

PRATAMIKA RASAVADAM
PARAMESWARAN PILLAI

E1:1

32 F0

MUL



080621

Madras University Library.


Date Label.



Ac. No. 80621

Cl. No. ~~E1:1~~

This book should be returned on or before ^{32FO}
the date last marked below.



Pratanika Rasavadam
പ്രാതനിക രസവാദം.

ഗ്രന്ഥകർത്താ,
കേ. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. ഐ.
തിരുവിതാംകൂർ നവമെൻറ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽകെമിസ്ട്രറ്റ്.

K. Paraswarayan Pillay


“മനോമോഹനം” പ്രസ്സ്,

കൊല്ലം.

Quilom

1096.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പ്രതി വ്യാജമാകുന്നു.



80621

E1:1

32 F.



പ്രാഥമികരസവാദം.

പാഠം ച.

പ്രകൃതിവികാരവും രാസവികാരവും. ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാവസ്തുക്കൾക്കും അവയുടെ പ്രകൃതിയിലും ചേരുവയിലും ഓരോതരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു കഷണം ഇരുമ്പെടുത്തു ചൂട് പഴുപ്പിക്കുക. ഈ ചൂടുപഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പിനെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ അതിന്റെ തൂക്കത്തിലോ മറ്റു ഗുണങ്ങളിലോ സാധാരണ ഇരുമ്പിനുള്ളവയിൽ നിന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും കാണുകയില്ല. ചൂട് മാത്രം അതിന്നു കൂടുതലായി കാണും. ഇനി ഒരു കഷണം ഇരുമ്പെടുത്തു ധാരാളം ഈപ്പമുള്ളതും വായു സ്വർഗ്ഗീകാർത്തക്ക സൗകർണ്യമുള്ളതും ആയ ഒരുസ്ഥലത്തു വയ്ക്കുക! ഒന്നരണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുമ്പുകഷണം മുഴുവൻ തവിട്ടു നിറമുള്ള ഒരുമാതിരി പൊടികൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നതുപോലെ കാണാം. ഈ പൊടിക്കു് നാം തുരുമ്പു് എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. ഈ തുരുമ്പു് പ്രത്യേകം എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇരുമ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇരുമ്പിനു് ചൂടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വികാരത്തിനു് നാം പ്രകൃതിവികാരം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ

ഗുണങ്ങൾക്കു പാടെ വ്യത്യാസം വരത്തക്കവണ്ണം അതു തുരുമ്പായി പരിണമിച്ചതിന് നാം രാസവികാരമെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു.

രസവാദം. വസ്തുക്കളുടെ ചേരുവയിലോ രസത്തിലോ ഗണനീയങ്ങളായ ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടാക്കി അവയുടെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് അവയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ സാധനങ്ങളെ ഉളവാക്കത്തക്കവണ്ണം വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരഭേദങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനു രസവാദം എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റും സദാസമയവും പലമാതിരി രാസവികാരങ്ങളും പ്രകൃതിവികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മണ്ണിലും വായു മണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാതിരി വികാരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് സസ്യാദികളും ജീവജാലങ്ങളും ജീവിച്ചുപോരുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും രസവാദം വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്ന് വെളിവാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

വസ്തുക്കളുടെ അനശ്വരത. ഒരു വസ്തുവിനു എന്തെല്ലാം രാസവികാരങ്ങളും പ്രകൃതിവികാരങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അണുമാത്രം പോലും നശിച്ചു നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നില്ല. ഇതു പ്രകൃതിയുടെ പ്രധാനനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ നിയമമാണ് രസവാദത്തിന്റെ അസ്ഥിവാദമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് രാസവികാരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളുടേയും സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അതു ഒരു പുതിയ രൂപത്തെ അവലംബിക്കുകമാത്രം ചെയ്യുന്നു.

ന്നു. വിറകു കത്തിഎരിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലമായി ചാമ്പലും വായുരൂപത്തിൽ ഉള്ള ചില സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിലും വിറകിന്റെ ചേരുവയിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായിരുന്ന യാതൊരു മൂലതത്വങ്ങൾക്കും വാസ്തവത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവയുടെ ഘടനയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി വിറകിന് ഒരു രൂപഭേദം വന്നു എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

വസ്തു. ഘനമുള്ളവയും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാവുന്നവയുമായ എല്ലാവിധം വസ്തുക്കൾ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവ അവിഭജിതങ്ങളും അനുഗമ്യങ്ങളുമായ ചെറിയ ചെറിയ അണുക്കളുടെ സംയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഏകദേശം ൮൦ (എൺപതു) തരം അണുക്കൾ ഉള്ളതായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുതരം അണുക്കൾകൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു ഭൂതങ്ങൾ എന്നൊരു തത്വങ്ങൾ എന്നൊരു പേർ കല്പിക്കാം. രണ്ടോ അതിലധികമോ അണുക്കളുടെ സംയോഗംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു യോഗവസ്തുക്കൾ എന്നു പേർപറഞ്ഞുവരുന്നു. അണുക്കൾ ഏകദേശം ൮൦ തരം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതിനാൽ ഈ ഓരോ തരം അണുക്കളും അവ തമ്മിൽ മാത്രം സംയോഗിച്ചാൽ എൺപതു ഭൂതങ്ങളേ ഉണ്ടാകാൻ തരമുള്ളൂ. എല്ലാത്തരം അണുക്കളുടേയും ഘനം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെ അല്ല. എന്നാൽ ഒരേതരത്തിൽപ്പെട്ട അണുക്കൾക്കു തമ്മിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യർക്കു ഇതേവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനംകൊ

ണ്ടു നിണ്ണയിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തവിധം അത്ര ഘനംകുറഞ്ഞവയാണു് അണുക്കൾ. അതുകൊണ്ടു് ഒരുണുവിന്റെ ശരിയായതുകൾ ഇത്രയെന്നു ആരും ഇതുവരെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരുതരം അണുവിനെ ഒരു തോതായി സ്വീകരിച്ചു അതിനു ഇനതുകൾമെന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നപക്ഷം മറുത്തു അണുക്കൾ ഈ അണുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാൽ അവയ്ക്കു് എത്രഘനം കാണുമെന്ന് ഓരോ പരീക്ഷണം കൊണ്ടു് നിണ്ണയിക്കാം. സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഏകോപിച്ചു് ഓക്സിജനെ ഒരുതോതായി ഗണിച്ചു അതിന്റെ ഒരുണുവിനുള്ള തുകയും മറ്റു ഏന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറുത്തു ഭൂതങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിനും എത്ര ഘനമുണ്ടെന്നു പല പരീക്ഷണം കൊണ്ടു് ക്ഷണത്തിൽ അനുമാനിക്കാം. താഴെകാണുന്ന പട്ടികകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂതങ്ങളെയും അവയുടെ ഒരുണുവിന്റെ ഘനത്തെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏ. പട്ടിക.

പേരു.	ചിഹ്നം.	അണുവിന്റെഘനം.
ഹൈഡ്രജൻ	H	1
ഇംഗാലാ (കാർബൺ)	C	12
നൈട്രജൻ	N	14
ഓക്സിജൻ	O	16
ഫ്ലൂവീൻ	F	19
സിലിക്കോൺ	Si	28
ഫോസ്ഫറസ്	P	31
ഗന്ധകം (സൾഫർ)	S	32
ക്ലോറിൻ	Cl	35.5
ബ്രോമീൻ	Br	78.0

ബി. പട്ടിക.

സോഡിയം	Na	23
മാഗ്നീഷ്യം	Mg	24
അലൂമിനിയം	Al	27
പൊട്ടാസ്യം	K	39
കാത്സ്യം	Ca	40
ക്രോമിയം	Cr	52
മാങ്ങനീസ്	Mn	55
ഇരിമ്പ് (Iron)	Fe	56
ചെമ്പ് (Copper)	Cu	63
നാകം (Zinc)	Zn	65
വെള്ളി (Silver)	Ag	108
വെളുത്തീയം (Tin)	Tn	118
അന്തരനക്ഷത്രം (ആൻറിമണി)	Sb	120
ബേരിയം	Ba	137
പ്ലാറ്റിനം	Pt	195
സ്വർണം (ഗോൾഡ്)	Au	197
രസം (മെർക്കറി)	Hg	200
കുത്തിയം	Pb	207
റേഡിയം	Ra	225

ഓരോ ഭൂതത്തിന്റേയും പേരുകഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിക്കാണുന്നവല്ലോ. അവയെല്ലാം ഓരോ ഭൂതത്തിനും അതിന്റെ പേരിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാകുന്നു. H എന്ന അക്ഷരംകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ഭൂതത്തിന്റെ ഒരു അണു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതു്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായ് ഒടുവിൽ കാണുന്ന H എന്ന അക്ഷരം

പട്ടികകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്രകാരംതന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം.

പരീക്ഷണം ൧. സാമാന്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു കണ്ണാടി ക്ഷഴലിൽ സ്വല്പം മെർക്യൂറിക്ക് ഓക്സൈഡ് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചുവന്ന പൊടിയെടുത്തു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു നോക്കുക. ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ നിറം കറുപ്പായിത്തീരുന്നു. പിന്നീട് സ്വല്പസമയം കഴിഞ്ഞു കണ്ണാടിക്കുഴലിൽനിന്നും അത്രപിടയായ ഒരു വാതകം പുറപ്പെടുന്നതും അതിന്റെ അകവശത്തു മുകളിലായി മിനുമിനുപ്പുള്ള ഒരു സാധനം പറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം. ഈ വാതകത്തെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതു ഓക്സിജൻ എന്ന ഭൂതവസ്തുവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അകത്തു പറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തെ ചുരണ്ടിയിട്ടു നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേന്ന് കുമളപോലെ നില്ക്കും. ഇതു രസമാകുന്നു. അതിനാൽ മെർക്യൂറിക്ക് ഓക്സൈഡ് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചുവന്ന പൊടി രസം, ഓക്സിജൻ എന്നീ രണ്ടു സാധനങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നു നമുക്ക് അറുമാനിക്കാം. ഇപ്രകാരം ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളുടെ സംയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് യോഗവസ്തുക്കൾ എന്നു പേർപറഞ്ഞുവരുന്നു. രസത്തിൽനിന്നും ഓക്സിജനിൽനിന്നും എത്രതന്നെ പണിപ്പെട്ടാലും ഇതരസാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഈ മാതിരി വസ്തുക്കൾക്കു തത്വങ്ങൾ എന്നോ ഭൂതങ്ങൾ എന്നോ പേർ പറയുന്നു.

പരീക്ഷണം ൨. കുറച്ചു ചെമ്പുരാകിയ പൊടിയും ഗന്ധകവും കൂടി ഒരു കണ്ണാടിക്കുഴലിൽ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു നോക്കുക. കുറച്ചു സമയംകൊണ്ട് ഗന്ധകം ഉരു

കി ചെമ്പുമായി യോജിച്ച് കോപ്പർസൽഫൈഡ് (Copper sulphide) എന്നു പറയുന്ന ഒരു കരുത്ത സാധനമായിത്തീരുന്നു. ഇതു ചെമ്പിൽനിന്നും ഗന്ധകത്തിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. കോപ്പർസൽഫൈഡ് ഒരു യോഗവസ്തുവാകുന്നു. എന്നാൽ ചെമ്പിനേയോ ഗന്ധകത്തേയോ പ്രത്യേകം എടുത്തു എന്തെല്ലാം വിദ്യകൾ പ്രയോഗിച്ചാലും അവയെ അന്യസാധനമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ അവയും തത്വങ്ങൾ (ഭൂതങ്ങൾ) തന്നെ.

മേൽ കാണിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് തത്വങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളായി പിരിക്കാൻ വഹിയാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നും യോഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളുടെ സംയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവയെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലായി. എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സ്ഥിതി ഒന്നുപോലെ അല്ല. ചിലവ ഘനരൂപത്തിലും മറ്റു ചിലവ ദ്രവരൂപത്തിലും വേറെ ചിലവ വായുരൂപത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ലോഹങ്ങളിൽ രസം ഒഴികെയുള്ള തത്വങ്ങൾ എല്ലാം ഘനരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. രസം ദ്രവരൂപത്തിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അലോഹങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറീൻ എന്നീ അഞ്ചു തത്വങ്ങളും വായുരൂപത്തിലും, ബ്രോമീൻ ദ്രവരൂപത്തിലും ശേഷമുള്ളവയെല്ലാം ഘനരൂപത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. ചില തത്വങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണും. മറ്റുചിലവ വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ. ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തത്വമാണ്. ഭൂമിയുടെ തുക്കത്തിന്റെ പകുതിഭാഗവും ജലത്തിന്റെ ഒൻപതിൽ എട്ടുഭാഗവും വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗവും ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ്. ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ധാരാളമായി കാണുന്ന തത്വങ്ങൾ സിലിക്കോൺ, നൈട്രജൻ, ഇംഗാലം,

ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവകളാകുന്നു. ഭൂമിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം സിലിക്കോൺ ആകുന്നു. ജീവജാലങ്ങളുടേയും, സസ്യാദികളുടേയും അധികഭാഗവും ഇംഗാലം, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നിവകൾ ചേർന്നായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഫ്ലൂറീൻ, ക്രോമിയം, ബേറിയം, മാങ്ങനീസ്, മുതലായ തത്വങ്ങൾ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ചില തത്വവസ്തുക്കൾ തനിസ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അവ എപ്പോഴും മറ്റു വസ്തുക്കളോടു സംയോജിച്ച് യോഗങ്ങളായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഫാസ്ഫറസ്, ക്ലോറീൻ, സിലിക്കോൺ, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ നാലും അത്തരം തത്വങ്ങളാണ്. ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഗന്ധകം, രസം മുതലായവ തനിയേയും യോഗങ്ങളായിട്ടും ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും. തത്വങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. മുകളിൽ കാണിച്ച ഏ. പട്ടികയിൽ കാണുന്നവയെല്ലാം അലോഹങ്ങളും ബി. പട്ടികയിൽ കാണുന്നവയെല്ലാം ലോഹങ്ങളും ആകുന്നു. തത്വങ്ങളിൽ ലോഹങ്ങളാണ് ആദ്യകാലംമുതലേ മനുഷ്യരുടെ പരിചയത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവ. ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, ഇഴയം, നാകം, സ്വർണം, വെള്ളി എന്നീ ലോഹങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ഏകദേശം അറിഞ്ഞിരുന്നു. തത്വങ്ങളിൽ അധികവും ലോഹങ്ങളാകുന്നു. ആകെ ഏകദേശം അൻപത്തിമൂന്നു ലോഹങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് അലോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പല സ്വഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായവ,

(൧) ലോഹങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രഭുവുണ്ട്.

(൨) ലോഹവസ്തുക്കളിൽ കൊട്ടിനോക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക നാദം പുറപ്പെടും.

(൩) ലോഹങ്ങൾ ഓക്സിജനമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന യോഗവസ്തുക്കൾ വെള്ളവുമായി യോജിച്ചാൽ ബെയിസ് എന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാഹരണം. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$.
 $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ba}(\text{OH})_2$.

എന്നാൽ അലോഹങ്ങൾ ഓക്സിജനമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന യോഗങ്ങൾ ജലവുമായി യോജിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അമ്ലങ്ങളാണ്.

(൪) ലോഹങ്ങളിൽ കൂടി ചൂടും വിദ്യുച്ഛക്തിയും വേഗം സഞ്ചരിക്കും. എന്നാൽ അലോഹങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല.

മിശ്രങ്ങൾ. തത്വങ്ങളെ നോക്കുന്നതായാലോ ചിലപ്പോൾ ചൂപറയാൻ പാടില്ലാത്തവയായി ഒരുതരം വസ്തുക്കളെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവയിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വസ്തുക്കൾ രാസയോഗംകൂടാതെ ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു. അവയെ സാധാരണ മിശ്രങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. സ്വല്പം മണ്ണും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ അവ രണ്ടും ഇടകലർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മിശ്രം നമുക്കു കിട്ടുന്നു. ഈ മിശ്രത്തിന് മണ്ണിന്റെയും പഞ്ചസാരയുടേയും ഗുണങ്ങൾ കാണാം. ഇതിനെ ജലത്തിലിട്ടാൽ പഞ്ചസാര മഴുവൻ അതിൽ അലിഞ്ഞു മണ്ണ് അടിയിൽ താഴുന്നു. അപ്പോൾ അവയെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം തിരിക്കാം. കുറച്ച് ഇരുമ്പുരാകിയ പൊടിയും ഗന്ധകവും കൂടി കലർത്തിയാൽ അവയുടെ ഒരു മിശ്രം ഉണ്ടാകും. കാന്തത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഈ മിശ്രത്തിലുള്ള രണ്ടു സാധനങ്ങളെയും വേർ തിരിക്കാം. എന്നാൽ നേരേമറിച്ച് ഈ മിശ്രത്തെ ചൂടാക്കിപ്പിടിക്കുന്നപക്ഷം അവയ്ക്കു തമ്മിൽ

മാസയോഗമുണ്ടായി അയറൺസൾഫ്യിഡ് എന്ന ഒരു പുതിയ വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ഒരു യോഗവസ്തുവാണ്. അതിന്റെ സ്വഭാവം ഗന്ധകത്തിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മിശ്രങ്ങളും യോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ.

മിശ്രങ്ങളും യോഗങ്ങളും ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ ചേർന്നതായിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും അവയ്ക്കുതമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായവയെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

൧. സ്വല്പം ഇരുമ്പുരാകിയ പൊടിയും ഗന്ധകഭൂസ്മവും കൂടി കലർത്തിവെച്ചാൽ അവയുടെ ഒരു മിശ്രം നമുക്കു കിട്ടുന്നു. ഇതിനു ഗന്ധകത്തിന്റെയും ഇരുമ്പുപൊടിയുടെയും നിറത്തിന്റെ ചകച്ചു്കാണം. അതിൽ സ്വല്പം എടുത്തു ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഗന്ധകവും ഇരുമ്പുപൊടിയും ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നതു്കാണം. അതുകൂടാതെ കാന്തംകൊണ്ട് ഈ മിശ്രത്തിലുള്ള ഇരുമ്പുപൊടിയെ വേർതിരിക്കയും ചെയ്യാം. അതിനാൽ ഒരു മിശ്രത്തിൽ അതിന്റെ ഓരോ അംശവും യാതൊരു രൂപഭേദവും കൂടാതെ ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു. നേരേമറിച്ചു യോഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇവിടെനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായ ഓരോ വസ്തുവിനേയും സാമാന്യരൂപമായങ്ങൾകൊണ്ടു ധർമ്മം തിരിച്ചറിയാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തവിധം അതിനു രൂപഭേദം സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഗന്ധകഭൂസ്മവും ഇരുമ്പുരാകിയപൊടിയും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അയറൺസൾഫൈഡ് എന്ന വസ്തു നല്ല കറുപ്പുനിറത്തോടുകൂടിയതും ഗന്ധകത്തിൽനിന്നും ഇരുമ്പിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടിയതും ആകുന്നു.

൨. ഇരുമ്പുപൊടിയും ഗന്ധകവുംകൂട്ടി കലർത്തിയുണ്ടാക്കിയ മിശ്രത്തെ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ സഹായംകൊണ്ട് വേർതിരിക്കാം. എന്നാൽ അവ തമ്മിൽചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുവായ അയറൺസൾഫ്യിഡിനെ രാസപ്രയോഗംകൊണ്ടുമാത്രമേ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

൩. യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണയായി പൂട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ മിശ്രങ്ങളുടെ കായ്ത്തിൽ അപ്രകാരം സാഭവിക്കുന്നില്ല.

൪. യോഗവസ്തുക്കളിൽ ഭാഗഭാഷകേളാകുന്ന തത്വങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ഇത്രത്തോളമെ യോജിച്ചുചേരുകയുള്ളുവെന്നു ഒരു ക്ലിപ്തമുണ്ട്. നേരേമറിച്ച് ഒരു മിശ്രത്തിന്റെ കായ്ത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു നിബന്ധനയുമില്ല.

പാഠം ൨.

അഗ്നി.

നാം മെഴുകുതിരിയുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന മെഴുകു ഇംഗാലം, ഫൈഡ്രജൻ എന്നീ രണ്ടു തത്വങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗവസ്തുവാണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് ഫൈഡ്രോകാർബൺ യോഗങ്ങൾ എന്ന് പേർ പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ മെഴുകിന്റെ അംശങ്ങളായ ഇംഗാലത്തിനും ഫൈഡ്രജനും വായുമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി രാസയോഗമുണ്ടായി ഇംഗാലാമ്ലവാതകവും നീരാവിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇംഗാലത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗം

കത്തി ദഹിക്കാതെ പുകയായിട്ടും പോകും. ഇതിന്റെ വസ്തുതയെന്താഴെ പറയുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് തെളിയിക്കാം.

പരീക്ഷണം ൧. സ്വല്പം നല്ല ചുണ്ണാമ്പ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു കുപ്പിയിലോ അരിപ്പുതാളിലോ ഒഴിച്ചുറിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി അടച്ചുവക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം യാതൊരു കലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തെളിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിൽ കുറച്ചെടുത്ത വാ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു ഇളക്കിയാൽ അതിനു യാതൊരു നിറഭേദമൊ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നീട് ആ കുപ്പിയിലെ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം കളഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിറക്കിവെക്കണം. അല്പസമയം അതിലിരുന്ന് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പൂർത്തെയ്ത്ത് കുറെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ കലക്കിയാൽ അതിന് പാലിന്റെ നിറം ഉണ്ടാകും. സ്വല്പസമയംകൊണ്ട് കുപ്പിയുടെ അടിയിൽ വെളുത്ത ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ തണ്ടുകളും ചെച്ചും. ഈ തരികളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതു ചോക്ക് എന്ന് നാം പറഞ്ഞുവരുന്ന ശീമചുണ്ണാമ്പാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ വസ്തു ചുണ്ണാമ്പും ഇംഗാലാമ്ലവാതകവും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽനിന്നും മെഴുകുതിരി കത്തിയപ്പോൾ ഇംഗാലാമ്ലവാതകം ഉണ്ടായിരുന്നത് നാം പഠിക്കുന്നു.

പരീക്ഷണം ൨. കത്തിനില്ക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ മുകളിലായി വൃത്തിയായി കഴുകി ഉണക്കിയ ഒരു കണ്ണാടി ട്രബ്ളർ കമത്തി പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ അകവശത്തു ചെറിയ ജലകണങ്ങൾ പററിപ്പിടിക്കുന്നതു കാണാം. ഹൈഡ്രജനെന്നും ഓക്സിജനെന്നും പറയപ്പെടുന്ന രണ്ടു തത്വങ്ങൾ ത

മയിൽ സംയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു യോഗവസ്തുവാണു് ജലം. ഇവിടെ ജലം ഉണ്ടായതു മെഴുകുതിരിയിലുള്ള ഫൈബ്രജൻ വായുമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിചേർന്നാണു്. മെഴുകുതിരികളുന്മേലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതു നീരാവിയാണു്. ജലം അല്പം ഈ നീരാവി തണുക്കുമ്പോൾ ജലം ഉണ്ടാകുന്നു.

പരീക്ഷണം ൩. ഒരു കണ്ണാടിപ്പാത്രത്തിൽ കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു് അതിനെ കത്തിനില്പിക്കുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ മുകളിൽ പിടിച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ കരിപററിപ്പിടിക്കും. ഇതിൽനിന്നും മെഴുകുതിരിയിൽ കരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗാലത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

വസ്തുക്കൾ ഒക്കെയും അനശ്വരങ്ങളാണെന്നു് മുമ്പു് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതിൽ എത്രമാത്രം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കാം.

പരീക്ഷണം ൩. നടുഭാഗം ഇടുങ്ങിയ ഒരു കണ്ണാടിക്കുഴലിനെയെടുത്തു അതിന്റെ ഒരറ്റം ചെറിയ ചെറിയ സൂഷിരങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു കെടേൾകൊണ്ടു് അടക്കുക. അടുപ്പിന്റെ സൂഷിരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു തിരികത്തിനിർത്തി കുഴലിന്റെ മറ്റേറ്റം കാസ്റ്റിക് സോഡായെണു് പറയപ്പെടുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഏതാനുംകഷണങ്ങൾ ഇട്ടു നിറക്കുക. പിന്നീട് കുഴലിനെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള തിരിമുതലായ സാധനങ്ങളോടുകൂടി തുക്കി അതിന്റെ തുക്കം നിണ്ണയിക്കണം. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു പതുക്കെ കെടേൾ അടുപ്പു് ഇളക്കിയെടുത്തു തിരികത്തിച്ചു് ക്ഷണത്തിൽ അതേസ്ഥിതിയിൽ കുഴലിനെ ആ അടുപ്പുകൊണ്ടു് അടക്കുക. അടുപ്പിന്റെ സൂഷിരങ്ങളിൽകൂടി പ

റത്തുള്ള വായുവിനു കഴലിനകത്തു പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തിരി മുറക്ക് കത്തികൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്വല്പനേരം കത്തികഴിയുമ്പോൾ തീ അണച്ച് അതേസ്ഥിതിയിൽ കഴലിനെ തുക്കിനോക്കുന്നപക്ഷം അതിന് ആദ്യത്തേതിൽനിന്നും കൂടുതൽ തുക്കമുള്ളതായികാണാം. തിരി കുറെ കത്തിയെരിഞ്ഞുപോയിട്ടും ഇങ്ങനെ തുക്കംകൂട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണംഎന്ത്? തിരി കത്തിയതിന്റെ ഫലമായി നീരാവിയും ഇംഗാലാമ്ലവാതകവും ഉണ്ടാകാം. കുപ്പിയുടെ ഒരുഭാഗത്തു ഈ രണ്ടുവസ്തുക്കളേയും സംഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള കാസ്റ്ററിക്ക് സോഡായെന്ന സാധനം ഇരിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അവ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രയിൽത്തന്നെ അവയെ അപഹരിച്ചുകളയുന്നു. അതിനാൽ അവയിൽ അല്പംപോലും പുറത്തുപോകാൻ സംഗതിയാകുന്നില്ല. നീരാവിയും, ഇംഗാലാമ്ലവാതകവും തിരിയിലുള്ള ഇംഗാലവും ഫൈഡ്രജനും വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുക്കളാണെന്ന് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചുവല്ലോ. അതിനാൽ തുക്കത്തിൽ കൂടുതൽകാണുന്നതിനുള്ള കാരണം തിരിയുടെ അംശങ്ങളോടുചേർന്ന വായുവിലുള്ള ഓക്സിജൻ സംയോഗിച്ചതെന്നെയാണ്. പരീക്ഷണത്തിനുമുമ്പും പിമ്പും പുറമെയുള്ള വായുവിനെ നമുക്കു തുക്കിനോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ കത്തിയ തിരിയോടുകൂടിയ കഴലിനു എത്രമാത്രാ ഘനം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ. അത്രത്തോളം ഘനം വായുവിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി വെളിപ്പെടും.

ഈകാണിച്ച പരീക്ഷണംകൊണ്ടും ഒരു തിരികത്തി എരിഞ്ഞാൽ അതു നമുക്കു ദ്രാളിക്കു അഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിന്റെ അംശങ്ങളായ ഭൂതങ്ങളിൽ ഒരണവിനു പോലും നാശമൊ നഷ്ടമൊ സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമായി. അവയ്ക്കു രാസവികാമുണ്ടായി രൂപാന്തരപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നുഎന്നു മാത്രമെയാളുള്ളു. കട്ടിയായിരുന്ന തിരി ക

ത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരുപികളായ ഇംഗാലാമുവാതകമാ
യും നീരാവിയായും പരിണമിച്ചു. മേൽപറയപ്പെട്ട സംഗ
തികളിൽനിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കത്തി എരിയുന്നുഎ
ന്നുപറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ചൂടും വെളിച്ചവും പുറപ്പെടുവിക്ക
ത്തക്കവണ്ണം അതിന്റെ അംശങ്ങൾ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജ
നുമായി രാസയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണു് മനസ്സിലാക്കേണ്ട
തു. വസ്തുക്കൾ കത്തുന്നതിനു ചില പ്രത്യേകസൗകര്യങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവ കത്തുകയില്ല. ധാരാ
ളം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ സാധാരണ ഒന്നാ
ണെ കത്തുകയില്ല. ഒരു ഇടുങ്ങിയ കഴുത്തുള്ള കുപ്പിയിൽ ഒരു
തിരികത്തിച്ചുവെച്ചാൽ അതു ക്ഷണത്തിൽ കെട്ടുപോകുന്നതു
ഓക്സിജന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണു്. വസ്തുക്കൾ കത്തുന്നതിനു ചൂ
ടു് ആവശ്യമാണു്. ഒരു മെഴുകുതിരി എടുത്തു വെറുതെവെ
ച്ചിരുന്നാൽ അതു കത്തുകയില്ല. അതിനെ തിരിയിൽ കാണി
ച്ചു് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു് മാത്രമെ അതു
കത്തുകയൊള്ളൂ. ഒരു കഷണം ഫാസ്ഫറസ് എടുത്തു കാ
ററത്തുവെച്ചാൽ അതു ആദ്യമായി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടു് മാത്രം ഇ
രിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വല്പനേരംകൊണ്ടു് അതിനു വേണ്ട
വോളം ചൂടുകിട്ടുമ്പോൾ അതു കത്തിത്തുടങ്ങും.

പാഠം ൩.


ഓക്സിജൻ (അമ്ലജം. പ്രാണവായു)

ചിഹ്നം—O. അണുവിന്റെ ഘനം ൧൩.

പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന

തതം ഓക്സിജനാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി അതിനെ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആലോചിക്കാം.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ. മെർക്യൂറിക്ക് ഓക്സൈഡു, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് മുതലായി ഓക്സിജന്റെ വേറുപയുജ്ജ പല യോഗവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. സാധാരണ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാണ് ഓക്സിജനെ ശേഖരിക്കുന്നത്. അത് സ്റ്റിക്കുരൂപത്തിലിരിക്കുന്നതും നല്ല വെളുപ്പുനിറമുള്ളതുമായ ഒരു സാധനമാണ്. അതിൽ പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറിൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂന്നുതത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഉരുകി അതിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ പുറപ്പെടും. പിന്നീട് ശേഖിക്കുന്നതു പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറിൻ എന്നീ രണ്ടുതത്വങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യംക്ലോറൈഡ് എന്ന സാധനമാകുന്നു. ഒരു ധികം ചൂടിന്റെ സഹായംകൊണ്ടേ പൊട്ടാസ്യംക്ലോറേറ്റിലുള്ള ഓക്സിജനെ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവൂ. എന്നാൽ അതിന്റെകൂടി സ്വല്പം മാങ്ങനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കറുത്തപൊടി കലർത്തിയാൽ വളരെ കുറച്ചു ചൂടുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ വേർതിരിയും. ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന മാങ്ങനീസ് ഡയോക്സൈഡിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊരുവികാരവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്കിലും അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യംക്ലോറേറ്റ് വേഗം അഴിഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു. ഇപ്രകാരം സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടുമാത്രം രാസപ്രവൃത്തിയുടെ വേഗത്തെ കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാറ്റാലിറ്റിക്കേജൻറ് എന്നൊരു കാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്നൊരു പദത്തെുപയോഗിക്കുന്നു.



also J.

മുകളിൽ കാണുന്ന പടത്തിൽ നോക്കുക. ഇതിൽ A. എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിയുള്ള കണ്ണാടിക്കഴലാണ്. ഇതിൽ സ്വല്പം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അത്രയും തുക്കത്തന്നെ മാജനീസ് ഡയോക്സൈഡും എടുത്തു കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇടണം. പിന്നീട് B. എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിക്കഴൽ കടക്കാൻതക്ക വലിപ്പമുള്ള ഒരു സൂഷിരത്തോടുകൂടിയ ഒരു കെടേൾ അപ്പുകൊണ്ട് അതിനെ അടയ്ക്കണം. C. എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അകത്തു തട്ടോടുകൂടിയ ഒരു പാത്രമാണ്. അതിന്റെ ഏകദേശം അരഭാഗവും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. പിന്നീട് D. എന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നപാത്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറച്ച് അതിന്റെ വാ ഒരു കണ്ണാടിച്ചിലുകൊണ്ട് മൂടി U. എന്ന പാത്രത്തിനകത്തുള്ള തട്ടിൽ കമത്തിവെച്ച് കണ്ണാടിച്ചിലുടപ്പിനെ മാറിക്കളയണം. B. എന്ന കഴലിന്റെ താഴത്തെ അറ്റം വളഞ്ഞു C. യുടെ അകത്തുള്ള തട്ടിലെ സൂഷിരത്തിൽകൂടി D. എന്ന പാത്രത്തിന്റെ വായിൽ ചെന്നെത്തത്തക്കവണ്ണവും ഇരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിവെച്ചുകഴിഞ്ഞു A. യുടെ മൂട്ടിൽ പതുക്കെ ഒരു വിളക്കുവെച്ച് മൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ A. യിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ വാതകം പുറപ്പെട്ട് B. എന്ന കഴൽ വഴിയായി D. എന്ന പാത്രത്തിൽ ചെന്നുചേരും. അപ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളം താഴെയുള്ള C. യെന്ന പാത്രത്തിൽ വീണുകൊള്ളും. D. യിൽ ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വാ ഒരു കണ്ണാടിച്ചിലുകൊണ്ട് മൂടി അതിനെ മാറിവെച്ച് മുമ്പു പറഞ്ഞ പ്രകാരം വേറെ പാത്രങ്ങൾ കമത്തി അവയിലും ഓക്സിജൻ ശേഖരിക്കാം.

പരീക്ഷണം ൧. ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിന്റെ കണ്ണാടിയില്ലാപ്പിനെ തുറന്ന് അതിലേക്കു ഒരു ചെറിയ തീക്കൊള്ളി കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതു പൊങ്ങു ആളിക്കത്തും.

൨. മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തൂടത്തിൽ ഒരു കഷണം ഫ്ലാസ് ഫ്ലാസ് വെച്ചു കത്തിച്ച് കാണിച്ചാൽ അതു വളരെ പ്രഭയോടുകൂടി കത്തും. അപ്പോൾ അതിൽനോക്കിയാൽ കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകും.

൩. തുരുമ്പില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഘനംകറഞ്ഞ കമ്പിയെടുത്ത് അതിന്റെ അറ്റത്തു സ്വല്പം പഞ്ഞി ചുറ്റി ഉരുക്കിയ ഗന്ധകത്തിൽ മുക്കി കത്തിച്ച് അതിനെ ഓക്സിജനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാണിച്ചാൽ അതു ധാരാളം തീപ്പൊരി ചിതറിക്കൊണ്ടു വളരെ പ്രകാശത്തോടുകൂടി കത്തിക്കൊരിയും.

ഓക്സിജന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഭൂതം ഒരു അത്രുപിയായ വാതകമാണ്. ഇതിനു യാതൊരു ഗന്ധമോ രുചിയോ ഇല്ല. ഓക്സിജൻ ഫൈബ്രജൻ എന്ന ഭൂതത്തേക്കാൾ പതിനാറിരട്ടി ഘനമുണ്ട്. അതു ഏറക്കുറവെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും. ഓക്സിജൻ സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു വാതകമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അന്യധികമായി തണുപ്പിച്ചാൽ അതിനെ ഒരു ദ്രവംപോലെ ആക്കാം. ഓക്സിജൻ കത്തുകയില്ല. എങ്കിലും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ അതിൽ കാണിച്ചാൽ അതു കൂടുതൽ

വേഗത്തോടും പ്രഭയോടും കൂടി കത്തും. സാധാരണ മിക്ക ഭൂതങ്ങളോടും ഓക്സിജൻ രാസയോഗം ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന യോഗവസ്തുവിനു ഓക്സൈഡ് എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. രസവും ഓക്സിജനും ചേർന്നുണ്ടായത് മെർക്കുറിക്ക് ഓക്സൈഡ്. അതുപോലെ ഹാസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം എന്നിങ്ങനെ ഭൂതങ്ങളോട് ഓക്സിജൻ സംയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹാസ്ഫറസ് ഓക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഓക്സൈഡ്, സോഡിയം ഓക്സൈഡ് മുതലായവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്സിജൻ നമുക്കു വളരെ ഉപയോഗമുള്ള വസ്തുവാകുന്നു. ഇതിന്റെ സഹായം കൂടാതെ സസ്യാദികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാലത്രേ അതിനു പ്രാണവായു എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ഹാരസാധനങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിനു വേണ്ട ചൂടുലഭിക്കുന്നതും ഓക്സിജന്റെ പ്രവൃത്തിമൂലമാണ്. മണ്ണിൽ ഈ വാതകം ശരിയായി പ്രവൃത്തിച്ചില്ലായെങ്കിൽ ചെടികൾ വളരുകയില്ല.

ഓസോൺ. ഇത് ഓക്സിജന്റെ ഒരു രൂപവിശേഷമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഓക്സിജന്റെ മൂന്നുണക്കൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഓസോൺ ഓക്സിജനെപ്പോലെ ഒരു വാതകം തന്നെ. എങ്കിലും അവയുടെ രണ്ടിന്റേയും സ്വഭാവങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ഗണനീയങ്ങളായ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജനു യാതൊരു മണവുമില്ല. ഓസോൺ എന്ന വസ്തുവിന് വല്ലാത്ത ഒരു കടുത്ത മണമുണ്ട്. കുറച്ചു രസമെടുത്ത് ഓസോൺ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവയ്ക്കു തമ്മിൽ രാസയോഗം ഉണ്ടാ

കുറ. ഓക്സിജനമായി രാസയോഗമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ രസത്തെ നല്ലപോലെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കണം. വിദ്യശ്ചക്രിയുടെ സഹായംകൊണ്ട് ഓക്സിജനെ ഓസോണാക്കിത്തീർക്കാം. ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസോൺ ചൂടുകൊണ്ട് തിരികെ ഓക്സിജനായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.




൨൦൦൦ ര്.

ഹൈഡ്രജൻ ചിഹ്നം H. അണുവിന്റെ ഘനം ൧.

തനിഹൈഡ്രജൻ വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടേ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും പുറപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂതം ഏറക്കുറെകാണും. ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. ജലത്തിന്റെ ഒൻപതിൽ ഒരുഭാഗം ഇതുതന്നെയാണ്. എല്ലാത്തരം അമ്ലങ്ങളിലും സസ്യാദികളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ഒട്ടുവളരെ ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും സാധാരണയായി ലോഹങ്ങളിൽ അമ്ലങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാണ് അതു ശേഖരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നാകം എടുത്ത് അതിൽ അല്പം സൽഫൂറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജനും, നാകവും സൽഫൂറിക്ആസിഡും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സിങ്ക്സൾഫൈറ്റ് എന്ന ലവണവും ഉണ്ടാകുന്നു.



മേൽകാണിച്ചിരിക്കുന്ന പടത്തിൽ നോക്കുക. A. എന്ന് രണ്ടിടങ്ങിയ കഴുത്തുള്ള ഒരു കുപ്പിയാകുന്നു. അതിൽ ഉദ്ദേശം ൨൫ ഗ്രാം നാകുതകിടുകഷണം ഇട്ട് കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിന്റെ ഒരു കഴുത്ത് പടത്തിൽ B. എന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നതരം ഒരു വെച്ചുറോടുകൂടിയ ഒരു ക്ലേശപ്പുകൊണ്ട് മറുകെ അടയ്ക്കണം. വെച്ചുററിന്റെ താഴത്തെ അറ്റം കുപ്പിയുടെ അകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിയിരിക്കുകയും വേണം. മറോക്കഴുത്തു C. എന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വളഞ്ഞ കഴലോടുകൂടിയ ഒരു ക്ലേശപ്പുകൊണ്ടും അടയ്ക്കണം. D. എന്നും E. എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവ ഓക്സിജൻ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതരം പാത്രങ്ങളാണ്. വെച്ചുററിൽക്കൂടി ബ്ലേൺസ് തനിസൽഫൂറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചാൽ കുപ്പിയ്ക്കകത്തുനിന്നും കുമളകൾപോലെ ഫൈബ്രജൻ എന്നു വാതകം പുറപ്പെട്ട് C. എന്ന വളഞ്ഞ കഴൽവഴിയായി പുറത്തുവരും. ഓക്സിജനെ ശേഖരിച്ചതുപോലെതന്നെ അപ്പോൾ അതിനെ E. പോലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കാം.

ഫൈബ്രജൻകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തീക്കൊള്ളി കാണിച്ചാൽ ഉടൻ അതു കെട്ടുപോകും. പടത്തിൽ കണ്ടമാതിരി ഒരു വളഞ്ഞ കഴലിൽക്കൂടി ഫൈബ്രജൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അറ്റത്തു ഒരു തിരികൊള്ളത്തി പിടിച്ചാൽ ഫൈബ്രജൻ നീലനിറത്തിൽ കത്തും. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ ഒരു ചിമ്നി കമത്തിയാൽ ചിമ്നിയുടെ അകവശത്തു

ജലകണങ്ങൾ പററിപ്പിടിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതിൽനിന്നും ഫൈഗ്രജൻ കത്തിയപ്പോൾ അതു വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ച് ജലമുണ്ടായി എന്നു നാം പഠിക്കുന്നു.

മുണങ്ങും. ഫൈഗ്രജൻ ഓക്സിജനെപ്പോലെ നിറവും രുചിയുമില്ലാത്ത ഒരു അരുപിയായ വാതകമാകുന്നു. വസ്തുക്കൾ കത്തിപ്പരിയുന്നതിന് ഒരു സഹായിയാണ് ഓക്സിജൻ എന്നു മുമ്പ് പഠിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ ഫൈഗ്രജന്റെ സ്ഥിതി നേരേ മറിച്ചാണ്. എങ്കിലും അതു കത്തും. ഓക്സിജൻ ഒരിക്കലും കത്തുകയില്ല. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഘനം കുറഞ്ഞ വസ്തുവാണ് ഫൈഗ്രജൻ. അതിനു വായുവിന്റെ ഹർബ്-യിൽ ഒരുഭാഗം ഘനമേയുള്ളൂ. സോപ്പുവെള്ളത്തിലേക്കു ഫൈഗ്രജനെ പായിച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ കുമളകൾ ഉണ്ടായി വേഗം പറന്നു മുകളിലോട്ടുപോകും. ഇതും ഓക്സിജനെപ്പോലെ ഏറക്കുറെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും. സാധാരണയായി ഇതു വായുരൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും തണുപ്പിച്ച് ഇതിനെ ദ്രവരൂപത്തിലാക്കാം. ഫൈഗ്രജനെ ഓക്സിജനുമായി ചേർത്ത് അതിൽ തീ കാണിച്ചാൽ അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി അവയ്ക്കു തമ്മിൽ രാസയോഗം ഉണ്ടാകും. ഫൈഗ്രജൻ മറ്റു പല ഭൂതങ്ങളോടും ചേർന്ന് യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സകല ജീവികളുടേയും സമ്പ്രദികളുടേയും ജീവിതത്തിനു ആവശ്യമുള്ള ജലം ഫൈഗ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുവാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ ഈ ഭൂതം ഇംഗ്ലാലത്തോടും ഓക്സിജനോടും ചേർന്ന് പല പ്രയോജനകരങ്ങളായ

യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ഫൈഡ്രജൻ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ഭൂതമാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ.

പാഠം ൫.


ജലം.

നാം ഓക്സിജൻ, ഫൈഡ്രജൻ എന്നീ രണ്ടു ഭൂതങ്ങളെ പറ്റി സാമാന്യമായി ചില സംഗതികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പാഠങ്ങളിൽനിന്നും പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്കു അവ രണ്ടും സംയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ജലം എന്ന യോഗവസ്തുവിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം.

ഈ വസ്തു പ്രകൃതിയിൽ ഘനരൂപത്തിൽ മഞ്ഞുകട്ടയായും, ദ്രവരൂപത്തിൽ ജലമായും, വായുരൂപത്തിൽ നീരാവിയായും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ രൂപഭേദങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിഭേദം ഒന്നുമാത്രമാണ്.

ജലത്തിന്റെ ചേരുവ. ജലം ഓക്സിജൻ, ഫൈഡ്രജൻ എന്നീ രണ്ടു ഭൂതങ്ങളുടേയും രാസയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്നു മുമ്പു പറയപ്പെട്ട സംഗതികൾകൊണ്ടു നമുക്കു മനസ്സിലായി. ഇവ ഓരോന്നും ഏത്രത്തോളം ചേർന്നാൽ ജലമുണ്ടാകുമെന്നാണിനിയാലോചിക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ചേരുവയെപ്പറ്റി ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്കു ലഭിക്കുകയുള്ളു.

പരീക്ഷണം.



പട്ടം ൩.

മേൽകാണുന്ന പടത്തെ നോക്കുക. A. എന്നതു നാക കഷണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണാടി കൂസയാകുന്നു. അതിലേക്കു B. എന്ന വച്ചുറികൂടി സൽഫൂറിക്കാസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായി C. എന്ന വളഞ്ഞ കുഴൽ വഴിയായി D. എന്ന കൂസയിൽവരും. അതിൽ തന്നി സൽപൂറിക്കാസിഡ് വച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഫൈഡ്രജനിലുള്ള ഈപ്പത്തെ മുഴുവൻ അതു സംഗ്രഹിക്കുന്നു. D. യിൽനിന്നും കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ് കൊണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുന്ന E. എന്നനടുവ് വീങ്ങിയകഴലിലേക്ക് ഫൈഡ്രജൻ വരുന്നു. കാത്സ്യംക്ലോറൈഡ് കാത്സ്യം, ക്ലോറിൻ എന്നീ രണ്ടു ഭൂതങ്ങൾ സംയോഗിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഈപ്പത്തെ ആവാഹിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു ലവണമാണ്.

അതിനാൽ E. യിൽ കൂടി ഫൈഡ്രജൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഈർപ്പം മുഴുവൻ ഈ ലവണം അപഹരിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി വിടുന്നു. F. എന്നതാ ഒരു നടു വീങ്ങിയ കഴലാണ്. അതിൽ ചെറും ഓക്സിജനും സംയോഗിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്നു പറയുന്ന കറുത്ത വസ്തുവിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഉണ്ട്. G. എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വളഞ്ഞകഴലിൽ കാത്സ്യംക്ലോറൈഡ് നിറച്ച് അതിന്റെ തുകയും നിണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. E. വഴിയായി ഈർപ്പമില്ലാതെ വരുന്ന ഫൈഡ്രജൻ സ്വല്പനേരം F. G. എന്നി കഴലുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവയിലുള്ള വായു മുഴുവൻ പുറത്തുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിളക്കുകൊണ്ട് H. എന്ന കഴലിനു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ ഫൈഡ്രജൻ അതിലുള്ള കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന യോഗവസ്തുവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി രാസയോഗമുണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം ഓക്സിജന്റെ യോഗത്തിൽനിന്നും മോചിച്ചു തനിച്ചെന്നു മാത്രം ചൂവന്ന പൊടിപോലെ H. എന്ന കഴലിൽ ശേഖിക്കുന്നു. ഫൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചുണ്ടായ ജലത്തെ G. എന്ന കഴലിലുള്ള കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ് ആവാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും H. നേരും G. യേയും തുക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ F നു തുക്കുകറവുള്ളതായും G. ക്കു തുക്കുകൂടുതലുള്ളതായും കാണുന്നു. F. ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ ഫൈഡ്രജനുമായി സംയോഗിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് അതിനു ഘനം കുറയുകയും ഈ സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ജലത്തെ G. യിൽ ഉള്ള കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ് അപഹരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനു ഘനംകൂടുക

യും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താഴെ കാണുന്ന ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വസ്തുതയെ വിശദീകരിക്കാം.

പരീക്ഷണത്തിനു മുമ്പുള്ള F. റ്റർ തൂക്കം.	}	200	ഗ്രെയിൻ
പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം ടി			
അതിനാൽ നഷ്ടമായ ഓക്സി ജന്റെ തൂക്കം.	}	8	ടി
പരീക്ഷണത്തിനു മുമ്പുള്ള G. യുടെ തൂക്കം.			
പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം ടി	}	160	ടി
അതിനാൽ രാസയോഗംകൊ ണ്ടുണ്ടായ ജലത്തിന്റെ തൂക്കം.		9	ടി

ഇതിൽനിന്നും 9 ഗ്രെയിൻ ജലമുണ്ടാകുന്നതിന് എട്ടു ഗ്രെയിൻ ഓക്സിജൻ വേണമെന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ജലമെന്നത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും മാത്രം ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുവാകയാൽ വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കത്തിൽനിന്ന് ഓക്സിജന്റെ തൂക്കം കുറച്ചു കിട്ടുന്ന $(9-8=1)$ 1 ഗ്രെയിനാണ് ഇത്രയും വെള്ളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ തൂക്കം. മേൽ പറയപ്പെട്ട സംഗതികളിൽനിന്നും ജലത്തിന്റെ ചേരുവയിൽ $\frac{1}{9}$ ഭാഗം ഹൈഡ്രജനും $\frac{8}{9}$ ഭാഗം ഓക്സിജനും ആണെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലായി.

ജലത്തിന്റെ സാമാന്യസ്വഭാവം.

(1) ശുദ്ധജലത്തിനു യാതൊരു നിറവും, രുചിയും, മണവും ഇല്ലാ.

(2) ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിഭേദംകൊണ്ട് ജലം മഞ്ഞുകട്ടയായും നീരാവിയായും തീരുന്നു. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ സെൻറിഗ്രേഡ് എന്ന ചൂട് പരിമാണയനുപ്രകാരം നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടാകുമ്പോൾ ജലം തിളച്ചു നീരാവിയായി മാറും. അപ്രകാരംതന്നെ 0 ഡിഗ്രിയിൽ അതു ഉറഞ്ഞു മഞ്ഞുകട്ടയായും തീരും.

(3) ജലത്തിനു വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ൮൦൦-മടങ്ങ് ഘനക്കൂടുതൽ ഉണ്ട്.

(4) ജലത്തിൽകൂടി ചൂട് അത്ര വേഗം സഞ്ചരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അതിൽകൂടി വിദ്യുച്ഛക്തി അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കും.

(5) പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാത്സ്യം എന്നീലോഹങ്ങൾ ചൂടിന്റെ സഹായംകൂടാതെതന്നെ ജലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിപ്പിരിക്കും.

(6) ജലം പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒട്ടധികം വസ്തുക്കളെ അതിൽ ലയിപ്പിച്ച് വേർക്കും.

വായു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവികൾക്കും സസ്യാദികൾക്കും ജീവസന്ധാരണത്തിനു ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള വസ്തുവാണു് ജലം. സസ്യാദികൾ അവയുടെ ആഹാരസാധനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതു് ജലംമൂലമാണു്. ജീവികൾക്കു് ജലം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആഹാരസാധനംതന്നെ.

ജലത്തിന്റെ വകഭേദം. തന്മിജലം എന്ന് പറയുന്നതു് ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നീ ഭൂതങ്ങളുടെ രാസയോഗംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണു്. പ്രകൃതിയിൽ ശുദ്ധജലം

കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ജലത്തിനു അന്യസാധനങ്ങളെ ലയിപ്പിച്ചു ചേർക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ഭൂമിയിൽ പലയിടത്തും കാണുന്ന ജലത്തിനു തമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

മഴവെള്ളം. പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായത് മഴവെള്ളമാകുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം അതു പ്രകൃതിയുടെ വാറുയന്ത്രത്തിൽ വാറ്റി വരുന്നതാണെന്നുള്ളതുതന്നെ. സൂര്യരശ്മിയുടെ സഹായംകൊണ്ട് ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം ആവിതായി ആകാശത്തേക്കു പോകുന്നു. അവിടെനിന്നും ഈ നീരാവി തണുത്തു മഴയായി പെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മഴവെള്ളത്തിൽ അധികമായി അന്യസാധനങ്ങളോ കാണുകയില്ല എങ്കിലും വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഏറക്കുറവ് ഇംഗോലാഗ്നീവാതകവും ഓക്സിജനും അതിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതാണ്. മറ്റൊറ്റൊക്കെയുള്ളിലും അതു മിക്കവാറും തനി വാറുവെള്ളം പോലെതന്നെയായിരിക്കും.

൨) ഉഴറുജലം. ഭൂമിയിൽ വിഴുന്ന മഴവെള്ളം പാറകളിലും മണ്ണിലും കൂടി ഉഴറിപ്പൊങ്ങുന്നതാണ് ഉഴറുജലം. അതിനാൽ അതിൽ പല സാധനങ്ങളും ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കും. ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ഉഴറുജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന രസങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആ സ്ഥലത്തെ പാറകളുടെ ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സാധാരണയായി കറിയുപ്പ്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ജിപ്സം, മഗ്നീസ്യം കാർബണേറ്റ്, മഗ്നീസ്യം സൾഫേറ്റ് മുതലായ ലവണങ്ങളോ മിക്ക ഉഴറുജലത്തിലും കാണും. ജനബാഹുല്യമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലുള്ള കിണറുജലത്തിൽ ഇറിച് പദാർത്ഥങ്ങളും അമ്ലമാണിയായും, കാത്സ്യം, സേഫിയം, എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ ട്രൈറേറ്റ ലവണങ്ങളും കാണും.

നദീജലം. മഴപെയ്യുണ്ടാകുന്ന ജലം ഷെങ്കി കൂടുന്നതത്ര നെയ്യാണു് നദീജലം. ഇതു ഭൂമിയിൽകൂടി ഷെങ്കിപ്പോകുമ്പോൾ അതിൽ പല സാധനങ്ങളും വന്നുചേരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചേരുന്ന അന്യസാധനങ്ങളിൽ ചിലതു ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരും മറുചിലതു ലയിച്ചു ചേരാതെയും കിടക്കുന്നു. ലയിച്ചു ചേരുന്ന സാധനങ്ങൾ മിക്കവാറും ലവണങ്ങളായിരിക്കും. മറുജലം ചെളി, മണൽ, ചെറിയ ജീവികൾ, സസ്യാദികളും മറ്റും ചിഞ്ഞഴുകി ഉണ്ടായ സാധനങ്ങൾ എന്നിവകളായിരിക്കും. ലയിച്ചു ചേരാത്ത ഈവക സാധനങ്ങളുടെ കലർപ്പുകൊണ്ടു് നദീജലം സാധാരണ കലങ്ങി നിറം ഭേദിച്ചിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കാണുകയില്ലാ. അതിനാൽ അതുഎപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു സ്വീകരണപോലെയിരിക്കുന്നു.

കടൽവെള്ളം. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഭൂമിയിൽ ജലം സമുദ്രത്തിലേതാകുന്നു. അതിൽ ഒട്ടധികം ലവണങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയപദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റു പല സാധനങ്ങളും കാണും. ൧൦൦-ഔൺസ് കടൽവെള്ളം എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഏകദേശം ൨-ഔൺസ് കറിയുപ്പുതന്നെ കാണും. മറെറും കലാരങ്ങളുംകൂടി കഷ്ടിച്ചു മുക്കാൽ ഔൺസെ കാണുകയൊള്ളു. അതുകൊണ്ടാണു് കടൽവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ ചുവ മുന്തിട്ടു് നില്ക്കുന്നതു്. കടൽവെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ കൂടുതൽകൊണ്ടു് എത്രതന്നെ ദാഹിച്ചാലും നാം ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ലാ.

പരീക്ഷണം. സ്വല്പം കടൽവെള്ളം എടുത്തു അതിൽ രണ്ടുമുനത്തുള്ളി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്ന ലവണം ശുദ്ധജലത്തിൽ ദ്രവിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദ്രവം ഒഴിച്ചാൽഉടൻ വെളുത്ത പാടപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും. ഇതിന്നു സിൽവർക്ലോറൈഡ് എന്നു പേർ പറയപ്പെടുന്നു. സിൽവർനൈട്രേറ്റ്

എന്നതു നൈട്രിക് ആസിഡിൽ വെള്ളിചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ലവണമാണ്. അതു ജലത്തിലുള്ളപ്പോൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായി ചേർന്നു രാസവികാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മു കണ്ട വെള്ളപ്പനിറമുള്ള സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരുതരം ജലത്തിൽ കരിച്ചപ്പിൻറെ അംശം ഉണ്ടോ എന്നു ഇങ്ങിനെ പരീക്ഷിച്ചു റിയാം.

കറിനജലവും മുദുജലവും. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജലത്തെ കറിനജലമെന്നും മുദുജലമെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും കുറെ ജലമെടുത്തു അതിൽ സോപ്പു പരച്ചുനോക്കിയാൽ വേഗം ധാരാളമായിപ്പരയുമെങ്കിൽ അതു മുദുജലമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അതു കറിനജലം തന്നെ. മഴവെള്ളത്തിലും വാറ്റവെള്ളത്തിലും സോപ്പു നല്ലപോലെ പരയുന്നു. അതിനാൽ അവ മുദുജലമാണ്. കടൽവെള്ളത്തിൽ സോപ്പു ശരിയായി പരയുകയില്ല. അതിനാൽ അതു കറിനജലമത്രേ. കാത്സ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ കാർബണേറ്റുരൂപവണങ്ങളും സൾഫേറ്റുരൂപവണങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിനു കാറിനും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ കാർബണേറ്റുരൂപവണങ്ങൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നവയല്ല. എന്നാൽ ഇംഗാലാറ്റുവാതകം കലർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അവ ലയിച്ചുപോകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഈ വാതകം ധാരാളം കലർന്നിട്ടുള്ള ജലത്തിലാണ് കാർബണേറ്റുരൂപവണങ്ങൾ ലയിച്ചുചേർന്നു കറിനജലമുണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം വെള്ളത്തെ തിളപ്പിച്ചാൽ അതിലുള്ള ഇംഗാലാറ്റുവാതകം ചൊയ്ക്കാം. അപ്പോൾ കാർബണേറ്റുരൂപവണങ്ങൾ അടിയിൽതരിശായി കിടക്കുന്നു. ഈ തരിശെ അരിച്ചുമാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്നതു നല്ല മുദുജലമായിരിക്കും.

സർവ്വഹേതുവേദവേദങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള കഠിനജലം ഇപ്രകാരം മുട്ടുവാക്കൻ വഹിയാ. അതിന്നു വേറെ ഉപായങ്ങളും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഇത്തരം ജലത്തിൽ സോഡാപ്പൊടിയിട്ടാൽ അതു മുട്ടുവാകും. സോഡാപ്പൊടിയെന്നു പറയുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റെന്നു പറയപ്പെടുന്നവണ്ണമാണ്. ഇതു കാത്സ്യം, മാഗ്നീസ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സർവ്വഹേതുവേദങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവയുടെ കാർബണേറ്റുവേദങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അവ ശുദ്ധജലത്തിൽ കലർന്നുചേരാത്തവയാകയാൽ തരികളായി അടിയിൽ താഴും. അപ്പോൾ അവയെ അരിച്ചുമാറ്റാം.

പാഠം ൬.

നൈട്രജൻ: ഫിഫ്തം N. അണുവിന്റെ ഭാരം ൧൪.

നൈട്രജൻ മറ്റു ഭൂതങ്ങളുമായി സംയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന വായുവിന്റെ അഞ്ചിൽ നാലുഭാഗവും ഇതുതന്നെയാണ്. അമ്മോണിയാ, വെടിയുപ്പ് മുതലായ ക്ഷാരങ്ങളിലും ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലും സസ്യാദികളിലും നൈട്രജന്റെ ചേരുവയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയപദാർത്ഥങ്ങൾ വീണ് അഴുകി മണ്ണോടു ചേരുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണിലും നൈട്രജൻ ഏറക്കുറവു കാണും.

നൈട്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നീഷ്യം. (1) നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന വായുവിൽ അഞ്ചിൽ നാലുഭാഗം നൈട്രജനും ബാക്കി ഓക്സിജനാണ്. അതിനാൽ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനെ

സൗകൃത്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷിക്കുന്നത് നൈജനായിരിക്കും.

പരീക്ഷണം. വാവട്ടമുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ജലം നിറച്ച് ഒരു വലിയ ക്ലേശകഷണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരിയെടുത്തു കത്തിനിറുത്തി വെക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലേശകഷണത്തോടുകൂടി മെഴുകുതിരി ജലത്തിൽ ചൊങ്ങിക്കിടക്കും ആ സ്ഥിതിയിൽ മെഴുകുതിരി കൊളുത്തി നാം ഓക്സിജൻ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതരം ഒരു പാത്രം അതിന്നു മുകളിൽ കമഞ്ഞണം. ഈ പാത്രത്തിന്റെ വാ നല്ലപ്പോലെ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിയിരിക്കുകയും വേണം. മെഴുകുതിരി സ്വല്പനേരം കത്തിക്കഴിഞ്ഞു താനെ അണഞ്ഞുപോകുന്നു. സ്വല്പം കഴിയുമ്പോൾ കമത്തിയ പാത്രത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊരഭാഗത്തോളം ജലം കയറി നിറയുകയും ചെയ്യും. മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ നീരാവിയും ഇംഗ്ലാലാമ്ലവാതകവും ഉണ്ടാകുമെന്നു നാം മുമ്പു പറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവരണ്ടും ക്ഷണത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നുപോകുന്ന വസ്തുക്കളാകയാൽ മെഴുകുതിരി കത്താൻ ഉപയോഗിച്ചുപോയ ഓക്സിജന്റെ സ്ഥാനം പാത്രത്തിനകത്തു ഒഴിവായി. അതിനാൽ അവിടം നിറയാനായിട്ടാണ് ജലം ചാടികയറിയത്. പാത്രത്തിൻ പിന്നീടു ശേഷിക്കുന്നത് നൈജനാണ്. വായുവിൽ ഓക്സിജനും നൈജനും കൂടാതെ ഇംഗ്ലാലാമ്ലവാതകം, നീരാവി മുതലായി മറ്റനേകം വസ്തുക്കൾകൂടി ഉണ്ട്. അതിനാൽ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച നൈജനിൽ ഇവയുടെ കലർപ്പ് കാണും. അതുകൊണ്ട് ഈവക സാധനങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ കൂടി വായുവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനെ മറ്റു വല്ല വസ്തുവുമായി രാസയോഗം ഉണ്ടാക്കി വേർതിരിച്ചാൽ ഏതക്കറെ ശുദ്ധമായ നൈജൻ കിട്ടും. ഇ


തിലേക്ക് സാധാരണയായി നല്ലപോലെ ചൂടുപഴുപ്പിച്ച ചെമ്പിൽകൂടി, നീരാവിയും ഇംഗാലാറ്റുവാതകവും മാറിയ വായുവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജൻ ചെമ്പുമായി സംയോജിച്ച് കോപ്പർഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുകയും തനി നൈട്രജൻ പുറത്തേക്കുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ആവശ്യപോലെ ശേഖരിച്ചെടുക്കാം.

നൈട്രജന്റെ സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങൾ. ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നീ ഭൂതങ്ങളെപ്പോലെ നൈട്രജനും നിറവും രുചിയും മണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാതകമാകുന്നു. അതു അത്ര അധികമായി ജലത്തിൽ കലർന്നു ചേരുകയില്ല. നൈട്രജൻ വായുവിനേക്കാൾ ഘനക്കുറവുണ്ട്. അതു കത്തുകയും ഇല്ലാ കത്തുന്നതിനു സഹായിക്കുകയും ഇല്ല. നൈട്രജൻ വിഷമുള്ള വസ്തുവല്ലെങ്കിലും നൈട്രജൻകൊണ്ടുമാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപ്രാണിക്കും ജീവിക്കാൻ കഴികയില്ല. നൈട്രജൻ കൊണ്ടു നിറച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരികത്തിച്ചു കാണിച്ചാൽ ഉടൻ അതു കെട്ടുപോകും. ഈ കായ്ക്കത്തിൽ അതു ഇംഗാലാറ്റുവാതകത്തെപ്പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഇംഗാലാറ്റുവാതകത്തെപ്പോലെ ചൂണ്ണാമ്പുവെള്ളത്തിനു പാലിന്റെ വണ്ണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനു ഇതിനു കഴികയില്ല. നൈട്രജൻ മറുളള ഭൂതങ്ങളുമായി അത്ര എളുപ്പം രാസയോഗം ഉണ്ടാകയില്ല. അതിനാൽ അതിന്റെ ചേരുവയുള്ളതായി കറച്ചുമാത്രം യോഗവസ്തുക്കളുണ്ടു്. ഈ യോഗവസ്തുക്കളിൽ ചിലവ രാസവികാരം കൊണ്ടു അരദിതയ്ക്കുമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി പൊട്ടിത്തെറിക്കും. വെടിമരുന്നു മുതലായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മിക്ക വസ്തുക്കളിലും ഇതിന്റെ യോഗവസ്തുക്കളുടെ ചേരുവയുണ്ടു്.

നെടജൻ ചേന്ന് യോഗവസ്തുക്കൾ.

(൧) അമ്മോണിയാ. നെടജന്റെ ഒരുണവും ഹൈ
 ഡ്രജന്റെ മൂന്നുണക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗവസ്തു
 വാൺ അമ്മോണിയാ. വായുമണ്ഡലത്തിൽ സദാസമയവും
 ഈ വസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കാണാം. അതുപോലെതന്നെ
 മഴവെള്ളത്തിലും മണ്ണിലും അമ്മോണിയായുടെ അംശം സ്വ
 ല്പമായിട്ടെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്. സസ്യാദികളിൽ നിന്നും ജീ
 വജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചീ
 ഞ്ഞഴുകുമ്പോൾ ഈ വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മൃതപ്പുരകളിൽ
 നിന്നും തൊഴുത്തുകളിൽ നിന്നും മറ്റും പുറപ്പെടുന്ന എറിഞ്ഞ
 ഗന്ധം അമ്മോണിയായുടേതാകുന്നു. അമ്മോണിയായുടെ പല
 യോഗവസ്തുക്കളേയും മനുഷ്യർ ഔഷധമായിട്ടും വളമായിട്ടും മ
 ററും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. അവയെ എല്ലാം കല്പരിനീറ
 വ്വോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അമ്മോണിയാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണു
 തയ്യാറാക്കുന്നത്.

അമ്മോണിയാ ഉണ്ടാകുന്ന മാർഗ്ഗം. അമ്മോണിയായു
 ടെ യോഗവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പ
 ല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാധാരണ രസതന്ത്രപ്രയോഗശാല
 കളിലെആവശ്യത്തിലേക്കു നവസാരത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പുചേർത്ത്
 അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നവസാരം എന്നത് അമ്മോണിയാ
 യും ഹൈഡ്രോക്സോറിക്കാസിഡും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലവ
 ണമാകുന്നു. അതിൽ ചുണ്ണാമ്പു (കാത്സ്യം ഹൈഡ്രാക്
 സൈഡ്) ചേരുമ്പോൾ അമ്മോണിയായും കാത്സ്യംക്ലോറൈ
 ഡെന്നു ലവണവും ഉണ്ടാകും.



പടം ൪.

മേൽക്കാണുന്ന പടത്തിൽ നോക്കുക. അതിൽ A. എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിക്കൂസയിൽ സമഭാഗം നവസാരവും ചുണ്ണാമ്പും ഇട്ടു കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ A. യിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അമ്മോണിയ B. എന്ന വളഞ്ഞ കുഴലുവഴിയായി C. യിൽ വന്നുചേരും. C. ചുറ്റുകക്കൊണ്ടു നിറച്ചാണു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അമ്മോണിയാ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിനോടു കലർന്നിരിക്കുന്ന ഈപ്പ്‌മെല്ലാം ചുടുകക്കു ആവാഹി ച്ചുകളയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെനിന്നും ഈപ്പ്‌മില്ലാത്ത അമ്മോണിയാ D. എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വളഞ്ഞ കുഴൽ വഴിയായി E. യിൽ വന്നുചേരും. അമ്മോണിയാ വായുവിനേക്കാൾ ഘനക്കുറവുള്ള വാതമാകയാൽ E. എന്ന കുപ്പി പടത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ കമത്തിവെച്ചാൽ അമ്മോണിയ അതിനടുത്തു പ്രവേശിച്ച് അതിലുള്ള വായുവിനെ പുറത്തടിച്ചുകളയും. അമ്മോണിയാ വെള്ളത്തിൽ വേഗം ലയിച്ചുചേരും. അതി

നാൽ ഓക്സിജനേയും ഹൈഡ്രജനേയും ശേഖരിച്ചതുപോലെ വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പികൾ കമത്തി ഇതിനെ ശേഖരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. വെള്ളത്തിനുപകരം രസം ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിറച്ച കുപ്പികൾ കമത്തിയും അമ്മോണിയം ശേഖരിക്കാം.

അമ്മോണിയായുടെ സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങൾ. അമ്മോണിയാ ഒരുരൂപിയായ വാതകമാകുന്നു. അതിനു എരിവും വീർപ്പുമുള്ള മണവും രുചിയും ഉണ്ട്. അമ്മോണിയായ്ക്കു നാഡികളെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. മൂക്കടപ്പാ ജലദാഹവും ഉള്ളപ്പോൾ അതു മണപ്പിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തോന്നുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. അതിന്റെ ആവി കണ്ണിനു ദോഷം ചെയ്യും. അതു കണ്ണിപ്പിച്ചാൽ കണ്ണിൽ നിന്നു വെള്ളം വരികയും കണ്ണു ചൊരിയുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഭാഗം ജലത്തിൽ ഏകദേശം ൧൦-ഭാഗംവരെ അമ്മോണിയാ കലർന്നുപോകും. അമ്മോണിയാ വായുവിൽ കത്തുകയില്ല. എന്നാൽ അത് ഓക്സിജനിൽ കത്തും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചത്തിനു പച്ചയും മഞ്ഞയും കൂടി കലർന്ന ഒരു നിറം കാണും. അമ്മോണിയായിൽ യാതൊരു വസ്തുവും കത്തുകയില്ല. അമ്മോണിയാ ശക്തിയേറിയ ഒരു ക്ഷാരമാകുന്നു. അതിനാൽ ചൂവന്ന ലിറ്റ്മസ്സിനെ അതു നീലനിറമുള്ളതാക്കും. അമ്ലങ്ങളോടു ചേർന്നു ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അമ്മോണിയായുടെ അടുത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അസിഡു കൊടുത്താൽ നല്ല വെളുത്തു പുകയുണ്ടാകും. പുകപോലെ കാണുന്ന ഈ സാധനം അവതമിൽ യോജിച്ചുണ്ടായ അമ്മോണിയംക്ലോറൈഡ്(നവസാരം)ന്ന ലവണമാകുന്നു. അമ്മോണിയാ ചെതൺപിച്ചു ദ്രവരൂപത്തിലാക്കാം. ഈ ദ്രവം കൊടുത്ത ജലത്തെ തണുപ്പിച്ചു മഞ്ഞുകട്ടയുണ്ടാക്കിവരുന്നു.

നൈജെൻ ഓക്സിജനമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള യോഗ
ജേൾ. നൈജെൻ ഓക്സിജനം തമ്മിൽ യോജിച്ച് അഞ്ചു
 യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന
 മായവ “നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ആ
 കുന്നു.


നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൈജെൻ മോ
ണോക്സൈഡ്. നൈജെൻ രണ്ടുണ്ടാക്കും ഓക്സിജന്റെ
 ഒരുണ്ടവും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അതിനാൽ അ
 തിന്റെ ചിഹ്നം N_2O എന്നാകുന്നു. അമോണിയം നൈ
 ട്രേറ്റ് എന്ന സാധനത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തു
 ഉണ്ടാകുന്നു. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നല്ല മധുരവും സ്വല്പ
 മൊരു മണവുമുള്ള അരൂപിയായ ഒരു വാതകമാണ്. അതു
 അധികമായി ശ്വസിച്ചാൽ തലയ്ക്കു മത്തുപിടിച്ചു നാം ചിരി
 ക്കാൻ തുടങ്ങും. തന്മൂലം ഇതിനു ചിരിയുണ്ടാക്കുന്ന വാതകം
 എന്നൊരു പേരുണ്ട്. ഓക്സിജനിൽ എന്നപോലെ ഇതിലും
 ഒരു ചെറിയ തീക്കൊള്ളി കാണിച്ചാൽ അതെരിഞ്ഞു നല്ല
 പ്രയോടുക്രൂടിക്കത്തും.


നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. ഇതും അരൂപിയായ ഒരു
 വാതകമാണ്. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജനമായി സം
 യോഗിച്ചാൽ ചുവന്ന പുകപോലെയിരിക്കുന്ന നൈജെൻ
 ഡൈറോക്സൈഡ് എന്ന യോഗവസ്തു ഉണ്ടാകും. ചെമ്പിൽ
 കുറച്ചു നൈട്രിക്കാസിഡൊഴിച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ
 നിന്നും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡെന്ന വാതകം പുറപ്പെടും.

നൈട്രിക്കാസിഡ്.

നൈട്രിക്കാസിഡ്, ഫൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂന്നു ഭൂതങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗവസ്തുവാകുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ഇതു വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടെ കാണപ്പെടുന്നുള്ളു. എന്നാൽ അതിന്റെ യോഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പലയിടത്തും ധാരാളം ഉണ്ടു്. ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ ചില്ലി, പെറ എന്നീരാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു യോഗവസ്തുവാണു്. അവിടങ്ങളിൽനിന്നും ആണ്ടുതോറും അതിനെ ധാരാളമായി ശേഖരിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയച്ചുവരുന്നു. ഉത്തരഇൻഡ്യയിൽ ബീഹാർ എന്ന സ്ഥലത്തു് പൊട്ടാസ്യവും നൈട്രിക്കാസിഡും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വെടിയുപയോഗ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്.

നൈട്രിക്കാസിഡുണ്ടാക്കുന്ന മാർഗ്ഗം. കുറച്ച സോഡിയം നൈട്രേറ്റോ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റോ എടുത്തു് അതിൽ സൽഫൂറിക് അസിഡോശീച്ച വാററിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭ്രം നൈട്രിക്കാസിഡാകുന്നു.





പടം ൫.

മേൽ കാണുന്ന പടത്തിൽ നോക്കുക. A എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിക്കൂസയിൽ കുറച്ചു വെടിയുപ്പോ സോഡിയം നൈട്രേറ്റോളെ അതിൽ സ്വല്പം സൽഫൂറിക് അസിഡ് ചുട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ B എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കഴലുവഴി നൈട്രിക്കാസിഡ് പുറപ്പെട്ട് C എന്ന പാത്രത്തിൽ വന്നു ചേരും. C തണുത്ത വെള്ളംകൊണ്ടു നി

റച്ചിരിക്കുന്ന D എന്ന പാത്രത്തിലാണു ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാലു E യിൽ വന്നുചേരുന്ന നൈട്രിക്കാസിഡ് തണുത്തു ഭവരൂപത്തിലാകുന്നു.

നൈട്രിക്കാസിഡിന്റെ സ്വഭാവം. തന്നിനൈട്രിക്കാസിഡ് യാതൊരു നിറവുമില്ലാത്ത ഒരു ദ്രവമാകുന്നു. അതിനു ജലത്തേക്കാൾ ഒന്നരയീരട്ടി ഘനക്കൂടുതൽ ഉണ്ടു്. കാരാത്തു തുറന്നുവെച്ചാൽ അതു പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അതു ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മുതലായ സാധനങ്ങളായിപ്പിരിയും. സ്വണ്ണം, പ്ലാറ്റിനം എന്നിവ യൊഴികെ ഉള്ള എല്ലാ ലോഹങ്ങളും നൈട്രിക്കാസിഡിൽ ദ്രവിച്ചു ചേരും. സസ്യാദികളിൽനിന്നും ജീവജാലങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സാധനത്തിലും നൈട്രിക്കാസിഡൊഴിച്ചാൽ അതിനു പെട്ടെന്നു രാസവികാരം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണു് നൈട്രിക്കാസിഡു നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ എവിടെ എങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഉടൻ അവിടം ചൊള്ളുന്നത്. കുറച്ചു നൈട്രിക്കാസിഡിൽ രണ്ടുമൂന്നു ചെറിയ കഷണം ചെമ്പുതകടിട്ടു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽനിന്നും ചുവന്ന പുക പോലെ ഒരു വസ്തു പുറപ്പെടും.

സൽഫൂറിക്കാസിഡുണ്ടാക്കുന്നതിനും നൈട്രേറുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപ്പുകളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ആയി ഒട്ടുവളരെ നൈട്രിക്കാസിഡു നമുക്കാവശ്യമുണ്ടു്.

മേൽപ്പറയപ്പെട്ടവയാണു് നൈട്രജന്റെ പ്രധാന യോഗവസ്തുക്കൾ. ഇവകൂടാതെ ഇനിയും ഇത്തരം പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടു്. അവയെല്ലാം സസ്യാദികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നവയാണു്. ഇംഗാലം, ഫൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നിത്യാദികളായ ഭൂതങ്ങളുമായി നൈട്ര

ജൻ സംയോഗിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള പുഷ്പികരസതപം (പ്രോട്ടീഡ്) ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഹാരസാധനങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പോഷകാംശമാണ്. നൈട്രജന്റെ യോഗവസ്തുക്കളായ, കാത്സ്യം നൈട്രേറ്റ്, അമോണിയായോഗങ്ങൾ, വെടിയുപ്പു മുതലായവ മിക്കതരം മണ്ണിലും ഏറക്കുറക്കുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നുമാണ് ചെടികൾ അവയുടെ വളച്ചു്ക അവശ്യം വേണ്ടതായ നൈട്രജനെ ശേഖരിക്കുന്നത്. വായുമണ്ഡലത്തിൽ ധാരാളം നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വങ്കിലും അതു സാധാരണയായി ചെടികൾക്കുപയോഗപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാലത്രെ നൈട്രജന്റെ ചേരുവയുള്ള യോഗവസ്തുക്കളെ നാം വളമായി മണ്ണിൽ ചേർത്തുകൊടുക്കുന്നത്.



൨൦൦ ൭.

വായു.

ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാതകസമൂഹത്തിനു വായു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അതു നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഇംഗാലാമ്ലാതകം, അമോണിയാ, റീസവി എന്നിവകൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിശ്രമാണ്. വായുവിൽ നൈട്രജനും, ഓക്സിജനും ഉണ്ടെന്നുള്ളതു മുമ്പു പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ മറ്റുള്ള അംശങ്ങളേപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ആലോചിക്കാനുള്ളതു്.

പരീക്ഷണം ൧. ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ അല്പം ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കാറത്തു് തുറന്നുവെച്ചാൽ സ്വല്പസമയംകൊണ്ടു് അതു വെളുത്തു പാലുപോലെ ആകും. അപ്പോൾ അതിൽ വെളുത്ത ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ ഉള്ളതായിക്കാണാം. ഈത്തരികളെ സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം ആ വസ്തു ചാക്കാണെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാകും. ചോക്കു് ചുണ്ണാമ്പും ഇംഗാലാമ്ലവാതകവും ചേർന്നതായ യോഗവസ്തുവാണു്. ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം കാറത്തു വെച്ചപ്പോഴാണു് അതിൽ ചോക്കുണ്ടായതു്. അതിനാൽ വായുവിൽ ഇംഗാലാമ്ലവാതകമുണ്ടെന്നും അതു ചുണ്ണാമ്പുമായി ചേർന്നാണു് ചോക്കുണ്ടായതെന്നും തെളിയുന്നു. വായുവിന്റെ പതിനായിരത്തിൽ ഏകദേശം നാലുഭാഗത്തോളം ഈ വസ്തുതന്നെയാണു്. ഇതു ഇംഗാലവും ഓക്സിജനും ചേർന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗവസ്തുവാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജീവജാലങ്ങൾ ശ്വാസോശ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജനെ അകത്തോട്ടു ഗ്രഹിക്കുകയും ഇംഗാലാമ്ലവാതകത്തെ പുറത്തോട്ടു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ പുറത്തോട്ടു വിടുന്ന ആ വാതകം വായുവിൽ വന്നു ചേരുന്നു. കഴുത്തു നന്നാ ഇടുങ്ങിയ ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറച്ചു ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളമെടുത്തു് ഒരു ചെറിയ കഴലിൽക്കൂടി നാം അതിലേക്കുതുറന്നപക്ഷം അതിൽ ചോക്കുണ്ടാകും. ഈ പരീക്ഷണംകൊണ്ടു് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽനിന്നും പുറത്തേക്കു വരുന്ന കാറിൽ ഇംഗാലാമ്ലവാതകം ഉണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു. ഭൂമിയിൽ ലക്ഷോപിലക്ഷം ജീവികൾ ഉണ്ടു്. അവയെല്ലാം ശ്വാസോശ്വാസം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് നിമിഷപ്രതിയെന്ന ചോലെ ഒട്ടുവളരെ ഇംഗാലാമ്ലവാതകം വായുവിൽ വ്യാപിച്ചു

ചേരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഭൂമിയിൽ പലയിടങ്ങളിലുമായി വിറകു, കല്ക്കരി, മണ്ണെണ്ണ മുതലായി ഇംഗ്ലാലത്തിന്റെ ചേരുവയുള്ള പലവസ്തുക്കൾ കത്തി എരിയുന്നതുകൊണ്ടും പരമാണുജീവികളുടെ പ്രചുർത്തികൾ മൂലമായും മറ്റും ഇന്ദ്രിയപദാർത്ഥങ്ങൾ ചീഞ്ഞഴുകുന്നതുകൊണ്ടും വളരെ ഇംഗ്ലാലാഗ്നിയായതുകൊണ്ടും വായുമണ്ഡലത്തിൽ വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. ഈ വാതകം ക്രമത്തിലധികമായുള്ള സ്ഥലത്തു യാതൊരു പ്രാണിക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ സദാപി വന്നുകൂടുന്ന ഇംഗ്ലാലാഗ്നിയായതുകൊണ്ടു മാറിക്കളയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപായം ഇല്ലായെങ്കിൽ കറച്ചുകാലംകൊണ്ടു ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രാണികൾക്കു ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശമായിത്തീരും. ഭാഗ്യംകൊണ്ടു ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രകൃതിതന്നെ ഒരു നല്ല ഉപായം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലാലം വൃക്ഷങ്ങളുടേയും ചെടികളുടേയും ഒരു പ്രധാന ആഹാരസാധനമാണ്. അതിനെ അവയ്ക്കു മറ്റുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ വേരുകളിൽക്കൂടി ഗ്രഹിക്കാൻ വഹിയാ. സൂര്യരശ്മിയുടെ സഹായംകൊണ്ടു അവ വായുവിലുള്ള ഇംഗ്ലാലാഗ്നിയായതുകൊണ്ടു നിന്നുമാണ് അവയ്ക്കു വായുവുമുള്ള ഇംഗ്ലാലത്തെ ശേഖരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേർതിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ വായുമണ്ഡലത്തിൽതന്നെ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്രമത്തിലധികമായി ഇംഗ്ലാലാഗ്നിയായതുകൊണ്ടു കാണുകയില്ല.

പരീക്ഷണം ൨. ഒരു കണ്ണാടിപ്പാത്രത്തിൽ കറച്ചു മഞ്ഞുകട്ടയിട്ടു അതിനെ കാറിൽക്കുറിച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിൽ

ന്റെ പുറവശം മുഴുവൻ ജലകണങ്ങൾകൊണ്ടു നിറയുന്നതു കാണാം. വായുവിലുള്ള നീരാവി കണ്ണാടിപ്പാത്രത്തിൽ സ്തംഭിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ശീതംകൊണ്ടു തണുത്തു ജലമായി. അതുകൊണ്ടാണു പാത്രത്തിന്റെ പുറവശത്തു ജലകണങ്ങൾ അടിയുന്നതു.

അമ്മോണിയായാണു് വായുമണ്ഡലത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സാധനം. ഇതിന്റെ സാമാന്യമായ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി നാം കഴിഞ്ഞപാഠത്തിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ. വായുവിന്റെ പത്തുലക്ഷത്തിൽ ഒരുഭാഗം മാത്രമാണു് അമ്മോണിയാ. എങ്കിലും ഈ അമ്മോണിയായ്ക്കു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ഉണ്ടു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സസ്യാദികളുടെ വളച്ചു് ആവശ്യമുള്ള നൈട്രജനെ കൊടുക്കുന്നതിന്നു ഇതു വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഒട്ടുവളരെ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും പന്യറാർട്ടത്തിൽ പെട്ട ചെടികൾക്കൊഴികെ മറ്റു ചെടികൾക്കെന്നിന്നു ആ നൈട്രജനെ അത്രേ രൂപത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴികയില്ലാ. അമ്മോണിയാ രൂപത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ എപ്പോഴത്തും ചെടികൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടും.

മേൽവിവരിക്കപ്പെട്ടവയാണു വായുവിലുള്ള പ്രധാനവസ്തുക്കൾ. ഇവ കൂടാതെ ഓസോൺ, ഹൈഡ്രജൻപെരോക്സൈഡ്, ആർഗൺ, നിയോൺ, ക്രിപ്റ്റോൺ, ക്ലീനോൺ, ഇന്ദ്രിയപദാർത്ഥങ്ങൾ, പാമാണജീവികൾ എന്നിത്യാദികളായ പല സാധനങ്ങളും സമൃദ്ധമായിട്ടെങ്കിലും വായുവിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

വായു ഒരു യോഗവസ്തുവല്ല. അത് ഒരു മിശ്രം മാത്രമാണെന്നു താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികൾകൊണ്ടു തെളിയിക്കാം.

൧. രാസയോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെയും ഏറക്കുറവു ചൂടുണ്ടാകും. വായുവൽ കാരണമെന്നു കണക്കിന് ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ മുതലായ വാതകങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തുവെച്ചാൽ വായു ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവ കലർന്നപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടുണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ വായു ഒരു യോഗവസ്തുവല്ല.

൨. യോഗവസ്തുവിന്റെ ചേരുവ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വായുവിൽ അതിന്റെ അംശങ്ങൾ എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ അല്ലാ കാണുന്നതു്.

൩. യോഗവസ്തുക്കളിൽ ഭാഗഭാഷകളാകുന്ന ഓരോ ഭൂതവും ഇത്ര തുക്കമേ അതിൽ കണ്ടുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ക്രിപ്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ വായുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ അംശങ്ങളുടെ ചേരുവയിൽ യാതൊരു ക്രിപ്തും കാണുന്നില്ല.

൪. ഒരു കുപ്പിയിൽ സ്വല്പം വെള്ളമൊഴിച്ചു കലക്കിയാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കുപ്പിയിടുണ്ടായിരുന്ന വായു ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പരിശോധനകൾ കൊണ്ടു വെളിപ്പെടും. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ ലയിച്ചുചേരുന്ന വായുവിനെ പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഓക്സിജന്റെയും നൈട്രജന്റെയും ചേരുവ വായുവിലുള്ളതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. വായു ഒരു യോഗവസ്തു ആയി.

രുന്ന എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ അംശവും വായുവിൽക്കു
ന്ന കണക്കനുസരിച്ചതന്നെ വെള്ളത്തിലും കാണുമായി
രുന്ന.



പാഠം ൮.

യോഗവസ്തുക്കൾ.

യോഗവസ്തുക്കളെ നാലു പ്രധാനതരങ്ങളായിത്തീരിക്കാം.

൧. ഓക്സൈഡ് (ആഗ്നേയം). ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഭൂതം ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന രാസയോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ലഭി
ക്കുന്ന യോഗവസ്തുവിന് ആ ഭൂതത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ്
(ആഗ്നേയം) എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. രസവും ഓക്സിജനും
ചേർന്ന രസാഗ്നേയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇംഗ്ലാലവും ഓക്സിജനും ചേ
ർന്ന ഇംഗ്ലാലാമ്ലവാതകം (കാർബൺഡയോക്സൈഡ്) ഉ
ണ്ടാകുന്നു. അലോഹങ്ങളായ ഭൂതങ്ങൾ ഓക്സിജനുമായി ചേ
ർന്നുണ്ടാകുന്ന യോഗവസ്തുക്കൾക്ക് “അൻഫൈഡ്രൈഡ്” എ
ന്നും കൂടി പേരുണ്ട്. അവ ജലത്തിൽ കലരുമ്പോൾ അമ്ല
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗന്ധകവും ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നുണ്ടായ
ഒരു യോഗവസ്തു ജലവുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സൽഫ്യൂ
റിക്അസിഡ് എന്ന അമ്ലം. അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ്സ്,
ഇംഗ്ലാലം എന്നിവകളുടെ ആഗ്നേയങ്ങൾ വെള്ളവുമായി യോ
ജിച്ചുണ്ടായ അമ്ലങ്ങളാണ് ഫോസ്ഫറിക്അസിഡും, ഇംഗ്ലാ
ലാമ്ലവും.

൧. ക്ഷാരങ്ങൾ. ചൊട്ടാമ്പ്രം, സോഡിയം മുതലായ ചില ലോഹങ്ങളുടെ ആഗോധങ്ങൾ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുക്കൾക്കു ക്ഷാരങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. അവയ്ക്കു അമ്ലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അവ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ്സിലെ നീലനിറമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കും. ക്ഷാരങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വീർച്ചകൂടിയവ കാസ്റ്റിക്ചൊട്ടാഷ്, കാസ്റ്റിക്സോഡാ, അമോണിയ എന്നീമൂന്നും ആകുന്നു.

൨. അമ്ലങ്ങൾ. ഫൈഡ്രജൻ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുതരം യോഗവസ്തുക്കളാണ് അമ്ലങ്ങൾ. അവ ലോഹങ്ങളുമായി ചേർന്നപ്പോൾ ഫൈഡ്രജൻ വേർതിരിയും. അമ്ലങ്ങൾക്കു നല്ല പുളിരസം ഉണ്ട്. നീലലിറ്റ്മസ്സിൽ അമ്ലങ്ങൾ സ്വർശിച്ചാൽ ഉടൻ അതു ചുവക്കും. സൾഫൂറിക്, നൈട്രിക് മുതലായ വീർച്ച കൂടിയ അമ്ലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീണാൽ നീരിപ്പിടിച്ച് വേദനയുണ്ടാക്കും.

൪. ലവണങ്ങൾ. അമ്ലങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുമായി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള യോഗവസ്തുക്കൾക്കു ലവണങ്ങൾ എന്നു പേർ പറയുന്നു. സോഡിയവും ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സാസിഡും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡെന്ന യോഗവസ്തുവാണ് കറിയപ്പ്. ചെമ്പും സൾഫൂറിക്സാസിഡും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ലവണമാണ് തുരിശ്. ലവണങ്ങളിൽനിന്നും അവയുടെ ലോഹാംശത്തെ വേർതിരിക്കാൻ പലമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്.

പരീക്ഷണം. സ്വല്പം തുരിശ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തുരുമ്പില്ലാത്ത ഒരു ഇരുമ്പുകഷണം അതിൽ മുക്കിയാൽ തുരിശുവെള്ളത്തിന്റെ നീലനിറം ക്രമേണ മാറുകയും ഇരുമ്പുക

ഷണത്തിൽ ചുവന്ന പൊടിപോലെ ചെമ്പു പററിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം ഓരോ ഉപായങ്ങൾക്കൊണ്ടു് എല്ലാ ലവണങ്ങളിൽനിന്നും അവയിലുള്ള ലോഹങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം.

പാഠം ൯.

ക്ലോറിൻ : ചിഹ്നം Cl

അണുവിന്റെ ഘനം : 35 . 45

പ്രകൃതിയിൽ തനിക്കു്ലോറിൻ ഉള്ളതായി ഉത്തേവരെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലാ. അതിന്റെ യോഗങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടു്. സോഡിയംക്ലോറൈഡു് (കറിയുപ്പു്) അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനയോഗവസ്തുവാകുന്നു.

ക്ലോറിനുള്ളതാകുന്ന മാതൃകൾ. ഒരു കണ്ണാടിക്കൂസയിൽ കുറച്ചു കറിയുപ്പും മാങ്ങനീസു് ഡയോക്സൈഡും ഇട്ടു് അതിൽ സ്വല്പം നൽഫൂറിക്കാസിഡൊഴിച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ പച്ചനിറത്തിന്റെ പകുച്ചുള്ള ഒരുമാതിരി മഞ്ഞച്ചു ഒരു വാതകം പുറപ്പെടും. ഇതു് ക്ലോറിനാകുന്നു. ഇതിനെ ഒട്ടും തന്നെ ഇഴുപ്പമില്ലാത്ത കുപ്പികളിൽ ശേഖരിച്ചു ഓരോ പരീക്ഷണം നടത്താം. മാങ്ങനീസു് ഡയോക്സൈഡും ഫൈവോക്സൈഡും കൂടി ഒന്നിച്ചുചേർത്തു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാലും ക്ലോറിനുള്ളതാകും. ക്ലോറിൻ വായുവിനേക്കാൾ രണ്ടരമടക്കു ഘനക്കൂടുതലുള്ള ഒരു വാതകമാകുന്നു. അതിന്റെ നിറം പച്ചവണ്ണത്തിന്റെ പകുച്ചുള്ള മഞ്ഞയാകുന്നു. അതിനവ

ല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമണ്ണു ഉണ്ടു്. അതു ശ്വസിച്ചാൽ തൊണ്ടവിഷം, തൊണ്ടചൊരിച്ചിൽ, ശ്വാസാമുതൽ മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അതുമൂലം മരണംകൂടി സംഭവിക്കും. ക്ലോറിൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെ കത്തിച്ചുവെച്ചാൽ ഒരു മങ്ങിയവെളിച്ചത്തോടുകൂടി ആ വസ്തു കത്തും. എന്നാൽ ക്ലോറിൻകത്തുകയില്ല. ഇതു തണുത്ത ജലത്തിൽ ധാരാളമായി ലയിച്ചുപോകും. ഒരു ഭാഗം ജലത്തിൽ മൂന്നുഭാഗം ക്ലോറിൻവരെപോകും. ക്ലോറിൻപേൻവെള്ളം വെയിലത്തുവെച്ചാൽ, വെള്ളത്തിന്റെ അംശമായ ഹൈഡ്രജനോടു ക്ലോറിൻ രാസയോഗം സംഭവിച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിദ്ധമാകുന്നു.


പരീക്ഷണം. ൧. ക്ലോറിൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ ആൻറിമണി (അഞ്ഞനക്കല്ലു) എന്ന ലോഹത്തിന്റെ ചൊടി വിതറിയാൽ ഉടൻ അതു കത്തി പാത്രത്തിൽനിന്നും വെളുത്ത പുക പുറപ്പെടും. അതു അവയുടെ രാസയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായ ആൻറിമണിക്ലോറൈഡ് എന്ന യോഗവസ്തുവാണ്. പരീക്ഷണം ൨. സ്വല്പം ഒപ്പുതാളെടുത്തു ട്രെപ്പൻറയിൻ എന്ന ദ്രവത്തിൽ മുക്കി ക്ലോറിൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറെറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ അതു പെട്ടെന്നാളിക്കത്തും. അതിന്റെ ഫലമായി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിദ്ധം, കരിയും ഉണ്ടാകുന്നു.

സന്യാദികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായീട്ടുള്ള എല്ലാവിധം കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ക്ലോറിനു ശക്തിയുണ്ടു്. കറുപ്പു്, ചുവപ്പു്, മഞ്ഞ മുതലായ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോടു കൂടിയ ഒരു പുഷ്പമെടുത്തു ഈ വാതകത്തിൽ

കാണിച്ചാൽ ഉടൻ അതിന്റെ നിറം മാറുന്നു. അതിനാൽ വസുങ്ങൾ, കടലാസ് മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽശാലകളിൽ വർണ്ണവ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിലേക്കായി ക്ലോറിൻ ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നു. അതിനു ഈ വാതകത്തെ ചുണ്ണാമ്പുമായി യോജിപ്പിച്ച് “ബ്ലീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ” എന്നൊരു സാധനമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഇതിൽ വെള്ളം ചേർന്ന സൽഫൂറിക് അസിഡ് ശിച്ഛാൽ ക്ലോറിനുണ്ടാകും. ഈ ക്ലോറിൻ അതിന്റെ രാസപ്രവൃത്തികൊണ്ടു വസുങ്ങൾക്കു മറ്റൊരു നല്ല വെള്ളനിറം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും. രോഗഹേതുക്കളായ ദുഷിച്ച വാതകങ്ങളേയും പരമാണുജീവകളേയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും ക്ലോറിനുണ്ട്. അതിനാൽ അതിലേക്കും ഈ വാതകത്തെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ഫൈഡ്രോക്ലോറിക് അസിഡ്. ഇതാകുന്നു ക്ലോറിൻ എന്ന ഭൂതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗവസ്തു. ഇതിൽ ക്ലോറിൻ, ഫൈഡ്രജൻ എന്നീ രണ്ടുവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർഗ്ഗം. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറെ ഫൈഡ്രജൻ എടുത്ത് അത്രയുംഭാഗം ക്ലോറിനുമായി ചേർത്ത് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തു വെച്ചാൽ അവയ്ക്കു തമ്മിൽ പെട്ടെന്നു രാസയോഗം സംഭവിച്ച് ഫൈഡ്രോക്ലോറിക് അസിഡെന്ന യോഗവസ്തു ഉണ്ടാകും. സാധാരണയായി സോഡിയംക്ലോറൈഡിൽ (കറിയുപ്പിൽ) സൽഫൂറിക് അസിഡ് ശിച്ഛിച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാണു് ഈ അമ്ലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.



പടം ൬.

മേൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പടത്തിൽ നോക്കുക. A. എന്ന കണ്ണാടിക്കൂസയിൽ കുറിയുപ്പം സൽഫൂറിക്കാസിഡും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഫൈഡ്രോക്സോറിക്കാസിഡു B. എന്ന കഴലു വഴിയായി C. എന്ന ചാരത്തിൽ വരും. C-യിൽ സ്വല്പം ജലംവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജലം ഫൈഡ്രോക്സോറിക്കാസിഡുമായി കലർന്നുവരുന്ന അന്യ സാധനങ്ങളെ അതിൽ ലയിപ്പിച്ചു ചേർക്കുകയും. അപ്പോൾ തനി ഫൈഡ്രോക്സോറിക്കാസിഡു വാതകരൂപത്തിൽ D എന്ന കഴലുവഴി പുറത്തേക്കുവരും. അതിനെ ആവശ്യംപോലെ നമുക്കു ശേഖരിക്കാം. E എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്

വെള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാതുമാണ്. വാതകരൂപത്തിൽ വരുന്ന ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കലരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ദ്രവം നമുക്കു കിട്ടും.

ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡ് ഒരു രൂപിയായ വാതകമാകുന്നു. അതിനു ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കടുത്ത മണം ഉണ്ട്. ഈപ്പമുള്ള വയേറിൽ തുറന്നുവെച്ചാൽ അതു പുകയും. ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡ് കത്തുകയോ കത്തു നീന്തിനെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ല. അതിനു വായുവിന്റേക്കാൾ ഘനക്കൂടുതൽ ഉണ്ട്. വാതകരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡ് ക്ഷണത്തിൽ ജലത്തിൽ കലർന്നു പോകും. നാം സാധാരണ ദ്രവരൂപത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡ് അതിന്റെ വാതകം വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലോഹങ്ങളിൽ ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അവയുടെ ആഗേയങ്ങളിൽ അതു പ്രവർത്തിച്ചാൽ ക്ലോറിനും ഉണ്ടാകും. ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സിഡ് ലോഹങ്ങളുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലവണങ്ങൾക്കു ക്ലോറൈഡു ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു കറിയുപ്പാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവികളുടെ വളച്ചു കൂട്ടേണ്ട ഈ സാധനം ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ സമ്പാദിക്കുക ക്ലോറിന്റെ ചേരുവയുള്ള യാതൊരു വസ്തുവും ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തെ മണ്ണിൽ ക്ലോറൈഡ് ലവണങ്ങൾ വളർച്ചിയാണാൽ അവിടാ ചെടികൾക്കു വളരാനു യോഗ്യമായിരിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജലം ജീവികൾക്കും സമ്പാദിക്കുകയും ഉപയോഗപ്പെടുകയുമില്ല.

൨൦൦൦ ൧൦.

(കുറി). ഇംഗ്ലാൻഡ്: ഫിന്നി. C

അണുവിന്റെ ഘനം ൧.

ഇംഗ്ലാൻഡ് തന്നിയിട്ടും യോഗവസ്തുക്കളായിട്ടും പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കല്ലുരി ഇംഗ്ലാൻഡ്മാകുന്നു. വളം, ഈയമണ്ണ എന്നിവസ്തുക്കൾ ഇംഗ്ലാൻഡ്ത്തിന്റെ രൂപവിശേഷങ്ങളാണ്. ചുണ്ണാമ്പു കല്ലും കക്കയും ഇംഗ്ലാൻഡ്ത്തിന്റെ യോഗങ്ങളത്രെ. ജീവജാലങ്ങളുടേയും നസ്യങ്ങളുടേയും അധികഭാഗവും ഇംഗ്ലാൻഡ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ചുട്ട പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കരിയുന്ന എല്ലാവസ്തുക്കളിലും ഇംഗ്ലാൻഡ്ത്തിന്റെ ചേരവേണ്ടു്. അവയിൽ നിന്നൊക്കയും നമുക്കതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. വായുവിനത്തിനെ പ്രവേശം കൊടുക്കാതെ വിറകു നല്ലപോലെ ചുട്ടപിടിപ്പിച്ചാൽ തന്നി ഇംഗ്ലാൻഡ് കിട്ടും

ഇംഗ്ലാൻഡ് ഘനരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതമാണ്. അതിനു സാധാരണയുള്ള ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയിൽ യാതൊരു വികാരവും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. നല്ലപോലെ ചുട്ടപിടിപ്പിച്ചാൽ അത് ഓക്സിജൻ, ഗന്ധകം മുതലായ പല ഭൂതങ്ങളോടും സംയോഗിക്കും. ലോഹങ്ങളുടെ ആഗ്നേയങ്ങളെ ഇംഗ്ലാൻഡ്വുമായി ചേർത്തു ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ചാൽ ഇംഗ്ലാൻഡ് ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചു ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കും. ഇംഗ്ലാൻഡ്തെ യാതൊരുപായം കൊണ്ടും ഇതുവരെ ദ്രവ രൂപത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലാൻഡ് യാതൊരു ദ്രവത്തിലും ലയിച്ചു ചേരുകയുമില്ല.

ഇംഗാലം സ്പിടിക രൂപമായിട്ടും അല്ലാതെയും കാണപ്പെടുന്നു. വളവും ഈയമണ്ണും സ്പിടികരൂപത്തിലുള്ള ഇംഗാലമാണ്. സാധാരണ കരിയും, കല്ലുരിയും ഇംഗാലത്തിന്റെ സാധാരണ രൂപങ്ങളാകുന്നു. വളം ഈയമണ്ണു, കരി എന്നീ മൂന്നു സാധനങ്ങളേയും ഓക്സിജനിൽ കത്തിച്ചാൽ നമുക്കു കിട്ടുന്ന വസ്തു ഇംഗാലാമ്ലവാതകമാകുന്നു. ഇവ ഓരോന്നും സമതൂക്കം എടുത്തു കത്തിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഇംഗാലാമ്ലവാതകത്തിന്റെ തൂക്കം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ അവയെല്ലാം രസവാദശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ ഒരേ വസ്തു തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

വളം. വസ്തുക്കളിൽ വച്ചു ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയത് വളമാകുന്നു. അതിന്നു വെള്ളത്തേക്കാൾ മൂന്നരയിരട്ടി ഘനം ഉണ്ടു്. അതു എപ്പോഴും സ്പിടിക രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. വളരെ പ്രകാശമുള്ള വസ്തു ആകയാൽ ആദരണങ്ങളിലും മറ്റും പതിക്കുന്നതിന്നു് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരിയെ വളമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഈയമണ്ണ്. സ്വല്പം കറുത്ത ചാരനിറത്തിലുള്ള വസ്തുവാണ് ഈയമണ്ണ്. ലോഹങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ മിന്നുമിന്നുപ്പിതിന്നും ഉണ്ടു്. ഈയമണ്ണ് ഭൂമിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതിൽ തൊട്ടുനേക്കിയാൽ വളരെ മാർദ്ദവമായിരിക്കും. അതിന്നു വെള്ളത്തേക്കാൾ രണ്ടിലധികഭാഗം ഘനമുണ്ടു്. നാം കടലാസിലെഴുതാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പെൻസിൽ, ഈയമണ്ണം ചെളിയും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു്.

കരി. ഇതു നല്ല കറുപ്പുനിറമുള്ള ഒരു വസ്തുവാകുന്നു. ഇതിനു വെള്ളത്തേക്കാൾ ഒന്നരയിരട്ടി ഘനക്കൂടുതൽ ഉണ്ടു്. കരിയെ ഗന്ധകം, വെടിയുപ്പു് എന്നീ സാധനങ്ങളോടു കൂട്ടി ചേർത്തു പൊടിച്ചു വെടിമരുന്നുണ്ടാക്കിവരുന്നു. വെള്ളം അരികുന്നേതിന്നും, കരിവിൻചാർ മുതലായ സാധനങ്ങളിലെ നിറം കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന്നും കരി ഉപയോഗപ്പെടുന്നു.

കല്ക്കരി. വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും മറ്റും അനേകായിരം വർഷം മണ്ണിൽക്കിടന്നു രൂപാന്തരപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് കല്ക്കരി. അതിന്റെ അധികഭാഗവും ഇംഗ്ലാലാതന്നെ. ഇംഗ്ലാലം കൂടാതെ അതിൽ ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, ഇരിമ്പും ഗന്ധകവും ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില യോഗവസ്തുക്കൾ, പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നിത്യാദി സാധനങ്ങളും സ്വല്പമായിട്ടു കാണാം. കല്ക്കരി ഭൂമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ധാരാളമായിക്കാണു് പെടുന്നു. അവിടെനിന്നും അതിനെ ശേഖരിച്ചു വിറ്റുകൊണ്ടിട്ടും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

കോൾഗാസ്. (കല്ക്കരിഭാതകം) വായുവിനു പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കുറെ കല്ക്കരിയെടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടു ചൂടുപഴുപ്പിച്ചാൽ അതിൽ കോൾഗാസ് എന്ന വാതകവും, ഓർ, അമ്മോണിയാ മുതലായ പല വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകും. അവയെ ഒരു കഴൽവഴിയായി, വെള്ളച്ചുണ്ണാമ്പും ജലവും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ദ്രവം എന്നിവകളിൽകൂടി വിട്ടാൽ അന്യസാധനങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞു കോൾഗാസെന്ന വാതകം മാത്രം പ്രത്യേകം കിട്ടും. ഈ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺമോണോക്സൈഡു മുതലായ പല വാതകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രമാണ്. ഇതിനു യാ-

തൊരു നിറവും ഇല്ലാ. വിളക്കുകൊളുത്തുന്നതിലേക്കാണ് ഇതിനെ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. അതു കത്തുമ്പോൾ നീരാവിയും ഇംഗാലാമുവാതകവും ഉണ്ടാകുന്നു. വായുവിന്റെ എട്ടിലൊന്നു ഭാഗമേ ഈ വാതകത്തിനുള്ളൂ. അതിനാൽ ഘനംകാഞ്ഞ കൂട്ടുകളിലും മറവും കോൾഗാസു നിറച്ചുവച്ചാൽ അവ വേഗം വായുവിൽ പൊങ്ങി സഞ്ചരിക്കും. കോൾഗാസു വെള്ളത്തിൽ കലരുന്ന സാധനമല്ല.

കല്ലുരി ചൂട്ടു പഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും കോൾഗാസു എന്ന വാതകം കൂടാതെ മറ്റു പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായവ അമ്മോണിഡായും ടാറും ആകുന്നു. ഈ അമ്മോണിയാകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പല യോഗവസ്തുക്കളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ടാറിൽനിന്നും നമുക്കു പ്രയോജനകരങ്ങളായ പല വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്ന പല മായങ്ങളും ടാറിൽനിന്നും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്.

ഇംഗാലം ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന യോഗങ്ങൾ.

൧. കാർബൺമോണോക്സൈഡ്. ഇതു ഇംഗാലം ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വാതകമാകുന്നു. ഇതിനു യാതൊരു നിറവും രുചിയും ഇല്ല. എങ്കിലും വല്ലാത്ത ഒരു ഗന്ധം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഇംഗാലം, ഓക്സിജൻ എന്നീ രണ്ടുഭൂതങ്ങളുടേയും ഓരോ അണുവിതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതു കത്തും. കത്തുമ്പോൾ മങ്ങിയ നീലനിറമുള്ള വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. അന്യസാധനങ്ങൾ കാർബൺമോണോക്സൈഡിൽ കത്തുകയില്ല. കാർബൺമോണോക്സൈഡിനു വിഷമുണ്ട്. അതിനാൽ അതു അധികമായി ശ്വാസിച്ചാൽ മരണം സംഭവിക്കും.

൨. ഇംഗാലാമുവാതകം. ഇംഗാലം ഓക്സിജനമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു യോഗവസ്തുവെണിതു്. ഇതിന്റെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഇംഗാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഓക്സിജന്റെ ഒരു ഭാഗവും കാണാം. വായുമാണ്ഡലത്തിൽ തനി ഇംഗാലാമുവാതകമുണ്ടെന്നു നാം മുമ്പു പഠിച്ചുവല്ലോ. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നും കല്ലുരിഖാനികളിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വാതകസമൂഹത്തിലും പഴയ കിണറുകളുടെ അടിയിലും ഈ വാതകം കാണാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ചേരുവയുടേ ഒരുവളരെ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായവ കക്കായം, ചുണ്ണമ്പുകല്ല്, ചോക്കമാകുന്നു. ഈ യോഗവസ്തുക്കളിൽ ഫൈഡ്രോക്സോറിക് അസിഡു ചേർത്താൽ അറയിൽനിന്നും ഇംഗാലാമുവാതകം പുറപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ആവശ്യപോലെ ശേഖരിക്കാം. ഇതും ഒരു രൂപിയായ വാതകമാകുന്നു. വായുവിനേക്കാൾ ഇതിനു ഒന്നരമടങ്ങുചെന്നു കൂടുതലുണ്ട്. ഇംഗാലാമുവാതകം കത്തുകയോ കത്തുന്നതിനെ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ല. ചുണ്ണമ്പുവെള്ളത്തോടു ഈ വാതകം ചേർന്നാൽ ചോക്കുണ്ടാകുമെന്നു നാം മുമ്പു പഠിച്ചുവല്ലോ. സോഡാ, പോട്ടാസ് എന്നീ രണ്ടു ക്ഷാരങ്ങളും ഇംഗാലാമുവാതകത്തെ വേഗം സംഗ്രഹിക്കും.

പാഠം ൧൧.

ജ്വാലയുടെ സ്വഭാവവും ആകൃതിയും


ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു വാതകരൂപത്തിലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവസ്തുക്കളും കത്തുന്നതു്. വിളക്കുകൊളുത്തുന്നതിന്നു് നാം വിളക്കിന്റെ തിരിയിൽ

തീർപ്പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചുടുകൊണ്ട് തിരിയിൽ പാറി
 യിരിക്കുന്ന എണ്ണ വാതകരൂപത്തിലാകും. അപ്പോൾ അതു
 കത്തുന്നു. ഇങ്ങിനെ കത്തുമ്പോൾ വിളക്കിലെ എണ്ണ സ്വല്പം
 സ്വല്പമായി തിരിയിൽക്കൂടി കത്തുന്നസ്ഥലത്തേക്കു വന്നുകൊ
 ണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ചുടുകൊണ്ടുവരുന്ന എണ്ണ അ
 പ്ലപ്പോൾതന്നെ വാതകരൂപത്തിലായിത്തീരുന്നു. അതി
 നാൽ വിളക്കിലെ എണ്ണ മുഴുവൻ തീരുന്നതുവരെ അതു മുറ
 യ്ക്കു കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ കത്ത
 ുമ്പോൾ വാതകരൂപത്തിലായ എണ്ണയുടെ അംശങ്ങൾക്ക് വാ
 യുവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി രാസയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. എണ്ണ
 യുടെ അംശങ്ങളുമായി ചേർന്ന് രാസവികാരമുണ്ടാകുന്നതിനുപ
 കാരപ്പെടുന്ന വസ്തു വായുവിലില്ലായെങ്കിൽ വിളക്കു കത്തുകയി
 ല്ല. ഒരു തിരികത്തിച്ചു ഇംഗ്ലാൻഡുവാതകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
 ഒരു പാത്രത്തിൽ കാണിച്ചുനോക്കുക. അപ്പോൾ അതണ
 ഞ്ഞുപോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എണ്ണയുടെ അംശങ്ങ
 ൾക്കു ഈ വാതകവുമായി രാസയോഗം ഉണ്ടാകാൻ കഴികയി
 ല്ല. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കത്തുന്നു എന്നുപ
 റഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓരോ അംശത്തിനും രാസവികാരം
 ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുകൂടി ധരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ജ്വാലയുടെ പ്രകാശം. വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാ
 കുന്ന ജ്വാലയുടെ പ്രകാശം പല സംഗതികളെ ആശ്രയിച്ചി
 രിക്കുന്നു. ഒരിരുട്ടു മുറിയ്ക്കുകത്തുവെച്ച് ഫൈഡ്രജൻ എന്ന
 വാതകത്തെ കത്തിച്ചാൽ തീർന്ന പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു ജ്വാല
 മാത്രം ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ സ്വല്പം കരിയുടെ പൊടിവിതറി
 യാൽ ജ്വാലക്കു നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നു. കോൾഗ്യാസോ
 ഏതെങ്കിലും എണ്ണയൊഴിച്ചു വിളക്കോ കത്തുമ്പോൾ പുറ
 പ്പെടുന്ന ജ്വാലക്കു നല്ല പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതി

നുള്ളകാരണം അവയുടെ ചേരുവയിലുള്ള കരിയുടെ അംശം വേർതിരിഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളായി ജ്വാലയിൽ പതിയുന്നതുതന്നെയാണ്. എരിഞ്ഞു പ്രകാശിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതായ കരിയേപ്പോലെയുള്ള ഏതങ്കിലും വസ്തു ജ്വാലയിൽ കലന്നാൽമാത്രമേ അതിനു പ്രകാശം കാണുകയുള്ളൂ.

൨. ജ്വാലയുടെ പ്രകാശം കത്തുന്ന വസ്തുവിന്നും അതിനെ ചൂറിയിരിക്കുന്ന വാതകത്തിനും ഉള്ള ചൂടിന്റെ ഏറ്റക്കുറവിനെ അനുസരിച്ചും ഇരിക്കും. ഒരു കഷണം ഫാസ് ഫ്ലൈഡ് ക്ലോറിൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ കാണിച്ചാൽ അതു മങ്ങിയതും ഏറ്റക്കുറവ് പച്ചനിറമുള്ളതുമായ ഒരു ജ്വാലയോടുകൂടിക്കത്തും. എന്നാൽ ഫാസ് ഫ്ലൈഡ്, ക്ലോറിനും നല്ലപോലെ ചൂടുവിടിപ്പിച്ചതിനുശേഷം മേൽപ്രകാരം ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നപക്ഷം ജ്വാലക്കു നല്ല പ്രകാശം കാണും.



ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ജ്വാല. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തു നോക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വാലയെ സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്ന പക്ഷം അതിന്നു ഈ പടരത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ മൂന്നു പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതായിക്കാണാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതു് എല്ലാവർക്കും അകത്തായി തിരിയെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കറുത്ത ഭാഗമാണു്. അതുമുഴുവൻ മെഴുകുതിരിയുടെ അംശം അഴിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ള വാതകങ്ങളാകുന്നു. രാസയോഗത്തിന്നു വേണ്ട ഓക്സിജന്റെ അഭാവം കൊണ്ടു അവ കത്താതെ നില്ക്കുന്നു. പടത്തിൽ കാണുന്നതുപോലുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ കുഴൽ ജ്വാലയുടെ ആഭാഗത്തു കാണിച്ചാൽ ഈ വാതകങ്ങൾ കുഴലിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിന്റെ മറ്റൊര അറ്റത്തുകൂടി വെളിയിൽ വരും. അവിടെ തീകാണിച്ചാൽ അവ കത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ കറുത്ത ഭാഗത്തിനെ ചുറ്റി നന്നു പ്രകാശിച്ചു കാണുന്നതാണു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അവിടെ മെഴുകുതിരിയിൽ നന്നുമുണ്ടായ വാതകങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം കത്തിനില്ക്കുന്നു. ശരിയായി രാസവികാരം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കരിയുടെ തരികൾ അവിടെ ധാരാളം ഉണ്ടു്. അതിനാലത്രെ ജ്വാലയുടെ ഈ ഭാഗത്തിന്നു പ്രകാശം കൂടിയിരിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രകാശം കൂടിയ ഭാഗത്തിന്റെ പുറമേയുള്ളതാണു് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം. അവിടെ വായുവിന്റെ പ്രവേശനം ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ടു മെഴുകുതിരിയുടെ അംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരിയായി കത്തുന്നു. കരിയുടെ അംശങ്ങൾ ആഭാഗത്തു് തീരെ കാണുകയുമില്ല. അതിനാൽ ജ്വാലയുടെ ആഭാഗത്തിന്നു പ്രകാശം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ചിഹ്നം P. അനുവിന്റെ പേരും 31.

തനി ഫാസ് ഫാസ് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ ചേരുവയുള്ള വളരെ ധതു ഭവ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. സാധാരണ മിക്കതരം മണ്ണിലും ഇതിന്റെ യോഗവസ്തുക്കളുടെ ചേരുവയുള്ളതായി കാണുന്നു. ചെടികളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ഫാസ് ഫാസ്സിന്റെ അംശം ഉണ്ട്.

ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർഗ്ഗം. ഫാസ് ഫാസ്സുണ്ടാക്കുന്നതു അസ്തിയിൽനിന്നും ആകുന്നു. അതിലേക്കു ആദ്യമായി അതു ചൂട്ട അതിലുള്ള ഇട്രിയാപദാർത്ഥങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇട്രിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത് എലിന്റെ ചമ്പലാണ്. ഇതിൽ സൽഫൂറിക് അസിഡിഡൊഴിച്ചാൽ ഹേസ് ഹേസ് യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അവയെ കരിയും ചേർത്തു ചൂട്ടാൽ തനിഫാസ് ഫാസ്സുണ്ടാകും.

ചുവന്നതെന്നും മഞ്ഞതെന്നും രണ്ടുതരം ഫാസ് ഫാസ്സുണ്ട്. മഞ്ഞഫാസ് ഫാസ്സ് വായുവിനു പ്രവേശം ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ചൂട്ടാപിടിപ്പിച്ചാൽ ചുവന്നഫാസ് ഫാസ്സായിത്തീരും. രസതന്ത്രശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ ഇവ രണ്ടും ഒരു വസ്തുതയാണ്. എങ്കിലും അവയുടെ സാമാന്യസ്വഭാവത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായവ:—

(൧) മഞ്ഞഫാസ് ഫാസ്സ് വളരെ മൃദലമുള്ളതും അരക്കു പോലെ ഇരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സാധനമാണ്. ചുവന്നതു നല്ല പൊടിപോലിരിക്കും.

- (൨) മഞ്ഞ ഓക്സിജൻ, ക്ലോറിൻ, മുതലായ ഭൂതങ്ങളോടു ക്ഷണത്തിൽ യോജിച്ചു ചേരും. മറോതു അതു വേഗം യോജിച്ചുചേരുകയില്ലാ.
 - (൩) നല്ല ഇരിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു ഒരുകഷണം മഞ്ഞ ഫാസ്ഫറൈസ്സുടുത്തുവെച്ചാൽ അത് മിന്നും. എന്നാൽ ചുവന്ന ഫാസ്ഫറൈസിനു ഈ സ്വഭാവം ഇല്ല.
 - (൪) മഞ്ഞയ്ക്കു വിഷമുണ്ട്. ചുവന്നതിനു അതു തീരെയില്ല.
 - (൫) മഞ്ഞ കാർബൺബൈസൾഫൈഡ് എന്ന ദ്രവത്തിൽ ലയിച്ചുചേരും. ചുവന്നതു അങ്ങിനെ ചേരുകയില്ല.
 - (൬) മഞ്ഞയ്ക്കു ചുവന്നതിനേക്കാൾ ഘനക്കുറവുണ്ട്.
 - (൭) മഞ്ഞ കാരാത്തുവെച്ചാൽ പുകഞ്ഞു കത്തും. ചുവന്നതു വളരെനേരം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ കത്തുകയുള്ളൂ.
- ഈ രണ്ടുതരം ഫാസ്ഫറൈസിന്റെയും പ്രധാന ഉപയോഗം തീപ്പെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്.

ഫാസ്ഫറൈസിന്റെ യോഗങ്ങൾ. ഫാസ്ഫറൈസ് അനേകം ഭൂതങ്ങളുമായി സംയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിനാൽ അതിന്റെ ചേരുവയുള്ളതായി വളരെ യോഗവസ്തുക്കളുണ്ട്. ഫാസ്ഫറൈസ്, ഫൈബ്രജനോടും ഓക്സിജനോടും ചേർന്ന ഫാസ്ഫാറിക്സിഡുണ്ടാകുന്നു. ഈ യോഗവസ്തു ലോഹങ്ങളുമായി സംയോഗിച്ചാൽ അവയുടെ ഫോസ്ഫേറലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാത്സ്യംഫോസ്ഫേറ്റ്, സോഡിയംഫോസ്ഫേറ്റ് മുതലായവ ഇപ്രകാരമുണ്ടായിട്ടുള്ള ലവണങ്ങളാണ്. ഈ യോഗവസ്തുക്കൾ കൈയും സസ്യവളച്ചു് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നവയാണ്. അതിനാൽ അവയ്ക്കു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്.

പാഠം മന.

ഗന്ധകം.

ചീനം S. അണവിന്റെ പേര് 32.

ഗന്ധകം തനിയായും യോഗങ്ങളായിട്ടും പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. യോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായവ നാലുപേർ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ അതു ഇംഗാലം, ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ എന്നീ ഭൂതങ്ങളുമായി യോജിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ളവയായ ചില യോഗവസ്തുക്കൾ ചെടികളിലും ജീവജാലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗന്ധകം ചെളി, മണ്ണു മുതലായ അന്യസാധനങ്ങളുമായി കലർന്നിരിക്കും. ഈ അന്യസാധനങ്ങളിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതിനു ചൂടുകല്പിക്കാൻ പ്രത്യേകം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ മുറികളിൽ വായുവിന്റെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കാതെ അതിട്ട് ചൂട്പിടിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഗന്ധകം ആവിരൂപത്തിലായി മുറിയുടെ അകത്തുള്ള ചൂടുകല്ലിൽ അടിഞ്ഞുപറ്റി ഉറക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗന്ധകം നല്ല പൊടിപോലെയായിരിക്കും. ഈ പൊടി ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി ഉരുക്കി അച്ചുകളിൽ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കി വരുന്ന കട്ടകളാണു നാം സാധാരണകാണുന്ന ഗന്ധകം. ഇംഗാലത്തിനെപ്പോലെ ഗന്ധകത്തിനും പല രൂപവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ചിലവ സ്പടികരൂപത്തിലിരിക്കും. ഗന്ധകത്തിന് ഓക്സിജനുമായി രാസയോഗം ഉണ്ടായി അതിന്റെ രണ്ടുപ്രധാന ആഗേയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതു ലോഹവുമായി സംയോജിച്ചാൽ സൾഫൈഡ് എന്ന യോഗവസ്തു ഉണ്ടാകും. വെടിമരുന്നു. തീപ്പെട്ടി, സൽഫൂറിക് അസിഡ് എന്നിവകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഗന്ധകം ആവശ്യമുണ്ട്.

ഗന്ധകത്തിന്റെ പുകയ്ക്കു ചെറിയതരം ജീവികളേയും സാം
ക്രമിക രോഗബീജങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്.
ഗന്ധകം ചേർന്നിട്ടുള്ള സർഫേറൽ ലവണങ്ങൾ ചെടി
കളുടെ രാമാമാരസാധനമാണ്.

ഗന്ധകത്തിന്റെ പ്രധാനയോഗങ്ങൾ.

ഗന്ധകം ഓക്സിജനോടു സംയോജിച്ച് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡെന്നും, സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡെന്നും രണ്ടു
യോഗവസ്തുക്കളുണ്ടാകുന്നു. അവരണ്ടും വാതകരൂപത്തിലിരി
ക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. ഈ വാതകങ്ങൾ ജലത്തിൽ കലർന്നുചേ
രുമ്പോൾ അമ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗന്ധകം കത്തുമ്പോളുണ്ടാകു
ന്ന എരിഞ്ഞഗന്ധം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റേതാക
ുന്നു. കടലാസ്, പട്ട് മുതലായവയ്ക്കു നല്ല വെളിച്ചനിറം ഉ
ണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലേക്കും ചീഞ്ഞഴുകുന്ന സാധനങ്ങൾ
ചീന്യാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കും ഈ വസ്തു ഉപയോഗപ്പെട്ടു
ന്നു. ചെമ്പിൽ തനിസൽഫൂറിക്കാസിഡൊഴിച്ചാണ് സാ
ധാരണ സൽഫർ ഡയോക്സൈഡുണ്ടാക്കുന്നത്.

സൽഫൂറിക്കാസിഡ്. സൽഫർ ട്രയോക്സൈഡെന്ന
വസ്തു ജലത്തിൽ കലർന്നുണ്ടാകുന്ന യോഗവസ്തുവാനിത്. ഗ
ന്ധകത്തേയോ അയാൺ പൈറയിറീസെന്നു പറയപ്പെട്ട
ന്ന ധാതുദ്രവ്യത്തേയോ ചൂട്ടുകത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും
സൽഫർ ഡയോക്സൈഡുണ്ടാകും. ഇതിനെ വായു, നൈ
ട്രിക്കാസിഡിന്റെ ആവി, നീരാവി എന്നിവകളുമായി കല
ർത്തിയാൽ സൽഫൂറിക്കാസിഡുണ്ടാകും. ഇതു പല വ്യവസാ
യത്തിലേക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാകയാൽ ഈ ത
ത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒട്ടവളരെ സൽഫൂറിക്കാ
സിഡുണ്ടാക്കിവരുന്നു. സൽഫൂറിക്കാസിഡ് വളരെ ചെ

നമുക്കുതന്നെ കാഴ്ചയിൽ എണ്ണപോലെയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ദ്രവമാകുന്നു. അതു ജലവുമായി വേഗം കലർന്നുപോകുന്നു. അങ്ങിനെ ചേരുമ്പോൾ വളരെ ചൂടുണ്ടാകുന്നു. ഈപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളെ അതിനടുത്തുവെച്ചാൽ ഈപ്പത്തെ മുഴുവൻ അതു ഗ്രഹിച്ചുകളയും. സമ്പ്രദായികളിൽനിന്നും ജീവജാലങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിൽ ഈ അമ്ളം വീണാലുടൻ അതു കരിയാൻ തുടങ്ങും. നൈട്രിക്കാസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡ് എന്നീ അമ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സൽഫൂറിക്കാസിഡ് ആവശ്യമാണെന്നു മുമ്പു പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇതു കൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശം ലവണങ്ങളുണ്ടാക്കുക, തുണികൾക്കും മറ്റും ചായം പിടിപ്പിക്കുക, വാതകങ്ങളിലെ ജലവും നശിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. സൽഫൂറിക്കാസിഡിന്റെ ചേരുവയുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനോടു ബേരിയംക്ലോറൈഡെന്ന ലവണം ചേർത്താൽ ബേരിയംസൾഫേററെന്ന ഒരു വെളുത്ത യോഗവസ്തു ഉണ്ടാകും. ഇതു വെള്ളത്തിൽ അധിമുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ പരിക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. സൽഫൂറിക്കാസിഡിന്റെ ചേരുവയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

ഹൈഡ്രജൻസൾഫൈഡ്. ഗന്ധകം ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു യോഗവസ്തുവുമാണിത്. അയാൻസൾഫൈഡിൽ സൽഫൂറിക്കാസിഡിന്റെ അളവ് വളരെ ചെറുതാകുന്നു. ഇതു ചീഞ്ഞുമുട്ടയുടെ ദുർഗന്ധത്തോടു കൂടിയ ഒരു രസവുമായി വാതകമാകുന്നു. ഈ വാതകത്തിന് വിഷമുണ്ട്. അതിനാൽ അതിനെ അധികമായി ശ്വാസിച്ചാൽ ആപത്തുണ്ടാകും. തൊണ്ടഴുകുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന ദുർഗന്ധം ഹൈഡ്രജൻസൾഫൈഡുമാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

ന്നതാണ്. ഫൈഡ്രജൻസൾഫൈഡ് ഒരു മങ്ങിയതും നീലനിറമുള്ളതുമായ വെളിച്ചത്തോടുകൂടി വായുവിൽ കത്തും. അപ്പോൾ അതു വായുവിലുള്ള ഓക്ജിജനുമായി സംയോഗിച്ച് നീരാവിയായും സൾഫർഡയോക്സൈഡായും പിരിയുന്നു. ലവണങ്ങൾ ജലവുമായിച്ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ദ്രവത്തിൽ ഫൈഡ്രജൻസൾഫൈഡു വിട്ടാൽ അതു ലവണങ്ങളിലുള്ള ലോഹാംശവുമായി സംയോഗിച്ച് സൾഫൈഡ് എന്ന യോഗവസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കും.



പാഠം ൧൪.

ക്ഷാരജനകങ്ങളായ ലോഹങ്ങൾ—സോഡിയം: പൊട്ടാസ്യം—ഈ ലോഹങ്ങളുടെ ഫൈഡ്രോക്സൈഡുയോഗങ്ങൾ വളരെ കടുത്ത ക്ഷാരങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അവയുടെ ക്ഷാരജനകങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

പൊട്ടാസ്യം. പൊട്ടാസ്യം തനിസ്വഭാവത്തോടുകൂടി പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. എപ്പോഴും അതു മറുഭൂതങ്ങളുമായി സംയോഗിച്ചതന്നെയിരിക്കുന്നു. ഫെൽസ്പാർ എന്ന ധാതുവസ്തുവിൽ പൊട്ടാസ്യംസിലിക്കേറാറു പറയപ്പെടുന്ന യോഗവസ്തുവുണ്ട്. വെടിമുപ്പു പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു യോഗവസ്തുവാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും കത്തി ഭവിക്കുന്നതായ ചാമ്പലിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ചേരുവയുണ്ട്. അതിൽ അതു പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറാറുന്ന യോഗമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടാസ്യംകാർബണേററിൽ കരിച്ചേർത്തു നീറുന്നതാൽ അതിൽനിന്നും തനിപൊട്ടാസ്യത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം.

പൊട്ടാസ്യം വളരെ മൃദുത്വമുള്ള ഒരു ലോഹമാണ്. അതിനു വെള്ളത്തെക്കാൾ ചെറുക്കുറവുണ്ട്. അതിനെ കഠിനമായ കാണിച്ചാൽ അതു വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചു പൊട്ടാസ്യം ഓക്സൈഡായിത്തീരും. ഈ ലോഹം ജലത്തിലിട്ടാൽ അതു ജലത്തിന്റെ ചേരുവയിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചു ഹൈഡ്രജനെ വേർതിരിക്കും. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രാസയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി പുറപ്പെടുന്ന ചൂടുകൊണ്ടു വേർതിരിയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഉടനെതന്നെ കത്തുകയും ചെയ്യും. പൊട്ടാസ്യം ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പല യോഗങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ അതിന്റെ നൈട്രേറ്റ്, സൾഫേറ്റ്, ക്ലോറേറ്റ്, ക്ലോറൈഡ്, എന്നിവകളാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം നമുക്കു പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റുകൊണ്ടാണ് വെടിമരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുഭാഗം ഗന്ധകവും രണ്ടുഭാഗം വെടിയുപ്പും, മൂന്നുഭാഗം കരിയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മിശ്രമാണ് വെടിമരുന്നു. അതു കത്തുമ്പോൾ ഇംഗാലാറ്റുവാതകവും, നൈജനും പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റുമുണ്ടാകുന്നു. പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ചില ലവണങ്ങൾ സസ്യാദികളുടെ ഒരു പ്രധാന ആഹാരസാധനമാണ്. അതിനാൽ അവയെ വളമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

സോഡിയം. പൊട്ടാസ്യത്തെപ്പോലെതന്നെ സോഡിയവും തനിസ്വഭാവത്തോടു കൂടി പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ യോഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായവ കരിയുപ്പും സോഡിയം നൈട്രേറ്റും ആകുന്നു. സോഡിയം കാർബണേറ്റെന്ന യോഗവസ്തുവിനെ കരിയുമായി ചേർത്തുനീറുമ്പോൾ തനി സോഡിയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോഹത്തെപ്പോലും സാധാരണയായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. പൊ

ദാസ്യത്തെപ്പോലെതന്നെ ഇതും വളരെ മുദ്രതമുള്ള ഒരു ലോഹമാണ്. ഇതിനു വെള്ളത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം പലനക്ഷരവേരുകളുണ്ട്. കാരത്തുവെച്ചാൽ സോഡിയം വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചു സോഡിയം ഓക്സൈഡായിത്തീരും. ഒരു കക്ഷണം സോഡിയം എടുത്തു ജലത്തിലിട്ടാൽ അതു ജലത്തിന്റെ ചേരുവയിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി സംയോഗിച്ചു ഹൈഡ്രജനെ വേർതിരിക്കും.

സോഡിയം മററുള്ള ഭൂതങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പല യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കറിയപ്പ, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്, കാസ്റ്റിക് സോഡ, സോഡാപ്പൊടി, സോഡിയം സൾഫേറ്റ്, ഇവയെല്ലാം അതിന്റെ പ്രധാന യോഗങ്ങളാകുന്നു.

സേപ്പ്. കൊഴുപ്പിനോടോ, സമ്പ്രദീകളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എണ്ണയോടോ ക്ഷാരങ്ങൾചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സാധത്തിനു സേപ്പ് എന്നു പറയുന്നു. ഒരുഭാഗം കാസ്റ്റിക് സോഡ അഞ്ചുഭാഗം വെള്ളത്തിൽദ്രവിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ദ്രവത്തെ ഏഴുഭാഗം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചു ഏകദേശം അരമണിക്കൂർനേരം നല്ലപോലെ ഇളക്കി അടച്ചുവെച്ചാൽ ദൈർഘ്യമുള്ള മണിക്കൂർകൊണ്ട് അതു ശരിയായി ഉറച്ചു നല്ല കട്ടിസോപ്പായിത്തീരും.

പാഠം ൧൫.

കാത്വ്യം.

കാത്വ്യം തനിസ്വഭാവത്തോടുകൂടി പ്രകൃതിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ കാത്വ്യം കാർബണേററ്, ഫോസ്ഫേററ്, സൾഫേററ് എന്നിത്യാദികളായ അതിന്റെ ഒട്ടവളരെ യോഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട്. കാത്വ്യം ക്ലോറൈഡെന്ന യോഗവസ്തുവിൽ വിദഗ്ദ്ധരായി പ്രയോഗിച്ചാണ് തനികാത്വ്യത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാത്വ്യം ഒരു മങ്ങിയ മഞ്ഞനിറത്തോടുകൂടിയ ലോഹമാണ്. അതിനെ കഠിനമാക്കാനിച്ഛാൽ ഓക്സിജനോടു സംയോജിച്ച കാത്വ്യം ഓക്സൈഡായിതീരും. പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം എന്നീ ലോഹങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ കാത്വ്യവും ജലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അതിനെ കത്തിച്ചാൽ നല്ല പ്രഭയുള്ള ചുവന്ന വെളിച്ചത്തോടുകൂടിക്കത്തും.

കാത്വ്യത്തിന്റെ യോഗവസ്തുക്കൾ. കാത്വ്യം കാർബണേററ്, ക്ലോറൈഡ്, സൾഫേററ്, എന്നിങ്ങിനെ കാത്വ്യത്തിന്റെ ചേരുവയുള്ള പല യോഗവസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്. കക്കാചോ, മാർബിൾ മുതലായവ കാത്വ്യം കാർബണേററാകുന്നു. കക്കാനീറുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഇംഗ്ലാലാമ്യവാതകം വേർതിരിഞ്ഞു കാത്വ്യം ഓക്സൈഡുണ്ടാകുന്നു. ഇതിൽ ആവശ്യപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുമ്മായവും, ചുണ്ണാമ്പും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. ഇവ ക്ഷാരങ്ങളാണ്, അതിനാൽ അമുങ്ങളെ

നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു് അവ ഉപയോഗപ്പെടും. കാത്സ്യം സന്ധ്യാദികളുടെ ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരുവസ്തുവാണു്. മിക്കതരം മണ്ണിലും ഇതിന്റെ ചേരുവ ഏറെക്കുറെകാണും. കാത്സ്യത്തിന്റെ യോഗവസ്തുവായ കുമായത്തിന്നു മണ്ണിന്റെ ചേരുവയെ നന്നാക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലുള്ള കൃഷിക്കാർ ഇതിനെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

പാഠം ൧൬.

ഇരുമ്പു്.

ഇരുമ്പു്, കാക്സിജനമായി സംയോജിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ധാതുവസ്തുക്കളായിട്ടാണു് മുഖ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതു്. ഇതിന്റെ കാർബണേറ്റം, സൾഫൈഡ് എന്നീയോഗങ്ങളും ഭൂമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. മിക്കതരം മണ്ണിന്റെ ചേരുവയിലും ഇരുമ്പിന്റെ അംശം ഉണ്ടു്. അതിൽ നിന്നുമാണു് ചെടികൾ അവക്കാവശ്യമുള്ള ഇരുമ്പു ലവണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതു്. ഇരുമ്പു് ഓക്സിജനമായി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളവയായി പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ധാതുക്കളെ കരിയും ചുണ്ണാമ്പുകളും ചേർത്തു നീററി തന്നിരുമ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

ലോഹങ്ങളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയതുഇരുമ്പാകുന്നു. തനിയീരുമ്പിന്റെ നിറം നല്ലവെളുപ്പാണു്. ഇരുപ്പുള്ള ചായു സ്തരിച്ചാൽ അതിന്നു തുരുമ്പുപിടിച്ചു നിറവ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. അധികമായി ചൂടാപിടിപ്പിച്ചാൽ ഇരുമ്പുക

ഇതും. ഫൈഡ്രോക്സോറിക്സാസിഡ് മുതലായ എല്ലാ അമ്ലങ്ങളിലും ഈ ലോഹം ലയിച്ചുപോകും.

ഇരുമ്പിൽ പ്രധാനമായി രണ്ടു വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നു സാധാരണ ഇരുമ്പും മറേറതു ഉരുക്കും ആകുന്നു. സാധാരണ ഇരുമ്പിൽത്തന്നെ പിന്നേയും രണ്ടു പിരിവുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതിൽ കരിയുടെ അംശം മിക്കവാറും കാണുകയില്ല. അതുനിമിത്തം അതിന്നു പൊട്ടുന്നശീലം വളരെ കുറവായും ചത്തുന്ന ശീലം അധികമായും ഇരിക്കും. രണ്ടാമത്തേതിൽ കരിയുടെ ഭേദവക്രൂടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതു വേഗം പൊട്ടും. ചീനച്ചട്ടി മുതലായ ഇരുമ്പുപാത്രങ്ങൾ ഇത്തരം ഇരുമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഉരുക്കിന്റെ ഗുണം മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടിന്നും മധ്യേ ഒന്നു പ്രത്യേകമാണ്. അതിൽ കരിയുടെ ഭേദവ കുറച്ചുമാത്രമേയുള്ളൂ.

ഇരുമ്പിന്റെ ലവണങ്ങൾ. മററുള്ള പോഹങ്ങളെപ്പോലെ ഇരുമ്പും അമ്ലങ്ങളുമായി സംയോഗിച്ചു ഓരോയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായു് അന്നഭേദി എന്ന ലവണമാണ്. ഇരുമ്പിൽ, സൽഫുറിക്സാസിഡൊഴികെ ബോധം ഇതുണ്ടാകുന്നു.





ചരം ൧൭.


ചെമ്പ്.


തനിസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയും യോഗങ്ങളായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് ചെമ്പ്. ഇതു ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ധാതുവ്യുത്ഭവത്തെ കരിയുമിട്ടുനീറിയാൽ തനിച്ചെമ്പു വേർതിരിയും.


ചെമ്പിന്റെ നിറം നല്ല മഞ്ഞിറുപ്പുള്ള ചുവപ്പാകുന്നു. അതിനു ജലത്തേക്കാൾ ഉദ്രശം ഒൻപതിരട്ടി പലതുമുണ്ട്. ചെമ്പുണ്ടാക്കിയ പാത്താവുന്ന ലോഹങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. അതിനെ ചെറിയചെറിയ കമ്പികളായി വലിക്കുവാനും എളുപ്പമുണ്ട്. ഇഴർപ്പമില്ലാത്തവായുവിൽ എത്രനാൾ വെച്ചിരുന്നാലും ചെമ്പിന്റെ നിറത്തിനു ഒരു ഭേദഗതിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇഴർപ്പമുള്ളപ്പോൾ അതിനു ക്ലോറാപിടി ഉം. ചെമ്പു മറ്റൊല്ലാലോഹങ്ങളോടും ഉരുകിച്ചേരുന്ന ഒരു ലോഹമാണ്. അതിനാൽ അതിന്റെ ചേരുവയുള്ള ഒട്ടുവളരെ കൂടുതലോഹങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായ പിത്തള, ഓട്ട്, ജർമ്മൻസിൽവർ, മുതലായവയാകുന്നു.

ചെമ്പിന്റെ ലവണങ്ങൾ. ചെമ്പിന്റെ ചേരുവയുള്ള പല ലവണങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം വിഷവസ്തുക്കളാകുന്നു. തുരിശാണെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സാധനം ചെമ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടലവണമാണ്. ഇതിൽ അതു് സൽഫൂറിക് അസിഡിനോടുകൂടിയോ ജീച്ചിരിക്കുന്നു.

B199









PRATAMIKA RASAVADAM
PARAMESWARAN PILLAI

E1:1
32 F0