

GENERAL SCIENCE

FOR FORM IV MALAYALAM

(Prepared according to the latest Madras syllabus:
suited for use in Cochin & Travancore
Secondary Schools also)



by

C. S. VENKATARAMAN, B. A., L. T.,
Headmaster, Board High School, Manjeri

[FIRST EDITION]

MADRAS

SRINIVASA VARADACHARI Co.

2/16, MOUNT ROAD

Copyright Reserved] 1949.

[PRICE : Rs. 1/4.

സാമാന്യശാസ്ത്രം

നാലാം ഫാറ്റത്തിലേയ്ക്ക്



സി. എസ്സ്. വെങ്കിട്ടരാമൻ ബി. എ. എൽ. ടി,
ഫെഡ്റേഷൻ, ബോർഡ് ഫൈനാൻസ്,
മട്ടാഞ്ചേരി.

ശ്രീനിവാസ വരദാചാരി &
കമ്പനി.

2/16, മൈക്ക് റോഡ്, മദിരാശി.

വില]

1949

[Rs. 1/4.

PREFACE.

This book is written according to the syllabus in General Science finalised for the Reorganised Secondary School Course in March 1949. Only such matters as have vital relation to experiences within the reach of High School pupils have been dealt with in this book.

The Malayalam equivalents of the 'Scientific Terms' are those given in the booklets published by the Govt. of Madras in April 1947.

It is hoped that this book would meet the requirements of the pupils in Form-IV. Teachers are requested to offer their suggestions so that improvements can be effected.

15-12-49.

The Author.

വിഷയവിവരം

വിഭാഗം കന്ന

അദ്ധ്യായം

പേജ്

1	അളവു	1
2	അളവു (തുടച്ചു)	4
3	ബലം	9
4	ബലം (തുടച്ചു)	12
5	ലംഘനശൃംഗം—ചീവർ	15
6	ചീവർ (തുടച്ചു)	16
7	തുലാസ്സു	18
8	തുലാസ്സു (തുടച്ചു)	20
9	തുലാസ്സു (തുടച്ചു)	24
10	തുലാസ്സു (തുടച്ചു)	25
11	സ്ഥിതിസ്ഥാപകരൂപം	29
12	സിപ്രിംഗ്തുലാസ്സു	32

വിഭാഗം രണ്ടു

13	വായുമണ്ഡലം	34
14	ബറോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വായു മർദ്ദമാപകം	55
15	ബറോമീറ്റർ (തുടച്ചു)	38
16	ബറോമീറ്റർ (തുടച്ചു)	40
17	ബോയിൽ നിയമം	42
18	ബോയൽ നിയമം	44
19	വായുപ്പമ്പു	47
20	മറുമർദ്ദകപമ്പകൾ	49
21	പീച്ചാങ്കുഴൽ (Syringe)	50
22	ബലപ്പമ്പു	51

23	സൈഫൺ	52
24	വായുമണ്ഡലം—വായുവിലെ അംശങ്ങൾ	56
25	ചില മൂലഗതകൾ വായുവിൽ ചുട്ടുപിടിച്ചാൽ— അവയിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ	66
26	കാക്സൈഡുകൾ	69
27	ശ്വാസകോശങ്ങളും മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും	72
28	ശ്വാസകോശങ്ങളും മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും (തുടച്ചു)	74
29	മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം (തുടച്ചു)	78
30	സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം	79
31	സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം (തുടച്ചു)	81
32	തവള, തവളക്കുഞ്ഞു, മത്സ്യം എന്നിവയുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം	82
മൂന്നാം വിഭാഗം		
33	വെള്ളം	86
34	വെള്ളം (തുടച്ചു)	91
35	വെള്ളം—ശുദ്ധീകരണം	93
36	കഠിന ജലവും മൃദുജലവും	98
37	വെള്ളത്തിന്റെ രാസയോഗം	101
38	ഹൈഡ്രജൻ	104
39	ഹൈഡ്രജൻ (തുടച്ചു)	106
40	ഹൈഡ്രജൻ (തുടച്ചു)	109
41	വിലയനം	112
42	വിലയനം (തുടച്ചു)	114
43	വാതകങ്ങളും വിലയനവും	118
44	അക്വീഭവനം (Crystallisation)	119
45	അക്വീഭവനം (തുടച്ചു)	121

46	കാലാവസ്ഥയും ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയും—ബാഷ്പീഭവനവും സാന്ദ്രീകരണവും (Condensation)	125
47	മഴ, മഞ്ഞു, മുടൽമഞ്ഞു	127
48	ബാഷ്പീഭവനവും തണുപ്പും	130
49	വെള്ളത്തിന്റെ ഘനീഭവനാങ്കം	133
50	വെള്ളത്തിന്റെ കപനനാങ്കം	136

വിഭാഗം നാലു

51	മണ്ണും അതിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന പോഷകപദാർത്ഥങ്ങളും	139
52	വേരും അതിന്റെ രചനയും	142
53	വേരുകളും അവയുടെ മുഖ്യ പ്രവൃത്തികളും	146
54	പ്രകൃതിയിലെ നൈട്രജൻ ചിത്ര	149
55	വളം—കഴിക്കൽ	153
56	അഭിസരണം (Osmosis)	154
57	ചെടിക്കുള്ള ഭക്ഷണം	157
58	ബാഷ്പവിസർജ്ജനം	159
59	ബാഷ്പവിസർജ്ജനം (തുടച്ചു)	161

അഞ്ചാം വിഭാഗം

60	സമുദായത്തെ ഭീനങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ	163
61	കീറിവെക്കലും കുത്തിവെക്കലും	164
62	അശുഭവായുവിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീനങ്ങൾ—വായു സഞ്ചാരം—ശരിയായി ശ്വാസിക്കേണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗം	166
63	ഉപകാരികളും ഉപദ്രവികളുമായ സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികൾ	169
64	മലിനാ നീക്കം ചെയ്യൽ	172

ആറാം വിഭാഗം

66	കല്ലരി—കല്ലരിവാതകം, കീൽ മുതലായവ	177
67	അമോണിയവാതകം	179

68	പെട്രോലിയം—ഭൂമിയിൽ എവിടെ കിട്ടുന്നു	181
69	പെട്രോലിയം (തുടച്ചു)	182
70	മാർബിൾ, കക്കുമുതലായവ	185
71	കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡ് സജ്ജീകരണം—ഗുണങ്ങൾ	187
72	കുമ്മായക്കുട്ടു, ശീമക്കുമ്മായം കോൺക്രീറ്റ	189
73	കടലാസ്സു ഉണ്ടാക്കൽ	191
ഏഴാം വിഭാഗം		
74	പ്രകൃതിശക്തികളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ	193
75	വിദ്യുച്ഛാരണയുടെ ഉജ്ജ്വീകരണം (തുടച്ചു)	194
76	കമ്പിത്തപ്പാലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും	196
77	കമ്പിത്തപ്പാലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും (തുടച്ചു)	189
	തെറ്റാ രീക്ഷക	201

സാമാന്യശാസ്ത്രം വിഭാഗം ഒന്നു

അദ്ധ്യായം I

(അളവ്)

നീളം:- നീളം അളക്കുവാൻ അളവുകോൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ആശ്വരീക്കോലാകുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്നു വാരയിലോ മീറ്ററിലോ അക്കമിട്ട അളവു കോലാണു ഉപയോഗിക്കാൻ. വാരയളവുകോലിനേക്കാൾ മീറ്ററളവുകോലിന്നാണു സൗകര്യം അധികമുള്ളത്.

വാരയളവുകോലിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പെരക്കങ്ങൾക്കും എളുപ്പമായ ഒരു ബന്ധമില്ല. എന്നാൽ മീറ്ററളവുകോലിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പെരക്കങ്ങൾക്കും സൗകര്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഈ സംഗതി താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാം.

വാരയുടെ വിഭാഗങ്ങളും പെരക്കങ്ങളും.

12 ഇഞ്ചു - 1 അടി

3 അടി - 1 വാര

220 വാർ - 1 ഫർലാങ്ങ്

8 ഫർലാങ്ങ് - 1 മൈൽ

മീറ്ററിന്റെ വിഭാഗങ്ങളും പെരക്കങ്ങളും:-

10 മില്ലിമീറ്റർ } - 1 സെന്ററിമീറ്റർ (സെ. മീ.)
(മി. മീ.)

10 സെ. മീ. - 1 ഡെസിമീറ്റർ (ഡെ. മീ.)

10 ഡെ. മീ. - മീറ്റർ (മീ.)

- 10 മീ. - 1 ഡക്കാമീറ്റർ (ഡക്കാ. മീ.)
 10 ഡക്കാ. മീ. - 1 ഹെക്ടോമീറ്റർ (ഹെ. മീ.)
 10 ഹെ. മീ. - 1 കിലോമീറ്റർ (1 കി. മീ.)

ഈ പട്ടികകളിൽനിന്നു ഒരു സംഗതി വിശദമാകുന്നു. ഒരു മൈലിനെ വാരയോ അടിയോ മറ്റോ ആയി മാറ്റുന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ മീറ്ററിന് കിലോമീറ്ററോ മില്ലീമീറ്ററോ ആയി ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ക്ഷണം ചെയ്യാം. ഉദാഹരണമായി 518.38 മൈലിനു വാരയെത്ര എന്നറിയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ സംഭ്യമല്ല; കടലാസിൽ പെന്റക്കിക്കാണണം. എന്നാൽ 518.38 മീറ്ററിനു 51838 സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ 51838 കിലോമീറ്റർ എന്നു എളുപ്പത്തിൽ പറയാം.

മീറ്ററിന്റെ വിഭാഗങ്ങളും പെന്റക്കങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവ ദശോഹരിഭിന്നിതങ്ങളാകയാലാണ്. 518.38 മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്ററാക്കുവാൻ ഈ സംഖ്യയെ 100 കൊണ്ടു പെന്റക്കണമല്ലോ. അതിന്നു ഡെസിമൽ (Decimal) സ്ഥാനം വലത്തോട്ടു 2 അക്കം കണ്ടു നീക്കിക്കുത്തിയാൽ മതിയാകും. 1000 മീറ്ററാണല്ലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ. അതിനാൽ സംഖ്യയുടെ ഇടത്തോട്ടു 3 അക്കം കണ്ടു ഡെസിമൽ സ്ഥാനം നീക്കണം. അതായതു $518.38 \text{ മീ} = .51838 \text{ കിലോമീറ്റർ}$.

അളവു കോൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില നിബന്ധനകൾ നാം അനുസരിക്കേണ്ടവയാണ്. അവ:-

1 കോലിന്റെ അറ്റങ്ങൾ അളവു കുറിച്ചെടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്.

2 അളവ് എടുക്കുന്ന ഭാഗവും കോലിൽ അക്കമിട്ട ഭാഗവും അളക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിരിക്കണം — എന്നിവയാണ്.

ഓർമ്മിക്കേണ്ടുന്ന ചില തുകകൾ:—

- 1 1 ഇഞ്ച് = 2.54 സെ. മീ.
5 മൈൽ = 8 കി. മീ. (സുമാർ)

b ക്ഷേത്രഫലം (area):—

തലങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്ര (unit) ചതുരശ്രയിഞ്ചോ ചതുരശ്രസെൻറിമീറ്ററോ ആണ്. ഭൂജ്ഞരക്കു ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ അളവാണ് ചതുരശ്രയിഞ്ച്. അതുപോലെ തന്നെ, ഭൂജ്ഞരക്കു ഒരു സെ. മീ. നീളമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ അളവു ചതുരശ്ര സെൻറിമീറ്റർ ആകുന്നു. ഈ മാതൃകകളുടെ വിഭാഗങ്ങളോ പെരുക്കങ്ങളോ ആയിരിക്കും ഒരു തലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം. ചില ക്ഷേത്ര ഗണിത രൂപങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുവാനുള്ള സൂത്രം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

- 1 ചതുരം (Square) = നീളം $\times$ നീളം
- 2 സമകോണ ചതുരം = നീളം $\times$ വീതി
- 3 സമാന്തര ചതുഷ്കോണം
($\square^m$) = നീളം $\times$ ഉന്നതി (altitude)
- 4 ത്രികോണം (Triangle) = $\frac{1}{2}$ പാദം $\times$ ഉന്നതി
- 5 വൃത്തം = πr^2
($\pi r^2 = 22/7$; r = വ്യാസാർദ്ധം)

(N. B- നീളം ഇഞ്ചിലാണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി അളവുകളും അതേ തോതിലാവണം; അപ്പോൾ ഉത്തരം ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിലാണെന്നു ധരിക്കണം; നീളം സെ.മീറ്ററിൽ കണ്ടാൽ ഉത്തരം ചതുരശ്ര സെൻറി മീറ്ററിലായിരിക്കും)

(c) ഘനമാനം (Volume) ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ഉൾ-അളവു, ഒരു മരത്തിയുടെ ആകെച്ചുവു, ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കൂമ്പാരമായി കൂപ്പിപ്പിട്ടുള്ള മണ്ണിന്റെ അളവു എന്നിവയെല്ലാം ഘനമാനത്തിലാണ് കറിക്കുക. ഇതിനുള്ള മാത്ര ഘനയടിയോ ഘനസെൻററി മീറ്ററോ ആണ്. ഒരു കൂപ്പിട്ടുള്ള ഒരു സമഘന (cube)ത്തിന്റെ അളവു ഒരു ഘനയടിയുമാണ്. ഭൂമിയിന്റെ അളവു 1 സെ. മീ. ആയാൽ, അങ്ങിനത്തെ സമഘനത്തിന്റെ അളവു ഒരു ഘന സെ. മീറ്ററായിരിക്കും. ചില രൂപങ്ങളുടെ ഘനമാനം കാണുവാനുള്ള സൂത്രം:—

$$1 \text{ സമഘനം} = (\text{നീളം})^3.$$

$$2 \text{ സമകോണ ചതുര ഘനം} = \text{നീളം} \times \text{വീതി} \times \text{ഉയരം}$$

$$3 \text{ ത്രിപാർശ്വം (prism)} = \text{ത്രികോണ പാദ-} \\ \text{ക്ഷേത്രഫലം} \times \text{ഉയരം}$$

$$4 \text{ ഉരുൾ} = \pi r^2 \times \text{ഉയരം}$$

അദ്ധ്യായം 2


അളവ് (തുടർച്ച)

ഘനമാനം അളക്കുവാനുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങൾ

എണ്ണ, പാൽ എന്നിവയുടെ അളവ് കാണാൻ നാം ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീടുകളിൽ നാഴി, ഇടങ്ങഴി, പാ മുതലായവയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ അളവുകൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളവയല്ല. ഇത്തരം അളവുകൾ ദേശത്തോടും മാറി

ഉള്ളവയായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്നു ചില പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളാണു ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതു്. അവയുടെ വിവരണം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1 അംശാങ്കിതജാർ (Graduated jar) ഇതിന്റെ ചിത്രം [ചിത്രം 1] നോക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലിണ്ടറിൽ അക്കങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കും. ഇറന്ന മുഖത്തിന്റെ അടുക്കെയായി c. c. (സെ. സെ.) എന്നെഴുതിയിരിക്കും. രണ്ടു അടയാളങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ദൂരം 1 c. c. ആകുന്നു. ഈ ഉപകരണംകൊണ്ടു ദ്രാവകങ്ങൾ അളന്നെടുക്കാം. 40 c.cm. വെള്ളം വേണമെന്നു കരുതുക. ഒരു ബീക്കറിൽ നിന്നു ജാഗ്രതയായി ഇതിലേക്കു വെള്ളമൊഴിക്കുക. ചോട്ടിലെ '0'ൽനിന്നു 30 c. cm എന്ന അക്കം എത്തിയാൽ സൂക്ഷിച്ചു വെള്ളം ഒഴിക്കാൻതുടങ്ങണം 40 c. c എന്ന അക്കം എത്തിയാൽ ഒഴിക്കുന്നതു നിർത്തണം. ജാറിൽ പറ്റിനിൽക്കുവാൻ ഇടയുള്ള വായു കണങ്ങളെ 40 എന്ന അക്കം എത്തുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ, നീക്കം ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുതു. വായനക്കുറിപ്പെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു വക്രതലം (Meniscus) കാണും. രസമല്ലാത്ത ബാക്കി ദ്രാവകങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ വക്രതലം കുറച്ചൊന്നു് ഉള്ളിലേക്കു താണിരിക്കും. രസത്തിൽ മാത്രം ഈ തലം മധ്യോന്നതമായിരിക്കും. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ വായനക്കുറിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി പഥം ഈ തലത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുഴിഞ്ഞ അടിഭാഗത്തിലൂടെ ക്ഷേതിജ രേഖയായിപ്പോകണം. അപ്പോൾ അംശാങ്കിത ജാറിൽ നിന്നു വാറു വായിക്കുന്ന അക്കം കുറിച്ചെടുക്കണം. ഈ




ചിത്രം 1

അക്കമാണ് ഉപരിതലത്തെ കാണിക്കുക. രസമാണ് ദ്രാവകമായി

ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൃഷ്ടിപഥം ക്ഷേപിതമായിത്തീർന്നുവെങ്കിൽ, ഉയർന്നതലത്തെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജാറിൽ കാണുന്ന അക്കമാണ് എടുക്കേണ്ടത്.

ഇമ്മാതിരി പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ അളവുവെള്ളം എടുത്ത് ജാറിലെ വെള്ളം വൃത്തിയായ ബീക്കറിലേക്കു പകർന്നാൽ ബീക്കറിൽ നാം ഉദ്ദേശിച്ച അളവു വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കും.

ഈ ഉപകരണംകൊണ്ടു ചെറിയ ഘനവസ്തുക്കളുടെ ഘനമാനം കാണാം. ഘനവസ്തു ഒരു സ്ഫടികയടപ്പായിരിക്കട്ടെ. ഇതു ജാറിൽ കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം. ഒരു ചരടുകൊണ്ടു ഘനവസ്തു കെട്ടി ജാറിൽ താഴ്ത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വസ്തു ജാറിന്റെ ഭിത്തികളിൽ തട്ടി താഴ്വാൻ പ്രയാസപ്പെടരുത്. ആരംഭത്തിൽ ജാറിൽ ഒരു കൃത്യ അളവുവരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഉപരിതലം കുറിക്കുന്ന അക്കം കുറിച്ചെടുക്കുക. പിന്നീട് ഘനവസ്തു വെള്ളത്തിൽ പതുക്കെ താഴ്ത്തുക. ഘനവസ്തുവിൽ വായുക്കുണ്ടാകാൻ പറ്റിനിൽക്കരുത്. നിൽക്കുന്ന പക്ഷം അവയെല്ലാം നീക്കണം. പതുക്കെപ്പതുക്കെ ചരടിളക്കിയാൽ വായുക്കുണ്ടാകാൻ നിമിഷപ്പെടും. പിന്നീട്, ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനുള്ള ഉപരിതലം കുറിക്കുന്ന അക്കം കാണണം. ഈ രണ്ടു വായനക്കുറിച്ചുകൾക്കു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഘന വസ്തുവിന്റെ അളവു.



ചിത്രം 2

2. ബ്യൂററ്റ് (Burette)

ഘനയളവു കാണേണ്ടതിലേക്കു വേറൊരു ഉപകരണം


ഉണ്ട്. അതിനുബ്യൂററ്റ് (Burette) എന്നാണ് പേര്. അതിന്റെ രൂപമാണ് 2-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു C. C. അളവിന്റെ ഭിന്നാംശങ്ങൾ അളന്നെടുക്കാം. ഉദാഹരണമായി 20.5 c.c., 30.2 c.c. എന്നിത്തരം അളവുകൾ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

നീണ്ടതും നേരിയതും ആയ ഒരു കഴൽ ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കഴൽ കീഴ്ഭാഗത്തു വളരെ നേരിയതായി തീർന്നിരിക്കും. ഈ ഭാഗത്തോടു ഒരു ചെറുറബ്ബർ കഴൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതിനോടു നാസാഗ്രം തുറിച്ചു കാണുന്നതായ ഒരു ഗ്ലാസ് കഴൽ ചേർത്തിരിക്കും. റബ്ബർ കഴലിന്റെ ഉപരി ഒരു കഴലടപ്പ് (Stopcock) വെച്ചിരിക്കും. നേരിയ നീണ്ട കഴലിൽ അടിത്തട്ടിൽനിന്നു കുറേ മുകളിലായി അക്കങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. മേൽഭാഗത്തുള്ള തുറന്നമുഖത്തിന്റെ കുറേ ചോടെയാണ് '0' എന്ന അക്കം തുടങ്ങുക. '0'ത്തിനും '1' എന്നു അക്കത്തിനും ഇടയിലെ ദൂരം ഒരു ക്യു. സെ. (ഘനസെന്റീമീറ്ററുടെ ക്യൂബിക് സെന്റീമീറ്റർ എന്നു പറയും) ആകുന്നു. ഈ ഘനമാനത്തെ 10വിഭാഗങ്ങൾ ആയിഭാഗിച്ചിരിക്കും.

ഇതിൽ നിന്നു 15.3. c. c. (ഘ. സെ.) ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഒരു ഫണലി (Funnel) ലൂടെ തന്നെ ദ്രാവകം ബ്യൂററിൽ ഒഴിക്കുക. ഫണൽ നീക്കം ചെയ്യുക. കഴലടപ്പു തുറന്നു ഉൾക്കൊണ്ട നാസാഗ്രത്തിൽ കൂടി ദ്രാവകം ഒഴുകുവാൻ ഇടയാക്കിയാൽ റബ്ബർ കഴലിലും നാസാഗ്രത്തിലും ഉള്ള വായുക്കളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകും. പിന്നീടു അടപ്പമെത്തി ദ്രാവകം പുറമെ പോകുവാൻ ഇടയാക്കുക. 10 c. cm എന്ന അക്കം ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലം കാണിക്കുമ്പോൾ അടപ്പിന്മേലുള്ള കൈ വീടുക. നാസാഗ്രത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ദ്രാവകമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബീക്കർ വെക്കുക. 24.c.cm എന്ന

അക്കം ആകുന്നതുവരെ ദ്രാവകം ബീക്കറിലേക്കു ഇറങ്ങി വരട്ടെ. അതിനു ശേഷം തുള്ളി തുള്ളിയായി ദ്രാവകം വീഴട്ടെ. 25.2 c. c എന്ന അക്കം എത്തിയ ഉടനെ അടപ്പിന്മേലുള്ള അമർച്ച വിടുക. എന്നാൽ ബീക്കറിലേക്കു 15.2 c.c. ദ്രാവകമാണു പകർന്നിരിക്കുക.

3 പിപ്പറ്റ് (Pipette)—3ാം ചിത്രം നോക്കുക. അതു പിപ്പറ്റിന്റെതാണ്. നടുവിൽ വണ്ണമുള്ള ഒരു കഴലാണിത്. വണ്ണമുള്ള ഭാഗത്തു ഇതുകൊണ്ട് അളന്നെടുക്കാവുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ഘനമാനം കാണിച്ചിരിക്കും. കഴലിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു മുഖത്തിന്റെ കീഴിലായി ഒരു കുറി കാണാം. ഇതിന്റെ കീഴ്ഭാഗം കുറച്ച കൂർത്തിരിക്കും. ഗോളത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതോ അതിന്റെ പെരുക്കങ്ങളായവയോ ആയ ഘനമാനം ആണ് ഈ ഉപകരണംകൊണ്ടു അളക്കാവുന്ന അളവുകൾ.



ദ്രാവകമുള്ള ബീക്കറിനുള്ളിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ കൂർത്ത ഭാഗം താഴ്ത്തുക. മറ്റേ അറ്റത്തിലൂടെ ദ്രാവകം മേൽപ്പോട്ടു വലിച്ചെടുക്കുക. കഴലിലെ കുറി കവിഞ്ഞു ദ്രാവകം പൊന്തിയാൽ വലിക്കുന്നതു നിർത്തിക്കൊടുത്തു ഇടത്തെ തള്ളുവീരൽകൊണ്ടു ഉപകരണത്തിന്റെ മുഖം അടയ്ക്കുക. ബീക്കറിൽനിന്നു ഉപകരണം മേൽപ്പോട്ടെടുക്കുക. വലത്തെ കൈകൊണ്ടു ഗോളം പിടിച്ചു മുഖത്തിന്മേലുള്ള തള്ളുവീരൽ സ്ഥാനം വിടാതിരിക്ക ചിത്രം 3 ന്നുക്കുവണ്ണം തിരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദ്രാവകം തുള്ളിയായി വീണു തുടങ്ങും. എപ്പോഴാണോ ദ്രാവകതലം കുറിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ തള്ളുവീരൽ അമർത്തിപ്പിടിക്കണം. പിന്നീടു നാസാഗ്രത്തെ യാതൊന്നും ഉള്ളിലില്ലാത്ത ഒരു ബീക്കറിനുള്ളിൽ ആക്കണം. പിന്നീടു തള്ളുവീരൽ ഉയർത്തിയാൽ ദ്രാവകം ബീക്കറിലേക്കു വീഴും. ദ്രാവകം മുഴുവനും വീണതിനുശേഷം നാസാഗ്രംകൊണ്ടു ബീക്കറിന്റെ ഭിത്തി

യെ തൊടിയിച്ചു ഉപകരണം നീക്കണം. ഇപ്പോൾ ബീക്കറിൽ പിപ്പറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അളവുള്ള ദ്രാവകം ഉണ്ടായിരിക്കും.

4 ഔൺസ് ഗ്ലാസ് (Ounce glass) :- രോഗികൾക്കു ദ്രാവകങ്ങളായ മരുന്നു അളന്നു സേവിക്കുവാൻ കൊടുക്കേണ്ടതിലേക്കു് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചെറിയ ഒരു ടംബുളിന്റെ ആകൃതി ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും. ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1 എന്നീ അക്കങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതു് ounce അളവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇതു വാസ്തവത്തിൽ ചെറിയൊരു അംശാങ്കിതജാർ ആണു്.

അദ്ധ്യായം 3

• —ബലം—

ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം:—


നിലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കല്പുരു ഉരുട്ടുക. വലിയ പ്രയാസം തോന്നുകയില്ല. നേരെ മറിച്ചു, അതു ഉയർത്തി നോക്കുക. ഘനം തോന്നും. പദാർത്ഥം ഒന്നാണെങ്കിലും ഇത്തരം അനുഭവത്തിന്നു കാരണമെന്തു്?

ഭൂമിക്കു എതിരായി പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ഭാരമധികം തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിക്കു സമാന്തരമായി നീക്കുമ്പോൾ അതനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ഈ സംഗതിക്കു കാരണം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണമാണു്.

ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സേർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ശക്തിയാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിനു അതിന്റെ ഘനം നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി.

ഈ ആകർഷണ ശക്തിയാൽ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയുടെ നടുവിലേക്കു പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു.

ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘനം എന്നത് ഒരു ബലം (force) ആണ്. ബലം പ്രയോഗിച്ച് പലതരം പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാം. അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു വസ്തുവെ അനങ്ങുവാൻ സംഗതി വരുത്തുന്നതും അനങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവെ ചേഷ്ടയില്ലാതാക്കുന്നതും ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതി, ചലനവേഗം (velocity) എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും ബലം ആണ്. ഒരു ബലത്തെ ഒരു രേഖകൊണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം.



A B എന്ന രേഖ ഒരു ബലത്തെ കുറിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു വിശദമാക്കാം. ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു സംഗതികൾ പൂർത്തിയാകണം. അവ (1) ബലം പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാനം, (2) ബലത്തിന്റെ പരിമാണം, (3) ബലത്തിന്റെ ഗതി കാണിക്കുന്ന ദിശ (direction)—എന്നിവയാണ്. ഓരോ രേഖയിലും ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട്. A എന്ന സ്ഥാനം രേഖയുടെ ആരംഭ സ്ഥാനമാണല്ലോ; അതു പ്രേരിത സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കും. A B എന്ന നീളം രേഖയുടെ അളവു കുറിക്കുന്നു; അതായത് രേഖയുടെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ട്; അതു ബലത്തിനും വേണ്ടമല്ലോ. A B എന്ന രേഖയുടെ ബലത്തിനുള്ളപ്പോലെ ഒരു ദിശയുണ്ട്; ഈ ദിശയെ രേഖയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരാശരി (arrow head) കൊണ്ടാണ്.

ബലത്തിന്റെ പരിമാണം രേഖയിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ബലത്തിന്റെ പരിമാണം 500 ഗ്രാം തൂക്കം എന്നിരിക്കട്ടെ. 100 ഗ്രാമിനു ഒരു ഇഞ്ചു എന്ന തോതെടുക്കുക. അപ്പോൾ 5 ഇഞ്ചു 500 ഗ്രാമിനെ കുറിക്കുമല്ലോ.


ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ പല ബലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിതന്നെ ഒരു ബലം ചെയ്യും. ഈ ഏകബലത്തെ പരിണാമബലം (resultant force) എന്നു പറയും. ഈ ഏകബലത്തിന്നു ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്. ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഏക ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മറ്റു ബലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫലംതന്നെയാണു് ഉണ്ടാവുക. ഈ സ്ഥാനത്തെയാണു് ഭാരകഷ്ണ കേന്ദ്രം (centre of gravity) എന്നു പറയുക.

ബലത്തെപ്പറ്റി വേറൊരു വിഷയം കൂടി അറിയണം. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബലങ്ങളുടെ പരിമാണങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായിരിക്കും പരിണാമ ബലത്തിന്റെ പരിമാണം. ഈ ബലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഏക ബലം ഉണ്ടു്. അതിന്നു് സമതുലിത ബലം എന്നാണു് പറയാറു്. ഇതിന്റെ പരിമാണം പരിണാമബലത്തിന്നു തുല്യമായിരിക്കും; പക്ഷേ ഇതിന്റെ ദിശ പരിണാമബലത്തിന്റേതിന്നു വിപരീതമായിരിക്കും.

ഭാരകഷ്ണ കേന്ദ്രം എന്തെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതിന്റെ നിർവചനം താഴെ ചേർക്കുന്നു. ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ തൂക്കം ഏതു സ്ഥാനത്തു കേന്ദ്രീഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കരുതാമോ അതാണു് ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭാരകഷ്ണകേന്ദ്രം.

ഈ ബീന്ദു കാണുവാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിവിവരിക്കാം. പദാർത്ഥം നേരിയ തകിടാണെന്നു വിചാരിക്കുക.

തകിടിനെ മേ
ശയുടെ ഒരു വക്ക
ത്തു വെക്കുക. കൂ
മേണ കുറേയ്ക്കയാ
യി തകിടിനെ വ
ക്കിൽനിന്നു വീട്ടി
നീക്കുക. ഒരു സ്ഥ
ലത്തെത്തുമ്പോൾ
തകിട് മറിഞ്ഞുവീ
ഴുവാൻ ആരംഭി



ചിത്രം 4

യ്ക്കും. ആ സ്ഥാനം കുറിക്കുവാൻ തകിടിൽ വക്കിൽക്കൂടി A B എ
ന്ന രേഖ വരക്കുക തകിടിനെ വേറൊരു മട്ടിൽ ആക്കി വക്കിന്റെ
അടുക്കെ വെച്ചു മുൻ വീവരിച്ച പരിശ്രമം ആവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ
കിട്ടുന്ന രേഖ C. D ആകട്ടെ. ഈ രണ്ടു രേഖകളും തമ്മിൽ
മുറിയുന്ന ബീന്ദു G ആകട്ടെ. എന്നാൽ G എന്ന ബീന്ദു തകി
ടിന്റെ ഭാരകക്ഷണ കേന്ദ്രം ആണ് (ചിത്രം 4 നോക്കുക.)

അദ്ധ്യായം 4

ബലം (തുടർച്ച)

സ്ഥിരത (Stability):—

സാധനങ്ങളെ രണ്ടു വിധത്തിലാണു വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
ഒന്നാമതായി അതിനെ കെട്ടിത്തൂക്കും; രണ്ടാമതായി അതിനെ ഒരു
താങ്ങിന്മേൽ വെക്കും.

കെട്ടിത്തക്കുമ്പോൾ സാധനത്തിനു സ്ഥിരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതു ഏതു വിധത്തിലാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

കെട്ടിത്തക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനു് ചോട്ടിലാണു് പോകുവ്വം എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സാധനം ഇളക്കിയാലും ചെരിച്ചാലും അതു വേഗം പഴയ സ്ഥാനം പ്രാപിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ സാധനം സ്ഥിരസമതുലനം (stable equilibrium) വസ്ഥയിൽ ആണു്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ സ്ഥിരത അധികമാവാൻ അവലംബന ബീദുവിൽ നിന്നു പോകുവ്വന്ന കേന്ദ്രം താണു വരണം.

കെട്ടിത്തക്കുമ്പോൾ പോകുവ്വന്ന കേന്ദ്രം മുകളിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ. കുറച്ചൊന്നു ചെരിച്ചാൽ സാധനം സ്ഥാനംതെറ്റി മറിയുന്നു. അതു കെട്ടിത്തക്കിട്ടുള്ളതു് അസ്ഥിരാവസ്ഥയിലാണു്. ഈ അവസ്ഥയിൽ പോകുവ്വന്ന കേന്ദ്രം അവലംബന സ്ഥാനത്തിനു മീതെയായിരിക്കും. അവലംബനത്തിൽനിന്നു സ്ഥാനം നീങ്ങുന്നോറും അസ്ഥിരത വർദ്ധിച്ചുവരും.

കെട്ടിത്തക്കുന്ന സമാനവും പോകുവ്വന്ന കേന്ദ്രവും ഒന്നായിത്തീരുമ്പോൾ സാധനം ചെരിച്ചാലും മറിയുകയില്ല. അതു നിശ്ചിത സമാനത്തു നിലച്ചു നിൽക്കും. ഈ അവസ്ഥക്കു ഉദാസസമതുലനം (Neutral equilibrium) എന്നാണു് പേർ.

സാധനത്തെ താങ്ങിനേൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥകളുടെ സമ്പ്രദായത്തെ പരാമർശിക്കാം.

പോകുവ്വന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബരേഖ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പാദ (base)ത്തിന്നകത്തു വീണാൽ സാധനം സ്ഥിരാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കും.

ഈ ലംബരേഖ പാദത്തിനു പുറമെ വീണാൽ അതു അസമീരാവസമയിലാണ്. അതായതു ചെറു അനക്കം തട്ടിയാൽ സാധനം നിലം പതിക്കും.

ചോകുഷ്ണ കേന്ദ്രവും താങ്ങുന്ന സമാനവും ഒരിടത്തിലായാൽ സാധനം ഉദാസീനാവസ്ഥയിലാണ്.

ഭാരം നിറച്ച ഒരു വണ്ടിയിൽ ചോകുഷ്ണകേന്ദ്രം പാദത്തിനു പരിയാണ. ഈ വണ്ടി സമനിരപ്പല്ലാത്ത പാതയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ചോകുഷ്ണകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബരേഖ പാദത്തിനു പുറമെ വീഴാൻ ഇട വേണേക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി മറിയും. വളരെ ക്രൂന്ധരമായി ഭാരം കയറ്റിയാൽ മറിയുന്നതു എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കും. വൈക്കോൽ നിറച്ച വണ്ടി ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക. ഇവിടെ ചോകുഷ്ണ കേന്ദ്രം പാദത്തിൽനിന്നു എത്രയോ ഉയർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അസ്ഥിരത വർദ്ധിക്കും. അതായതു ചെരിവുള്ള പാതയിൽ കൂടി വണ്ടി പോകുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ലംബരേഖ പാദത്തിനു പുറമെ വീണേക്കാം. തന്മൂലം വണ്ടി മറിയുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ കല്ലാണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളതു എന്നു വിചാരിക്കുക. ഈ വണ്ടി വൈക്കോൽ നിറച്ച വണ്ടിയെപ്പോലെ അതു എളുപ്പത്തിൽ മറിയുന്നതല്ല. ഇതിലെ ചോകുഷ്ണ കേന്ദ്രം വൈക്കോൽ നിറച്ച വണ്ടിയിലെ കേന്ദ്രത്തേക്കാൾ താണിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടു മറിയുന്നതു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കയില്ല.

അദ്ധ്യായം 5

ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ

ഉത്തോലകം (lever) അല്ലെങ്കിൽ ലീവർ:—


താമ്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ മൂന്നു വകയായി തിരിക്കാം. ഈ വക യന്ത്രങ്ങളെ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. അവ (1) ഉത്തോലകം അഥവാ ലീവർ (2) ചക്രം (pulley) (3) പ്രവണതലം (inclined plane) എന്നിവയാണ്.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ലീവർ എന്ന ലഘുയന്ത്രത്തെപ്പറ്റി ചില സംഗതികൾ പഠിക്കാം.

ലീവർ എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഒരു ആലംബ (Fulerum) ത്തിന്നു ചുറ്റും തിരിയുന്ന ഒരു ദണ്ഡു (rod)—കോൽ—ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ സഹായത്താൽ ഒരു ശക്തി ഒരു ഭാരത്തെ ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യും.

ലീവർ മൂന്നു തരമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തരം ലീവറിന്റെ ആധാരം ഭാരത്തിനും ശക്തിക്കും ഇടയിലാണ് (ചിത്രം 5(a) നോക്കുക.) ഇതരം ലീവറിന്നു തുല്യാസ കൃതിക എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ തരം ലീവറിൻ ഭാരം, ശക്തിക്കും ആധാരത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും. (ചിത്രം 5 b നോക്കുക.) അടക്കം അതി,



ചിത്രം 5 a. b.

കൈവണ്ടി, റിക്ഷ, തോണിയിൽ തണ്ടു വലിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുഴ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. (ചിത്രം 6 നോക്കുക.)

മൂന്നാമത്തെതരം ലീവറിൽ ആധാരം ഒരറ്റത്തും ഭാരം മറേയറ്റത്തും ശക്തി ഇടയിലും ആയിരിക്കും. ചവണ ഈ വകുപ്പിൽ പെട്ടതാണ്. തട്ടാമ്പാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊടിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കീഴ്ക്കൈത്തണ്ട എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.



ചിത്രം 6

അദ്ധ്യായം 6

ലീവർ (തുടർച്ച)

യന്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ യാന്ത്രികലാഭം (mechanical advantage) എന്നൊരു സംജ്ഞ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു തുകയാണ്. $\frac{\text{ഭാരം}}{\text{ശക്തി}}$ എന്നബന്ധത്തേയാണ് അതു കുറിക്കുന്നത്. $\frac{\text{ഭാരം}}{\text{ശക്തി}} = \frac{\text{ശക്തിദൂരം}}{\text{ഭാരദൂരം}}$ എന്നും തെളിയിക്കാവുന്നതാണ്. ആധാരത്തിനും ശക്തിക്കും ഇടയിലെ ലംബദൂരത്തെ ശക്തി ദൂരം എന്നും ആധാരത്തിനും ഭാരത്തിനും ഇടയിലെ ലംബദൂരത്തെ ഭാരദൂരം എന്നും പറയുന്നു.

രണ്ടാംതരം ലീവറിൽ യാന്ത്രികലാഭം എപ്പോഴും ഒന്നിലധികവും മൂന്നാംതരത്തിൽ ഇതു എപ്പോഴും ഒന്നിൽ ചുരുങ്ങിയും ഇരിക്കും.

ഒന്നാംതരത്തിൽ യാന്ത്രികലാഭം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികവും മറവസരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ചുരുങ്ങിയും ഇരിക്കും. ഈ സംഗതി ശക്തി ഭൂജത്തിന്റെ നീളത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഭാരത്തേക്കാൾ ശക്തി ആധാരത്തിന്റെ അടുക്കെയോകുമ്പോൾ ശക്തിഭൂജം ഭാരഭൂജത്തേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ യാന്ത്രിക ലാഭം ഒന്നിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും.

യാന്ത്രികലാഭം ഒന്നിലധികമായാൽ ശക്തിയേക്കാൾ ഭാരം അധികമാണ്. അതായതു വലിയൊരു ഭാരത്തെ ചെറിയൊരു ശക്തികൊണ്ടു നീക്കാം. ഇത്തരം പ്രവൃത്തി പടുപണി ആവാ നെ നിവൃത്തിയുള്ളു. നേരെ മറിച്ചു, യാന്ത്രി കലാഭം ഒന്നിൽ ചുരുങ്ങിയാൽ അപ്പോഴത്തെ പണി മിനുസപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കും. ഉദാഹര ണമായി, റെയിൽവെ ആപ്പീസുകളിൽ പാർ സൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന



ചിത്രം 7

കൈവണ്ടി (wheelbarrel) എടുക്കുക. (ചിത്രം 7) ഇതിൽ വ ലിയ ഭാരം അട്ടിയിടുന്നു. ഇതിനെ ഒരൊരു ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇതു മിനുസപ്പെട്ടി അല്ല. ഇവിടെ ശക്തിഭൂജം, ഭാരഭൂജത്തേക്കാൾ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധ്യമാകുന്നത്. തീപ്പെറ്റി എടുക്കുന്നത്, സൂക്ഷിച്ചു വേണം; ഇതു മിനുസപ്പെട്ടി ആണ്. ഇതി ന്നു കൊടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഉപകരണത്തിൽ ശക്തിഭൂജം ഭാരഭൂജത്തേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും.


×———×

തുലാസ്സ് എന്ന ഉപകരണം ഒന്നാംതരത്തിൽപെട്ട ഒരു ലീവറാണ്. ഇതിൽ ആധാരം ഭാരത്തിനും ശക്തിക്കും നടുവിലാണ് ആയതിനാൽ ശക്തിഭൂജം ഭാരഭൂജത്തിനു തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഭാരം = ശക്തി ആയിത്തീരുന്നു. ഒരു പദാന്തത്തിന്റെ ശരിയായ തൂക്കം ഈ ഉപകരണംകൊണ്ടു കാണാം.

പീടികകളിൽ സാമാനം തൂക്കി വിൽക്കാൻ തുലാസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പദാന്തം ഒരു പിടി അധികമായാൽ യാതൊരു വൈഷമ്യവുമില്ല. ആയതിനാൽ ഇതിലെ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വസ്ത്രി തൂക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം. തട്ടാന്റെ തുലാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആധാരത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സൂചിയുടെ നീളം അധികമാണ്. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ കാണുന്ന തൂക്കങ്ങളുടെ കൃത്യതയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫലം ഇരിക്കുക. ആയതിനാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുലാസ്സ് സംസ്കരിച്ചതായിരിക്കണം. അത്തരം ഒരു തുലാസ്സ് താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ചിത്രം നോക്കി ഭാഗങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക. (ചിത്രം 8) ഇതിൽ B എന്നു കമിട്ടതു തുലാഭണ്ഡം ആകുന്നു. ഭണ്ഡിനു നിശ്ചിതമായ തിരിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആധാരം ഭണ്ഡിന്റെ നടുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കത്തിവായ (knife-edge) ആകുന്നു. ഈ കത്തിവായയുടെ പാദം മേല്പോട്ടാണ്. ഇതിന്റെ വായ, ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും ആയ ഒരു വടിയുടെ ഉപരി നിൽക്കുന്നു. ഈ വടി ഒരു പൊള്ളയായ സ്തംഭ (pillar)ത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നതു H എന്ന

അറസ്റ്റ്മെന്റ് (Arrestment) അതായത് നിർത്തിപ്പിടിയാക്കുന്നു. സ്കെയിലിൽ ഒരു പലകയുടെ നടുവിലാണ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പലകയുടെ ചോട്ടിൽ L എന്ന പിരിയാണികൾ കാണാം. ഇവയെ



ചിത്രം 8

തിരിച്ച പലകയെ ക്ഷൈതജത്തിൽ ആക്കാം. അങ്ങിനെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നുവോ എന്നറിയാൻ സ്കെയിലിന്റെ അടുക്കെ തൂക്കി ടുള്ള കുമ്പ (Plumbline)യിലെ ചരട്ട, സ്കെയിലിന്റെ അടിയിലുള്ള വളയത്തിന്റെ നടുവിലാണോ എന്നു നോക്കണം. ചില തുലാസുകളിൽ വളയത്തിനു പകരം മേല്പോട്ട തുറിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരാണിയുണ്ടാകും. കുമ്പയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലോഹത്തിന്റെ അഗ്രം ഈ ആണിയുടെ അഗ്രത്തിന്നു നേരെ ആണോ എന്നു നോക്കിയാലും മതി. തുലാഭണ്ഡിന്റെ നടുവിൽനിന്നു കീഴോട്ടു ഒരു നീളമുള്ള സൂചി ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അഗ്രം ഒരു സ്റ്റെയിലിന്റേൽ തട്ടാതെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ള H എന്ന പിടിയമർത്തിയാൽ ആടുന്നതാണ്. Hനെ ഇടത്തു ഭാഗത്തു തിരിച്ചു

വെച്ചാൽ സൂചി ആടുകയില്ല. ആധാരത്തിൽനിന്നു കുറച്ചുകലെ ഇരുഭാഗത്തും കൊക്കികൾ കാണാവുന്നതാണ്. ആധാരത്തിൽനിന്നു കൊക്കികൾക്കുള്ള ദൂരം തൃലാമാണ്. ഈ കൊക്കികളിൽനിന്നു G എന്ന തട്ടുകൾ തുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇവയുടെ തുക്കം സമമായിരിക്കും. H എന്ന പിടി പൊന്തിച്ചാൽ സ്തംഭത്തിലെ വടി ഉയരും. അതോടൊപ്പം തട്ടും ആടും. തട്ടുകളിൽ തുക്കമില്ലാത്തപ്പോൾ സ്തംഭകയീലിലെ ഇരു ഭാഗത്തേക്കും നടുവിൽനിന്നു സൂചി കൃത്യമായി ആടിത്തുടങ്ങണം. ഇതൊരുവിധം ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ തൃലാ ബ്ലോക്കുകളുടെ ഇരുഅറ്റങ്ങളിലും വട്ടംപിരിയും ഏല്പാട് ഉണ്ടു്. അവയെ പാകംപോലെ തിരിച്ചു സൂചി ആടുവാൻ ഇടയാക്കാം.

അദ്ധ്യായം 8

തൃലാസ്സം (തടച്ചു)

മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച തൃലാസിലെ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇതിലെ സൂചി നീളമുള്ളതായിരിക്കണം. ബ്ലോക്കു ആടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനാണ് ഇതിനിത്ര നീളമുള്ളതു്. ബ്ലോക്കു ആടി സ്തംഭിരാവസ്ഥയെ വേഗം പ്രാപിച്ചാൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ചലനം പരിശോധിക്കാവുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു, ഉപകരണത്തിന്റെ ചോക്യങ്ങളേകൂടും ആധാരത്തിന്റെ അടുക്കെയായിരിക്കണം.

ക്ഷണത്തിൽ സ്തംഭിരാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല, പക്ഷേ, ഈ സംഗതിയിൽ മനസ്സിന്റേതി തൃലാസു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു അസൗകര്യം ഉണ്ടാകും. തൃലാസു മറിഞ്ഞു വീഴാൻ നോക്കും. തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും

തുലാസു മറിയുന്നതായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ഇതിന്റെ നിവാരണത്തിന്നു ഭണ്ഡിന്നു കട്ടി കൂട്ടണം. വല്ലാതെ കട്ടി കൂടിയാൽ തുലാസുകൊണ്ടു് ഉപയോഗമില്ലാതെ വരും. ആവശ്യത്തെ മുൻ നിർത്തി, ഈ രണ്ടു വീചരീത നിബന്ധനകളേയും ഇണക്കി തുലാസു കര ഉണ്ടാക്കണം. കട്ടി കൂടാതിരിക്കുവാനാണു് ഭണ്ഡിൽ അവിടവിടെയായി തുറന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതു്.

മൂന്നാമത്തൊരു വിഷയം കൂടി തുലാസിൽ കാർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതു കള്ളത്തുലാസാകാതെയിരിക്കണം. അതിന്നു കൃത്യത വേണം. ഇതിന്നു തുലാസിന്റെ ഭൂഷങ്ങൾ സമമായിരിക്കുകയും തട്ടിന്റെ തൂക്കങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കുകയും വേണം.

സംഗ്രഹം: ഒരു നല്ല തുലാസ്സിന്നു വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ—

- 1: സൂക്ഷ്മ ഗ്രഹണശക്തി (Sensibility)
2. സ്ഥിരത (Stability)
3. കൃത്യത (Accuracy)

ഇവയിൽ ഒന്നും രണ്ടും വീചരീതഗുണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഏതിന്നാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നതു് ആവശ്യത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. വളരെ ചെറിയ ഭാരങ്ങൾ തൂക്കിക്കാണാൻ ആദ്യത്തെ നിബന്ധനക്കു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടു്. അതിന്നുള്ള തുലാസുകളിൽ സ്ഥിരത വിലവെക്കാറില്ല. മറിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ തുലാഭണ്ഡിന്റെ ചോട്ടിലായി സ്കൂന്തത്തിൽനിന്നു ഇരുഭാഗത്തേക്കും പുറപ്പെട്ടുന്ന താങ്ങുകൾ ഉണ്ടു്. (ചിത്രത്തിൽ സ്കൂന്തത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിലായി ഇവയെ കാണാം.)


തുലാസിലെ കാറോ കൊക്കിയിലും ഇതരണ്ടു കൊള്ളുതുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ കൊള്ളുത്തിൽനിന്നാണ് തട്ടു തൂക്കീട്ടുള്ളതു്. തട്ടിൽ പദാത്ഥം വെക്കാതെ തൂക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൊക്കിയിൽ നിന്നാണ് പദാത്ഥം കെട്ടി

തുലാസ്

യിടാൻ. ഉദാഹരണമായി, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ തൂക്കം വെള്ളത്തിൽ എത്രയെന്നു കാണുന്നമെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽനിന്നു കെട്ടിത്തൂക്കേണ്ടതു് (ചിത്രം 9 നോക്കുക) രട്ടിമ്പിനെ തുലാസു തൊടാതെ ഒരു പീഠം വെക്കണം. അതിന്മേൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു ബീക്കർ വെച്ചു പദാർത്ഥത്തെ രണ്ടാമത്തെ കൊക്കിയിൽനിന്നു പറയുകൊണ്ടു തൂക്കി വെള്ളത്തിൽ ആഴ്ത്തി നിത്തുക.

തുലാസിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ തൂക്കുവാൻ തൂക്കപ്പെട്ടി-വേണം പെട്ടിയിൽ തൂക്കക്കട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. ഇവ ഗ്രാം തൂക്കങ്ങൾ ആണു കാണിക്കുക. വലിയ തൂക്കക്കട്ടികളുടെ അടുക്കെയായി ഗ്രാസുമുടിയുള്ള കള്ളികളിൽ മില്ലിഗ്രാം തൂക്കങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കും.

ഗ്രാമിനും മില്ലിഗ്രാമിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.



ചിത്രം 9

$$10 \text{ മില്ലിഗ്രാം (മി. ഗ്ര)} = 1 \text{ സെന്ററി ഗ്രാം} \quad (\text{സെ. ഗ്രാം.})$$

$$10 \text{ സെ. ഗ്രാം} = 1 \text{ ഡെസിഗ്രാം} \quad (\text{ഡെ. ഗ്രാം.})$$

$$10 \text{ ഡെ. ഗ്രാം} = 1 \text{ ഗ്രാം}$$

$$1000 \text{ ഗ്രാം} = 1 \text{ കിലോഗ്രാം}$$

(കി. ഗ്രാം)

പെട്ടിയിലെ തൂക്കക്കട്ടികൾ താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നവയാണ്.

അവ:—

തൂക്കം	എണ്ണം	ആകൃതി
1 മി ഗ്രാം	ഒരേണ്ണം	ത്രികോണം
2 മി ഗ്രാം	രണ്ടേണ്ണം	ചതുരം
5 മി ഗ്രാം	ഒരേണ്ണം	ഷഡ്കോണം
10 മി ഗ്രാം	ഒരേണ്ണം	ത്രികോണം
20 മി ഗ്രാം	രണ്ടേണ്ണം	ചതുരം
50 മി ഗ്രാം	ഒരേണ്ണം	ഷഡ്കോണം.
100 മി ഗ്രാം	ഒരേണ്ണം	ത്രികോണം
200 മി ഗ്രാം	രണ്ടേണ്ണം	ചതുരം
500 മി ഗ്രാം	ഒരേണ്ണം	ഷഡ്കോണം

മില്ലിഗ്രാം തൂക്കക്കട്ടികൾക്കു പുറമെ ഗ്രാം തൂക്കക്കട്ടികൾ ഉണ്ടു്. അവയിൽ 1 ഗ്രാം, 10 ഗ്രാം, 100 ഗ്രാം, 1000ഗ്രാം എന്നിവ ഭാരോന്നം ഒരേണ്ണവും 2 ഗ്രാം 20 ഗ്രാം 2000ഗ്രാം എന്നിവ രണ്ടേണ്ണവും 5 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം, 500 ഗ്രാം എന്നിവ രണ്ടേണ്ണവും ആയിരിക്കും.

തൂക്കക്കട്ടികളെ കൈകൊണ്ടു് പെരുമാറരുതു്. അവയെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പെട്ടിയിൽ ഒരു ചവണ ഉണ്ടായിരിക്കും.

മില്ലിഗ്രാം തൂക്കക്കട്ടികൾ അലുമിനിയം കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. ആയതിനാൽ അവയിൽ 'കറ'വേഗം കട്ടുകയീല്ല. ഗ്ലാസുമുടിയുള്ളതിനാൽ പെട്ടിയിൽ നിന്നു വീണു നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയില്ല.

തലാസ്സ് (തുടർച്ച)

പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തൂക്കം കാണുവാൻ തലാസ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില സംഗതികളിൽ മനസ്സിരുത്തണം.

അവ—

- 1 സ്കംഭം കുത്തനെയായിരിക്കണം; ഇതിനു പലകയുടെ അടിയിലുള്ള പിരിയാണികൾ തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- 2 തൂക്കുവാൻ ഉള്ള പദാർത്ഥം ഇടത്തെ തട്ടിലും തൂക്കുകൾ വലത്തേതട്ടിലും ആണു വെക്കേണ്ടതു്.
- 3 തൂക്കപ്പെട്ടി വലത്തു ഭാഗത്താണ് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതു്.
- 4 തൂക്കുകൾ വലത്തു ഭാഗത്താണ് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതു്.
- 5 വായനക്കുറിപ്പുകൾ കുറിച്ചെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ പിടി ഉയർത്തി വലത്തോട്ടു തിരിച്ചു വെക്കാവൂ. മററവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പടി ഇടത്തായിരിക്കണം.
- 6 തലാസ്സിനുള്ള ഗ്ലാസറുടെ മുൻഭാഗം വായനക്കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കേണ്ടതു്.
- 7 തലാസ്സിലെ സൂചി സ്ക്രെയിലിന്റെ മുമ്പിൽ ആടുവാൻ പാകത്തിൽ വട്ടം പിരിയ്ക്കും തിരിച്ചു് ശരിപ്പെടുത്തണം.
- 8 മുട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ തലാസ്സിൽ തൂക്കുവാൻ പാടില്ല.
- 9 തൂക്കുകൾ കഴിവുള്ളതോളം തട്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്.
- 10 ഉപയോഗിച്ച തൂക്കുകൾക്കു മുമ്പെ തൂക്ക കാണുവാൻ പെട്ടയിലെ ഒഴിഞ്ഞ കള്ളികൾ നോക്കി തൂക്കം കുറിച്ചെടുത്തു് ആകെ തൂക്കം കാണേണ്ടതാണ്.

11 പദാർത്ഥത്തിന്റെ തൂക്കം കണ്ടതിനുശേഷം തൂക്കപ്പെട്ട കര സ്മാനത്തിൽതന്നെ പെട്ടിയിൽ വെക്കുന്നു.

12 സൂചി പാകത്തിൽ ആടുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനുശേഷം പദാർത്ഥത്തിന്റെ തൂക്കം കാണുന്നതുവരെ വട്ടം ചിരിയും വീണ്ടും തിരിക്കരുത്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം തുലാസിനുള്ള ഗ്ലാസറയുടെ മുൻവശത്തെ മൂടി അടയ്ക്കുവാൻ മറക്കരുത്.

തുലാസിൽ പൊടിയോ മറ്റോ തട്ടരുത്. ജൂതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കറ തട്ടാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിനു ഒരു ജാഗ്രത എടുക്കാറുണ്ട്. ഗ്ലാസറയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ചെറിയൊരു ബീക്കറിലായി സരപ്പുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ അമ്ലം വായുവിലെ നീരാവിയെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ തുലാസിൽ കറ തട്ടുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 10

തുലാസു (തുടർച്ച)

തുലാസു ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാധനത്തിന്റെ തൂക്കം കാണുവാനുള്ള മാറ്റം ചുരുക്കി വിവരിക്കാം.

ഒന്നാമതായി, തുലാസിൽ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആടുന്ന സൂചി വന്നു നിൽക്കുവുന്ന സ്മാനം ആദ്യത്തിൽ കാണണം. ഈ സ്ഥാനത്തിന്നു 'ശൂന്യബിന്ദു' (zero point) എന്നു പേർ.

നല്ലൊരു തുലാസിൽ, സൂചി ആടുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ വേഗത്തിൽ വിരാമസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഈ സ്മാനം കണ്ടുകൂട്ടി കാണേണ്ടതാണ്.

സംഭരണിന്മേലുള്ള സ്തേയിലിൽ നിന്നു, സൂചി എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടത്തെ സ്തംഭനവും അടുത്ത വലത്തെ സ്തംഭനവും പിന്നയുള്ള ഇടത്തെ സ്തംഭനവും കുറിച്ചെടുത്തു താഴെ കാണിച്ചപ്രകാരം പട്ടികയിൽ ചേർക്കുക.

	ഇടം	വലം		ഇടം	വലം
				2	16
				4	
ശരാശരി			ശ. ശ.	3	16
ശരാശരി			ശ. ശ.		
കുളിടെ			കുളിടെ		9.5
ശരാശരി			ശ. ശ.		

വലത്തെപ്പട്ടികയിൽ ഏതോ ഒരു പരിശുദ്ധഫലമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണക്കു കൂട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം വ്യക്തമാക്കുവാൻ തുകകൾ സഹായിക്കുമല്ലോ.

ഇമ്മാതിരി കാണുന്ന ശരാശരികളുടെ തുക, ഭാരമില്ലാത്ത പ്പോൾ തുലാസു തരുന്ന ശൂന്യബിന്ദുവാണ്. ഒരു അവലംബന ബിന്ദുവിൽനിന്നു കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുള്ള ലോലകം ആട്ടമ്പേരേ വിരാമസ്തംഭനത്തിൽനിന്നു ഇരുഭാഗത്തും സമമായ ദൂരം നീങ്ങും എന്ന സംഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗണനരീതി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇതിന്നുശേഷം ഇടത്തെത്തട്ടിൽ സാധനം വെച്ച് വലത്തെത്തട്ടിൽ തൂക്കുകെട്ടികൾ ചേർത്തു പിടി വലത്തോട്ടു തിരിച്ച സൂചി


സ്ക്വെയിലിന്റെ മുമ്പാകെ ക്രമമായ മട്ടിൽ ആടുന്നുവോ എന്നു നോക്കുക. സൂചി ഇടത്തോട്ടായികേ പോകുന്നതായാൽ വലത്തെ തട്ടിൽ തൂക്കക്കട്ടികൾ അധികമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. പിടി ഇടത്തോട്ടു കൊണ്ടുവന്നു തൂക്കക്കട്ടികൾ ചുരുക്കി വീണ്ടും പരിശ്രമമാവത്തിക്കക. ഇങ്ങിനെ ചുരുക്കി സ്ക്വെയിലിന്റെ മുമ്പാകെ സൂചി ആടുവാൻ ഇടയാക്കുക.

തൂക്കക്കട്ടികൾ ചേക്കുന്നതും ചുരുക്കുന്നതും പിടി ഇടത്തുഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ. സൂചി ആടുന്ന മട്ടു നോക്കുവാൻ പിടി വലത്തോട്ടാക്കണം.

ഇങ്ങിനെ ചെയ്തുകിന്നശേഷം സൂചി കാണിക്കാവുന്ന വിരാമ ബിന്ദു കാണുക. ഇതിന്നു, ശൂന്യബിന്ദു കണ്ടുവാൻ പ്രയോഗിച്ച മാർഗ്ഗംതന്നെയാണു അനുസരിക്കേണ്ടതു്. ഉദാഹരണമായി, 'വിരമ ബിന്ദു'വിനുള്ള തുക '9' എന്നാകട്ടെ.

ഇടത്തെത്തട്ടും വലത്തെത്തട്ടും സമമായ ഭാരം കാണിക്കുമ്പോൾ വിരമബിന്ദു 9.5 ആയിരിക്കണം. ചിത്രം നോക്കുക (ചിത്രം 10)

ഇവിടെ A B എന്നതു് തട്ടുകളിൽ തുല്യഭാരമുള്ളപ്പോൾ ഭണ്ഡിനുള്ള അവസ്ഥയാണു കാണിക്കുന്നതു. സൂചി A B ക്ക് ലംബമായിരിക്കും. അതു് കാണിക്കുന്ന, വിരമബിന്ദു 9.5 ആണെന്നു ഞല്ലോ നാം വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഭാരങ്ങൾ തട്ടിൽ ചേർത്തതിന്നു ശേഷമുള്ള ഭണ്ഡിന്റെ അവസ്ഥ CD ആണു. സൂചി '9' എന്ന ബിന്ദുവിലാണല്ലോ വിരമിക്കേണ്ടതു്. അതായതു സൂചി ഇവിടെ ഇടത്തോട്ടു നീങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. അതിന്നു ലംബമായിരിക്കണം C D എന്ന ഭണ്ഡു. ചുരുക്കിപ്പറയുമ്പോൾ, ഭണ്ഡിന്റെ വലത്തെ ഭുജം താണിരിക്കുന്നതിനാൽ തൂക്കക്കട്ടികൾ അധികമാണു്.



സാധനത്തിന്റെ തൂക്കം സെന്റിഗ്രാംവരെ കൃത്യമാകുന്ന മെങ്കിൽ 10 മി. ഗ്രാം കണ്ടു വലത്തെ തട്ടിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴുള്ള വിരമ ബിന്ദു 10.3 എന്നാകട്ടെ

ഇവിടെ 9.5 ന്റെ ഇടത്തുള്ളതും വലത്തുള്ളതും ആയ രണ്ടു വിരാമബിന്ദുക്കൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇമ്മാതിരി ശൂന്യ ബിന്ദുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി രണ്ടു വിരാമബിന്ദുക്കൾ കിട്ടിയശേഷം തുക്കും കൃത്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

9.5 ആയാൽ ഇരുതട്ടും സമമാണ്. അതായത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ തുക്കമാണ് തുക്കക്കുട്ടികൾ കാണിക്കുക. 10.8നേക്കാൾ 9 എന്ന ബിന്ദു 9.5 ന്റെ അടുക്കെയൊക്കെയാകുന്നു 9 കിട്ടിയപ്പോൾ വലത്തെ തട്ടിൽ ചേർത്ത് തുക്കമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ആ തുക്കം കുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്.

തുക്കം തുലാസിൽ നിന്നു കാണുന്നവസരത്തിൽ അനുസരിച്ചേണ്ടുന്ന സമ്പ്രദായം ഒരു നോട്ടത്തിൽ നോക്കി അറിയുവാൻ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക സഹായിക്കും.

ഇടത്തേ തട്ടിൽ ഭാരം	വലത്തെ തട്ടിൽ തുക്കക്കുട്ടികൾ	തിരിയുംനിലകൾ		ശൂന്യബിന്ദു	സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടുന്ന തുക്കം
		ഇടം	വലം		
○	○	2 } 3 4 }	16	9.5	
ഗ്രാം	18.62 ഗ്രാം	8 } 3.5 4 }	13.1	8.3	വലത്തെതട്ടിൽ ഭാരമധികം
	18.61,,	2 } 2.5 3 }	16	9.3	ടി
	18.60,,	3 } 3.5 4 }	17.5	10.5	ഇവിടെ 9.3 എന്നതുക 10.5 നേക്കാൾ 9.5 ന്റെ അടുക്കെയൊക്കെയാകയാൽ തുക്കം 18.61 ഗ്രാം.

N. B.—ശുന്ധിവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ആയിരണ്ടു തുകൾ കിട്ടുന്നതുവരെ 10 മി. ഗ്രാം തൂക്കക്കുട്ടികൾ നീക്കം ചെയ്തു വിരോധബീജ കാരണങ്ങളാൽ.

അദ്ധ്യായം 11

സ്ഥിതിസ്ഥാപകത്വം (elasticity)

തുലാസുപയോഗിച്ചുകാണുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ തൂക്കം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഇരിക്കയില്ല. തൂക്കം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നു് അറിയുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ. ഈ ആകർഷണം ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിനും പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആകർഷണശക്തി അധികമാകും; അതായതു തൂക്കം അധികമാകും. ഉണ്ണുമേഖലയിലെ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥത്തിനുള്ള തൂക്കത്തേക്കാൾ ശീതമേഖലയിൽ അതിന്നു തൂക്കം അധികമുണ്ടു്. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഉഷ്ണമേഖലകളിൽ ഉള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. തുലാസുപയോഗിച്ചു തൂക്കം കാണുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ഇടത്തെത്തട്ടിന്നു ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്രകണ്ടു തൂക്കം അധികമാകുമോ അത്രകണ്ടു വലത്തെ തട്ടിന്നും തൂക്കം വലിക്കും. തുലാസുപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാം തട്ടുകൾ സമപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ആകർഷണ ശക്തിക്കുള്ള വ്യത്യാസം നാം ഗണിക്കുന്നതേയില്ല.

സ്ക്വിംഗ് തുലാസുപയോഗിക്കുമ്പോൾ തൂക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം നേരിടുന്നതു് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണു്.

സ്പ്രിംഗ് തുലാസിന്റെ വിവരണം 12ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതു മനസ്സിലാക്കാൻ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥിതി സ്ഥാപകത്വം എന്തെന്നറിയണം.

ഒരു നേരിയ റബ്ബർ കഷണം എടുക്കുക. അതിന്റെ ഒരറ്റം പിടിച്ചു മറേറ അറ്റം നീട്ടുക. റബ്ബർ വലിഞ്ഞു നീളുന്നു. എന്നാൽ വലിക്കൽ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ റബ്ബർ പൂവ് സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കും. റബ്ബറിനു സ്ഥിതി സ്ഥാപകത്വമുണ്ടെന്നു പറയുന്നു, ബലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നീളുന്ന സാധനം ബലം നീക്കിയാൽ പൂവ് സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതായാൽ അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിതിസ്ഥാപകത്വമുള്ളവയാണ്.

സ്ഥിതിസ്ഥാപകപദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നിയമം എളുപ്പത്തിൽ പറിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു റബ്ബർ ചരടെടുക്കുക. അതിന്മേൽ കുറേ അകലെയായി രണ്ടു മൊട്ടുസൂചികൾ തറക്കുക. റബ്ബർ കെട്ടിത്തൂക്കുക. ചരടിൽ വളവു പിരിവുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ ഒരു ചെറു തട്ടു ചോട്ടിൽ തൂക്കുക. സൂചികൾ തൊട്ടിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം ഒരു സ്ലെയിൽ നിർത്തുക. സൂചികൾക്കിടയിലെ നീളം കാണുക. തട്ടിൽ 50 ഗ്രാം തൂക്കക്കട്ടികൾ ചേർക്കുക. ഈ സമയത്തുള്ള സൂചികൾക്കിടയിലെ നീളം കുറിച്ചെടുക്കുക. പിന്നീട് 50 ഗ്രാം വീതം തൂക്കം തട്ടിൽ മൂന്നുനാലു തവണ ചേർത്ത് ഓരോ അവസരത്തിലും സൂചികൾക്കിടയിലെ ദൂരം കാണുക. 50 ഗ്രാം കണ്ടു തൂക്കം ചുരുക്കി സൂചികൾക്കിടയിലെ നീളം കാണുക. ഈ വായനകളെല്ലാം പട്ടികയിൽ ചേർത്ത് അവസാനത്തെ കള്ളി പരിശോധിക്കുക.

തട്ടിലെ ഭാരം	ഭാരംചേർക്കുമ്പോൾ നീളം	ഭാരംഎടുക്കുമ്പോൾ നീളം	ശരാശരി നീളം	വലിവു	ഭാരവു വലുത	വലി ഭാര വലുത
0	30cm	30cm	30			
50	32cm	32cm	32	$\left\{ \begin{array}{l} 32-30 \\ = \text{cm} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 50-0 \\ = 50 \end{array} \right.$	$2/50 = .04$
100	34cm	34cm	34	$\left\{ \begin{array}{l} 34-32 \\ = 2\text{cm} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 100-50 \\ = 50 \end{array} \right.$	$2/50 = .04$
...	...	...	...	...	...	...

വലിവു
ഭാരവലുത എന്ന തുക ഒരു സ്മിർ സംഖ്യയാണ്, അതായതു വലിവു ഭാരവലുതക്ക് ക്രമാനുപാതമാകുന്നു.

ഈ സംഗതി യെങ്ങ് (Young) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ചത്. ഭാരം വളരെ അധികമായാൽ സ്മിതി, സ്ഥിരപരതം നീങ്ങിപ്പോയി ചുരുട്ടുന്നെ പൊട്ടുവാൻ ഇടവരും അതുകൊണ്ടു വലിവിനും ഭാരത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്മിതി സ്ഥിരപരതകിനുള്ള അതിർത്തികൾക്കിടയിൽ മാത്രം ബാധിക്കുന്നിതാണ്.

എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സ്മിതിസ്ഥിരപരതവുമുണ്ട്. ചില വയിൽ ഇതു നല്ലവണ്ണം കാണാം. മറു ചിലവയിൽ ഇതു തീരെ

ഇല്ലാതിരിക്കും. പൂർണ്ണമായ സ്‌മിതിസ്‌മാപകരപം ഗ്ലാസിന്നാണുള്ളത്; പക്ഷേ ഇതിനുള്ള സീമ അഥവാ അതിർത്തി വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും.

വലിവിന്റെ അളവു അധികമാകണമെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെ നീളം അധികമാകണം. തിര്യക്‌ഛേദം (cross-section) അധികമായാൽ അളവു ചുരുങ്ങും. ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നോരംവലിവിന്റെ അളവു അധികമാവും.


അദ്ധ്യായം 12

സ്‌പ്രിംഗ്‌തുലാസ്സ്

വലിവു ഭാരത്തിനു ക്രമാനുപാതമാണെന്നുള്ള തത്വത്തെ അടിസ്‌ഥാനമാക്കിട്ടാണു സ്‌പ്രിംഗ്‌തുലാസ്സ് ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളത്.

ഒരാണിയിൽനിന്നു് ഒരു സ്‌പ്രിംഗ് താണുകിടക്കും. സ്‌പ്രിംഗ് ഒരു ഉറയിൽ വെച്ചിരിക്കും. ഉറയിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടാകും. സ്‌പ്രിംഗിന്റെ അടിയിൽനിന്നു് ഉറയിലെ 'പിളപ്പിൽക്കൂടി തുരിച്ചുനിൽക്കുന്ന സൂചി പുറമെ വന്നിട്ടുള്ളതു കാണാം. സ്‌പ്രിംഗിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കൊളുത്തുണ്ടു്. സൂചിയുടെ അടുക്കെയായി പിളർപ്പിന്റെ വലത്തു വശത്തുള്ള ഒരു സ്‌കെയിലിൽ നിന്നാണു്, കൊളുത്തിൽ തൂക്കിയിടുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ തൂക്കം കാണുക. കൊളുത്തിൽ ഭാരമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സൂചി '0' എന്ന അക്ക

ത്തിനെതിരായിരിക്കും. റാത്തൽ അളവാണ് തുലാസ്യ കാണിക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ. 10 എന്ന അക്കത്തിനെതിരായി സൂചി വരുമ്പോൾ കൊളത്തിൽ 10 റാത്തൽ ഭാരമുണ്ടായിരിക്കും. '0'ത്തിനും '10'നും ഇടയിലെ നീളത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും '0'ത്തിനും '20'നും ഇടയിലെ നീളം. (ചിത്രം 11)



ഈ തുലാസ്സിൽ ഒരു തട്ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ തുലാസ്യകൊണ്ടു ഉഷ്ണ മേഖലയിലെ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ തൂക്കിട്ടുള്ള പദാർത്ഥത്തെ ശീതമേഖലയിലെ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ ചെന്ന് തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ തൂക്കം അധികം ആയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണും. ഇങ്ങി ചിത്രം 11

നെ അനുഭവപ്പെടുവാൻ കാരണം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാകാത്തതു കൊണ്ടാണ്. ഉഷ്ണമേഖലയിലെ സ്തംഭത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അധികവും, പദാർത്ഥത്തിനുള്ള തൂക്കം ചുരുക്കവുമാണ്.



വിഭാഗം രണ്ട്

അദ്ധ്യായം 13


(വായുമണ്ഡലം)

വായുവിന്റെ മർദ്ദവും വ്യാപകതയും-
ഉപയോഗങ്ങൾ, വായു ചാമ്പുവാൻ ഉള്ള യന്ത്രം (air-pump)

വായുവിന് എല്ലാഭാഗത്തേയും മർദ്ദശക്തി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇക്കാരണത്തിലാകുന്നു രബ്ബർ ബ്ലാഡറി (bladder)ൽ നമുക്ക് കാററ നിറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. മോട്ടോർ വണ്ടിയിലെ ടയറും ചവിട്ടു വണ്ടിയിലെ ടയറും കാററ ചാമ്പുമ്പോൾ നിറയുന്നതും ഇതേ കാരണത്താലാകുന്നു.

വായുവിനെ അമർത്തി അതിന്റെ ആയതനം ചുരുക്കുവാൻ സാധിക്കും. വായു നിറച്ച ഫുട്ബോൾ (കാൽപ്പന്തു—football) ഞെങ്ങുന്നത് ഇക്കാരണം കൊണ്ടാകുന്നു. ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഏടുക്കുക. ഒരു ബീക്കറിന്റെ അടിഭാഗം പിടിച്ച് അതിന്റെ മുമ്പം വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു് തള്ളി നിർത്തുക. (ചിത്രം 12 നോക്കുക) വെള്ളം ബീക്കറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു് കുറച്ചൊന്നു തള്ളിനിൽക്കും. കൈവിട്ടാൽ ബീക്കർ മേല്പോട്ടു പോരും. ആയതിനാൽ, വായുവിനെ അമർത്തി ചുരുക്കാമെന്നും മർദ്ദശക്തി ചുരുങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ആയതനം കിട്ടുവാൻ വായു ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം.

വാതകങ്ങൾ അവയ്ക്കു് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിക്കും. ഈ സംഗതിയാകുന്നു പൂവിന്റെ മണം അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. പൂവിൽ നിന്നു് പുറപ്പെടുന്ന മണത്തോടുകൂടിയ വാതകം വായുവിൽ പരക്കുന്നു. ഒരു മുറിയുടെ മുമ്പയിൽ കത്തിച്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദനത്തിരിയുടെ വാസന വീടമുഴു



ചിത്രം 12

വനം പരക്കുന്നത് വായുവിനുള്ള വ്യാപകശക്തികൊണ്ടാകുന്നു.

അമർത്തപ്പെട്ട വായു ആദ്യത്തെ ആയതനം എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നു് മുകളിൽ വിസ്തരിച്ചുവല്ലോ. കുട്ടിക്കാലത്തു് 'പാവിട്ട' തേരാക്കുകൊണ്ടു് നാം കളിക്കാതെ ഇരുന്നിരിക്കയില്ല. അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കായ് പുറമെ വരുന്നത് വായുവിന്റെ അമർച്ചശക്തിയാൽ ആകുന്നു.

വായുവിന്നു് മർദ്ദശക്തിയുള്ളതിനാലാകുന്നു മോട്ടോർവണ്ടിയിൽ പോകുന്നത്, കട്ടവണ്ടിയിൽ യാത്രചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സുഖമായി തോന്നുന്നത്. മോട്ടോറിലെ ടയറിൽ കാരാ നിറച്ചിരിക്കുന്നു. പാതയിലെ ഒരു കല്ലിന്മേൽ ടയർ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ടയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായു ഞെങ്ങുന്നു. അയതിനാൽ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം നാം അനുഭവിക്കുന്നില്ല. കട്ടവണ്ടി ചുറ്റും കല്ലിന്മേൽ കയറുമ്പോൾ വണ്ടിയൊന്നു് പൊതിവശാവുകയും നമുക്കു് വല്ലാത്ത കലുക്കം തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. വായുവിന്റെ മർദ്ദശക്തി ആസ്പദമാക്കിട്ടാകുന്നു വായുപമ്പ, ജലപ്പമ്പ മുതലായവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 14


(Barometer)

ബറോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ—വായുമർദ്ദമാപകം.


വായുവിന്നു് ഭാരമുണ്ടെന്നും അതു് മർദ്ദം (Pressure) പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുമല്ലോ. ഈ പാഠത്തിൽ വായുവിന്റെ മർദ്ദം അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണത്തെപ്പറ്റിയാണ് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്.

ഭാജനബറോമീറ്റർ (Cistern barometer)

വായു മർദ്ദം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്? മുൻകൂറായി അറിവുള്ള സാന്ദ്രത (Density) യോടുകൂടിയ ഒരു ദ്രാവകസ്തംഭം (Liquid column) ഞ്ഞ വായുവിനാൽ താങ്ങി നിർത്തിപ്പിടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളതായ സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം കണ്ടു മർദ്ദം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഗണിച്ചെടുക്കാം. വായുവിന്റെ മർദ്ദശക്തിയെ കണക്കാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് ബറോമീറ്റർ (Baros-ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദനശക്തി—Metron—മാപകം) അല്ലെങ്കിൽ വായുമർദ്ദമാപകം എന്നാകുന്നു പേർ. രസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബറോമീറ്ററാണ് നാം സാധാരണമായ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. ഗലീലിയോവിന്റെ ശിഷ്യനും ഇറ്റലിരാജ്യത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയ ടോറിസിലി (Torricelli) ആയിരുന്നു 1644ൽ ആദ്യമായി വായുമർദ്ദമാപകം നിർമ്മിച്ചത്.



ചിത്രം 13



ചിത്രം 14

സുമാർ 3 അടി നീളമുള്ളതും 5 മി. മീ വ്യാസത്തോടുകൂടിയതും വൃത്തിയുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായ ഒരു ഗ്ലാസ് കഴൽ എടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം അടഞ്ഞതായിരിയ്ക്കണം. ശുദ്ധമായതും നീർ

തുളികളില്ലാത്തതും ആയ രസം കഴലിന്റെ ഉള്ളിൽ പതുക്കെ കറേഗ്ലക്കറേഗ്ലയായി നിറയുക; തുറന്ന ഭാഗത്തിൽ കഷ്ടിച്ച് 1 സെ- മീ. ദൂരത്തേക്ക് രസം നിറക്കാതെ വെയ്ക്കുക. ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് കഴലിന്റെ വായ അടച്ച്, വായുഭാഗം ഒരറ്റത്തുനിന്നു മറേറ അറ്റംവരെ വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുകവിധത്തിൽ കഴലിന്റെ വായ കീഴ്പ്പോട്ടിരിക്കത്തക്കവണ്ണവും മേല്പോട്ടിരിക്കത്തക്കവണ്ണവും ആയി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കഴൽ പൊന്തിയുക. പിന്നീട് രസംകൊണ്ട് കഴൽ നിറക്കുക. തുറന്ന അറ്റം വിരൽകൊണ്ട് മൂടി, കഴലിനെ തല കീഴ്പ്പോട്ടാക്കി പിടിച്ച്, ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലുള്ള രസത്തിൽ കഴലിന്റെ വായ് മുക്കുക. പിന്നെ വിരൽ നീക്കം ചെയ്ത് കഴലിനെ ലംബമായി പിടിക്കുക. കഴലിൽ നിറച്ച് രസമില്ലെന്നും കുറച്ചൊന്നു കീഴ്പ്പോട്ട് രസം താണിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ രസസ്തംഭത്തെ താങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വായുവിന്റെ മർദ്ദശക്തിയല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല.

കഴൽ ചെറുക്കുക. കഴലിൽ രസം ക്രമേണ കയറുന്നതായി കാണാം. നല്ലവണ്ണം ചെറിയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബറോമീറ്ററിൽ രസം പൂർത്തിയായ് കയറി നിൽക്കും. ആയതിനാൽ, കഴലിലെ രസത്തിന്നുമീതെ ഒഴിവായ സ്ഥലം ഉണ്ട്. ഇതൊരു ശൂന്യ സ്ഥാന (vacuum) മாகുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിന് 'ടോറിസിലിയുടെ ശൂന്യസ്ഥാന'മെന്നാകുന്നു പേർ. വായുമർദ്ദകമാപകത്തിലെ രസത്തെ വായു മർദ്ദശക്തിയാണ് താങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. രസസ്തംഭത്തിന്റെ ലംബമായ നീളം അതായത് വായുമർദ്ദകമാപകത്തിലെ ഉയരം സമുദ്രവിതാനത്തിൽ സുമാർ 30 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 76 സെ. മീ. ആകുന്നു. ഈ നീളം ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലുള്ള രസത്തിന്റെ സമതലത്തിൽനിന്ന് കഴലിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന രസത്തിന്റെ തലംവരെയാണ് കണക്കാക്കുക. കഴൽ ചെരിച്ചാലും പൊന്തിച്ചാലും ഇതിന്റെ വായ ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലെ രസത്തിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നോടത്തോളം, ബറോമീറ്റർ കാണിയ്ക്കുന്ന രസസ്തംഭത്തിന്റെ നേർ ഉയരത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയില്ല. കഴൽ വിസ്കാരമുള്ളതായാലും അതിന്റെ

പരിച്ഛേദം ഓരോ ഇടത്തിൽ ഓരോമാതിരി ആയിരുന്നാലും ഈ നീളം മാറുന്നതല്ല. വായുവിന്റെ മർദ്ദശക്തി വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഈ ഉയരവും മാറും; മർദ്ദം ചുരുങ്ങിയാൽ, സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം ചുരുങ്ങും. ആയതിനാൽ ഈ രസസ്തംഭം വായുവിന്റെ മർദ്ദശക്തിയെ അളക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 15

ബറോമീറ്റർ (തുടർച്ച)

രസം ഉപയോഗിച്ച ബറോമീറ്റർ സമുദ്രവിതാനത്തിൽ 30" ഉയരം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജലം ഉപയോഗിച്ച ബറോമീറ്ററിന്റെ നീളം മാറുന്നതാണ്. രസത്തെ സംബന്ധിച്ച ജലത്തിൽ ഗുരുത്വം ചുരുങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജല ബറോമീറ്ററിന്റെ നീളം വലുതാകും. വെള്ളത്തേക്കാൾ രസത്തിന്റെ ഗുരുത്വം 13.6 മടങ്ങ് അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളമുള്ള ബറോമീറ്ററിന്റെ നീളം 30" x 13.6 എന്നായിരിക്കും.

മറ്റു ദ്രാവകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള നീളവും ഗണിക്കാം. ദ്രാവകങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ രസത്തിന്റെ ഗുരുത്വം എത്ര മടങ്ങ് അധികമാണെന്നറിയണം. രസബറോമീറ്ററിന്റെ നീളത്തെ ഈ തുകകൊണ്ട് പെരുക്കണം. ഉദാഹരണമായി, ഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിച്ച ബറോമീറ്ററിന്റെ നീളം 30" x 11 എന്നായിരിക്കും; കാരണം, രസത്തിന്റെ ഗുരുത്വം ഗ്ലിസറിന്റെതിനേക്കാൾ 11 മടങ്ങ് അധികമായിരിക്കും.

രസമാണ് ബറോമീറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. രസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉപയോഗത്തിനു കാരണം.

1. രസം ഗ്ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുകയില്ല. ബറോമീറ്ററിന്റെ ഉയരം വായുവിന്റെ മർദ്ദത്തെ ആസ്പദിച്ചിരിക്കും. മർദ്ദം ചുരുങ്ങിയാൽ ഉയരം താഴും, നേരെ മറിച്ചു മർദ്ദം അധികമായാൽ ഉയരം അധികമാകും. ആയതിനാൽ, മർദ്ദത്തിനനുസരിച്ചു രസം ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസരങ്ങളിൽ രസം ഗ്ളാസിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഉപകരണം ശരിയായ ഉയരം കാണിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു രസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ സൗകര്യമാണ്. രസത്തിന്നു മാത്രമേ ഗ്ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഗുണമുള്ളൂ.

2. രസം തിളങ്ങുന്ന വസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ടു രസം നിൽക്കുന്ന ഉപരിതലം വ്യക്തമായ് കാണാം.

3. രസമല്ലാതെ വേറെ ദ്രാവകങ്ങളാണെങ്കിൽ ബറോമീറ്ററിന്റെ ഉയരം വളരെ നീളമുള്ളതായിരിക്കും. രസം ആണെങ്കിൽ ഉയരം അളക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

4. ചൂടുകൊണ്ടു രസം വേഗത്തിൽ ബാഷ്പമാവുകയില്ല. സൂര്യന്റെ ചൂടാൽ മറ്റു ദ്രാവകങ്ങൾ ബാഷ്പമായ് തീരുകയും ഉപകരണം കുറിക്കുന്ന ഉയരം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. രസം ബാഷ്പമാകുന്ന ഉഷ്ണത(temperature) ഉയർന്നു നില്ക്കില്ലെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടു വായുവിനുള്ള ഉഷ്ണതയിൽ രസം വേഗത്തിൽ ബാഷ്പമായി പരിണമിക്കുകയില്ല. ഈ സൗകര്യത്താൽ ഉപകരണം തന്നെ ഉയരം വ്യത്യസ്തപ്പെടുകയില്ല.

5. രസം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതു പ്രയാസമായതല്ല. മസിലിനിൽ അരിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. മറ്റു ദ്രാവകങ്ങൾ മലിനപ്പെട്ടാൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതു ക്ലിഷ്ടമായ കാര്യമാണ്.

ജീവിതത്തിൽ ഭാജനബറോമീറ്റർ അല്ല ഉപയോഗിക്കാറു്. അതിനെ സംസ്കരിച്ചു ഉപകരണമാണ്. ഉപയോഗത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതിന്നു പുറമെ ദ്രാവകം ഇല്ലാത്ത ഉപകരണവും ഉണ്ടു്. അതിന്നു 'അനിറോയിഡ്' (aneroid) ബറോമീറ്റർ എന്നാകുന്നുപേർ.

അദ്ധ്യായം 16

ബറോമീറ്റർ (തുടർച്ച)

ഒരു സ്ഥലത്തിലെ മർദ്ദം എപ്പോഴും ശാശ്വതമല്ല. ശരാശരി തുകയിൽനിന്നും 5% കണ്ടു് ഇതു വ്യത്യാസപ്പെട്ടു് കണ്ടു്ക്കാവുന്നതാണു്. ആയതിനാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദനശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നായിത്തന്നെയിരിയ്ക്കയില്ല. ഒരു ദിവസത്തിലെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാപകത്തിലെ താഴ്ചകളിൽനിന്നു പരിഗണിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഉയരത്തിന്നു് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചു് ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ക്ഷീപ്തമായ ഒരു അറിവു സമ്പാദിയ്ക്കാം. ബറോമീറ്ററിന്റെ ഉയരം പെട്ടെന്നു താഴുന്ന പക്ഷം വായുവിൽ നീരാവി നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ നല്ല കളിമയുള്ള ഒരു ദൂർട്ടിനത്തെ താമസംകൂടാതെ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം എന്നു് മനസ്സിലാക്കാം. അന്തരീക്ഷ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്ന ആപ്പീസിൽ നിന്നു് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മേപ്പുകളിൽ അതായതു് പടങ്ങളിൽ വായുവിന്റെ മർദ്ദനശക്തി, കാറിന്റെ ഗതിയുടെ രീതി എന്നിന്യോദിവിഷയങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുടെ ഒരു ചെറു വിവരണം കൂടി ചേർത്തിരിക്കും. പുനാവിലെ ആബ്സർവേറ്ററിയിൽ നിന്നു ദിവസേന പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ശീതോഷ്ണ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കുക. മലകളുടെ ഉയരവും ഖനികളുടെ ആഴവും തീർമ്മാനപ്പെടുത്തുവാൻ ബറോമീറ്ററുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്. ആകാശപ്പലകളും ആകാശവിമാനങ്ങളും എത്രകണ്ടു വായുവിൽ ഉയരുന്നു എന്നു് അറിയേണ്ടതിലേക്കു് ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഈ ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നു.

ഭിന്നപ്രതിയുള്ള മർദ്ദം കുറിക്കുവാൻ വായുമർദ്ദലേഖകം (barograph) എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആനിറോയിഡ് ബറോമീറ്ററാണു് ഇതിലെ പ്രധാന ഭാഗം. ഇതിൽ പൊള്ളയായവയും വായു നീക്കം ചെയ്തവയും ആയ ആറോ എട്ടോ അളു

കുടുംബം ഉണ്ടാകും. ഇവയെല്ലാം ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായി നല്ല വണ്ണം ഉരുക്കിപ്പേർത്തിരിക്കും. ഉപകരണത്തിന്നു തുക്കമധികമുണ്ടാവുകയില്ല. വായു തട്ടി തകിട്ടു ഉള്ളിലേക്കു താഴ്ന്നോരം ഉപകരണം തട്ടാതിരിക്കുവാൻ അളക്കുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ക്വിംഗ് ചുരുട്ടിവെച്ചിരിക്കും. സ്ക്വിംഗിന്റെ സ്ഥിതിസ്ഥാപകത്വം താഴ്ന്നതെ കുറച്ചൊന്നു ക്രമപ്പെടുത്തും. വായുവിന്റെ മർദ്ദകത്തിന്നു നസരിച്ച് താഴ്ന്ന അധികമാവുകയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യും. ഈ താഴ്ന്നതെ കാണിക്കുവാൻ അളക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്നു ക്ഷേതിജത്തിലായി നിൽക്കുന്ന നീണ്ട സൂചിയുണ്ടു്. ഈ സൂചിയുടെ അറ്റം ഒരു കടലാസിന്മേൽ തട്ടും. ഈ കടലാസു ഉരുട്ടിന്മേൽ ചുറ്റിയിരിക്കും. ഉരുൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം ചുറ്റും. അപ്പോൾ കടലാസിന്മേൽ സൂചി അടയാളപ്പെടുത്തും. ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രേഖ സമാന്തരമായിരിക്കയില്ല. ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉള്ള രേഖയായിരിക്കും. ഈ രേഖയിലെ ബിന്ദുക്കളെ നോക്കി അതതു സമയത്തിലെ മർദ്ദം ഗണിക്കാം.

ഈ ഉപകരണം അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണു്. പരീക്ഷണശാലകളിൽ ടിനംപ്രതിയുള്ള മർദ്ദം കുറിക്കുവാൻ ഈ ഉപകരണം ഉപകരിക്കും.

ഒരു സ്ഥാനത്തിലെ മർദ്ദം അറിഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ ഉയരം കണക്കാക്കാം. കടൽനിരപ്പിൽ നിന്നു 1000 അടി ഉയന്നാൽ വായു മർദ്ദമാപകത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചു താഴ്ന്നു ഉണ്ടാകും. ഈ സംഗതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രദേശത്തിലെ ഉയരം കാണാം. ഉദാഹരണമായി, വായു മർദ്ദമാപകം ഉയറ്റിയിൽ 23 ഇഞ്ചു കാണിക്കും. അതായതു സമുദ്രനിരപ്പിലെ അളവിൽനിന്നു 7 ഇഞ്ചു താഴ്ന്നുണ്ടു്. ആയതിനാൽ, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നു ഉയറ്റി 7000 അടി ഉയന്നിരിക്കുന്നു.

ബറോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന മർദ്ദം എന്നതിന്നു അർത്ഥമെന്തു്? കഴലിലെ രസ സ്തംഭം വായു പുറമെയുള്ള സ്തംഭത്തെ താങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാണു അർത്ഥം. വായു മർദ്ദം 76 സെ.മീ എന്നു പറഞ്ഞാൽ, 76. സെ. മീ. ഉയരമുള്ള ഒരു സ്തംഭത്തിന്റെ

ബലവും വായുസ്തംഭത്തിന്റെ ബലവും തുല്യമാകുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബറോമീറ്റർ കഴലിന്റെ മുഖവിസ്താരത്തിനും രസത്തിന്റെ ഉയരത്തിനും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതുതരം കഴൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ഉയരം വ്യത്യാസപ്പെടുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 17

ബോയിൽ നിയമം


കുടുങ്ങിയ ഒരു പാത്രത്തിലെ വായു മർദ്ദം ചില നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കും. ബോയിൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ വിഷയം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. താപം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരേ അളവുള്ള ഒരു വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം ആയതന (volume)ത്തിനു വിപോലാനുപാതമായിരിക്കും. ഇതാണ് ബോയിൽ നിയമം.

വിപോലാനുപാതകം എന്നാൽ എന്തെന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടു സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അവയിൽ ഒന്നു വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറേറതു ചുരുങ്ങി എന്നു വരാം ഉദാഹരണമായി 100 ഫു സെ. ദ്രാവകങ്ങളും പല മുഖവിസ്താരമുള്ള ഉയര പാത്രങ്ങളും എടുക്കുക. ഈ ദ്രാവകം അവയിൽ ഒഴിക്കുക. എല്ലാപാത്രങ്ങളിലും ഒരേ ഉയരത്തിൽ ദ്രാവകം നിൽക്കുകയില്ല. വിസ്താരമധികമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉയരം ചുരുങ്ങിയും, ചുരുങ്ങിയ വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉയരം വർദ്ധിച്ചും ഇരിക്കും അതായതു വിസ്താരമധികമായാൽ ഉയരം ചുരുങ്ങും. എത്രകണ്ടു ഒരു സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ടു മറേറ സംഖ്യ ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നു വന്നാൽ ഈ സംഖ്യകൾ വിപോലാനുപാത സംഖ്യകളാണ്.

കുടുങ്ങിയ പാത്രത്തിലുള്ള വാതക മർദ്ദം പാത്രത്തിന്റെ ആയതനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആയതനം എത്ര കണ്ടു അധികമാകുന്നുവോ അത്രകണ്ടു മർദ്ദം ചുരുങ്ങും.

ഈ സ്ഥാപിക്കാൻ ബോയിലുപകരണം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായത് 'A' എന്ന അടയാള പെട്ടത്തിന് കഴലാണ്. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം അടുത്തിരിക്കും. മറ്റേ അറ്റം തുറന്നതാണ്. ഈ അറ്റം ഒരു റബ്ബർ കഴലോടു ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഈ കഴൽ കട്ടികൂടിയതും നീളമുള്ളതുമാണ്. ഇതിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ഇരുഭാഗവും തുറന്നിട്ടുള്ള കഴലോടു (B നോക്കുക) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. റബ്ബർ കഴലിൽ രസം ഉണ്ടായിരിക്കും. B എന്ന കഴൽ ഉയർത്തിട്ടും താഴ്ത്തിട്ടും A എന്ന കഴലിലെ വായുവിന്റെ ആഴ്ചതനം വ്യത്യാസമാക്കും. കഴലുകളിൽനിന്നു അളവുകൾ എടുക്കാൻ അവയുടെ അടുക്കെയായി ഒരു അളവുകോൽ കാണാം (ചിത്രം 15 നോക്കുക.)

ഉപകരണത്തിൽനിന്നു A എന്ന കഴലിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കാണുന്ന സമ്പ്രദായം താഴെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. B എന്ന കഴലിലെ രസവിതാനം കുറിക്കുന്ന അക്കം 20 സെ. മീ. എന്നും A എന്ന കഴലിലെ രസവിതാനം 10 സെ. മീ. എന്നും ആണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയ സ്ഥാനത്തിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദം പ്രകൃതിയിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദത്തേക്കാൾ അധികമാണെന്ന് ഫറോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന രസ സ്തംഭത്തിന്റെ നീളം കണക്കാക്കി കഴലുകളിലെ രസവിതാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൂട്ടുക. ഈ തുക ആയിരിക്കും A എന്ന കഴലിലെ മർദ്ദം. B എന്ന കഴലിലെ രസവിതാനം A എന്ന കഴലിലെ രസവിതാനത്തേക്കാൾ ചോട്ടിലാണെങ്കിൽ രസവിതാനങ്ങൾക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം ഫറോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന നീളത്തിൽ നിന്നു കിഴിക്കേണ്ടതാണ്.



ചിത്രം 15

അദ്ധ്യായം 18

ബോയിൽ നിയമം.


ബോയിൽ ഉപകരണത്തിൽനിന്നു ബോയിൽനിയമം സ്പീഗം പിടാം. B എന്ന കുഴൽ കീഴ്പോട്ടു കൊണ്ടുവരിക. ഒരു സ്പീഗത്തിൽ നിന്നുക. A എന്ന കുഴലിലെ വായുവിന്റെ ആയുതനം കാണുവാൻ കുഴലിലെ വായുവിന്റെ നീളം കുറിച്ചെടുത്താൽ മതി. കുഴലിന്റെ മുഖവിസ്താരം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാകയാൽ ഘനമാനം നീളത്തിന്നു ക്രമാനുപാതമാകുന്നു. പിന്നീട് കുടുങ്ങിയ സ്പീഗത്തിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കണക്കാക്കുക.

B എന്ന കുഴൽ ഉയർത്തി വേറൊരു സ്പീഗത്തിൽ വെച്ചു, ഇതേ പരിശ്രമം ആവർത്തിക്കുക. ഇമ്മാതിരി, അഞ്ചോളം സ്പീഗങ്ങളിൽ മർദ്ദവും ആയുതനം കുറിക്കുന്ന നീളവും കാണുക. ഓരോ പ്രാവശ്യവും കിട്ടിയ തുകകളെ ചെരുക്കുക. ഫലം സ്പീഗം സംഖ്യ ആയിരിക്കും.

മർദ്ദം $\times$ ആയുതനം = സ്ഥിരസംഖ്യ. അതുകൊണ്ടു മർദ്ദം അധികമായാൽ ആയുതനം ചുരുങ്ങുന്നതാണ്.

മർദ്ദത്തിനും ആയുതനത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് വരക്കുക. ഗ്രാഫിന്റെ ആകൃതി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുമാതിരി ആയിരിക്കും (ചിത്രം 16 നോക്കുക).


ചിത്രം 16



മർദ്ദം

ബോയിൽ നിയമം ശരിയോ എന്നു നോക്കുവാൻ താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണവും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ നീളമുള്ള ഒരു നേരിയ കുഴലുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം അടഞ്ഞിരിക്കും. ഉള്ളിൽ സുമാർ 10 സെ. മീ. നീളമുള്ള രസതന്തു ഉണ്ടാകും. ഈ കുഴലിനെ ഒരു സ്റ്റേയിലി നോട്ടു ബന്ധിച്ചിരിക്കും.

കഴലിനെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വസ്തു ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 17 നോക്കുക) കാണിച്ചതായിരിക്കട്ടെ. തുറന്ന മുഖം കീഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ്. കഴൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് സമാന്തര രേഖ മേശപ്പുറം കാണിക്കുന്നു. പുറം വായുവിനു C എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ള മർദ്ദം കുടുങ്ങിയ ഭാഗത്തിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദത്തേക്കാൾ അധികമാണ്. BC എന്നതും സതതുവിനെ കുറിക്കുന്നു. C എന്ന സ്ഥാനത്തിലെ മർദ്ദത്തിൽനിന്നു CB എന്ന രസതന്ത്രമുള്ള മർദ്ദം കഴിച്ചാൽ കുടുങ്ങിയ സ്ഥാനത്തിലെ മർദ്ദം കാണാം. C എന്ന സ്ഥാനത്തിലെ മർദ്ദം പുറംവായുവിന്റെ മർദ്ദമാണല്ലോ. ഇതു ബറോമീറ്ററിൽ നിന്നു കാണാം. CB തന്നെ മർദ്ദം ഈ രസതന്ത്രവീനുള്ള മർദ്ദം ആണ്.



ചിത്രം 17

മർദ്ദം എപ്പോഴും കുത്തനെയുള്ള നീളംകൊണ്ടാണ് കുറിക്കുക. CB രസമാകയാൽ ബറോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന നീളത്തിൽനിന്നു CB-യ്ക്കു ഒത്ത H B എന്ന ലംബദൂരം കിഴിച്ചാൽ A B-യ്ക്കുള്ളിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കിട്ടും.

മുഖം മേശപ്പുറത്തോൾ CB എന്ന തന്തുവിന്നു് ഒത്ത ലംബദൂരം ബറോമീറ്റർ തന്നെ നീളത്തോടു കൂട്ടേണ്ടതാണ്. കഴൽ ക്ഷെതിജത്തിലായാൽ കൂട്ടുവാനുള്ള നീളം പൂജ്യമായിരിക്കും.

വായനക്കുറിപ്പുകൾ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുക.

വായു മർദ്ദം
ബാരോമീറ്ററിൽ നിന്നു
} = B സെ. മീ.

കുഴൽനിന്നിയ മാതിരി.	കഴിയിലെ വായുവിന്റെ ആയതനം A B എന്നീ കൂം = 'V'	H B അതായത് വായുവിന്റെ വീന്റെ ലം ബദരം + അ ഥവാ --	.. കഴലിലെ വായു വീന്റെ മർദ്ദം B + H = P സെ. മീ.
(1) ചെരിഞ്ഞ മുഖം മേല്പോട്ടു (വലത്തുഭാഗം)			
(2) കൈനീട്ടത്തിൽ			
(3) ചെരിഞ്ഞ മുഖം കീഴ്പ്പോട്ടു (വലത്തു ഭാഗം)			
(4) കുത്തനെ മുഖം കീഴ്പ്പോട്ടു			
(5) ചെരിഞ്ഞ മുഖം കീഴ്പ്പോട്ടു (ഇടത്തു ഭാഗം)			
(6) ചെരിഞ്ഞ മുഖം മേല്പോട്ടു (ഇടം)			
(7) കുത്തനെ മുഖം മേല്പോട്ടു.			


P X V എന്ന തുക എല്ലാ പരിശ്രമത്തിലും ഒരേ സംഖ്യതന്നെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

N. B. പരിശ്രമഫലം പരിശോധിച്ചാൽ തുകകൾക്കു അധികമൊന്നും വ്യത്യാസമുണ്ടാകയില്ല. തുകകളിൽ കാണാവുന്ന പ്രമാണം (error) ശതമാനമാക്കിയാൽ വീസ്റ്റാറമായിരിക്കും. ആയതിനാൽ P X V സ്ഥിരസംഖ്യയാണെന്നു വിചാരിക്കാം. ഇതാണല്ലോ ബോധിയിൽ നിതമം.

വായുപ്പമ്പ് (air-pump)

വായുപ്പമ്പും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും : ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നു വായു നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതിലേക്ക് വായുപ്പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദ്യുച്ഛീപങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബാർബുകളിൽനിന്ന് വായു നീക്കുവാൻ ഈ ഉപകരണമാണുപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സ്-റേ (X-ray) എന്ന ഉപകരണത്തിലെ വായു നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള വായുപ്പമ്പിന്റെ സഹായത്താലാണ്.

എളുപ്പത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരു പമ്പാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് (ചിത്രം 18). ഇതിൽ B എന്നൊരു ബാരൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ അഥവാ ചാമ്പുകോൽ (P) വേലയെടുക്കുന്നു. പിസ്റ്റണിൽ മേലോട്ടു തുറക്കുന്ന വാൽവ്



ചിത്രം 18

V^2 ഉണ്ട്. ബാരലിന്റെ മേൽഭാഗത്തു ഒരു ചെറു പോരമുണ്ട്. ബാരലിന്റെ ചോട്ടിൽനിന്നു ഒരു ചെറു കഴൽ പുറമെ വരുന്നു. ഈ കഴൽ ഒരു പ്ലാട്ടഫോമത്തിൽ ചെന്നുവസാനിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാട്ടഫോമത്തിന്റെ അടിയിലെ ചെറു കഴലിൽ അടക്കുവാൻ തുറക്കുവാനുള്ള ഒരു പിരിയാണി (Screw) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാരലും ചെറുകഴലും ചേരുന്നേടത്ത് വേറൊരു വാൽവ് (V^1) കാണാം. ഇതും മേലോട്ടു മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഏതു പാത്രത്തിൽനിന്നു വായു നീക്കം ചെയ്യേണമോ അത് പ്ലാട്ടഫോമത്തിന്മേൽ കമഴ്ത്തിവെക്കേണ്ടതാണ്; ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന പോരം പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്നു. പ്രവർത്തനസമയത്തു ചെറുകഴലിലെ സ്ക്രൂ അടക്കണം.

പ്രവർത്തനം:—പിസ്റ്റൺ (Piston) ബാരലിന്റെ അടിയിലായിരിക്കട്ടെ. അതു പൊന്തിക്കുമ്പോൾ V^2 എന്ന വാൽവ് അടയ്ക്കയും V^1 എന്ന വാൽവ് തുറക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽനിന്നു വായു ബാരലിലേക്കു കടക്കും. പിസ്റ്റൺ താഴ്ന്നുവോൾ V^1 അടയ്ക്കയും V^2 തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. വായുവിന്നു വ്യാപകതമുള്ളതിനാൽ V^2 വിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരുന്ന വായു ഈ വാൽവ് വഴിക്കു പിസ്റ്റണിന്റെ മേല്പോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു, ബാരലിലെ ദോരത്തിലൂടെ പുറമെ പോകുന്നു. പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും പൊക്കുമ്പോൾ V^1 തുറക്കുകയും V^2 അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥയിൽ പാത്രത്തിൽനിന്നു വീണ്ടും വായു ബാരലിലേക്കു വരുന്നു. പിസ്റ്റൺ രണ്ടാമതു് താഴ്ന്നുവോൾ V^2 തുറന്നു ഈ വായു പുറമെ പോകുന്നു. ഇമ്മാതിരി, പിസ്റ്റൺ മേല്പോട്ട് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽനിന്നു ബാരലിലേക്കു വരികയും കീഴ്പോട്ടു താഴ്ന്നുവോൾ ബാരലിലെ വായു പുറമെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പാത്രത്തിലെ വായു നീക്കം ചെയ്യുന്നതു എളുപ്പമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. കുറെ പ്രാവശ്യം ചാമ്പുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽനിന്നു നല്ല പോലെ വായു നീങ്ങുന്നതാണ്.

ഈ യന്ത്രത്താൽ പാത്രത്തിലുള്ള വായു മുഴുവനും നീക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. വാൽവുകൾക്കു തുക്കമുണ്ടു്. കുറെ തവണ ചാമ്പുമ്പോൾ വായു ഒരുവിധം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിനാൽ, ബാക്കിയാകുന്ന വായുവിന്നു വാൽവുകളെ തുറക്കുവാൻ ശക്തി പോരാതെ വരും. ഇക്കാരണത്താൽ വായു മുഴുവനും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ, ചില പ്രത്യേക വായുപ്പമ്പുകളാൽ വായു മുഴുവനും നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനത്തെ പമ്പുകളുടെ വിവരണം ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല.

അദ്ധ്യായം 20


മാറു മർദ്ദകപമ്പകൾ

ഫുട്ടു ബാച്ചിൽ കാറു നിറക്കുവാൻ സമ്മർദ്ദനപമ്പാണു് (Compression pump) ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഒരു കഴലും അതിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. കോലിന്റെ അറ്റത്തു ഒരു തോൽവട്ട (Leather washer) മുറുക്കിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. വട്ടിന്റെ ആകൃതി കമഴ്ത്തിവെച്ച ഒരു കോപ്പുയുടേതുപോലെയാണു്. അതിനാൽ പിസ്റ്റൺ ചാമ്പുമ്പോറു വായു കീഴ്പ്പോട്ടു മാത്രമേ അമന്ത കടക്കുകയുള്ളൂ.

19-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതു് ഒരു തരം സമ്മർദ്ദനപമ്പാണു്. A എന്ന പിസ്റ്റണിനെ മേല്പോട്ടുയർത്തുമ്പോൾ B എന്ന വാർവു മേല്പോട്ടു നീങ്ങി പുറമെനിന്നു വായു ബാറലിലേക്കു കടക്കുന്നു. അതേ സമയത്തു C താണു്



ബാറലിൽനിന്നു വായു പുറമേ പോകാതെ അടഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. പിസ്റ്റൺ താഴ്ന്നുവോൾ B അടയുകയും C തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബാറലിലെ വായു ഉഴക്കേണ്ടതെന്ന സ്ഥാനത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുതലായ സ്ഥലത്തിൽ നിറയുന്നു. സൈക്കിൾ പമ്പും



ചിത്രം 19.

ഒരു മർദ്ദകപമ്പാണു്. ചിത്രം 20 നോക്കുക. CD എന്ന പിസ്റ്റൺ പൊള്ളയാണു്. C എന്ന ഭാഗത്തു ഒരു ചെറിയ കഴൽ മൂലം പമ്പിനെ ഒരു റോട്ടു മേക്കും. A എന്ന കഴൽ മേല്പോട്ടു ഉയർത്തിയാൽ പുറമെ നിന്നു വായു പിസ്റ്റണിന്നു

ചിത്രം 20 മീതെ Bയിലൂടെ കഴലിൽ നിറയും. A താഴ്ന്നുവോൾ പിസ്റ്റൺ B കടന്നു മേല്പോട്ടുയരും. അപ്പോൾ കഴലിന്നകം പുറമെയുള്ള വായുവീനോടു ബന്ധം ഇല്ലാതെ ആയിത്തീരും. അതോടൊപ്പം A D എന്ന സ്ഥാനത്തിലെ വായുവിന്റെ മർദ്ദനം അധികമാകും. അപ്പോൾ D എന്ന വാർവു

തുറക്കും. കുഴലിലെ വായു ടയറിലേക്കു കടക്കും. പലതവണ A എന്ന കുഴൽ മാന്യമ്പോൾ ടയറിൽ നല്ലവണ്ണം വായു നിറയും.

അദ്ധ്യായം 21

പീച്ചാങ്കുഴൽ (Syringe)

പീച്ചാങ്കുഴൽ വളരെ ലഘുവായ ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇതിൽ ഒരു കുഴൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം ഒരു ചെറു കുഴലിൽ അവസാനിക്കും. ഈ ചെറുകുഴലിന്റെ അഗ്രം കുറച്ചൊന്നു കൂത്തിരിക്കും. കുഴലിനുള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ചെറുകുഴൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ആക്കി പിസ്റ്റൺ താഴ്ത്തുക. പിന്നീട് പിസ്റ്റൺ ഉയർത്തിയാൽ കുഴലിലേക്കു വെള്ളം കയറിവരും. ഉപകരണം പുറമെ എടുത്തു പിസ്റ്റൺ അമർത്തിത്താഴ്ത്തുമ്പോൾ വെള്ളം ചെറുകുഴലിലെ അറ്റത്തിൽനിന്നു പുറമെ ഉയർക്കേണ്ട പോകും. വെള്ളം ഞെക്കിയാൽ അമരുകയില്ല എന്ന തത്വത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യുവാൻ വൈദ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇതാണ്. സൂചിപ്പോലെയുള്ള ഭാഗം പൊള്ളയാണ്; അതാണ് ചെറുകുഴൽ.

ഫൌണ്ടൻപെനിൽ മഷിനിറക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴൽ ഇതേമാതിരിയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ചില്ലാ വ്യത്യാസം കാണാം. കുഴലിന്റെ മേൽഭാഗത്തു ഒരു ചെറു റബ്ബർസഞ്ചി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലെ പിസ്റ്റൺ.


ആരംഭത്തിൽ കുഴലിന്റെ അറ്റം മഷിപ്പാത്രത്തിൽ താഴ്ത്തും. പിന്നീട് റബ്ബർ ഞെക്കും. അപ്പോൾ കുഴലിലെ വായു കുമിച്ചായിട്ടു പുറമെ പോകും. റബ്ബറിന്റെ മുകളിൽനിന്നു കൈവിരൽ അയച്ചുവീടുമ്പോൾ വായു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു മഷി കയറിച്ചെല്ലും. കുഴൽ പുറമെ എടുത്താൽ മഷി വീഴുന്നതല്ല. പെനിൽ കുഴലിന്റെ അഗ്രം നിർത്തി റബ്ബർ അമർത്തിയാൽ മഷി പെനിനുള്ളിൽ വീഴും.

ചില ഫെൺഷൻപെനുകളിൽ മഷിനിറക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം പെനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അവ 'സ്വയം പൂരിത' (self-filling) ഫെൺഷൻപെനുകളാകുന്നു. പെനിലെ കുഴലിൽ (barrel) ഒരു റബ്ബർ സഞ്ചി ഉണ്ട്. ചുട്ടിവുകൾ കൂടാതെ ഇതു കുഴലിൽ വെച്ചിരിക്കും. കുഴലിന്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഒരു പിട്ടപ്പിൽ ഒരു പിത്തള ലീവർ കാണാം. പെനിലെ 'നിബ്ബ' (Nib) മഷിയിൽ താഴ്ത്തും. നിബ്ബിലെ ചോരം മഷിക്കുള്ളിൽ ആവണം. പിന്നീട് ലീവർ ഉയർത്തും. അപ്പോൾ റബ്ബർസഞ്ചി അമർത്തപ്പെടും. നിബ്ബിലെ ചോരത്തിലൂടെ സഞ്ചിയിലെ വായു പുറമെ പോകും. ലീവർ താഴ്ത്തിയാൽ സഞ്ചിയിലേക്കു മഷി നിബ്ബിലെ ചോരംവഴിക്കു കയറും.

അദ്ധ്യായം 22

ബലപ്പമ്പ്.

ബലപ്പമ്പ (Force pump):— ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ചിത്രം നോക്കുക. ഇതിൽ ഒരു വിസ്താരമായ കുഴൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിൽനിന്നു് ഒരു ചെറുകുഴൽ പുറപ്പെടുന്നു. ഈ കുഴലുകൾ ചേരുന്നേടത്തു് ഒരു വാറമ്പ് ഉണ്ട്. ഈ വാറമ്പ് മേല്പോട്ടു മാത്രം തുറക്കുന്നതാണ്. വലിയ കുഴലിൽനിന്നു് വലത്തുഭാഗത്തു് ഒരു കുഴൽ പൊന്തിനില്ക്കുന്നത് നോക്കുക. വലിയ കുഴലിനോടു ഈ കുഴൽ ചേരുന്ന സ്ഥാനത്തു് V എന്നു അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു വാറമ്പ് ഉണ്ട്. ഈ വാറമ്പ് വലിയ കുഴലിൽനിന്നു് വലത്തുഭാഗത്തുള്ള കുഴലിന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ. വലിയ കുഴലിൽ ഒരു പിസ്റ്റണുണ്ട്. ചെറുകുഴലിന്റെ അറ്റം ഒരു തൊട്ടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിരിക്കുമാറു് വെയ്ക്കുക.



ചിത്രം 21

പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ വിസ്കാരമേറിയ ക്ഷേപിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുകയും അപ്പോൾ വാർവ്വകൾ രണ്ടും അടഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിസ്റ്റൺ മേലോട്ടു വലിയുന്തോറും വലിയ ക്ഷേപിലെ അമച്ഛത്തിൽ ചുരുങ്ങുന്നതിനാൽ തൊട്ടിയിലെ വെള്ളം ചെറുക്ഷേപിന്റെ മേൽഭാഗത്തിലേക്കു വാർവ്വ തുറന്നു വലിയ ക്ഷേപിൽ കടക്കുന്നു. പിസ്റ്റൺ താഴ്ന്നുവോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഘനത്താൽ ഈ വാർവ്വ അടയ്ക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ വെള്ളം V എന്ന വാർവ്വ തുറന്നു വലത്തുഭാഗത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേപിലേയ്ക്കു കടക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പിസ്റ്റൺ പൊന്തിയപ്പോൾ ചെറുക്ഷേപിന്റെ അറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന വാർവ്വ മാത്രം തുറക്കുകയും ജലാശയത്തിലെ വെള്ളം വലിയ ക്ഷേപിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

പിന്നീട്, പിസ്റ്റൺ താഴ്ന്നുവോൾ ഈ വാർവ്വ അടയ്ക്കുകയും V എന്ന വാർവ്വ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം വലത്തേക്ഷേപിൽ അധികം ഉയരത്തേയ്ക്കു പൊന്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ചാവുകോൽ ചാവുമ്പോൾ വലത്തെ ക്ഷേപിൽ ക്രമേണ വെള്ളം പൊന്തിപ്പൊന്തി അറ്റത്തിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു ചാടുന്നു.


തീയെഞ്ചിനുകളിൽ (In fire engines) ഈ കാര്യം ഉപകരണം ഈ പമ്പിനെ പരിഷ്കരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

അദ്ധ്യായം 23

സൈഫൺ

ഈ ഉപകരണത്തിനാൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലുള്ള ദ്രാവകത്തെ താണസ്ഥലത്തേക്കു, ആദ്യസ്ഥാനത്തിലെ ദ്രാവകത്തിന്റെ അടിഭാഗം ഇളകിമറിയാതെ, കൊണ്ടു വരാവുന്നതാണ്. ഈ ഉപകരണത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സമകോണായി വളക്കുപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാസുകുഴലുണ്ടു്. അതിന്റെ ഒരു ഭുജം മറ്റേ ഭുജത്തിനേക്കാൾ

നീളം ചുരുങ്ങിയതാകുന്നു. കഴലിൽ ദ്രാവകം നിറച്ച രണ്ടു വായു വീരലുകൾ കൊണ്ടടക്കുക. രണ്ടു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തു്, ഒരു പാത്രത്തെ കുറച്ചുയരേയായും മറേറതു താഴെയായും വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു. ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ചെറിയ ഭുജത്തിന്റെ വായ കടത്തി കൈവിരൽ വീടുക; വലിയ ഭുജത്തിന്റെ അറ്റം താഴേയുള്ള വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തുക. ഈ അറ്റം താഴേയുള്ള വെള്ളത്തിന്മീതെ വെള്ളം തൊടാതെ നിത്തിയാലും വിരോധമില്ല. കഴൽ നിവർത്തിപ്പിടിയ്ക്കുക. താഴേയുള്ള പാത്രത്തിലേക്കു് വെള്ളം ഒഴുകി വീഴുന്നു. 22-ാംചിത്രത്തിൽനിന്നു ഈ ഉപകരണത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം.



ചിത്രം 22


X-ഉം Y-യും എന്തുകൊണ്ടിച്ഛിച്ചുള്ള ദ്രവസമതലങ്ങളിന്മേൽ വായുവിന്റെ അമർച്ചശക്തിയാണുള്ളതു്. A എന്ന സ്ഥാനം X ന്നേരെ മീതെ ചെറിയ ഭുജത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഇവിടത്തെ അമർച്ചശക്തി ചുരുങ്ങിയതാകുന്നു. X- എന്ന സ്ഥാനത്തിലെ വായുവിന്റെ അമർച്ചശക്തിയിൽ നിന്നു AX എന്ന ദ്രാവക സ്തംഭത്തിന്റെ അമർച്ചശക്തിയെ കീഴിച്ചാൽ A എന്ന സ്ഥാനത്തിലെ അമർച്ചശക്തി കിട്ടും. അതേമാതിരി B എന്ന സ്ഥാനത്തിലെ അമർച്ചശക്തി കിട്ടുവാൻ, വായുവിന്റെ അമർച്ചശക്തിയിൽ നിന്നു BY എന്ന ദ്രാവകസ്തംഭത്തിന്റെ അമർച്ചശക്തി കീഴിക്കണം. BY എന്ന സ്തംഭം AX-നേക്കാൾ നീളമുള്ളതാകുന്നു ആയതിനാൽ B എന്നിടത്തിലെ അമർച്ചശക്തി A എന്നിടത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്നു. ഇതിന്റെ തുക, X എന്ന സമതലത്തിനും Y എന്ന സമതലത്തിനും തമ്മിലുള്ള നീളവ്യത്യാസത്തിന്നു ക്രമാനുപാതമായിരിക്കും- (Proportional) ആ

യതിനാൽ, ദ്രാവകത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, A-യിൽ നിന്നു B- ഭാഗത്തേക്കു വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. AB എന്ന ഭാഗത്തു ഒരു കുഴൽ-അടപ്പു (Stopcock) ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അതു തുറന്നവിട്ടാൽ നീളം ചുരുങ്ങിയഭാഗത്തേക്കു ദ്രാവകം ഒഴുകുകയും ഉൽക്ഷേപണിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലകയും ചെയ്യും.

ഒരു പാത്രത്തിൽനിന്നു മററു പാത്രത്തിലേക്കു വായുവിന്റെ അമർച്ചശക്തിയാണു് ദ്രാവകത്തെ ഒഴുകുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതു്. ആയതിനാൽ, ദ്രാവകം വെള്ളമാണെങ്കിൽ, കടൽ നിലപ്പിൽ AX എന്ന ഉയരം 34 അടിയ്യിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കണം; ഈ 34 അടിയാണല്ലോ ജലഭാരമാപിനിയുടെ ഉയരം.

സൈഫണിന്റെ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാണു് ‘ഫ്ലഷ്-ടാങ്ക്’ (flush tank) ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 23-ാം ചിത്രം പരിശോധിക്കുക. ഇത്തരം തൊട്ടി (ടാങ്ക്-tank) കൾ പട്ടണങ്ങളിലെ കക്കൂസുകളിൽ മലം ഉടനടി കഴുകിക്കളയുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നു.

തൊട്ടിയുടെ വലത്തു വശം കാണുന്നതാണു് സൈഫൻ സുമാർ 3" വ്യാസവും 12" നീളവും ഇതിന്നുണ്ടാവും. ഇതിന്നുള്ളിൽ ഒരു തകിട്ടു



ചിത്രം 23

ഇതിനെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കുന്നു. തകിട്ടു പുറം കുഴലിന്റെ മേൽ തട്ടു് വരെ ഉണ്ടാകയില്ല. 3" താണിട്ടാണുണ്ടാവുക. ഇതിലെ വലത്തെ അറഭാഗമാണു് തൊട്ടിയിലെ വലത്തെ കുഴലിൽ അടഞ്ഞുനില്ക്കുക. ഇടത്തെ അറയുടെ ചോട്ടിലായി ഒരു ചോരമുണ്ടാകും. ഈ സൈഫണിനെ പൊന്തിക്കാൻ ലീവർ ഫ്ലാറ്ററുണ്ടു്. സൈഫൺ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തൊട്ടിയിലെ കുഴലിലൂടെ ആണു് വെള്ളം ഉയർക്കാതെ വീണു കക്കൂസിലെ മലം കഴുകുക.

തൊട്ടിയുടെ ഇടത്തു ഭാഗത്തു കാണുന്ന കഴലിൽകൂടി ആണു തൊട്ടിയിലേക്കു വെള്ളം കടക്കുക. ഈ പ്രവേശനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു അടപ്പുണ്ട്. ആ അടപ്പു തനിയെ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സൗകര്യത്തിന്നാണ് ഒരു ലീവറും അതോടു ഘടിപ്പിച്ച പ്ലാവനി (float)യും ഉള്ളത്.

തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ കഴലിന്റെ മുമ്പം അടച്ചിരിക്കും. വലത്തു കാണുന്ന ചങ്ങല വലച്ചാൽ സൈഫൻ കുറച്ചൊന്നു പൊന്തുകയും വലത്തേ കഴലിലേക്കു വെള്ളം വീഴുകയും തത്സമയം സൈഫണിലെ വലത്തെ അറയിലെ മർദ്ദം ചുരുങ്ങുകയും ഇടത്തെ അറയിൽ നിന്നു വെള്ളം വലത്തെ അറയിൽ നിറഞ്ഞുവശാവുകയും ചെയ്യും. ചങ്ങലയിലെ പിടിവീട്ടു ഉടനെ സൈഫണിന്റെ നീളമുള്ള നാളുമായി, വലത്തെ അറയും അതിനോടു ബന്ധിച്ച കഴലും, പരിണമിക്കും. അതു കൊണ്ടു വെള്ളത്തിന്റെ വിതാനം ഇടത്തെ അറയിലെ ഭാഗത്തിന്റെ മോട്ടിൽ ആകുന്നതുവരെ പുറമെ ഒഴുകും. ഇതേ അവസരത്തിൽ ഇടത്തെ ലീവറിലെ ഫ്ലോട്ടു (പ്ലാവനി) താണുവരും. അപ്പോൾ അടപ്പു പൊന്തും. തത്ഫലമായി, തൊട്ടിയിലേക്കു വെള്ളം കടന്നു അതു നിറയും. കള്ളസിന്റെ മേൽഭാഗത്താണ് തൊട്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക. പിടിക്കുവാനുള്ള ചങ്ങല താണുകിടക്കും. വലത്തെ ഭാഗത്തെ കഴൽ കള്ളസിന്റെ ഉള്ളിലോളം പ്രവേശിച്ചിരിക്കും.

സൈഫണിന്റെ തത്വം വേറേയും ആവശ്യങ്ങൾക്കു പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രയോഗം അധികവും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുക. വീട്ടിലെ മലിനപ്പെട്ട വെള്ളം പുറംചാലുകളിലേക്കു പോകണമല്ലോ. അവകളിലെ ടുഷിച്ച വെള്ളത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വിഷവായുക്കൾ വീട്ടിലെ കഴലുകളിൽക്കൂടെ നല്ലവെള്ളം വന്നു നിറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരരുത്. ഇത് തടയുവാൻ സൈഫൻ ഏർപ്പാടു വെയ്യും.



ചിത്രം 24

ഫോട്ടോകളിൽ കൈ കഴുകുവാനും മറ്റും 'ബേസിൻ'(basin) ഉണ്ടാകും. ചീത്ത വാതകങ്ങൾ കീഴ്ഭാഗത്തിൽ നിന്നു ഇതിൽ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. ഇതിനു 'trap' (കെണി) ഏർപ്പെടുത്തും. കെണിയുടെ സമ്പ്രദായം 24-ാം ചിത്രത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഉള്ളിലേക്കു ചെല്ലുന്ന കുഴലിന്റെ താഴെത്തറ വെള്ളത്തിന്നടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ വലത്തെ കുഴലിലൂടെവാതകങ്ങൾ പൊങ്ങിവന്നു ഇടത്തെ കുഴലിലേക്കു കടക്കയില്ല.

ഇമ്മാതിരി ഒരു കെണി ബേസിന്റെ ഫോട്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ രക്ഷകിട്ടുമല്ലോ.

അദ്ധ്യായം 24

B വായുമണ്ഡലം — വായുവിലെ അംശങ്ങൾ —


ഗുണാത്മകം (Qualitative) യോഗവും ആയതന (Volumetric) യോഗവും

വായു

നാം നിവസിക്കുന്ന ഭൂമിക്കുചുറ്റും വായു ഉണ്ടു്. ഈ വായുവിനെ ആണ് നാം ശ്വസിക്കുന്നതു്. അതിൽകൂടിയാണ് നാം നടക്കുന്നതു്. സുമാർ 200 മൈൽ ദൂരത്തോളം വായുവുണ്ടത്രെ. പക്ഷേ അഞ്ചുമൈലിനു മുകളിൽ വായു വളരെ നേർത്തുള്ളതായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനത്തെ നേരിയ വായുവിനെ ശ്വസിക്കുന്നതു് അതിപ്രയാസമായതാണെന്നു വൈമാനികർ പറയുന്നു. വായുവിനെ കാണുവാനോ മണത്തറിയുവാനോ നമുക്കു് സാധിയ്ക്ക

നില്ലെങ്കിലും നമുക്കു ചുറ്റും അത് ഉണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാം. നാം വേഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒന്നു ചീല്ലറ തടസ്സം ഞെ ചെയ്യുന്നുവെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. ഇത് വായുവാണു്.

വായു ഒരു മൂലധാതുവല്ല.



ചിത്രം 25.

മനുഷ്യർ വളരെക്കാലങ്ങളോളം ഇതൊരു മൂലക (element) മാണെന്നു് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനകാലങ്ങളിൽ, വിശുത ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ബ്ലാക്ക് (Black) പ്രീസ്റ്റലി (Priestley) ലവോയിസിർ (Lavoisier) എന്നിവർ പല പരിശോധനകൾമൂലം സന്ദേഹമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വായു ഒരു മൂലധാതുവല്ലെന്നു്

കാണിച്ചു.

വായുവിന്റെ അപഗ്രഥനം

പരീക്ഷ 1:— 25-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുപോലെ കാർഷ് വളഞ്ഞ ചെറു കുഴലുകൾ എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും U-ന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതും ആയ ഒരു നേരിയ ഗ്ലാസ് കുഴൽ എടുക്കുക. ഒരു ബീക്കറിനുള്ളിൽ ഉപ്പും ചൊടിച്ച് ഹിമവും ചേർത്തു് ഹിമമിശ്രമണത്തിന്റെ നടുവിലായി ഈ ഗ്ലാസ് കുഴലിനെ നിർത്തുക. ചെറു കുഴലിന്റെ ഒരറ്റത്തിൽക്കൂടി വായു വലിച്ചെടുക്കുക. U-കുഴൽ കൂടെ കൂടെ ബീക്കറിൽനിന്നു് പുറമെ എടുത്തു് അതിനെ പരിശോധിക്കുക. ശുഭ്രതാപോലെയുള്ള ഒരു സാധനം U-കുഴലിനുള്ളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. ഹിമമിശ്രണം വെച്ചിട്ടുള്ള ബീക്കറിന്റെ പുറമേയും ഇതേമാതിരിയുള്ള ഒരു മട്ടു് കാണുന്നു. കുഴലിലെ തുഷാരവും ബീക്കറിന്റെ പുറമെയുള്ള സാധനവും വെള്ളമായിരിയ്ക്കുന്നുമില്ല.

ആയതിനാൽ വായുവിൽ ജലാംശം ബാഷ്പാകൃതിയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്നു.

ഇതേ ഫലം എടുപ്പമായ ഒരു പരിശോധനയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വാച്ചഗ്ലാസിൽ നീരില്ലാത്ത ഒന്നരണ്ടു കാൽസിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ (Calcium Chloride) കഷണങ്ങൾ ഇട്ട് ഒരിടത്തിൽ ഗ്ലാസു വെയ്ക്കുക. കുറേ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവ മുഴുവനും ദ്രവമായ്ത്തീരുന്നതായ്ക്കാണാം വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം കാൽസിയം ക്ലോറൈഡിനു ഉണ്ടു്. ഇങ്ങനത്തെ പദാർത്ഥങ്ങളെ വിദ്രാവക (Deliquescent) വസ്തുക്കൾ എന്നു പറയുന്നു.

അങ്ങാടിയിൽനിന്നു മേടിക്കുന്ന ഉപ്പു് മഴക്കാലങ്ങളിൽ തുറന്ന പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈറനായിരിക്കുമല്ലോ. മേടിക്കുന്ന ഈ ഉപ്പു് ശുദ്ധമായതല്ല. ഇതിൽ മാഗ്നീസിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സാധനമാണു് വായുവിൽ നിന്നു് വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതു്. നല്ലതായ ഉപ്പു വിദ്രാവക വസ്തുവല്ല.

ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം സൂര്യന്റെ ചൂടിനാൽ ആവിയായി മാറി വായുവിൽ കലർന്നിരിക്കും. ഈ ആവിയുടെ അളവു് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ വിധമായിരിക്കും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ അധികം പെയ്യുന്നതിനാൽ അവിടങ്ങളിൽ വായുവിൽ നീരാവി ജാസ്തി ഉണ്ടാകും; മരുഭൂമികളിലാകട്ടെ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മരുഭൂമികളിലെ വായുവിൽ 100 ആയതനത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു് ആയതനത്തേക്കാൾ കവിഞ്ഞതോതു് നീരാവിയ്ക്കു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല.

വായുവിലെ നീരാവിയുടെ തോതനുസരിച്ചു് നമുക്കു് ചില ടിവസങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മവും മറ്റു ടിവസങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മീല്ലായ്മയും ഉണ്ടാകും. ടേഫർത്തിന്റെ ഉഷ്ണത രോഗമില്ലാത്ത ഒരുവനു് 98. 6°F ആകുന്നു. ഇതു് നിയതമായതാകുന്നു. ടേഫർത്തിലെ രാസ

വികാരങ്ങളാലാകുന്നു ഈ ഉഷ്ണത നിലനിന്നുപോരുന്നുത്. ദേഹത്തിലെ രചകിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വിയപ്പിന്റെ ബാഷ്പീഭവനത്താലും ദേഹത്തിൽനിന്നു ചൂടു വായുവിലേക്കു വികിർണ്ണമായ് (Radiate) പോകുന്നതിനാലും ആണ് നിയതമായ ഒരു ഉഷ്ണത ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വായു ഈറൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ബാഷ്പീഭവനം പതുക്കെയാണ് സംഭവിയ്ക്കുക; നേരെമറിച്ചു, വായുവിന് വറുചു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഗതി വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും. ഈ രണ്ടവസ്ഥകളിലും നമുക്കു അനുഭവതാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ബാഷ്പീകരണം വേഗം സംഭവിയ്ക്കേണ്ടതിലേക്കു നേരിയ വസ്ത്രം വിശദി എന്നിവ നാം ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്തു് നിലത്തിലും മറ്റും വെള്ളം തെളിയ്ക്കുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാകുന്നു. ദേഹത്തിൽനിന്നു കൂടമായ രീതിയിൽ വേണ്ടേടത്തോളം മാത്രം ബാഷ്പീഭവനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു തുറന്ന വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളിലെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കഴിച്ച കൂട്ടുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നുത്. വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറികൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കേണമെന്നു പറയുന്നതിലുള്ള സാരവും ഈ ബാഷ്പീഭവനവിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിട്ടാകുന്നു.

പരീക്ഷ2:—വെള്ളവീശുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പു (Slaked lime) ഒരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുക. ബീക്കർ നല്ലവണ്ണം കുറേനേരത്തോളം കലക്കി ഒരിടത്തു് വെക്കുക. ദ്രാവകം തെളിഞ്ഞതിനുശേഷം മേൽഭാഗത്തു് ഇരിക്കുന്ന തെളിവായ വിലയനത്തിന്റെ അടിഭാഗം ഇളകാതെ വിലയനത്തെ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു കാക്കു് ഇട്ടു മുടിവെക്കുക. കുപ്പിയിലെ


വെള്ളം പുണ്ണമ്പുവെള്ളമാകുന്നു. ഈ വെള്ളം ഒരു ട്രൈസ്ക്വെബിൽ കുറെ എടുക്കുക. ഈ വെള്ളത്തെ അതിൽ കൂടി വായു കണങ്ങൾ കമിച്ചായിട്ടു വരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തോടു ചേർക്കുക. 26-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുപോലെ ട്രൈസ്ക്വെബിനെ ശരിപ്പെടുത്തി വായുവിനെ വിലയനത്തിൽ കൂടി വലിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. യാതൊരു നിറവുമില്ലാത്ത പുണ്ണമ്പുവെള്ളം പാൽനിറമുള്ളതായ് തീരുന്നു. കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിനു മാത്രമേ ഈ ഗുണമുള്ളൂ.



ആയതിനാൽ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ-ആക്സൈഡ് (Carbon-dioxide) എന്ന വാതകം ഉണ്ടു്.

ചിത്രം 26

പ്രാണികൾ ശ്വാസോച്ഛവാസം ചെയ്യുമ്പോളും, വിറകു കത്തുമ്പോളും പ്രാണികളും സസ്യങ്ങളും ചീഞ്ഞളിയുമ്പോളും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായ വായുവിൽ കലൺ ചേരുന്നു. ഒരു വൻ ദിവസത്തോറും 1000 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഈ വാതകത്തെ ഉച്ഛാസിക്കുന്നു; കല്ലരി, വിരുകു്, എണ്ണ എന്നിവയിൽ നിന്നും ഈ വാതകം ഉത്ഭവിക്കുന്നു; കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ ജീർണ്ണിച്ചു് നശിച്ചിട്ടും ഈ വാതകം വേഗത വായുവിൽ ചേരുന്നു. എന്നിരുന്നിട്ടും 10000 ആയതനത്തിൽ മൂന്നുമുതൽ നാലുഭാഗം മാത്രമേ ഈ വാതകം നിയതമായിട്ടു് വായുവിൽ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ചില



ചിത്രം 27 കാർബൻ ഡൈ - ഓക്സൈഡിൽ സസ്യങ്ങൾ വന്ധിക്കുന്ന മാറ്റം. ട്രെസ്സ്ക്വബിൽ ശേഖരിയ്ക്കുന്നു. പരിശോധിച്ച നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാതകം ഓക്സിജനാണെന്നു് തെളിയും.

ദേശങ്ങളിലെ വായുവിൽ 1%- ഓളമോ കറുപ്പു് അധികമോ ഈ വാതകം വായുവിൽ ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേക്കാം. വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈയോക്സൈഡ് വാതകത്തിനു് മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ച നിയന്ത്രമായ തോതു് ഉണ്ടായിരിക്കുവാനുള്ള കാരണം സസ്യലോകമാകുന്നു. സസ്യങ്ങളിലെ പച്ചനിറത്തോടുകൂടിയ ഭാഗങ്ങൾ സൂര്യവെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ ഈ വാതകത്തെ സ്വീകരിച്ചു് അതിൽ നിന്നു് അംശാരത്തെ വേർവിടുത്തി സസ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ട പോഷകത്തിനെ ശേഖരിയ്ക്കുന്നു. ഈ ഭൗതികവികാരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടു് സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജനെ പുറമെ വിടുന്നു. ഈ സംഗതിയെ ഒരു പരിശോധനമൂലം കാണിക്കാവുന്നതാണു്. കിണററിലെ വെള്ളമോ പമ്പുവെള്ളമോ ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ നിറച്ചു് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ചെടിയുടെ ഒട്ടുതന്നെ വാടാത്ത ഇലകൾ ഇടുക. കാക്കും മറ്റും ഉപകരണങ്ങളും 27-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുമാതിരി ശരിപ്പെടുത്തുക. ഈ സാധനത്തെ സൂര്യവെളിച്ചം കൊള്ളത്തക്കവണ്ണം ഒരിടത്തു് വെയ്ക്കുക. ഇലകളിൽ നിന്നു് ചില വാതകബിന്ദുക്കൾ പൊന്തുന്നതു് പരിശോധിയ്ക്കുക. നാടയിൽ യാതൊരുമാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു് അറിയുക.


പരീക്ഷ 3:—ഒരു മൂശ (Crucible) യെടുത്തു് അതിൽ ഒരു കഷണം മാഗ്നീസിയംനാട ഇടുക. മണ്ണുകൊണ്ടു് നാടമുടുക. മൂശ നല്ലവണ്ണം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക. കുറെ നേരം ചൂടുപിടിച്ചശേഷം മൂശ തണുപ്പിക്കുക. പിന്നീടു് നാട പുറമെ എടുത്തു് പരിശോധിയ്ക്കുക. നാടയിൽ യാതൊരുമാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു് അറിയുക.

മൂശയിൽത്തന്നെ വീണ്ടും നാട ഇടുക. ഇത്തവണ മണ്ണുകൊണ്ടു നാട മൂടാതെ വെയ്ക്കുക. നല്ലവണ്ണം ചൂടപിടിപ്പിയ്ക്കുക. ഫലം എന്തെന്ന് കുറിയ്ക്കുക. സാധാരണത്തിന്നു ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. മൂശയും ലോഹവും തൂക്കിനോക്കേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾ വീലവെയ്ക്കുകയില്ലെങ്കിൽ, ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും തൂക്കം കാണുക. ഈ പരീക്ഷയുടെ അവസാനത്തിൽ മാഗ്നീസിയംനാടയ്ക്കു തൂക്കത്തിൽ വലുതായുണ്ടെന്നു തെളിയും.

സാധനങ്ങൾ കത്തുവാൻ വായു ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ- ചൂടപിടിപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ കത്തിയ സാധനത്തിന്റെ നിറവും ഗുണവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ തൂക്കം അധികരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിച്ചറിയുക. ഈ മാറ്റം ശാശ്വതമാണെന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. വായുവിൽ വേദസാധനങ്ങൾക്കും രാസവികാരം നടക്കുന്നുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായ്, ഇരുമ്പു് തുരുമ്പു് പിടിക്കുന്നു. ഈ വികാരം നടക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ തൂക്കവും വലുപ്പവും. ഈ കാരണത്താലാണ് ഇരുമ്പിന്മേൽ നാം വാർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടതു്; ഇരുമ്പിന്റെ മുകളിൽ ഇനാമൽ (Enamel) പിടിപ്പിയ്ക്കുന്നതും വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ സഹായത്താൽ ഇരുമ്പിന് നാകം പുത്രുന്നതും തുരുമ്പുപിടിക്കാതെ ഇരുമ്പിനെ സൂക്ഷിയ്ക്കുവാനാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ വായുവിന് ഇരുമ്പിനോടു സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉത്ഭവിച്ചേയ്ക്കാം. വായുമുഴുവനും ഈ വികാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

പരീക്ഷ 4:—വാതകങ്ങളെ ശേഖരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം (വാതകശേഖരപാത്രം—Pneumatic trough) ത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചു് ആഴത്തിൽ വെള്ളംവിടുക. ഒരു കാക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയമെഴുകുതിരിക്കുവെക്കണം നിർത്തി വെള്ളത്തിന്മേൽ പെന്തിക്കിടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുക. മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ മണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുപ്പിഭരണി കമഴ്ത്തിവെക്കുക. ഈ ഭരണിയുടെ അടിയിൽ ഒരു പോരം ഉണ്ടു്. അതിന് ഒരു അടപ്പു് ഉണ്ടു്. കമിഴ്ത്തുന്ന സമയത്തു് ഈ അടപ്പു് തുറന്നുവെക്കുക. വെള്ളത്തിന്റെ നിദാ

നം നോക്കിക്കുറിയുക. വേഗത്തിൽ അടപ്പ് സ്ഥാനത്തിൽ വെക്കുക. കുറച്ചുനേരത്തോളം മെഴുകുതിരി കത്തുകയും പിന്നെ കെട്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നു. കുപ്പി ഭരണിയിൽ പതുക്കെപ്പതുക്കെ വെള്ളം കയറുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നെ ഒട്ടുംതന്നെ ചെറിയ കയറാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൊന്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഉയരം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാ




ചിത്രം 28-വായുവിന്റെ 'സംയോജക' മട്ടു പരീക്ഷവാൻ.

യിരുന്ന ഉയരത്തിന്റെ $\frac{1}{5}$ ആകുന്നു. അയതിനാൽ മെഴുകുതിരികത്തുവോൾ വായുവിന്റെ $\frac{1}{5}$ ഭാഗം കത്തുവാൻ ചെലവഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉൾക്കണ്ടേണ്ടിവരുന്നു. പരിശോധനാശേഷം ഭരണിയിലെ മെഴുകുതിരി കത്താത്തതിനാൽ ഭരണിയിൽ ഉള്ള ഖാക്കി വാതകത്തിന് മെഴുകുതിരിവെളിച്ചത്തെ കത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തെളിയുന്നു. ഒരു ചീനപ്പിഞ്ഞാണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കഷണം മഞ്ഞഭാസപരം — (Yellow phosphorus) ഇട്ട് മെഴുകുതിരിക്ക് പകരം ഈ പിഞ്ഞാണത്തെ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിയിരിക്കത്തക്കണ്ണം വെച്ച് ഇതേ പരീക്ഷ നടത്തുക. മഞ്ഞഭാസപരതനിയെ കത്തുന്നതാകുന്നു.

ഇരിമ്പുപൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ പരീക്ഷ കുറച്ചൊരു ഭേദഗതിയോടുകൂടി നടത്താവുന്നതാണ്.

ഒരു മസലിൽ തൂണിയിൽ കുറെ ഇരിമ്പുപൊടി ഇട്ട് മസലിൻ കെട്ടുക. ഒരു ഇരിമ്പുവടിയുടെ അറ്റത്തു് ഈ സഞ്ചി കെട്ടിവെയ്ക്കുക. സഞ്ചിമേൽ വെള്ളം പകരുക. വെള്ളത്തിൽ തല കീഴ്ക്കാത്തുക്കുമായി വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണിയുള്ളിലെ വായുവിൽ സഞ്ചി ഇരിയ്ക്കുത്തക്കവണ്ണം ഇരിമ്പുവടി ഭരണിയിൽ കടത്തുക. ഈ ഉപകരണത്തെ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തേയ്ക്കു് ഇതേ നിലയിൽ വെയ്ക്കുക.



ചിത്രം 29—ഇരുമ്പുപൊടി ഉപയോഗിച്ചു വായുവിന്റെ സംയോജകം അറിയുവാൻ.

ആരംഭത്തിൽ ഭരണിയിൽ ഉള്ള വായുവിന്റെ ആയതനം അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം. മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ, വെള്ളം ഭരണിക്കുള്ളിൽ പൊന്തി നില്ക്കുന്നതായും ഈ പൊന്തയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ആയതനം മുമ്പ് അളന്നു കണ്ടതായ ആയതനത്തിന്റെ $\frac{1}{5}$ ആയ്ക്കിരിയ്ക്കുന്നതായും കാണാം. (ചിത്രം 29) ഭരണിയുടെ മുഖം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗ്ലാസ് തട്ടുകൊണ്ടു് മുഖം മൂടി ഭരണിയെ മേശമേൽ നിവർത്തിവെയ്ക്കുക. പിന്നീട് അതിന്റെ മൂടി തുറന്നു ഉടനെ കത്തുന്ന ഒരു ഈക്കുല് ഭരണിക്കുള്ളിൽ കടത്തുക. തീ ഉടനെ കെട്ടുപോകുന്നു.

ഈ പരിശോധനകളിൽനിന്നു് വായുവിലെ $\frac{1}{5}$ ഭാഗം, സാധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ശക്തിയോടെ സാധനങ്ങളിൽ വികാരത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുവെന്നും വായുവിലെ $\frac{4}{5}$ ഭാഗം ശക്തിഹീനമായതാണെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. ശക്തിയോടുകൂടിയ വായുഭാഗത്തെ ഓക്സിജനെന്നും ശക്തിഹീനമായ വായുഭാഗത്തെ 'നൈറ്റ്റജൻ' (Nitrogen) എന്നും ആണു വിളിക്കാറു്.

വായുവിലെ ഘടകങ്ങൾക്കു് ഒരു കൃത്യമായ തോതില്ല. ഓരോരോ ദിക്കിലെ വായുവിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട തോതിൽ ഓരോരോ മാതിരിയിലാണിരിയ്ക്കുന്നതു്. പട്ടണങ്ങളിൽ

ലും വ്യവസായശാലാഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള വായുവിലെ കാർബൺ-ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ തോത് ഗ്രാമങ്ങളിലും മലമുകളിലും ഉള്ള ഈ വാതകത്തിന്റെ തോതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികമായതാണ്. ജീവജന്തുക്കൾ മാത്രമല്ല വായുവിലെ നീരാവിത്തോതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചൽ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവിധ വായുക്കളിലും കാർബണിനും നൈട്രജിനും ഉള്ള ബന്ധം കൃത്യമായ് ഇരിയ്ക്കാതെ സുമാർ 1:4 എന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു സ്മാൻത്തിലെ വായു പരിശോധിച്ചു കിട്ടുന്ന തോതിന്നനുസരിച്ച് കാർബണിനേയും നൈട്രജിനേയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആയതിനാൽ വായു ഒരു രാസയന്ത്രീകപദാർത്ഥം (Chemical compound) അല്ല; വെറും ഒരു മിശ്രപദാർത്ഥമാണ്.

കാർബൺ, നൈട്രജൻ, കാർബൺഡൈയോക്സൈഡ്, നീരാവി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ചില അപൂർവ്വമായ വാതകങ്ങൾ വായുവിൽ ഉണ്ട്. ഇവയുടെ ആയതനത്തോളം വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്, (സുമാർ 1% മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ). ഈ അപൂർവ്വവാതകങ്ങളിൽ മുഖ്യമായവ ആർഗൺ (Argon) ഹീലിയം (Helium) ആകുന്നു. വായുവിൽ കലർന്നുപോയതെ അതിൽ പാറിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിശ്വസിച്ചുപോകരുത്. വായു തെളിഞ്ഞതും നിർമ്മലമായതും ആണെന്ന് നമുക്കു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ അനവധി പൊടിപടലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒരു ജന്തുദൂരിയിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശകിരണം കടത്തിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ആ കിരണത്തിൽ അനേകം പെടികൾ പാറിക്കിടക്കുന്നതുകാണാം. സസ്യങ്ങൾ, പ്രാണികൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട ഏതുവിധ അണുക്കളും വായുവിൽ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. അണുപ്രാണികൾ (Bacteria), ചെടികളുടെ പരാഗം—പൂമ്പോടി— (Pollen), വൈക്കോൽകഷണങ്ങൾ മുതലായവ ഉള്ളതായി പരിശോധനകൾ കാണിച്ചതും. പട്ടണങ്ങളിലെ വായുവിൽ പൊടിപടലം വേണ്ടതിലധികം ഉണ്ടാകും. ഓരോ പട്ടണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തെ അനുസരിച്ച് ഈ പൊ

66 മൂലധാതുക്കൾ വായുവിൽ ചൂടുപിടിച്ചാൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

ടിപടലത്തിന്റെ തോത് കാരോ വിധമായിരിയ്ക്കും. സമുദ്രതലത്തിൽ പൊടിയുടെ രോത് വളരെ ചുരുക്കമെ ഉണ്ടാകയ്ക്കുമ്പോൾ മലമുകളിൽ ഒട്ടുതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല.

സംഗ്രഹം:— വായുവിലെ പ്രധാന അംശങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഓക്സൈഡ്, ഹീലിയം എന്നിവയാണ്. അപൂർവ്വമായ ആർഗൺ, ഹീലിയം എന്നിവയും വായുവിലെ അംശങ്ങളാണ്.

വായു ഒരു രാസയൗഗികപദാർത്ഥമല്ല. അതൊരു മിശ്രപദാർത്ഥമാണ്. വായുവിൽ $\frac{1}{5}$ ഭാഗം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, $\frac{4}{5}$ ഭാഗം നൈട്രജൻ ആണ്.

അദ്ധ്യായം 25

ചില മൂലധാതുക്കൾ വായുവിൽ ചൂടു പിടിച്ചാൽ

അവയിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ, ഓക്സൈഡ്, ഹീലിയം എന്നിവയാണ്. അപൂർവ്വമായ ആർഗൺ, ഹീലിയം എന്നിവയും വായുവിലെ അംശങ്ങളാണ്.

കത്തുന്ന മാഗ്നീസിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചെലുക്കുന്നത് അതിശോഭയോടെ കത്തുന്നു. അവസാനം ഒരു വെളുത്ത സാധനം ബാക്കിയാകുന്നു. ഈ സാധനം മാഗ്നീസിയം-കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്.

ഇതേ വളഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ പദാർത്ഥം വായുവിൽ കത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടായിത്തീർന്നത്.

ഗന്ധകം അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ (sulphur) വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ അതൊരു വാതകമായി മാറിപ്പോകുന്നു. ഇതിന്നൊരു പ്രത്യേക വാസനയുണ്ട്. ഈ വാതകത്തെ സൾഫർ-ഡൈ-ഓക്സൈഡ് (sulphur-di-oxide) എന്നു പറയുന്നു. ഗന്ധകം ഓക്സിജനിൽ പ്രജ്വലിച്ചു കത്തുമ്പോഴും സൾഫർ-ഡൈ-ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണു് ഉണ്ടാവുക.

ഒരു പരീക്ഷണ കഴലിൽ ഗന്ധകം ഇട്ടു കഴൽ ചൂടി പിടിപ്പിക്കുക. അതു ഉരുകി മഞ്ഞയായ ഒരു ദ്രാവകമാകും. വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാൽ ദ്രാവകം കറുത്തു തുടങ്ങുകയും കറുത്ത കട്ടിവെച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ചൂടിപ്പിടിക്കുന്നതു തുടർന്നാൽ നല്ലവണ്ണം കറുത്തു വശാവുകയും പാത്രം കമഴ്ത്തിയാൽ കൂടി ഒഴുകാത്ത വിധത്തിൽ അതു കട്ടിയുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് നിറം കറുത്തിരുണ്ടു വരും. പക്ഷേ സാധനം ഒഴുകിത്തുടങ്ങും. അവസാനം ഇതു തിളക്കം. കഴലിൽ നിന്നു വരുന്ന ഗന്ധകവാതകം തീ പിടിക്കുകക്കൂടിചെയ്യും.

ഗന്ധകം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയതും തീ നീക്കം ചെയ്യുക. ചൂടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ദാഹം വിഷയവും പ്രതിലോമമായി കണ്ടുതുടങ്ങും.

ചെമ്പു് അഥവാ കോപ്പർ വായുവിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മാറുന്നതാശ്ശാണകയില്ല. അതു ഓക്സിജനിൽ കത്തുന്ന പക്ഷംകുറഞ്ഞ ഒരു പൊടിയായിത്തീരും. ഈ പൊടി കോപ്പർ-ഓക്സൈഡ് ആണ്. ചെമ്പുപാത്രം പെരുമാറാതെ വായുവിൽ കിടക്കുന്ന പക്ഷം കുറച്ചൊന്നു കറുത്തോ നീല നിറമായോ മാറും. ചെമ്പു വായുവിലെ ഓക്സിജനോടു ചേർന്നു കോപ്പർ-ഓക്സൈഡ്

68 മൂലധാനക്കുറവായവിൽ ചൂടുപിടിച്ചാൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വായുവിൽ നീരാവി ഉണ്ടങ്കിൽ ഇതു വായുവിലെ കാർബൺ-ഡൈഓക്സൈഡോട് സംയോജിച്ച കോപ്പർ-കാർബോണൈറ്റ് ആയിത്തീരുന്നതാണ്.

പദാർത്ഥങ്ങൾ വായുവിൽ ഓക്സൈഡുകളായി മാറുന്നത് രണ്ടു പ്രകാരത്തിലാണ്. ഒരു രീതിയിൽ ഈ മാറ്റം പെട്ടെന്നുണ്ടാകും. മറേത്തിൽ കാലതാമസം നേരിടും.

ഈ മാറ്റം നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചൂടോ വെളിച്ചമോ ഉണ്ടാകും ഓക്സിജൻ(oxygen)നോട് നേരിട്ടു ചേരുമ്പോൾ നല്ല ചൂടും അതിശോഭയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ സംപർക്കം പതുക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചൂടെല്ലാം വായുവിനാലോ മറോ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. ഇരുമ്പു വായുവിൽ തുരുമ്പുപിടിക്കുന്നതു നോക്കുക. അധികം ചൂടു ഉണ്ടെന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. മാഗ്നീസിയം വായുവിൽ കറേ ടിവാസത്തേക്കു തുറന്നു വെക്കുക. അതു വെളുത്ത പൊടിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വലിയ ചൂടോ വെളിച്ചമോ അനുഭവമാകുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഉത്തുതമാകുന്ന ചൂടു നഷ്ടമാകാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഏതു സാധനത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ചൂടുണ്ടാകും. ചില എണ്ണകളിൽ വായുവിൽതന്നെ ഓക്സീകരണം (oxidation) നടക്കും അങ്ങിനത്തെ ഒരണ്ണുതാണ് ലിൻസീഡെണ്ണ (linseed oil). ഈ എണ്ണ ചായക്കൂട്ടിൽ ചേർക്കുന്നു. ലിൻസീഡെണ്ണ തുടച്ചു ഒരു തുണിക്കെട്ടു അജാഗ്രതയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതു പ്രത്യേകിച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. അതു വായുവിനോടു ചേർന്നു വികാരത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടു നഷ്ടപ്പെടാത്തപക്ഷം താപക്രമം (temperature) വർദ്ധിച്ചു തുണിക്കെട്ടു കത്തും. തുണി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഉടനെ മാറ്റം നടന്നു എന്നു വന്നേക്കില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ ടിവാസം കഴിഞ്ഞു സംഭവിച്ചേക്കാം.

ഇതുപോലെത്തന്നെ ഈർപ്പപ്പൊടി കൂട്ടിയിടുന്നതോ, കീറിക്കടലാസ്സു കൂട്ടിയിടുന്നതോ അപകടമാണ്. ഇവ വായുവിനോടു ചേർന്നുവെള്ളമുണ്ട്. ജലനാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു തീർന്നു. ഉഷ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ വൈക്കോൽക്കണ്ട കാരണം കൂടാതെ തീ പിടിക്കുന്നതായ്ക്കാണാം. വൈക്കോൽ വായുവിനോടു ചേർന്നു മുട്ടു വലിച്ചു തീർന്നുയരുന്നതാണ്.

കരി അഥവാ കാർബൺ വായുവിൽ കത്തുന്നു. കത്തുമ്പോൾ കാർബൺ-ഡൈ-ഓക്സൈഡായി മാറുന്നു.

അദ്ധ്യായം 26

ഓക്സൈഡുകൾ.

മൂലക(element)ങ്ങൾ ഓക്സിജനിനോടു ചേർന്നുവെള്ളമുണ്ട്. ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുക. രാസപരിണാമങ്ങൾ(chemical change)കൾ ഏതു പദാർത്ഥങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലയോ അവയാണ് മൂലകങ്ങൾ.

ഇരിമ്പ് (iron) തുരുമ്പുപിടിച്ചാൽ ഇരിമ്പ്-ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇരിമ്പുപൊടി ഉപയോഗിച്ചു 4-ാം പരീക്ഷ 24-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നടത്തിയല്ലോ. അതിലെ ഇരിമ്പുപൊടി നാലഞ്ചു ദിവസംകഴിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തുരുമ്പുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. നന്നവുള്ള വായുവിലെ ഓക്സിജനിനോടു ഇരിമ്പ് സംയോജിച്ചു ഓക്സൈഡാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇമ്മാതിരി സംയോജിക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്ക് തൂക്കം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ചപ്പോൾ സംയോജിക്കുമ്പോഴും ഘനം വലിക്കും.

ഒരു മൂലയും അതിൽ ചേർന്ന മാഗ്നീസിയവും കൃത്യമായി തുക്കുക. മൂല അടച്ച ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക. കൂടക്കൂടെ മൂല തുറന്നു ഉടനെത്തന്നെ അടക്കുക. കുറെ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മൂല തുറന്നു പിച്ച് തുക്കുക. തുക്കം അധികമായിരിക്കും. മൂലക്കുള്ളിൽ മാഗ്നീസിയം അല്പ ഉണ്ടായിരിക്കുക. വെളുത്തനിറമുള്ള മാഗ്നീസിയമാക്സൈഡ് ആണ് ബാക്കിയാവുക. മൂലക-ഓക്സൈഡ് മൂലകത്തേക്കാൾ തുക്കം കൂടിയതാണ്.

ഓക്സീകരണം നടക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ തുക്കം അധികമാകുന്നു.

ഓക്സൈഡുകൾ മൂന്നു തരമാണ്. അവ അമ്ളിക-ഓക്സൈഡ് (acidic oxide) ലവണാധാര-ഓക്സൈഡ് (basic oxide) ഉദാസീന-ഓക്സൈഡ് (neutral oxide) എന്നിവയാണ്. അലോഹ(non-metal)ങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഓക്സൈഡുകളെ വെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കുക. എന്നാൽ ദ്രവത്തിനു ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായ്ക്കാണാം. ഇവ നീലലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇവ സാന്ദ്ര(concentrated)വസ്ഥയിൽ തീക്ഷ്ണസ്വഭാവീകളാകുന്നു. വീതും ചുരുങ്ങിയ വിലയന (solution)ങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരു പുളിപ്പരസം ഉണ്ടാകും. അമ്ളങ്ങളുടെ സാന്ദ്രവിലയനങ്ങളിൽ വെള്ളംചേർത്തു വീതും ചുരുക്കിട്ടുവേണം സ്വാദുനോക്കാൻ. അലോഹ-ഓക്സൈഡുകളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിലയനങ്ങളെ അമ്ള(acid)ങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഗന്ധകം(സൾഫർ)തന്നെ ഓക്സൈഡിൽനിന്നു സൾഫ്യൂറിക് അമ്ളം, കാർബൺ തന്നെ ഓക്സൈഡിൽനിന്നു കാർബോണിക് അമ്ളം, ഭാസ്വരം (ഫോസ്ഫറസ്) തന്നെ ഓക്സൈഡിൽനിന്നു ഫോസ്ഫോറിക് അമ്ളം, നൈട്രജൻ തന്നെ ഓക്സൈഡിൽനിന്നു നൈട്രിക് അമ്ളം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. ഇത്തരം അലോഹ-ഓക്സൈഡുകളേയാണ് അമ്ളിക-ഓക്സൈഡുകൾ എന്നു വിളിക്കാറുള്ളത്.

ലോഹങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഓക്സൈഡുകളെ രണ്ടു വകയ്ക്കായിപ്പിരിക്കാം. അവ ലവണാധാര-ഓക്സൈഡുകളും ഉദാസീന-ഓക്സൈഡുകളുമാണ്.

ലോഹ-ഓക്സൈഡുകളിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുക്കിയാൽ ചിലവ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ അലിയുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങിനത്തെ ലോഹ-ഓക്സൈഡുകളെയാണ് ലവണാധാര-ഓക്സൈഡുകൾ എന്നു പറയാൻ. വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്തവ ഉദാസിന-ഓക്സൈഡുകൾ ആണ്.

കാൽസിയം-ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തോടു നല്ലവണ്ണം സംയോജിക്കും. അതുപോലെതന്നെ പൊട്ടാസിയം-ഓക്സൈഡും സോഡിയം-ഓക്സൈഡും ചേരും. മാഗ്നീസിയം-ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം അലിഞ്ഞുചേരുകയില്ല. കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്, ഇറിമ്പാക്സൈഡ്, സിങ്കാക്സൈഡ്, നിക്കൽ-ഓക്സൈഡ്, സ്റ്റീലിക്സൈഡ് എന്നിവ തീരെ അലിയുകയില്ല.

ലവണാധാര-ഓക്സൈഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന വിധയനങ്ങൾ ക്ഷാര(alkali)ങ്ങൾ ആകുന്നു. നേർത്ത (dilute) ക്ഷാരങ്ങൾക്കു തീക്ഷ്ണമായ സ്വാദുണ്ടു്; വീര്യ ക്ഷാരങ്ങളുടെ സ്വാദു നോക്കരുതു്. ക്ഷാരങ്ങൾ ഖാദക(corrosive)ങ്ങളാണ്. നേർത്ത ക്ഷാരങ്ങൾ ചൂവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലനിറമാക്കും. ക്ഷാരങ്ങൾ അമ്ളങ്ങളോടു യോജിച്ചു ലവണ(salt)ങ്ങൾ തരുന്നു. ഉദാഹരണമായി കാൽസിയം ഫൈഡ്രോക്സൈഡോടു് ഫൈഡ്രോക്ലോറിക്ക് അമ്ളം (Hydrochloric acid) ചേർത്താൽ കാൽസിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന ലവണം ഉണ്ടാകും.

കാൽസിയം ഫൈഡ്രോക്സൈഡ് + ഫൈഡ്രോ

ക്ലോറിക്ക് അമ്ളം →

കാൽസിയം ക്ലോറൈഡ് + വെള്ളം

ഉദാസിന ഓക്സൈഡുകളോടു അമ്ളങ്ങൾ ചേർത്താലും ലവണങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഉദാ: കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് + നൈട്രിക് അമ്ളം → കോപ്പർ-നൈട്രിയിറ്റ് + വെള്ളം.

ശ്വാസകോശങ്ങളും മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും.

ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല. ഈ വ്യാപാരം നടത്തുവാൻ മനുഷ്യക്കു ശ്വാസനേന്ദ്രിയമാണുള്ളത്. ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ കാർഷ്ണിജൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിനെ നാം പുറമെ വിടുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.


ശ്വാസനേന്ദ്രിയത്തിൽ പ്രധാനമായതു ശ്വാസകോശ(lung)ങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ മാറിടത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു ശ്വാസകോശങ്ങളുണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ആയി ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്നു പുറത്തേയ്ക്കു രണ്ടു വഴികളുണ്ട്. ഒരു വഴി മൂക്കിൽ കൂടിയാകുന്നു. ഇതു നാസാമാഗ്ഗമാകുന്നു. മറ്റൊരു വഴി വായിൽ കൂടിയാകുന്നു. ഇതു മുഖമാഗ്ഗമാകുന്നു. ഈ രണ്ടു മാഗ്ഗങ്ങളും തൊണ്ടയിൽ വെച്ചു ചേരുന്നു. നാസാമാഗ്ഗത്തിൽ രണ്ടു കഴലുകൾ ഉണ്ട്. ഈ കഴലുകളെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭിത്തിയാകുന്നു. ഈ ഭിത്തി നാസാമാഗ്ഗത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ചെല്ലുന്നു. നാസാമാഗ്ഗം എല്ലാപ്പോഴും തുറന്നിരിയ്ക്കും. മുഖമാഗ്ഗത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപോലെ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യാം. ആഹാരം കഴിഞ്ഞുണ്ടതിലേക്കു വായു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റിയ അവയവങ്ങളെ കീഴും വായിൽ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കു വായു ചെല്ലും. ആഹാരത്തിനുള്ള വഴിയും



ചിത്രം 30
ശ്വാസോച്ഛ്വാസം
ചെയ്യുമ്പോൾ വായു
പോകുന്ന വഴി

വായുവിനുള്ള വഴിയും തൊണ്ടയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തിൽ വ്യതാസപ്പെട്ടവയാണു്. അന്നനാള(gullet)ത്തലുടെ ആഹാരം ആമാശയത്തിലേക്കു് പോകുന്നു.

ശ്വാസനാളം (wind-pipe) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതും മൂലാസ്ഥി(cartilage) കൊണ്ടുള്ള തുമായ ഒരു കഴൽവഴിനാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും ഒന്നിനോടൊന്നു തൊട്ടു് സമാന്തരമായി കിടക്കുന്നു. ശ്വാസനാളം മുൻഭാഗത്തും അന്നനാളം അതിന്റെ പിന്നിലും ആകുന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ശ്വാസനാളം എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും. എന്നാൽ ആഹാരം ഉള്ളി



ചിത്രം 31—ശ്വാസകോശത്തിലെ ചെറുവായുസെല്ലുകൾ.

ലേക്കു ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്വാസനാളമുഖം (glottis) ഉപജ്ഛിഹ്വാവിനാൽ മൂടപ്പെടുന്നു. ആഹാരം ഉള്ളിലേക്കു പോയ ഉടനെ ഈ മുഖം തുറന്നുകളയും. ശ്വാസനാളം കീഴോട്ടു നീണ്ടുപോയി മാറിടത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽവെച്ചു രണ്ടു ഉപശ്വാസനാളങ്ങളായി പിരിയുന്നു. ഒരനാളം ഇടത്തെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും വലത്തുഭാഗത്തുള്ള നാളം വലത്തെ കോശത്തിലേക്കും ചെല്ലുന്നു. ഈ ഉപശ്വാസനാളങ്ങൾ കോശങ്ങളിൽവെച്ചു ഭിന്നിച്ചു് ഭിന്നിച്ചു് നേരിയ സൂക്ഷ്മശ്വാസനാളങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മശ്വാസനാളങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലകളിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മശ്വാസനാളങ്ങളുടെ അറ്റത്തിൽ നേരിയ വായുസഞ്ചികൾ ഉണ്ടു്. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അധികഭാഗ

വും ഈ കഴലുകളാലും വായുസെല്ലുകളാലും നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഓരോ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പ്രത്യേക രക്തനാളികൾ ഒഴുകുന്നു. ഹൃദയത്തിൽനിന്നു അശുദ്ധരക്തത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തനാളി പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു നേരിയ സൂക്ഷ്മരക്തനാളികളായി പരന്നു വായുസഞ്ചികളുടെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചിരിക്കും. ഈ സൂക്ഷ്മനാളികൾ ഇല്ലാത്ത ശ്വാസകോശഭാഗംതന്നെ ഇല്ല.

അദ്ധ്യായം 28

ശ്വാസകോശങ്ങളും മനുഷ്യൻ ശ്വസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും
(തുടർച്ച)


ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽവെച്ചു വായുവിലെ ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്കു ചേരുകയും രക്തത്തിലെ മലിനവാതകമായ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ കടന്നു ശ്വാസനാളംവഴി മൂക്കിലൂടെ പുറമെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശ്വാസനേന്ദ്രിയം മാത്രമല്ല ഈ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതു്. നാം ഉച്ഛ്വാസി (inspire) ക്കുന്ന ഓക്സിജൻ രക്തംവഴി ദേഹത്തിലെ 'ടിഷ്യൂ'കളിൽ വ്യാപിക്കുന്നു അവയിലുള്ള മലിനവാതകമായ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ ചേർന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തി, ശ്വസി (respire) ക്കുമ്പോൾ നിഗ്നമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ രണ്ടു വ്യാപാരങ്ങൾ നാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ വ്യാപാരത്തിൽ ധാതുക്കളെല്ലാം ഏല്പെടുന്നു. ഈ വ്യാപാരം 'ടിഷ്യൂശ്വാസനം' (Tissue respiration) ആകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എല്പെടുന്നു. ഇതു 'ശ്വാസകോശശ്വാസനം' (Pulmonary respiration) ആകുന്നു.

ശ്വാസകോശമുറക്കൊള്ളുന്ന വായുവിലെ കാക്സിജൻനിന്റെ സ്വീകരിച്ച ധാതുക്കളിലേക്കു എത്തിക്കുന്നത് രക്തമാകുന്നു. ധാതുക്കളിലെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിനെ ശേഖരിച്ചു ശ്വാസിക്കേണ്ടതിലേക്ക് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതും രക്തം തന്നെയാകുന്നു. ഈ ഏല്പാടു നടക്കേണമെങ്കിൽ, ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ സദാപി ചലനം ഉണ്ടാകണം. ഉള്ളിലേക്കു വായു കടക്കുകയും അതിൽനിന്നു കാക്സിജൻ ചോരയിൽ ചേരുകയും വേണം; ചോരയിൽനിന്നു കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കു കടക്കുകയും അവയിൽനിന്നു പുറമെ ഒഴിയുകയും വേണം.

‘ശ്വാസകോശശ്വാസന’ത്തിൽ രണ്ടു വ്യക്തങ്ങളായ ക്രിയകൾ ഉണ്ടു്. വായു ഉള്ളിലേക്കു പോകുന്നത് ഉച്ഛ്വാസമാകുന്നു. കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് പുറമെ പോകുന്നത് ശ്വാസമാകുന്നു. ഒരു പുരുഷനിൽ മിനുട്ടിനു 16 തവണ ഈ രണ്ടു വ്യാപാരങ്ങളും നടക്കുന്നു. മാറിടത്തിലെ മാംസപേശികളും മററും വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സംകോചവികാസങ്ങൾ ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടന്നുപോകുന്നു. മർദ്ദം (pressure) അധികമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു ചുരുങ്ങിയ സ്ഥാനത്തേക്കു വാതകം ചെല്ലും; ഉണ്ണുതയിൽ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിന്റെ ആയുതനം മർദ്ദത്തിന്റെ വിലോമാനുപാതം ആയിരിക്കും. ഈ വിഷയം പ്രകൃതിയിലെ മുഖ്യമായ ഒരു നിയമമാണു്.

ശ്വാസകോശങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ, അവയിലെ ആയുതനം അധികമാവുകയും മർദ്ദം അതിനോടൊപ്പം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.

യുന്നു. ആയതിനാൽ വായു ഉള്ളിലേക്കു പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു. ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ, ഉള്ളിലെ ആയതനം, ചുരുങ്ങുകയും അതിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും വാതകം പുറമെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ശ്വാസകോശത്താൽ മാറിടം നിറഞ്ഞിരിക്കും. ആയതിനാൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ വികസിക്കുവാൻ മാറിടുകോശം വിസ്താരം വെക്കുന്നു. മാറിടത്തിലെ മാംസപേശിക (muscle)ളുടെ ചലനമാകുന്നു ഈ വിസ്താരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശ്വാസകോശങ്ങൾ വിസ്താരം വെക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനം സംഭവിക്കുന്നു. മാറിടത്തിലെ മാംസപേശികൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ, മാറിടപഞ്ചരത്തിന്റെ വിസ്താരം ചുരുങ്ങുകയും ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ആയതനം ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നാം ശ്വസിക്കുന്നു.



ചിത്രം 32—മാറിടകോശത്തിന്റെ വിസ്താരം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അധികം ആകുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന ചിത്രം.

മാറിടപഞ്ചരത്തിന്റെ മുൻവശത്തു മദ്ധ്യത്തിൽ മാറില്ല (Breast bone) ഉണ്ടു്. പാശ്ചാത്യങ്ങളിൽ വാരിയെല്ലുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ വാരിയെല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ മാംസപേശികൾ ഉണ്ടാകും. ഈ പഞ്ചരത്തിന്റെ പിൻവശത്തിൽ നട്ടെല്ലു കാണാം. വാരിയെല്ലുകൾ നട്ടെല്ലിലെ കശേരുകളിൽ ചെന്നുവസാനിക്കുന്നു. ഈ മാറിടപഞ്ചരത്തിന്റെ മേൽഭാഗം കഴുത്താകുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തേയും ഉദരത്തേയും വേർപെടുത്തുന്ന ഉരേവിതാനം (diaphragm) ഈ അറയുടെ അടിയിൽ കാണാം;

ആകപ്പാടെ പഞ്ഞജരം പൊള്ളയായ ഒരു ശക്തി (cone) ന്റെ ആകൃതിയിലാകുന്നു. 12 ജോടി വാരിയെല്ലുകൾ ഉണ്ട്. കഴുത്തിൽനിന്നു ഉദരത്തോടടുക്കുമ്പോൾ വാരിയെല്ലുകളുടെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു. വാരിയെല്ലുകളെ രണ്ടുതരങ്ങളായ മാംസപേശികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഒരുതരം പേശി ചുരുങ്ങുമ്പോൾ വാരിയെല്ലുകൾ പൊതുവെ മറേറത്തരം പേശി സംകോചക്രിയയിൽ ഏല്പിച്ച് വാരിയെല്ലുകളെ താഴ്ത്തുന്നു.

ശ്വാസനം നടക്കുമ്പോൾ വാരിയെല്ലിലെ ഒരു കൂട്ടം മാംസപേശികൾ ചുരുങ്ങുകയും വാരിയെല്ലുകൾ പൊതുവെ മെട്രിയം ചോട്ടിലെ വാരിയെല്ലുകൾ നീളമുള്ളവയാകുന്നു. അവ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നീളം ചുരുങ്ങിയ വാരിയെല്ലുകളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ അവ വരുന്നു. അപ്പോൾ നെഞ്ചറയുടെ വീലങ്ങനെയുള്ള വീതി വലുതായിത്തീരുന്നു. വാരിയെല്ലുകളോടൊന്നല്ലോ മാറ്റെല്ല ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാരിയെല്ലുകൾ പൊതുവെ മാറ്റെല്ല മുനോക്കം പോകുന്നു. ഈ തള്ളലിനാൽ പിന്നിൽനിന്നു മുൻഭാഗത്തേക്കു മാറിടപെങ്ങരം നീളം വെക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമെ ഉദരവിതാനം ചുരുങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അതു പരന്നു വശാകുന്നു. സാധാരണമായി ഇതു കഴുത്തുഭാഗത്തേക്കു കഴിവോടുകൂടിയതായിരിക്കും. ഇതു ചുരുങ്ങുകയും ഇതിന്റെ കഴിവു നിവരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദരഭാഗത്തേക്കു ഇതു താണു ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ 'മാറുകൂട്ട' മുകളിൽനിന്നു കീഴോട്ടു നീളം വെക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ മാറിടപെങ്ങരത്തിന്റെ വിസ്താരം വർദ്ധിക്കുന്നു; ശ്വാസകോശങ്ങൾ വികസിക്കുകയും വായു ഉള്ളിലേക്കു ഉൾക്കോടെ വരികയും ചെയ്യുന്നു.

ശ്വാസനവേളയിൽ ഇപ്പോൾ വിസ്തരിച്ച വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം വിപരീതരീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ചുരുങ്ങിയ പേശികളല്ലാത്തവ ഈ വ്യാപാരത്തിൽ ചുരുങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ വാരിയെല്ലുകൾ താഴുന്നു. ഈ താഴ്ചയിനാൽ പെങ്ങരത്തിന്റെ വീലങ്ങനെയുള്ള നീളം ചുരുങ്ങുന്നു. മാറ്റെല്ല പിന്നോക്കം നീങ്ങി മുൻഭാഗത്തിനും പിൻഭാഗത്തിനും ഇടക്കുള്ള നീളവും ചുരുങ്ങുന്നു. ഇതിനും പുറമെ, ഉദരവിതാനപഞ്ചം കഴിവുള്ള പൂർവ്വാവസ്ഥയെ

പ്രാപിച്ച മാറിടുകോശത്തിന്റെ ആഴം ചുരുങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ യെല്ലാം ഫലമായി മാറിടപഞ്ജരത്തിന്റെ ആയതനം ചുരുങ്ങുകയും ശ്വാസകോശങ്ങൾ സംകോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു.

അദ്ധ്യായം 29

മനുഷ്യൻ ശ്വാസകോശം സമ്പ്രദായം.

(തുടർച്ച)

ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചലനത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മനാളികളിൽവെച്ചു രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കുകതന്നെ. ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ സഞ്ചികളുടെ ചുറ്റും സൂക്ഷ്മരക്തനാളികൾ പരന്നുകിടക്കുന്നതായി നാം പഠിച്ചുവല്ലോ. ശ്വാസനാളം പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു രോമസദൃശങ്ങളായ കുഴലുകളായിത്തീർന്ന ശ്വാസകോശസഞ്ചികളിൽ അവസാനിക്കുന്നതായി നമുക്കു അറിയാമല്ലോ. ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കു വരുന്ന ചോരയിൽ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിന്റെ തോത് അധികരിച്ചിരിക്കുകയും ഓക്സിജന്റെ തോതു കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നാം ഉച്ഛ്വാസിക്കുന്ന വായുവിൽ ഓക്സിജന്റെ തോതു വർദ്ധിച്ചു കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിന്റെ തോതു ചുരുങ്ങിയും ഇരിക്കും. സൂക്ഷ്മരക്തനാളികളുടെ ഭിത്തികളും വായുസഞ്ചികളുടെ ഭിത്തികളും വളരെ നേരിയവയാകുന്നു. ആയതിനാൽ ചോരയിലെ വാതകത്തിനും ശ്വാസകോശത്തിലെ വായുവിനും തമ്മിൽ വ്യാപനം (Diffusion) നടക്കുന്നതാണ്. ഈ വ്യാപനം ചില നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി വായുസഞ്ചിയിൽനിന്നു ചോരയിലേക്കു ഓക്സിജനും ചോരയിൽനിന്നു വായുസഞ്ചിയിലേക്കു കാർബൺഡൈഓക്സൈഡും പ്രസരിച്ചുതുടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ കൈമാറ്റത്താൽ ചോരയിലെ മലിനമായ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് നീങ്ങി

പ്രോക്തകയും ഓക്സിജൻ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചോരശുദ്ധമായിത്തീർന്നു ഹൃദയത്തിലേക്കു് ഒഴുകുന്നു. ഹൃദയത്തിൽനിന്നു ശുദ്ധമായ ചോര അംഗങ്ങളിലേക്കു് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അംഗധാതുക്കൾക്കു ഈ വായു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ കടൽമാലയിൽനിന്നു രക്തത്തിൽ കലർന്നു ചേർന്ന ആഹാരസാരം അംഗധാതുക്കളിൽ വന്നു നിറഞ്ഞിരിക്കും. ടിഷ്ണു ശ്വസനത്താൽ ധാതുക്കളിൽ ഓക്സിജൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ആഹാരസാരത്തിന്നു ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ക്രിയയുടെ ഫലമായി ധാതുവർദ്ധനക്കു ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. തൽഫലമായി, നമുക്കു പ്രവർത്തനശക്തി ലഭിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 30


സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം.

മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളും ശ്വസിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ സസ്യങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്നു. നല്ലവായു ജന്തുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിനെ അവ പുറത്തേക്കു വിടുന്നു.

ഇതുപോലെ സസ്യങ്ങളും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു പരിശോധനകൾമൂലം മനസ്സിലാക്കാം.

ഒരു ഫ്ലാസ്കം അതിന്നുപറിയ ഒരു കാക്കും. എടുക്കുക, കാക്കിന്നുകൂടി രണ്ടു കഴലുകൾ കെട്ടുക. നീളമുള്ള കഴൽ ഫ്ലാസ്കിന്റെ അടിയിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. ഈ കഴലിന്റെ മുകൾഭാഗം ഒരു ഫണലിന്റെ വിസ്താരമുള്ള ഭാഗംപോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. മറേറുകഴൽ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു അധികം താണിരിയ്ക്കരുത്. ഈ കഴലിനെ ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 33) കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു റബ്ബർകഴലിനോടു ചേർക്കുക. റബ്ബർകഴലിനെ ഒരു

ക്ലിപ്പ് (clip) കൊണ്ടു അമർത്തിവെക്കുക. ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിൽ മുളച്ചു വരുന്ന കുറെ വിത്തു ഇടുക. നീളമുള്ള കഴലിന്റെ മേൽഭാഗം വേറൊരു കാക്കുകൊണ്ടു മൂടുക. രണ്ടു ദിവസംകഴിഞ്ഞു ഫ്ലാസ്കിലെ



ചിത്രം 33

ചെറുകഴലോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള രബ്ബർകഴലിന്റെ അറ്റത്തിൽ ഒരു ചെറുകുഴൽ ചെലുത്തി അതിന്റെ തുറന്ന അറ്റം ഒരു ബീക്കറിലെ പുണ്ണാവെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തുക. അമർത്തി (clip) അയച്ചുവിട്ടു ഫ്ലാസ്കിലെ കാക്കു നീക്കിട്ട് ഫ്ലാസ്കിലേക്കു വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ബീക്കറിലെ പുണ്ണാവെള്ളം പാൽനിറമുള്ളതായിത്തീരുന്നു.

പുണ്ണാവെള്ളം പാൽനിറമുള്ളതാവാൻ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് (Carbon-di-oxide) വേണം. ആയതിനാൽ, ഫ്ലാസ്കിൽനിന്നു കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് പുറപ്പെട്ട് പുണ്ണാവെള്ളത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്ലാസ്കിലെ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തായിരിക്കുന്നു ഈ വാതകത്തെ ഉത്ഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുക.

മുളച്ചുപൊന്നു വിത്തുകൾക്കു പകരം ചെടിയുടെ കൊമ്പ്, മൊട്ട് മുതലായ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഫ്ലാസ്കിൽ ഇട്ടു ഇതേ പരിശോധന നടത്താം. അപ്പോഴും ഇതേ ഫലംതന്നെയാണ് കിട്ടുക.

ആയതിനാൽ സസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ശ്വാസിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾക്കു ജീവിക്കുവാനുള്ളപോലെ പ്രത്യേകമായ ശ്വാസനേന്ദ്രിയമില്ല. സസ്യങ്ങളുടെ സർവ്വഭാഗങ്ങളും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു.

അദ്ധ്യായം 31

സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം (തുടർച്ച)

തടികളിൽ വായു ശ്വാസിക്കേണ്ടതിലേക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകളുണ്ടു് തൈരുകളിൽ സൂക്ഷ്മരസ്യങ്ങളാണുള്ളതു്. പ്രായംചെന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വല്ലത്തിൽ അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ചെറുദോരങ്ങളാണു് ഉണ്ടാവുക. സസ്യങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗങ്ങളിലേക്കു വായു ഈ ദോരങ്ങളിൽ കൂടി ചെല്ലുന്നു. ഈ രസ്യങ്ങൾക്കു് ചർമ്മസൂചിര (lentical)ങ്ങളെന്നാകുന്നു പേർ.

ഇലയുടെ രചനയിൽനിന്നു ശ്വാസോച്ഛ്വാസക്രിയക്കു ഇലകളിൽ സൈതകയ്ക്കുകളുണ്ടെന്നു കാണാം. സാധാരണമായി ഒരിലയിൽ രണ്ടു തലങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഉപരിതലത്തിന്മേലും അധോതലത്തിന്മേലും തൊലി (ക്യൂട്ടിൻ-cutin)ഉണ്ടു്. ഈ തൊലിയിൽ പത്രസൂചിരങ്ങൾ (stomata) ഉണ്ടു്. സൂക്ഷ്മദർശക (microscope)ത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ ഇവയെ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉപരിതലത്തിൽ ഈ സൂചിരങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കവും അധോതലത്തിൽ അധികവുമായിരിക്കും.

ഇലയിലെ പത്രസൂചിരങ്ങളിൽക്കൂടി സസ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വായുസഞ്ചാരത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടു്. ഇലയിലെ സൈതകരൂക്കിടയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മറ്റുഭാഗങ്ങളിലെ സൈതകരൂക്കിടയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇല ശ്വാസിക്കുന്ന വായു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കിട്ടുന്നു.

ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജനെ ഉൾക്കൊണ്ട കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിനെ പുറമെ വിടുകയാണല്ലോ സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു്. ഈ ഓക്സിജൻ പുറമെയുള്ള വായുവിൽ ഉ

ഉള്ളതാണ്. കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് സസ്യത്തിലെ കാർബണീകരണത്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആയതിനാൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ക്ഷയകരമായ ഒരു വ്യാപാരമാകുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസവേളയിൽ സസ്യവീഭവം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. സസ്യത്തിലെ കാർബൺ ഓക്സീജനോടു ചേർന്ന് കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ സസ്യത്തിന്റെ ചലനം ചുരുങ്ങുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 32.

തവള, തവളക്കുഞ്ഞു, മത്സ്യം, എന്നിവയുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം

ജീവികൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു വ്യാപാരം നടക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ദേഹത്തിലെ മലിനപദാർത്ഥമായ കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറമെ പോകുന്നു. രണ്ടാമതായി ഓക്സീജനെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് രക്തത്തിലേക്കു എത്തിക്കുന്നു. രക്തം ഈ വാതകത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു ദേഹാംശങ്ങളിലെ ധാതുക്കളിലേക്കു ഭക്ഷുന്നു. ധാതുക്കളിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കുകയും തദ്വാരാ അംശങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കും പ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടിവരുന്ന ശക്തി ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ ജീവികളുടെയും ദേഹഘടന ഭാരോമാതിരിയിൽ ഉള്ളതല്ല ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുവാൻ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്.

തവള

ജലത്തിലും കരയിലും വസിക്കുന്ന ചില ജീവികളിൽ രണ്ടു വിധ ശ്വാസനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണുന്നു. അവയിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളും ഗില്ലുകളും (gill) ഉണ്ടാകും. ഇവ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോൾ ഗില്ലുകളാണ് ശ്വാസിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത്. കരയിൽ ഇരിയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ്

ഇവ ശ്വസിക്കുക. തവട്ട, പച്ചത്തവട്ട (Toad) എന്നിവയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ശ്വസനേന്ദ്രിയസൗകര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

തവട്ടക്കു കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കേണ്ടതിലേക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിലാണ് തവട്ട പാറുന്നത്. മുട്ടകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വെള്ളത്തിൽകിടക്കും. മുട്ടവിരിഞ്ഞ് ഭേദശിശുക്കൾ പുറമെവരുന്നു. ഈ തവട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ (Tadpoles) ചെറുമത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഇരിക്കും. ഭേദശിശുവിന്റെ കഴുത്തു-ഭാഗത്തിൽനിന്നു രൂപലുകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മൂന്നു സാധനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇവയുടെ സഹായത്താലാണ് 'പൊട്ടിലി (തവട്ടക്കുഞ്ഞു)കൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവയെ പുറംഗിലുകൾ എന്നു പറയുന്നു. വെള്ളത്തിലെ വായുവിലുള്ള ഓക്സിജനെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽവെച്ചു ഇവ ഉൾക്കൊള്ളുകയും കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വെള്ളത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. തവട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്നതോടുകൂടി പുറം ഗിലുകൾ വീണു തുടങ്ങുന്നു. തദവസരത്തിൽ 4 ജോടി പിളർപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ പിളർപ്പുകളോടു ചേർന്നിട്ട് മത്സ്യങ്ങളിലുള്ളപോലെ ഉൾഗിലുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയുടെ മീതെ ഒരു തോലു വളരുന്നു. ഈ ഉൾഗിലുകൾ ആദ്യം വളർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഗിലുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവയാണ്.



ചിത്രം 34


തവട്ടക്കുഞ്ഞുകളുടെ നില്പുകൾ

ഉൾഗിലുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയുടെ മീതെ ഒരു തോലു വളരുന്നു. ഈ ഉൾഗിലുകൾ ആദ്യം വളർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഗിലുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവയാണ്.

ജീവിതം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടവയാണ്.

അംഗങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണവളർച്ചയെ പ്രാപിക്കുകയും വരളയുടെ വാൽ ഇല്ലാതായിത്തീർന്ന് ഇത് തുളുച്ചിയാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസകോശങ്ങൾ വളർന്നുതുടങ്ങുന്നു. 'പൊട്ടിലി,ന്റെ ആകൃതി തീരെ വിട്ട് തവട്ടയുടെ രൂപം ധരിക്കുന്നകാലങ്ങളിൽ ഈ ജീവി ഗിലുകളിൽകൂടിയും ശ്വാസകോശങ്ങളിൽകൂടിയും ശ്വാസേന്ദ്രമാസം ചെയ്യുന്നു.

ശ്വാസകോശങ്ങൾ നീണ്ടുചുരുങ്ങുന്ന സഞ്ചികൾ ആകുന്നു. ദേഹത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ഓരോ സഞ്ചികൾ കാണാം. ഈ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ പുറം ഭിത്തികളിൽ നേരിയ ചാലുകളുണ്ട്. ഈ ചാലുകളിൽ അനവധി രക്തക്കുഴലുകൾ പരന്നുകിടക്കുന്നു. ഈ ശ്വാസകോശങ്ങൾ മുൻ വശത്തു വായിലേക്കു തുറക്കുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജന്തു വായ അടച്ചുവെച്ചിരിക്കും. വായിന്റെ അടിത്തട്ടു താഴുകയും മൂക്കിലെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ വായു ഉള്ളിലേക്കു ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് വായിന്റെ അടിത്തട്ട് പൊങ്ങി നാസാദ്വാരങ്ങൾ അടഞ്ഞു വായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു.



ചിത്രം 34 (b)

തവട്ടയുടെ
ശ്വാസകോശങ്ങൾ


ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നാസാദ്വാരങ്ങൾ തുറക്കുകയും വായു പുറമെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

തോലിലെ സുഷിരങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ വായു വലിച്ചെടുക്കുവാനും അവയിൽ കൂടിത്തന്നെ ദേഹത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുവാനും ഇതിനു സാധിക്കും.

മത്സ്യം

മത്സ്യങ്ങൾ ഗില്ലകളുടെ സഹായത്താലാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് ശ്വസിക്കുവാൻ പറ്റിയ അവയവങ്ങളാണിവ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗില്ലകൾ ചെറുകുഴലുകളാകുന്നു. ഇവ ഗില്ലറുകളുടെ ഉള്ളിൽ ആണ്. ഈ ഗില്ലകൾ മത്സ്യത്തിന്റെ തൊണ്ടയോടു ചേർന്നിരിക്കും. പുറമെ

യായി ചില പിളർപ്പുകളിലാണ് ഇവ അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ അറയുടെ ഭിത്തികൾ എല്ലുകൊണ്ടോ ഉപാസ്മികൊണ്ടോ ഉള്ളവയായിരിക്കും. കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ നേരിയ സൂക്ഷ്മനാളികളായിത്തീർന്ന് ഈ ഗില്ലുകൾക്കു ചുറ്റും വട്ടം വെയ്ക്കുന്നു. മ



ചിത്രം 35

ടയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിനടക്കുന്നത് അറയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഗില്ലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

രും ചുറ്റും വട്ടം വെയ്ക്കുന്നു. മ
ത്സ്യം വെള്ളം കുടിച്ച് അറപ്പിച്ചർപ്പി
ൽ കൂടി വെള്ളം പുറമെ വിടുന്നു
ഈ വെള്ളത്തിൽ വായു അലിഞ്ഞു
ചേർന്നിരിയ്ക്കും. ഈ വായുവിലെ ഓ
ക്സിജനെ നാളികൾ വലിച്ചെടുക്കു
കയും നാളികളിലെ കാർബൺഡൈ
ഓക്സഡിനെ വെള്ളത്തിലേക്കുവി



മുന്നാംവിഭാഗം

അദ്ധ്യായം 33

വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഈ പദാർത്ഥം വേണ്ടത്ര പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടു്, ഇതു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണു്. ആയതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ അഭീരുചി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. ഭൂമിയുടെ 5/7 ഭാഗം ജലമാകുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിൽ നീരവിയായി ഇതു ഇരിക്കുന്നു. മണ്ണിനുള്ളിൽ ഇതിനെ കാണാം. ജീവജാലങ്ങളിലും സസ്യലോകത്തിലും ഇതു ഉണ്ടു്. മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ 70% ജലാംശകമാകുന്നു. വത്തക്ക (Water melon)യിൽ 90% വെള്ളമാകുന്നു.

വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നു് പറയുന്നതു് ഒട്ടുംതന്നെ അതിശയോക്തിയല്ല. ജീവിക്കുന്ന പ്രാണികളെല്ലാം ജലമയങ്ങളാകുന്നു. അവക്കു് സദാപി വെള്ളത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ വേണം. വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തിൽ ചേഷ്ടകളില്ല. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും മരിച്ചുപോകും; - സസ്യങ്ങൾ വാടി നശിക്കും; ഭൂലോകം മരുഭൂമിയായു് ഭവിക്കും.

വെള്ളത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങൾ

ഏതു മൂലസ്ഥാനത്തിൽനിന്നാണു് വെള്ളം ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നതു്? 'എവിടെ നിന്നാണോ മഴ പെയ്തു വെള്ളം ഉണ്ടായതു് അവിടേക്കുതന്നെ അതു് വീണ്ടും ആവിതായി പൊങ്ങിപ്പോകും.' ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ, അവസാനിക്കാത്തതും ശാശ്വതവുമായ ചുറ്റിത്തിരിയലാണു് ജലപരിമണ്ണാമലകൂത്തിനു് ഉള്ളതു്, സൂര്യശക്തിയാൽ സമുദ്രം, തടാകം, പുഴ കളും ഏന്നീ ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം ആവിതായി മാറുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിനു ബാഷ്പീഭവനമെന്നാകുന്നുപേർ. ബാഷ്പീഭവനത്തിന്റെ മട്ടു് പ


ല സംഗതികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ: (1) ഉഷ്ണത (2) വായുവിന്റെ മർദ്ദനശക്തി (3) വായുവിൽ ഉള്ള നീരാവി (4) വായുവിന്റെ ചലനം എന്നിവ ആകുന്നു. വായുവിൽ എത്രകണ്ട് നീരാവി ഉണ്ടെന്ന് കുറിക്കുവാൻ ആർദ്രത (Humidity) എന്ന സംജ്ഞയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാലാചസ്മയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ചില ഭേദഗതികളും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിലെ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളും വായുവിന്റെ ഈ ആർദ്രതയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നീരാവിക്കൊണ്ട് വായു പരിപൂരിതമായ് (Saturated) തീരുമ്പോൾ അത് മേഘമായ് മേൽപോട്ടു പോരുന്നു. എപ്പോഴോണം ഗഗനമണ്ഡലത്തിൽ തണുത്ത കാരോടു കൂടി മേഘം സംഘടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിസ്ഫോരത്തെ പ്രാപിച്ച് മഴയായ് ഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്നു.

പ്രകൃതിയിൽ പരിശുദ്ധമായവെങ്കിലും മഴവെള്ളമാകുന്നു. പക്ഷേ, വെള്ളത്തിൽ സാധനങ്ങൾ നല്ലപോലെ അലിയുന്നതുകൊണ്ട് വായുമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി മഴപെയ്തു ചോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ വായുവിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള ചില വാതകങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്നു. ഇതിനും പുറമെ പൊടിപ്പടലം, കരിപ്പൊടി, അണുപ്രാണികൾ എന്നിവയെയും മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനു മുമ്പായി മഴ വെള്ളം മലിനപ്പെട്ടുപോകുന്നു. ആലിപ്പടം (Hill), ഹിമം (Snow), മഞ്ഞു, തുഷാരം (frost) എന്നിവയായ് വായുവിലെ നീരാവി ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.

മഴയായും ഹിമമായും ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനു എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? അതിലെ കുറച്ച ഭാഗം വീണ്ടും നീരാവിയായി മാറുന്നു. വേറൊരു ഭാഗം മണ്ണിൽ ഉൾനി ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു; അധികഭാഗവും തടാകങ്ങൾ, പുഴ, സമുദ്രം എന്നീ ജലാശയങ്ങളിൽ ചെന്ന് എത്തുന്നു. വെള്ളം സദാപി ആവിയായ് മാറുകയും തണുത്ത് വീണ്ടും വെള്ളമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബാഷ്പീഭവനവും സാഗ്രീകരണവും (Conde-

nation) അവസാനിക്കുകയില്ല. മേഘം ആവീർവിക്കുക, മഴയായി പെയ്യുക, പുഴയായി ഒഴുകുക, സമുദ്രത്തിൽചെന്നുവീഴുക, വീണ്ടും മേഘമായി മാറുക എന്നീ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഈ ആവർത്തനത്തെ ജലപരിണാമചക്രം എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഈ പരിണാമത്തെ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വെള്ളം



വെള്ളത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ.

പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വെള്ളത്തെ മഴവെള്ളം, ഉറവുവെള്ളം, പുഴ, കിളി അല്ലെങ്കിൽ കിണറു് എന്നിവയിലെ വെള്ളം, സമുദ്ര

ജലം എന്നിവകകളായി വേർതിരിക്കാം.

ഭൂമിയെ തൊടുന്നതിനുമുമ്പ് വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന വെള്ളമാകുന്നു മഴവെള്ളമെന്നത്. ആദ്യത്തെ മഴയുടെ ഉഷ്ണിതാൽ മേൽപ്പരയിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം നീങ്ങിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ മേൽപ്പരകളിൽനിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തെ ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളമായ് കരുതാം. ബർമുഡാ (Bermuda) എന്ന രാജ്യക്കാക്കു കടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം മഴവെള്ളം മാത്രമാകുന്നു. മുക്കാൽ വീടുകളിലും മേൽപ്പരയിൽ മുറച്ചിപ്പോലുള്ള ഓടുകൾ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. ഇവയെ വേണ്ടപോലെ പരത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മഴപെയ്യുമ്പോൾ ഇവയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളമെല്ലാം കീഴ്ഭാഗത്തു് ശരിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള വൃത്തിയായ ചാൽ വഴിക്ക് വീട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന തൊട്ടിയിൽചെന്നു് ശേഖരിയ്ക്കും. ബർമുഡാവിൽ ആണ്ടു മുഴുവനും മഴപെയ്യുകയില്ല.

ഉറവുവെള്ളം:- ഒരു സ്ഥലത്തിലെ മണ്ണിന്റെ സമ്പ്രദായത്തേയും ഒരു സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവിനേയും ആണ്, എത്രകണ്ട് മഴവെള്ളം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സംഗതി ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുക. ആകപ്പാടെ നോക്കുന്നതായാൽ, ചെയ്യുന്ന മഴയുടെ വലിയ ഒരു ഓഹരി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആർട്ടീഷൻ (Artesian) കിണറു അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കകിണറു് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഉറവായ് പൊന്തി വരുന്നു. ഫ്രാൻസു് രാജ്യത്തിലെ ആർട്ടീഷ് (Artois) എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽനിന്നാണ് ആർട്ടീഷൻ കിണറു് എന്ന സംജ്ഞ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. വളരെ ആഴത്തിൽനിന്നാണ് ഈ ഉറവുകളിലെ വെള്ളം വരുന്നതു്. ഈ വെള്ളം വളരെ ശുദ്ധമായിരിയ്ക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉറവുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഉറവുകളുടെ സഹായത്താൽ ഇന്ത്യാനിവാസികൾക്ക് കടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുവാൻ തീരെ അസാധ്യമാകുന്നു.

കിണറുകൾ:- മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറവുകളായിട്ട് ചൊന്തി വരുന്നില്ല. വെള്ളം ഇരക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് കിണറുകൾ കണ്ടെത്തി വരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവക്ക് വളരെ ആഴമുണ്ടാകും. വേറെ ചില ഇടങ്ങളിൽ ആഴം അധികമുണ്ടാവുകയില്ല. ആഴമില്ലാത്ത കിണറുകളിൽനിന്ന് കുടിയിടവാങ്ങും മറും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമാകുന്നു. വളം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവും, കനുകാലിക്കുവാനുള്ള ആലവും, ചട്ടിക്കുഴി (CessPool) കൾ മുതലായവയ്ക്കു കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കിണറുകളിൽനിന്ന് ഒരു കാലത്തും വെള്ളം കുടിയ്ക്കരുത്. ഭൂമിയുടെ ഉതരിഭാഗത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വലിവി (Drainage)ൽ സാധാരണമായ കാണുവാൻ ഇടയുള്ള ദോഷബീജങ്ങൾ ആഴമില്ലാത്ത കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ നീപുത്തിയില്ല.

പുഴയിലും തടാകത്തിലും ഉള്ള വെള്ളം:- മൂക്കാലിലധികം പട്ടണങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന വെള്ളം പുഴയിൽനിന്നോ തടാകത്തിൽനിന്നോ ആയിരിക്കും. മദിരാശിയിലെ വെള്ളം 'റെഡ് ഹിൽസ്' (Redhills) എന്ന തടാകത്തിൽനിന്നാണ് കഴൽ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ കാവേരി നദിയിൽനിന്നും, രാജമുണ്ടിയിൽ ഗോദാവരി നദിയിൽനിന്നും പമ്പടിചിട്ടാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിൽ മലിനങ്ങൾ കലർന്നു ചേരുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അധികമുണ്ട്. (1) കാലപ്പുകച്ച (2) വെള്ളം കഴുകുന്ന നിലങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം (3) ചാക്കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഴക്കു ചാലുകൾ, (4) വ്യവസായശാലകളിലെ മലിനങ്ങൾ, (5) പുഴവക്കിലുള്ള കാഴ്ചനിരത്തോട്ടങ്ങളിലെ സസ്യഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പുഴയുടെ അടുത്തെ നിൽക്കുകയോ പുഴയിലേക്കു തന്നെ തള്ളി വിടുകയോ ചെയ്യുന്ന ചില ദേശങ്ങളിലെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മുതലായവയാണ് പുഴവെള്ളത്തിൽ എത്ര കണ്ട് മലിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.

സമുദ്രജലം:- നമുക്ക് അറിവുള്ള മൂക്കാലിലധികം നിർജീവ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിലയനാവസ്ഥയിൽ സമുദ്രജലത്തിലുണ്ട്. വെറും വെള്ളം മാത്രമെ ആവിയായി മാറുന്നുള്ളൂ. ആയതിനാൽ സമുദ്രജലം

ദൃഢലതയിൽ നിർജീവപദാർത്ഥങ്ങൾ ബാക്കിയായ് നിൽക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമെ, വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പല വിധ പദാർത്ഥങ്ങളെ സമുദ്രത്തിലേക്കു പുഴകൾ അടിച്ചെടുത്തു് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ സമുദ്രജലത്തിൽ നിർജീവ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വരുന്നു. സമുദ്ര ജലം ഒരു കഷായമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു് ഒരു സന്തപ്പിതവിലയിനമാണു് ആയതിനാൽ സമുദ്രത്തിലെ നിർജീവ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവു വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമുദ്രജലത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശതമാനത്തോളം കനത്തതന്നെയാണു്. ഇ പദാർത്ഥങ്ങളിൽവെച്ചു് അധികമുള്ളതു് ഉപ്പു് (സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്) ആണു്. സമുദ്രം ഉപ്പിന്റെ വിളനിലമാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 34

വെള്ളം (തുടച്ചു)

ധാതു മയമായ വെള്ളം:- ചില ഉറവുകളിൽനിന്നു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ പല വിധ ഖനിജഭാഗങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അലിഞ്ഞു് ചേർന്നിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തെയാണു് ഖനിജമായ (Mineral) വെള്ളം എന്നു പറയുന്നതു്. ദഹനക്കുറവു, വാതം മുതലായ ദീനങ്ങൾ പിടിപെട്ട രോഗികൾക്കു് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം നല്ല ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു.

മലിനങ്ങൾ:- പദാർത്ഥങ്ങൾ മുക്കാലും, വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നതുകൊണ്ടു്, വെള്ളത്തെ ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതു പ്രയാസമാകുന്നു ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മലിനങ്ങൾ നിർജീവപദാർത്ഥങ്ങളുടേതോ സജീവപദാർത്ഥങ്ങളുടേതോ ആയിരിക്കും. നിർജീവപദാർത്ഥങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മലിനവും അധികവും നമുക്കു ദേഹോപദ്രവത്തെ ചെയ്യാത്തവയാകുന്നു. എന്നാൽ ചീഞ്ഞളിയുന്ന ജീവികളുടേയോ സസ്യങ്ങളുടേയോ ഭാഗങ്ങളോടു് വെള്ളം ചേരുന്ന പക്ഷം ആ വെള്ളം കടിയ്ക്കുന്നതു് അപകടമാകുന്നു. അഴുക്കു ചാലുകളിൽനിന്നോ കന്നുകാലികളെ കെട്ടുന്ന ആലുകളിൽനിന്നോ കക്കൂസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു്

ജിൽവിനോ പുറപ്പെടുന്ന നീച്ചാലുകളോ വാതകങ്ങളോ വെള്ളത്തോട് കലർന്നു വശാകുന്നതായാൽ അന്നവയി മലിനാംശങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചേരുകയും അതിനെ കുടിയ്ക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ മലിനജലത്തിനു ദുഗ്ഗന്ധവും ദുർസവാദം ഉണ്ടായിരിക്കും; ഗന്ധവും ദുർസവാദം ഇല്ലാത്ത മലിനജലവും ഉണ്ടു. അലിഞ്ഞുചേരുന്ന മലിനങ്ങൾക്കു പുറമെ അലിഞ്ഞുചേരാത്ത ചെറു പൊടികളും വെള്ളത്തിൽ കാണാം.

വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ചില ഖനിജലവണങ്ങൾ


കാർബണേയിറം (Capbonate)	80
സൾഫേയിറം (Sulphate)	20%
ക്ലോറൈഡ് (Choloride)	7%
കാൽസിയഭാഗം	17%
മാഗ്നീസിയഭാഗം	5%
സോഡിയഭാഗം	10
സിലിക്ക (Silica)	11
	100

വെള്ളവും രോഗങ്ങളും:— സജീവപദാർത്ഥങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം, പ്രത്യേകിച്ചു് അഴുക്കുചാലിൽനിന്നുള്ള മലിനങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം, വളരെ ഉപദ്രവത്തെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നു് പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിസാരം, ചോരപോക്ക്, വിഷുചിക, സന്നിപാതജ്വരം എന്നീ രീതികൾ പിടിപെടുന്നതു് എളുപ്പമാണു്. ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിനു നല്ല തെളിവു് സ്വാദം ഉണ്ടായി എന്നു വന്നേക്കാം; പക്ഷെ വിഷബീജങ്ങൾ ഇരിക്കാവുന്നതുകൊണ്ടു് പലവിധ രോഗങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പരക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു് സംശയമുള്ളപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ നല്ലപോലെ പരിശോധിയ്ക്കുകയും അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി സൂക്ഷിക്കുവാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണം.

അദ്ധ്യായം 35


വെള്ളം—ശുദ്ധീകരണം

വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിയ്ക്കൽ:—വെള്ളത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളേയും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം



ചിത്രം 35 വാറിയെ

വാറിയെടുക്കൽ (Distillation) തന്നെയാണു്. ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവയും ചെയ്യാത്തവയും ആയ എല്ലാമലിനങ്ങളേയും ഈ മാർഗ്ഗത്താൽ നീക്കം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതു നടത്താൻ വളരെ ചെലവുണ്ടു്.



ചിത്രം 36


നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കത്തക്കവണ്ണം ആക്കിത്തീർക്കുവാൻ അതിനെ കുറെ നിമിഷം തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. ഉയന്ന ഉഷ്ണതയിൽ വിഷാണുബീജങ്ങൾ നശിയ്ക്കുന്നുവെന്നു് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കോ മറ്റോ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുവാൻ പല വിധ ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടു്. അവ

യിൽ മുഖ്യമായവ (1) ഊരവാൻ സമ്മതിക്കൽ (Sedimentation) (2) അരിച്ചെടുക്കൽ (Filtration) (3) ഓക്സീകരണം. (Oxidation) എന്നിവയാകുന്നു.

ഊരവാൻ സമ്മതിക്കൽ:- വലിയ തൊട്ടികളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ അലിഞ്ഞു പോരത്ത പോടികൾ അടിക്കാത്ത വീഴേണ്ടതിലേക്കായി ചിലേടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താറുണ്ട്. ഊരൽ (Sediment) വേഗത്തിൽ വീഴേണ്ടതിലേക്കു പടിക്കാരം (Alum) ലേക്കുക പതിവാണു്. മണ്ണും വണ്ടലും ചോട്ടിലേക്കു വീണുതുടങ്ങുമ്പോൾ സജീവാംശങ്ങളിൽ കുറെ ഭാഗം ഇവക്കിടയിൽ പെട്ടു പോകും. ഈ രീതിയാൽ ചീത്തയായ വെള്ളം തീരെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതല്ല.


അരിച്ചെടുക്കൽ:- പുഴകളിൽനിന്നും ജലസംഗ്രഹസ്ഥാന (Reservoir)ങ്ങളിൽനിന്നും പട്ടണങ്ങളിലേക്കു വരുന്ന വെള്ളത്തെ മണൽനിറച്ച ചില പ്രത്യേക അരിപ്പകളുടെ സഹായത്താലാണു മലിനരഹിതമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു.



ചിത്രം 37 മണൽ നിറച്ച അരിപ്പകൾ

അരിപ്പകളിൽ ചരലു, മണലു എന്നിവ അടിയട്ടിയായി നിറച്ച അവകളിൽക്കൂടി വെള്ളം കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും; ഈ ഉപകരണത്തിൽ രണ്ടു അരിപ്പകളുണ്ടാകും. അവയുടെ അടിക്കാത്തതെ ഒരു കഴൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. മ

ലിനങ്ങളിൽ ചിലവ അരിപ്പുകളിൽ തങ്ങിനിൽക്കും; മറ്റു ചിലവ പരിപൂർണ്ണമായ മാനദണ്ഡത്തെ പ്രാപിക്കും. അരിപ്പയിൽനിന്നു പുറമെ വരുന്ന വെള്ളം നല്ലതായിരിക്കും. ബെങ്കളൂർ എന്നപോലെ ചില പട്ടണങ്ങളിൽ മണ്ണിൽ അരിപ്പുകൾക്കു പകരം യന്ത്ര സഹായത്താൽ വേല എടുക്കുന്ന ചില അരിപ്പുകളാണുള്ളതു. ഈ അരിപ്പുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞു ചോരാത്ത മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.



ചിത്രം 38

വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിലേക്കു പലതരത്തിലുള്ള അരിപ്പുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അരിപ്പയിൽ ചെറു സൂചിരങ്ങളോടുകൂടി ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഉയരക്കോടെ വീഴുമ്പോൾ, വീഴുന്ന ഉയക്കിനാൽ വെള്ളം സൂചിരങ്ങളിൽക്കൂടി പുറത്തേക്കു വരുന്നു. അലിയാത്ത അടുക്കു പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം അരിപ്പുകളിൽ തങ്ങിപ്പോകുന്നു. റെയിൽവെ ആപ്പീസുകളിൽ വെള്ളം അരിക്കേണ്ടതിനുള്ള ഏർപ്പാടു നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതിൽ ഒന്നിന്നുമീതെ ഒന്നായി മൂന്നു ചട്ടികൾ വെച്ചിരിക്കും. ഇവയെല്ലാം മുക്കാലി ഉപകരണത്തിന്മേലാണു നിർത്തിയിരിക്കുക. ചട്ടികളിൽ മണലൊ കരിക്കട്ടെയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സാധനങ്ങളാണു അരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുഖ്യ സാധനങ്ങൾ.

പാസ്ചർ ചേംബ


ർലാണ്ടു അരിപ്പ

സസ്യബീജാംശങ്ങളാൽ കലുഷിതമായിരിക്കുന്ന വെള്ളം വായുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന

പക്ഷം നല്ല വെള്ളമാകുവാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നു പണ്ടുപണ്ടെ അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണു താഴെ വിവരിക്കുന്ന മാതിരിയിലാണു ഈ സംഗതി സംഭവിക്കുന്നതു. വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചൊന്നു വായു അലിയും. അലിഞ്ഞുചേരുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജൻ

സസ്യംഗങ്ങളെ ഭക്ഷ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിയുന്ന പ്രാണികൾക്കു ആവശ്യമാകുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അവ നശിയ്ക്കുന്നു. കുടിക്കേണ്ടുന്ന വെള്ളത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നല്ലതാക്കിത്തീർച്ചയാൻ ഈ സമ്പ്രദായത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാവുന്നതല്ല.

വിഷുചിക, വിഷമജപരം എന്നീ ദീനങ്ങൾ പരക്കെ കാലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വിഷാണുബീജങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാറ്റം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതാകുന്നു. വിദ്യുച്ഛക്തി അധികം ചെലവു കൂടാതെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഓക്സിജനെ വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ പ്രയോഗങ്ങളാൽ ഓസോൺ (Ozone) ആക്കി മാറ്റാം. ഈ വാതകത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വെള്ളത്തെ മലിനരഹിതമാക്കാം. വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ സഹായത്താൽ ഓസോൺ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തെ നല്ലതാക്കുവാൻ വേണ്ടുന്നതായ ഉപകരണസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത്, പാരിസ്ഥി പട്ടണത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിക



അരിയ്ക്കുത്തപ്പോൾ അരിച്ചപ്പോൾ

ചിത്രം 39

[അരിക്കലും ദോഹസൗഖ്യവും—വിഷമജപരത്താൽ 1000,000 ആളുകളിൽ എത്രയെണ്ണം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നു കാണിക്കുന്നത്]

ളിൽ മുഖ്യമായ ഒന്നാകുന്നു. ഇക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളത്തെ മലിനങ്ങളില്ലാത്ത പദാർത്ഥമാക്കുവാൻ അതായത് ക്ലിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നതു് ക്ലോറിൻ (Chlorine) ആകുന്നു. 1914 മുതൽ 1918 വരെ നീണ്ടുനിന്ന മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹരിതകവായുവു യോഗം ഈ ആവശ്യത്തിന്നു് സ്ഥലമായിരുന്നുവെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടു് ഉണ്ടു്. ഹരിതകവാതകം ക്ലിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഹരതകവാതകവിലയനമോ വണ്ണനാശകമുണ്ണമോ (Bleaching Powder) ആണു് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതു്. വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ക്ലിഷ്ടങ്ങളെ ആവശ്യത്തിലേക്ക്, വെള്ളത്തെ മലിനഹീനമാക്കുവാൻ, ക്ലോറിൻവാതകം അലിയിച്ചു വെള്ളത്തെ, മണൽ അരിപ്പകളിൽ കൂടി അരിച്ചിട്ടാണു് ഇക്കാലങ്ങളിൽ അവിടത്തെ നിവാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതു്. നല്ലതാക്കിത്തീർത്ത വെള്ളത്തെ കടിക്കുന്നതായാൽ നാട്ടിലുള്ളവരുടെ അരോഗതാവസ്ഥ വളരെ നല്ലമട്ടിൽ ഇരിയ്ക്കും എന്നതു് മേലെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പടത്തിൽനിന്നു് വിശദമാകുന്നതാണു്.

യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ തല്ലാലം ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരാളെപ്പറ്റി താമസിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം കടിയ്ക്കത്തക്കതോ അല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം. യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ കയ്ക്കൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്കായി എപ്പോഴും അയോഡിൻ വിലയനം (Tincture of Iodine) ഉണ്ടാകമല്ലോ. ഇതു ഉപയോഗിച്ചു അവർക്കു ആവശ്യമുള്ള വെള്ളത്തെ നല്ലതാക്കിത്തീർക്കാം. $\frac{1}{4}$ ഗാലൻ വെള്ളത്തിൽ ഒരു തുള്ളി അയോഡിൻ വിലയനം ചേർത്തു അത മണിക്കൂറോളം ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു ഒരിടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ ആ വെള്ളം കടിയ്ക്കുവാൻ പാറിയതായിത്തീരും.

ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കടിക്കത്തക്കതോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാൻ എളുപ്പമായ രണ്ടു സൂത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

1. ഒരു ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ലുണ്ടാക്കണം ഇടുക; പാത്രത്തെ ഒരു വൃത്തിയായ തട്ടുകൊണ്ടു് അടച്ചു രാത്രി മുഴുവനും ചൂടുള്ള ഒരിടത്തിൽ വെയ്ക്കുക; രാവിലെ തട്ടു തുറന്നു

നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നപക്ഷം ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം കടിയ്ക്കുവാൻ പറ്റിയതാണ്.

2. ഒരു ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രെയിൻ പൊട്ടാസിയം പെർമാൻഗനെയിറ്റ് (Potassium Permanganate) ഇട്ട് മൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഒരിടത്തിൽ അടച്ചു വെക്കുക. വെള്ളത്തിന്റെ നിറം നല്ല പാടലവർണ്ണമായിരിയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെള്ളം കടിയ്ക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തരക്കേടും ഇല്ല.

അദ്ധ്യായം 36

കഠിനജലവും മൃദുജലവും

പതുക്കെ പതയുന്നതും വേഗം പതയുന്നതുമായ വെള്ളങ്ങൾ.

ചില വെള്ളങ്ങളെ പതുക്കെ പതയുന്നവയെന്നും വേറെ ചിലവയെ വേഗം പതയുന്നവയെന്നും പറയാറുണ്ടു. വെള്ളത്തിൽ പലവിധ സാധനങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നതായാൽ അതിൽ സോപ്പ് അത്ര വേഗം പതയുന്നതല്ല. സോപ്പുവെള്ളം അങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ തയിന്ദുപോലുള്ള ഒരു അവക്ഷേപവസ്തു (Precipitate) വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തെ പതുക്കെ പതയുന്ന ജലം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനജലം എന്നാണ് പറയുക. സോപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ 'വേഗം പതയുന്ന' വെള്ളത്തെ മൃദുജലം അല്ലെങ്കിൽ 'വേഗം പതയുന്ന' വെള്ളം എന്നു കരുതാവുന്നതാണ്.

വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്ന സാധനങ്ങളാണു വെള്ളത്തെ ഇമ്മാതിരി ഗുണമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നതു. മഴവെള്ളം ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെള്ളങ്ങളിലും ലവണങ്ങൾ അലിഞ്ഞു

ചേർന്നിരിക്കും. സോഡിയലവണങ്ങൾ, കാൽസിയലവണങ്ങൾ, മാഗ്നീസിയലവണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണമായി വെള്ളത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുക. കാൽസിയലവണങ്ങളും മാഗ്നീസിയലവണങ്ങളുമാണ് അഴുക്കുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാപകരിക്കേണ്ടുന്ന സോപ്പിനോടുകൂടി ആദ്യത്തിൽ സംയോജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്മൂലം പോലുള്ള അവക്ഷേപമുണ്ടാകുന്നു. സോപ്പ് ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ചെലവാകുന്നു; അഴുക്കിനെ നീക്കംചെയ്യുന്ന പത പുറപ്പെടുമ്പോൾ. ഈ ലവണങ്ങളുടെ തോത് വലിക്കുന്നതോടൊപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ കഠിനാവസ്ഥയും അധികരിക്കുന്നു. കാൽസിയലവണങ്ങളും മാഗ്നീസിയലവണങ്ങളും മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ കടുപ്പമാക്കിത്തീർക്കുന്നു? പൊതുവിൽ ഒരു പോലെയുള്ള പല ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ രണ്ടു ലോഹങ്ങളാകുന്നു കാൽസിയവും മാഗ്നീസിയവും. ഇവയുടെ കാർബണൈറ്റിറം (Carbonate) ബൈകാർബണൈറ്റിറം (Bicarbonate) ഒരേമാതിരിയിലുള്ള ലവണങ്ങളാണ്. കുമ്മായം (Quicklime) ആയിത്തീരുന്ന കുമ്മായക്കല്ല് (Limestone) ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യോനോക്കുന്നപക്ഷം കാൽസിയം കാർബണൈറ്റിറം (Calcium Carbonate) ആകുന്നു. സേലംജിപ്സ്യൂമിൽ ധാരാളമായ് കണ്ടുവരുന്ന മാഗ്നീസിയം (Magnesite) എന്ന പദാർത്ഥം മാഗ്നീസിയംകാർബണൈറ്റിറം അല്ലാതെ വേറെയൊന്നുമല്ല. ഈ സാധനത്തിൽനിന്നാണ് വയറിളക്കവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്സംസോലവണം (Epsom salt) ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ക്ലോറൈഡ് (Chlorides) കളും സൾഫേറ്റിറം (Sulphate) കളും എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളവയായ യേശുദീപദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഇവയാണ് വെള്ളത്തെ കഠിനജലമാക്കുന്നത്.

രണ്ടുവിധ കാഠിന്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു വകയിൽ കാഠിന്യത്തെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാം. അത് താൽക്കാലിക കാഠിന്യമാകുന്നു. വേറൊരുതരം കടുപ്പം സ്ഥിരമായ കടുപ്പമാകുന്നു. ബൈകാർബണൈറ്റിറംകൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളം താൽക്കാലിക കാഠിന്യമുള്ളതാകുന്നു. ക്ലോറൈഡുകളും സൾഫേറ്റുകളും ഉള്ള വെള്ളം സ്ഥിരമായ കാഠിന്യമുള്ളതാകുന്നു.

ന്നു. തിളപ്പിച്ചൊ ചുണ്ണാമ്പു ചേർത്തോ ബൈകാർബണൈലിററുക
 ജെ ഈ വെള്ളത്തിൽയിന്നു എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാവുന്നതാകുന്നു.
 ആയതിനാലാണ് ഈ ധനമൂലം (Positive Radical) തോട
 കൂടിയ ലവണങ്ങൾ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തെ താ
 ൽക്കാലിക കഠിനജലം എന്നു പറയുന്നത് സ്വീകാറിനുത്തോ
 ടുകൂടിയ വെള്ളത്തെ മറ്റുജലമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് എളുപ്പമായ
 സംഗതിയല്ല. വാറിയെടുത്തിട്ടോ അല്ലാത്ത പക്ഷം സോഡിയം
 കാർബണൈറ്റിട്ടുചേർക്കേണ്ടുന്ന തോതിൽ ചേർത്തിട്ടോ ഇത്തരം വെ
 ള്ളത്തെ ദൈനികപ്രയോഗങ്ങളാൽ മറ്റുജലമാക്കിത്തീർക്കാം.

സാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്യേണ്ടുന്നതിനും വെള്ളം കുടിക്കേ
 ണ്ടതിനും അല്പം കാറിനുമുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ യാതൊ
 രു തരക്കേടും നേരിടുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതികാറിനുമുള്ള വെ
 ള്ളം വാതരോഗികൾക്കു ഉപദ്രവത്തെ ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിൽ ല
 ല്ല കാറിനുമുള്ള വെള്ളം മാത്രം കിട്ടുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ
 നിവാസികളിൽ 10% കണ്ടു വാതരോഗികളോ തൊണ്ടവനെ
 (Goiter)ത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ ആയിരിക്കും. സോപ്പിട്ട വ
 സൂങ്ങൾ അലക്കി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിലേക്കും പാത്രങ്ങളിൽ വെ
 ള്ളം കുറെ നേരത്തേക്കു തിളപ്പിക്കേണ്ടതിലേക്കും കഠിനജലം ഒരി
 ക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. കാൽസിയലവണമോ മാഗ്നീസിയല
 വണമോ കടുപ്പമുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോപ്പു അ
 നാവശ്യമായി നശിക്കുന്നതിനു പുറമെ വെള്ളത്തിൽ ഒട്ടുന്ന ഒരു
 അവക്ഷേപം കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. കഠിനജലം ആവിയാക്കി
 മാറിത്തുടങ്ങിയതിനുശേഷം തിളപ്പിക്കുന്ന പാത്രത്തെ നാം പ
 റിശോധിച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു പാട (Scale) കാണാം. ഈ
 പാട ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം നല്ല ചാലക (Conduc-
 tor) മല്ല. ആയതിനാൽ ചൂടു പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിറകു അന്നു
 വശ്യമായി ചെലവാകുന്നു. $\frac{1}{4}$ കട്ടിയുള്ള പാടയുള്ള ഒരു പാത്ര
 ത്തിൽവെള്ളം. തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വേണ്ടിവരുന്നതി
 നേക്കാൾ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടി വിറകു വേണ്ടിവരുന്നു.

ആയതിനാൽ മറ്റുജലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പലവിധ
 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. തുണികൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിലേക്കും കുളി


ക്കേണ്ടതിലേക്കും കഠിനജലത്തെ മൃദുജലമാക്കുവാൻ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മേടിക്കുവാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ചിലുവുവസായശാലകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കഠിനതയ്ക്കു തീക്കേണ്ടതിലേക്കു ആദ്യത്തിൽ സോഡിയം കാർബണേയിററ ചേർത്തു വെള്ളത്തെ അരിച്ചു കളഞ്ഞതിനു ശേഷമെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള. വലിയ തോതിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്ന വ്യവസായശാലകളിൽ പെർമ്യൂട്ടിററ (Prmutit) എന്നൊരു സമ്പ്രദായമാണ് വെള്ളത്തെ മൃദുലജലമാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 37

വെള്ളത്തിന്റെ രാസയോഗം

Chemical composition

ഒരു കാലത്തു വെള്ളം ഒരു മൂലക (Element)മാണെന്നു കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതു് രണ്ടു മൂലകങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാൽ ഉണ്ടായതാണെന്നു് പരിശോധനകൾമൂലം തെളിയിച്ചു കണ്ടതിരിക്കുന്നു. ഈ വാതകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ (Oxygen)നും ഹൈഡ്രജൻ (Hydrogen)നും ആകുന്നു. യൗഗിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രാസയോഗങ്ങളെപ്പറ്റി പരിശോധനകൾ മൂലമാണു പഠിക്കുക.



ചിത്രം 40
വെള്ളത്തിന്റെ


വെള്ളത്തിന്റെ ആയതനയോഗത്തെ (Volumetric composition) പഠിക്കുവാൻ സാധാരണമായി വിദ്യുൽ-വിച്ഛേദനം (Electrolysis) ആണ് നടത്തുക. ഈ സമ്പ്രദായം താഴെ വിവരിക്കുന്നു. കഴൽഭാഗം വിസ്താരമുള്ള ഒരു നാളമെടുക്കുക. അടിയിൽ ഒരു കാർഷാ ഉറപ്പിക്കുക. ഇതിൽകൂടി രണ്ടു പ്ളാട്ടിനക്കമ്പി ചെലുത്തിയിരിക്കണം. ഈ കമ്പികളുടെ ഉൾഭാഗത്തിലെ അറ്റത്തിൽ പ്ളാട്ടിനത്തിന്റെ നേരിയ ഒരു തകിട് കെട്ടിവെക്കുക. നാളത്തിൽ ഗന്ധകികാ മ്ളത്തിന്റെ കുറെ തുള്ളികൾ ചേർത്തു

വെള്ളം നിറക്കുക. തകിടിന്റെ മേൽഭാഗത്തു വെള്ളം നിറച്ചു ട്രൈസ്ക്വബുകൾ നിറയ്ക്കുക. പ്ലാട്ടിനക്കമ്പികളുടെ അറ്റങ്ങളെ ഒരു ബാറ്ററിയിലോടു ചേർത്തുവെക്കുക. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കഴലുകളിൽ വാതകം ശേഖരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. കുറെ നേരത്തേയ്ക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി നടന്നശേഷം, കഴലുകളെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഒന്നിൽ മറേതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ആയതന്നെ (Volume) ഉള്ള വാതകമുള്ളതായ്ക്കാണാം. അധികമളവുള്ള വാതകം ഇരിക്കുന്ന ട്രൈസ്ക്വബിനുള്ളിൽ ഒരു കത്തുന്നകോൽ കടത്തുന്നപക്ഷം മങ്ങിയ പ്രകാശത്തോടുകൂടി വാതം കത്തിത്തുടങ്ങും. ഈ വാതകം ഫൈഡ്രജൻ ആകുന്നു. ഒരു രക്തതപ്തക്കൊള്ളി (Red-hot spinter) യാകട്ടെ മറേവാതകത്തിൽ ജ്വലിച്ചു കത്തുന്നതായിക്കാണാം; ഈ വാതകം ഓക്സിജൻ ആകുന്നു. ഒരു ആയതനമുള്ള ഓക്സിജൻ രണ്ടായതനമുള്ള ഫൈഡ്രജനോട് സംയോജിച്ചു വെള്ളമായ്ത്തീരുവെന്ന് ഈ വിശേഷപരിശോധനയിൽനിന്നും പഠിയ്ക്കുന്നു.



കാർബണിന്റെ സജ്ജീകരണം:— വെള്ളത്തിൽനിന്നു കാർബണിന്റെ വിദ്യുൽവിച്ഛേദനം വഴിക്കു ലഭിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. ഈ വാതകസജ്ജീകരണം വേറെ വിധത്തിലും നടത്താം.

പൊട്ടാസിയംക്ലോറൈറ്റിനോടു മാംഗ്നീസ് ഡൈകാർബ്ബൈഡ് ചേർത്ത് ചൂടു പിടിപ്പിക്കുന്നതായാൽ, കാർബണിന്റെ കിട്ടും. ഈ ക്രിയയിൽ മാംഗ്നീസ് - ഡൈ - കാർബൈഡിൽ നിന്നല്ല കാർബണിന്റെ വരുന്നത്; അതു ക്ലോറൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. വാതകം വേഗം വരുന്നതിനെ കാർബൈഡ് സഹായിക്കുന്നു. ഭരണികളിൽ കാർബണിന്റെ പിടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ചിത്രത്തിൽ (ചിത്രം 41) നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.



ചിത്രം 41 കാർബണിന്റെ സജ്ജീകരണം.

കാർബണിന്റെ ഗുണങ്ങൾ: 1 മണമില്ല 2 നിറമില്ല 3 വെള്ളത്തിൽ കറച്ചു മാത്രമെ അലിയുകയുള്ളൂ. വായുവോക്കാര കറച്ചൊന്ന് സാന്ദ്രത (density) കൂടിയതാണ് 4 ദഹനസഹായി (supporter of combustion) ആകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 38.

ഹൈഡ്രജൻ (HYDROGEN)

— : 0 : —

പൊതുവെയുള്ള പ്രസ്താവന. തീയിന്റെ സഹായത്താൽ തനിയെ കത്തുന്ന വാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യക്തിത്വം വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാതെ അനേക കഴുപ്പങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകം വളരെക്കാലത്തേയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചു. ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ വേറെ വാതകങ്ങളാൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട നിലയിൽ ഹൈഡ്രജനെ സജ്ജീകരിച്ചത് കാവൻഡിഷ് (1766) എന്ന ആംഗ്ലേയ രസശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ എന്ന നാമധേയം നൽകിയത് ലവോയിസർ (Lavoisier—1783)—എന്ന ഫ്രാൻസ് രാജ്യത്തിലെ രസശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഹൈഡ്രജൻ എന്നതിന് വെള്ളത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാതകം എന്നാകണമെന്നർത്ഥം. വെള്ളത്തിലെ ഒരു മൂലകം ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേർ ഈ വാതകത്തിന് നൽകിയത്.

പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രനിലയിൽ ഹൈഡ്രജനെ കാണുന്നില്ല. ഈ വാതകം അടങ്ങിയ യന്ത്രഗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊരംശം ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചവല്ലേ. കാർബണോടു സംയോജിച്ച് അനവധി യന്ത്രഗതികപദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ പദാർത്ഥങ്ങൾ പെട്രോളിയ (Petroleum) ൽ കാണുന്നു. അമ്ലങ്ങളിലും ഈ വാതകം സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമ്മജീകരണം.

1. വെള്ളത്തിൽനിന്നു.

വെള്ളത്തിൽ ഫൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മൂലകത്തെ അതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കാം. രണ്ടുവഴികളാൽ വെള്ളത്തിൽനിന്ന് ഈ വാതകത്തെ വേർതിരിക്കാം. (a) വിദ്യുച്ഛക്തിദാർഢ്യം ഈ വാതകം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പ്രകാരം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. (b) വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ ഭാഗത്തോട് ലോഹങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുവാൻ സമ്മതിച്ച് ഫൈഡ്രജൻവായുവിനെ വേർപെടുത്താവുന്നതാണ്. ചില ലോഹമൂലകങ്ങൾ ഈ ആവശ്യത്തെ നല്ലപോലെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. സാധാരണമായ ഉഷ്ണതയിൽ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ വിഘടനത്തെ നടത്തുന്നു.


പരീക്ഷ:— ഒരു ഗ്ലാസ് ഭരണിയെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറച്ച്, വെള്ളം വെച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ തലകീഴ്ക്കാത്തു കുമായി വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തക്കവിധത്തിൽ നിർത്തുക. നനവില്ലാത്ത കത്രികയുപയോഗിച്ച് മണ്ണെണ്ണക്കുളിയിൽവെച്ച്, ഒരു ചെറുപയറുവണ്ണത്തിൽ സോഡിയക്കുഷ്ണത്തെ മുറിച്ചെടുക്കുക. രസ്യമായ ഒരു കാർയത്തകിടിയിൽ ഈ മുറിച്ചെടുത്ത സോഡിയത്തെ പൊതിയുക. ഈ സാധനത്തെ ഗാസ്ഭരണിയിന്നടിയിൽ വെക്കുക. ഒരു വാതകം കമിച്ചയിട്ടു വരുകയും ഭരണിയിൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭരണി നിറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിഭാഗം മേല്പോട്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പിടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ഒരു കത്തുന്ന ഊക്കൽ കടത്തുക. വാതകം കത്തുന്നതായിക്കാണാം.

വികാരത്തെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

സോഡിയം + വെള്ളം $\rightarrow$ ഹൈഡ്രജൻ + സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (Sodium hydroxide)

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു വെളുത്ത പദാർത്ഥമാണ്. വെള്ളത്തിൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം അലിയും. സോഡിയം ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ഈ സാധനം വിലയനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കും. വെള്ളം വററിക്കുന്നപക്ഷം സോഡിയംഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നതാകുന്നു.

ഉയർന്ന ഉഷ്ണതയിലിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽനിന്നു മഗ്നീസിയം സിങ്ക് (zinc) ഇരിമ്പു എന്നിവ വെള്ളത്തെ വിമോചിപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ തരുന്നു. ചൂട്ടപഴുക്കുന്ന ഇരുമ്പിനുള്ളിൽ നിരാവിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പ്രദായം 42-ാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നപ്പോൾ ട്യൂക്കടി ഇരിമ്പാകട്ടെ ഇരിമ്പോക്സൈഡായി (Iron-oxide) മാറുന്നു.



ചിത്രം 42.

അദ്ധ്യായം 39—ഹൈഡ്രജൻ (തുടച്ചു)


അമ്ലങ്ങളിൽനിന്നു, സജ്ജീകരണം.

അനേകം അലോഹ കാർബൈഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നവെന്നും അങ്ങിനെ കിട്ടുന്ന വിലയനങ്ങൾ നീലലിട് മസിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവെന്നും മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന അനവധി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവയെല്ലാം അമ്ലങ്ങളാകുന്നു. അവയെല്ലാം പൊതുവിൽ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടു്.

a) അവയെല്ലാം പുളിക്കും. (b) അമ്ലങ്ങളിലെല്ലാം ഫൈഡ്രജൻ സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ വാതകത്തെ ലോഹങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ അമ്ലങ്ങളിൽനിന്നു സ്ഥാനാന്തരപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. (Displace)

അമ്ലങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിട്ടാകുന്നു ലാബറേട്ടറികളിൽ ഫൈഡ്രജൻ ശേഖരിയ്ക്കുന്നത്. വീയും ചുരുങ്ങിയ സൾഫ്യൂറിക് അമ്ലത്തോടു സിങ്ക് രാസക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഫൈഡ്രജനെ സ്ഥാനാന്തരപ്പെടുത്തും

രണ്ടു ചോരങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക. ഇതിനു പകരം രണ്ടു ചോരങ്ങളോടുകൂടിയ റബ്ബർ കാക്കിനാൽ മുഖം അടക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കാം. ഈ ചോരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടി വാൽ നീളമുള്ള ഒരു നാളവും മറേറതിൽകൂടി വാതക വരേണ്ടതിലേക്കു പാകത്തിൽ വളച്ച ശരിയാക്കിയ ഒരു ഗ്ലാസ് കുഴലും കടത്തുക. രണ്ടു ചോരങ്ങളോടുകൂടിയ കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഏകമായ ചോരത്തോടുകൂടിയ ഒരു റബ്ബർ കാക്ക് കുപ്പിയുടെ ചോരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാളവും കുഴലും കാക്കിലെ ചോരങ്ങളിൽകൂടി കടത്തേണ്ടവയാണ്. കാക്ക് സ്ഥാനത്തിൽ വെക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കുപ്പിയുടെ (ഫ്ലാസ്കിന്റെ) ഉള്ളിൽ സിങ്ക് ഇടുക. (സിങ്ക് ശുദ്ധമായതായിരിക്കേണ്ടത്; അതിനെ ചെറു കഷണങ്ങളാക്കിട്ടു വേണം കുപ്പിക്കുള്ളിൽ ഇടുവാൻ) നാളത്തിന്റെ വാൽ കുപ്പിയുടെ അടി തൊടത്തക്കവണ്ണമായിരിക്കണം. ഉപകരണം ശരിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അതിൽനിന്നു വായു ഒഴിഞ്ഞു പോകരുത്. നാളത്തിൽ കൂടി വീയും ചുരുങ്ങിയ സൾഫ്യൂറിക് അമ്ളം (Dilute Sulphuric Acid) പകരുക. ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിൽ ഉയക്കോടെ



ചിത്രം 43

അബ്ജനകവായുവിനെ സജ്ജീകരി തീയുടെ അടുക്കെ കൊണ്ടു
ക്കുന്ന രീതി


ക്കും. ഇങ്ങിനെ കുറെ തവണയോളം ചെയ്തതിനുശേഷം ഗാസ്യ പട്ടാതെ തീ തട്ടുമ്പോൾ അതു തവിയേ കത്തുന്നതായ്ക്കാണ്. പിന്നീട് ഭരണിയിൽ വാതകം ശേഖരിക്കുന്നതു യാതൊരു സ ന്നേഹവും കൂടാതെ നടത്താം.

ഹൈഡ്രജൻവായുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ:— ഈ വാതകത്തിനു നിറമാ കട്ടേ, രുചിയോകട്ടേ, വാസനയോകട്ടേ ഇല്ല. ഗാസ് ഭരണിയുടെ മു ഖത്തിൽ ഒരു കത്തുന്ന ഈക്കൽകൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ വാതകം തവിയെ കത്തുന്നതായ്ക്കാണ്. ഇക്കൽ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി യാൽ, ഈക്കലിൽ തീ ഉണ്ടാകയില്ല. ആയതിനാൽ വാതകം കത്തുമെങ്കിലുണ്ടാൽ സാധനങ്ങൾ കത്തുന്നല്ല.

ഗാസിന് ഘനം ചുരുങ്ങും. മുഖം മേല്പോട്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിൽനിന്ന് വാതകം വേഗത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒരു പാത്രത്തിൽനിന്ന് മുഖം കീഴ്പ്പോട്ടാക്കിയ വേറൊരു പാ ത്രത്തിലേക്ക് ഈ വാതകത്തെ വിടാം (ചിത്രം 17). ഈ വാ തകം സോപ്പുകുമളയിൽ നിറയുവാൻ സജ്ജീകുന്നതായാൽ അതു് വേഗത്തിൽ മേല്പോട്ട് വായുവിൽ പൊങ്ങിപ്പോകും. വായുവി നെ കീഴ്പ്പോട്ട് തള്ളുവാനുള്ള സൗകര്യം വാതകത്തിനു ഒരു

പത അല്ലെങ്കിൽ നര (Effervescence) പു രപ്പെടുന്നതു കാണാം. വള രെ താമസിയാതെ ഒരു വാ തകം ഗാസ് ഭരണിയിൽ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ആരംഭ ത്തൽ ഗാസിനെ ഒരു ടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ പിടിച്ച് തയുടെ അടുക്കെ കൊണ്ടു പോവുക. ഗാസ് പൊട്ടു ന്നശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. പി ന്നേയും ഗാസ്യ പിടിച്ചു പോകുക. പിന്നേയും ഗാ സ്യ പൊട്ടുന്നതായി കേൾ

കാൽസിയം ക്ലോറൈഡ് നിറച്ച ഒരു U-കുഴൽ ഉപയോഗിക്കുക. കുഴലിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുപോലുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ കുഴലിനോടു് ഘടിപ്പിക്കുക. ഉപകരണത്തിൽ നിന്നു് വായുവെല്ലാം പോയെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ ഫൈഡ്രജനെ കത്തിക്കുക. തീയിനെ റിട്ടാർട്ടിന്റെ (Retort) തണുത്ത ഭാഗത്തിൽ തട്ടത്തക്കവണ്ണം ശരിപ്പെടുത്തുക (ചിത്രം 18). റിട്ടാർട്ടിന്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ലപോലെ തുടച്ചതായ ഒരു ബീക്കർ വെയ്ക്കുക. ബീക്കറിൽ കുറെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ശേഖിക്കുന്ന താഴ്ന്നുണ്ടാം.




ചിത്രം 45 വെള്ളത്തിന്റെ സംശ്ലേഷണം

ഫൈഡ്രജനു് ധൈമികപദാർത്ഥങ്ങളെ കുറുക്കുന്നതിന്നു് (Reduce) സാമർത്ഥ്യമുണ്ടു്. ഫൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനോടു് വേഗത്തിൽ ചേരുന്നതിനാൽ, ധൈമികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് ഓക്സിജനെ ഇതു് അപഹരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം:— കാൽസിയം ക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയ കുഴലിൽ കൂടി ഈ വാതകത്തെ പോകുവാൻ സമ്മതിപ്പി് അതിലെ നീരാവി എല്ലാം നീക്കിയതിന്നു ശേഷം വാതകത്തെ ഒരു വിധം ചൂടുപിടിപ്പിച്ച കോപ്പറോക്സൈഡ് ഉള്ള കുഴലിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായാൽ വാതകം കോപ്പറോക്സൈഡിലെ ഓക്സിജനെ അപഹരിച്ചുകളയും.

ഈ പരീക്ഷയിൽ, കോപ്പറോക്സൈഡ് 'ക്ഷയ'ത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നോ, ഫൈഡ്രജൻ കോപ്പറോക്സൈഡിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നോ, നാം പറയുന്നു.



ചിത്രം 46.

വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരയോഗം (Gravimetric composition) കാണാവുന്നതാണ്. കോപ്പറോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ പരിശോധനക്കൾക്ക് മുമ്പും പിമ്പും തൂക്കിനോക്കണം. രാസവികരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം ശേഖരിക്കണം. അതിന്റെ തൂക്കവും കാണണം. വെള്ളം ആവിയാകുമ്പോൾ തൂക്കം പുനഃശോധിക്കാവുന്നതുമാത്രം എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. വെള്ളത്തിന്റേയും ഓക്സിജന്റേയും തൂക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന്റെശേഷം, ഫൈഡ്രജന്റെ തൂക്കം കാണുന്നതിൽ പ്രാധാന്യമില്ലല്ലോ. കൃത്യമായ് ചെയ്ത പരീക്ഷകളിൽ നിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫലം എന്തെന്നാൽ 1 ഗ്രാം ഫൈഡ്രജനോടു 7.94 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ചേർന്ന് 8.94 ഗ്രാം വെള്ളം തരുന്നു എന്നതാകുന്നു.

ഓക്സി-ഫൈഡ്രജന്റെ സഹായത്താൽ

വേലപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം (Blowpipe)

ഫൈഡ്രജൻ കത്തുമല്ലോ. അതിനെ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനിൽ കത്തിപ്പിടിക്കാം. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചതായ ഒരു ഉപകരണം

മാകുന്നു ഒക്സി-ഹൈഡ്രജൻ ഉപക്കുഴൽ Oxyhydrogen blow-pipe. ഇതിൽ രണ്ടു കുഴലുണ്ടാകും. ഒന്നു മറ്റൊരിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. പുറമെയുള്ള കുഴലിൽ കൂടി ഹൈഡ്രജൻ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വായുവിനെ കത്തിക്കും. ഉള്ളിലെ കുഴലിൽ കൂടി ഓക്സിജൻ ഉറക്കോടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീയിന് നിറം തീരെ ഇല്ലാതാവും.

ഈ തീയ്ക്ക് അത്യുഷ്ണമുണ്ട്. ലോഹങ്ങൾ ഉരക്കുവാൻ ഈ തീ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ കാലത്തിൽ ഹൈഡ്രജനു പകരം ഇതേ ഉപകരണത്തിൽ അസിറ്റിലിൻ വാതകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഹൈഡ്രജനേഷൻ (Hydrogenation)

കൊഴുപ്പുകൾ ഉറക്കേണ്ടതിലേക്ക് നവീനകാലങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃത്രിമവെണ്ണ (Margarine) ഉണ്ടാക്കുന്നതു മഹായുദ്ധ കാലത്തിൽ ആണ് ആവിർഭവിച്ചതു. അക്കാലത്തു സൈന്യങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര വെണ്ണ കിട്ടാതെ വന്നു. വാസനകൊണ്ടും, രുചികൊണ്ടും ചില എണ്ണകളൊന്നും അവയ്ക്ക് ഇയ്യപ്പൊഴാതെ ആയി. സംഗതിവശാൽ ചുട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ അബ്ജനകവായുവിനെ കമച്ചയിടുവാൻ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അതു: ഉറക്കുകയും അതിന്റെ നിറം വെളുത്തതാകുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ആണ് ആദ്യം കൃത്രിമവെണ്ണ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാൻ ഇടയായത്. ഈ വികാരം മേൽത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ എണ്ണയിൽ നേരിയ നിക്കൽ (Nickel) പൊടികൾ ചേർത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 41 വിലയനം

ഉപ്പു, പഞ്ചസാര എന്ന ഘനപദാർത്ഥങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ അവ അലിഞ്ഞു പോകുന്നു. അവവെള്ളത്തോടു ചേർന്ന് ഒരു ദ്രവീയന (solution) മായിത്തീരുന്നു. പഞ്ചസാര മേൽത്താൽ പഞ്ചസാര വിലയനമാണ്; ഉപ്പുമേൽത്താൽ ഉപ്പുവിലയനമാണ്.

എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും വെള്ളം ആയിരിക്കയില്ല വിലായക (solvent) ദ്രാവകം. അയോഡീൻ മേതിലേറഡ് സ്പിരിറ്റി (methylated spirit) ലാണ് അലിയുക; ഗന്ധകമാകട്ടെ കാർബൺഡൈസൾഫൈഡ് (corbonbisulphide) ക അലിഞ്ഞു ചേരും.

വിലയനം ലഭിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്നു വിധായകം എന്നാണ് പേര്. അലിയുന്ന പദാർത്ഥത്തെ വിലേയം (solute) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

വിലയനത്തിന്നു ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അതിന്നു വിലേയത്തിന്റേയും വിധായകത്തിന്റേയും ഇടകലന്ന സ്വാഭാദും നിറവും ഉണ്ടാകും. വിലയനം ഒരു ഇടത്തിൽ അനങ്ങാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ കൂടി വിലേയം പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തു അവക്ഷേപിക്കുകയില്ല.

ദ്രാവകങ്ങളിൽ അലിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വിലയനീയവസ്തുക്കൾ (soluble substances) എന്നാണ് പറയാറു്.

മണൽ വെള്ളത്തിൽ അലിയില്ല. മണൽ ചേർത്തവെള്ളം ഇളക്കി ഒരിടത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മണൽ അവക്ഷേപിക്കുന്നതു കാണാം.

ഒരളവു വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പും പോലെ ഉപ്പുലിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അലിയുന്ന ഉപ്പിനെന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടു്. ആ തോതു കവിഞ്ഞാൽ ഉപ്പു അവക്ഷേപിക്കുന്നതാണു്. ആരംഭത്തിൽ കുറച്ചു ഉപ്പു ചേർക്കുക. ഉപ്പു വിലയനം കിട്ടും; കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പു ചേർത്തിട്ടു കൂക. ഉപ്പു അലിയും. വീണ്ടും ചേർക്കുക. ഉപ്പു അലിയുകയില്ല. ആവുന്നിടത്തോളം ഉപ്പുലിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന വിലയനം പരിപൂരിത (saturated) മായ ഉപ്പു വിലയനമാണു്. ഇതേമാതിരി അലിയ

ന്ന ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ഒരു പരീപൂരിത വിലയനമുണ്ടു ഒരു നിശ്ചിതായതനമുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ പദാർത്ഥം അലിഞ്ഞു ചേരാനെയുള്ള അവസ്ഥവരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന വിലയനം പരീപൂരിത വിലയനമാണ്.

പരിപൂരിത വിലയനം ചില ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒന്നാമതായി പദാർത്ഥത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; രണ്ടാമതായി ഉഷ്ണത വർദ്ധിച്ചാൽ വിലേയത്തിന്റെ അളവു അധികമാകും. അതായത് ഉഷ്ണത അധികമായാൽ താണു ഉഷ്ണതയിലുള്ള പരിപൂരിത വിലയനം അപരിപൂരിത (unsaturated)മായിത്തീരും. ഉയർന്ന ഉഷ്ണതയിൽ വീണ്ടും പദാർത്ഥം ചേർത്തു പരിപൂരിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്.

വിലയനത്തെ മുടക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകം ബാഷ്പമായിപ്പോകുന്നു. അവസാനം വിലേയം ബാക്കിയാകുന്നു.

പദാർത്ഥം തെരിച്ചു പോകാതെ വിലയനത്തെ ജാഗ്രതയോടെ വററിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിലേയത്തിന്റെ തുക വിലയനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ചേർന്ന വിലേയത്തിന്റെ തുകത്തിന്നു തുല്യമായിരിക്കും. വററിച്ചതിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ചേർന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെതായിരിക്കും. വിലയനത്തിന്നും വിലേയത്തിന്റെ ഗുണമുണ്ടാകും.

അല്പായം 42 വിലയനം (തുടച്ചു)

വിലയനീയത (solubility)

ഓരോരു സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വിലയനം വെച്ചുറയ്ക്കാവാനും എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. വെള്ളത്തിൽ പാർഫിൻ മെഴുകു (paraffin wax) അലിയുകയില്ല. എന്നാൽ അതു ബെൻസീനി (benzene) ൽ അലിഞ്ഞുചേരും. വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്ത മിക്കസാധനങ്ങൾക്കും ആൽക്കഹൊൾ (alcohol) വിലയനകമാണ് ആൽക്കഹൊളിൽ അലിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന വിലയനങ്ങൾക്കു ഷിങ്ക്വർ

(tincture) കര എന്നാകുന്നു പേർ. ചെഞ്ചലും (resin) ടെർപ്പൻടൈൻ (turpentine) തൈലത്തിലാണു നല്ലവണ്ണം അലിയുക ഇങ്ങിനെ കിട്ടുന്ന വിലയനമാണ് വാർണ്ണീഷ്. ബെൻസിനിൽ കൊഴുപ്പുകളും എണ്ണയും അലിയും. അതുകൊണ്ട് വസ്തുങ്ങളിൽ തട്ടുന്ന മെഴുക്കുകൾകാകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബെൻസിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് ഒരുപദാർത്ഥത്തിന്റെ വിലയനസമ്പ്രദായം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ വിലായകമെന്നെന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

അളവറിയുന്ന വിലായകത്തിൽ എത്ര തൂക്കം വില്പേയം അലിയും എന്നു അറിയുന്നത് ശാസ്ത്രപഠനത്തിന് ഉപകരിക്കും. ഒരു നിശ്ചിതോഷ്ണതയിൽ 100 ഗ്രാം വിലായകത്തിൽ ഏറ്റവും അലിയുന്ന വില്പേയത്തിന്റെ തൂക്കമാണ് സാധനത്തിന്റെ വിലയനീയത എന്നത്. ഉദാഹരണമായി 30°C ലായി 100 ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ 35.8 ഉപ്പിലധികം അലിയുകയില്ല. ആയതിനാൽ 30°Cൽ ഉപ്പിന്റെ വിലയനീയത 35.8 ഗ്രാമാകുന്നു.

ഉഷ്ണതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമല്ലോ സാധനത്തിന്റെ വിലയനീയത. ആയതിനാൽ വിലയനീയത പറയുമ്പോൾ ഉഷ്ണത പറയുവാൻ മറക്കരുത്.

വിലയനീയത കാണുന്ന മാർഗ്ഗം താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ഉഷ്ണതയിൽ പരിപൂരിത വിലയനം ഉണ്ടാക്കണം പരിപൂരിതമോ എന്നു അറിയുവാൻ സാധനത്തിന്റെ കഷണം വിലയനത്തിൽ കുറേ നേരമിരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണം.

ഒരു പുത്തിയായ ബേസിൻ (basin) തൂക്കണം. ഈ ബേസിനിൽ പരിപൂരിത വിലയനമരിച്ചെടുക്കണം. ബേസിനും വിലയനവും തൂക്കണം. ബേസിൻ മുക്കാലി (tripod stand) മേൽ വെച്ചു തിളപ്പിക്കണം; തെരിച്ചു യാതൊന്നും പുറത്തു പോവാതിരിക്കാൻ മൂടിവെക്കണം. ദ്രാവകം തിള

പിക്സമ്പോൾ നീരപ്പ (water - bath) ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗകര്യമായിരിക്കും. നല്ലവണ്ണം ബാഷ്പീഭവനം സംഭവിച്ചതിനു ശേഷം ബേസിൻ തുക്കണം. വീണ്ടും നീരപ്പിൽ 15നീമിഷം

വെച്ച് മുടാക്കിയതിനു ശേഷം തുക്കണം. തുക്കത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ അപ്പോഴത്തെ തുക്കം കുറിച്ചെടുക്കണം.



(ചിത്രം 47)

ബേസിനിന്റെ തുക്കം = a ഗ്രാം

(ബേസിൻ + വിചയനം) തുക്കം = b ഗ്രാം

ഓ ദ്രാവകത്തിന്റെ തുക്കം = $(b-a)$ ഗ്രാം

(ബേസിൻ + വിലേയം) തുക്കം = c ഗ്രാം

ഓ വിലേയത്തിന്റെ തുക്കം = $(c-a)$ ഗ്രാം

ഓ വിചായകത്തിന്റെ തുക്കം = $(b-c)$ ഗ്രാം

ആയതിനാൽ $(b-c)$ ഗ്രാം വിചായകത്തിൽ $(c-a)$ ഗ്രാം വിലേയം അലിയും

ഓ 100 ഗ്രാം വിചായകത്തിൽ $\frac{(c-a)}{(b-c)} \times 100$ ഗ്രാം വി

ലേയം അലിയും

ഉഷ്ണത ആദ്യം കുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വിചയനീയത എത്ര എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ഉഷ്ണത $t^{\circ}\text{C}$ ആ

കട്ടെ. എന്നാൽ $t^{\circ}\text{C}$ ൽ വിലയത്തിന്റെ വിലയനീയത $\frac{(c-a)}{b-c} \times$

100ഗ്രാം ആകുന്നു.

ഉഷ്ണത ഉയരുമ്പോളുള്ള വിലയനീയത കാണാൻ വേഗത കൂടുന്ന ഒരു മാറ്റം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്കു കൃത്യമായ അളവുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 2 ഗ്രാം സാധനം തൂക്കു പൊതിയാക്കി വെക്കുക. പരിപൂരിത വിലയനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധനത്തേക്കാളും തൂക്കമുള്ള ഒരു സാധനക്കു ചുറ്റും വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക. വെള്ളം ചൂടാക്കിപ്പോയ ഉഷ്ണതയിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു എന്നു കാണുക. ഒരു പൊതി ചേർത്തു അതിലെ സാധനം അലിയുമ്പോളുള്ള ഉഷ്ണത കുറിക്കുക. വേറൊരു പൊതിയിലെ സാധനമിട്ടു അതിന്നാവശ്യമുള്ള ഉഷ്ണത കാണുക. ഇമ്മാതിരി മൂന്നു നാലു തവണ പരിശോധന നടത്തുക.

എന്നാൽ ഉഷ്ണതയും അലിയുന്ന സാധനത്തിന്റെ തൂക്കവും കാണാം. വിലായകത്തിന്റെ അളവു 50 c.cm (ക്യൂ. സെ) ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൂക്കം 50 ഗ്രാമാണ്.

ആയതിനാൽ 50 ഗ്രാമിൽ, ഓരോ ഉഷ്ണതയിൽ അലിയുന്ന തൂക്കം എത്രയെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഈ കുറിപ്പുകളിൽനിന്നു വിലയനീയത കണക്കാക്കാം.


ഈ പരിശോധനയിലെ ഫലം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കയില്ല. ചൂടാക്കുമ്പോൾ എടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം കുറേയ്ക്കു ചുരുങ്ങും. ഈ കുറവു വകവെക്കാതെയാണ് പരിശോധന നടത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കണം.

ഫലം ഒരു ഗ്രാമിൽ വരച്ചുകാണിക്കാം. പല പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഫലം ഓരോ ഗ്രാമിൽ വരക്കുന്ന പക്ഷം വിലയനീയതയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പഠിക്കാവുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 48

വാതകങ്ങളും വിലയനവും

കിണറിലെ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വാതകം ശേഖരിക്കാം. ഈ വാതകം വായുവല്ലാതെ മററൊന്നും അല്ല. ഈ വായു സജ്ജീകരിക്കുവാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചിത്രത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കുക.



ചിത്രം 48

ഈ വായു വെള്ളത്തിൽ എങ്ങിനെയുണ്ടായി? വായുമണ്ഡലത്തിലെ വായു വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതു ഉണ്ടായത്. വായു വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം അലിയുന്നില്ല 100 c.c വെള്ളത്തിൽ സമാർ 2 c.c വായുവേ അലിയുകയുള്ളൂ.

കിണറിലെ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോഴേണല്ലോ വായു പുറമേ പോയത്. ആയതിനാൽ ഉഷ്ണത അധികമാകുന്നോരും വായുവിന്റെ വിലയനീയത ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരും. ഘനപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഈ രീതിയല്ല നാം കണ്ടത്. ഉഷ്ണത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഘനപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിലയനീയത വർദ്ധിക്കുകയാണു ചെയ്യുക.

കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചൊന്നു അലിയും 'സോഡാവാട്ടർ' (soda water) അങ്ങനത്തെ വിലയനമാ

ണ്. സോഡാക്കുപ്പി ഉടച്ചതും കുമിളകൾ പുറപ്പെടുന്നു. മർദ്ദത്തിൽ നിത്തിയിരുന്ന കാർബൺഡൈകാക്സൈഡ് കുമിളകളാണിവ. ഇവ പോയതിനു ശേഷം ശക്തിയില്ലാത്ത 'സോഡാവാട്ടർ' ചൂടാക്കുന്ന പക്ഷം, കുമിളകൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്ന കാർബൺഡൈകാക്സൈഡ് വാതകത്തിന്റെ കുമിളകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്.

കാക്സീജനം വെള്ളത്തിൽ അലിയും; പക്ഷേ വിലയനീയത വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഫൈബ്രജൻ വെള്ളത്തിൽ അലിയുകയില്ല. ക്ലോറീൻ നല്ലവണ്ണം അലിയും. ഫൈബ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകം വല്ലാതെ അലിയും.

വായുവെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾക്കു വളരെ ഉപകാരമുള്ളതാണ്. അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള വായുവിലെ കാക്സീജനിനെ ആണ് ഗില്പുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള നാളികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 44

അക്ഷീഭവനം (crystallisation)

കല്ലുണ്ടം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അതിൽ പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള പാർശ്വങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുവെച്ചപ്പോൾ, ഉപ്പിനു കല്ലുണ്ടത്തിന്റെ ആകൃതി അല്ല ഉണ്ടാവുക. ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ഓരോ ആകൃതി ഉണ്ടാകും.

ഇതുപ്പിനു സമചതുര (prism) ത്തിന്റെ ആകൃതിയും. ആല (പടിക്കാരം) ത്തിന്നു് അഷ്ടഫലകീയാ (octahedral) ആകൃതിയും വെങ്കല്പി (quartz) നു് ഷഡ് പാർശ്വാകൃതിയും കാൽസൈറ്റി (calcite) നു് സമചതുർഭുജപാർശ്വ (rhombohedron) ആകൃതിയും ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

മയിൽത്തൂത്ത (blue vitriol) ത്തിന്നു ആകൃതിയുണ്ടെങ്കിലും അതു് വിഷമം പിടിച്ചതാണ്.

ഇമ്മാതിരി നിശ്ചിതാകൃതികളോടുകൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളെ അക്ര (crystal) ഞ്ങൾ എന്നാണ് പറയാറ്. മാണിക്യം, കറുപ്പു കൽ, സ്വഭാവവികമായി ആക്രിയാകൃതി ഉണ്ടു്. പക്ഷേ ഭംഗിക്കു വേണ്ടി ചെത്തി ശരിപ്പെടുത്തി ഇവക്കു കൃത്രിമമായ രൂപങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. പള്ളിക്കിന്നു അക്രിയാകൃതിയില്ല. പക്ഷേ മുറിച്ചു ഇതിന്നു പല ആകൃതികളും കൊടുക്കാം. കരിക്കു സ്വന്തമായി, സ്വഭാവവികമായ ഒരു ആകൃതിയില്ല. പള്ളി, കരി എന്നീ പദാർത്ഥങ്ങളെപ്പോലെ അക്രിയാകൃതി ഇല്ലാത്തവ അനാകാര (amorphous) പദാർത്ഥങ്ങളാണ്.

അക്രങ്ങളെ പരീക്ഷണ ശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കാം. മുറിയുടെ ഉഷ്ണതയിൽ നിന്നു 5°C എങ്കിലും ഉയർന്ന ഉഷ്ണതയിൽ ആലത്തിന്റെ ഒരു പരിപൂരിതവിലയന്നു ഉണ്ടാക്കുക. വിലയന്നത്തിന്നു ഇളക്കം തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഒരിടത്തിൽ വെക്കുക. അതിൽ ചെറു അക്രങ്ങൾ കാണാം. അവയിൽ നിന്നു് നല്ലതെന്നു തോന്നുന്ന ഒരക്രം എടുത്തു് അക്രം വിലയന്നത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായി നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം കെട്ടിത്തൂക്കുക. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കൊട്ടിത്തൂക്കിയ കഷണം പരിശോധിക്കുക. ആലത്തിന്റെ വലിയ ഒരക്രം കാണാം. അതിന്റെ പാർശ്വങ്ങളെല്ലാം നല്ല പോലെ തെളിഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

അനുസാധനങ്ങളോടു തൊട്ടിരുന്നാൽ അക്രങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണ രൂപം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ചാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗം തട്ടിട്ടു് അക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അക്രത്തിന്നുള്ള വാസ്തവ രൂപം കാണുന്നതല്ല. അനേകമക്രങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉണ്ടായോരു തമ്മിൽ തട്ടി നല്ല വളച്ചു അവക്കു ഉണ്ടാകയില്ല. ഉയർന്ന താപത്തിലെ പരിപൂരിതവിലയന്നത്തെ പെട്ടെന്നു തണുപ്പിച്ചാൽ അക്രങ്ങളുണ്ടാകുവാനുള്ള സമയം ചുരുങ്ങുന്നതിനാൽ അക്രങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ തരികളായിരിക്കും.

ഈ സംഗതികളെ മുൻനിർത്തിട്ടാണ് നല്ല അക്രം ഉണ്ടാ

ക്കുൻ ചെറു അക്കത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കി കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ച് പരിശോധിച്ചത്.

അദ്ധ്യായം 45

അക്കീഭവനം (തുടർച്ച)

കർപ്പൂരം ചൂടാക്കിയാൽ ഉരുകാതെ ബാഷ്പമായിത്തീരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ അയൊഡീൻ (iodine) ചൂടാക്കുമ്പോൾ അയൊഡീൻ വാതകമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഉരുകാതെതന്നെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ബാഷ്പമായിത്തീരുന്ന സമ്പ്രദായം ഉൽപതനം (sublimation) എന്ന ക്രിയ ആകുന്നു.

അയൊഡീൻ വാതകത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതായാൽ അയൊഡീൻ അക്കങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ്. കർപ്പൂരവാതകം തണുപ്പിച്ചാലും കർപ്പൂരാക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

നാകം പൂശിയ ഇരിമ്പ് (galvansied iron) നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇരിമ്പുവലകളെ ഉരുക്കിയ സിങ്കിൽ മുക്കിത്താണു നാകം പൂശിയ ഇരുമ്പുതുകിടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരം തുകിടുകളിന്മേൽ പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം സിങ്കന്റെ അക്കങ്ങൾ കാണാം. സരഫറിൽ നിന്നും രണ്ടു തരം അക്കങ്ങൾ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു തരം ചതുർഭുജ പാർശ്വാകൃതിയുള്ളതാണ്. കാർബൺ ബൈസൾഫൈഡിൽ സൽഫർ അലിയിച്ചു പരിപൂരിതമാക്കുക. അരിച്ച വായുവിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ചതുർഭുജ പാർശ്വാകൃതിയുള്ള അക്കങ്ങൾ കിട്ടും. ഗന്ധകം (സരഫർ) ഉരുക്കിത്തണുക്കുവാൻ വെയ്ക്കുക. ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാടകണ്ടുതുടങ്ങും. പാടമേൽ രണ്ടു ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അടിയിലുള്ള ദ്വാരകത്തെ പുറമെ കളയുക. അപ്പോൾ മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ളതും സൂചിയുടെ ആകൃതിയുള്ളതും ആയ ഏകനത പാർശ്വാസരഫർ കിട്ടും.

അക്കങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോളുള്ള ഫലം കുറേ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതല്ല. ആലം, പൊൻകാരം (borax) എന്നിവ ചൂടാക്കിയാൽ ഉരുക്കി തിളച്ചു തുടങ്ങും. എന്നാൽ വെടിയുപ്പ് (Nitre)

ഉരുകാൻ ഉയർന്ന ഉഷ്ണത ആവശ്യമാണ്. ഇതുപു അത്രവേഗമൊന്നും ഉരുകുകയില്ല.

ചില അക്കങ്ങളെ ചൂടാക്കിയാൽ പരീക്ഷണക്കുഴലിന്റെ മേൽഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കാണാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി, മയിൽതുത്താക്കങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണക്കുഴലിൽ ചൂടാക്കുക. പരീക്ഷണക്കുഴലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണുകയും മയിൽ തുത്തത്തിന്റെ നിറം വെളുപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വെള്ളത്തിന്നു അക്കീകരണജലം (water of crystallisation) എന്നു പേരുണ്ട്. ചൂടാക്കിയതിന്നു ശേഷം ബാക്കിയാകുന്ന പദാർത്ഥം നിജജല (anhydrous) പദാർത്ഥമാണ്. മാഗ്നീസിയം സൾഫേയിറ്റ് ചൂടാക്കിയാലും അക്കീകരണജലം കിട്ടും.

എല്ലാ അക്കങ്ങളിലും അക്കീകരണജലം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇതുപു, വെടിയുപ്പു എന്നിവയിൽനിന്നു അക്കീകരണജലം കിട്ടുന്നതല്ല.

അക്കങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. ജലാണു അക്കങ്ങളിൽ സംപൂർണ്ണമായ രാസക്രിയയിൽ ഏല്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കരുതാവുന്നതല്ല. എങ്കിലും വെറും ഭൗതികമാറ്റം (physical change) അല്ല. കോപ്പർസൾഫേയിറ്റ് അക്കങ്ങൾ പലമാതിരിയിലുണ്ടു ഒരു ജലാണു മാത്രം ഉള്ള കോപ്പർസൾഫേയിറ്റ് (CuSO_4 , H_2O) അഞ്ചുജലാണു ഉള്ള കോപ്പർസൾഫേയിറ്റ് (CuSO_4 , $5\text{H}_2\text{O}$) ഉണ്ടെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കറിയാം. — 70°C വേർതിരിയുന്ന ഉപ്പിന്റെ അക്കത്തിൽ 2 ജലാണു ആണ് ഉണ്ടാവുക; എന്നാൽ നാം പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ അക്കത്തിൽ 10 ജലാണു കാണും NaCl , ($10\text{H}_2\text{O}$) ഏഴു ജലാണുവും 10 ജലാണുവും ഉള്ള സോഡിയം കാർബണേയിറ്റ് ഉണ്ടു.

ചില അക്കങ്ങളുടെ നിറം അതിലെ അക്കീകരണജലത്തിന്റെ തോതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കോബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ്

(cobalt chloride) അക്കത്തിൽ 6 ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നിറം ഇളം വയലാറുനിറമായിരിക്കും. അതിനെ 120°C ഉഷ്ണതയോളം ചൂടാക്കിയാൽ അതിലെ അക്ഷീകരണ ജലം എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയി നിറം കടും നീലമാകും. ഈ ഗുണത്തെ ആസ്പദപ്പെടുത്തി ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ വിലയനംകൊണ്ടു് കാമുകന്മാർ സ്വകാര്യക്കത്തുകൾ എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അക്കത്തിന്റെ വിലയനം കൊണ്ടു് എഴുതിയാൽ കടലാസിലെ അക്ഷരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണുകയില്ല. ഈ എഴുത്തു തീയ്യടു് മീതെ കാട്ടി വേഗം വലിച്ചെടുത്താൽ ചൂടു തട്ടുന്നതോടു കൂടി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നീലനിറംവെച്ചു് തെളിഞ്ഞു കണ്ടുതുടങ്ങും. കടലാസു വായുവിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ ക്രമേണ അക്ഷരങ്ങൾ മങ്ങും.

കോബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് അക്കത്തിന്റെ നിറം അക്ഷീകരണ ജലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വേറൊരു പരിശോധനകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അക്കത്തിന്റെ വിലയനത്തിൽ ആൽക്കഹൊൾ ഒഴിക്കുക. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആൽക്കഹൊൾ അക്ഷീകരണജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ നിറം കടും നീലമായി മാറുന്നതാണ്.

മയിൽതുത്തത്തിന്റെ അക്കം നീലമാണല്ലോ. ഇതിൽ 5 ജലാംശം ഉണ്ടു്. അതിനെ സരഫ്ഫുറിക്ക് അമ്ലത്തിൽ ഇട്ടാൽ 4 ജലാംശം നീങ്ങി വെളുത്ത നിറമുള്ള കോപ്പർസൾഫെയിററ് അക്കം കിട്ടും. മയിൽതുത്ത അക്കത്തെ 100°C വരെ ചൂടാക്കിയാൽ 4 ജലാംശം ഡയൂമായി വെളുത്ത കോപ്പർസൾഫെയിററ് അക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. നിർജ്ജലമായ കോപ്പർ സൾഫെയിററ് കിട്ടുവാൻ 200°C വരെ ചൂടാക്കേണ്ടതാണ്.

അക്കങ്ങളുടെ നിറം അക്ഷീകരണജലത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നതിന്നു് മാഗ്നീസിയം പ്ലാട്ടിനോസയനൈഡ് എന്ന അക്കം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. 7 ജലാം

൯ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിറം നല്ല ചുവപ്പായിരിക്കും. 50°C ഉഷ്ണതയിൽ ഇതിൽ 5 ജലാംശവേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിറം മഞ്ഞയായിരിക്കും. 100°C ൽ ജലാംശം രണ്ടാണു്; നിറം വെളുപ്പു്.

മുട്ടുള്ളകുപ്പിയിൽ അക്കങ്ങളെ ഇട്ട് അടപ്പിട്ടുവെച്ചാൽ അവയിൽ മാറ്റം കാണുകയില്ല. പക്ഷെ തുറന്ന മട്ടിൽ അക്കങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നപക്ഷം ചില അക്കങ്ങൾ നന്നവൃത്തി ദ്രാവകമാകും. കോബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് പദാർത്ഥം ഇമ്മാതിരിയാണ് മാറുക. വെളുത്ത കോപ്പർ സൾഫെയിററ് വായുവിൽ വെച്ചാൽ വായുവിൽ നിന്നു നീരാവി വലിച്ചെടുത്തു നീല നിറമാകും. ഈതറി(ether) ൽ വെള്ളം കലന്നാൽ വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുവാൻ വിലയനത്തിൽ വെളുത്ത കോപ്പർ സൾഫെയിററ് ഇട്ടുവെയ്ക്കും. വാതകങ്ങളിലെ നീരാവി വലിച്ചെടുക്കാൻ കാൽസിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിയ്ക്കും. നീരാവിവലിച്ചെടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള അക്കങ്ങൾ വിദ്രാവക (deliquescent) വസ്തുക്കളാണു്.

വായുവിൽ ചില അക്കങ്ങളെ വെച്ചിരുന്നാൽ അവ തനിയെ മഞ്ഞി പൊടിഞ്ഞുവശാകും. ഈ ക്രിയ നടന്ന ശേഷം പദാർത്ഥം തൂക്കുന്നതായാൽ ഘനം ചുരുങ്ങിയതായി അനുഭവപ്പെടും. ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രസ്ഫടക (efflorescent) വസ്തുക്കളാണു്. ചവുക്കാരം (Washing soda), മയിൽതുത്തം, സോഡിയം സൾഫെയിററ് (ഇതിനെ ഗ്ലോബേർസ്സാൾട്ടു എന്നും പറയാറുണ്ടു്) എന്നിവ പ്രസ്ഫടക വസ്തുക്കൾക്കു ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 46

കാലാവസ്ഥയും ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതിയും—ബാഷ്പീഭവനവും സാന്ദ്രീകരണവും (Condensation)

—::*:—

കാലാവസ്ഥയും ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയും

പ്രകൃതിയിലെ വിവിത്രങ്ങൾക്കു് മുഖ്യകാരണം കാലാവസ്ഥയും ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതിയും ആകുന്നു. ഒരു ദേശത്തിലെ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും എവയെല്ലാമായിരിക്കേണമെന്നു് തീർമാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രണ്ടു സംഗികളെ ആശ്രയിച്ചാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം സമ്പ്രദായം എന്നിവയും ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളാൽ മാറ്റത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥയിലും ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സൂര്യനിൽനിന്നു് ലഭിക്കുന്ന ചൂടിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചയെ അനുസരിച്ചു് ഇരിയ്ക്കും. ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ വീഴുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടാകട്ടെ രശ്മികളുടെ കോണു, ദിവസത്തിന്റെ ദീർഘം എന്നീ ഇനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പകലിനും രാത്രികൾക്കും ഉള്ള സമയവ്യത്യാസം അധികമില്ല; സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ കുത്തനെ വീഴുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഷ്ണത പൊന്തിനില്ക്കും. ഇവിടെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി സാധാരണമായ് ഉഷ്ണമായതായിരിക്കും. ഒരു സ്ഥാനത്തിലെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയെ മുഖ്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടത്തെ ഉഷ്ണത ആണ്. ഇതിനും പുറമെ വായുവിലുള്ള നീരാവിയുടെ തോതു്, കടൽനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയർച്ച, കടലോരസാമീപ്യം അഥവാ വിസ്താരമേറിയ പാർശ്വസമുദ്രം

ത്തിന്റെ അടുപ്പം, സമുദ്രത്തിലെ കഴുകുകൾ, കാരാ മുതലായ മറ്റു ചില സംഗതികളും ഉഷ്ണത്തിന്റെ നിലയിൽ മാറ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥയിലും ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിയിലും മുഖ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഒരു സ്ഥാനത്തിലെ നീരാവിയുടെ തേളു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ വായു വരൾച്ചയെ പ്രാപിച്ചതായും ചിലപ്പോൾ കളിർമ്മയുള്ളതായുമിരിക്കും. വായുവിൽ ഉള്ള ബാഷ്പസഞ്ചയം മഴയായിട്ടും മഞ്ഞയായിട്ടും മുകൾമഞ്ഞയായിട്ടും അപസ്മാനസരണം മാറ്റത്തെ സ്പീകരിയ്ക്കുന്നു.

പുറമെ നിന്നുള്ള ചൂടുകൂടാതെ ഒരു സാധനം പതുക്കെ ബാഷ്പാവസ്ഥയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്ന രീതിയെ ആകുന്നു ബാഷ്പീഭവനം എന്നു നാം പറയുന്നത്. ഈ ബാഷ്പീഭവനം

1. ഉഷ്ണതയുടെ ഉയർച്ച,

2. ബാഷ്പീഭവനം സംഭവിക്കുന്ന സമതലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലാധിക്യം,

3. ഈ സമതലത്തിൽക്കൂടി കാരാ വീശിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കൽ എന്നീ സംഗതികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സാന്ദ്രീകരണം (Condensation) എന്നതു ബാഷ്പാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ തണുപ്പിച്ച് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കു മാറ്റുന്നതാകുന്നു. ഇതു ബാഷ്പീഭവനത്തിന്റെ വിപരീതമാകുന്നു. കഴൽവെള്ളം, കിണറുകളിലെ വെള്ളം എന്നിവയിൽനിന്നു നല്ല പരിശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടുവാൻ വെള്ളം തിട്ടപ്പിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന നീരാവിയെ തണുത്ത ഒരു സ്മാനത്തെയ്ക്കു കൊണ്ടുചെല്ലും; അപ്പോൾ നീരാവി ശുദ്ധജലമായ് പരിണമിക്കും. തണുത്തതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ നീരാവി സാന്ദ്രീകരിയ്ക്കുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 47

മഴ, മഞ്ഞ, 'മുടൽ മഞ്ഞ

മഴ

വായുവിൽ ഒരോരിക്കൽ ഒരോ ആയതനം ഉള്ള നീരാവി ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നീരാവിയുടേ തോത് വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ അസഹനീയമായി തോന്നുന്നു. വായുവിൽ പൂണ്ണമായ നീരാവി ഉള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിയപ്പിനെ വായു വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. അന്ന് അത്യുഷ്ണമാണെന്നു നാം പറയുന്നു. അന്ന് ആകാശം മേഘം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. തണുത്ത കാര്യം വീശുന്നപക്ഷം നീരാവി തണുത്തു് പെട്ടെന്നുള്ളികളായി തീരുന്നു. പിന്നീട് മഴയായി പെയ്യുന്നു.

പുഴകൾ, തടാകങ്ങൾ, സമുദ്രം എന്നീ ജലാശയങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളം ബാഷ്പീഭവിച്ച് നീരാവിയായി പൊങ്ങി വായുവിൽ കലരുന്നു. ബാഷ്പീഭവനം പ്രകൃതിയിലെ ചില വിശേഷങ്ങളാലും നടക്കുന്നുണ്ട്. നീരാവി വായുവിനേക്കാൾ എത്രയോ ഘനം ചുരുങ്ങിയതാകുന്നു. അതു കൊണ്ട്, നീരാവി മേൽപോട്ടു പൊങ്ങി ഉപരിഭാഗങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെ വായുവിന്റെ ഉഷ്ണത വളരെ താണതാകുന്നു. സമുദ്രവീതാനത്തിൽ നിന്നു ഉയരം അധികമാകുന്നോൾ വായുവിന്റെ അമച്ച ശക്തി ചുരുങ്ങുന്നു. ആയതിനാൽ നീരാവിയുടെ ആയതനം വർദ്ധിക്കുന്നു. നീരാവി തണുത്തു തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അതു് ഘനം ചുരുങ്ങിയതും നേർത്തായതും ആയ നീന്തുളളികളായി മാറുന്നു. പൊടിപടലം പോലെ ഇവ വായുവിൽ ചാരിപ്പറക്കുന്നു. ഇവയെ ആണ് നാം മേഘങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഇമ്മാതിരിയതെ ഒരു മാറ്റം തീവണ്ടി ഇഞ്ചിനിലെ പുകക്കുഴലിന്റെ അടുക്കെയായി കാണാം. വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നീരാവി പാത്രത്തിന്റെ മുഖത്തായി തണുത്തു് പുകപോലെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഈ പുകക്ക് മേഘത്തിനോടു് സാദൃശ്യമുണ്ടു്.

മേഘത്തിലെ നേരിയ തുള്ളികൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് പെരും തു

ഇളകളായി തീരും. ഈ തുള്ളികളുടെ ഘനം വായുവിനേക്കാൾ അധികമാകുമ്പോൾ അവ മഴയായി കീഴ്പ്പോട്ടു വീഴുന്നു.

മഞ്ഞു

സാധാരണയായി വായുവിൽ അതിൽ കൊള്ളാവുന്നത്ര നീരാവി ഇരിയ്ക്കുകയില്ല. കാര്യം വീശാത്ത രാത്രികളിൽ ചൂടിന്റെ വികിരണ (Radiation)ത്താൽ വായുവിന്റെ ഉഷ്ണത പെട്ടെന്നു താഴുന്നു. അപ്പോൾ വായുവിലുള്ള നീരാവി ജാസ്തിയായിത്തീരുന്നു. വായുവിന്നു എത്രത്തോളം നീരാവിയെ എടുക്കാമോ അത്രത്തോളം എടുത്തതായ അവസ്ഥ വന്നുചേരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ പരിപൂർണ്ണമായ (Saturated) വസ്ഥയെ നീരാവി പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. വികിരണം ഹേതുവായിട്ടു തെളിവുള്ള രാത്രികളിൽ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം തണുത്തുവശാകുന്നു. അവയുടെ അടുക്കെയുള്ള വായു അധികം തണുപ്പുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ഈ അട്ടിയിലെ വായുവിൽ വേണ്ടതിലധികമുള്ള നീരാവി ഉണ്ടാകാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അധികമാകാനിടയുള്ള നേരിയ നീർതുള്ളികൾ മഞ്ഞു (Dew)യിട്ട് തണുത്ത സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. ജനലുകളുടെ ഗ്ലാസുകളിൽനിന്നും തുത്തനാകം അടിച്ചിട്ടുള്ള മേൽപുരകളിൽനിന്നും മരങ്ങളുടെ ഇലകളിൽനിന്നും തണുപ്പുകാലങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ മഞ്ഞു ഇററിയ വീഴുന്നതു നിങ്ങൾക്കു അനുഭവമാണല്ലോ.

മുടൽമഞ്ഞു

നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു ദിവസം ബാഷ്പീഭവനത്താൽ പകൽ സമയത്തു വായുവിൽ വളരെ നീരാവി ഉണ്ടായിത്തീരും. ഈ നീരാവി വായുവിൽ കലർന്നിരിക്കും. രാത്രി പ്രസന്നമായതും അനക്കമില്ലാത്തതും ആയാൽ, ഭൂമിയുടെ തലത്തിന്റെ അടുക്കെയുള്ള വായുവിന്റെ അട്ടി നല്ലപോലെ തണുക്കും. അപ്പോൾ നീരാവിയുടെ തോതു വർദ്ധിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച നീരാവി നേരിയ കണങ്ങളായി പരിണമിച്ച് വായുവിൽ തിങ്ങിനില്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതു നിലത്തിന്റെ അടുക്കെയുള്ള

വായുവിലാണ് സംഭവിയ്ക്കുക. ഈ അവസ്ഥയെ മൂടൽമഞ്ഞ എന്ന് നാം പറയുന്നു. ചതുപ്പുസ്ഥലവും വായുവിൽ കരിപ്പൊടിയോ നേരിയപൊടിയോ ഉണ്ടായിരിക്കലും മൂടൽമഞ്ഞ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നു, വലിയ പട്ടണങ്ങളിലും വലിയ താഴ്വരകളിലും സാധാരണമായി മൂടൽമഞ്ഞ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ബാഷ്പീഭവനവും തണുപ്പും.

— : 0 : —


ബാഷ്പീഭവനം നടക്കുമ്പോൾ തണുപ്പുണ്ടാകും. ആൽക്കഹോളിലോ ഇതറിയിലോ കൈമുക്കി വീശുക. ദ്രാവകം കാണാതാകുന്നു; നല്ല തണുപ്പു തോന്നുന്നതാണ്. ദ്രാവകസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു ബാഷ്പസ്ഥിതിയിലേക്കു മാറുവാനായി ഗുപ്തോഷ്ണം (latent heat) നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ടാകുന്നു.

വെള്ളം തിളച്ചു ആവിയാകുമ്പോൾ ചൂടു നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉഷ്ണത കുറയുകയില്ല. വെള്ളം മുഴുവനും ആവി ആകുന്നതുവരെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വഥനാങ്കം സ്ഥിരമാണ്. നഷ്ടമാകുന്ന ചൂടു എത്രയെന്നു വ്യക്തമാക്കി അറിയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംജ്ഞയാണ് ഗുപ്തോഷ്ണം എന്നത്. വെള്ളം ബാഷ്പമാകുവാനുള്ള ഗുപ്തോഷ്ണനീരാവിയുടെ ഗുപ്തോഷ്ണമാണ്; ഇതിനെ, വെള്ളം ആവിയാകുമ്പോഴത്തെ ഗുപ്തോഷ്ണം എന്നും പറയാറുണ്ട്. കണക്കു കൂട്ടുവാനും മറ്റും ഈ സംജ്ഞക്ക് ഒരു നിർവചനം വേണം. 1 ഗ്രാം വെള്ളം ഉഷ്ണതയിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആവിയാകുവാൻ എടുക്കുന്ന ഉഷ്ണപരിമാണമാണ് നീരാവിയുടെ ഗുപ്തോഷ്ണം.

വേഗത്തിൽ ബാഷ്പീഭവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അധികം തണുപ്പുണ്ടാവപ്പെടും. ആൽക്കഹോളിലെക്കുട്ടിലും ഇത്തർ വേഗം ബാഷ്പീഭവിക്കും. അതുകൊണ്ടു, ഇത്തർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവപ്പെടും. അമോണിയാദ്രാവകവും വേഗം ബാഷ്പീഭവിക്കും.

ഹിമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അമോണിയം ട്രാവകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ട്രാവകത്തെ ആവിയാക്കിയാൽ നല്ല തണുപ്പുകാട്ടും. അപ്പോഴുള്ള ഉഷ്ണത 0°C —ൽനിന്നു താണനിൽക്കും.

അമോണിയംവാതകത്തെ അമച്ചുകുതി പ്രയോഗിച്ചു ട്രാവകമാക്കാം. കണ്ടുകിട്ടിൽ ഈ ട്രാവകം ശേഖരിതമായിരിക്കും.



ചിത്രം 49

1. ശുദ്ധജലം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഭരണികൾ.
- 2- ഉപ്പുവെള്ളം.
3. അമോണിയംവാതകം വഹിച്ചുകൊണ്ടു ഭരണികൾക്ക് ചുറ്റും വളയം വെക്കുന്ന കഴൽ.

ഈ ഭിക്കീന്റെ മേൽഭാഗത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു കഴൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണികൾക്ക് ചുറ്റും വളയം വെക്കുന്നതാണ് (ചിത്രം 48) പിന്നീട് ഈ കഴലിന്റെ അറ്റം പാത്രത്തിൽനിന്നു പുറമെവന്ന് ഒരു ആവിശീതിനിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ ആവിശീതിനിയിൽ അമച്ചുകുതി പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. ഈ ശീതിനിയിൽ ഉള്ള ട്രാവകം ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച ട്രാവകസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകാവുന്നതാണ്.

ട്രാവകസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പുറമെ വരുന്ന കഴൽ തുറക്കുമ്പോൾ ട്രാവകം വാതകമായാത്തീരുന്നു. ഈ വാതകത്തിന് വലിയ തണുപ്പുണ്ടാകും. ഈ തണുപ്പുള്ള വാതകമാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ വളയം വെക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഉപ്പുവെള്ളം തണുക്കുന്നു. അ

തിന്റെ താപക്രമം 0°C —ൽനിന്നു താണുപോകും. അപ്പോൾ ഭരണികളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം (pure water) ഫിമക്കെട്ടായിത്തീരുന്നു.

പാത്രത്തിൽനിന്നു പുറമെ വരുന്ന വാതകം ആവി ശീതീനിയിൽ എത്തി അമച്ഛ്ശക്തി ഏല്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കഴൽ വഴിക്കു പാത്രത്തിൽ എത്തി ഉപ്പുവെള്ളത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏല്പെടുന്നു.

വെള്ളത്തിന്റെ ഘനീഭവനാങ്കം. (FREEZING POINT)

— : 0 : —

ബാഷ്പീഭവനത്തിന്നു വിപരീതമാണല്ലോ സാത്രികരണം. സാത്രികരണത്തിന്നു ഉഷ്ണത കറയണം. നീരാവി തണുത്തസ്ഥലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളിയായിത്തീരുന്നു.

വായുലിൽ നീരാവിയുണ്ടു്. വായുവിന്നു വലിച്ചെടുക്കാവുന്നത്ര നീരാവി വായുവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീന്തു്തുള്ളികൾ എല്ലാ സ്ഥാനത്തും കാണാം. ഒരു ഗ്ലാസുബീക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളത്തിൽ ഹിമക്കട്ടക്കഷണവും ഉപ്പും ചേർക്കുക. വെള്ളത്തിൽ തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഗോളം (ബൾബ്) താഴ്ത്തുക. ഉഷ്ണത ചുരുങ്ങുന്നതായിക്കാണാം. ഈ അവസ്ഥയിൽ ബീക്കറിന്റെ പുറം ഭാഗം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബീക്കറിന്റെ പുറം മഞ്ഞുന്നതായും ഒരു ദ്രാവകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായും അനുഭവമാകും. ഈ ദ്രാവകം വെള്ളമാണെന്നു് പരിശോധനയ്ക്കുലം തെളിയിക്കാം. മങ്ങൽ കാണുമ്പോൾ ഉഷ്ണത കുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണു്.

വെള്ളം ബീക്കറിന്റെ പുറംഭാഗത്തു എവിടെനിന്നുവന്നു്? അതു വായുവിനിൽനിന്നുതന്നെ വന്നിരിക്കണം. പാത്രത്തിനുള്ളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉഷ്ണത ചുരുക്കിയെന്നു തെർമോമീറ്ററിൽനിന്നു മനസ്സിലായിരിക്കും. ഉഷ്ണത ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ബീക്കറിന്നു ചുറ്റുമുള്ള വായു തണുക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ഈ തണുപ്പിനാൽ വായുവിന്നു നീരാവിയെ ഉറക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി ചുരുങ്ങി. ക്രമേണ വായുവിലെ നീരാവി നിർത്തുള്ളികളായി ബീക്കറിന്റെ പുറംഭാഗത്തു വീണു. മങ്ങൽ ആ ആരംഭഘട്ടത്തെയാണു് കുറിച്ചതു്.

ഏതു ഉഷ്ണതയിലാണോ വായു നീരാവിയാൽ സംപൂരിതമാകുന്നു, ആ ഉഷ്ണതയെ തുഹിനാങ്കം (dew point) എന്നാണു്

വിളിക്കാൻ. മഞ്ഞൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഉഷ്ണത തുഹിനാകത്തെ കാണിക്കുന്നു.

വെള്ളം ഘനീഭവിച്ചാണ് ഹിമം ഉണ്ടാകുന്നത്; വെള്ളം ഘനീഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഉഷ്ണതയിലാണ്. ഇതൊരു സ്ഥിരാങ്കമാണ്. ഈ അങ്കത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ ഘനീഭവനാങ്കം (freezing point) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

വെള്ളത്തിന്റെ ഘനീഭവനാങ്കവും ഹിമം ഉണ്ടാകുന്നതു ദ്രവീകരണാങ്കവും ഒന്നുതന്നെയാണ്.

ഈ അങ്കം കാണുവാൻ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഗ്ലാസുകൾ വേണം.

അടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗോളമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസുകൾ എടുക്കുക. കുഴലിന്റെ വിസ്താരം വളരെ നേരിയതാകുന്നു. തുറന്ന അറ്റത്തു ഒരു നാളം ചേർത്തു പൂത്തിയുള്ളതും നീർത്തുള്ളികൾ



ഇല്ലാത്തതും ആയ രസം പകരുക. ഗോളം ചൂടു പിടിപ്പിക്കുക. നാളത്തിലെ രസത്തിൽക്കൂടെ കുറെ വായു കണങ്ങൾ പുറമെ പോകും (ചിത്രം 50). കുറെ രസം ഗോളത്തിലേയ്ക്കു കടക്കും. ചൂടു പിടിപ്പിക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും എന്ന പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തു രസംകൊണ്ടു ഗോളം നിറയ്ക്കുക. ഗോളത്തിലെ രസത്തെ ജാഗ്രതയോടെ തിളപ്പിച്ച കുഴലിലെ വായു വെല്ലാം കുളയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കുഴലിലും ഗോളത്തിലും രസം വന്നു നിറയും. ഏതു ഉഷ്ണത കുറിക്കേണമെന്നു വിചാരിയ്ക്കുവോ അതിനെക്കാട്ടിലും വലുപ്പിച്ച ഒരു ഉഷ്ണതയിൽ ഉപകരണത്തെ വെയ്ക്കുക. ഈ അവസ്ഥയിൽ നാളത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുഴലിന്റെ മേൽഭാഗം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു ഉരുക്കിമേക്കുക; പിന്നീട് നാളത്തെ നീക്കം ചെയ്യുക.

താപമാപകത്തുപോലെയെ സ്ഥിരാംശങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ.

മേൽ വിവരിച്ച മാതിരി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഴലിന്റെ ഗോളത്തിന്നു ചുറ്റും ചെറിയ പൊടിക്കഷണങ്ങളാക്കിയ നല്ല ഫിമം വെക്കുക; ഫിമംതന്നെ ഒരു നാളത്തിനുള്ളിൽ ഇരിയ്ക്കട്ടെ (ചിത്രം 51) കുറെ കഴിഞ്ഞശേഷം കഴലിനെ രസം എവിടെ സ്ഥിരമായിനിൽക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഈ സ്ഥാനം ഫിമം ഉരുകുന്ന ഉഷ്ണതയെ കുറിയ്ക്കുന്നു. ഈ അങ്കം തന്നെയാണു് വെള്ളത്തിന്റെ ഫനീഭവനാങ്കവും.



ചിത്രം 51


വെള്ളത്തിന്റെ ഫനീഭവനാങ്കം 0°C അല്ലെങ്കിൽ 32°F ആകുന്നു.

ക്വഥനാങ്കം വായുവിന്റെ മർദ്ദത്തെ ആശ്രയിരിക്കും. മർദ്ദം അധികമായാൽ ക്വഥനാങ്കം ആദ്യത്തേതായിരിക്കുകയില്ല. അതു കഴിവിൽ ഉയർന്നൊരു സ്ഥാനമായിരിക്കും.

പരീക്ഷണത്തിൽ എടുത്ത കഴലിനെ ഹിമാങ്കത്തിനും 760 മി. മീ. വായുസമർദ്ദമുള്ളപ്പോൾ ശുദ്ധജലത്തിനുള്ള താപനാങ്കത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരത്തെ സെൻസിഗ്രേഡ് (Centigrade) തെർമോമീറ്ററിൽ നൂറായിട്ടാണ് ഭാഗിച്ചിരിക്കുക. ഹിമാങ്കം 0° സെൻസിഗ്രേഡും ക്വഥനാങ്കം 100° സെൻസിഗ്രേഡും ആണ്. ഈ അങ്കങ്ങളെ 0°C എന്നും 100°C എന്നും ആണ് ചുരുക്കി എഴുതുക.

വായുവിന്റെ മർദ്ദം 1 മി. മീ. കണ്ടു അധികമാകുമ്പോൾ ക്വഥനാങ്കത്തിൽ 0.34°C ഉയച്ചു ഉണ്ടാകും.

മർദ്ദം അധികമാകുമ്പോൾ ക്വഥനാങ്കം ഉയരും എന്ന സംഗതി പരീക്ഷയുപം കാണാവുന്നതാണ്.




ചിത്രം 53.

53-ം ചിത്രം നോക്കുക.

ക്വഥനാങ്കം എത്രയെന്നു തെർമോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നതാണ്. കഴലിന്റെ തുറന്ന അറ്റം രസതന്ത്രങ്ങളിൽ ആകത്തക്കവണ്ണം സിലിണ്ടറിൽ രസം ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാസ്കിലെ വായുസമർദ്ദം പുറം വായുവിനുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമാണല്ലോ. ഫ്ലാസ്കിലെ വെള്ളം തിട്ടയുണ്ടെന്ന് നിലച്ചിരിക്കുന്നതായാണാം. വീണ്ടും തിട്ടക്കുമ്പോൾ ഉടക്കി എത്രയെന്നു നോക്കിയാൽ ഉയർന്നതായിരിക്കും.

മർദ്ദം താഴ്ന്നപ്പോൾ താണ ഉണ്ണിയെപ്പോലെയും വെള്ളം തിളയ്ക്കും ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു തിളപ്പിക്കുക. — തിളയ്ക്കുന്ന അവ

സരത്തിൽ ദീപം നീക്കി മൂലം കറക്കുക. ഫ്ലാസ്ക് കമിഴ്ത്തി വെക്കുക. അതിന്റെ അടിഭാഗത്തായി ഒരു ബേസിൻ വെക്കുക. ഫ്ലാസ്കിൻമീതെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക (ചിത്രം 54) ഫ്ലാസ്ക് തണുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആവി ഘനീഭവിച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികളായി മാറുന്നതിനാൽ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഉള്ളിലെമർദ്ദം ചുരുങ്ങുന്നു. വെള്ളം ഫ്ലാസ്കിൻ മീതെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിള ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടിരിക്കും, ആയതിനാൽ മർദ്ദം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ കപമനാകും ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ്.



ചിത്രം 54.

ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളമെടുക്കുക. വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഗ്ലോബ് താഴ്ത്തി തിളക്കുമ്പോളുള്ള കപമനാകം കുറിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് അലിയിക്കുക. വീണ്ടും കപമനാകം കാണുക. കപമനാകം ഉയന്നിരിക്കും. വിലയനങ്ങളുടെ കപമനാകം വിലായക (Solvent) ത്തിന്റെതന്നെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്.

വിഭാഗം നാലു്

അദ്ധ്യായം 51


മണ്ണു് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകപദാർത്ഥങ്ങളും.

ഒരു ബീക്കറിൽ കുറെ മണ്ണുടത്തു് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇളക്കി മേശപ്പുറത്തു വെയ്ക്കുക. കുറെനേരം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ബീക്കർ പരിശോധിയ്ക്കുക. അതിന്റെ അടിയിൽ പൊടിക്കല്ലു കളും അവയുടെ മീതെ മണലും അതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു ചളിയും അതിനുമേൽ വെള്ളവും വെള്ളത്തിൽ പെന്തിക്കിടക്കുന്ന ഇല പ്പൊടി വൈക്കോൽതുരുമ്പുകൾ എന്നിവപോലെ ചില സസ്യം ശങ്ങളും കാണാം.

ബീക്കറിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വെള്ളം പരിശോധിച്ചാൽ ചില സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ചീന പിഞ്ഞാണ (china-dish) അതിൽ ഇതിലെ വെള്ളം കുറച്ചെടുത്തു് വററിക്കുക. പിഞ്ഞാണത്തിൽ എന്തോ ബാക്കിയുണ്ടാവുന്നതായ്ക്കാണാം. ഈ സാധനം വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

അലിഞ്ഞിരുന്ന ആ സാധനം പല ലവണ (salt) ങ്ങളും കൂടിക്കലർന്നതായിരിക്കുന്നതാണു് ഇട. മണ്ണിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലവണങ്ങളും ഉണ്ടു്. അവയിൽ മുഖ്യമായവ കുറിയുപ്പ (common salt), സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് (Sodium nitrate), പൊട്ടാസിയം-നൈട്രേറ്റ് (Potassium nitrate) മഗ്നീസിയം സൾഫേറ്റ് (Magnesium sulphate), കാൽസിയം-ബൈകാർബണേറ്റ് (Calciumbi-carbonate) എന്നിങ്ങനെ കളകുന്നു.

ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെ സമ്പാദിയ്ക്കുവാൻ ജീവിലോകം അധികവും മണ്ണിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. സസ്യഭോജികൾക്കു വേണ്ടിവരുന്ന കായ്കറികൾ (മണ്ണിൽ വളരുന്ന) ചെടികളിൽനിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. മാംസഭോജികൾക്കും വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സസ്യോപജീവികളായ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നല്ലെ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയോ മറ്റോ മണ്ണുതന്നെ തിന്നിട്ടു ജീവിയ്ക്കുന്ന ഒരു ജന്തുവാണ്.



ചിത്രം 55

പാറപൊടിഞ്ഞു മണ്ണായിത്തീരുന്നു. വായുവിന്റെയും ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും ശക്തിയാൽ പാറകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു തരികളായിത്തീരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ആകർഷണശക്തിയാൽ ഇത്തരികൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ പെടുകയും കാലാന്തരത്തിൽ മിനുസമുള്ള പൊടിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പൊടിയെല്ലാം സംയോജിച്ചു നിബിഡമായിത്തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം മണ്ണ് എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയിലും ഗുണങ്ങളിലും മണ്ണുകൾ തമ്മിൽ അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. വായു, വെള്ളം എന്നിവ എല്ലാ മണ്ണിലും ഒരേ രീതിയിൽ

അല്ല പ്രവേശിക്കുന്നത്. വായു, വെള്ളം എന്നിവയെ എല്ലാ മണ്ണും ഒരേ മട്ടിൽ അല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പോഷകസാധനങ്ങൾ എല്ലാ മണ്ണിലും ഒരേ തോതിലല്ല ഉള്ളത്.


ചില മണ്ണിൽ മണൽഭാഗം അധികമായിരിക്കും. ചേറുക വാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമുള്ള മണ്ണ് കളിമണ്ണാകുന്നു. ചീഞ്ഞ ജിഞ്ഞ സസ്യാംശത്തിന്റെ ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് കപ്പമണ്ണാകുന്നു. ഒരേ തോതിലുള്ള മണലും കളിമണ്ണും മിതമായ തോതിലുള്ള കപ്പമണ്ണും കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മൃത്തിക പരിമരാശിമണ്ണാ (Loam) കുന്നു.

സസ്യവളച്ചുക്കു ഉതകുന്നത് പരിമരാശിമണ്ണാകുന്നു.

വേരും അതിന്റെ രചനയും.

—:O:—


സാധാരണയായി കരയിലെ ഒരു ചെടിയിൽ വേര് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് ഇരിയ്ക്കുക. ഇതിനു നിറം ഉണ്ടാകയില്ല. കമ്പാ



കാട്ടുമൊട്ടകേട്ടേ ഇലയാകട്ടേ പൂവാകട്ടേ കായാകട്ടേ ഒന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടാകയില്ല.

വേരുകളെല്ലാം ചേർന്നിന്നു സസ്യമൂലവ്യൂഹം എന്നു പേരിടാവുന്നതാകുന്നു. രണ്ടുവിധ സസ്യമൂലവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരേപ്പാടിൽ ആണിവേര് (taproot)

ചിത്രം 56. എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. സസ്യത്തിന്റെ തടി ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു ചെല്ലുന്ന ഭാഗമാണു ആണിവേര്. ഈ ആണിവേരിൽനിന്നു അനേക ഉപശാഖകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. ഈ ഉപശാഖകളിൽനിന്നു നേരിയവേരുകൾ പുറപ്പെട്ടു നാലുഭാഗത്തുപരന്നു പടരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഏപ്പാടിന്നു നരായണമൂലവ്യൂഹം എന്നാകുന്നു




ചിത്രം 57.

ആണിവേരിന്റെ സമ്പ്രദായം.

പേർ. രണ്ടാമതൊരു ഏല്പാടിൽ ആണിവേര്പ്പ് ഇല്ല. തടിയുടെ കണ്ടയിൽനിന്നു സുമാർ ഒരു നീളമുള്ള അനവധി വേരുകൾ പൊട്ടി മണ്ണിനുള്ളിൽ പരക്കുന്നു. ഈ ഏല്പാടിന്നു അസ്ഥാനാഗത മൂലവ്യൂഹം (Adventitious root system) എന്നാകുന്നു പേർ. തെങ്ങ്, പന, നെല്ല്, ചോളം എന്നീ സസ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം വേരുകൾ കണ്ടുവരുന്നു. മാവ്, പിലാവ് പൂച്ചി, വേപ്പ് ചന്ന വയ്പ്പു ആണിവേരുകൾ ഉണ്ടു്.

കാറ്റിനാലോ ജന്തുക്കളാലോ വേരോടെ ചരിച്ചിടപ്പെടാതെ സസ്യത്തെ നിലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുവാൻ ഉപകരിയ്ക്കു യാകുന്നു വേരിന്റെ മുഖ്യമായ പ്രവൃത്തി. വേരിന്നു് ബലമുള്ളതുകൊണ്ടാണു് വായുവും വെളിച്ചവും ഇലകളിൽ തട്ടത്തക്കവണ്ണം തടിയും വളനും വലുതാകുന്നതു്.

വേരുകളിൽ പലമാതിരി രചനകളോടുകൂടിയവ ഉണ്ടു്. നൂലുപേലേളുള്ള വേരുകളെ നാരവേര (Fibrous root) കൾ എന്നു പറയാം. പുല്ലിൽ ഇങ്ങനത്തെ വേരുകളാണു് കണ്ടുവരുന്നതു്. ചോട്ടത്തിന്റെ മൂലവ്യൂഹത്തിന്നു ബലം തീരെ ഇല്ല.




ചിത്രം 58

[നാരവേര (പുല്ലിന്റെ)]

ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ തടി വീഴാതിരിയ്ക്കുവാൻ തടിയുടെ അടിയിലുള്ള കമ്പുകളിൽനിന്നു് അസ്ഥാനാഗത മൂലങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു് മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു ചെല്ലുന്നു. ഈ വേരുകൾ ആണിവേരിൽനിന്നല്ല പുറപ്പെടുന്നതു്; ഈ ചെടിക്കു് ആണിവേരേ ഇല്ല. ആണിവേരിന്റെ രേഖാപൽ

ശാഖകളായി പിരിയാതെ ചെടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വേരുകൾ അസ്ഥാനാഗത വേരുകളാകുന്നു. സാധാരണയായി വേരുകളെ മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളതെങ്കിലും ചില ചെടികളിൽ വേരും പുറമെ വരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവ വായുമണ്ഡലവേര (Aerial root) കൾ അതായത് വേടുകൾ ആകുന്നു. തെക്കേന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി ആൽ മരം എവിടേയും കാണാം. ഇതിനു വണ്ണമുള്ള തടിയും സമതലത്തിൽ വളരുന്ന കൊമ്പുകളുണ്ട്. ആലിനു വയസ്സുകമ്പോൾ ആണിവേരിനു മരം താങ്ങി നില്ക്കുവാനുള്ള ബലം ഇല്ലാതെ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഈ മരം വേഗത്തിൽ വീണുപോകുന്നില്ല. കൊമ്പുകളിൽനിന്നു വേടുകൾ പുറപ്പെട്ടു ചോട്ടി

ലേക്കു താണുതുടങ്ങുന്നു. കുറെ കാലങ്ങളോളം ഇവ വായുവിൽതന്നെ തുങ്ങിക്കിടക്കും. ഇവ വളർന്ന ഭൂമിയിൽ എത്തുകയും കൊമ്പുകളെ താങ്ങി നില്ക്കുന്ന സ്തംഭങ്ങളായ് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള വേടുകളെ ഉത്ത (Buttress)



ചിത്രം 59

ആൽമരത്തിലെ വായുമണ്ഡലവേരുകൾ (വേടുകൾ)

വേരുകൾ എന്താണ് പറയുക ചില ചെടികൾ മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്ന് യാതൊരു വാസ്തവഹാരസത്തും സ്വീകരിയ്ക്കാതെ മറ്റുള്ളവയുടെ തടിയിൽ വളരുന്നു. ഇവ പരാവലംബി (Epiphyte) കൾ ആകുന്നു. മറ്റു ചെടികളിൽ പറ്റിക്കൂടി അവയിൽനിന്നു ആഹാരം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചില പരാവലംബികൾ (Parasites) ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലവ, മുഴുവൻ ആഹാരത്തിനും ഭോജനഭാരം

വീനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇവയുടെ ഇലമൂലം കറച്ചെല്ലാം ആഹാരം ഇവ സമ്പാദിയ്ക്കുന്നു. ഇവയിൽനിന്നു പ്രത്യേകവേരുകൾ പുറപ്പെട്ട് ഇവ പറ്റിക്കൂടിയിരിയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കു ചെല്ലുന്നു. അവ ബാക്കി ആഹാരത്തെ ഇവക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരം വേരുകൾക്കു ചൂഷകങ്ങൾ (Haustoria) എന്നു കുന്നു പേര്.

തടിക്ക് ബലം ചൂഷണിയ ചില ചെടികൾ നിലത്തിൽ പടരുന്നതിനുപകരം മറ്റു ചെടികളുടെ തടിമേലും മറ്റും കയറി വളരുന്നു. കരുമുളകുവള്ളിയും വെറിലക്കൊടിയും ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. വള്ളിയുടെ കമ്പുകളിൽ നിന്ന് വേരു പൊട്ടി അത് വളരുന്ന സാധനത്തിന്മേൽ പിടികൂടുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ വേരുകൾ പരിവേഷുന്ന വേരുകൾ (Clasping roots) ആകുന്നു.

ഇലയിന്മേലൊട്ടി (Bryophyllum) എന്ന ചെടിയിൽ വേരുകൾ ഇലയുടെ വക്കിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. ഇവ പത്രവേര (Leaf-root) കളാകുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ ഇല ചളിപ്രദേശത്തു വീണാൽ, ഇലയിൽനിന്ന് വേരുകൾ ഉണ്ടായി പുതിയ ഒരു ചെടി വളരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

വേരുകളും

അവയുടെ മുഖ്യ പ്രവർത്തികളും.


— : 0 : —

സസ്യങ്ങളെ മണ്ണിൽ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിന്നു പുറമെ വേരുകൾ മുഖ്യമായ വേറൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു.

ഇവ വെള്ളവും ലവണദ്രാവകങ്ങളും മണ്ണിൽ നിന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇലയിൽക്കൂടി സസ്യം വായുവിൽനിന്നു് സ്വീകരിക്കുന്ന കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡോഴിച്ചു ബാക്കി ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിൽനിന്നു വേരുകൾ വഴിക്കു സസ്യത്തിന്നു ലഭിക്കുന്നു.

SI മണ്ണിൽനിന്നു് ആഹാരദ്രവ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതു വേരുകൾക്കകുന്നു. ആണിവോരപ്പാടുള്ള ചെടികളിൽ, ആണിവേരൂ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽചെന്നു് ചെടിയെ വീഴാതെ നിർത്തുകയും വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടു പിടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ

ണിവേരിൽ നിന്നു് ശാഖകൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഇവ ഭൂമിയ്ക്കു സമന്തരമായിട്ടും മററും ആണിവേരിന്റെ നാലുഭാഗത്തിലും പരക്കുന്നു. ഈ ശാഖകളിൽനിന്നു അനേക ഉപശാഖകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും ചൊട്ടിപ്പോകുകയും മണ്ണിന്റെ തരികിടയിലുള്ള വെള്ളത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപശാഖകളും ചിരിഞ്ഞ് നേരിയ സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങളായിത്തീരുന്നു. മണ്ണിന്റെ തരികളുടെ പുറം ഉള്ള ദ്രാവകത്തിൽ



ചിത്രം 60. മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മാതിരി.

ലവണങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിയ്ക്കും. ഈ ദ്രാവകം തരികളുടെ ചുറ്റും ഒരു പാടപോലെയാണിരിയ്ക്കുക. വേരിന്റെ മൃദുഭാഗങ്ങൾ



മാത്രമേ ദ്രാവകത്തെ വലിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ. വേരിന്നു മൂപ്പാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മേൽഭാഗം കട്ടിവെക്കുകയും വെള്ളം അതിൽ കൂടി കടക്കാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവേരുകളുടേയും അറ്റത്തിന്റെ കുറച്ചു മേലിലായി വേർരോമങ്ങൾ (Roo-hairs) വളരുന്നു. ഈ വേർരോമങ്ങളാകുന്നു വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഏല്പെടുന്നതു. ഇവ ശാഖാവേരുകൾ അല്ല. ഇവ വേരിന്റെ മുകളിൽ വളരുന്ന ചില അനുബന്ധങ്ങൾ ആകുന്നു. ഇവയ്ക്കു പ്രത്യേകങ്ങളായ ചില വേലകൾ ചെയ്യവാനുണ്ട്. ഇവ നേരിയവയും ബലഹീനമായവയും ആകയാൽ, ചെടി പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇവ ചൊട്ടിച്ചുപോകുന്നു.

ചിത്രം 61.
കടുകുചെടിയിലെ വേർ രോമങ്ങൾ
(Root hairs)

വേരുകൾ മൂന്നാമതൊരു കൃത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവ ആഹാരസത്തിനെ ശേഖരിച്ചു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗീരോസ്റ്റാസ്ഥിതി മുതലായ ചില പ്രകൃതിവിഷയങ്ങൾക്കു അധീകരിച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളോ കനുകാലികളോ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ

ഉള്ള സസ്യഭാഗങ്ങളെ വേഗത്തിൽ കേടുവരുത്തുകയില്ല. വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിലാകയാൽ ആഹാരസത്തു വേരുകളിൽ ആണ് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്. രണ്ടു കൊല്ലങ്ങളോളം ജീവിയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ ദ്വിവാഷിക (Biennial)ങ്ങളാകുന്നു. അവയിൽ വേര

ലാഭം ആഹാരസത്ത ശേഖരിക്കുന്നതു്. ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ വേരു തടിച്ച അതിനുള്ളിൽ ആഹാരസത്തു് നിറയുന്നു. ഈ സത്തിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ചെടി കായിനം പൂവിന്നും ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. മുളങ്കുടി, കാരട്ട് (Carrot), തക്കാരിക്കിഴങ്ങ് (Turnip), ബീററ (Bee) എന്നിവ ചിലവർഷികങ്ങളാകുന്നു. ഇവയിൽ ആണിവേരു തടിച്ചു് ആഹാരസത്ത അതിൽ നിറയുന്നു. ശർക്കരക്കിഴങ്ങ്, ഡാലിയ (Dahlia) കിഴങ്ങ് എന്നിവ സസ്യങ്ങളിലെ അസ്ഥാനാഗതവേരുകൾ തടിച്ചു വണ്ണം വെച്ചുവരുന്നു. ഇവയിലും ആഹാരസത്തുണ്ടു്.



RADISH



SWEET POTATO

ചിത്രം 62.

വേരുകളിൽ ആഹാരശേഖരം.

പ്രകൃതിയിലെ നൈജേൻ ചിത്രം

— : 0 : —

പ്രകൃതിയിൽ നൈജേൻ വാതകം സംയുക്തിവസ്ഥയിലും സംശ്രവണാവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടുന്നു. ജീവികളുടെ ജീവിത ധാരത്തിന് നൈജേൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ജീവികൾ ഇതിനെ യൌഗിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾ ഈ മൂലകത്തെ യൌഗികപദാർത്ഥമായിട്ട് ശേഖരിയ്ക്കുന്നു. ആയതിനാൽ സസ്യങ്ങൾ തിന്നുമ്പോൾ ജീവികൾക്ക് ഈ മൂലകം യൌഗികാവസ്ഥയിൽ ലഭിക്കുന്നു.




ചിത്രം 63
നൈജേനാണ്
പ്രാണികൾ

മണ്ണിലെ സജീവനൈജൈറർ വസ്തുക്കളെ സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികൾ നൈജൈറർ കളായി മാറ്റുന്നു. ഈ കൃത്യത്തിൽ ഏല്പിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളെ നൈജോണപ്രാണി (Nitrifying bacteria) കൾ എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിക്കുന്നത്. നൈജൈറർകളെ മണ്ണിൽനിന്നു വലിച്ചെടുത്തു സസ്യം ഓജസ്സുവത്തെ ദേഹാംഗങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കുന്നു. ജീവികൾ മരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മാണു പ്രാണികൾ വീണ്ടും ഈ സജീവവസ്തുപംഗത്തേക്ക് സംയോജിക്കുകയും നൈജൈറർ ഉ

ണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. സസ്യങ്ങൾ ഈ പദാർത്ഥത്തെ പിന്നെയും സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ചക്രം പുനരാവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സജീവവസ്തുക്കളെ നൈട്രൈറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, ഈ നൈട്രൈറ്റുകൾ



ചിത്രം 64.

കളെ നൈട്രേൻ വാതകമായി മാറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളും ഉണ്ട്. ഈ പ്രാണികൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗുണത്തേയും ചെയ്കയില്ലെന്നു എടുത്തുപറയേണ്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ.

ചില നൈട്രോണപ്രാണികൾ വായുവിൽനിന്നു നേരിട്ടു നൈട്രേൻവാതകത്തെ വലിച്ചെടുത്തു നൈട്രൈറ്റുകളെ സസ്യ

ങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ അണുപ്രാണികൾ പയറും, അവരും എന്ന് ചെടികളിലെ വേരുകളിലുള്ള മുഴകളിൽ ചിലപ്പോൾ വസിക്കുമത്രേ. ഈ പ്രാണികൾ മൺതരികൾക്കിടയിൽ ഉള്ള വായുവിൽനിന്നു നൈഷേധവാതകത്തെ വലിച്ചെടുത്തു സസ്യത്തിന്നു ആവശ്യമായ നൈഷേധകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.



വളം—കുഴിക്കൽ

— : 0 : —

ചെടി നല്ലവണ്ണം വളരുവാനും നല്ലപോലെ കായ്ക്കുവാനും വേണ്ടി സസ്യത്തിന് ചുറ്റും മണ്ണിനോടു ചേർന്ന സാധനത്തെ ആണ് വളം എന്നു പറയുന്നത്. സജീവ വസ്തുക്കളടങ്ങിയ വളം നിർജീവപദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ഉരം എന്നു രണ്ടുതരം വളങ്ങൾ ഉണ്ട്. പശു, എരുമ, കുതിര, കഴുത, ആട് എന്നിവയുടെ ചാണകം; എല്ല്, മാംസം, ചോര, കൊമ്പ് എന്നിങ്ങനെയി സജീവാംശങ്ങൾ; സസ്യങ്ങൾ ചീഞ്ഞുളിഞ്ഞ കുപ്പമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പിമണ്ണ്—എന്നിവയെല്ലാം സജീവവസ്തുക്കളടങ്ങിയ വളങ്ങളാകുന്നു. നിർജീവവസ്തുക്കളടങ്ങിയ വളങ്ങൾ പ്രാണിലോകത്തിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ഭൂണിലെ ധാതുക്കളിൽനിന്നോ വ്യവസായശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നോ ആണ് ഇത്തരം വളം കിട്ടുന്നത്.

സോഡിയം നൈട്രേറ്റും, അമോണിയം സൾഫേറ്റും, കാൽസിയം സ്യൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റും, പൊട്ടാസിയം സൾഫേറ്റും എന്നിവയാകുന്നു വ്യവസായശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വളങ്ങളിലെ സാമഗ്രികൾ. കുതിരയുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും ചാണകം, പക്ഷിക്കാടം (Guano) എല്ലുപൊടി, വെണ്ണീർ, കുപ്പമണ്ണ് എന്നിവയാണ് സാധാരണമായി സജീവവസ്തുപദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ വളമായി കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നത്.

വളം ചേർന്ന വിഷയത്തിൽ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാകുന്നു:— (1) വേണ്ടസമയത്തിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ വളം ചേർക്കണം. നഷ്ടമാകാതെ കറേഴ്സുകറേഴ്സായി വേരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ വളം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു

കൊടുക്കണം. (2) സജീവവസ്തുപംശം അടങ്ങിയ വളങ്ങൾ നല്ല പോലെ ചീഞ്ഞട്ടിണത് വികാരപ്പെട്ടതിനുശേഷമേ വളമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേരുകൾ കേടുവന്നും പോകും. (3) വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലവണങ്ങൾ വളമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങളെ നനയ്ക്കണം. കഴുകുന്ന വെള്ളം ഇവയെ അലിയിച്ചോ അടിച്ചോ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളിൽ ലവണവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. (4) പുതിയ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളം ചേർക്കുന്നത് അത്ര നന്നല്ല. (5) സസ്യങ്ങളുടെ മുറടിന്റെ ചുവട്ടിൽ വളം വേർക്കരുത്; വേരിൽനിന്നു കറച്ചുകലേയായി നാലുപാടും ചാലുകീറി വളം ചേർക്കുന്നതായാൽ പുതുതായി പൊടിച്ചുവരുന്ന വേരുകൾ വളങ്ങളെ വലിച്ചെടുത്തു സസ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും (6) സജീവവസ്തുപംശം അടങ്ങിയ വളങ്ങൾ ലവണങ്ങളേക്കാൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവയാകുന്നു.

കഴിയ്ക്കൽ

വിത്തു മുളയ്ക്കുന്നമേങ്കിൽ നിലം ഇളകിമറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം തറച്ച നിലത്തിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വേരിന്നു ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള ശക്തി പോരതെവരും. രണ്ടാമതു തറച്ച നിലങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വേഗത്തിൽ താഴുകയില്ല. ആയതിനാൽ, വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു മണ്ണ് ഇളക്കണം. ഇതിനു മൂന്നു മാറ്റങ്ങളാണത്. അവ കുന്നപ്പുട്ടൽ, ചാലുകീറൽ, കഴിയ്ക്കൽ എന്നിവ ആകുന്നു.

അഭിസരണം (OSMOSIS)

— :: —

സസ്യങ്ങൾ വേരിന്റെ സഹായത്താലും തടിയുടെ സഹായത്താലും ആണ് മണ്ണിലെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നിലച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ സംഗതി പരീക്ഷണംമൂലം കാണാവുന്നതാണ്.

ഇയോസിൻ (eosin) ചായമോ ചുവന്ന മഷിയോ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക. വെളുത്ത ചീരത്തെ പഠിച്ചെടുത്തു ഈ വലയനം ഉള്ള പാത്രത്തിൽ, വേച്ച് വിലയനത്തിനകത്താക്കത്തക്കവണ്ണം വെക്കുക. പിന്നെ ദിവസം തെ പരിശോധിക്കുക. ഇലമേൽ ചായത്തിന്റെ നിറം അവിടവിടെയായിക്കാണാം, തെയിലെ തടി മുറിച്ചു നോക്കുക. മുറിവായിൽ ചായക്കുറികൾ ഉണ്ടാകും. വേറൊരിടത്തിൽ തെ മുറിച്ചു നോക്കുക. അവിടെയും ചായക്കുറികൾ കാണാം. വെള്ളം തടിയുടെ ചില ചാലുകൾ വഴിക്കാണ് മേല്പോട്ടുയരുന്നത്.

ചീരത്തെക്കു പകരം ഒരു ചെടിയുടെ ചില്ലി മുറിച്ചെടുത്തു പരിശോധന നടത്തുക. ചായക്കുറികൾ നടുവിൽ കാണുകയില്ല. ചെടിയുടെ ചുറ്റുകാതൽ (sapwood) ഭാഗത്തിലൂടെ ആണ് മണ്ണിലെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥവിലയനം കയറിയിരിക്കുക.

തടിയുടെ നടുവിൽ കാതൽ ഉണ്ടാകും. കാതൽ തൊട്ടു തൊലിയുടെ ഉൾഭാഗത്തായി ചുറ്റുകാതൽ ഉണ്ടു. ഈ സമ്പ്രദായം എല്ലാ ചെടികളിലും കാണുകയില്ല. ഉദാഹരണമായി ചീരത്തെയിൽ കാതൽ ഇല്ല.

വേരുകളുടെ ഉള്ളിലേക്കു മണ്ണിൽനിന്നു നീരു കടക്കുന്നുവെന്നു പഠിച്ചുവല്ലോ. ഈ പ്രവേശനം അഭിസരണം (osmosis) എന്ന വ്യപാരം വഴിക്കു് ആണു.

ഒരു വേരിന്റെ അറ്റത്തിൽ സല്ലെകൾകൊണ്ടാം. ഈ സെല്ലുകൾക്കു നേരിയ സെൽഭിത്തി (cell-wall) കളുണ്ട്. പാർച്ച്മണ്ട് (parchment) പോലെ വളരെ നേരിയ സൂക്ഷിരങ്ങളോടുകൂടിയവയാണിവ. ഇവയിലൂടെ ദ്രാവകം കടക്കും. ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ സെൽസാരവും പ്രോട്ടോപ്ലാസം (protoplasm) വും കാണാം. സെൽസാരത്തിൽ മധുരസത്തിനു പുറമെ വേറെ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ കഴമ്പിനു ധല്ല കട്ടി ഉണ്ടാകും. ഏൽക്കിന്റെ തൈ മുറിക്കുക. ഒരു നീർ തുളമ്പി മേല്പോട്ടുയരുന്നു ; ഇതിന്നു കട്ടി കൂടും. സെല്ലിലെ സാരം ഇതേ രീതിയിലാണിരിക്കുക. വേരിലെ ഇത്തരം സെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലേക്കുമാണു മണ്ണിൽനിന്നു വെള്ളം കടക്കുന്നത്. മണ്ണിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത സെൽസാരത്തേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയതാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണു അഭിസരണംവഴിക്കു മണ്ണിലെ നീരു ഉള്ളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചത്.

വാൽ നീളമുള്ള തിസിൽ ഫനൽ (thistle funnel) എടുക്കുക. പരന്ന ഭാഗത്തായി പാർച്ച്മണ്ട് കെട്ടുക. കെട്ടു നല്ലവണ്ണം മുറിക്കിച്ചിരിക്കണം മുറുക്കത്തവക്കും ഫനലിനുള്ളിൽ ഒഴിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഒഴുകിപ്പോകും. ഇതു സംഭവിക്കരുതു. ഉപകരണം ശരിപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം ഇതിനുള്ളിൽ പരിപൂരിതമായ പഞ്ചസാരവിധയനം ഒഴിച്ചു ഉപരിതലം കാണിക്കുന്ന സ്ഥാനം കുറിക്കുക. ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളമെടുത്ത് പാർച്ച്മണ്ട് കെട്ടിയ ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ ആഴ്ത്തുക. ഫനൽ നിവ്വൻ നീല്ക്കാനുള്ള ഏല്പാടു ചെയ്യുക. പിറെ ദിവസം ചെന്നു പരിശോധിക്കുക. കഴലിലെ ദ്രാവകതലം ഉയർന്നു നീല്ക്കും. ബീക്കറിലെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്കു കടക്കുന്നതെ ഇതു സംഭവിക്കയില്ലല്ലോ.

സാന്ദ്രത ചുരുങ്ങിയ ദ്രാവകമാണു വെള്ളം. അതുകൊണ്ടാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകഭാഗത്തേക്കു വെള്ളം പ്രവേശിച്ചത്. ഈ

വ്യാപാരമാണ് അഭിസരണം. സാമ്പ്രതകൂടിയ ദ്രാവകത്തെയും സാമ്പ്രത അത്രത്തോളം ഇല്ലാത്ത ദ്രാവകത്തെയും സൂഷിരമായ ഒരു പടലം വേർ തിരിക്കുവക്കും അഭിസരണവ്യാപാരപ്രകാരം ചൂടുങ്ങിയ സാമ്പ്രത ഉള്ളദ്രാവകം മറേ ദ്രാവകത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് ഇരു ദ്രാവകവും ഒരേ സമ്പ്രതയുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കും.

ചെടിയിലെ വേരുകളിലെ ഒരു സെല്ലിൽനിന്നു വേറൊരു സെല്ലിലേക്കു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും അഭിസരണത്താൽ ആകുന്നു.

ചെടിക്കു ചുറ്റും മണ്ണിലെ നീരു സാമ്പ്രതകൂടിയതാണെങ്കിൽ ചെടിയുടെ നീരു മണ്ണിലേക്കൊഴുകി ചെടിതന്നെ വാടിപ്പോകും. ആയതിനാൽ കൃത്രിമവളം മണ്ണിൽ അധികംചേർക്കുന്നതു ഗുണപ്രദമല്ല.

ചെടിക്കുള്ള ഭക്ഷണം.

— : 0 : —

ഏതുവിധ പ്രാണി (സസ്യങ്ങളേയും ജീവികളേയും ഈ വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) യാതൊരു വേണ്ടില്ല, അതിന്നു ആഹാരം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. സസ്യങ്ങൾക്കും ആഹാരം വേണം. സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ധാതുലവണങ്ങളാണു ആഹാരപദാർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന ലവണങ്ങളിൽ അനേക വികാരങ്ങൾ നടന്നതിന്നു ശേഷമേ അവ ആഹാരസത്തായി പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ.

ധാതുലവണങ്ങളെ സസ്യാഹാരം എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലവണങ്ങൾ ആഹാരമേ അല്ല ആഹാരം എന്നതു ദേഹാംഗങ്ങളുടെ പോഷകത്തെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നു. ലവണങ്ങൾ യാതൊരു നവശക്തിയേയും നൽകുകയില്ല. ആയതിനാൽ ഇവ സസ്യാഹാരമല്ല. സസ്യം ഈ ലവണങ്ങളെ ചില സാധനങ്ങളായി മാറുന്നു. അവ ദ്രാക്ഷാമധുരവസ്തുവോ ധാന്യനുദാഹോ ആയിരിക്കും. ഇതാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സസ്യത്തിന്റെ ആഹാരം.

സസ്യാഹാരം എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വെള്ളം മുഖ്യമായതാകുന്നു. അതില്ലാതെ ഒരു സസ്യവും വളരുന്നതല്ല. കടിയിൽകൂടിയും ഇലയിൽകൂടിയും ചെടിക്കു വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ വേരല്ലാതെ വേരൊരവയവം ഈ വിഷയത്തിൽ ഏല്പെടുന്നില്ല.

സസ്യാഹാരസത്തായ ധാന്യനുദാഹ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. സസ്യങ്ങളിൽ അധിക ഭാഗവും ജലമയമായതാകുന്നു. ചില ശാഖാദ്രവ്യങ്ങളിൽ 90% വെള്ളമുണ്ട്. ഇവയിൽ

ചെ മൂലമായ ഭാഗങ്ങൾക്കു ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നതു ഈ വെള്ളമാകുന്നു. വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ നിവന്നു നില്ക്കുകയില്ല. വെള്ളം തിങ്ങിപ്പോയാൽ ചെടിയുടെ ഘാതാൽ ചെടി ചുവട്ടിലേയ്ക്കു തലതാഴ്ന്നു വീണുതുടങ്ങുന്നു. അതു വാടി ഉണങ്ങിപ്പോകും.


വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിലുള്ള അനവധി ലവണങ്ങൾ അലിയുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ വേര് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം അനവധി ലവണങ്ങളേയും ആകർഷിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ ലവണങ്ങൾ ജലയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ആഹാരസത്തായി മറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ സസ്യങ്ങൾക്കു വെള്ളം കഴിച്ചുകൂടാത്തതായി വരുന്നു.

ബാഷ്പവിസർജ്ജനം

TRANSPIRATION.

— : 0 : —

നമ്മുടെ തപാലിൽ കൂടി സദാചി ചിതപ്പു പുറമെ പോകുന്നതു പോലെ ചെടിയുടെ മുകളിൽനിന്നു സദാചി വെള്ളം നഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തെ ‘ബാഷ്പവിസർജ്ജനം’ എന്നാണ് പറയാറു്. ചെടികളിൽനിന്നു ജലം നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നു എന്നു് പരിശോധനമൂലം തെളിയിക്കാവുന്നതാണു്. വെള്ളം നനച്ചു് ചട്ടിയിൽ വളത്തുന്ന ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവരുക. ചട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളും മണ്ണിന്റെ ഉപരിതലവും ഒരു റബ്ബർ കഷണംകൊണ്ടു മൂടിക്കെട്ടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തടി പുറത്തേക്കു തുറിച്ചു



ചിത്രം 65. ചെടികളിൽനിന്നു ബാഷ്പവിസർജ്ജനം നടക്കുന്നു എന്നു കാണിയ്ക്കുവാൻ

നില്ക്കുവാനുള്ള ചോരം റബ്ബർതൂണിയിൽ ഉണ്ടാകണം. ചെടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബെൽജാർ കമഴ്ത്തിവെയ്ക്കുക. കുറെ സമയം കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പായി ഗ്ലാസിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിൽ നീന്തിക്കുകയും

കണ്ടുതുടങ്ങും. ഉവ വണ്ണംവെച്ചു ഒഴുകിത്തുടങ്ങും. പാത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും മണ്ണും നല്ലവണ്ണം മൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്രയധികം വെള്ളം ചെടിയിൽനിന്നുതന്നെ വന്നിരിയ്ക്കണം. ഇതേമാതിരിയുള്ള വേറൊരു ചട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിൽ ചെടിമാത്രം ഉണ്ടാകരുത്. ആദ്യത്തെപ്പോലെ. റബ്ബർകൊണ്ടു മൂടിക്കെട്ടി റബ്ബർജാർ അതിന്റെ മുകളിൽ കമഴ്ത്തിവെയ്ക്കുക. അതൊരുവിധ തുള്ളികളും ജാറിൽ കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ നീന്തുളളികൾ ചെടിയിൽ നിന്നു ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്നതിന്നു സംശയമെ ഇല്ല.

ചട്ടിയിലെ ചെടിയെ ചട്ടിയോടുകൂടി ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചു വലത്തേത്തട്ടിൽ തൂക്കിക്കെട്ടികെട്ടി സമനിലപ്പെടുത്തുക. കുറെനേരം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ഇടത്തേതട്ടു പൊതുനതായിക്കാണാം. പരിശോധനയുടെ അവസാനത്തിൽ സമനിലപ്പെടുവാൻ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവന്നതായ തൂക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളത്തിന്റെതാകുന്നു.

ബാഷ്പവിസർജ്ജനം. (തുടർച്ച)

— : 0 : —

ബാഷ്പവിസർജ്ജനം (Transpiration) നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ അളവു പല സംഗതികളെ ആസ്പദിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെടിയുടെ സമ്പ്രദായമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവു തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. ഉദാഹരണമായി തടിച്ച ഇലകളോടുകൂടിയതും പതുക്കെ വളരുന്നതുമായ ചെടികളിൽ ഈ ബാഷ്പീകരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയും നേരെമറിച്ച് നേരിയ ഇലകളോടുകൂടിയതും വേഗത്തിൽ വളരുന്നതുമായ ചെടികളിൽ ഈ ബാഷ്പീകരണം വലിച്ചിരിക്കുകയുമാണ് പതിവ്. ഒരേ ചെടിയിൽതന്നെ സമയവ്യത്യാസത്തെ ആസ്പദിച്ചാണ് ഈ ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ തോത് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്; നട്ടുച്ചക്കു ഈ ബാഷ്പീകരണം അത്യധികമായും രാത്രിയ്ക്കു തീരെ ഇല്ലാത്തതും ഇരിയ്ക്കും. സൂര്യവെളിച്ചം, ചൂട്, അനക്കമില്ലാത്ത വായു, ഇരുട്ട്, തണുപ്പ്, വരൾച്ച, മഞ്ഞു എന്നിവയെല്ലാം സസ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ജലബാഷ്പീകരണത്തിൽ വ്യത്യാസത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വായുവിലുള്ള നീരാവിയേയും വായുവിന്നു വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയേയും അനുസരിച്ചു ബാഷ്പീകരണം മാറുന്നതാകുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം, ചൂട്, വരൾച്ച, കാറ്റ് എന്നിവ ബാഷ്പീകരണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുട്ട്, തണുപ്പ്, വായുവിന്നു അനക്കമില്ലായ്മ, വായുവിലുള്ള നീരാവിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിവ ബാഷ്പീകരണത്തെ ചുരുക്കുന്നു. ബാഷ്പീഭവനത്തിന്നു സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ജലബാഷ്പീകരണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാഷ്പീഭവനം (Evaporation) ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഒരേ സമയം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽനിന്നും വെള്ളത്തിൽനിന്നും പോകുന്ന

നീരാവിയുടെ തോതു ഒന്നല്ല. ഈ ബാഷ്പവിസർജ്ജനം സസ്യത്തിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം (Protoplasam) ത്തിന്റെ അധീനത്തിലാകുന്നു നടക്കുന്നത്.

ഇലയിൽനിന്ന വെള്ളം എങ്ങനെ വാറിപ്പോകുന്നു? വേരുവലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടു ഇലയിൽനിന്നു വാറിപ്പോകുന്നു? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം കിട്ടുവാൻ ഇലയുടെ രചന കാർമ്മിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇലയുടെ കീഴ്തൊലിൽ സൂക്ഷ്മ പത്രസുഷിരങ്ങൾ (Stomata) ഉണ്ടല്ലോ. സൂക്ഷ്മദേശീനിയുടെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ ഇവയെ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉപരിതലത്തിൽ ഈ സൂക്ഷ്മരസ്രങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കവും അധോതലത്തിൽ അധികവുമായിരിക്കും. സൂര്യനോടു എതിരായിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ അധികമായ ബാഷ്പവിസർജ്ജനം നടക്കാതിരിക്കുവാനാണു് ഈ എപ്പാടുള്ളതു്. ഈ സുഷിരങ്ങളിൽക്കൂടി ആകുന്നു ബാഷ്പവിസർജ്ജനം ഉണ്ടാകുന്നതു്.

5ാം വിഭാഗം = ആരോഗ്യശാസ്ത്രം.

അദ്ധ്യായം 60

സമുദായത്തെ ഭിന്നങ്ങളിൽ നിന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ.

— : 0 : —

വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യനഷ്ടങ്ങൾ.

നവീന കാലങ്ങളിൽ ജീവിതശൈലീമാറ്റവും ഭരണ രോഗങ്ങളോടു മല്ലിടുവാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഈ ആയോധനത്തെ ലഘൂകരിച്ച സമുദായത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ആരോഗ്യവകുപ്പു ഏല്പിടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ എന്തുതന്നെ ചെയ്യാലും പ്രജകളിൽ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച ചില ആരോഗ്യനിനമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ സദുദ്ദേശം നിഷ്പലമാകുന്നു.

സമുദായത്തിനു ഗുണം ചെയ്യേണ്ടതിലേക്ക് ഓരോ പ്രജയും ശരീരവൃത്തി, നല്ലാഹാരം, മലിനരഹിതവസ്ത്രധാരണം, വ്യായാമം, പ്രവൃത്തിയും വിശ്രമവും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനും പുറമെ ഭരവൻ നിവസിക്കുന്ന ഗൃഹത്തിൽ പാകത്തിലുള്ള വായുസഞ്ചാരവും നല്ല വെളിച്ചവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കടിയുണ്ടാവാനുള്ള ശുദ്ധജലം ഗൃഹത്തിൽ ലഭിക്കണം. വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കാതെ നല്ല നീരാഴക്കം വീട്ടിനുപുറം ഉണ്ടാകണം. വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കംചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ പരക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മാനുപ്രാണികൾ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽനിന്നു മോചനം നേടുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്ന കീറിയെടുത്തുലിലോ കത്തിയെടുത്തുലിലോ സഹകരിക്കേണ്ടതു ഓരോരുത്തന്റെയും കടമയാകുന്നു.

കീറിവെക്കലും കുത്തിവെക്കലും.

— : 0 : —

കീറിവെക്കുന്നതെന്തെന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്. വസ്തുവിൽ പിടിപെടുന്നതിൽനിന്നു ഒരു രക്ഷ ഇതു നല്കുന്നു.

പ്ലേഗ്, വിഷുചിക, വിഷജ്വരം, കണ്ണരോഗം (Diphtheria) മുതലായ രോഗങ്ങൾ പരക്കാതിരിക്കുവാനും കുത്തികെട്ടുവാനുള്ള മരുന്നുകൾ വൈദ്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സമുദായികപരമായ ആരോഗ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ.

ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യധിപ്പാർട്ട് മെണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ ആകമാനആരോഗ്യവിഷയത്തിൽ ആണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. പട്ടണത്തിലെ വായു ശുദ്ധമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഗവർണ്മെന്റാണ് ചെയ്യേണ്ടതു്. വ്യവസായശാലാ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തിരക്കുകൾക്കുള്ള പട്ടണഭാഗങ്ങളിൽ ശാലകൾ കെട്ടാതെ നോക്കേണ്ടുന്ന ചുമതല ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റുകാർക്കുണ്ട്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് തെരുവിലെ പാതകൾ വെട്ടുപ്പുവരത്തുകയും പൊടി ശമിക്കുവാൻ പാത നനക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗവർണ്മെന്റുചിലവിന്മേൽ കളിത്തോട്ടങ്ങളും ഉപവനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നു. ജലകഷ്ടമുള്ള ദിക്കിൽ ജലവിതരണത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നു. ജലം മലിനപ്പെടുമ്പോൾ കാലറ (വിഷുചിക) മുതലായവ സാംക്രൂമികരോഗങ്ങൾ പരക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടായി അനേകായിരം ജനങ്ങൾ ക്ഷണനേരത്തിൽ മരിച്ചുപോകുവാൻ സംഗതിയുള്ളതിനാൽ പട്ടണത്തിലേക്കു വരുന്ന വെള്ളത്തെ അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുതന്നെ പരിശോധിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു വൃത്തിയുള്ള കുഴലുകളിൽ ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ പട്ടണനിവാസികൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

പട്ടണങ്ങളിലെ മലിനവെള്ളം കുടുകിപോകേണ്ടതിലേക്കു
 കുരുവുകൾ കെട്ടുന്നു. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകാർ തോട്ടികളേയും കപ്പ
 വണ്ടിക്കാരേയും നിശ്ചയിച്ചു തെരുവുകൾ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു.

സാംക്രമികരോഗങ്ങളെ പരക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ നഗ
 1
 റ്റുകൾക്കകത്തു ആരോഗ്യഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടുകാരുടെ മുഖ്യമായ
 കൃത്യം. പ്രത്യേകമായി തെളുപ്പാക്കുന്ന മരുന്നുകളെ സാംക്രമികരോ
 ഗങ്ങൾ പരക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ദേഹത്തിൽ
 കുത്തിവെച്ചും രോഗികളെ കുറച്ചെടുത്തിയും രോഗികൾ താമസിച്ച
 വീടുകളിലെ വിഷബീജം നീക്കിയും ആണ് സാംക്രമികരോഗബാ
 ധയെ ജയിക്കുവാൻ ഗവർണ്മെണ്ടു മുതിരുന്നത്.

അശുഭവായുവിവാൽ ഉണ്ടാകുന്ന
ദീനങ്ങൾ—വായുസഞ്ചാരം—ശരി
യായി ശ്വാസിയുണ്ടെന്ന മാതൃം—
ഭീഷഗ്വാസ വായുമങ്ങൾ—കൃത്രി
മമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം—
പ്രണവായു ശ്വാസനം.

—::*::—

അശുഭവായുവിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദീനങ്ങൾ.

ആദ്യകര ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ വിട്ടു പട്ടണങ്ങളിൽ
ചെന്നു പാർക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. പട്ടണങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ വളർ
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ വീടുകൾ സ്ഥലമുള്ളതി
ത്തൊലാം കയറുന്നു. പകൽ മുഴുവനും വാഹനങ്ങൾ പൊടി
പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഓടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പട്ടണങ്ങളിൽ നല്ല
വായു കിട്ടുകയില്ല. അവിടത്തെ നിവാസികൾക്കു് അശുഭവായു
ശ്വാസിയുണ്ടെന്നതുകൊണ്ടു് പലവിധ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു.

അശുഭവായു ശ്വാസിയുണ്ടെന്നതിനാൽ അധികം പേക്കും ഛന്ധം
എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. ട്യൂബർക്കിൾ (Tubercle) എന്ന
രോഗാണു പാതയിലെ പൊടിയിൽ ചേർന്നു പട്ടണനിവാസികളിൽ
ഈ ദീനത്തെ പരത്തുന്നു. പട്ടണത്തിൽ ജീവിയുന്ന എല്ലാവരും
ഈ ദേഹത്തിലും ഛന്ധരോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടു്. പക്ഷെ ചിലരിൽ

മാത്രം ഇവ രോഗത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് വിഷ ബീജങ്ങളോടു പൊരുതുവാൻ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ ദേഹം ക്ഷീണിച്ചിരിയ്ക്കുമ്പോഴോ രാജസ്സ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴോ രോഗാണുക്കൾ കോപിക്കയും നമുക്ക് ദീനം പിടിപെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ദീനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതു അവയവത്തിലും കാണാം. ശ്വാസകോശങ്ങളും മേദോഗ്രന്ഥി (lymph gland) കളും വേഗത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കരൾ, കുടൽമാലകൾ, ഗുളം (സ്പ്ലീൻ), വൃക്കകൾ എല്ലാകരും, സന്ധികൾ, തലച്ചോറ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരവയവത്തേയോ അതീലധികം അവയവങ്ങളേയോ ഈ ദീനം ഉപദ്രവിക്കാം. ശ്വാസകോശങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ക്ഷയത്തെ രാജയ്ക്ക് മാവ്—ക്ഷയക്കര—Phthisis) എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്.

വായുമൂലം പരക്കുന്ന വേറെയും ദീനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശ്വാസകോശരോഗം, ബാംബേപ്പനി, ചുമ (കര), അള്ളുമുറിച്ചിൽ (Bronchitis) എന്നിവ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ പരത്തുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ആകുന്നു. ഈ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടാൽ പനി, ശ്വാസനാളത്തിൽ പുണ്ണ്, തലവേദന, കൈകാലുകളിൽ തളച്ചു, ബലഹീനത എന്നീ ഉപദ്രവങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും.

ശുദ്ധവായു ശ്വാസിക്കുന്നപക്ഷം ഈ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ പിടിപെടാതെ കഴിക്കാം. തീക്കും, തിരക്കും, പൊടിയും അധികമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുദ്ധവായു എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുവാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായതു പട്ടണങ്ങളും, വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, പൊടി ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ താമസിക്കരുത്.

വായുസഞ്ചാരം.

വീടുകളിൽ നല്ല വായുവിന്റെ ഓട്ടം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളിരിക്കണം. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെത്തന്നെ വീണ്ടും ശ്വസിക്കുന്നപക്ഷം നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന വായു മലിനമായതായിരിക്കും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്താൽ, ശ്വസകോശത്തിൽനിന്നു മലിനചദ്രാവങ്ങളോടൊപ്പം അധികമായ തോതിലുള്ള അംഗാരകദ്രവങ്ങളായിത്തീരുന്നതായാണല്ലോ നാം പുറമെ വീടുന്നതു്. വായു അശുദ്ധമാക്കിത്തീർന്നതിനാൽ അതിനെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ചോര ശുദ്ധമാകുകയില്ല. നേരെ മുറിച്ചു അതിൽ മലിനങ്ങൾ വെച്ചിടും. തലവേദന, സുഖമില്ലായ്മ എന്നീ ഉപദ്രവങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ആയതിനാൽ നാം വസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നല്ല വായുവിന്റെ സഞ്ചാരം വേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി കെട്ടിടങ്ങളിൽ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും എതിരിലായി വേറെ വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയെ തരമുള്ളപ്പോളെല്ലാം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കണം. തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ എതിരിലുള്ള ജനലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന മുറികളിലോ ഉറങ്ങുന്നവർക്കു ജലദോഷം, തലവേദന എന്നീ സുഖക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകയില്ല.



ഉപകാരികളും ഉപദ്രവികളുമായ സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണി (Bacterium) കുറം (Bacteria)

— : 0 : —

സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും ഭൂമിയുടെ തലത്തിലും വായുവിലും വെള്ളത്തിലും നാം അതിനെ കണ്ടേക്കാം. നിലം അടിച്ചുകോരുന്നവൻ അനേകായിരം അണുപ്രാണികളെ നിലത്തിൽനിന്നു വായുവിൽ പരക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. മോട്ടോർ കാടിക്കുന്നവൻ ലക്ഷക്കണക്കായി ഇത്തരം പ്രാണികളെ പാതയിലുള്ള പൊടിയിൽനിന്നു വായുവിലേയ്ക്ക് പരത്തുന്നു. ആ ഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ആയിരം കണക്കായി നാം ഈ പ്രാണികളെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ചെല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ പ്രാണികൾ എത്രയും സൂക്ഷ്മതയുള്ളതായ സസ്യങ്ങളാകുന്നു. ശരാശരി അളവെടുക്കുന്നതായാൽ ഇവയുടെ വ്യാസം സുമാർ $\frac{1}{200000}$ അംഗുലം ആകുന്നു.

സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ചനിറം ഇവയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ സസ്യവസ്തുതയിൽ പെട്ടവയാണെങ്കിലും ഇവയ്ക്കു നിർജീവപദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ആഹാരസത്തിനെ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പ്രാണികളുടെ അംശങ്ങളെ ആണ് ആഹാരത്തിനു ഇവ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഈ അംശം പ്രാണനുള്ള ഭാഗങ്ങളോ ചത്തതോ ആയിരിക്കും. ഈ സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളിൽ ചിലവ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സസ്യഭാഗങ്ങളേയോ ജീവിഭാഗങ്ങളേയോ തിന്നുന്നു. ഇവ ശവഭോജികൾ (Saphropytes) ആകുന്നു. വേറെ ചിലവ പ്രാണനുള്ള സസ്യങ്ങളുടേയോ ജീവികളുടേയോ രസം വലിച്ചുകടിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ഇവ പരാന്നഭോജികൾ ആകുന്നു. സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളിൽ മുക്കാലിലധികത്തിന്റേയും വളച്ചുക്കും മറ്റും പ്രാണവായു ആവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രാണികളിൽ ചിലവയ്ക്ക് പ്രാണവായു തീരെ പറ്റുകയില്ല. വായുവിലെ നനവു, മിതമായ ചൂടു, ഈ പ്രാണികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം എന്നിവ കിട്ടിയാൽ ഈ അണുപ്രാണികൾ വല്ലാതെ വളന്ന് പെരുകും. ഒരിടത്തിൽ ഒരു അണുപ്രാണിയുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതു കോടിക്കണക്കായി അണുപ്രാണികളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കും.

അണുപ്രാണികളെല്ലാം ഉപദ്രവികളാണെന്നു ഒരു തെറ്റിധാരണ പൊതുവേയുണ്ടു്. ഇതു് അബദ്ധമാണു്. എത്രയോ നിരുപദ്രവമായ അണുപ്രാണികൾ ഉണ്ടു്. ഈ അണുപ്രാണികളിൽ ചിലവ ഉപകാരംകൂടിയും ചെയ്യുന്നു.

ചിലവ സാധനങ്ങളെ പുളിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുഗ്ഗന്ധത്തെ പരത്തി സുഖക്കേടുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രാണിശൃംഗങ്ങളെ നിർജ്ജീവപദാർത്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതു വേറെ ചില അണുപ്രാണികളാകുന്നു. ഇത്തരം അണുപ്രാണികളില്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തിലെ ശവങ്ങളിൽ മാറ്റാങ്ങൾ സംഭവിക്കയില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും ശവമയമായിരിക്കും. കാലാന്തരങ്ങളിൽ ശവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സ്ഥലസൗകര്യം പോരാതെ വന്നേക്കും. എന്നാൽ ശവങ്ങളെ മണ്ണാക്കിത്തീക്കുന്ന ഈ പ്രാണികൾ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരം നോക്കുക! പ്രാണികൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മണ്ണായിത്തീരുന്ന വളം പ്രാണികളുടെ വളച്ചുയ്ക്കു് എത്ര ഗുണപ്രദമാകുന്നു.

പാൽ തൈസായിത്തീരുന്നത് ഒരുവിധ അണുപ്രാണിയുടെ സഹായത്താലാകുന്നു. ഈ പ്രാണി ലാക്റ്റിക് അമ്ലം (Lactic acid) ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രാണികൾ സ്ഥിരമായി ആമാശയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആഹാരത്തോടൊപ്പം ആമാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ചില വിഷബീജങ്ങളെ ഇവ നശിപ്പിക്കുന്നു. വായിലും കുടൽമാലയിലും വേറെ ചില അണുപ്രാണികൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ അധികഭാഗവും നിരുപദ്രവികളാകുന്നു.

ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന അനേകം അണുപ്രാണികളും ഉണ്ട്. വെണ്ണ നാറുന്നതും പാൽകട്ടി ചീയുന്നതും അണുപ്രാണികളുടെ ഉപദ്രവത്താൽ ആകുന്നു. ഇതേമാതിരി ദേഹത്തിന് ഉപദ്രവത്തെ ചെയ്യുന്ന അണുപ്രാണികൾ അസംഖ്യം ഉണ്ട്. ഇവയുടെ ഉപദ്രവം അസഹ്യമായതിനാൽ ഗുണംചെയ്യുന്ന അണുപ്രാണികളെ നാം വിസ്തരിച്ച ഏല്പാ സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളും ഉപദ്രവികളാണെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്. രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണിവർ രോഗജന്യമാണെന്നു ആകുന്നു. ഈ അണുക്കൾക്ക് ദീനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പ്രത്യേക പേരുകൾ ഉണ്ട്.

സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികൾ ദേഹത്തിൽ നിവസിച്ചു് പെരുകുമ്പോൾ ഒരുതരം വിഷപദാർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദീനങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഈ വിഷത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശരീരം പ്രതിവിഷ (Anti-toxin) ന്റെ ശേഖരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷത്തെ നശിപ്പിക്കത്തക്കനിലയിൽ ശക്തിയുള്ള പ്രതിവിഷങ്ങളെ ദേഹം വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പ്രാണികൾ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന രോഗത്തിന്നിന്നു മോചനമുണ്ടാവുകയും വളരെക്കാലം പിന്നീട് അതേരോഗം പിടിപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മലിനം നീക്കം ചെയ്യൽ

— : 0 ; —


വീടുകളിലെ മലിനം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് സൂര്യ വെളിച്ചത്തിനും തീയ്യും അണുപ്രാണികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ട്. വീടുകളിലെ മലിനം തീ കത്തിച്ച വെണ്ണിറാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. മലിനം ചീഞ്ഞങ്ങളിയരുത്. താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ അരികെ കൂടുവാൻ ഇടവരുത്തരുത്.

നാട്ടും പുറങ്ങളിൽ മലവിസർജ്ജനാദികളിൽ ജാഗ്രത എടുക്കാറില്ല. ഇത് ആശാസ്യമായതല്ല. മലം അറപ്പും ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് വിശേഷപ്പെട്ട വളമാണ്. മലം നീക്കം ചെയ്ത് ഗുണപ്രദമാക്കേണ്ടതാണ്. മലം മൂത്രം എന്നിവ വലിയ കുഴിയിൽ വീഴാൻ ഇടയാക്കി മീനെ മണ്ണിടണം. മണ്ണിനുള്ളിൽ കിടന്നു ചീഞ്ഞു അത് വളമായിത്തീരും. മലം വളമായിത്തീരുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളാണ്. മലം ആഴമുള്ള കുഴികളിൽ കെട്ടിനില്പുവാൻ ഇടയാക്കരുത്. അവ തുറന്നിടുമ്പോൾ നന്നല്ല; മലം ദ്രാവകരൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തിലെ മണ്ണിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു അവിടെമെല്ലാം മലിനപ്പെടും. അടുത്തുള്ള കിണറുകളുടേതെല്ലാം കേടുവരും. വെള്ളം നിലത്തിന്മേൽ പരന്നാൽ മണ്ണിലുള്ള അണുപ്രാണികൾ രോഗത്തിൽ മലിനത്തെ കാക്കുകയും ചെയ്യും. കുഴികളിൽ കൂടേക്കൂടെ പുതുക്കുന്നത് കാക്കുകയും ചെയ്യും സഹായിക്കും.

നാട്ടും പുറങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ 'സെപ്റ്റിക്' മറപ്പുറം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുണപ്രദമായിരിക്കും.

ഇത്തരം ഒരു മറപ്പുറയുടെ ചിത്രം നോക്കുക. ഇതിൽ മുന്നറയുണ്ട്. 10 അറയിൽ ആണ് മലം വീഴുക. തൊടിയിലെ

മലിനമലവും ഈ അറയിൽ വീഴാൻ ഇടയാക്കാം. മലിനം ഈ തൊട്ടിയിൽവെച്ചു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ദ്രാവകമായിത്തീരും. ഇതു സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികളാണു. കടലാസു, തുണി, മരത്തുരമ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാക്ലീകരിക്കപ്പെടും. മാററം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാ



ചിത്രം 66.

കുന്ന ഭൂമിച്ചു വായു പോകാൻ തൊട്ടിയിൽനിന്നു ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കഴലുണ്ടാകും. തൊട്ടിയിലെ മലം ഇളകി മറിയാതിരിക്കാൻ തൊട്ടിയുടെ വാല്പങ്ങളിൽനിന്നു തുറിച്ചുനില്ക്കുന്ന 'ബാഫിൾ' (baffle) സഹായിക്കും. മലം ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ കൊഴുപ്പുഭാഗം ചെറുചെറു തരികളായി മാറുന്നു. സാധാരണ ചുരുങ്ങുന്നതിനാൽ 1-ാം അറയിലെ ദ്രാവകത്തിന്റെ മീതെ ഒരു പാടയായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ വായു ഉള്ളിലേക്കു പോകയില്ല. ഇതൊരു സൗകര്യമാണ്. മലത്തെ ദ്രവമാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുപ്രാണികൾക്കു വളരെ ജീവിക്കുവാൻ വായു പാടില്ല.

1-ാം അറയിൽനിന്നു 2-ാം അറക്കു കഴലുണ്ടു്. അതിൽക്കൂടി 1-ാം അറയിലെ ദ്രാവകം 2-ാം അറയിലേക്കു ഒഴുകുന്നു. 2-ാം അറ

യിൽവെച്ച് മലിനാംശം വീണ്ടും ഒക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടും അറയ്ക്കടിയിൽ മലിനം ഉണ്ടാകും. അതു നീക്കം ചെയ്യാനാണ് 3-ാം അറയിലെ സൈഫൺ. ഇതു 3-ാം അറയിൽനിന്നു മണ്ണിനിടയിലുള്ള ഓവുചാലിൽക്കൂടി മണ്ണിനു പുരിപോകുന്നു. ചാലിൽക്കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ അണുപ്രാണികൾ ബാക്കീയാവാനിടയുള്ള മലിനത്തെ നശിപ്പിക്കും.

3-ാം അറ ചിലപ്പോൾ കാണുകയില്ല. സൈഫൺ 2-ാം അറയിൽതന്നെ ഇങ്ങായിരിക്കും.

പട്ടണങ്ങളിൽ 'ചാക്കട' ചാലുകളുണ്ടാവും. വീടുകളിലെ മലിനം കെട്ടി നില്ക്കാതെ ചാക്കടചാലുകളിൽ വീഴണം. ചാക്കട ചാലുകളിലെ മലിനമെല്ലാം അവസാനത്തിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു പുഴയിലാണ് ചെന്നു വീഴുക. അവിടെയുള്ള അണുപ്രാണികൾ മലിനത്തെ ഒക്സീകരിക്കും. മലിനം പുഴയിൽ ചേരുന്നതിനടുത്ത് അധികം വീടുകൾ ഉണ്ടാവരുത്. പുഴയിൽവെച്ചു കറിയെല്ലാം മലിനം നിർദ്ദോഷമായിത്തീരും. പുഴയിൽ മലിനം കലരുവാൻ സംഗതി വരുത്തുന്നതു ഇത്തരമായ പ്രവൃത്തി അല്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മലിനം നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇപ്പോളുള്ളതിനേക്കാൾ വിശേഷപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. വിദ്യ മഹിമയ്ക്കി ഉപയോഗിച്ചു പുഴയിൽ മലിനം ചേരുന്നതിനു മുമ്പു അതിനെ നിർദ്ദോഷമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങളുണ്ടത്രെ.

ആറാം വിഭാഗം— പ്രാണികളുടെ സാമുദായിക ജീവിതം.

അദ്ധ്യായം 65.

—:0:—

തേനീച്ചകളും ഉറമ്പുകളും.

തേനീച്ചകളും ഉറമ്പുകളും കൂടുംകൂട്ടമായി വസിക്കുന്ന ജീവികളാകുന്നു. ഇവ കൂട്ടിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ജോലിചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവികളെ സാമുദായിക ജീവികളെന്ന് വിളിക്കുന്നു.



ചിത്രം 67.

തേനീച്ച. ഒരു തേനീച്ചകൂട്ടിൽ മൂന്നുവിധം തേനീച്ചകളെ കാണാം. (ചിത്രം 10). അവ രാജ്ഞി, അലസൻ, വേലക്കാർ എന്നിവയാകുന്നു. രാജ്ഞിയാകുന്നു മുട്ടയിടുന്നത്. അലസന്മാർ ആൺതേനീച്ചകളാകുന്നു പുണ്യ വളച്ച എത്തിട്ടില്ലാത്തവയും മുട്ടയിടാത്തവയും ആയ തേനീച്ചകളാകുന്നു വേലക്കാർ.

എന്നിവ പൂക്കളിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവ തേനീച്ച കൂട്ടിലെ അറകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അറ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുക, രാജ്ഞി ഇടുന്ന മുട്ടകൾ കീടദശയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവയെ പോറ്റി വളർത്തുക, അറകൾ (അടകൾ) കേടു വരാതെ നോക്കുക, രാജ്ഞിക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ശത്രുക്കളോടു എതിർക്കുക എന്നിങ്ങനെയി ഭാരമേറിയ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വേലക്കാർ നടത്തുന്നു. കൂട്ടിലെ ഇഴച്ചകൾ അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ മത്സരബുദ്ധി കൂടാതെ കൂട്ടിന്റെ നന്മക്കായി എപ്പോഴും പ്രവൃത്തിക്കുന്നു.

ഉറമ്പ്, ഇവയിലും മൂന്നുവിധം കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നു. ഇവ ആൺ-ഉറമ്പുകൾ, പെണ്ണുറമ്പുകൾ, വേലക്കാർ എന്നിവരാകുന്നു. വേലക്കാർ ചിറകുകളില്ല. ആൺ-ഉറമ്പിനും പെണ്ണുറമ്പിനും ചിറകുകൾ ഉണ്ടു്. ചിറകുള്ള ഉറമ്പുകൾ ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ പറക്കുകയുള്ളൂ. പെണ്ണിന്റെ പ്രവൃത്തി മുട്ടകൾ ഇടുക മാത്രമാകുന്നു. വേലക്കാരാണു് പുററിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും വൃത്തിയ്ക്കും വേണ്ടി അതിപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതു്. വേലക്കാരിൽ ചിലർ വലിപ്പം കൂടിയ തല കാണുന്നു. അവ വല്ലാതെ കടിക്കും.

7-ാം വിഭാഗം—സുഖസൗകര്യത്തിനുള്ള പ്രകൃതിസാധനങ്ങൾ.

— : 0 : —

കല്ല്‌രി—കല്ല്‌രിവാതകം കീൽമുതലായവ.

അംഗാരകത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമാകുന്നു കല്ല്‌രി. ചില ദിക്കുകളിൽ കല്ല്‌രി മണ്ണിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു, വളരെ കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വലിയ കാടുകൾ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് ഭൂമിയുടെ അമച്ഛശക്തിയാലും ഉള്ളിലുള്ള ചൂടിനാലും കാലാന്തരത്തിൽ കരിയാച്ചി മാറിനല്ലവണ്ണം ഉറച്ചുവശായ സാധനമാകുന്നു കല്ല്‌രി.

വിറക്, കല്ല്‌രി മുതലായവയെ വായു അകത്തു കുടക്കൊണ്ടെ ആക്കീട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളിലിട്ടു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അവയിൽനിന്ന് വാതകങ്ങളും കീൽ മുതലായ വേറെ ചില സാധനങ്ങളും കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്നു 'നിർനീരമായ വാറ്റിയെടുക്കൽ' (dry-distillation) എന്നാകുന്നു ചേർ. കല്ല്‌രികൊണ്ടു ഈ ക്രിയ നടത്തുന്നപക്ഷം ചില പ്രത്യേകതരവാതകങ്ങളെ ശേഖരിക്കാം. ഒരു ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള വാൽപാത്രത്തിൽ (Retort) കല്ല്‌രിയിട്ട് ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക. താപക്രമം 1200°C ൽ അധികമാകുമ്പോൾ 1) കല്ല്‌രിവാതകം (Coal gas) 2) കീൽ (Coal tar) 3) അമോണിയ വാതകം എന്നിവ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. ഈ വാതകങ്ങളെ ഒരു ആവിശീതിനി (Condenser) യിൽക്കൂടി വിടുക. കീൽവാതകമെല്ലാം ദ്രവക,

മായിത്തീരും. ആവിശീതിനിയിൽനിന്നു വരുന്ന കഴൽവെള്ളത്തിൽ വന്നു അവസാനിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അമോണിയവാതകം വെള്ളത്തിൽ അലിയും. ഈ വെള്ളം ചൂടുപിടിച്ചാൽ അമോണിയവാതകം വീണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ മൂടിയിൽക്കൂടി രണ്ടു ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയിൽ ഒന്നിൽക്കൂടിയാണ് റിട്ടാർട്ടിൽനിന്നു വരുന്ന കഴൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു പോകുന്നത്. മറെറാ ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി വെള്ളം തൊടാതെയുള്ള വേറൊരു കഴൽ പുറമെ വരുന്നു. അതിൽക്കൂടി ബാക്കിയായ കല്ലരി വാതകം വരുന്നതാണ്.

ഈ കല്ലരിവാതകം കത്തും. ഈവാതകത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കാം. അവിടെനിന്നു കഴൽവഴിക്കു കൊണ്ടുപോയി യന്ത്രശാലകളിലെ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും അവിടങ്ങളിലെ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ കീലിൽനിന്നാണ് ബെൻസയിൻ, കാർബോളിക് അമ്ലം, നാഫ്തലീൻ മുതലായവ കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബെൻസയിൻ മുതലായ സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു് പലവിധ ചായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.



അമോണിയാവാതകം.

— : 0 : —

അമോണിയാവാതകം :—ഒരു ട്രൈംഗ്യൂബിന്റെ മുഖത്തു് അതിന് പറ്റിയ ഒരു അപ്പി ഇടുക. ഈ അപ്പിലെ ചോരത്തിൽ കൂടി ഒരു കുഴൽ കടത്തുക. കുഴലിന്റെ അറ്റം ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു അധികം ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കുഴലിന്റെ മറ്റൊരു അറ്റം കുറച്ചൊന്നു വളഞ്ഞിരിക്കണം. വളഞ്ഞഭാഗം മേല്പോട്ടാക്കി, ട്യൂബ് ഒരു താങ്ങുകാലിന്മേൽ ഉറപ്പിക്കുക. കുറെ നവസാരത്തോടു (Sal-ammoniac—അമോണിയംക്ലോറൈഡ്) അതിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ ഇരട്ടികുമായും (കാൽസിയം ഓക്സൈഡ്—Calcium oxide) കലർത്തുക. ഈ കലർപ്പിനെ ട്രൈംഗ്യൂബിൽ ഇട്ടു്, കാർഷ്കകോണ്ടു മുഖം നല്ലപോലെ അടക്കുക. ട്രൈംഗ്യൂബ് ചൂടു പിടിപ്പിക്കുക. വളഞ്ഞഭാഗത്തു വേറൊരു ട്രൈംഗ്യൂബ് കമിഴ്ത്തി നിർത്തുക. ഈ ട്രൈംഗ്യൂബിൽഒരു വാതകം ശേഖരിതമാകും. ഈ സംഗതി വാതകത്തിനുള്ള വാസനയിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ വാതകത്തിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ :—സ്വഭാവികഗുണങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തവ ആകുന്നു. (1) നിറമില്ല. (2) ശീതോഷ്ണമായ ഒരു വാസന ഉണ്ടു് (3) വായുവിനേക്കാൾ ഘനം ചുരുങ്ങിയതാകുന്നു. (4) വെള്ളത്തിൽ അലിയും.

ചില രാസഗുണങ്ങൾ :—(1) നനഞ്ഞ ചുവന്ന ലിട്മസ് കടലാസിനെ ഇതു് നീല നിറമാക്കിത്തീർക്കും (2) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആമ്ലം അടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ വാതകം അതിനോടു ചേർന്നു

പുകയുടെ രൂപത്തിൽ അമോണിയംക്ലോറൈഡായിത്തീരുന്നു (3) അമോണിയാദ്രാവകത്തോടു മയിൽത്തുളളദ്രാവകം ചേർത്താൽ ആദ്യത്തിൽ പച്ചനിറത്തിൽ ഒരു അവക്ഷേപം (precipitate) കിട്ടും, എന്നാൽ അമോണിയാദ്രാവകം അധികമായാൽ കട്ടയായിരുന്ന അവക്ഷേപം അലിഞ്ഞു നീലനിറമുള്ള ഒരു ദ്രാവകമായി

അമോണിയാദ്രാവകം ഫിമക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു നാം മുമ്പു പഠിച്ചുവല്ലോ.

പെട്രോലിയം (Petroleum) ഭൂമിയിൽ എവിടെ കിട്ടുന്നുവെന്നു—

— : 0 : —

പെട്രോലിയം മണ്ണിൽനിന്നു കഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയാകുന്നു. മണ്ണെണ്ണ എന്നാണു പേർ പറയേണ്ടതു്. എന്നാൽ ആ പേർ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന എണ്ണക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറു്. പല വിധ ഫൈഡ്രോകാർബണുകൾ അടങ്ങിയ ഒന്നാകുന്നു മണ്ണിൽനിന്നു കഴിച്ചെടുക്കുന്ന എണ്ണ. ഫൈഡ്രോകാർബൺ എന്നതു ഫൈഡ്രജനും കാർബണം ചേർന്നു കിട്ടുന്ന യന്ത്രശാസ്ത്രപദമാണു്.

പാർസീക (Persia) ക്കാണ് ആദ്യമായി ഈ എണ്ണയെ പറ്റിറിയുള്ള അറിവു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമേ ഇതു് ഒരു വ്യവസായ പദാർത്ഥമായിത്തീർന്നതു്. ഇപ്പോൾ അനവധി യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഈ എണ്ണയുടെ സഹായത്താൽ കാട്ടുന്നുണ്ടു്. റോടുകൾ നേരയാക്കേണ്ടതിലേക്കു കട്ടിയായ പെട്രോലിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്.

ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്തും മണ്ണിനടിയിലായി ഈ എണ്ണ കണ്ടു വരുന്നു. അമേരിക്കയിൽനിന്നു വളരെ എണ്ണ കിട്ടുന്നുണ്ടു്. റഷ്യ, പേഷ്യ, ആസാം, ബർമ്മ, റൂമേനിയ എന്നീ ദേശകളിൽ ഈ എണ്ണയുടെ ഉറവുകൾ അനവധി ഉണ്ടു്.

പെട്രോലിയത്തിൽനിന്നു അനേകം സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. മണ്ണിൽനിന്നു ഈ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ അതു വളരെ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കും. അതു മങ്ങിയതവിട്ടു നിറത്തോടുകൂടിയതും കൊഴുത്തതും ആയ ഒരു എണ്ണയായിരിക്കും.

പെട്രോലിയം (തുടച്ചു)

— : 0 : —

ഈ എണ്ണയിലെ ഫൈഡ്രോകാർബണുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ആദേശികസ്രാവണം എന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നടത്തുക. ഈ ക്രിയയാൽ പ്രത്യേകങ്ങളായ ഉഷ്ണതകളിൽ വിവിധങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ വാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു റിട്ടോട്ടിൽ പെട്രോലിയം ഒഴിക്കുക. റിട്ടോട്ടിന്റെ ഉഷ്ണത കാണിക്കുവാൻ ഗോളത്തിലുള്ള ചോരത്തെ മുടിയിരിക്കുന്ന കാർബിഡുടെ ഒരു ഉഷ്ണതാമാപകം (thermometer) കെട്ടുക. റിട്ടോട്ടിന്റെ വാൽഭാഗത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാസ്ക്ക് വെക്കുക. ഈ ഫ്ലാസ്ക്ക് തണുത്തവെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കിടക്കട്ടെ. ഫ്ലാസ്സിന്റെ മുഖം വെള്ളത്തിൽ നന്നു വീട്ടിരിക്കണം. റിട്ടോട്ട് ചൂടു പിടിച്ചിരിക്കുക.

70°C നും 90°C നും ഇടയിലായി ഫ്ലാസ്സിൽ പെട്രോൾ ലേഖരിതമാകും. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുവാൻ പെട്രോൾ വേണം.

90°C നും, 150°C നും ഇടയിൽ ബെൻസീനും നാഫ്തയും കിട്ടുന്നു. ചായവും, വാണിയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ നാഫ്ത ഉപയോഗിക്കാമെന്നു.

150°C നും, 300°C നും ഇടയിൽ കറോസീൻ (kerosene) കിട്ടുന്നു. വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുവാൻ മണ്ണെണ്ണ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 150°C നു മുകളിൽ നിറമുള്ള മണ്ണെണ്ണ കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ 180°C നു മുകളിൽ നല്ല വെളുത്ത മണ്ണെണ്ണയാണ് ഉണ്ടാവുക.

റിട്ടോട്ടിൽ ബാക്കിയായ ദ്രാവകം തണുപ്പിക്കുക. അതിൽ പലവിധ പാരഫിനുകൾ (paraffins) ഉണ്ടാക്കും. അവയിൽ മുമ്പുണ്ടായ പാരഫിൻ-മെഴുകാകുന്നു. ഇതു മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ റിട്ടോട്ടിൽ ബാക്കിയായതു തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ കട്ടിയായ മാരം നീക്കം ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെ കിട്ടുന്ന ദ്രാവകത്തിൽനിന്നാണ് വാസിലീനും (vaseline) ലൂബ്രിക്കേയിറിനും (lubricating) എണ്ണയും കിട്ടുന്നത്. ഇവ യന്ത്രങ്ങൾ കേടുവരാതിരിക്കുന്നതിന്നു ഉപയോഗപ്പെടുന്നവയാണ്. ലൂബ്രിക്കേയിറിന്റെ എണ്ണ നല്ലപോലെ പരിഷ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതു വിരോചനത്തിന്നു പറ്റിയതാകുന്നു. ഇവയെല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയാകുന്ന പെട്രോളിയം-കരി (petroleum coke) വിറകുപോലെ കത്തിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഈ കരിയിൽനിന്നാണ് വിദ്യുച്ഛക്തി തരുന്ന സെല്ലുകളിലെ കാർബൺ-ദണ്ഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

പെട്രോലിയത്തിൽനിന്നു ആംഗികസ്രാവണത്താൽ കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ കാണാം.

പേര്	കുപമനരേഖ	ഉപയോഗം
പെട്രോലിയം	40°—70°C	മെഴുക്കിലുക്കൻ ; വസ്തുങ്ങളിൽനിന്നു.
പെട്രോൾ	70°—90°C	വിറകിന്നു പകരം
നാഫ്താ	80°—120°C	ചായം, വാഷ്നീഷ്യ ഉണ്ടാക്കുവാൻ
ബെൻസിൻ	120°—150°C	"
കറോസിൻ	150°—300°C	വിളക്കു കത്തിക്കാൻ

മാർബിൾ, കക്കമുതലായവ.

— : 0 : —

മാർബിൾ (വെണ്ണക്കല്ലു) വളരെ മിനുസമുള്ളതും ഉറപ്പുള്ളതും ആണ്. അതു വെള്ളത്തിൽ അലിയുകയില്ല.

മാർബിൾ എന്നതു കാൽസിയംകാർബണേയിറ്റ് ആണ്. ഈ പദാർത്ഥം പല രൂപത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ചോക്കം, കുമ്മായക്കല്ലും കാർഷ്റ്റ്സാറും, കക്കയും ഇതേ പദാർത്ഥമാണ്.

കുമ്മായക്കല്ലു (limestone) നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കുക. പിന്നീട് തണുത്തതിനുശേഷം കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ ഇടുക. 'ഫീസ്', ഏന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. വീലയനം ചുവന്ന ലിട്മസിനെ നീലനിറമാക്കും. കുമ്മായക്കല്ലു ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു രാസക്രിയ നടക്കുന്നു.

മാർബിൾ, ചോക്ക് മുതലായ ചൂടാക്കിയാലും കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥം കുമ്മായക്കല്ലു ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതില്ലെന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നു.

ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംയന്തത്തിനു കുമ്മായം (quicklime) എന്നാകുന്നു പേര്. കുമ്മായം വെള്ളത്തോടു കലരുവാൻ ഇടയാക്കിയതു ചുണ്ണാമ്പു (slaked lime) ആണ്. ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം അലിയുകയില്ല. അലിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന വീലയനം ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളമാകുന്നു.

മാർബിൾ, ചോക്ക്, കുമ്മായക്കല്ലു, കക്ക എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ യന്ത്രിക പദാർത്ഥമാണ്. സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കാം. രാസഗുണങ്ങൾ ഒരേമാതിരി ഉള്ളവയാണ്. മാർബിൾ കട്ടപ്പമുള്ളതാണ്. കുമ്മായക്കല്ലു വേഗത്തിൽ പൊട്ടില്ല. കക്കക്കു ചോക്കിനേക്കാൾ ഉറപ്പുണ്ട്. ചോക്ക് വേഗം പൊടിക്കാം ഇവയ്ക്കു തമ്മിൽ കറേൾ നീറ വ്യത്യസ്തമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാരോന്നം നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയാൽ കുമ്മായമയ്മാറുന്നു.

കക്ക ചൂട്ടുകുമ്മായം (ഇത്തിൽ) ഉണ്ടാക്കുന്നതു ചൂളകളിൽ ആണ്. നല്ല കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കക്കയോടു നേരിട്ടു വിറകു ചേർക്കുകയില്ല. ഇരിമ്പു വലുതെങ്കിൽ ഉള്ള കക്ക നല്ലവണ്ണം കത്തുന്നതീയുടെ സഹായത്താൽ വരുന്നിട്ടാണ് നല്ല കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.


കുമ്മായക്കല്ലു ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം തൂക്കി നോക്കിയാൽ തൂക്കം ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വാതകം പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നു നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഈ വാതകം കാർബൺഡയോക്സൈഡ് ആണ്.

കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ്— സജ്ജീകരണം—ഗുണങ്ങൾ.

— : 0 : —

കാർബണൈറിറ്റിൽനിന്നു ഈ വാതകം ലഭിക്കുവാൻ സുഖകരമായ വേറൊരു വഴി ഉണ്ടു്. കാർബണൈറിറ്റിനോടു അമ്ളം ചേർത്താൽ മതി.

ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചുമാതിരിയുള്ള ഉപകരണം ശരിപ്പെടുത്തുക. ഫ്ലാസ്കിൽ മാർബിൾ കഷണങ്ങളുണ്ടുള്ളതു്. രക്ഷണ ഫനലിൽ (safcty funnel) ആണു് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ദ്രാവകം ഒഴിച്ചതിനുശേഷം ഫനലിൽ കുറെ ദ്രാവകം ബാക്കി



യാകും. ആയതിനാൽ ഫ്ലാസ്കിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാതകം ഫനൽവഴി പുറമെ പോകയില്ല. നേർത്ത (dilute) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ളം ആണു് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിക്കുക. സിലിണ്ടറിൽ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ശേഖരിതമാകും.

ചിത്രം 68.

ഗുണങ്ങൾ : സ്വാഭാവികഗുണങ്ങൾ—

(1) നിറമില്ല. (2) വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞമട്ടിൽ ഒരു പുളിപ്പരസം വാതകത്തിനു ഉണ്ടു്. (3) വായുവേക്കാൾ ഘനം കൂടിയതാണു് (4) വെള്ളത്തിൽ അലിയും.

രാസഗുണങ്ങൾ:---(1) ഫെനവീരോധി (non-supporter of combustion) ആണ്; കത്തുന്ന തിരി വാതകത്തിൽകാണിക്കുന്നപക്ഷം അതു കെട്ടുപോകും (2) ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളത്തിൽ വാതകം ലേഖനപക്ഷം ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം പാൽനിറമുള്ളതായിത്തീരും. ഇതിനു കാരണം, ചുണ്ണാമ്പ് + കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് = കാൽസിയംകാർബണേയിറ്റ്. ഇതിന്റെ തരികളാണ് പാൽ നിറമുണ്ടാകുന്നത്.

രണ്ടാമത്തെ ഗുണംകൊണ്ടു വാതകത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാം. മറ്റു വാതകങ്ങൾക്കു ഈ ഗുണമില്ല.

അഗ്നിശമനയന്ത്രത്തിൽനിന്നു ഈ വാതകമാണു ഉയർക്കോടെ പുറപ്പെടുന്നത്. ആക്സിസുകളിലെ വരാന്തച്ചുമതകളിൽ ചുവന്നു ചായം അടിച്ച ഒരു ഉപകരണം തറച്ചിരിക്കാം. ഇതാണു അഗ്നി നാശകനന്ത്രം. ഇതിനുള്ളിൽ സോഡിയംകാർബണേറ്റ് വിലയനമുണ്ടാകും. ഇതോടു കലരാതെ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ സരംചുരിക്കളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഉപകരണം ഏടുത്തു തല കീഴാക്കി ഉയർക്കോടെ നിലത്തടിക്കുന്നപക്ഷം അല്പം വെച്ചിരിക്കുന്നഭാഗം പൊട്ടി ദ്രാവകത്തോടു കലരും. പെട്ടെന്നു ഉയർക്കോടെ വാതകം ഉണ്ടാകും. ഈ വാതകമാണ് തീയിൽ തട്ടെണ്ടത്.

‘സോഡാവാട്ടറിൽ’ ഈ വാതകം ആണ് വെള്ളത്തിൽ അലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനു പുറമെ വാതകം ശക്തിയായ മർദ്ദത്തിലാണ് കുപ്പിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. കുപ്പി തുറന്നതും കമിച്ചയിട്ടു പുറമെ വരുന്നതും ഈ വാതകമാണ്.

കുമ്മായക്കുട്ട്, ശീമക്കുമ്മായം കോൺക്രീറ്റ്.

— : 0 : —

കുമ്മായക്കുട്ട് ഇത്തിളിൾ വെള്ളം തെളിച്ചാൽ ഇത്തിര പൊ
ടിഞ്ഞു കുമ്മായമായിത്തീരും. ഈ കുമ്മായംകൊണ്ടാണു നാം
കുമ്മായക്കുട്ട് (mortar) ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. കുമ്മായത്തോടു മണൽ
ചേർത്തു വെള്ളം കഴിച്ചു് ഇടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൂട്ടാകുന്നു
കുമ്മായക്കുട്ട്. ഇഷ്ടിക്കിടയിൽ ഈ കൂട്ട് ഇട്ടു നാം ചുമരു
മുതലായതു കെട്ടുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ കുമ്മായം ഉറയുന്നു. ഈ
സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രാസപരിണാമം നടക്കുന്നു. കുമ്മായക്കുട്ടു
വായുവിലെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡിനോടു ചേരുന്നു. അ
പ്പോൾ അതു വീണ്ടും കുമ്മായക്കല്ലായിത്തീരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഈ സമയത്തു 'ക്രട്ടി'ലെ മണൽത്തരികളിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ടായി
കുമ്മായക്കുട്ടു ഉറക്കുന്നു. ഈ ഉറച്ച സാധനമാണ് കല്ലുകൾ വഴുതി
വീഴാതെ ചുമരിനെ ബലവത്തായി നിർത്തുന്നതു്.

സിമൻറ് അഥവാ ശീമക്കുമ്മായം :—ഇക്കാലത്തിൽ വീടു
കെട്ടുവാൻ സിമൻറ് (ശീമക്കുമ്മായം) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.
സിമൻറും കുമ്മായക്കല്ലുകൊണ്ടു് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കുമ്മായക്ക
ല്ലിനോടു 'കളിമണ്ണ' ശരിയായ തോതിൽ ചേർത്തു ചൂളയിൽ ഇട്ടു
ചൂടുപിടിപ്പിച്ചും. അപ്പോൾ ഒരു കട്ടയായ സാധനം കിട്ടും.
ഈ കട്ട പൊടിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ശീമക്കുമ്മായം എന്നതു്. പോർ
ട്‌ലൻഡ് സിമൻറ് (Portland cement) പേരു കേട്ടതാണ്.
തെൻ ഇന്ത്യയിൽ കോയമ്പത്തൂരിന്നടുത്തുള്ള മതക്കരയിൽ ശീമക്ക
ുമ്മായം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്.

കോൺക്രീറ്റ് (Concrete):—കോൺക്രീറ്റ് പണി മുഴുവനും ശീമക്കുമായം കൊണ്ടാകുന്നു. ശീമക്കുമായം, കരിങ്കൽ ചില്ലുകൾ, മണൽ, വെള്ളം എന്നിവ കൂട്ടിക്കലർത്തിട്ടാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1 : 2 : 4 എന്ന തോതിൽ ശീമക്കുമായം, മണൽ, കരിങ്കൽ കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്താൽ ഒരുവിധം നല്ല കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടും. 1 : 2 : 3 എന്ന തോതിൽ ചേക്കുന്ന താണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്നടിയിൽക്കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കോൺക്രീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആദ്യം ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തും. പിന്നീട് കലപ്പിനെ ആവശ്യമുള്ളതായ അച്ചിലിടും. അച്ചിലിട്ടതിൽപിന്നെ കലപ്പിൽ വെള്ളം പകരും. ശീമക്കുമായം വെള്ളത്തോടു ചേർന്ന് ഉറച്ചു കട്ടിയാകും. അപ്പോൾ കലപ്പിന്റെ 7 ആയതനത്തിനു പകരം 4.5 ആയതനമേ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. കലപ്പ് ഒന്നരണ്ടു മണിക്കൂറിനകം ഉണങ്ങി ഉറച്ചു തുടങ്ങും. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ ഒന്ന്മൂന്നരക്കൊല്ലം വേണ്ടിവരുംത്രേ. കോൺക്രീറ്റ് സാമാനങ്ങൾക്കു ഉറപ്പു കൂടുവാൻ കലപ്പിനുള്ളിൽ ഉറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇരിമ്പു വടികൾ വെയ്ക്കുക പതിവുണ്ട്.

കടലാസ് ഉണ്ടാക്കൽ.

—:0:—

കീറത്തുണി, മുള, വൈക്കോൽ, ചില മരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കടലാസ്സുണ്ടാക്കുവാൻ ഇപയോഗിക്കുന്നത്. കീറത്തുണികൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലാസ്സു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്.

കടലാസ്സുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കു്:—മരത്തിന്റെ പലം കുറച്ചു രുതു് പിന്നീടവയെ കഷണം കഷണമാക്കി കുതിരുവാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വെക്കുക. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇതിട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കാരംസിയം-ബൈ-സൾഫൈറ്റ് (Calcium-bi-sulphite) ചേർക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മരത്തിലെ സസ്യശരം അതായതു് സെല്യൂലോസ്സു (cellulose) വേർതിരിഞ്ഞു കിട്ടും. പാത്രത്തിലുള്ള സാധനത്തിൽ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കുറച്ചു് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (Sodium Hydroxide) ചേർക്കണം. തിളപ്പിച്ചുകിട്ടുന്ന സാധനത്തെ നല്ലവണ്ണം അരച്ച ഒരു കഷവുപോലെ ആക്കിത്തീർക്കണം. ഇതിന്നു കടലാസ്സുക്ലാപ്പ് (Paperpulp) എന്നറക്കുന്നു പേർ. ബലത്തിന്നു ക്ലോണ്ടു് ഈ കൂഴിൽ കളിമണ്ണു ചേർക്കാം. വണ്ണനാശകവുണ്ണം (bleaching powder) എന്ന പദാർത്ഥം ചേർത്തു് വെളുത്തതാക്കിത്തീർക്കാം. ഈ കഷവിനെ ഒരു തൊട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു് പാകത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക. ഈക്കുലകൾ നിറത്തിവെച്ചു കുതിരയുടെ വാൽ രോമംകൊണ്ടു് ബന്ധിച്ചു് ഒരു പായ ഉണ്ടാക്കുക. അതിന്റെ മേൽ ഒരു തുണി പറത്തുക. തുണിയുടെ ഉപരി ഒരു ചതുരശ്രവട്ടം

വെക്കുക. പായോടൊപ്പം ഈ ചട്ടം പൊന്തിച്ചെടുത്ത് തൊട്ടിയിലെ ദ്രാവകത്തിൽ ചട്ടത്തിന്റെ വക്ക് തൊടത്തക്കവണ്ണം ആക്കുക. പിന്നീട് ചട്ടംകൊണ്ട് ദ്രാവകം ഇളക്കുക. ദ്രാവകത്തിലെ തരികൾ ഇളകി മറിഞ്ഞുതുടങ്ങുമ്പോൾ ചട്ടം ലംബമായി തഴ്ത്തി ചട്ടം സമനിരപ്പിലാക്കി ദ്രാവകത്തിൽനിന്ന് മേൽപോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ തുണിമേൽ ഒരു നേരിയ അട്ടി കണ്ടുതരും. നീർ വലിഞ്ഞ ഉടനെ ചട്ടം നീക്കി പായോടൊപ്പം തുണിയെ ഒരു ഫ്ലാനൽ തുണിമേൽ പരത്തി വെക്കുക. പായും അതിന്മേലുള്ള തുണിയും ഒന്നിച്ചു ചുരുട്ടിയെടുക്കുക. എന്നാൽ ഫ്ലാനൽതുണിയിൽ കടലാസ്സ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഈ ഫ്ലാനൽ തോരാനിട്ട് എടുത്തു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലാനലിനിന്നു കടലാസ്സ് വേറിട്ടെടുക്കുക. പിന്നീട്, ഉണ്ടാക്കിയ കടലാസ്സിന്മേൽ ഉരസി മീനസം വരുത്തുക.

ദ്രാവകത്തിൽ ചട്ടം വെക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കഞ്ഞിപ്പശയും പടികക്കാര വിലയനവും ചേർത്താൽ കിട്ടുന്ന കടലാസ്സ് കറേക്കുടിയും നല്ലതായിത്തീരും.

വ്യവസായശാലകളിൽ, കടലാസ്സുകൂട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിലേക്കും യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടു. നീർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ആവിയുടേയും ചൂടുള്ള ഉരുളികളുടേയും സഹായത്താലാകുന്നു.

പ്രകൃതിശക്തികളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ.

അദ്ധ്യായം 74.

----- :: -----

വദ്യുദ്ധാരണയുടെ ഉഷ്ണീകരണം

ലോഹക്കമ്പികളിൽക്കൂടി വിദ്യുദ്ധാര പ്രവഹിക്കുന്നു. എ
ന്നാൽ എല്ലാമാതിരി കമ്പികളിലുംകൂടിയുള്ള പ്രവാഹം ഒരു
പോലെതല്ല. ചില കമ്പികളിൽകൂടി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക്
വിദ്യുത്ശക്തിയെ സ്വല്പമായോ അധികമായോ തടഞ്ഞുനിർത്തു
വാൻ കഴിയും. ചെമ്പുകമ്പിയിൽക്കൂടി പോകുമ്പോൾ ഈ തട
സ്സം തീരെ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഇരുമ്പ്,
പ്ലാറ്റിനം മുതലായ ലോഹങ്ങൾക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കമ്പികളിൽ
കൂടി പോകുമ്പോൾ തടസ്സം അധികരിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്,
കമ്പിയുടെ നീളം കൂടിക്കൂടിവരുന്തോറും അപ്രകാരമുതന്നെ അതി
ന്റെ വ്യാസം ചുരുങ്ങുചുരുങ്ങി വരുന്തോറും പ്രസ്തുത പ്രതിരോധ
വും (Resistance) കൂടിക്കൂടിവരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തട
സ്സം അധികമാകുന്തോറും ചൂടും അധികരിച്ചുവരും. ചൂടുവലി
ക്കുന്നതോടുകൂടി ശോഭയും ഉളവാവി പ്രകാശവും അധികരിക്കുന്ന
താണ്.



ഈ പ്രമാണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്
വിദ്യുദ്ദീപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തന്നത്. വിദ്യുദ്ദീപ
ങ്ങളിൽ വേഗം ഉരുകാത്ത കാർബൺ (Car-
bon) ടങ്സ്റ്റൺ (Tungsten) എന്നീ പദാർത്ഥ
ങ്ങളുടെ നേർമ്മയായ തന്തുക്കളാകുന്നു വിദ്യുദ്ധാ
രയെ തടയുന്നത് ചിത്രം 96 വിദ്യുദ്ദീപത്തി
ന്റെ ബൾബിനുള്ളിൽനിന്ന് വായു നീക്കം

ചിത്രം 96. ചെമ്പ്യിരിക്കും. അതിലെ തന്തുക്കളിൽക്കൂടി
വിദ്യുദ്ധാര കഴുകുമ്പോൾ അവ ചൂടു പിടിച്ചു ജ്വലിച്ചുതുടങ്ങും.
അപ്പോൾ പ്രകാശം കിട്ടും.


വിദ്യുദ്ധാരയുടെ ഉഷ്ണീകരണം

(തുടച്ചു)

— : 0 : —

വിദ്യുദ്ദീപങ്ങൾ കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി അയസ്സംയോജകയന്ത്രം. വിദ്യുത്ത് ഇന്സുലിപ്പെട്ടി മുതലായവയെ പറയാം.

അയസ്സംയോജകയന്ത്രം :—ഇതിൽ ' നൈക്രോം ' എന്ന മിശ്ര ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പിയുണ്ട്. ഈ മിശ്ര ലോഹക്കമ്പിക്ക് വിദ്യുദ്ധാരയെ പ്രതിരോധം ചെയ്യാനുള്ള



ചിത്രം 70.


ശക്തി അധികമായുണ്ട്. വിദ്യുദ്ധാര ഈ കമ്പിയിൽക്കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ ഉതിന്റെ ഇഷ്ടത അധികരിച്ചുവരുന്നു. നൈക്രോം കമ്പിച്ചുരുളിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇരുമ്പുകഷണം ഉണ്ട്. ഈ ഇരുമ്പുകഷണം ചൂടപിടിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചൂടപിടിച്ച ഇരുമ്പിന്റെ കൂർത്ത ഭാഗം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ വെച്ചാൽ അവ ഉരുകി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ്.

വിദ്യുത് ഇസ്കരിപ്പെട്ടി:—കരി കത്തിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഇസ്കരിപ്പെട്ടി ചൂടപിടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. വിദ്യുത് ഇസ്കരിപ്പെട്ടിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യുത് ഇസ്കരിപ്പെട്ടി ആകൃതിയിൽ സാധാരണ ഇസ്കരിപ്പെട്ടിപോലെ തന്നെ. എന്നാൽ ചൂടപിടിപ്പിക്കേണ്ടതിലേക്കു നൈട്രോക്രോംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള കമ്പിച്ചുരുളുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ചുരുളിൽ വിദ്യുത് ശക്തി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പെട്ടിയുടെ അടി ചൂടപിടിക്കും. പ്രവാഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഇഷ്ടപോലെ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉഷ്ണതയെ വേണ്ടവിധം നിലനിർത്താനും കഴിയും.

കമ്പിതപ്പാലം അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും

— : 0 : —

വിദ്യുച്ഛക്തി ഒരു കമ്പിയിൽക്കൂടി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു കാന്തക്ഷേത്രം (magnetic field) ഉണ്ടാകാത്തതല്ല. ഇതു നമുക്കു താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷണമുഖം അറിയാം. ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോരങ്ങൾ നീളമുള്ളതായ രോഡിനു



ചിത്രം 71.

ചെമ്പുകമ്പി (insulated copper wire) കൊണ്ടു ചേർക്കുക. ഈ കമ്പിയെ ഒരു വടക്കുനോക്കി (artificial magnet) അഥവാ കൃത്രിമകാന്തത്തിന്റെ മുകളിലായി പിടിക്കുക. വടക്കുനോക്കിയിൽ ഒരു ലിഗ്നം (declination) കാണാവുന്നതാണ്. കമ്പിയെ വടക്കുനോക്കിയുടെ താഴെപിടിയ്ക്കുക. ആദ്യത്തെ ലിഗ്നം തന്നെ വിപരീതമായ ഒരു ദിശ കാണുന്നതാണ്. ഒരു കാന്ത

സൂചിയിൽ ദിഗ്ദൂശം ഉണ്ടാകേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുക്കെ മറ്റൊരു കാന്തസൂചികൊണ്ടു വരണം. ആയതിനാൽ, ഈ ദിഗ്ദൂശത്തിന്നു കാരണം വിദ്യുച്ഛക്തിയെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കമ്പിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാന്തക്ഷേത്രമായിരിക്കണം.



ചിത്രം 72.

കമ്പിക്കു പകരം കമ്പിച്ചുരുളുപയോഗിക്കുന്നപക്ഷം, ആ ചുരുളുതന്നെ ഒരു കാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ചുരുളിനുള്ളിൽ പരമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പുകോൽ വെക്കുന്നപക്ഷം, ചുരുളിന്റെ കാന്തശക്തി അധികരിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഈ സംഗതികളെ ആസ്പദമാക്കിട്ടാകുന്നു, വിദ്യുൽ-കാന്ത (electromagnet) അർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.


കമ്പിത്തപ്പാലം അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും (തുടർച്ച)

— : 0 : —

കമ്പിത്തപ്പാലിലെ മുഖ്യഭാഗം വിദ്യുൽക്കാന്തമാകുന്നു. വിദ്യുൽക്കാന്തത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണം. അതിലെ കമ്പിച്ചുരുളിയിൽക്കൂടി വിദ്യുദ്ധാര ഉള്ളപ്പോൾ ഉപകരണം ഒരു കാന്തമായിരിക്കും. ധാര മുറിയുമ്പോൾ ഉപകരണത്തിന്റെ കാന്തശക്തി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു.

കമ്പിത്തപ്പാലിലെ സാമഗ്രികൾ : (1) ബാറ്ററി (2) താക്കോൽ (Key) (3) മോർസുശബ്ദജനകം (Morse Sounder) എന്നിവയാകുന്നു.

ഇവയെ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ടതു ചിത്രത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുക (ചിത്രം 30). K എന്ന താക്കോൽ വർത്തമാനം അയക്കേണ്ട ആപ്പീസിലാണു് ഓടുക. m എന്നതു ശബ്ദജനകം ആകുന്നു.



ചിത്രം 73

ഈ കമ്പി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ട ആപ്പീസിലായിരിക്കും. C എന്നത് ബാറ്ററി ആണ്. ഈ ബാറ്ററിയിലെ ചാരത്തിൽനിന്നു് താക്കോൽ വഴിക്കു m എന്നതിലേയ്ക്കു് രോധിതകമ്പിയുണ്ടു്. ഇതിന്നു ലൈൻ (Line) കമ്പി എന്നാകുന്നു പേർ. വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രവഹിക്കുവാൻ m-നെ വേറൊരു കമ്പിമൂലം ബാറ്ററിയിലെ മറ്റേ ചാരത്തോടു ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്നുപകരം m-ൽ നിന്നു് ഒരു ചെറു ചെമ്പുകമ്പി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കും C-ൽ നിന്നു് വേറൊരു ചെറുചെമ്പുകമ്പി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കും ചെലുത്തിവെച്ചിരിക്കും. ഈ ഏർപ്പാടാണു് സാധാരണയായ് കണ്ടുവരുന്നതു്. ആയതിനാൽ ലൈൻ-കമ്പിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേച്ചിയെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതു ഭൂമിയാകുന്നു. വിദ്യുദ്ധാര ഒഴുകുവാൻ ഭൂമി അനുക്രമിക്കുന്നതാണു്.

കമ്പിത്തപ്പാലിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശബ്ദജനകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു്.

ശബ്ദജനകത്തിലെ മുഖ്യഭാഗം വിദ്യുൽ-കാന്തമാകുന്നു. ഈ കാന്തത്തിന്റെ മീതെ പതമുള്ള ഒരു അർമച്ചർ (Armature) വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഇരുമ്പുകട്ട ഒരു ലീവറി (Lever) നോട്ടു് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ലീവറിലെ ആധാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അറ്റത്തിന്റെ അടുക്കെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങ് കാണാവുന്നതാണു്. ലീവറിന്റെ മറ്റേ അറ്റം പിടിച്ചുകൊണ്ടു് കെട്ടിയിരിയ്ക്കും. ഈ അറ്റത്തിന്റെ മുകളിലും താഴ്ത്തും ഓരോ ആണി ഉണ്ടായിരിക്കും.

കമ്പിത്തപ്പാലിലെ താക്കോൽ അമർത്തുമ്പോൾ വിദ്യുദ്ധാര പൂർത്തിയാകുന്നു. ഇതിൻ ഫലമായി അപ്പോൾതന്നെ കമ്പി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആഫീസിലെ നാദകത്തിലുള്ള വിദ്യുൽ-കാന്തം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഉപകരണം കാന്തമായ് തീരുകയും

അർമച്ചറിനെ പിടിച്ചുവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർമച്ചർ അതായത് ഇരുമ്പുകട്ട കാത്തത്തിൽവന്നു തട്ടുമ്പോൾ ലീവറിലെ പിചുട്ട കെട്ടിയ അറ്റം താഴെയുള്ള ആണി (a) മേൽവന്നു അടിച്ച ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. താക്കോൽ വിട്ടാൽ വിദ്യുദ്ധാര മുറിയുന്നു. അപ്പോൾ m എന്ന ശബ്ദമുണ്ടാകാതെ കാത്തമായ തീരുകയും അർമച്ചർ മേല്പോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലീവറിലെ പിചുട്ട കെട്ടിയ അറ്റം മുകളിൽ ഉള്ള ആണി (d) യിൽ ചെന്നു തട്ടി ശബ്ദിക്കുന്നു. താക്കോൽ അമർത്തിവിടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെയും സമവ്യത്യാസത്തെയും ആസ്പദമാക്കി വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന രണ്ടുവിധം ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം. ആണിമേൽ തട്ടുന്ന രണ്ടു 'ടിക്' ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലെ സമയം പുരുഷിയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ 'കട്ട്' എന്നാണ് പറയുക. ഈ സമയം അധികരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ 'കട്ട്' എന്നാണ് പറയുക. ഈ ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അമേരിക്കയിലെ മോർസ് (Morse) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചില അക്ഷരസങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ 'കട്ട്' എന്ന ശബ്ദം പുള്ളിയായും 'കട്ട്' എന്ന ശബ്ദം വരയായും കാണിച്ചിരിക്കും.

പേജ് വരി		അബജം	സുബജം
3	18	$\pi r^2 = \frac{22}{7}$	$\pi = \frac{22}{7}$
15	10	Fulerum	Fulcurm
80	7	സ്ഥിതിസ്ഥാപകത്വം	സ്ഥിതിസ്ഥാപകത്വം
65	2	ഡൈ	ഡൈ
66	19	ഓക്സിജൻകൊണ്ടു	ഓക്സിജനിൽകൊണ്ടു
67	1	വളത്ത	വെളത്ത
	4	മാറി	മാറി
	6	ഗന്ധകം	ഗന്ധകം
	9	പരീക്ഷണകഴിയിൽ	പരീക്ഷണക്കഴിയിൽ
	"	ഗന്ധകം	ഗന്ധകം
	12	തുടങ്ങുകയും	തുടങ്ങുകയും
68	19	linseed oil	linseed oil
71	14	Corrolsve	Corrosive
	25	നൈട്രൈറ്റ്	നൈട്രൈറ്റ്
72	21	എല്ലാഘോഷം	എല്ലാഘോഷം
74	24	Pulmonary	Pulmonary
		respiration	respiration
81	12	Ientical	lenticel
	17	microseope	microscope
83	7	TadPales	Tadpoles
	14	ആകൃതിയിലുള്ള	ആകൃതിയിലുള്ള
	25	ഉൾഗീലുകൾ	ഉൾഗീലുകൾ
	30	വളയുടെ	വളയുടെ
85	4	ഗീർലുകൾക്കു	ഗീർലുകൾക്കു
	12	ഓക്സസിനെ	ഓക്സൈഡിനെ

പേജ്	വരി	അബലം	സുബലം
87	21	Hill	Hail
88	1	Condenation	Condensation
	1	ആവീർവിക്കുക	ആവീർവിക്കുക
	4	ജലപരിണംചക്രം	ജലപരിണാമചക്രം
	19	വെർജ്ജം	വെജ്ജം
89	3	മഴവെള്ളമെന്നതു്	മഴവെള്ളമെന്നതു്
90	10	ഉതരി	ഉപരി
92	11	Choloride	Chloride
93	„	ചിത്രം 35 വാറിയെ	ചിത്രം 35 വാറിയെ
94	6	Sendiment	Sediment
100	15	തെണ്ടവനെ	തൊണ്ടവിക്ക
		(Goiter) ത്താൻ	(Goitre) ത്താൽ
101	8	Prmutit	Permutit
	16	കഞ്ഞിരിക്കുന്നു	കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
	17	ഡ്രൈജനം	ഡ്രൈഡ്രജനം
102	9	വാതം	വാതകം
	12	ജന്മ	ജന്മ
104	4	തനയെ	തനിയെ
	16	കാണുന്നില്ല	കാണുകയില്ല
106	9	Zine	Zinc
108	9	തയുടെ	തീയുടെ
	17	പട്ടാതെ	പൊട്ടാതെ
	19	സന്നേഹവും	സന്ദേഹവും
	23	ഇക്കൽ	ഇടക്കൽ
	25	കത്തുമെങ്കിലു	കത്തുമെങ്കിലും
109	9	Heilium	Helium

പേജ് വരി	അബലം	സുബലം
109 18		ഇതാവശ്യമില്ല
21	Hydrochoric	Hydrochloric
28	നീരാവിയില്ലാത്തതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ }	നീരാവിയില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ
110 6	ചിത്രം 18	ചിത്രം 45
112 12	തൂടങ്ങിയിരിക്കുന്നു	തൂടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
17	ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ	ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ
18	അതു :	അതു
113 4	Corbonbisulphide	Carbonbisulphide
7	Soluted	Solute
8	ഗുണങ്ങൾ	ഗുണങ്ങൾ
114 1	പരിപൂരിത	പരിപൂരിത
119 22	Octahidral	Octohedral
119 24	Rhombohcdren	rhombohedron
121 13	Galvansied	Galvanised
126 20	മാറാറുന്നതാകുന്നു	മാറാറുന്നതാകുന്നു
133 7	വായുവിൽ	വായുവിൽ
139 21	Magnesium	Magnesium
143 16	ഇല്ല	ഇല്ല
143 24	ശബ്ദപാത്രം	ശബ്ദപാത്രം
144 22	എന്താണ്	എന്നാണ്
146 11	ആണിവേരോപ്പാടുള്ള	ആണിവേരോപ്പാടുള്ള
147 8	Roo-hairs	Root-hairs
148 10	Bee	Beet
157 22	90 %	90%
160 5	റബ്ബർ	റബ്ബർ
“ “	റബ്ബർജാർ	റബ്ബർജാർ

പേജ്	വരി	അബദ്ധം	സുബദ്ധം
166	1	അശുദ്ധവായുവിനാൽ	അശുദ്ധവായുവിനാൽ
166	4	കൃത്രിമമായ	കൃത്രിമമായ
173	4	എന്നിനയെല്ലാം	എന്നിവയെല്ലാം
"	8	വേർപാളിച്ചിൽനിന്നു	വേർപാളിച്ചിൽനിന്നു
174	4	മണ്ണിന്നു പരി	മണ്ണിന്നുപരി
"	16	ഉന്നമമായ	ഉത്തമമായ
"	17	നശിപ്പിക്കുവാൻ	നശിപ്പിക്കുവാൻ
"	20	തീക്കുവാൻ	തീക്കുവാൻ
175	1	ജീവ്	ജീവി
182	12	ശേഖരിതമാകും	ശേഖരിതമാകും
115	1	മർബ്ബരം	മർബ്ബരം
187	1	കർബബർഡൈ	കർബബർഡൈ
		കാക്കൈഡ്	കാക്കൈഡ്
191	1	ഉണ്ടാക്കൽ	ഉണ്ടാക്കൽ

GENERAL SCIENCE

FOR FORM IV
MALAYALAM

(Prepared according to the latest Madras syllabus:
suited for use in Cochin & Travancore
Secondary Schools also)

by
C. S. VENKATARAMAN, B. A., L. T.,
Headmaster, Board High School, Manjeri

[FIRST EDITION]

MADRAS
SRINIVASA VARADACHARI Co.
2/16, MOUNT ROAD

Copyright Reserved]

1949.

[PRICE : Rs. 1/4.