

ജ്യോതിഷമാലബോധിനി

(ASTRONOMY FOR THE LAYMAN)



പി. കെ. കോത

٥٢

ജ്യോതിഷബാലബോധിനി

ASTRONOMY FOR THE LAYMAN

ഗ്രന്ഥകർത്താ :

പി. കെ. കോറു എം. എ; എൽ. ടി.

(രചകുപകാശം)

PUBLISHERS :

THE MANGALODAYAM LTD.,
TRICHUR.

1953 ജൂൺ.

ഒന്നാം പതിപ്പ്: കോപ്പി 1000.

തൃശ്ശിവപേരൂർ
ഗീതാ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചത്.

വില: 3 ക.

മഖവുറ

ജ്യോതിഷത്തിന്നു മാനവസംസ്കാരവുമായി ഒരുഭേദബന്ധമുണ്ടെന്നു തർക്കമറ്റ സംഗതിയാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും നിയതസഞ്ചാരം, ജ്യോതിഷങ്ങളുടെ ആവർത്തനം മുതലായ സംഗതികൾ മനുഷ്യരുടെ അതുഭൂതത്തേയും ചിന്തയേയും ഉണർത്തുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനുണ്ടാകാവുന്ന ശ്രേയസ്സിന്റെ ഉറവുകളാകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കാലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ആ കാലം ജ്യോതിസ്സുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നുമാത്രം അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാരതീയരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതു വളരെ സ്ഥൂലമത്രെ. കൃഷിക്കാർ ഞാററുവേലകളെ നോക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കളുടെ സകല വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നക്ഷത്രവും തിഥിയും നോക്കിട്ടാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. സംക്രമദിവസം ഈശ്വരാധനയനുഷ്ഠാനം പ്രത്യേകം പറ്റിയ ദിവസമാകുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അയനാരംഭമദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിക്കുന്ന സംക്രമങ്ങളെ അവർ ആഘോഷിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ പല ആഘോഷങ്ങളിലും ഇതു നിഴലിച്ചെങ്കിലും കാണാം. സംവത്സരദൈവവും തീയതികളും ജ്യോതിസ്സുകളുടെ സഞ്ചാരത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

കാലഗണനക്കുപയോഗമായ ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിലാണ് ജ്യോതിഷത്തെ ഭാരതീയചാതുർന്മാർ വേദാംഗമായി സ്വീകരിച്ചത്.

“വേദാസ്സാവദ്യജ്ഞകർമ്മപ്രവൃത്താ

യജ്ഞാഃ പ്രോക്താസ്തേ തു കാലാന്ത്രയേണ

ശാസ്ത്രാദസ്സാൽ കാലബോധോ യതഃ സ്വാ-

ദേദാംഗതം ജ്യോതിഷസ്യാക്തമസ്സാൽ.”

എന്നു ശ്രീ ഭാസ്കരൻ വളരെ വ്യക്തമായിപ്പറയുന്നു. വേദാംഗജ്യോതിഷമെന്ന പുരാതനഗ്രന്ഥത്തിൽ ദിക്കാലദേശനിർണ്ണയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. വിശ്വവിശുദ്ധമായ ഭാരതീയജ്യോതിഷഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതുതന്നെയാണ്. പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനുള്ള മാതൃകയെ ചിന്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തെ Astronomy എ

നാ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ Astronomy എന്നതിനാ തുല്യമായി ജ്യോതിഷം എന്ന വാക്കും Astronomer എന്നതിനാ തുല്യമായി ജ്യോതിഷി എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിൽ കാര്യമായ ഉദ്ദേശ്യം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ചയെ വിശദമാക്കുകയാണ്. പൂർവ്വന്മാരുടെ ചിന്തകൾ തുടർന്നുപോകുക മാത്രമാണ് ആധുനികർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്നു പ്രാചീനാധുനികമെന്നോ പൗരസ്ത്യപാശ്ചാത്യമെന്നോ ഉള്ള ഭേദം കല്പിക്കുന്നതു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അന്നും ഇന്നും ഇവിടെയും അവിടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടേയും ചിന്തകളുടേയും സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സ്ഥായിയായി നില്ക്കുന്ന ഒരൈകരൂപ്യം അഭ്യേതാക്കൾക്കു കാണാവുന്നതാണ്. മറ്റു ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച കൊണ്ടു ഇന്നു നിരീക്ഷണസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു മാത്രമാണ് ഭേദം. അതിനാൽ നിരീക്ഷണഫലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതരങ്ങളാകുകയും ആ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ചിന്തകൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണക്കാർക്കു വായിക്കുവാൻ പറയുന്ന ഭാഷയിലും രീതിയിലും ഒരു ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥം മലയാളഭാഷയിലെഴുതി മദിരാശി സർവ്വകലാശാല നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിശോധകന്മാർക്കു തൃപ്തിയായാൽ അതിന്നു സമ്മാനം കൊടുക്കുമെന്നു 1950 ഒക്ടോബർ 3-ാം തീയതി സർവ്വകലാശാല പരസ്യം ചെയ്തു. പത്രം വഴി അതറിഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്തു ശ്രീ. കെ. കെ. ചാത്തുറച്ചൻ M. A; L. T. എന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിബ്ബന്ധിച്ചു വഴിക്കാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാനാരംഭിച്ചത്. സമ്മാനം കാംക്ഷിച്ച് സ്വപകീയമായ ചിന്താഗതിയിൽനിന്നോ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽനിന്നോ ഒട്ടും തന്നെ വ്യതിചലിക്കരുതെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു താക്കീത് കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാഥാസ്ഥിതികരായ ചില കേരളീയർ ഹിന്ദുജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില മിഥ്യാവാദങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്യാറുള്ളതു വായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്റെ പ്രതിപാദനം സർവ്വകലാശാലാപരിശോധകന്മാർക്കുകൂടി രുചിക്കാതെ വരുമോ എന്ന സംശയവും ഉണ്ടാവാതിരുന്നില്ല. സമ്മാനം എനിക്കു ലഭിച്ചു. അതു ഞാൻ എന്റേയും നാടിന്റേയും ഭാഗ്യമായിക്കരുതുന്നു. സർവ്വകലാശാലയോടും പരിശോധകന്മാരോടും എനിക്കുള്ള വിനീതമായ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ രേ

ഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. സത്താനും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിൽ സൈമൻ ന്യൂക്കോമ്പ്, സേർ റോബർട്ട് ബാര, എഡിങ്ടൻ, സേർ ജെയിംസ് ജിൻസ് എന്നീ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എഴുതിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും, ആയുർദ്രിഷ്ടി, സൂര്യസിദ്ധാന്തം, സിദ്ധാന്തശിരോമണി, പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക, കരണപദ്ധതി, യുക്തിഭാഷാ എന്നീ ഭാരതീയഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭൂവനകോശാദി പ്രതിപാദകങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളുമാണ് അധികം അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജ്യോതിഷം ഇന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാകയാൽ, പുതുതായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളും ചില പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിൽ ഇല്ലെന്നു വരാം. വിശിഷ്ട പരമാണശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം അടുത്ത കാലത്തു വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു സൂര്യന്റേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും അന്തർഗതത്തെ സ്ഥിതികളുടെ വിവരണങ്ങളും മറ്റും ഇന്നറിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ പൂർണ്ണമായില്ലെന്നു വരും. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തപരമായ സംഗതികളിലും ഈ വിധം ന്യൂനതയുണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാം കാലക്രമംകൊണ്ടു പരിഹരിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. എങ്കിലും നാം അധിവസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപം ഗ്രഹിപ്പാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽതന്നെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു പ്രേരണാശക്തിയുണ്ടെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളായി എനിക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ ചില ന്യൂനതകൾ അവിടവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണമായി Little Bear എന്ന നക്ഷത്രഗണത്തെ 'ലാലുബാലു' എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതു 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജയപുരത്തെ മഹാരാജാവായിരുന്ന ജയസിംഹനെ, ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി, അനുകരിച്ചതാണ്. ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവും എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതു ലാലുലല്ല എന്നോ, ലാലുലാലു എന്നോ, ലാലുലല്ലുകമെന്നോ, ലാലുലക്ഷം എന്നുതന്നെയുമാകുമായിരുന്നു. ഇതു ശ്രീ. പി. എസ്സ്. സുബ്ബരാമപട്ടരവർകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. 'മൃഗശീഷ്'ത്തെ 'മകീര'മാക്കി തന്മയത്വം നൽകിയ കൈരളിക്ക് 'ലാലുബാലു'വും സ്വീകാര്യമെന്നു സമാധാനിക്കുന്നു.

പുസ്തകം അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സദയം ഏറ്റെടുത്ത ശ്രീ. മംഗളോദയം കമ്പനിയോടും പ്രൂഫ് നോക്കിത്തന്ന സാഹിത്യനിപുണൻ സാഹിത്യശിരോമണി പള്ളക്കോട്ട് ശ്രീ. പി. എസ്സ്. സുബ്ബരാം പട്ടർ അവർകളോടും ഞാൻ വളരെ കൃതജ്ഞനാണ്.

പാവാർട്ടി,
1—6—1953.)

പി. കെ. കോരു

അദ്ധ്യായാനുകൂലനിക

ഭാഗം

മംഗളാചരണം

പൂ വൃ ഖ ണ ങ

1. ഉപക്രമം	1
2. നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ	8
3. ജ്യോതിസ്സുകളുടെ ദൈനിക ചലനം	39
4. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും	46
5. ആദിത്യന്റെ വാഷികസഞ്ചാരം	59
6. ചന്ദ്രന്റേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും സഞ്ചാരങ്ങൾ	76
7. പ്രാചീനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ	88

അ പ ര ഖ ണ ങ

1. ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ	123
2. ദൂരദർശിനിയും വിരാജനിയും	144
3. ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (തുടച്ചു)	157
4. സൗരവ്യൂഹം	185
5. നക്ഷത്രങ്ങൾ	222
6. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകലവും	
ആകാശഗംഗാസ്വരൂപവും	238
7. ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തം	249
8. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉജ്വലതയും വലിപ്പവും	259
9. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം	272
10. സൗരവ്യൂഹത്തിന്റേയും ശുക്ലപടലങ്ങളുടേയും	
ഉത്ഭവകാലം	280
സൂചിക	288

ജ്യോതിഷബാലബോധിനി

പു രു ഖ ണ ങ

നിധനലക്ഷണകളോ

൦൮൩൩൫൫൦

മംഗളാചരണം

വിശ്വത്തിലെങ്ങും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
വസ്തുക്കളേറെ മനോഹരം ചിന്തയം.
എന്നുമിവക്കൊക്കെക്കാരണമായിട്ടു—
മെന്നുമിവക്കൊക്കെയധാരമായിട്ടും
മേവുന്നതേതൊന്നോയായതിൻമുമ്പിൽ ഞാൻ
വീണ്ടു നമസ്സാരംചെയ്തു സവിസ്തയം.
വിജ്ഞാനധാസിയും ബന്ധുവുന്മേലും
അന്നന്നു കയ്യിൽ വരുന്ന ധനങ്ങളും
ശൂന്യമായ് മേവുന്നതേതിന്റെ മുമ്പിലോ
ഖണ്ഡിച്ചു കാണുവാനാവാത്തതേതൊന്നോ,
ആയതിൻ ഭാവുകഭാസകമെന്നോണം
കോലകാലങ്ങളിൽ തത്തിക്കളിച്ചിട്ടും
ചണ്ഡപ്രതാപമാം മാന്താഞ്ചലമഞ്ചലം
ശീതളചന്ദ്രിക തൂകും ശശിധരൻ
വ്യോമത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കും ക്ഷോഭികൾ
അന്ധത വിട്ടു പ്രകാശം പ്രവേശിപ്പാൻ
രാത്രിയിൽ മിന്നി വിളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ
മററും പലപല വ്യോമവിലാസങ്ങൾ
കൂട്ടത്തിൽ ഭൂമിയും കാലമാറ്റങ്ങളും
എന്നുതുടങ്ങിയ സദ്വിഷയങ്ങളിൽ
ധന്വരാം സൂരികൾ വിജ്ഞാനതൃഷ്ണയാൽ
ചിന്തിച്ചു ചിന്തകളേറെ മനോഹരം.
ആചാര്യവർഗ്ഗരിൽ ഭക്തിയോടിന്നു ഞാ—
നായവ തെല്ലൊന്നു ചൊല്ലാൻ തുനിയുന്നു
സത്തുക്കളെന്നുടയുദ്യമം സാദരം
സാഹചര്യം ചേരാനനുഗ്രഹം നല്ലതെ.

1. ഉപക്രമം

ജ്യോതിഷം ഗഹനമായ ഒരു ശാസ്ത്രമായിത്തീർന്നു ചരിത്രകാലത്തിനിടയിലാണെങ്കിലും, അതിനുള്ള വിജ്ഞാനശകലങ്ങൾ ആഹ്ലാദത്തോടും ആത്മയുത്തോടുംകൂടി മനുഷ്യൻ സമ്പാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തീർച്ചയായും ചരിത്രാതീതമാകുന്നു. വിശാലമായ പുൽപ്രദേശങ്ങളിൽ ആടുമാടുകളെ മേച്ചു നദീതീരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു വസിച്ചു കൃഷി ചെയ്തും വിശ്രമം നേടി രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആകാശം നോക്കി ആനന്ദിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് രാശിച്ചക്രത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രഗണങ്ങൾക്കു പേരിട്ടതെന്ന് ആടു, കാള, ഞണ്ടു, സിംഹം, കന്നിക, തേളു്, വില്ലാളി, മീൻ എന്നീ അവയുടെ പേരുകൾതന്നെ നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അനും ആ ജ്ഞാനശകലങ്ങൾ മനുഷ്യക്കു് ദീപ്തഭേദങ്ങളേയും കാലഭേദങ്ങളേയും അറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്തുവിനു 4000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈജിപ്റ്റിൽ പണിത പിരമിഡ് എന്ന ശവകുടീരങ്ങളും ഏതാണ്ട് ആ കാലങ്ങളിൽ ബാബിലോണിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പണിത ക്ഷേത്രങ്ങളും കൃത്യമായി കിഴക്കോട്ടുതന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജ്യോതിസ്സുകളുടെ സഞ്ചാരവിശേഷങ്ങൾ അറിയാത്തവക്കു് ഇതിന്നു സാധിക്കുന്നതല്ല. ക്രിസ്തുവിനു 3000 കൊല്ലം മുമ്പു രാശിച്ചക്രത്തെ 12 രാശികളായി ഭാഗിച്ചു് ആ രാശികളേയും അവയെക്കുറിക്കുന്ന നക്ഷത്രഗണങ്ങളേയും ഈജിപ്റ്റിലെ പുരോഹിതന്മാർ നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് എച്ച്. ജി. വെൽസ് പറയുന്നു (The Outlines of History). ക്രിസ്തുവിനു് 2100-ലധികം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന 'ഹീ' എന്നും 'ഹോ' എന്നും പേരുള്ള രണ്ടു ചിനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ

ഉദാസിനരായി, അന്നുണ്ടായ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഗണിച്ചു ചക്രവർത്തിയേയും ജനങ്ങളേയും അറിയിക്കാത്തതിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു ചീനക്കാരുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരായണാരംഭത്തിൽ യാഗം തുടങ്ങുവാൻ വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്ന ഭാരതത്തിലെ മഹാഷിമാർ ഉത്തരായണാരംഭത്തിൽ സൂര്യൻ അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലെന്നു തെത്തിരീയബ്രാഹ്മണത്തിലും, മദ്ധ്യത്തിലെന്നു മൈത്രേയാപനിഷത്തിലും, ആരംഭത്തിലെന്നു വേദാംഗജ്യോതിഷത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. ഈ കാലങ്ങൾ ക്രിസ്താബ്ദത്തിന്നു ക്രമേണ 2360, 1880, 1400 എന്നീ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്മാണ്.

ആരാണ് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് അവയെ ഗണങ്ങളായിത്തീരിച്ച് പേരിട്ടതെന്നും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഗതികൾ സൂക്ഷിച്ചു കണ്ട് കാലത്തെ സംവത്സരം, മാസം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാക്കിയതെന്നും, കാലഗണനയിൽ നക്ഷത്രം, തിഥി, ആഴ്ച എന്നീ വ്യവസ്ഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും നാം ചരിത്രഗവേഷകന്മാർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട സംഗതികളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

കാൽമായ ജ്യോതിഷസിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായതു ക്രിസ്താബ്ദം 168-ൽ മൃതനായ ടോളമിയെന്ന യവനപണ്ഡിതൻ നിർമ്മിച്ച ആത്മജെസ്റ്റ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതിലുള്ള മിക്ക സംഗതികളും ടോളമിയുടേയും മൂന്നു ശതാബ്ദം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഹിപ്പാർക്കസ്സ് എന്ന മഹാൻ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തവയാണത്രെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിരുന്നുവെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പാശ്ചാത്യർ ജ്യോതിർഗ്ഗണിതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന മന്ദശീഘ്രവൃത്തങ്ങളും ചന്ദ്രന്റെ ദ്വിതീയ സംസ്കാരവും മറ്റും ആത്മജെസ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയചാതുന്മാരായ ആയുർഭടൻ, വരാഹമിഹിരൻ, ബ്രഹ്മഗു

പ്ലൻ, ഭാസ്കരൻ എന്നിവരിൽ ഏറ്റവും ചെറുരാണികനായ ആർച്ച്ഡേൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർച്ച്ഡീയമെന്ന സിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥം ക്രിസ്തവർഷം 476-ലായിരുന്നു എഴുതിയത്. ഇതിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തം, സൂര്യസിദ്ധാന്തം എന്നിവകളിൽ പിന്നീടു പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയതായി നിരൂപകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഈ മഹാന്നാരെല്ലാവരും ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നു സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വ്യാസം ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി അളക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരുംതന്നെ ഭൂമി നിശ്ചലമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു. ഹിപ്പാർക്കസ്സിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന പൈതഗോറസ്സ് ഭൂമി സ്ഥിരമല്ലെന്നും അതിന്റെ ഭ്രമണംകൊണ്ടാണ് രാപ്പകലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അരിസ്റ്റാർക്കസ്സ് എന്ന മറ്റൊരു യവനപണ്ഡിതൻ ഭൂമി കാരോ സംവത്സരത്തിലും സൂര്യനു ചുറ്റും ഒരിക്കൽ സഞ്ചരിക്കുകയെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പ്ലാറ്റോവിന്റേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റേയും വാദങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി. 1473-ൽ പ്രഷ്യയിൽ തോൺ എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ച പൂരോഹിതനായി ജീവിച്ച കോപ്പർനിക്കസ്സാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പിന്നേയും ലോകസമക്ഷം ഉദ്ധരിച്ചത്. പിന്നീടു ഗലീലിയോ, കെപ്ലർ, ഇവരുടെ പരീക്ഷണനിരൂപണങ്ങളുടേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടേയും പ്രകാശത്തിൽ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സർവ്വരാലും സമ്മതിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിൽ പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കണമെന്നു കരുതുന്നു. ഭൂഭ്രമണസിദ്ധാന്തം ഭാരതീയക്കുറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ആർച്ച്ഡേൻറേയും വരാഹമിഹിരന്റേയും വചനങ്ങളിൽനിന്നു കാണാം. എന്നാൽ ആ ആചാര്യന്മാരായട്ടെ മറ്റു പ്രാമാണികന്മാരായട്ടെ അതു സ്വീകരിച്ചുവെന്നതിന്നു തെളിവുകൾ വേണ്ടുവോളമില്ല. [മാതൃഭൂമി (1935) ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകൾ. പുസ്തകം 13; ലക്കം W.

17, ഭാ 26, 27, 28—പുസ്തകം 13; ലക്കം W. 21, ഭാ 11, 12, 13, 14—പുസ്തകം 13; ലക്കം W. 22, ഭാ 31, 32, 33, 34 നോക്കുക.]

സൂര്യന്റെശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരകാകർഷണശീലം നാം അടിസ്ഥാനമാക്കി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും ക്ഷോദിഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഖഗോളസ്ഥാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള വിശിഷ്ടമാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുന്നതിലായിരുന്നു ജ്യോതിഷികളുടെ ശ്രദ്ധ. ഇതിൽ വിജയം നേടിയതു ലെവെറിയർ (1811-1877) എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. 1857-ൽ ഹാൻസൻ എന്ന മറ്റൊരു ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചന്ദ്രനെ കൃത്യമായി ഗണിപ്പാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തി. ഇവരുടെ ഗണിതപദ്ധതികളിൽ കണ്ടതായ ചില ന്യൂനതകൾ ശരിയാക്കിയത് അടുത്ത കാലംവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന സൈമൻ ബ്രൂക്കോമ്പ്, ജി. ഡബ്ല്യു. ഹിൽ, ഡബ്ല്യു. ബ്രൗൺ എന്നവരാണ്. ഇവരിൽ ബ്രൗൺ ചന്ദ്രഗണിതത്തേയും മറ്റേവർ ഗ്രഹഗണിതത്തേയും പൂർവ്വാധികം സൂക്ഷ്മമാക്കി.

1838-ൽ ബർലിനിൽവെച്ച് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലം അളന്നതുവരെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും, സ്ഥാനങ്ങളിൽതന്നെ അത്യല്പമായിക്കാണുന്ന ഭേദങ്ങളും മറ്റു ചില ചില്ലറ സംഗതികളുമെല്ലാതെ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ചോ, സ്ഥാനഭേദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ആരും ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശഗോളത്തിൽ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്ന കുറികൾ മാത്രമായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം തൊട്ടു ജ്യോതിഷികളുടെ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ നക്ഷത്രങ്ങളിന്മേലാവുകയും ജ്യോതിഷം എന്ന പേരുതന്നെ കൂടുതൽ അന്ധതയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ആ ശ്രദ്ധ ഇന്നും നിലനിന്നു വരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിന്റേയും അതിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താരങ്ങളുടേയും ചരിത്രം ഇന്ന് ഏതൊരുവ

നേയും വിസ്തൃതഭരിതനാക്കും. ഈ വിഷയം ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിൽ സ്പർശിക്കുമാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ജ്യോതിഷത്തിൽ ജിജ്ഞാസക്കളായവർക്ക് ചുരുക്കം ചില സാങ്കേതികശബ്ദങ്ങളെങ്കിലും അവശ്യം അറിയേണ്ടതാകുന്നു. അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ചില ശബ്ദങ്ങളെ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

ആകാശത്തെ ഒരുലംഗോളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് നാം കാണുന്നത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉദിച്ചസ്ഥിമിച്ചു കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമി അതിരില്ലാതെ പരന്നു കിടക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ തരമില്ല. അതിരോടുകൂടിയ ഈ ഭൂമിയുടെ പാശ്ചാത്യങ്ങളിലും താഴത്തും ആകാശം വ്യാപിച്ചിരിക്കണം. അതിനാൽ ആകാശത്തെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഥവാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു പൂണ്ണഗോളമായി കല്പിക്കാം. താഴത്തെ അർദ്ധം ഭൂമിയുടെ മറവുകൊണ്ട് നാം കാണുന്നില്ല. ഈ കാണാത്ത അർദ്ധത്തേയും കാണുന്നതിനേയും നാം നില്ക്കുന്ന സ്ഥാനം കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തം വേർതിരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. ഈ വൃത്തത്തെ പൂർവ്വന്മാർ ഹിഴിതിജം (Horizon) എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു നോക്കുന്നവർക്ക് ആകാശം പരന്ന ഭൂമിയെ ക്ഷിതിജത്തിൽ തൊടുന്നതായിത്തോന്നും. കിഴക്കു മുതലായ ദിക്കുകൾ ഈ വൃത്തത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ദീർഘകൂർ എന്നു പറയാറുണ്ട്. പൂണ്ണഗോളമായിക്കരുതുന്ന ആകാശത്തെ വശോളം (Celestial Sphere) എന്നു പറയുന്നു. വശോളത്തിൽ തലക്കുമീതെയുള്ള സ്ഥാനത്തെ വെർദ്ധ്യം (Zenith) എന്നു പറയുന്നു.

വശോളസ്ഥമായ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലോ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലോ ഉള്ള അന്തരാളങ്ങളെ വശോളത്തിലുള്ള വലിയ വൃത്തങ്ങൾ വഴി അളന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഒരു വൃത്തപരിധിയെ അസ്ത്രോമ്പും ലംബമായ രണ്ടു വ്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ അത് നാലു സമഭാഗമാകുന്നു. ഓരോ ഭാഗത്തിനും വൃത്ത

വാദം എന്നു പറയുന്നു. വൃത്തപാദത്തെ 90 സമഭാഗമാക്കി യാൽ ഓരോ ഭാഗത്തിന്നും ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അംശം (Degree) എന്നു പറയുന്നു. ഭാഗത്തിന്റെ അറുപതിൽ ഒരംശത്തിന്നു കല അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്ത (Minute) എന്നും, കലയുടെ അറുപതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്നു വികല അല്ലെങ്കിൽ വിലിപ്ത (Second) എന്നും പറയുന്നു.

$$60 \text{ വികല (60'')} = 1 \text{ കല}$$

$$60 \text{ കല (60')} = 1 \text{ ഭാഗം}$$

$$90 \text{ ഭാഗം (90°)} = 1 \text{ വൃത്തപാദം}$$

$$4 \text{ വൃത്തപാദം} = 1 \text{ വൃത്തം (ചക്രം, മണ്ഡലം)}$$

ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു ക്ഷിതിജത്തിലേക്ക് ഏതു വശത്തും ഒരു വൃത്തപാദം അകലമാണെന്നു കാണാം. ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റേയോ ഗ്രഹത്തിന്റേയോ ഖഗോളമാർഗ്ഗമായ അകലത്തിന് അതിന്റെ നന്തി (Depression) അഥവാ ഖമദ്ധ്യാന്തരം (Zenith Distance) എന്നു പറയുന്നു. നന്തിയാകുന്ന വൃത്തഭാഗത്തെ ക്ഷിതിജംവരെ നീട്ടിയാൽ ആ നീട്ടിയ ഭാഗത്തിന്നു നക്ഷത്രത്തിന്റേയോ ഗ്രഹത്തിന്റേയോ ഉന്നതി (Altitude) എന്നു പറയുന്നു. നന്തിയും ഉന്നതിയും ഒരേ വൃത്തത്തിലാകുന്നു. ഈ വൃത്തം ഖമദ്ധ്യത്തിൽ കൂടിപ്പോകുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ തലം ക്ഷിതിജവൃത്തതലത്തിന്നു ലംബ (Perpendicular)മായിരിക്കുമെന്നും കാണാം. ഈ വൃത്തത്തെ ദൃഗ് വൃത്തം (Vertical) എന്നു പറയുന്നു. ദൃഗ് വൃത്തം ക്ഷിതിജത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന സ്ഥാനംവരെ പൂർവ്വദിക്കിൽനിന്നോ പശ്ചിമദിക്കിൽനിന്നോ ഉള്ള അകലത്തെ നക്ഷത്രത്തിന്റേയോ ഗ്രഹത്തിന്റേയോ ദിക്ക് (Azimuth) എന്നു പറയുന്നു. നക്ഷത്രത്തേയോ ഗ്രഹത്തേയോ ഖഗോളത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥാനത്തെ അതിന്റെ ദിക്കുകൊണ്ടും ഉന്നതികൊണ്ടും ക്ലൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നു.

പൂർവ്വപശ്ചിമദിക്കുകളിൽ കൂടിയും ഖമദ്ധ്യത്തിൽ കൂടിയും കല്പിക്കുന്ന വൃത്തത്തെ സമമണ്ഡലം (Prime Vertical)

എന്നും ഉത്തരദക്ഷിണദിക്കുകളിൽ കൂടിയും ഖമലൂത്തിൽ കൂടിയും കല്പിക്കുന്ന വൃത്തത്തെ ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തം (Meridian) എന്നും പറയുന്നു. ക്ഷിതിജം, സമമണ്ഡലം, ദക്ഷിണോത്തരം ഇവ മൂന്നും കൂടി ഖഗോളത്തെ എട്ടു സമഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു. ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ കഥാലമെന്നു പറയാറുണ്ട്. ഇവയിൽ 4 കഥാലങ്ങൾ ക്ഷിതിജത്തിനു താഴെ ആശ്വമായും ഖാക്കി നാലും ക്ഷിതിജത്തിനു മീതെ ദൃശ്യമായും ഇരിക്കും. ക്ഷിതിജദക്ഷിണോത്തരസമമണ്ഡലങ്ങളെ ഖഗോളവൃത്തങ്ങളെന്നു പറയുന്നു. ഈ മൂന്നു ഖഗോളവൃത്തങ്ങളും ആറു സ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്യോന്യം മുറിയുന്നു. ഈ ആറു സ്ഥാനങ്ങളേയും സ്വസ്തികങ്ങൾ എന്നു പറയാറുണ്ട്.

ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ മണിക്കൂർ, മിനുട്ട്, സെക്കന്റ് ഇവ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയും. ദിവസത്തിന്റെ 60-ൽ ഒരു ഭാഗത്തിനു നാഴികയെന്നും നാഴികയുടെ 60-ൽ ഒരു ഭാഗത്തിനു വിനാഴികയെന്നും പറയുന്നു. ഗുരുവായ കരക്ഷരത്തെ ഉച്ചരിക്കുവാനുള്ള കാലത്തെ നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ ഗുർവ്വക്ഷരമെന്നും, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ശ്വാസം വലിച്ചു പുറത്തു വിടുവാനുള്ള കാലത്തെ ഉച്ഛ്വാസകാലം അഥവാ പ്രാണകാലമെന്നും പറഞ്ഞു. 10 ഗുർവ്വക്ഷരം കൂടിയാൽ ഒരു പ്രാണകാലമെന്നും 6 പ്രാണകാലം കൂടിയാൽ ഒരു വിനാഴികയെന്നുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രാണകാലംകൊണ്ട് ആകാശഗോളം ഒരു കല തിരിയുന്നു.

ജ്യോതിഷം അനുഭവത്തോടും ആസ്വാദനത്തോടുംകൂടി അറിയണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായ നക്ഷത്രങ്ങളെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിത്യം ഭൂമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിലെ സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളാകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഗ്രഹചാരങ്ങളേയും മറ്റും നോക്കി അറിയണമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ ഇനിയത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടറിവാനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറയുന്നു.

2. നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ.

ആകാശത്തിൽ നോക്കിയാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അസംഖ്യമെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ അവയെ എണ്ണിക്കണക്കാക്കിയാൽ വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവുന്നവയുടെ എണ്ണം 6000ത്തിൽ അധികമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഭൂദർശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവയുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് അവയിൽകൂടിക്കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിരില്ലാതെ വലിക്കും. കാലിഫോർണിയയിൽ മൌണ്ട് വിൽസൺ കുന്നിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും 100 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ളതും ആയ ഭൂദർശിനിയിൽകൂടി ആ കാശത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അതിൽ കണ്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ 150 കോടിയാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരുവിധം ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ 500 ലധികമില്ല. ഇവ ആകാശത്തിൽ അങ്ങമിങ്ങം വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായിത്തോന്നും. കുറെ കാലം ഇവയെ നോക്കിയാൽ അടുത്തുള്ള കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടി ഒരു മൃഗത്തിന്റേയോ, സ്പ്പത്തിന്റേയോ, നദിയുടേയോ, മനുഷ്യന്റേയോ, ത്രികോണാദിക്ഷേത്രങ്ങളുടേയോ ആകൃതിയിൽ കണ്ടു എന്നു വരാം. ഭാവനയിൽ അവയെ ചില രേഖകളെക്കൊണ്ടു ചേർക്കേണ്ടിവരും. ഇങ്ങിനെ പലവിധ രൂപങ്ങളായി മനസ്സിൽ നിർത്തിപ്പറന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയാകുന്നു ഗണങ്ങൾ (Constellations) എന്നു പറയുന്നത്. ശോഭക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്നിലുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ 1, 2, 3 * മുത

* എണ്ണങ്ങൾക്കു പകരം പാശ്ചാത്യർ ആർക്കോ, ബീറ്റാ, ഗാമാ മുതലായ യവനഭാഷാബിഹികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലായ എണ്ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാലാനുരത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശോഭക്കു മാറ്റം വരാറുണ്ട്. അതിനാൽ ചില ഗണങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമെന്നു പറഞ്ഞുവന്നിട്ടുള്ളത് അവശ്യം ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളതായിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങിനെ നാം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ ഗണങ്ങളായിത്തീരിച്ച് പേരുകളോടുകൂടി മനസ്സിൽ നിർത്തുവാൻ ഏവക്കും സാധിക്കും. അതോടുകൂടി ആകാശമണ്ഡലം പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും പലപ്പോഴായിക്കാണുന്ന ധൂമകേതുക്കളുടേയും ഖഗോളസ്ഥിതി കണ്ടതു മനസ്സിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളായി അല്ലെങ്കിലും പരിചയമാവാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ പ്രധാനമായ ചില ഗണങ്ങളെയെങ്കിലും താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെപ്പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഉദിച്ചുനൂമിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഒരുപോലെയായിരിക്കയില്ല. ജനവരിമാസം അസ്തമനസമയത്തു കിഴക്കായിക്കാണുന്ന തിരുവാതിര മേയിമാസം അസ്തമനസമയത്തു പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലുംതന്നെ വായനക്കാർ ആകാശം നോക്കി നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണേണ്ടതാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളെ പരിചയമായവക്ക് ഈ നിബന്ധന ബാധകവുമല്ല. ആകാശത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദേശഭേദവുമുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഏതു സ്ഥലത്തും ഒരേ കാലത്തും സമയത്തും ഖഗോളസ്ഥിതി ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയിരിക്കും. മദ്ധ്യകേരളത്തിൽനിന്നു കാണുന്നപോലെയായിരിക്കും താഴെ വിവരിക്കുന്നത്.

ഡിസമ്പ്ര് 3-ാമത്തെ ആഴ്ച അസ്തമിച്ച് 9 മണിക്കോ, ജനവരി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച 8 മണിക്കോ, ജനവരി 3-ാമത്തെ ആഴ്ച 7 മണിക്കോ കിഴക്കോട്ടു നോക്കിയാൽ, കിഴക്കുനിന്ന് അല്പം തെക്കോട്ടു മാറി ഏതാണ്ട് 40 ഭാഗം ഉയരത്തായി പരിലേ

വത്തിൽ കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം. ഇവയിൽ താഴെത്തു വടക്കേതു ചുവന്നിരിക്കും. ഇതാകുന്നു തിരുവാതിരയെന്ന നക്ഷത്രം. മീനെ തെക്കേത് അല്ലും നീലനിറമുള്ളതായിരിക്കും. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രം



പരിലേഖം 1

അതാകുന്നു. കൂട്ടത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെല്ലാംകൂടി ശബരഗണന (Orion) എന്നു പറയുന്നു. ശബര 1ഉം 2ഉം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലായി ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ശോഭയുള്ള 3 നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നവയെ ഭാരതീയർ 'ത്രിമുത്തികൾ' എന്നും പാശ്ചാത്യർ 'കറയന്റെ ബെൽറ്റ്' എന്നും പറയുന്നു. മൂന്നും കൂടിയ വര ഏതാണ്ട് $1\frac{1}{2}$ ഫുട്ട് നീളമുണ്ടെന്നു തോന്നും. ഇതു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. കാരോരുത്തർക്കും കാരോ വിധം തോന്നിയെന്നു വന്നേക്കാം. രണ്ടുറത്തേയും നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് $2\frac{1}{2}$ ഭാഗം, എന്നുവെച്ചാൽ രവിബിംബവ്യാസത്തിന്റെ 5 മടങ്ങ്, അകലമുണ്ട്. 1ഉം 7ഉം തമ്മിലുള്ള അകലം 17 ഭാഗവും, 2ഉം 7ഉം തമ്മിലുള്ളതു 9 ഭാഗവുമാകുന്നു. ഇതു മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം സുമാർ കണക്കാക്കുവാൻ ഉപയോഗമാകും. ഗണത്തിലെ 1ഉം 3ഉം നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർന്ന രേഖയുടെ വടക്കു കാണുന്ന മൂന്നു ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടിയ ഉപഗണത്തിനു


മകീരം എന്നു പറയുന്നു. ത്രിമുന്തികളുടെ തെക്കുഭാഗത്തു ഒരമ്പുപോലെ കാണുന്ന മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടുവിലേത് ഒരു പ്രത്യേകപ്രകാശത്തിൽ പെട്ടതായിത്തോന്നും. ഈ വക പ്രകാശങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ദൂരദർശിനികളിൽ കൂടിക്കാണാം.

ത്രിമുന്തികളെ ചേർക്കുന്ന രേഖ കീഴ്പ്പോട്ടു സുമാർ 20° നീട്ടിയാൽ നീല നിറത്തിൽ വളരെ ശോഭയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തും. ഇതാകുന്നു ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളതായി നമുക്കു കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ ചിലർ റുദ്രൻ എന്നും, സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൃണ്യകൻ എന്നും, ഇംഗ്ലീഷിൽ സൈരിയസ്സ് (Sirius) എന്നും പറയുന്നു. ഇതിന്റെ താഴത്തായി ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 3 നക്ഷത്രങ്ങളും, ഇതും, ഇതിന്റെ മീതെക്കാണുന്ന ഒരു നക്ഷത്രവും ചേർന്നാൽ, ബൃഹദ്ഗുപാന (Canis Major) ഗണത്തിലെ പ്രധാനനക്ഷത്രങ്ങളായി. ഈ ഭാഗം ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനികൊണ്ടു നോക്കുന്നതു രസാവഹമാകുന്നു.

ഈ സമയത്തു തെക്കുകിഴക്ക് ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്ന് അധികം ഉയരത്തല്ലാതെ കാണുന്ന ശുഭ്രനക്ഷത്രമാകുന്നു അഗസ്ത്വൻ (Canopus). ഏതാണ്ടു നേർ തെക്കു കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തെ അക്കർനാർ (Achernar) എന്നും കുറെ കൂടി പടിഞ്ഞാറുമാറിക്കാണുന്നതിനെ ഫോമൽ (Fomalhot) എന്നും പറയുന്നു. ഫോമൽ ദക്ഷിണമീനം (Pisces Australis) എന്ന ഗണത്തിലെ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമാകുന്നു. അക്കർനാർ നക്ഷത്രത്തെ നട്ടുന്തകം എന്നും പറയുന്നു. ഈ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളത് അഗസ്ത്വനും, പിന്നത്തേതു അക്കർനാറും ആകുന്നു.

ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടതിന്റെ അടുത്തു ദിവസം ശബരഗണം അതേ ഉന്നതിയിൽ നില്ക്കുന്ന സമയത്തു തിരുവാ

തിരയെ നോക്കുക. അതിന്റെ നേർ വടക്കായി ഒരു വിധം ശോഭയുള്ള രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണാം. പരിലേഖത്തിൽ ഇവക്ക് 6, 2 എന്നീ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ മീതെയായി തിരുവാതിരപോലെത്തന്നെ ചുവന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെക്കാണാം. ഇതു രോഹിണി (Hyades) എന്ന ഉപഗണത്തി



പരിലേഖം 2

ലെ പ്രധാനനക്ഷത്രമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്രമായും രോഹിണിയെന്നു പറയും. ഇതിന്നു ബ്രഹ്മഷി (Aldebaran) എന്നുകൂടിപ്പേരുണ്ട്. രോഹിണിയിൽ ബ്രഹ്മഷി കൂടാ

തെ 3, 4, 5 എന്നുകുറിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളും 1നും 3നും ഇടയിലുള്ളവയും പെടും. രോഹിണിയുടെ മുകളിലായി അല്പം വടക്കോട്ടു നീങ്ങി അടുത്തടുത്തുള്ള ആറോ ഏഴോ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങി പ്രത്യേകശോഭയോടെ തിളങ്ങുന്ന കൂട്ടമാകുന്നു ക്വാന്റിക്സ് (Pleiades) എന്ന ഉപഗണം. ആദ്യം പറഞ്ഞ 6ഉം 2ഉം ക്വാന്റികളും രോഹിണിയും അവയുടെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി കാണുന്ന ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി ജിഷ്ട (ഇടവം, Taurus) നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു.

ഇടവം 2ഉം അതിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള 4 വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടിയ ഒരു പഞ്ചഭുജക്ഷേത്രത്തെക്കാണാം. ഈ നാലു വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളും അവക്കടുത്ത ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി പ്രാജിത (Auriga) എന്ന നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രത്തെ ഷഡാസ്യൻ (Capella) എന്നു പറയാറുണ്ട്. ഷഡാസ്യന്റെ മീതെയായി 3 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു സമപാശ്ചാത്യത്രികോണത്തെയും കാണാം. ആകാശം വളരെ പരിപാലമില്ലാത്തവർക്ക് ഷഡാസ്യനെ തിരിച്ചറിവാൻ ഇവ വളരെ ഉപയോഗമായിത്തീരുന്നു.

ഈ സമയത്തു പടിഞ്ഞാറോട്ടു നോക്കിയാൽ, നേർ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് അല്പം വടക്കോട്ടു മാറി സുമാർ 40 ഭാഗം ഉന്നതിയിൽ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ മീതെയായി അവയെപ്പോലെത്തന്നെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി ഏതാണ്ട് ഒരു സമചതുരത്തെക്കാണാം. ഈ നാലു നക്ഷത്രങ്ങളേയുംകൂടി ഭാദ്രപദചതുഷ്കോണ (Square of Pegasus) എന്നു പറയുന്നു. താഴത്തെ രണ്ടെണ്ണംകൂടി പൂരോരുട്ടാതിയും, മീതത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉരുട്ടാതിയും ആകുന്നു. പൂരോരുട്ടാതിയിലെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളേയും ചേർന്ന രേഖയെ വടക്കോട്ടു ആ രേഖയുടെ 4½ മടങ്ങ് നീട്ടിയാൽ നേർ വടക്ക് ക്ഷിതിജ

ലും, അതു നക്ഷത്രമല്ല. ഭൂദേശിനിയിൽകൂടി അത് ഒരു ചെറിയ മേഘഖണ്ഡമായിത്തോന്നും. അത് ഒരു ശുക്ലപടലമാകുന്നു.

മിരാഡ 1ൽനിന്നു വടക്കോട്ടു ചാഞ്ഞുപോകുന്ന വളഞ്ഞ രേഖയെ ആ വഴിക്കു നീട്ടിയാൽ വളരെ ശോഭയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തും. ഇതു വരാസവസ്സ് (Perseus) നക്ഷത്രഗണത്തിലെ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമാകുന്നു. ഇതിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു കാണുന്ന അനവധി ചെറു നക്ഷത്രങ്ങളും ഇതിന്റേയും കാത്തികയുടേയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും വരാസവസ്സ് ഗണത്തിൽ പെട്ടവയാകുന്നു. മിരാഡ 3ന്റേയും വരാസവസ്സ് 5ന്റേയും മദ്ധ്യത്തിലായിക്കാണുന്ന നക്ഷത്രം വരാസവസ്സ് 2 എന്നതാകുന്നു. ഇതിനെ ആറാഗോൾ (Algol) എന്നുകൂടിപ്പറയുന്നു. ഇത് ഒരു ക്ഷയോപചയതാരമാകുന്നു. 59 മണിക്കൂറിനിടയിൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ശോഭ ക്രമേണ മങ്ങി പിന്നേയും വലുതാകുന്നു.

മിരാഡ 3ന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ ഒരു സമപാശ്ചാത്രികോണം കാണുന്നതു ത്രികോണമൂർത്തി (Triangulum) എന്ന നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു. അതിന്റേയും തെക്ക് 2 ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും പടിഞ്ഞാറേതിന്റെ അടുത്ത് അത്രതന്നെ ശോഭയില്ലാത്ത മറ്റൊരു നക്ഷത്രവും കൂടി അശ്വതി എന്ന ഉപഗണമാകുന്നു. അശ്വതിയുടേയും വരാസവസ്സ് 5 ന്റേയും ഇടയിലായി നന്നെ ചെറിയ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾകൂടി ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നതു ഭരണി ഗണമാകുന്നു. അശ്വതിയും ഭരണിയും ഭരണിയുടേയും കാത്തികയുടേയും ഇടയിൽക്കാണുന്ന 2 നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി മേഷ് (മേടം-Aries) നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു.


മിരാഡ 4, 2 എന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കൂടികിടക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാല കാണുന്നതിനെ കേരളീയർ 'എരിഞ്ഞിമാലപോ

ലെ' എന്നു വിവരിക്കുന്നു. അവർ ഇതിനെ രേവതിയെന്നു പറയുന്നു. സൂര്യസിദ്ധാന്താദിഗ്രന്ഥങ്ങൾപ്രകാരം മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാകുന്നു രേവതി. അതു പറയാം. ഭാദ്രപദമുഷ്ണത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തു മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാല കാണാം. ഈ രണ്ടു നക്ഷത്രമാലകളിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന രണ്ടു മങ്ങിയ വരി നക്ഷത്രങ്ങൾ തെക്കുഭാഗത്ത് ഒരു പക്ഷിയുടെ കൊക്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു മങ്ങിയ നക്ഷത്രത്തിൽ ചേരുന്നു. ഈ രണ്ടു വരികളും ഭാദ്രപദങ്ങളുടെ തെക്കുള്ള നക്ഷത്രമാലയും കൂടി മീനം (Pisces) നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു. രണ്ടു വരികളും പക്ഷി മുഖാകൃതിയിൽ ചേരുന്ന നക്ഷത്രം മീനം 1 ആകുന്നു. സൂര്യസിദ്ധാന്തപ്രകാരമുള്ള രേവതി മീനം 6 (Pisces) ആകുന്നു. ഇതു ഭാദ്രപദമുഷ്ണത്തിന്റെ തെക്കുള്ള നക്ഷത്രമാലയിൽനിന്നു വരുന്ന വരിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഭാദ്രപദങ്ങളുടെ കിഴക്കുള്ള നക്ഷത്രമാല കൂടിച്ചേരുന്ന മീനം 22 എന്ന നക്ഷത്രത്തിലേക്കു മിഥുനം 2ൽനിന്നു വരുന്ന രേഖ നീട്ടിയാൽ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ കൂടിപ്പോകും. അശ്വതിയിലെ ശോഭയുള്ള രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന രേഖ പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീട്ടിയാൽ ഇതിന്റെ അല്പം പടിഞ്ഞാറായിപ്പോകും. സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമായ ക്രാന്തിമണ്ഡലത്തിൽ രേവതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിന്നു പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ഉത്രട്ടതി, രേവതി, അശ്വതി, ഭരണി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തെക്കുഭാഗത്തു കാണുന്നവയും ഒരുവിധം ശോഭയുള്ളവയും ആയ നക്ഷത്രങ്ങളെ കേതവസ്സ് (Cetus) നക്ഷത്രഗണമെന്നു പറയുന്നു. ഇവയിൽ മീനനക്ഷത്രവരികൾ പക്ഷിമുഖാകൃതിയിൽ ചേരുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്നു നേരെ കാണുന്നതു വിചിത്രം (Mira) എന്നു കൂടിപ്പറയുന്ന കേതവസ്സ് 15 (Cetus) എന്ന നക്ഷത്രമാകുന്നു. ഇതിനെ അടുപ്പിച്ച് കുറെ കാലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രഭ പെട്ടെന്നു വലിക്കുന്നതും പിന്നീടു പതുക്കെ കുറഞ്ഞുവരുന്നതും കാണാം.

ഈ സമയത്തു നേർ വടക്കുനിന്ന് അല്പം പടിഞ്ഞാറോട്ടു മാറി ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു 40° ഉയരത്തായി ഇംഗ്ലീഷ് M എന്ന അക്ഷരം പരത്തി എഴുതിയതുപോലെ കാണുന്നതു ജാതുൽ ക്സരാസി (ജാതുൽ Cassiopeia) എന്ന ഗണമാകുന്നു. ഇവ ക്രമേണ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു ജാതുൽ 2, 1, 3, 4, 5 എന്നവയാകുന്നു. ജാതുൽ 4, 5 വരാസവസ്സ് 1 ഇവയുടെ ഇടയിൽ ഒരു വെളുത്ത നിറം കാണുന്നതു രണ്ടു ഭൂപടങ്ങൾ (ഭൂ=നക്ഷത്രം, ച=രം=കൂട്ടം) അടുത്തു കിടക്കുന്നവയാകുന്നു.

ഇതുവരെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുവാൻ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർകൂടിക്കഴിഞ്ഞു ആകാശം നോക്കിയാൽ, നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം മുമ്പു കണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു കുറെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു മാറിയിരിക്കും. തുറൻ കിഴക്കുനിന്നു സമാന്തരമായി 20° തെക്കു മാറി 35ൽ അധികം ഭാഗം ഉന്നതിയിൽ എത്തിയിരിക്കും. ഭാദ്രപദചതുഷ്ഠത്തെ ഏതാണ്ട് 30° ഭാഗം ഉയരത്തായി പടിഞ്ഞാറു കാണാം. ഈ സമയത്തു തിരുവാതിരയുടെ താഴെ അല്പം വടക്കോട്ടു മാറി രണ്ടു വരിയായി കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണാം. ഈ രണ്ടു വരികളും മുകളിലേക്കു നീട്ടിയാൽ മകീരം അവയുടെ ഇടയിൽപ്പെടും. ഈ രണ്ടു വരികളിലും താഴെത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ ശോഭയുള്ളവയാകുന്നു. ഇവയെ അശ്വിനീദേവകൾ എന്നു പറയുന്നു. ഇവയിൽ വടക്കേതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാസ്റ്റർ എന്നും തെക്കേതിനെ പോളക്സ് എന്നും പറയും. ഇവ രണ്ടും ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 25° ഭാഗത്തിലധികം ഉന്നതിയിലായിരിക്കും. രണ്ടു വരികളിലും കൂടി കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി മിഥുന (Gemini) നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു. അശ്വിനീദേവകളുടെ തെക്കുനല്ല ശോഭയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം കാണുന്നതു പ്രോസിയോൺ എന്ന നക്ഷത്രമാകുന്നു. ഈനക്ഷത്രവും അതിന്റെ മീതെ കാണുന്ന ചെറിയ നക്ഷത്രവുംകൂടി ലഘുശ്വാനം (Canis minor) എന്ന ഗണത്തിലെ പ്രധാനനക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു. അശ്വിനീദേവ




ചരിലേഖം 4

കുളം, പ്രോസിയോണും അതിന്റെ മീതെയുള്ള നക്ഷത്രവും, കൂടും അതിന്റെ മീതെയുള്ളതും കൂടിയ കൂട്ടത്തെ പുണർതം എന്നു പറയുന്നു. പുണർതം പൂർണ്ണോണിപോലെയെന്നു പറയുന്നതു വാസ്തവമെന്നു കാണാം.

ഇതുവരെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയത് അസ്തമിച്ച് 7 മണി മുതൽ 10 മണിവരെയായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇതേ സമയത്തുതന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചാറു മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ ഫിബ്രുവരി ഒന്നാമ

ത്തെ ആഴ്ച പുലരുന്നതിനുമുമ്പ് 5 മണിക്ക് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ രാത്രി 9 മണിക്കും, ജൂലായി മാസത്തിൽ 7 മണിക്കും ഈ സ്ഥിതിയിൽത്തന്നെയായിരിക്കും ഖഗോളം.

ഈ സമയത്തു പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് അശ്വിനീദേവകളും പ്രാസിധോണും അസ്തമിക്കുവാൻ പോകുന്നതായിക്കാണാം.




ആകാശം നിമ്ബലമാണെങ്കിൽ തുറൻ തെക്കുപടിഞ്ഞാറു ക്ഷിതി ജ്ഞെ തൊട്ടുനില്ക്കുന്നതു കാണാം. നേർ വടക്ക് ക്ഷിതിജ്ഞതിൽനിന്നു 45 ഭാഗം ഉയരത്തായിക്കാണുന്ന 7 വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ സപ്തഷികളാകുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ അറ്റം മുതൽ കിഴക്കെ അറ്റംവരെ ഇവയുടെ പേര് ക്രമം, പുലഹൻ, പുലസ്കൻ, അത്രി, അംഗിരസ്സ്, വസിഷ്ഠൻ, മരീചി എന്നാകുന്നു. പുലഹനേയും ക്രമവേയും ചേർക്കുന്ന രേഖ സൂര്യൻ അതിന്റെ 8 മടങ്ങ് അതേ വഴിക്ക് നീട്ടിയാൽ ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിൽ ചെല്ലും. സപ്തഷികൾ 4, 5, 6, 7 ഇവയെ ചേർക്കുന്ന വളഞ്ഞ രേഖ ആ വഴിക്ക് 28 ഭാഗം നീട്ടിയാൽ ഒരു വലിയ നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തും. ഇതു ചുവന്നിരിക്കും. ഇതാകുന്നു ചോതി (Arcturus). “ചോതി ചോരത്തുള്ളിപോലെ”. ചോതി ഈ സമയത്തു ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു 25 ഭാഗം അകലെയായിരിക്കും. ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തത്തിന്റെ അല്പം പടിഞ്ഞാറായിക്കാണുന്ന അനവധി ചെറുനക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിന്നു സീതാവേണി (Coma Bernices) എന്നു പേർ പറയുന്നു. സപ്തഷികളും പരിലേഖത്തിൽ രേഖകളെക്കൊണ്ടു കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി സപ്തഷിമണ്ഡലം (Ursa Major-Great bear) എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

വസിഷ്ഠന്റെ അരികത്തു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രം അരുന്ധതിയാകുന്നു. മൂന്നിഞ്ചു വ്യാസമുള്ള ഓരോർത്തിരിയിൽകൂടി വസിഷ്ഠനെത്തന്നെ രണ്ടായി കാണാം. വസിഷ്ഠൻ അതിനാൽ ഒരു ഇരട്ടനക്ഷത്രമാകുന്നു. ചിത്രത്തിൽ 14 എന്നടയാളംവെച്ച നക്ഷത്രവും ഇരട്ടയാകുന്നു. ഇവ അന്യോന്യം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആകർഷണംകൊണ്ടു ബലപ്പെട്ട് അടുത്തുനിന്ന് അന്യോന്യം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഇരട്ടനക്ഷത്രങ്ങളെ ദ്വന്ദ്വതാരങ്ങൾ (Binary Stars) എന്നു പറയും. എല്ലാ ഇരട്ടകളും

പേരുള്ളല്ല. ഏതാണ്ട് ഒരു ദിക്കിൽ നില്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവ അടുത്തുകാണുന്നവയാവാം.

ഇനി ചോതിക്കു നേരെ വടക്കുകിഴക്കോട്ടു നോക്കുക. ചോ




പരിലേഖം 6

തിരുടെ താഴെ വഴിക്കുവഴി അവൂപുരുഷൻ (Bootes), കിരീടമണ്ഡലം (Corona Borealis), ജാസി (Hercules) എന്നീ ഗണങ്ങളെ പരിലേഖത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആകാശത്തിൽ കണ്ടറിവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വഴിക്കു താഴെ ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു 20 ഭാഗം ഉയരത്തായി നീലിമയോടുകൂടി മനോഹരമായി പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രം സൂര്യസിദ്ധമായ അഭിജിത്ത് (Vega) ആകുന്നു. ജാസിഗണം കിരീടമണ്ഡലത്തിന്റേയും അഭിജിത്തിന്റേയും ശരിക്കു് നടുവിലായിരിക്കും.

ചോതി ഒരു ഇരട്ടനക്ഷത്രമാകുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 5 വികലയോളം അകലമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ ദൂരദർശി

നി കൂടാതെ ഇവയെ വേർതിരിച്ചു കണ്ടുകൂടാ. അപ്പുപുരുഷൻ 5 ഇരട്ടയാകുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ $2\frac{1}{2}$ വികലമാത്രം അകലത്താണെങ്കിലും ചെറിയ ഭൂരശ്മിനിയിൽകൂടിയും വേറിട്ടു കാണാം. അപ്പുപുരുഷൻ 12 ഒരു ദന്ധപതാരമാകുന്നു. ഭാഗതാരങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം $108\frac{1}{2}$ വികലയായതിനാൽ ഇവയെ വേർതിരിഞ്ഞു കാണുവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല. ജാസി നം 7നും നടുവിലായി ഒരു ഗോളഭചയമുണ്ട്. ഗോളഭചയം എന്നത് അന്യോന്യം ബന്ധമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗോളരൂപമായ ഒരു



വരിലേഖം 7


സമൂഹമാകുന്നു. നല്ല ഒരു നുള്ളു കടക് എടുത്തു വിരിച്ച ഒരു തോത്തുമുണ്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് ഉയരത്തുനിന്നു താഴത്തിട്ടാൽ കടക് കിടക്കുന്ന ആകൃതിയിലായിരിക്കും മിക്ക ഗോളഭചയങ്ങളേയും ഭൂരശ്മിനികളിൽ കൂടി കാണുക. കാത്തിക നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തെക്കുറേക്കൂടി അകലത്തു കാണുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു ഗോളഭചയമായിത്തോന്നാം.

ഇനി കിഴക്കുനിന്നു പതിനഞ്ചിരപതു ഭാഗം തെക്കുമാറി നോക്കുക. തല പൊക്കി, വാൽ വളച്ച് പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു രേഖിന്റെ ആകൃതിയിൽ വൃശ്ചിക (Scorpio) ഗണത്തെ കാ

ണം. വാല് ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു 12 ഭാഗത്തോളം ഉയരത്തായിരിക്കും. ഇതിന്റെ മീതെയുള്ള അഞ്ചു നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി അനിഴവും നടുക്കുള്ള മൂന്നും തൃക്കേട്ടയും ബാക്കിയെല്ലാം മൂലവുമാകുന്നു. തൃക്കേട്ടയിൽ വലിയ നക്ഷത്രം ചുവന്നിരിക്കും. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അൻറാരസ്സ് എന്നു പറയുന്നു.

വൃശ്ചികത്തിന്റെ മീതെയായി തോരണം തുക്കുവാൻ ബന്ധിച്ച വാരികളുടെ ആകൃതിയിൽ 4 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നവയാകുന്നു വിശാഖം. ഈ നാലും താഴെ കാണുന്ന ചില ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടിയാകുന്നു തുലാം (Libra) നക്ഷത്രഗണം. വടക്ക് കിരീടമണ്ഡലം തൊട്ടു തെക്കു വൃശ്ചികഗണംവരെ കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്പ്യാഗണവും (Serpent), സ്പ്യാഗണവും (Ophiacas-The Serpent bearer) ആകുന്നു. ഖഗരാട് (14-ാം പരിലേഖം നോക്കുക), ജാസി, തുലാം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട ഈ നക്ഷത്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ആകാശഭാഗത്തു കാണുന്ന എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും സ്പ്യാഗണത്തിൽപ്പെടും.

ഇനി തെക്കോട്ടു നോക്കുക. നേർ തെക്കുനിന്ന് അല്പം കിഴക്കോട്ടു നീങ്ങി ഒരു സ്വസ്തിക (Cross) ത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽക്കാണുന്ന വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു ത്രിശങ്ക (Southern Cross) ഗണം. ത്രിശങ്കവിന്റെ കിഴക്കായി രണ്ടു വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണാം. ഇതിൽ വലിയതു കിനാരവസ്സ് 1 (2 Centaurus) ആകുന്നു. കിനാരവസ്സിലെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ പരിലേഖത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ദിന്റെ താഴെക്കാണുന്ന മൂന്നു ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളേയും ത്രിശങ്കവിന്റെ മീതെക്കാണുന്ന നീണ്ട ത്രികോണത്തേയും പ്രത്യേകം നോക്കി തെറ്റുകൂടാതെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം. കിനാരവസ്സിന്റെ കിഴക്കു കാണിച്ചിട്ടുള്ള 6 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വൂകം (Wolf) എന്ന ഗണമാകുന്നു. കിനാരവസ്സിൽനിന്നു തെക്കോട്ടു മാറി കുറേക്കൂടി മീതെയായിക്കാണുന്ന 5 നക്ഷ



പരിഭേഖ 8

അഥ അത്തം (Corvus) എന്ന ഗണമാകുന്നു. ഈ സമയത്തു, അതായതു ഫിബ്രവരി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കാലത്തു 5 മണിക്ക് അത്തം നേർ തെക്കായിരിക്കും. ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു 55 ഭാഗം ഉയരത്തുമായിരിക്കും.

കിനാരവസ്സ് 1 ഒരു ദ്വന്ദ്വനക്ഷത്രമാകുന്നു. 57 സംവത്സരത്തിൽ അതിലെ രണ്ടു താരങ്ങളും അന്യോന്യം പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കും. ഇവ നമുക്കു വളരെ അടുത്തവയാകുന്നു. ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി അടുത്തുനില്ക്കുന്ന വലിയ രണ്ടു താരങ്ങളായി ഇവയെ ഭംഗിയിൽക്കാണാം. ഇവയുടെ വളരെ അടുത്തു വലിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി മാത്രം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാകുന്നു നമുക്ക് ഏറവും അടുത്തത്. അതിന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രോക്സിമ സെന്റോറി (Proxima Centauri, പ്രത്യാസന്ന കിനാരവസ്സ്) എന്നു പറയും.


ഫിബ്രവരി മാസത്തിൽതന്നെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളേയും കണ്ടു
 റിയണമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ, രാത്രി വളരെ നേരം ഉണന്നിരി
 കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ ഈ മാസത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാ
 ലം മനസ്സിലായ നക്ഷത്രങ്ങളെത്തന്നെ നോക്കി ആകാശം ക
 നുകൂടി പരിചയപ്പെടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.
 ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുന്നതിന്നിടയിൽ ഇവിടെ പറയാത്ത
 തും പറയുവാൻമാത്രം ശോഭയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതും ആയ ചി
 ല ജ്യോതിസ്സുകളെ ഇവയുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവെന്നു വരാം. അവ
 നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ മിന്നിമിന്നിയിരിക്കയില്ല. അവയു
 ടെ പ്രകാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന വിളക്കിന്റേതുപോലെയിരിക്കും;
 മിന്നുകയില്ല. ഇങ്ങിനെ കാണുന്ന ജ്യോതിസ്സുകളെ അടുത്തടു
 ത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കുകയും അതോടുകൂടി അടുത്തുള്ള താര
 ങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അകലം നോക്കിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ അവ
 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതായിക്കാണാം.
 അതുകൂടിക്കണ്ടാൽ അവ പ്രോഥമാരികളായ ഗ്രഹങ്ങളെ
 നു തീർച്ചപ്പെടുത്താം. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള വശോ
 ഉസ്ഥിതിക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആകാശത്തിന്റെ നിത്യഭ്രമ
 ണവും കണ്ടുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ചന്ദ്രന്റെ ആകാശസ
 ഞ്ചാരവും നോക്കിക്കാണുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം.
 പക്ഷെ അതിന്നു ചന്ദ്രനെ വളരെ ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
 അടുത്തായി കിട്ടണം. അങ്ങിനെ കിട്ടിയാൽ രാത്രി 8 മണി
 ക്ക് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള ചന്ദ്രനെ പുലർന്നു
 തിന്നു മുറുത്തെന്ന ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ കിഴക്കായിക്കാണാം.
 ഇതു രണ്ടു മണിക്കൂറിന്നിടയിൽ കണ്ടു എന്നും വരാം.

മാർച്ച് മാസം മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച 10 മണിക്കോ, ഏപ്രിൽ
 മാസം ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച 9 മണിക്കോ ആകാശത്തെ നോക്കി
 യാൽ വടക്കും പടിഞ്ഞാറും കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പരിചയ
 പ്പെടുവയായിരിക്കും. കിഴക്കു രക്തവണ്ണത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ചോ
 തിയേയും തെക്കു ശുഭ്രവണ്ണമായി പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന അഗസ്തു

നേയും കാണാം. തെക്കുനിന്നു കടന്നു കിഴക്കോട്ടു നീങ്ങി ത്രിശങ്കവിനേയും കാണാം. അഗസ്ത്യനേയും ത്രിശങ്കവിനേയും ചേർന്ന രേഖയിലും അതിന്റെ മീതെ തുറന്റെ കിഴക്കായിക്കാണ് ഒരു മങ്ങിയ നക്ഷത്രവരേയും വിസ്താരത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു ദക്ഷിണനൌകം (Argo Navis) എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. അഗസ്ത്യൻ ഈ ഗണത്തിലെ പ്രധാന നക്ഷത്രമാകുന്നു. അഗസ്ത്യനും, ത്രിശങ്കവിന്റെ മീതെ കാണുന്ന ഒരു നക്ഷത്രവും, ഇവയുടെ ഇടയിലായിക്കാണ് ഒരു ചതുരശ്രവും, ആ ചതുരശ്രത്തിന്റെ താഴെ കറക്കുടി നീളത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചതുരശ്രവും കൂടിയാൽ നൌകമായി. ഈ ചതുരശ്രങ്ങളുടെ മീതെകാണുന്ന വിസ്താരമുള്ള സമകോണത്രികോണം നൌകത്തിന്നു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പായയും അവിടുന്നു മേല്പോട്ടു തുറന്റെ കിഴക്കുള്ള ഒരു മങ്ങിയ നക്ഷത്രവരെയുള്ളതു നൌകത്തിന്റെ പാമരവുമാകുന്നു. ആകാശത്തിലെ ഈ ഭാഗം അതിമനോഹരമായിത്തോന്നും.

കിഴക്കു ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു 60° ഉയരത്തായി ചിങ്ങം (Leo) നക്ഷത്രഗണത്തെക്കാണാം. ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറു മുമ്പാണെങ്കിൽ നോക്കുവാൻ കറക്കുടി സൌകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. നക്ഷത്രഗണം അല്പം താണിരിക്കും. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരിലേഖത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. ആയില്യം, മകര, പൂരം, ഉത്രം ഈ നാലു ചാന്ദ്രഗണങ്ങളുംകൂടി ചിങ്ങം (=സിംഹം) നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു. ഉത്രം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താഴെ അല്പം വടക്കോട്ടു മാറി സീതാവേണി (Coma Berenices) എന്ന നക്ഷത്രഗണത്തേയും കാണാം. ചിങ്ങം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വടക്കായി ഇപ്പോൾ സപ്തർഷിമണ്ഡലവുമുണ്ടായിരിക്കും.

ചിങ്ങം 3 ഒരു ദ്വന്ദ്വനക്ഷത്രമാകുന്നു. രണ്ടു ഭാഗത്താങ്ങളും വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു. അവ തമ്മിലുള്ള അകലം 3½




പരിഭേദം 9

വികലമാത്രമാകുന്നു. ഒരു പരിവർത്തനം മുഴുവ്വിപ്പിക്കുവാൻ ഇവക്കു 407 സംവത്സരം വേണം.

ചന്ദ്രികയില്ലാതെയും ആകാശം തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ ചിങ്ങം നക്ഷത്രഗണം 30-ാം, 40-ാം ഭാഗം ഉന്നതിയിൽ പൂർവ്വകപാലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ, പൂണർതത്തിന്റേയും മകത്തിന്റേയും ഇടയിലുള്ള ചെറുനക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. ആയില്യത്തിന്റേയും

മകത്തിന്റേയും പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു കാണുന്ന ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു കർക്കടക (Cancer) ഗണം. ഇവക്ക് ഒരു ഞണ്ടിന്റെ ആകൃതിയില്ലെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗണത്തെ കർക്കടകമെന്നു പറയുന്നതെന്നു ചിലരും, അതല്ല സൂര്യൻ വാഷികസംബാരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉത്തരായണം അ




പരിലേഖം 10

വസാനിപ്പിച്ച് ദക്ഷിണായനം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഞണ്ടു പിന്നോട്ടു നടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു വേറെ ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കർക്കടകം 3, 4 എന്നവയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തു പരിലേഖത്തിൽ x എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഭേദമാകുന്നു.

കർക്കടകം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തെക്കുവശത്ത് ആറു നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നവയാകുന്നു പൂയം എന്ന നക്ഷത്രഗണം. ഇതിന് ഒരു വാൽക്കണ്ണാടിയുടെ ആകൃതിയുണ്ട്. ഇതല്ല പൂയം, കർക്കടകഗണത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ 3, 4 ഇവയടക്കം തെ


കേവടക്കു കാണുന്ന ഒരു വരി നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു പുയമെന്നും ഇത് ആയില്യമാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അതു സൂര്യസിദ്ധാന്താദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അതു ശരിയാണെങ്കിൽ, ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയത്തു ഉച്ചയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ നടപ്പുള്ള നക്ഷത്രവാക്യങ്ങൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഒക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. ചിങ്ങം നക്ഷത്രഗണത്തിൽ അമ്മി പരിച്ചുപോലെ കാണുന്നവ ആയില്യവും, വാൽക്കണ്ണാടി പുയവുമാകുന്നു.

ചോതി നക്ഷത്രത്തിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 4 ഭാഗം പടിഞ്ഞാറായിക്കാണുന്ന ചെറിയ പരന്ന സമപാശ്ചാത്രികോണം



അവ്യപരഷഗണത്തിൽ പെട്ടവയാകുന്നു. ഈ ത്രികോണത്തിന്റേയും അത്തത്തിന്റേയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം കന്നി (Virgo) നക്ഷത്രഗണത്തിൽ പെട്ടവയാകുന്നു. കന്നിയിലെ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമാകുന്നു ചിത്ര (Spica). “ചിത്ര മുത്തുപോലെ ഒന്ന്” എന്നു പറയാറുണ്ട്. ചിത്രയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു വരിയേയും, ആ വരിയിലെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രണ്ടു ചെറിയ വളഞ്ഞ വരികളേയും നോക്കി കന്നി നക്ഷത്രഗണത്തെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

മേയിമാസം മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലം കേരളത്തിൽ മഴകൊണ്ടും മഴക്കാറുകൊണ്ടും നക്ഷത്രം നോക്കുവാൻ പറ്റിയ കാലമല്ല. സപ്തമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച 9 മണിക്കോ,



പരിലേഖം 12

മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച 8 മണിക്കോ, ഒക്ടോബർ ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച 7 മണിക്കോ നോക്കിയാൽ വൃശ്ചികഗണത്തെ തെക്കുപടിഞ്ഞാ

ദക്ഷിണിജത്തിനു സമാന്തരമായി നില്ക്കുന്നതു കാണാം. വൃശ്ചികത്തിന്റെ അറ്റമായ മൂലം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കിഴക്കായി അമ്പു തൊട്ടത്ത വില്ലിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ധനു (Sagittarius) നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു. പരിലേഖത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇവയെ അനായാസേന നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. 2, 3, 4, 5 ഇവ പൂരാടവും 6, 9, 18, 23 ഇവ ഉത്രാടവുമാകുന്നു. ഈ സമയത്തു തെക്കുകിഴക്കുള്ള വലിയ നക്ഷത്രം കണ്ണിൽപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. അതു ഫോമൽ എന്ന നക്ഷത്രമാകുന്നു.


ധനു നക്ഷത്രഗണത്തിൽ അനവധി ശുക്ലപടങ്ങളും ഭേയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന് അല്പം പടിഞ്ഞാറു സ്പ്യധരഗണത്തിൽ ആകാശഗംഗയുടെ* ഏറ്റവും നിബിഡമായ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നതു നമ്മുടെ ഉഡുപഞ്ചരത്തിന്റെ† കേന്ദ്രമാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് നേരെ മുകളിൽ മുഴക്കോലിന്റെ ആകൃതിയിൽ 3 നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നതു ഓണം നക്ഷത്രമാകുന്നു. അതിൽ നടുക്കുള്ളതും അധികം ശോഭയുള്ളതുമായ നക്ഷത്രത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൾട്ടയർ (Altair) എന്നു പറയും. ഈ മുഴക്കോലിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു മുഴക്കോലിന്നെതിരായി വടക്ക് കിഴക്കോട്ട് ഒരു രേഖ സങ്കല്പിച്ച്, ആ രേഖയിൽ മുഴക്കോലുകൊണ്ടു മൂന്നു വെച്ചാൽ ഒരു താലിയുടെ ആകൃതിയിൽക്കാണുന്ന 5 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തും. ഇതാകുന്നു അവിട്ടം (Dolphinus).

തിരുവോണം വടക്കുപടിഞ്ഞാറു തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. ഈ രേഖയെ ആ വഴിക്ക് നീട്ടി മുഴക്കോലുകൊണ്ട് എട്ടു വെച്ചാൽ അഭിജിത്ത് (Vega) എന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തും. അഭി

* ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനം നോക്കുക.

† അപരഖണ്ഡം 6-ാം അദ്ധ്യായം നോക്കുക.




പരിലേഖം 13

ചിത്ര വളരെ ശോഭയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാകുന്നു. അഭിജിത്തും അതിന്റെ അരികത്തുള്ള 5 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടി അയിംഗിതി (Lyra) എന്ന നക്ഷത്രഗണമാകുന്നു.

അവിട്ടത്തേയും അഭിജിത്തിനേയും ചേർന്നു രേഖയുടെ സമാന്തര മധ്യത്തിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് വടക്കുകിഴക്കോട്ട് ഒരു രേഖ സങ്കല്പിച്ചാൽ, അതിന്മേലും അതിന്റെ ഇരു ഭാഗത്തും കൂടി കാണുന്ന 7 നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു ജായര (Cygnus=ഹിംസര) നക്ഷത്രഗണത്തിലെ പ്രധാനനക്ഷത്രങ്ങൾ.

ഓണത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തു അവിട്ടം. അതിന്റെ
കുറെ അധികം കിഴക്കായി ഭാദ്രപദചതുഷ്തൈക്കാണ്. ഭാ




ദ്രവണിന്റെ മീതെയായി പൃത്താകൃതിയിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഭാദ്രപദമുഷ്ടവും കൂടിയ സമൂഹത്തിന്നു ബുധരശപവണ്ഡം* (Pegasus) എന്നു പറയുന്നു. ബുധരശപവണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് അടുത്തടുത്തു കിടക്കുന്ന 6 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണാം. കാഴ്ചക്കു കുറെ അധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതിനാൽ ഇവയെ ശതതാരകം (ചതയം) എന്നു പറയുന്നു. ചതയത്തിന്റെ മീതെയായി അവിട്ടത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തായി കുറെ അധികം ചെറുനക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം. ഇവ കുറുഭം (Aquarius), മകരം (Capricorn) എന്നീ ഗണങ്ങളിൽ പെട്ടവയാകുന്നു. ഈരണ്ടെണ്ണമായി അടുത്തു കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കി പരിലേഖത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കുറുത്തേയും മകരത്തേയും തിരിച്ചറിയാം.

നക്ഷത്രങ്ങളെ സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടണമെന്നേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അറാബിക്സ്കൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൽനിന്നു കാണുന്ന മിക്ക പ്രധാന നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെവിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേടം, ഇടവം മുതലായ 12 നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ വാഷികസഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിച്ചവയാകയാൽ അവയെ സൗരഗണങ്ങളെന്നും അശപതി, ഭരണി മുതലായ 27 നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിച്ചവയാകയാൽ അവയെ ചാന്ദ്രഗണങ്ങളെന്നും പറയാം. ചാന്ദ്രഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട മിക്ക നക്ഷത്രങ്ങളും സൗരഗണങ്ങളിൽപ്പെടും. ചാന്ദ്രഗണങ്ങളിൽ സൗരഗണങ്ങളിൽപ്പെടാത്തവയും ഉണ്ട്. അത്തം, ചോതി, പൂരോരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, തിരുവാതിര, തിരുവോണം, അവിട്ടം ഇവയെല്ലാം ചാന്ദ്രഗണങ്ങളാണെങ്കിലും സൗരഗണങ്ങളിൽപ്പെടുകയില്ല.

* ഇതിൽ ഉത്രട്ടാതിയിലെ വടക്കേതു വെട്ടുകയില്ല.

ക്ഷീണ്യവൃദ്ധത്തിന്നു ചുറ്റുമുള്ള കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇവിടെനിന്നു കാണുകയില്ല. അവയെ ഒന്നുംതന്നെ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തരധ്രുവത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവയിൽ ധ്രുവനേയും, സപ്തർഷികളേയും, ജാതുൽഗണത്തേയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറേയും ചില പ്രധാനനക്ഷത്രങ്ങൾ ഉത്തരധ്രുവത്തിന്നു ചുറ്റുമുണ്ട്. അവയെപ്പറയാം. സപ്തർഷികൾ ഉച്ചയായി നില്ക്കു



- | | |
|----------------|--------------|
| ഷ. ഷഡാസ്ത്രൻ | ല. ലഘുബാലു |
| കൈ. കൈകവസ്ത്രം | വ്യ. വൃശ്ചം |
| ര. വരാസവസ്ത്രം | വ. വനവിലാളം |
| യ. ജായന | സ. സപ്തർഷികൾ |
| ജാ. ജാതുൽ | മ. മയദീപി |

പരിലേഖം 15

മ്പോൾ അവയുടെ താഴെ ഏതാണ്ട് അവയുടെ ആകൃതിയിൽ 7 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണാം. ഇവയിൽ വാലിന്റെ ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞ വരിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ധ്രുവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ധ്രുവൻ സാമാന്യം ശോഭയുള്ളതാകുന്നു. മറോവ ആരും കരുവിധം മങ്ങിയവയും ആകുന്നു. ഏഴും കൂടിയതിനെ

ലഘുബാലു (Ursa minor) എന്നു പറയുന്നു. സപ്തർഷികളുടേയും ലഘുബാലുവിന്റേയും ഇടയിലായി പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തുനിന്നു തുടങ്ങി ലഘുബാലുവിലെ ചെറിയ ചതുരശ്രത്തെ ചുറ്റി അല്പം കിഴക്കോട്ടു തെറ്റി മേൽപ്പോട്ടു കയറി ജാസിയുടെ താഴെയായി ഒരു ചതുരശ്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വരി നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു വ്യാളഗണം (Draco). ഇതിലെ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രം വ്യാളം 1 എന്നതിനെ ധ്രുവന്റേയും സപ്തർഷികളിൽ കിഴക്കെ അറ്റത്തുള്ള മരിചിയുടേയും ഏതാണ്ട് നടുവിലായിക്കാണാം. വ്യാളത്തിന്റേയും ജാതൽഗണത്തിന്റേയും ഇടയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കൈകവസ്സ് (Cepheus) നക്ഷത്രഗണത്തിൽ പെട്ടവയാകുന്നു. കൈകവസ്സ് 1 എന്ന നക്ഷത്രം ധ്രുവന്റേയും ജായര 1ന്റേയും ഇടയിൽ ഏതാണ്ട് മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഷഡാസ്വൻ, വരാസവസ്സ് 1, ധ്രുവൻ ഇവയുടെ ഇടയിൽ മയദപീഠി (Camelopard) എന്ന മങ്ങിയ നക്ഷത്രഗണത്തേയും കാണാം.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷപ്രകാശത്തെ ആസ്പദമാക്കി അവയെ തരങ്ങളായിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്നാംതരമായും അവയിൽ കുറവു ശോഭയുള്ളവയെ രണ്ടാംതരം, മൂന്നാംതരം മുതലായവയായും കരുതി വരുന്നു. കുറേക്കൂടി കൃത്യമാക്കുവാൻവേണ്ടി ഈ തരങ്ങളെ മഹിമാങ്കം (Magnitude) എന്നു പറയുന്ന സംഖ്യകളെക്കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹിമാങ്കം കൃത്യം 1 ആയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അങ്കം കൃത്യം 2 ആയുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ സുമാര് 2½ മടങ്ങ് ശോഭയുണ്ടായിരിക്കും. അങ്കം 2 ആയ നക്ഷത്രത്തിന് അങ്കം 3 ആയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ 2½ മടങ്ങ് ശോഭയുണ്ടായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് ഈ തോതിൽ ശോഭ കുറഞ്ഞുവരുന്നതോടുകൂടി മഹിമാങ്കം വലുതായിവരുന്നു. മഹിമാങ്കം 1 ആയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ 2½ മടങ്ങ് ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്നു മഹിമാങ്കം ശൂന്യമാകുന്നു. അതിന്റേയും 2½ മടങ്ങ് ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ മഹിമാ

ങ്കം—1 ആകുന്നു. ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള ജ്യോതിസ്സുകളുടെ മഹിമാങ്കം ഇതിനെ ജ്ഞാതമകമായിത്തീരുന്നു. മഹിമാങ്കം 6 ആയ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് വെറും കണ്ണുകൊണ്ടുതന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിലും ശോഭ കുറഞ്ഞ മഹിമാങ്കം വലിക്കുന്ന താരങ്ങളെ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയൂള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷപ്രകാശത്തെ കുറേക്കൂടി കൃത്യമായി പറയണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ മഹിമാങ്കം ശോംശഭിനത്തോടുകൂടിപ്പറയുന്നു. ആരേയും ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം ശോഭിക്കുന്ന ഇരുപതോളം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മഹിമാങ്കങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കുറ്റൻ	—1.38	ചോതി	0.24	തിരുവോണം	0.89	ചിത്ര	1.21
അഗസ്ത്യൻ	—0.86	ശബര 2	0.34	തിരുവാതിര	0.5	തൃക്കേട്ട	1.22
കിനാരവസ്സ് ¹	+0.06	പ്രോസിറോൺ	0.48	ത്രിശങ്ക 1	1.05	ഫോമൽ	1.29
അഭിജിത്ത്	+0.14	അക്കർനാർ	0.60	ബ്രഹ്മചി	1.06	ജായര	1.33
ഷഡാസ്വൻ	+0.21	കിനാരവസ്സ് ²	0.86	മിഥുനം 2	1.21	ചിങ്ങം	1.34

തിരുവാതിര ക്ഷയോപചയതാരമാകുന്നു. ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളപ്പോൾ മഹിമാങ്കം 0.5 ഉം, ഏറ്റവും ശോഭ കുറയുമ്പോൾ മഹിമാങ്കം 1.1 ഉം ആകുന്നു. മഹിമാങ്കവും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശോഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറേക്കൂടി മനസ്സിൽ പ്പതിയുവാൻ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂടി മഹിമാങ്കവും പറയാം. അശ്വതിയിലെ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മഹിമാങ്കങ്ങൾ 2.23, 2.72, 4.53 ഇവയാകുന്നു. രേവതിയുടെ മഹിമാങ്കം 5.15 ആകുന്നു. ധ്രുവനേരത്തു 2.12 ഉം ആകുന്നു. കൂതു തൊട്ടു മരീചിവരെയുള്ള സപ്തർഷികളുടെ മഹിമാങ്കങ്ങൾ ക്രമേണ 1.95, 2.24, 2.54, 3.44, 1.68, 2.16, 1.91 ഇവയാകുന്നു.

അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളെ മാത്രമേ ദൂരദർശിനി കൂടാതെ കാണുവാൻ കഴിയൂള്ളൂ. ഇവയിൽ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളതു ശുക്രനാകുന്നു. ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ അസ്തമിച്ച ഉടനെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തും, ചിലപ്പോൾ ഉദയത്തിന്നു മുമ്പു കിഴക്കും കാണാം. ഇപ്രകാരം കാണുന്ന മറൊന്നാകുന്നു ബുധൻ. ഇതു വളരെ

ചെറിയതാകുന്നു. ഇതിനെ സൂര്യനിൽനിന്നു അധികം അകന്നു കാണുകയില്ല. മിക്കപ്പോഴും സന്ധ്യാപ്രകാശത്തിൽപ്പെട്ടു കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും. വ്യാഴം നല്ലവണ്ണം പ്രകാശമുള്ളതും, ശനി ഒരുവിധം മങ്ങിയതും, ചൊവ്വ ചുവന്നതും ആകുന്നു.

ആകാശം നിമ്ബലവും നിലാവു തീരെയില്ലാതേയും ഇരിക്കുന്ന രാത്രികളിൽ ക്ഷിതിജത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു തുടങ്ങി എതിർ ഭാഗത്തു അവസാനിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രഭാവലയത്തെ കാണാം. ഇതു വലോളത്തിൽ പല നിലയിലും നില്ക്കും. ഇതിനെ നമ്മുടെ പൂർവ്വാർ ആകാശഗംഗ എന്നു വിളിച്ചു. പാശ്ചാത്യർ ഇതിനെ ഗാലക്സി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥം (Milky way) എന്നു പറയുന്നു. ദക്ഷിണനൌകം, ബുധനപ്പാണം, മിഥുനശബരാന്തരാളം, പ്രാജിതാ, വരാസവസ്ത്വ്, ജാതുൽ, ജായര, സപ്തധരൻ, ധനു, വൃശ്ചികം, കിന്നാരവസ്ത്വ് എന്നീ നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽകൂടി നമ്മെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പൂണ്ണവലയമായി ആകാശഗംഗ ശോഭിക്കുന്നു. വൃശ്ചികത്തിന്റെയും ജായരയുടേയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞപോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി നോക്കിയാൽ ഈ പ്രഭാവലയം അസംഖ്യം ചെറുനക്ഷത്രങ്ങൾ അടുത്തടുത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിക്കാണാം. മൌണ്ട് വിൽസൻ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി കാണുന്ന 150 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വലിയ ഭാഗം ആകാശഗംഗയിലാകുന്നു.

3. ജ്യോതിസ്സുകളുടെ ദൈനികചലനം

(അഥവാ അഹോരാത്രചലനം)

നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി അവയുടെ ദിവസംതോറുമുള്ള സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചും ചിലതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും നേർ കിഴക്കു ദിച്ച് ആകാശത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ല നാം കാണുന്നത്. ചിലതു നേർ കിഴക്കും, ചിലത് അവിടുന്നു തെക്കു മാറിയും, മാറു ചിലതു വടക്കു മാറിയും ഉദിക്കുന്നു. നേർ കിഴക്കുദിക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു നേരെ മേല്പോട്ടു പൊന്തുന്നതോ ഖമദ്ധ്യത്തിൽ എത്തുന്നതോ ഇല്ല. ഉദിച്ചു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അല്പം തെക്കോട്ടു ചാഞ്ഞു പൊന്തുന്നു. ക്ഷിണോത്തര രേഖയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രം ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് അല്പം തെക്കു മാറി നില്ക്കും. പിന്നെ അവിടുന്നു ക്രമേണ വടക്കോട്ടു ചാഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതു നേർ പടിഞ്ഞാറുതന്നെ അസ്തമിക്കുന്നു. ഈ നക്ഷത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാറ്റത്തെ ആസക്തമായി ആലോചിച്ചാൽ അതു തെക്കോട്ടു ചാഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായിക്കാണാം. നേർ കിഴക്കുനിന്നു തെക്കും വടക്കും മാറി ഉദിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും തെക്കോട്ടു ചാഞ്ഞുതന്നെ പൊന്തുന്നു. കിഴക്കുദിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരമാറ്റത്തിന്നു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിച്ച് ഉദിക്കുമ്പോൾ നേർ കിഴക്കുനിന്ന് എത്ര തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ മാറിയിരുന്നുവോ അത്രതന്നെ നേർ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ മാറി അസ്തമിക്കുന്നു. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും പൂർണ്ണവണ്ണം തന്നെ. തെക്കോട്ടു മാറി ഉദിച്ചവയുടെ മാറ്റത്തിൽ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗം അല്പപുത്തത്തെ

ക്കാൾ ചുരുങ്ങിയും വടക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കുന്നവയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗം അല്പവൃത്തത്തെക്കാൾ അധികമായും ഇരിക്കും.

പടിഞ്ഞാറുനക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയും കിഴക്കുദിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാം ക്ഷിതിജ്ഞിനനു മീതെ കാണുന്ന സഞ്ചാരം ഖഗോളത്തിൽ ക്ഷിതിജ്ഞിനനു താഴേയ്ക്കും തുടന്നു പോകുന്നുവെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഖഗോളത്തിൽ പൂർണ്ണവൃത്തങ്ങളിൽകൂടി ആദ്യവസാനമില്ലാത്തതുപോലെ എന്നും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. എല്ലാ വൃത്തങ്ങളും അന്യോന്യം സമാന്തരമായിരിക്കും. കിഴക്കുദിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗം എല്ലാ വൃത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടും വലിയതും തെക്കും വടക്കും മാറി ഉദിക്കുന്നവയുടെ വൃത്തങ്ങൾ ഈ മാറാത്തതിനനുസരിച്ചു ചെറിയവയും ആയിരിക്കും. വൃത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടുന്നു നോക്കുന്നവക്കു തെക്കോട്ട് ഒരു നിലയിൽ ചാഞ്ഞതായും തോന്നും. ഈ വൃത്തങ്ങൾക്കു ദൃഢവൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഹോരാത്രവൃത്തങ്ങൾ (Diurnal circles) എന്നു പറയുന്നു.

എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും, അവ തമ്മിൽ അന്യോന്യമുള്ള അകലങ്ങൾക്കോ നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ ആകൃതികൾക്കോ ഒരു മാറ്റവും കാണുകയില്ല. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഖഗോളത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു രത്തക്കല്ലുകളെപ്പോലെ സ്ഥിരമായി നിന്നു ഖഗോളം ഒന്നാകെ കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോളത്തിന്റെ അക്ഷാഗ്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വടക്കു ക്ഷിതിജ്ഞിയിൽനിന്ന് അല്പം ഉയന്നും തെക്കു ക്ഷിതിജ്ഞിയിൽനിന്ന് അത്രതന്നെ താഴ്ന്നും ഇളകാത്തതായ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു കാണാം. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു ധ്രുവങ്ങൾ (Celestial poles) എന്നു പറയുന്നു. മോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു കാമറ ഉ

ത്തരസ്രവത്തിന്റെ നേർക്കു രാത്രി വെച്ചുകൊടുത്താൽ ഉത്തരസ്രവത്തിന്നു ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രമാറ്റങ്ങൾ ഫോട്ടോവിൽ പതിഞ്ഞു കിട്ടും. അവയെ വൃത്തഖണ്ഡങ്ങളായിക്കാണാം. അവയുടെ എല്ലാം കേന്ദ്രം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. അതത്രെ ഉത്തരസ്രവത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഉത്തരസ്രവത്തിന്നടുത്ത വൃത്തഖണ്ഡങ്ങൾ ചെറിയവയും അകന്നവ വലിയവയും ആയിരിക്കും.

ഉത്തരസ്രവം ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നിരിക്കയാൽ ഉത്തരസ്രവത്തിന്നു വളരെ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ ദൈനികചലനത്തിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷിതിജത്തിന്നു താഴെപ്പോകയില്ല. അവ ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല. പകൽസമയം വെളിച്ചംകൊണ്ടു മങ്ങുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവയെ നിരസ്തനക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ദക്ഷിണസ്രവത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്ഷിതിജത്തിന്നു മീതെ വരാത്ത കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവയെ നിരുദയനക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു.


മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ ഉത്തരസ്രവം ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു സുമാറ് 11 ഭാഗം ഉയർന്നിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ ധ്രുവോന്നതി 11 ഭാഗമാകുന്നു. ദക്ഷിണസ്രവം ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്ന് ഇത്രതന്നെ താണിരിക്കും. രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യദൂരത്തായി ആകാശത്തിൽ സങ്കല്പിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്നു ഘടികാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവനമണ്ഡലം (Celestial Equator) എന്നു പറയുന്നു. ഇതു കിഴക്കുകിടക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ സഞ്ചാരമാറ്റമെന്നു സ്പഷ്ടമത്രെ. മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ ഘടികാമണ്ഡലം ഖമദ്ധ്യത്തിന്റെ സുമാറ് 11 ഭാഗം തെക്കുവശത്തുകൂടിപ്പോകും. ഘടികാമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരസ്രവം വരെയുള്ള അകലവും ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരസ്വസ്തികം വരെയുള്ള അകലവും ഒരു വൃത്തപാദമാകയാൽ, ഘടികാമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ഖമദ്ധ്യംവരെ ദക്ഷിണോത്തരവു

ത്തം വഴിയായ അകലം (ഘടികാമദ്ധ്യാന്തരാളം) ധ്രുവോന്നതിക്കു തുല്യമാകുന്നു. ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങളിൽക്കൂടിയും പൂർവ്വപശ്ചിമ സ്വസ്തികങ്ങളിൽക്കൂടിയും സങ്കല്പിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്ന് ഉന്മണ്ഡലം എന്നു പറയുന്നു. ഉന്മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം ക്ഷിതിജത്തിനു മീതേയും ദക്ഷിണാർദ്ധം താഴേയും ആയിരിക്കും. ഉന്മണ്ഡലം, ഘടികാമണ്ഡലം, ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തം ഇവ മൂന്നുംകൂടിയ ഗോളമായി ആകാശത്തെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വായുഗോളമെന്നും ഈ വൃത്തങ്ങൾക്കു വായുഗോളവൃത്തങ്ങളെന്നും ഭാരതീയജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നു.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൈനികചലനംപോലെത്തന്നെയാകുന്നു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും, ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ദൈനികചലനം. എന്നാൽ ചില ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദ്രുവവൃത്തങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാറാമില്ല. ഒരു നക്ഷത്രം എന്നും അതിന്റെ ദ്രുവവൃത്തത്തിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ദ്രുവവൃത്തങ്ങൾ ദിവസേന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ കൊല്ലവും മാച്ച് 21-ാം തീയതി സൂര്യൻ നേർ കിഴക്കുദിക്കുന്നു. ഘടികാമണ്ഡലമാഗ്നമായി സഞ്ചരിച്ച് ഏതാണ്ടു നേർ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉച്ചസമയത്തു സൂര്യൻ ദക്ഷിണോത്തരഘടികാമണ്ഡലസംപാതത്തിലിരിക്കുവാൻ ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു തെക്കായിരിക്കും. നിലത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിഴൽ അപ്പോൾ വടക്കോട്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിറേറ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതു നേർ കിഴക്കായിരിക്കയില്ല, അവിടന്ന് അല്പം വടക്കു മാറിട്ടായിരിക്കും. ഈ മാറ്റം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്രമേണ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ അസ്തമനംതന്നെ നേർ പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പകുതിയോളം പടിഞ്ഞാറു മാറിട്ടുമായിരിക്കും. പിറേറ ദിവസത്തെ ഉദയത്തിനുശേഷം ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ തൊട്ടു വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ഒരു ദ്രുവവൃത്തമായിരിക്കും സൂര്യസഞ്ചാരം.

മാറ്റം. പിറേന്നു സൂര്യൻ കുറേക്കൂടി വടക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കുകയും കുറേക്കൂടി വടക്കുള്ള ഒരു ദ്രുവത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ ജൂൺ 22-ാം തീയതിവരെ ക്രമേണ വടക്കോട്ടു മാറും. അന്നത്തെ സൂര്യന്റെ ദ്രുവത്തം ഘടികാരമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു സർവ്വത്ര 23½ ഭാഗം വടക്കായിരിക്കും. അന്നതൊട്ടു സൂര്യൻ ക്രമേണ തെക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കുന്നു. സപ്തമ്പർ 23-ാം തീയതി പിന്നേയും നേർ കിഴക്കുദിക്കും. പിറൊ ദിവസം നേർ കിഴക്കുനിന്നു തെക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഡിസമ്പ്ര് 22-ാം തീയതിവരെ തെക്കോട്ടു മാറിമാറി ഉദിക്കുകയും ആ ഉദയ ദിക്കുകൾക്കനുസരിച്ച ദ്രുവത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഡിസമ്പ്ര് 22-ാം തീയതിയിലെ സൂര്യന്റെ ദ്രുവത്തം സർവ്വത്ര ഘടികാരമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു 23½ ഭാഗം തെക്കായിരിക്കും. ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ, സൂര്യൻ ക്രമേണ വടക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കു



പരാലേഖം 16

വക്രപ. ക്ഷിതിലും വ, ക, ത, പ. ഉത്തര, പൂർവ്വ, ദക്ഷിണ, പശ്ചിമ സ്വസ്തികങ്ങൾ. ഖ. ഖമ ഭഗ്നം, ധ. ഉത്തരഗ്രവം, ധ, ദക്ഷിണഗ്രവം വഖത. ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തം. കഘപ. ഘടികാരമണ്ഡലം. (ഇതിന്റെ തെക്കും വടക്കും ദ്രുവത്തങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു) ധകധ, പ. ഉന്മണ്ഡലം.

വാൻ തുടങ്ങുന്നു. മാർച്ച് 21-ാം തീയതി പിന്നേയും കിഴക്കുദിക്കുന്നു. സൂര്യൻ വടക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കുന്ന കാലത്തെ ഉത്തരായണകാലമെന്നും, തെക്കോട്ടു മാറി ഉദിക്കുന്ന കാലത്തെ ദക്ഷിണായനകാലമെന്നും പറയുന്നു. ഡിസമ്പ്ര് 22-ാം തീയതിതൊട്ടു ജൂൺ 22-ാം തീയതിവരെ ഉത്തരായണകാല

വും ജൂൺ 22-ാം തീയതി മുതൽ ഡിസംബർ 22-ാം തീയതി വരെ ദക്ഷിണായനകാലവുമാകുന്നു. ഉത്തരായണദക്ഷിണായന കാലങ്ങൾ കൂടിയ കാലത്തിന്നു സാവസ്ഥരം എന്നു പറയുന്നു. സൂര്യൻ ഏറ്റവും വടക്കും, നേർ കിഴക്കും, ഏറ്റവും തെക്കും ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യത്തങ്ങളുടെ വലുതായ സ്ഥിതികൾ 16-ാം പരിലേഖത്തിൽനിന്നു കാണാം. ഈ പരിലേഖം നോക്കി ചില സംഗതികൾ നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിപ്പാൻ നുണ്ട്. ദ്രവ്യത്തങ്ങൾ ഘടികാമണ്ഡലത്തെക്കാൾ ചെറിയവയാണെങ്കിലും ആകാശഭ്രമണത്താൽ അവക്കും ചുറ്റാത്തുവാൻ 24 മണിക്കൂറുതന്നെ വേണം. ഉന്മണ്ഡലം ഘടികാമണ്ഡലത്തേയും ദ്രവ്യത്തങ്ങളേയും തുല്യാലംബമായി ഭാഗിക്കുന്നു. ഉന്മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉത്തരാലം ക്ഷിതിജത്തിന്നു മീതേയും ദക്ഷിണാലം ക്ഷിതിജത്തിന്നു താഴേയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ വടക്കുള്ള ദ്രവ്യത്തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിൽ അധികം ക്ഷിതിജത്തിന്നു മീതേയും കുറവു താഴേയും ആകുന്നു. അതിനാൽ ഈ വൃത്തങ്ങളിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പകൽ 12 മണിക്കൂറിൽ അധികവും രാത്രി 12 മണിക്കൂറിൽ കുറവുമായിരിക്കും. ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കുള്ള ദ്രവ്യത്തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിൽ കുറവുമാത്രം ക്ഷിതിജത്തിന്നു മീതേയും അധികം താഴേയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈ വൃത്തങ്ങളിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പകൽ കുറഞ്ഞിരിക്കയും രാത്രി അധികമായിരിക്കയും ചെയ്യും. എന്നുമാത്രമല്ല, ദക്ഷിണായനം അവസാനിച്ച് ഉത്തരായണം തുടങ്ങുമ്പോൾ പകൽ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. അന്നുമുതൽ പകൽ ക്രമേണ വലിച്ച് ഉത്തരായണാന്ത്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പകലാകുന്നു. അതിനാൽ പകൽ വലിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്ന കാലത്തെ ഉത്തരായണകാലമെന്നു പറയാം. ഇതുപോലെ പകൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലം ദക്ഷിണായനകാലവുമാകുന്നു. രണ്ട് അയനങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ സൂര്യൻ കിഴക്കുദിച്ച് ഘടികാമണ്ഡലം വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നു രാവു പകലും സമമായിരിക്കും.

ആ ദിവസങ്ങളെ വിഷുദിവസങ്ങളെ (Equinoctial Days) നു പറയുന്നു.

“അയനേ ദേവ ഗതിരുദഗക്ഷിണാക്ഷസ്യ വത്സരഃ
സമരാത്രിംദിവേ കാലേ വിഷുവദിവിഷുവം ച തത്.”

അമരകോശം— കാലവക്ത്രം.

ചന്ദ്രന്റെ ഉദയാസ്തമനങ്ങളും ദൈനികസഞ്ചാരവും സൂര്യന്റെതുപോലെത്തന്നെ. ചിലപ്പോൾ ഉദയവും ചിലപ്പോൾ അസ്തമനവും പകലാവുന്നതുകൊണ്ട് അവ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു വരും. പൗർണ്ണമിദിവസമാത്രം രണ്ടും കണ്ടുവെന്നു വരാം. ചന്ദ്രനും സൂര്യനെപ്പോലെ ദക്ഷിണോത്തരായണങ്ങൾ ഉണ്ട്. രണ്ടിനുംകൂടി സൂര്യന് ഒരു സംവത്സരം വേണം. എന്നാൽ ചന്ദ്രനു രണ്ടിനുംകൂടി 27 നക്ഷത്രകാലങ്ങൾ അടങ്ങിയ 27½ ദിവസം മതി. ഘടികാരമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടുമുള്ള കവിഞ്ഞ മാറ്റം (അഥവാ പരമാപക്രമം) എന്നും 23½ ഭാഗമല്ല. അതു സൂര്യന് 18½ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ 28½ ഭാഗത്തിനും 18½ ഭാഗത്തിനും ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ദൂര്യത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. ഘടികാരമണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും സഭാ ഭേദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

4. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും

സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും പടിഞ്ഞാറു ക്ഷിതിജത്തിന്നു താഴെ പോയി പിന്നേയും 12 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കിഴക്ക് ക്ഷിതിജത്തിന്നു മീതെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരു പിണ്ഡമായിരിക്കണം. ഈ പിണ്ഡം ഏതാണ്ട് ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതാണെന്നും അതിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയെന്നും അതിപുരാതനകാലം മുതൽക്കേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്നുള്ള തെളിവുകളെ താഴെപ്പറയാം.

ഭൂപൃഷ്ഠത്തിന്റെ മറവുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽത്തന്നെ അകലെയുള്ള കാട്ടുതീയ് പോലെ പ്രകാശമുള്ള വസ്തുക്കളെക്കൂടി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈ മറവു തട്ടുന്ന ഭാഗം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും വൃത്താകാരമായിക്കാണുന്നു. ഇതിനെയാകുന്നു നാം ക്ഷിതിജമെന്നു പറയുന്നത്. ക്ഷിതിജത്തിന്നുപ്പുറത്തു പോകുന്ന സൂര്യനുംകൂടി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ക്ഷിതിജത്തിന്റെ സമവൃത്താകൃതി സമുദ്രതീരങ്ങളിൽനിന്നു നല്ലവണ്ണം കാണാം. ഇങ്ങിനെ മറവുതട്ടുന്ന ഭാഗം എവിടേയും വൃത്താകാരമായിരിക്കേണമെങ്കിൽ മറയ്ക്കുന്ന സാധനം ഗോളാകൃതിയിലായിരിക്കണമെന്നു സ്പഷ്ടമത്രെ.

കരയിലേക്കു അടുത്തുവരുന്ന ഒരു കപ്പലിനെക്കാണുന്ന മാതിരി സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ആദ്യം കാണുന്നത് കപ്പലിന്റെ പാമരാഗ്രം മാത്രമാകുന്നു. ക്രമേണ പാമരം അധികമധികം മറിയിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നെ കപ്പലിന്റെ മുകൾഭാഗം കാണുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പഴം കപ്പലിന്റെ പാശ്ചാത്യ വെള്ളം തൊടുന്ന ഭാഗം കാണുന്നില്ല. അതിനെ കടൽ മറച്ചിരിക്കുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് കപ്പൽ കരക്ക് രണ്ടോ

മൂന്നോ നാഴിക അടുത്തെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ കപ്പലിന്റെ പാ
ശ്ചം വെള്ളം തൊടുന്ന ഭാഗം കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഉരുണ്ട് വ
ലിയ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു താഴത്തു
നിന്നു കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്കു കയറിവരുന്ന ഒരാൾ ക്രമേണ
പ്രത്യക്ഷമായി വരുന്നതുപോലെത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ പതിയുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്ര
ഗ്രഹണമുണ്ടാകുന്നത്. നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ
ആ നിഴലിന്റെ ആകൃതി നമുക്ക് കാണാം. അതു ചന്ദ്രൻ ഏ
തു നിലയിൽ നിന്നാലും സമവൃത്താകാരമായിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയു
ടെ നിഴൽ എപ്പോഴും വൃത്താകാരമാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരു ഗോള
മായിരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

ഇനി ഭൂമിയുടെ നാനാഭാഗത്തും നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി
യും ചില അളവുകൾ കണ്ടും കണക്കുകൂട്ടിയും നമുക്കൊന്നു സ
ഞ്ചരിക്കാം. സഞ്ചാരം ആദ്യം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറാവട്ടെ. ചന്ദ്ര
ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നതു എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഒരേ സമയത്തു
തന്നെ കാണാം. ചന്ദ്രഗ്രഹണമുള്ള ഒരു ദിവസം ഗ്രഹണം തുട
ങ്ങുന്ന സമയം തലശ്ശേരിയിൽനിന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ക
ണക്കാക്കി വെക്കുക. അതേ ഗ്രഹണംതന്നെ തുടങ്ങുന്ന സമ
യം കടലൂർനിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കണക്കാക്കുക. രണ്ടു
സമയവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 17 മിനുട്ടോളമുണ്ടായിരിക്കും.
ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സമയത്തുമാണ്. ഈ ഭേദം എ
ങ്ങിനെ വരുന്നു? കടലൂർ തലശ്ശേരിയിൽനിന്നു നേർ കിഴക്കാ
ണ്. ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്ന സമയം കടലൂർ തെക്കുവടക്കായി
സങ്കല്പിക്കുന്ന മേലുകീഴ്തലം അവിടെ ഉച്ചയായി നില്ക്കുന്ന ന
ക്ഷത്രത്തെ സ്പർശിച്ച് 17 മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം മാത്രം
തലശ്ശേരി അതുപ്രകാരംതന്നെ സങ്കല്പിക്കുന്ന തലം അതേ ന
ക്ഷത്രത്തെ സ്പർശിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലേയും ദക്ഷി
ണോത്തരവൃത്തങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ആകാശം 17 മിനുട്ട് നേരം
തിരിയുന്ന കോണിനോളം ചരിവുണ്ടെന്നു വരുന്നു. രണ്ടു ദക്ഷി

ണോത്തരവൃത്തങ്ങളും തമ്മിൽ $4\frac{1}{4}$ ഭാഗം ചരിവുണ്ടെന്നു വരുന്നു. അതിനാൽ കടലൂരിൽകൂടിയും തലശ്ശേരിയിൽകൂടിയും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പോകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയിൽ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളേയും ചേർക്കുന്ന രേഖ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ $4\frac{1}{4}$ ഭാഗം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ചാപവണ്ഡത്തിന്റെ നിലയാകുന്നുവെന്നു വരുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ $4\frac{1}{4}$ കൊണ്ടു ഹരിച്ച് 360 കൊണ്ടു പെരുക്കിയാൽ ആ വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി കിട്ടും. ഈ കണക്കിൽ ചില ചെറിയ ഭേദങ്ങൾ വരുത്തുവാനുണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂഗോളകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുകുന്നിരിക്കും. ഭൂഗോളകേന്ദ്രം കേന്ദ്രമായി രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടിയും പോകുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി വരുത്തുവാനാകുന്നു ഭേദങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്. ഇങ്ങിനെ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്താലും എവിടേയും ഒരേ പരിധിതന്നെ കിട്ടും.

തെക്കുവടക്കും ഈ വിധം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം. അതിന്നു കുറേക്കൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്നു കാത്തു നില്ക്കുന്നമെന്നില്ല. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്നു കാത്തു നില്ക്കാതെ ടൈഗ്രാംകൊണ്ടു ഒരേ നിമിഷം അറിഞ്ഞ് അപ്പോഴുള്ള സ്വദേശസമയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കണ്ടാലും മതി. പൗരാണികകാലങ്ങളിൽ ടൈഗ്രാം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാത്രം ഒരേ നിമിഷം അറിയുവാൻ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്നു കാത്തുനില്ക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടാവും. തിരുവനന്തപുരത്തു ഘടികാമണ്ഡലവും ദ്രുവവൃത്തങ്ങളും സമമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു $8\frac{1}{2}$ ഭാഗം തെക്കോട്ടു ചരിഞ്ഞിരിക്കും. ധ്രുവോന്നതിയും $8\frac{1}{2}$ ഭാഗംതന്നെ. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നേരെ വടക്കായ കോയമ്പത്തൂരാവട്ടെ ഘടികാദ്രുമണ്ഡലങ്ങളുടെ ചരിവും ധ്രുവോന്നതിയും 11 ഭാഗം 2 കലക്കു തുല്യമാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നു കോയമ്പത്തൂരും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള അയോല്പരേഖകൾ ത

മ്മിലുള്ള ചരിവ് $2^{\circ}-32' (=11^{\circ}-2' - 8^{\circ}.30')$ എന്നു വരുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ വൃത്തകലകളായ 21600 കൊണ്ടു പെരുക്കി $2^{\circ}-32'$ നെ കലകളാക്കിക്കിട്ടുന്ന 152 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ, തിരുവനന്തപുരത്തുകൂടി തെക്കുവടക്കു വൃത്തമായിക്കല്പിക്കുന്ന ഭൂവേഷ്ഠനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കിട്ടും. ഇങ്ങിനെ തെക്കുവടക്കായി പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഒരേ വേഷ്ഠനദൈർഘ്യം കിട്ടും. ഈ ദൈർഘ്യം മുമ്പു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു കിട്ടിയ പരിധിയിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കയില്ല.

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നതു ഭൂമി ഏതാണ്ട് ഒരു സമഗോളമെന്നാകുന്നു. ആ ഗോളത്തിന്റെ പലവഴിക്കുമുള്ള വേഷ്ഠനമാണ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കിട്ടിയത്. ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്കു സമഗോളത്തിൽനിന്നുള്ള അല്പമായ ഭേദവും ഭൂഗോളത്തിന്റെ വ്യാസങ്ങളും പിന്നീടു പറയാം.

തെക്കുവടക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിവും അതിന്നു തുല്യമായ ധ്രുവോന്നതിയും പല സ്ഥലത്തും പലതായിക്കണ്ടു. ഇതു ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ട സംഗതിയാകുന്നു. മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ ധ്രുവോന്നതി 11 ഭാഗമാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതു $8\frac{1}{2}$ ഭാഗവുമാകുന്നു. തെക്കോട്ടു പോകുന്തോറും ധ്രുവോന്നതി ചുരുങ്ങുന്നു. ഇങ്ങിനെ കുറെ പോയാൽ ധ്രുവോന്നതിയും ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിവും ശൂന്യമായ ഒരു പ്രദേശത്തെത്തും. അവിടന്നു നേരെ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറും ഉള്ള ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ധ്രുവോന്നതി ശൂന്യംതന്നെ. സുമേദ്ര, ബോർണിയോ എന്നീ ദ്വീപുകളുടേയും ആഫ്രിക്കാ വങ്കരയുടേയും മദ്ധ്യപ്രദേശങ്ങളിലും തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ അമസോൻനദീമുഖത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ധ്രുവോന്നതി ശൂന്യമാകുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ ഘടികാരമണ്ഡലം സമമണ്ഡലത്തോടും ഉന്മണ്ഡലം ക്ഷിതിജത്തോടും ചേർന്നു നില്ക്കും. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളേയും ഇവിടങ്ങളിൽനിന്നു

കാണാം. ഏതു നക്ഷത്രവും ദിനാലം ക്ഷിതിജ്ഞിനാ മിത്രേയും ദിനാലം താഴേയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഉത്തരദക്ഷിണായനങ്ങൾ ഇവടങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നും രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും. ഇവിടങ്ങളിൽ നിത്യവിഷുവതന്നെ. ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഉള്ള ഈ വിധം പ്രദേശത്തിന്നു നിരക്ഷപ്രദേശം എന്നു പറയുന്നു. കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരക്ഷപ്രദേശം ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും പോകുന്ന ഒരു രേഖമാത്രമാകുന്നു. അതിന്റെ തെക്കും വടക്കും സാക്ഷപ്രദേശങ്ങളുമാണ്. കൃത്യമായിപ്പറയണമെങ്കിൽ നിരക്ഷരേഖ (ചരിവിലാത്ത രേഖ—Equator) എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉജ്ജയനിയിൽനിന്നു നേരെ തെക്കുള്ള നിരക്ഷപ്രദേശത്തെ ഭാരതീയ ജ്യോതിഷികൾ 'ലങ്ക'യെന്നു പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ലങ്ക സമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടു കിടക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടിവരുന്നു. നിരക്ഷപ്രദേശത്തുനിന്നു മടങ്ങി നമുക്ക് നേരെ വടക്കോട്ടുതന്നെ സഞ്ചരിക്കാം.

വടക്കോട്ടു പോകുന്തോറും ഘടികാദ്യമണ്ഡലങ്ങളുടെ ചരിവും, ധ്രുവോന്നതിയും, നിരസ്തോദയനക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും ക്രമേണ വലിച്ചുവരുന്നു. രാപ്പകലുകളുടെ വ്യത്യാസവും അതുപോലെ വലിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ എത്തിയാൽ ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിവ് $28\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തെക്കാൾ അധികമായിക്കാണാം. അതിനാൽ അവിടെ സൂര്യൻ ഖമദ്ധ്യത്തിൽ വരികയില്ല. ചന്ദ്രൻ $18\frac{1}{2}$ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഖമദ്ധ്യത്തിൽ എത്തും. അയനാന്ത്യങ്ങളിൽ രാപ്പകലുകളുടെ ദൈർഘ്യങ്ങളിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടായിരിക്കും. ടക്കിസ്ഥാൻ, സൈബീരിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധ്രുവോന്നതി 40 ഭാഗത്തെക്കാൾ അധികമുണ്ടായിരിക്കയും അതിനാൽ സപ്തർഷി കൂടി ഒരു കാലത്തും അസ്തമിക്കാതെ ഉത്തരധ്രുവത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യും. പിന്നേയും കുറെ വടക്കോട്ടു പോയാൽ ഉത്തരായണാന്ത്യത്തിന്നടുത്തുള്ള കുറെ ദിവ

സഞ്ചലിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതിരിക്കുന്നതു കാണാം. സൂര്യൻ വടക്കുഭാഗത്തു വരുമ്പോൾ ക്ഷിതിജത്തിനു വളരെ അടുത്തു നില്ക്കും. 24 മണിക്കൂറിലൊരിക്കൽ പൂർവ്വ, ദക്ഷിണ, പശ്ചിമോത്തരദിക്കുകളിൽകൂടി സൂര്യൻ വലംവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിരക്ഷദേശത്തുനിന്നു ഭൂവേഷ്ടനത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു ചെല്ലുന്ന ടത്തു ഉത്തരധ്രുവവും ഖമദ്ധ്യവും ഒരുമിച്ചുനില്ക്കും. ഘടികാര ണ്ഡലം ക്ഷിതിജത്തോടും ഉന്നണ്ഡലം സമമണ്ഡലത്തോടും ചേർന്നുനില്ക്കും. ഘടികാരണ്ഡലത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നു. ദക്ഷിണായനോത്തരാർദ്ധത്തിലും ഉത്തരായണപൂർ്വാർദ്ധത്തിലും സൂര്യൻ ഘടികാര ണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കുകയാൽ ഇവിടെ ക്ഷിതിജത്തിന്റെ താഴത്തായിരിക്കും. ഈ ആറു മാസവും ഇവിടെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയാകുന്നു. ഉത്തരായണമദ്ധ്യത്തിൽ പതുക്കെപ്പതുക്കെ സൂര്യനെ കണ്ടുതുടങ്ങും. സൂര്യൻ വലംവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയും ക്രമേണ ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യും. ഉത്തരായണാന്ത്യത്തിൽ സൂര്യന്റെ ഉന്നതി 23½ ഭാഗമാകും. പിന്നീടു സൂര്യൻ ക്രമേണ താണുവരുന്നു. ദക്ഷിണായനമദ്ധ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ പിന്നേയും ക്ഷിതിജത്തിന്നു താഴെപ്പോകുന്നു. ഇതോടുകൂടി 6 മാസം നീണ്ടുനിന്ന പകലും അവസാനിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ ഭാരതീയഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം 'മേരു'വെന്നു പറയുന്നു. ധ്രുവം എന്ന വാക്കു ആകാശത്തുള്ള ഹൃദ്യ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിരക്ഷദേശത്തുനിന്നു തെക്കോട്ടു പോകുന്തോറും വടക്കോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായതിന്നു വിപരീതമായ പല സംഗതികളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഉത്തരധ്രുവം അദൃശ്യമാകുന്നു. ദക്ഷിണധ്രുവം ക്രമേണ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഉത്തരധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നിരഭയങ്ങളും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ളവ നിരസ്തങ്ങളും ആയിത്തീരുന്നു. ഘടികാദൃവുത്തങ്ങളുടെ ചരിവ് തെക്കോട്ടായിരിക്കും. ദക്ഷിണായനത്തിൽ പകൽ വലിച്ചും, ഉത്തരാ

യണത്തിൽ പകൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും തെക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ ദക്ഷിണധ്രുവം ഖമധ്യത്തോടു ചേർന്നു നില്ക്കും. ഘടികാമണ്ഡലം ഇവിടെയും ക്ഷിതിജത്തോടും ഉന്മണ്ഡലം സമമണ്ഡലത്തോടും ചേർന്നു നില്ക്കുന്നു. ദക്ഷിണായനോത്തരാർത്തിലും ഉത്തരായണപൂർവാർത്തിലും ഇവിടെ എപ്പോഴും സൂര്യനെക്കാണാം. സംവത്സരത്തിൽ ബാക്കി ആറു മാസം രാത്രിയായിരിക്കും. ഉത്തരായണാരംഭത്തിൽ സൂര്യനു ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു 23½ ഭാഗം ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും. ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കുവശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ ഭാരതീയർ ബഡവാ മുഖം എന്നു പറയുന്നു. മേഘവിൽ പകലാവുമ്പോൾ ബഡവാ മുഖത്തു രാത്രിയും, മേഘവിൽ രാത്രിയായുമ്പോൾ ബഡവാ മുഖത്തു പകലും ആകുന്നു. മേഘവിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും വലത്തോടു ചുറ്റുന്നു. ബഡവാമുഖത്തു അവയെല്ലാം ഇടത്തോടും ചുറ്റുന്നു. ഈ ഭേദം ഭൂമിയുടെ ഉത്തരദക്ഷിണാർത്തിൽ എവിടെയും കാണാം. ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിൽ കിഴക്കുഭാഗത്തു സൂര്യൻ വടക്കോട്ടു ചാഞ്ഞു പൊന്തി വടക്കു ഭാഗത്തു കൂടെ പടിഞ്ഞാറു പോയി അസ്തമിക്കുന്നു.

ഈ വിവരിച്ച സംഗതികളെ സംക്ഷിപ്തമായി ആർച്ചഭടൻ പറയുന്നതു കേൾക്കുവാൻ ഭാരതീയർ പ്രത്യേകം ഉസുകരായിരിക്കും. അതിനാൽ അതു അല്പം പറയാം.

“വൃത്തഭവഞ്ജരമദ്ധ്യേ കക്ഷ്യാപരിവേഷിതഃ ഖമധ്യഗതഃ
ദൃഢജലശിഖിദ്ധായുമയോ ഭൂഗോളസ്സുര്യതോവൃത്തഃ.”

ആർച്ചഭടീയം ഗോളപാഠം 6.

വൃത്താകാരമായ നക്ഷത്രക്കൂടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗ്രഹകക്ഷകളെക്കൊണ്ടു ചുറ്റപ്പെട്ട ആകാശഗോളമദ്ധ്യഗതനായി മണ്ണ്, വെള്ളം, തീയ്, വായു ഇവയെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായതും ഏതു ഭാഗത്തും വൃത്താകാരമായതും ആയ ഭൂഗോളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, എന്നു സാരം.

“സ്വമേരുസ്സഥലമദ്ധ്യേ നരകാ ബഡവാമുഖത്വ ജലമദ്ധ്യേ അമരമാ മന്ത്രേണ പരസ്സരഥസ്ഥിതാനിതം.”

ഗോളപാഠം 12.

സ്വഗ്ഗ്വം മേരുവും സ്ഥലഭാഗത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും നരകവും ബഡവാമുഖവും ജലഭാഗത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സ്വഗ്ഗ്വാസികളായ ദേവന്മാരും നരകവാസികളായ അസുരന്മാരും എന്നും അന്യോന്യം താന്താങ്ങളുടെ കീഴ്ഭാഗത്തായി മറേറവർ നില്ക്കുന്നുവെന്നു കരുതുന്നു.

“ദേവഃ പശ്യന്തി ഭഗോളാലമുദഞ്ച മേരുസംസ്ഥിതാസ്സപ്യം അപസവ്യഗം തഥാലം ദക്ഷിണബഡവാമുഖേ പ്രേതഃ.”

ഗോളപാഠം 16.

മേരുവിൽ ഇരിക്കുന്ന ദേവന്മാർ ഭഗോളത്തിന്റെ ഉത്തരാലം വലത്തോട്ടു പോകുന്നതും ബഡവാമുഖവാസികളായ പ്രേതങ്ങൾ ദക്ഷിണഭഗോളാലം ഇടത്തോട്ടു പോകുന്നതായും കാണുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റു ജ്യോതിഷസിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാം. പുരാതനകാലംമുതൽക്കുതന്നെ ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണെന്നു ജ്യോതിഷികൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പ്രാമാണികന്മാരായവരെല്ലാം ഭൂമിയുടെ വ്യാസവും ഒരുവിധം കൃത്യമായി അളന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാരതീയഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന വ്യാസയോജനകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൂര്യസിദ്ധാന്തം 1600 യോജന. ആർട്ടുഭടീയം 1050 യോജന. സിദ്ധാന്തശിരോമണി (ഭാസ്കരൻ) 1581 യോജന. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മുഴുവൻ അളന്നതിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാകുവാൻ വഴിയില്ല. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ യോജനയെന്നു പറയുന്ന നീളം 2½ മൈൽ തൊട്ടു 8 മൈൽ വരെയുള്ള പല നീളങ്ങളായും പല ദേശക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതായി ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. അതിനാൽ യോജനദൈർഘ്യഭേദംകൊണ്ടു വന്നതായിരിക്കാം ഭൂവ്യാസയോജനസംഖ്യയിൽ കാണുന്ന ഭേദങ്ങളെന്ന് ആലോചിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. ആപ്ലേയുടെ നിഘ

ണ്ടുവിൽ 1 യോജന ഏതാണ്ട് 8 മൈൽ നീളമുള്ള അളവ് എന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്.

ഭൂമി ആകൃതിയിൽ ഗോളമാണെന്നു വന്നതോടുകൂടി അതിനേലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ അതിനെ പല പൂത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടും പുറപ്പെട്ടതായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സങ്കല്പിച്ചുപോന്നു. മേഘബന്ധവാമുഖങ്ങളിൽനിന്നു തുല്യദൂരത്തായി ഭൂമിയുടെ പുറം സങ്കല്പിക്കുന്ന പൂത്തത്തിന്നു നിരക്ഷവൃത്തം (Equator) എന്നു പറയുന്നു. ഇവിടെ നില്ക്കുന്ന ആളുകൾക്കു ചരിവില്ലെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നു. വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പോകുമ്പോഴും ഭൂപ്രകൃത്തിന്റെ വളവുകൊണ്ട് അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ നില്ക്കുന്നവർക്ക് ചരിവ് വരുന്നു. ഈ ചരിവ് ഗ്രൂവോണതിക്കും ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിവിന്നും തുല്യമെന്നു കണ്ടു. ഈ ചരിവിന്നു അക്ഷാംശം (Latitude) എന്നു പറയുന്നു. ഒരേ അക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടിപ്പോകുന്ന ഒരു രേഖ കല്പിച്ചാൽ അതു നിരക്ഷവൃത്തത്തിന്നു സമാന്തരമായിരിക്കും. ഈ പൂത്തങ്ങളെ ആക്ഷവൃത്തങ്ങൾ (Circles of Latitude) എന്നു പറയുന്നു. ആക്ഷവൃത്തങ്ങൾ നിരക്ഷവൃത്തത്തിൽനിന്നു വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പോകുമ്പോഴും ചെറുതായി മേഘബന്ധവാമുഖങ്ങളിൽ അവ ബിന്ദുപ്രായമാകയും ചെയ്യുന്നു.

വടക്കോട്ടു പോയി അക്ഷാംശം $23\frac{1}{2}$ ഭാഗമാകുന്നതുവരെ സംവത്സരത്തിൽ സൂര്യൻ രണ്ടുദിവസമെങ്കിലും ഖമദ്ധ്യത്തിൽകൂടി കടന്നുപോകും. $23\frac{1}{2}$ ഭാഗം അക്ഷമായ പൂത്തത്തിൽ സൂര്യൻ ഖമദ്ധ്യത്തിൽകൂടി ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കടന്നുപോകയുള്ളൂ. അന്നു സൂര്യൻ കർക്കടകരാശിയിലായിരിക്കും. (ഓം അദ്ധ്യായം നോക്കുക). അതിനാൽ ആ ആക്ഷവൃത്തത്തെ കർക്കടകവലയം (Tropic of Cancer) എന്നു പറയുന്നു. വടക്കോട്ടു പോയി അക്ഷാംശം $66\frac{1}{2}$ ഭാഗമാകുന്നതുവരെ കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുസ്തമിക്കുന്നു. അവിടുന്നു തൊട്ടു സൂര്യൻ ഉദിക്കാ

ത്ത ദിവസങ്ങളുടേയും അസ്തമിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുടേയും എണ്ണം വലിച്ചുവരുന്നു. അവസാനം മേരുവിൽ 6 മാസം ഒന്നായി രാത്രിയും 6 മാസം ഒന്നായി പകലും ഉണ്ടാകുന്നു. 66½ ഭാഗം അക്ഷമായ ആക്ഷവൃത്തത്തെ ഉത്തരവലയം (Arctic Circle) എന്നു പറയുന്നു. ഇതു മേരുവിൽനിന്നു സർവ്വത്ര 23½ ഭാഗം അകലത്തായിരിക്കും.


ഇതുപോലെ നിരക്ഷവൃത്തത്തിൽനിന്നു തെക്കോട്ടു ചെല്ലുന്തോറും ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ സംവത്സരത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം സൂര്യൻ ചമദ്യുത്തിൽ വരുന്ന ദിവസം സൂര്യൻ മകരരാശിയിലായിരിക്കും. അതിനാൽ തെക്കുഭാഗത്ത് അക്ഷം 23½ ഭാഗമായ വൃത്തത്തെ മകരവലയം (Tropic of Capricorn) എന്നു പറയുന്നു. 66½ ഭാഗം അക്ഷമായ വൃത്തത്തെ ദക്ഷിണവലയം (Antarctic Circle) എന്നു പറയുന്നു. ഈ വലയം ബന്ധവാമുഖത്തുനിന്നു സർവ്വത്ര 23½ ഭാഗം അകലെയുമായിരിക്കും. ഈ ഭേദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യന്റെ ദക്ഷിണോത്തരായണംകൊണ്ടാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

അക്ഷത്തെക്കൊണ്ടും ആക്ഷവൃത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിരക്ഷവൃത്തിൽനിന്നു വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടുമുള്ള നീക്കം അറിയാം. ഇതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിതസ്ഥാനത്തുനിന്നു കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടുമുള്ള നീക്കങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ ഭൂപുഷ്പത്തിൽ ഏതു സ്ഥാനത്തേയും ക്ലൃപ്തമാക്കാം. ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും സൂര്യോദയോതിസ്സുകൾ കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതായിത്തോന്നുകനിമിത്തം കിഴക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ജ്യോതിസ്സുകൾ കുറെ നേരം മുമ്പു ഉദയം കൊള്ളുമെന്നും, പടിഞ്ഞാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞുമാത്രം ഉദയം കൊള്ളുമെന്നും ഇതിനിടയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഉച്ചയാകുന്ന സമയങ്ങൾക്കും ഈ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്തു സൂര്യൻ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അതിന്റെ

നേർ തെക്കും വടക്കുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉച്ചയാകും. ഈ സ്ഥലങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്താൽ മേരുതൊട്ടു ബഡപാമുഖം വരെ തെക്കുവടക്കായി കിടക്കുന്ന ഒരു വൃത്തപരിധ്യുൾമുണ്ടാകും. ഇതിന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ ശൂവകവൃത്തം (Circle of meridian) എന്നു പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തുള്ള ശൂവകവൃത്തത്തെ ഒന്നാമത്തേതായി കല്പിച്ചു അതിന്റേയും അതിൽനിന്നു കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ ഉള്ള ശൂവകത്തിന്റേയും നേരെ മീതെ സ്കൂട്ടുൻ വരുന്ന സമയങ്ങളുടെ അന്തരംകൊണ്ടോ വൃത്തങ്ങളുടെ അന്യോന്യമുള്ള ചരിവുകൊണ്ടോ അളന്നു രണ്ടാമത്തെ ശൂവകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രഥമ ശൂവകത്തെ ഭാരതീയജ്യോതിഷികൾ ഭൂമദ്ധ്യരേഖ എന്നു പറഞ്ഞു പോന്നു. ഭാസ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തശിരോമണി ഗോളാദ്ധ്യായത്തിൽ താഴെ കാണുംപ്രകാരം പറയുന്നു.

“യല്ലങ്കോജ്ജയനീപുരോപരി കുരുക്ഷേത്രാദിദേശാൻ സ്പശൻ സൂത്രം മേരുഗതം ബുധൈന്നിഗദിതാസാ മദ്ധ്യരേഖാ ഭവഃ.”

ലങ്ക, ഉജ്ജയനീ, കുരുക്ഷേത്രം, മേരു ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടിപ്പോകുന്ന രേഖയെ ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യരേഖയെന്നു ബുധന്മാർ പറഞ്ഞു എന്നു സാരം. പാശ്ചാത്യർ ഗ്രീനിച്ചിൽകൂടിപ്പോകുന്ന ശൂവകത്തെ പ്രഥമമെന്നു കല്പിച്ചു മറുഭാഗത്തെ ഇതിനോടുള്ള ചരിവുകൊണ്ടു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നു. പരിലേഖത്തിൽ നിരക്ഷവൃത്തത്തേയും അതിന്നു സമാന്തരമായ ചില ആക്ഷവൃത്തങ്ങളേയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉജ്ജയനീയിൽകൂടിപ്പോകുന്ന ശൂവകവൃത്തമാകുന്നു ‘മുഖ’ എന്നത്. ഇതാകുന്നു ഭാരതീയസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഭൂമദ്ധ്യരേഖ. ല എന്നതു കൽക്കത്താ പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാനമാകുന്നു. ഇതിന്റെ അക്ഷം $22^{\circ}-32'$ എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇതു നിരക്ഷരേഖയിൽനിന്നു എത്ര വടക്കാണെന്നു ക്ലിപ്തമായി. ഭൂമദ്ധ്യരേഖാതലവും കൽക്കത്താശൂവകതലവും തമ്മിൽ 12° ഭാഗം $35'$ കല ചരിവുണ്ട്. പാശ്ചാത്യസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഇതു



പരിലേഖം 17.

- ക: മേൽ, ബ: ബഡവാമുഖം
 ക പ: നിരക്ഷരേഖ.
 ക₁ ക₂: കർക്കവലയം
 മ₁ മ₂: മകരവലയം
 ത, ദ: ഉത്തരദക്ഷിണവലയങ്ങൾ.
 ഉ: ഉജ്ജയനി. അതിനാൽ
 മ ഉ ബ: ഭൂമദ്ധ്യരേഖ.
 ല. കൽക്കത്തയുടെ സ്ഥാനം.

12° 35' കിഴ
 കാണെന്നു പറ
 ഞ്ഞാൽ, കൽക്ക
 ത്ത ഭൂമദ്ധ്യരേഖ
 യിൽനിന്നു എത്ര
 കണ്ടു കിഴക്കാണെ
 ന്നും ക്ലിപ്തമായി.
 സൂര്യൻ കൽക്ക
 ത്താ ദക്ഷിണോ
 ത്തരത്തിൽനിന്നു
 വായുഗോളഭൂമണ
 വശാൽ ഉജ്ജയനി
 യിലെ ദക്ഷിണോ
 ത്തരത്തിൽ വരു
 വാൻ 125 $\frac{5}{8}$ വിനാ
 ശിക (= 755 പ്രാ
 ണൻ) വേണം.
 അതിനാൽ ഭാരതീ
 യസമ്പ്രദായപ്രകാ
 രം കൽക്കത്തയി

ലെ സ്വദേശവിനാശിക 125 $\frac{5}{8}$ ഞം എന്നോ സ്വ
 ദേശപ്രാണൻ 755 ഞം എന്നോ പറയും.

പുരാതനകാലത്തു ഭൂമി ഒരു കൃത്യമായ ഗോളമാണെന്നു
 തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനികന്മാരുടെ സൂക്ഷ്മ
 മായ അളവുകൾകൊണ്ടു ഭൂമി കൃത്യമായ ഗോളമല്ലെന്നും നിര
 ക്ഷദേശത്തേക്കു അല്പം വീർത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു.
 മേൽതൊട്ടു ബഡവാമുഖംവരെ അകലം 7899.6 മൈൽസാ
 ണെങ്കിലും, നിരക്ഷരത്തത്തിന്റെ വ്യാസം 7926.6 മൈൽ
 സാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. മേൽബഡവാമുഖങ്ങളിൽകൂടി ഭൂ

മിയെ ചേദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വൃത്തം സമവൃത്തമായിരിക്കയില്ല. അതു കരായതവൃത്തമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഏറവും നീണ്ട വ്യാസം ഏറവും ചെറിയ വ്യാസത്തിന്റെ $\frac{1}{8}$ ശതമാനം മാത്രം അധികമാകയാൽ, തോതനുസരിച്ച് ഇതിനെ വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ സമവൃത്തത്തിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സാധിക്കയില്ല.

ഭൂമി കൃത്യമായ ഒരു ഗോളമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ധ്രുവകം വഴി 1° അക്ഷാന്തരമുള്ള രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ എവിടേയും ഒരേ അകലമായിരിക്കും. കൃത്യമായ ഗോളമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ അകലങ്ങൾക്കു അക്ഷമനുസരിച്ച് ഭേദം വരും. ഈ ഭേദങ്ങളേയും, ആക്ഷവൃത്തങ്ങളിലെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യങ്ങളേയും താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

അക്ഷം (ഭാഗം)	ധ്രുവകത്തിൽ 1° ഭാഗത്തിന്നു മൈൽസ്	ആക്ഷവൃത്തത്തിൽ 1° ഭാഗത്തിന്നു മൈൽസ്	അക്ഷം (ഭാഗം)	ധ്രുവകത്തിൽ 1° ഭാഗത്തിന്നു മൈൽസ്	ആക്ഷവൃത്തത്തിൽ 1° ഭാഗത്തിന്നു മൈൽസ്.
0	68.68	69.16	50	69.11	44.54
10	68.72	68.12	60	69.22	34.68
20	68.78	65.02	70	69.28	23.73
30	68.88	59.95	80	69.38	12.05
40	69.04	53.06	90	69.41	00.00

ധ്രുവകത്തിൽ കാണുന്ന ഭേദങ്ങൾ അതിന്റെ വളവിന്റെ അധികാല്പതകൊണ്ടും, ആക്ഷവൃത്തങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഭേദങ്ങൾ വൃത്തങ്ങളുടെ അധികാല്പതകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു.

5. ആദിത്യന്റെ വാഷികസഞ്ചാരം.


നക്ഷത്രങ്ങളെ രാത്രി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമയത്തുതന്നെയുള്ള അവയുടെ ഖഗോളസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നതായിക്കാണുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തു കിഴക്കു കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതേ സമയത്തുതന്നെ അധികമധികം മേലോട്ടു കയറിയതായും, പടിഞ്ഞാറു കാണുന്നവ അധികമധികം കീഴോട്ടു താണതായും കാണപ്പെടുന്നു. മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കിഴക്കു അതേ സമയത്തുതന്നെ പുതിയ പുതിയ നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പടിഞ്ഞാറു പരിചയമുള്ള നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ ക്ഷിതിജന്തിനു താഴെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി പിന്നേയും നക്ഷത്രങ്ങളെ പൂർവ്വസ്ഥിതികളിൽതന്നെ കാണുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ആകാശഗോളത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു രത്നങ്ങളെപ്പോലെ അന്യോന്യമുള്ള അകലങ്ങൾക്കു ഭേദമില്ലാതെ ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കാര്യത്തുനോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നവസ്തുവല്ല, അതു ക്രമേണ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽക്കൂടി പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. ഒരു മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സൂര്യാസ്തമനസമയത്തു ഖമദ്ധ്യത്തിനടുത്തു കണ്ടിരുന്ന നക്ഷത്രത്തെ ആ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഖമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു സുമാർ 30° പടിഞ്ഞാറായി കാണാം. നക്ഷത്രത്തിന്നു ആകാശഗോളത്തിൽ ചലനമില്ലാത്തതിനാൽ * ഇതു സൂര്യൻ നക്ഷത്രത്തോടു 30° അടുത്തു വന്ന

* ആകാശഗോളം ആസക്തമായി തിരിയുന്നതായിക്കാണുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്മേൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥലം മാറി നില്ക്കുന്നില്ലെന്നു സാരം.

തിന്റെ ഫലമാകുവാനേ വഴിയുള്ളൂ. പിന്നത്തെ മാസം അവസാനം സൂര്യൻ കറേക്കൂടി നക്ഷത്രത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനാൽ, സൂര്യോസ്തമനസമയത്തു നക്ഷത്രത്തെ ക്ഷിതിജ്ഞതിൽനിന്നു 30° മാത്രം ഉയരത്തായിക്കാണാം. ഒരു മാസവും കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി നക്ഷത്രവും അസ്തമിക്കുന്നു. പിന്നത്തെ മാസം സൂര്യോദയത്തിന്നു മുമ്പു ആ നക്ഷത്രം കിഴക്കുകുന്നു. സൂര്യോദയസമയത്തു നക്ഷത്രത്തെ ക്ഷിതിജ്ഞതിൽനിന്നു സൂര്യൻ 30° ഉയരത്തായി കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്തു? നാല് മാസം മുമ്പു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറായിരുന്ന സൂര്യൻ ക്രമേണ നക്ഷത്രത്തെ പ്രാപിച്ച് ഇപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിന്റേയും കിഴക്കുഭാഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ നക്ഷത്രം മുന്പിട്ട് മുന്പിട്ട് ഉദിച്ചു 9 മാസം തികയുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾതന്നെ നക്ഷത്രം കിഴക്കുകുന്നു. പിന്നീടു ദിവസങ്ങൾ കഴിയുംതോറും സൂര്യോസ്തമനസമയത്തു നക്ഷത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തെ ഉന്നതി വലിച്ചുവരുന്നു. 3 മാസവും കൂടി തികയുമ്പോൾ സൂര്യോസ്തമനസമയത്തു നക്ഷത്രത്തെ പിന്നേയും ഖമദ്ധ്യത്തിൽ കാണാം. നക്ഷത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള സഞ്ചാരമായിത്തോന്നുന്നതു സൂര്യന്റെ കിഴക്കോട്ടുള്ള സഞ്ചാരമായി കാണുകയേവേണ്ടൂ. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു സൂര്യനു നക്ഷത്രങ്ങളിൽകൂടിയുള്ള ഈ സഞ്ചാരം വട്ടമെത്തിക്കുവാൻ ഒരു സംവത്സരം വേണമെന്നു കാണുകയും ചെയ്യാം.

സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ ഒരു സംവത്സരത്തിനിടയിൽ വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും തെറുമെന്നു നാം കണ്ടു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു? കിഴക്കോട്ടുള്ള സഞ്ചാരവും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടുമുള്ള നീങ്ങലും ഒന്നായിത്തന്നെ കഴിക്കണമല്ലോ. സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ കിടപ്പറിയുവാൻ നാം കറേക്കൂടി പരിശ്രമിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും മദ്ധ്യാഹ്നത്തിന്നു സൂര്യൻ ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തത്തിലിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഖമ

ഭൂതത്തിൽനിന്നു തെക്കും ചിലപ്പോൾ വടക്കുമായിരിക്കും. സമ നിരപ്പായിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നാട്ടിയ കുറിയുടെ നിഴലിൽനിന്നു ഖമഭൂതത്തിൽനിന്നുള്ള ഈ ദൂരം മനസ്സിലാക്കാം. അതു ഭാഗം കലകളായിത്തന്നെ ഗണിക്കാം. സൂര്യൻ ഖമഭൂതത്തിൽനിന്നു വടക്കാണെങ്കിൽ ഭാഗം കലകളായി കിട്ടുന്ന ഈ ദൂരത്തെ ഘടികാഖമഭൂതാന്തരാളത്തോടു തുല്യമായ സ്ഥലത്തെ അക്ഷത്തോടു കൂട്ടിയാൽ ഘടികാമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ദൂരം അറിയാം. ഈ ദൂരത്തിന്നു സൂര്യന്റെ അപക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ക്രാന്തി (Declination) എന്നു പറയുന്നു. സൂര്യൻ ഖമഭൂതത്തിൽനിന്നു തെക്കായിരിക്കുകയും ഖമഭൂതാന്തരം അക്ഷത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷത്തിൽനിന്നു ഖമഭൂതാന്തരം കളഞ്ഞതു സൂര്യന്റെ ഘടികാമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു വടക്കോട്ടുള്ള നീക്കം (അഥവാ ഉത്തരപക്രമം) ആയിരിക്കും. സൂര്യൻ ഖമഭൂതത്തിൽ



പരിലേഖം 18

തെഖവ . ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തം.

യു . ഉത്തരയുഖം.

ഖ . ഖമഭൂതം.

5 . ദക്ഷിണോത്തരഘടികാമണ്ഡലസംപാതം

0₁, 0₂, 0₃ . മദ്ധ്യാന്തരസമയത്തു സൂര്യന്റെ

സ്ഥിതികൾ.

നിന്നു തെക്കും ഖമഭൂതാന്തരം അക്ഷത്തെക്കാൾ അധികവുമായിരിക്കുമ്പോൾ ഖമഭൂതാന്തരത്തിൽനിന്നു അക്ഷം കളഞ്ഞതു സൂര്യന്റെ ഘടികാമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു തെക്കോട്ടുള്ള നീക്കം (ദക്ഷിണപക്രമം) ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം പരിലേഖത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകും.

അതിൽ '5ഖ' എന്നതു ഘടികാഖമഭൂതാന്തരാളം. ഇതു സ്ഥലത്തെ അക്ഷത്തിന്നു തുല്യവുമാണ്.

ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ദിവസംതോറും, അതില്ലെങ്കിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ, ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ നടത്തിയാൽ, മാച്ച് 21-ാം തീയതി സൂര്യൻ അപക്രമമില്ലെന്നും അന്നുതൊട്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഉത്തരാപക്രമം വലിച്ച് ജൂൺ 22-ാം തീയതി ഉത്തരാപക്രമം $23\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തോളം വലിച്ച് പിന്നീട് ചുരുങ്ങി സപ്തംവർ 23-ാം തീയതി പിന്നേയും അപക്രമം ശുന്യമാകുമെന്നും അന്നുതൊട്ടു ദക്ഷിണാപക്രമം വലിച്ച് ഡിസംബർ 22-ാം തീയതി $23\frac{1}{2}$ ഭാഗമായി പിന്നീട് ക്ഷയിച്ച് മാച്ച് 21-ാം തീയതിക്ക് അപക്രമം പിന്നേയും ശുന്യമാകുമെന്നും കാണാം. തെക്കും വടക്കും കവിഞ്ഞ അപക്രമം, അഥവാ പരമാപക്രമം തുല്യമെന്നും കാണാം.

മാച്ച് 21-ാം തീയതി സൂര്യൻ ഘടികാരമണ്ഡലസ്ഥനാകുന്നു. പിന്നീട് നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽ കൂടി കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്തോറും ഘടികാരമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു വടക്കോട്ടും മാറുന്നു. ഒരു ഗോളത്തിന്മേൽ ഘടികാരമണ്ഡലവും സൂര്യന്റെ ഈ സ്ഥാനങ്ങളും അടയാളം വെച്ചാൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതു ഘടികാരമണ്ഡലത്തിനു ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വൃത്തത്തിലാണെന്നു കാണാം. ഈ വൃത്തത്തിന്നു അപക്രമമണ്ഡലം, അഥവാ ക്രാന്തിമണ്ഡലം (Ecliptic) എന്നു പറയുന്നു. മാച്ച് 21-ാം തീയതി സൂര്യൻ ഘടികാരപക്രമമണ്ഡലങ്ങൾ അയ്യോനും മുറിയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ (ഘടികാരപക്രമസംപാതങ്ങളിൽ) ഒന്നിലായിരിക്കും. ഈ സ്ഥാനത്തിന്നു പൂർവ്വവിഷുവത്തു (Vernal Equinox) എന്നു പറയുന്നു. പൂർവ്വവിഷുവത്തിൽനിന്നു സൂര്യൻ അപക്രമവൃത്തമാറ്റമായി ഒരു വൃത്തപാദം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പരമാപക്രമമായ $23\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തോളം ഘടികാരവൃത്തത്തിൽനിന്നു നീങ്ങുന്നു. സൂര്യൻ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഘടികാരമണ്ഡലത്തോടു അടുത്തുവരുന്നു. അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ പകുതി സഞ്ചരിച്ചു തീരുമ്പോൾ സൂര്യൻ പിന്നേയും ഘടികാരമണ്ഡലസ്ഥനാകുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തു അപക്രമമണ്ഡലം

ലം ഘടികാമണ്ഡലത്തെ മുറിഞ്ഞു തെക്കോട്ടു കടക്കുന്നു. ഇതു സപ്തമ്പർ 23-ാംതിയതി. ഈ സ്ഥാനത്തിന്നു അപരവിഷുവത്ത് (Autumnal Equinox) എന്നു പറയുന്നു. സൂര്യൻ പിന്നേയും സഞ്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്ഷിണാപക്രമം വലിച്ചു ഡിസമ്പ്ര് 22-ാം തിയതി അതു പരമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. സൂര്യൻ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി ഭക്ഷിണാപക്രമം ചുരുങ്ങി മാച്ച് 21-ാംതിയതി. സൂര്യൻ പിന്നേയും ഘടികാമണ്ഡലസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പോൾ അപക്രമം ശുന്യവുമാകുന്നു. അഭിമാനവിശ്വാസങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ അന്ധരാവാത്തവർക്കു ഇപ്പോൾതന്നെ സംവത്സരം തുടങ്ങേണ്ടതും അവസാനിക്കേണ്ടതും മാച്ച് 21-ാംതിയതിയാണെന്നു തോന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

അപക്രമമണ്ഡലമെന്നു പറയുന്ന സൂര്യസഞ്ചാരമാർഗ്ഗം ഘടികാമണ്ഡലത്തെ പൂർ്വാപരവിഷുവത്തുകൾ എന്നു പറയുന്ന രണ്ടു പാതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേദിച്ചു പകുതി ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ വടക്കും പകുതി തെക്കുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വൃത്തമാകുന്നു. പൂർ്വാപരവിഷുവത്തുകൾ തമ്മിൽ അപക്രമമണ്ഡലമാർഗ്ഗമായും ഘടികാമണ്ഡലമാർഗ്ഗമായും അകലം ഒരു വൃത്താൽമാണെന്നും വരുന്നു. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിവ് $23\frac{1}{2}^{\circ}$ ഭാഗമാകുന്നു. ആകാശത്തിൽ അപക്രമമണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു മീനം, മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കർക്കടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം എന്നീ 12 നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽ കൂടിയാകുന്നു. ഇതു രേഖതിയിൽ കൂടിക്കടന്ന് കാർത്തികക്കും രോഹിണിക്കും ഇടയിൽ കൂടിപ്പോയി അശ്വിനീദേവകളുടെ തെക്കുഭാഗത്തുകൂടിക്കടന്ന് മകത്തിൽ ഏറവും പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രത്തെ സ്പർശിച്ച് അത്തത്തിന്നു നേരെ വടക്ക് വെച്ച് ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കു കടന്ന് ചിത്രയുടെ അടുത്തു തെക്കുഭാഗത്തുകൂടിപ്പോയി തുലാം 1 നേയും സ്പർശിച്ച് വൃശ്ചികം 2 ന്റെ അടുത്തു തെക്കുഭാഗത്തുകൂടെ കടന്ന്

ഉത്രാടത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുകൂടിയും ചന്ദ്രത്തിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തുകൂടിയും പോയി ഉത്രട്ടാതിക്ക് നേരെ അതിൽനിന്നു കടന്നു തെക്കുഭാഗത്തുവെച്ച് ഘടികാരമണ്ഡലത്തെ മുറിഞ്ഞ് വടക്കുഭാഗത്തേക്കു കടന്ന് പിന്നേയും രേഖതിയിൽ ചെന്നു ആകാശമണ്ഡലത്തെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നു.

അപക്രമവൃത്തത്തെ പൂർവ്വവിഷുവത്തു തൊട്ടു സൂര്യസഞ്ചാരമനുസരിച്ച് കിഴക്കോട്ടു 12 തുല്യരാശികളായി പൂർവ്വനാർഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രാശികൾക്ക് മേടം (Aries-മേടം), ഇടവം (Taurus-ഋഷഭം), മിഥുനം (Gemini), കർക്കടകം (Cancer), ചിങ്ങം (Leo-സിംഹം), കന്നി (Virgo), തുലാം (Libra), വൃശ്ചികം (Scorpio), ധനു (Sagittarius), മകരം (Capricorn), കുംഭം (Aquarius), മീനം (Pisces) എന്നാകുന്നു പേരുകൾ. ഈ രാശികളെക്കുറിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യശബ്ദങ്ങൾക്കും പാശ്ചാത്യശബ്ദങ്ങൾക്കും അർത്ഥം ഒന്നുതന്നെയെന്നുള്ളതു ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പൗരാണികത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു വൃത്തപാദം അകലമുള്ള രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾക്കും രാശികൂടങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. സാങ്കേതികഭാഷയിൽ അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യഭാഗം രാശികൂടങ്ങൾ. ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങൾ ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യഭാഗമാകുന്നു. അപക്രമവൃത്തത്തിന്നു എതിരായി രാശികൂടങ്ങളിൽകൂടിപ്പോകുന്ന വൃത്തങ്ങൾക്കും രാശികൂടവൃത്തങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപക്രമനവൃത്തങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. അപക്രമവൃത്തത്തിലുള്ള 12 രാശികളുടെ ആദ്യനാളുകളിൽകൂടി സങ്കല്പിക്കുന്ന 6 രാശികൂടവൃത്തങ്ങൾ ആകാശത്തെ ശശികലാകൃതിയിലുള്ള 12 തുല്യഖണ്ഡങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു. ഓരോ ഖണ്ഡവും അപക്രമവൃത്തത്തിൽ 30° വീതിയുള്ളതും അവിടുന്നു ഇരുവശത്തേക്കും വീതി ചുരുങ്ങി രാശികൂടങ്ങളിൽ വീതി തീരെ ഇല്ലാത്തതായും ഇരിക്കും. ഈ 12 ഖണ്ഡങ്ങളേയും 12 രാശികളായിത്തന്നെ കരുതാം. അങ്ങി

നെ കരുതുവോൾ ആകാശം മുഴുവൻ 12 രാശികളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വരും. അപക്രമമണ്ഡലത്തോടും രാശികൂടവൃത്തങ്ങളോടുംകൂടി സങ്കല്പിക്കുന്ന ആകാശത്തെ ഭഗോളമെന്നും ഈ വൃത്തങ്ങളെ ഭഗോളവൃത്തങ്ങളെന്നും പറയുന്നു.

ഭാരതീയജ്യോതിർഗണിതവിദഗ്ദ്ധന്മാർ ആകാശഗോളത്തെ മൂന്നു പ്രകാരം സങ്കല്പിച്ചതായി കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നാം കാണുന്ന നിലയിൽ അതിനെ ഖഗോളമായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഇതിന്നാസ്സദമായതു ക്ഷിതിജമണ്ഡലംതന്നെ. സമമണ്ഡലവും ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തവും ഇതിന്നു വിപരീതമായി നില്ക്കുന്നു. ഖഗോളം ദേശംതോറും വിഭിന്നമാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിത്യമുള്ള പ്രത്യക്ഷഭ്രമണത്തെ ആസ്സദമാക്കി ആകാശത്തെ വായുഗോളമെന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ കാൽമായ വൃത്തം ഘടികാമണ്ഡലം. ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭ്രമണം ആസ്സദമാക്കി സമയം കണക്കാക്കിവരുന്നു. ഇതിന്നു വിപരീതമായ ഉന്മണ്ഡലം കാരോ ധ്രുവകവൃത്തത്തിന്നും കാരോന്നും സൂര്യന്റെ വാഷികസഞ്ചാരമാഗ്നമായ അപക്രമമണ്ഡലത്തെ ആസ്സദമാക്കി ആകാശത്തെ ഭഗോളമായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു ഗോളങ്ങളിലും വെച്ചു ഏറവും സ്ഥിരമായതു ഭഗോളമത്രെ. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യരേഖയായ അപക്രമമണ്ഡലത്തെ ആസ്സദമാക്കി ഭാരതീയർ നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. അപക്രമമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു രാശികൂടവൃത്തമാഗ്നമായി നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ഉള്ള അകലത്തിന്നു വിക്ഷേപം (Latitude) എന്നു പറയുന്നു.

അപക്രമമണ്ഡലവും ഘടികാമണ്ഡലവും അന്യോന്യം മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാതസ്ഥാനങ്ങളാണല്ലോ പൂർവാപരവിഷുവത്തുകൾ. ഇവയിൽ 'പൂർവ്വിഷുവത്തു ഇപ്പോൾ രേവതിനക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു 19° പടിഞ്ഞാറാണ്'. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ദക്ഷിണായനാരംഭത്തിൽ സൂര്യൻ രേവതിയിൽനിന്നു 71° കിഴക്കും ഉത്തരായണാരംഭത്തിൽ $251^\circ (=71^\circ + 180^\circ)$ കിഴക്കും നില്ക്കും

നം. എന്നാൽ വേദാംഗജ്യോതിഷം എന്ന പുരാതനഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉത്തരായണാരംഭത്തിൽ സൂര്യൻ അവിട്ടം നക്ഷത്രമൊരുമിച്ച് നിന്നതായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിട്ടം രേഖതിയിൽ നിന്നു 297° കിഴക്കാകുന്നു. അതിനാൽ വേദാംഗജ്യോതിഷകാലംതൊട്ടു ഇതുവരെ ഉത്തരായണാരംഭസ്ഥാനമായ അയനസന്ധി $46^{\circ}(297^{\circ}-251^{\circ})$ പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീങ്ങിട്ടുണ്ടെന്നു വരുന്നു. ഏതു കാലത്തും ഈ അയനസന്ധിയുടെ 90° ഭാഗം കിഴക്കായിരിക്കും പൂർവ്വിഷുവത്ത്. അതിനാൽ ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ പൂർവ്വിഷുവത്തും അതോടുകൂടി അപരവിഷുവത്തും 46° പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീങ്ങിട്ടുണ്ടെന്നു വരുന്നു. വേദാംഗജ്യോതിഷകാലത്തു പൂർവ്വിഷുവത്തു രേഖതിയുടെ $27^{\circ}(46^{\circ}-19^{\circ})$ കിഴക്കായിരുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ നേരെ തെക്കായിരുന്നു. ഗർഗ്ഗമഹഷിയുടെ കാലത്തു പൂർവ്വിഷുവത്തു കാർത്തികക്കടുത്തായിരുന്നു. അതിനും മുമ്പ് പൂർവ്വിഷുവത്തു മകീരത്തിലായിരുന്നു എന്നും അതിനാലാണ് സംവത്സരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നത് എന്നതുമ്മത്തിൽ മകീരത്തിന്നു “ആഗ്രഹായണീ” എന്നു പേരുള്ളതെന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ പൂർവ്വിഷുവത്തിന്നു അപക്രമപ്പത്തത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടു ഒരു ഗതിയുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ധാരാളം തെളിവുകൾ കാണാം. ആധുനികനിരീക്ഷണംകൊണ്ടും പൂർവ്വിഷുവത്തു കൊല്ലത്തിൽ $50\frac{1}{2}$ വികലയോളം പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു അപക്രമമണ്ഡലവും അതിന്റെ പാശ്ചാത്യ രാശികൂടങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരമാണെന്നും ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നു മാറ്റമുള്ളതിനാലാണ് വിഷുവത്തുകൾക്ക് സഞ്ചാരമുണ്ടാകുന്നതെന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷുവൽസഞ്ചാരം നിമിത്തം ഘടികാമണ്ഡലത്തിന്നു അപക്രമമണ്ഡലത്തോടുള്ള ചരിവിന്ന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതിനാൽ രാശികൂടങ്ങളും ധ്രുവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

അക്ഷത്തിനും മാറും വരുന്നില്ല. ഉത്തരധ്രുവം ഉത്തരരാശി കൂടത്തിനു പുറം, ദക്ഷിണധ്രുവം ദക്ഷിണരാശികൂടത്തിനു പുറം മന്ദമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഒരു പരിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സുമാർ 26000 സംവത്സരം വേണ്ടിവരും. ഈ കാലം കൊണ്ടു വിഷുവത്തുകളും അപക്രമമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വട്ടം തിരിക്കുന്നു. വിഷുവത്തുകളുടെ ഈ സഞ്ചാരത്തിനു അയനചലനം (Precession of Equinoxes) എന്നു പറയുന്നു.

പൂർവ്വന്മാർ അപക്രമമണ്ഡലത്തെ 12 രാശികളായി ഭാഗിച്ച് അവയെ നാമകരണം ചെയ്യുന്ന കാലത്തു പൂർവ്വിഷുവത്തു മേഷം നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തായിരുന്നു എന്നു കരുതുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാനം ഇന്നു കാണുന്ന പൂർവ്വിഷുവത്തിൽനിന്നു 23°യോളം കിഴക്കാകുന്നു. അയനാംശം എന്നു പറയുന്ന ഈ അകലം 71-34 കൊല്ലത്തിൽ 1° പ്രകാരം വലിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. ഭാരതീയർ ഇന്നും മേഷാദിയെന്നു പറയുന്ന ഈ സ്ഥാനത്തൊട്ടു രാശികളെ കണക്കാക്കുകയും ഓരോ രാശിയിലും സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തെ സൗരമാസമായിക്കരുതി ആ മാസത്തിനു ആ രാശിയുടെ പേർ പറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. പാശ്ചാത്യർ പൂർവ്വിഷുവത്തൊട്ടാണ് രാശികളെ കണക്കാക്കുന്നത്. പൂർവ്വിഷുവത്തിനെ അവർ ഇന്നും മേഷാദിയെന്നത്മുള്ള First point of Aries എന്നുതന്നെ വിളിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു.

ഭാരതീയസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഏതു മാസത്തിലും സൂര്യൻ ആ മാസത്തിന്റെ പേരോടുകൂടിയ നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതു പ്രത്യേകം സുഖപ്രദമായ സംഗതിയാണെങ്കിലും, ഈ സമ്പ്രദായം തുടന്നുകൊണ്ടുപോയാൽ ദക്ഷിണോത്തരായണങ്ങളുടെ പ്രാരംഭമദ്ധ്യാന്ത്യങ്ങളും അവയെ ആശ്രയിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഋതുക്കളും പതിവായിപ്പറഞ്ഞുപോരുന്ന തിയതിക്കു മുമ്പുമുമ്പായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതു ഒരു വലിയ അസൗകര്യമാകുന്നു. ഏതാണ്ട് 1600 കൊല്ലം മുമ്പ്

മേടം 1-ാംതിയതി വന്നിരുന്ന ഉത്തരായണമദ്ധ്യം ഇന്നു മീനം 8-ാംതിയതിക്കടുത്തുണ്ടാകുന്നു. അന്നാകുന്നു യഥാർത്ഥവിഷു. ഇതു തുടന്നുകൊണ്ടുപോയാൽ 450 കൊല്ലവുംകൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരായണമദ്ധ്യം മീനം 1-ാംതിയതിയും, പിന്നേയും സംവത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കുംഭം 1-ാംതിയതിയും മകരം 1-ാംതിയതിയും വരുമെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. ഇതു കഷ്ടകന്മാർക്കു വലിയ അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടവരുത്തുമെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ് ഈ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രഗവർണ്മണിന്റേയും വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടേയും പുരസ്കാരമാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായം ഒരു കഷ്ടകരാജ്യത്തിന്നു ഒട്ടും ചേർന്നതല്ല.

സൂര്യൻ അപക്വമവൃത്തത്തിൽക്കൂടി കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൂര്യനോ മാറ്റു ജ്യോതിസ്സുകൾക്കോ ഇപ്രകാരം നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽക്കൂടി പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ടുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്നു ക്രമചാരം (Right Motion) എന്നും, ഇതിന്നെതിരായി കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്നു വക്രചാരം (Retrograde Motion) എന്നും പറയും. ക്രമചാരത്തിൽ ദിവസേന സഞ്ചരിക്കുന്ന കലവികലകൾക്ക് ഗതിയെന്നും വക്രചാരത്തിൽ ദിവസേന സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു വിഗതിയെന്നും പറയുന്നു. ഒരു സംവത്സരത്തിൽ $365\frac{1}{4}$ ദിവസമായതുകൊണ്ടും ആ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽക്കൂടി 360° സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സൂര്യന്റെ ഗതി ഏതാണ്ട് $1^\circ (=60')$ ആകുന്നു. സൂക്ഷ്മമദ്ധ്യമഗതി $59'-8''.2$ ആകുന്നു. ആധുനികയന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടോ, ചക്രം മുതലായ പ്രാചീനയന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടോ സൂര്യന്റെ ഗതിയളന്നാൽ സൂര്യന്നു എന്നും ഒരേ ഗതിയല്ലെന്നു കാണാം. മേഘാഭിയിൽനിന്നു 78° ചെന്നോടത്തു സൂര്യൻ ഏറ്റവും മന്ദമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഗതി $57'-10''$ മാത്രമായിരിക്കും. ഈ സ്ഥാനത്തിന്നു സൂര്യന്റെ

മനോചൂഢം (Apogee) എന്നു പറയുന്നു. ഇവിടന്നു ഗതി ക്രമേണ വലിച്ചുവരുന്നു. കൃത്യം 6 രാശികൂടി സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ചാൽ ചെല്ലുന്ന സ്ഥാനത്തു ഗതി $61^{\circ} 10''$ യുമാകുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തെ സൂര്യന്റെ പ്രതിമനോചൂഢം (Perigee) എന്നു പറയുന്നു.

സൂര്യൻ മേഷാദിയിൽനിന്നു സഞ്ചരിച്ച് മേഷാദിയിൽത്തന്നെ എത്തുവാൻ വേണ്ട കാലത്തെ നാം ഒരു സംവത്സരമെന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ദൈർഘ്യം $365^{\circ} 256' 36''$ ദിവസമാകുന്നു. നൂറാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതു അല്പം വലിച്ചുവരികയും ചെയ്യും. ഇതിന്നു നാക്ഷത്രവത്സരം (Siderial Year) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ഗണനയിൽ അയനചലനത്തെ തീരെ കണക്കാക്കാത്തതിനാൽ ഈ സംവത്സരത്തെ നിരയനസംവത്സരം എന്നും പറയാം. നാം സൗരവത്സരം എന്നു പറയുന്നതും ഇതുതന്നെ. പൂർവ്വിഷ്വരത്തു തൊട്ടു പൂർവ്വിഷ്വരത്തുവരെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം അയനചലനം കൊണ്ടു അല്പം ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. അതിന്റെ ദൈർഘ്യം 365.24220 ദിവസമാകുന്നു. ഇതിന്നു ആർതവത്സരം (Tropical Year) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ഗണനയിൽ അയനചലനത്തെക്കൂടി ആലോചിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന്നു ആയനവത്സരം എന്നും പറയാം. അയനചലനത്തിന്റെ ഗതി വലിച്ചുവരികയാൽ നൂറാണ്ടുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വത്സരം അല്പം ചുരുങ്ങി വരികയും ചെയ്യും.

സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അസ്തമിച്ചു പിന്നേയും ഉദിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലത്തിന്നു സാവനദിനം എന്നു നാം പറയുന്നു. സൂര്യന്റെ സ്ഥാനഭേദത്തെക്കൊണ്ടും ഗതിഭേദത്തെക്കൊണ്ടും സാവനദിനത്തിന്നു ചെറിയ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും ശരാശരിയെടുത്തു അതു ദിനദൈർഘ്യമായി കല്പിക്കുന്നു. നമുക്കു് ദിനം ഉദയംതൊട്ടും, പാശ്ചാത്യർ അർദ്ധരാത്രിതൊട്ടും തുടങ്ങുന്നു. സൂര്യന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽക്കൂടി കിഴക്കോട്ടു ഗതി

യുള്ളതിനാൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു പിന്നെയും ഉദിക്കുവാനുള്ള കാലം സാവനദിനത്തെക്കാൾ 10 വിനാഴിക ($=4$ മിനുട്ട്)യോളം കുറവുണ്ടായിരിക്കും. ഈ കാലത്തെ നാക്ഷത്രദിനം (Siderial day) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രവർഷത്തിൽ 365.25636 സാവനദിനങ്ങളും 366.25636 നാക്ഷത്രദിനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും.

സാക്ഷാൽ സൂര്യന്റെ അപക്രമവൃത്തസ്ഥാനത്തെ സ്പട സൂര്യനെന്ന് പറയുന്നു. സ്പടസൂര്യന്റെ ദിനഗതിക്ക് ഭേദമുള്ളതായി കണ്ടു. മനോചുത്തിലോ പ്രതിമനോചുത്തിലോ സ്പടസൂര്യനൊരുമിച്ചു മറൊരു സൂര്യനെ കല്പിച്ച് അതു സൂര്യന്റെ മദ്ധ്യമഗതിയോടുകൂടി അപക്രമവൃത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു വെച്ചാൽ, അതിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നു മദ്ധ്യമസൂര്യനെന്ന് പറയുന്നു. പൂർവ്വിഷ്വരത്തിൽ മദ്ധ്യമസൂര്യൻ നില്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാമതൊരു സൂര്യനെ സങ്കല്പിച്ച്, അതു സൂര്യന്റെ മദ്ധ്യമഗതിയോടുകൂടി ഘടികാരമണ്ഡലം വഴി സഞ്ചരിച്ചാൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നു ഘടികാരമദ്ധ്യമസൂര്യനെന്ന് പറയുന്നു. ഈ സൂര്യനെ കാലസൂര്യനെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല, സൗകര്യമുണ്ട്.

നാം ആകാശത്തിൽ സൂര്യനെ കണ്ടു പറയുന്ന സമയത്തിന്നു പ്രത്യക്ഷസമയം (Apparent Time) എന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഘടികാരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയം ഈ സമയമല്ല, അതു കാലസൂര്യനിൽനിന്നു കണക്കാക്കുന്ന സമയമാകുന്നു. കാലസൂര്യൻ ശരിക്കു് തെക്കുവടക്കു രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രാദേശികസമയം (Local Time) 12 മണിയെന്നു പറയുന്നു. പ്രത്യക്ഷസമയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രാദേശികസമയം ലഭിക്കുള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷസമയത്തിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാലത്തിന്നു സംസ്കാരം എന്നു പറയുന്നു. ഈ സംസ്കാരങ്ങളെ ജ്യോതിഷി

കുറു ഗണിക്കുകതന്നെ വേണം. താഴെ എല്ലാ മാസം 1-ാം തീയതിക്കും ചെമ്മേണ്ട സംസ്കാരം മിനുട്ടിനു കൃത്യമായിക്കൊടുക്കുന്നു.

പ്രാദേശികസമയം = പ്രത്യക്ഷസമയം + സംസ്കാരം.

ജന. 1 + 3 മി.	മേയി 1 — 3 മി	സപ്ത. 1 — 10മി.	ഫിബ്ര. 14 + 15മി.
ഫെബ്ര. 1 + 13 മി	ജൂൺ 1 — 2 മി	ഒക്ടോ. 1 — 10മി	മേയി 15 — 4 മി
മാർച്ച് 1 + 13 മി	ജൂലായി 1 + 3മി	നവ. 1 — 16മി	
ഏപ്രി. 1 + 4 മി	ആഗസ്റ്റ് 1 + 6മി	ഡിസ. 1 — 10മി	From.R. S. Ball.

ഇതിനും പുറമെ സാധാരണഘടികാരങ്ങളിൽ കാണുന്നതു (കാണേണ്ടതും) പ്രാദേശികസമയമല്ല. അതു ഗ്രീനിച്ചിൽനിന്നു $72\frac{1}{2}^{\circ}$ കിഴക്കുള്ള യൂറോപ്യന്തത്തിലെ പ്രാദേശികസമയമാകുന്നു. അതിന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാണ്ടാർഡ് സമയം (I. S. T.) എന്നു പറയും. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാണ്ടാർഡ് സമയം 12 മണിയാണെങ്കിൽ, ഗ്രീനിച്ചിൽനിന്നു 76° മാത്രം കിഴക്കായ തിരുവനന്തപുരത്തെ സമയം $(82\frac{1}{2} - 76) \times 4 = 26$ മിനുട്ട് കുറവായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രാദേശികസമയം 11മ. 34. മി. ഇതു ഒക്ടോബർ 10-ാം തീയതിയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രത്യക്ഷസമയം കിട്ടുവാൻ $(-10) + (-6)$. $\frac{1}{2}$ മിനുട്ട് പ്രാദേശികസമയത്തിൽനിന്നു കളയണം. എന്നു വെച്ചാൽ 12 മിനുട്ട് കൂട്ടണം. ഫലം 11മ. 46മി.


$82\frac{1}{2}^{\circ}$ പൂർവ്വരേഖയിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭേദങ്ങളിൽ പ്രാദേശികസമയം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാണ്ടാർഡ് സമയത്തെക്കാൾ കുറവും, കിഴക്കുള്ള ഭേദങ്ങളിൽ അധികവുമായിരിക്കും. ഒരു ഭാഗത്തിന്നു 4മി. (=10വിനാഴിക) വീതം കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാൽ മതി. ഈ ഭേദങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

സൂര്യനു ഉത്തരാപകൃമമുള്ളപ്പോൾ ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ വടക്കുള്ള ദൂവുത്തങ്ങളിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു.


ഈ വൃത്തങ്ങളുടെ അർദ്ധാധികം നിരക്ഷവൃത്തത്തിന്റെ വടക്കുള്ള ദേശങ്ങളിൽ ക്ഷിതിജ്ഞിനാ മീതെയായിരിക്കയാൽ അവിടങ്ങളിൽ പകൽ അധികമായും രാത്രി കുറവായും ഇരിക്കും. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ഉഷ്ണം മുഴുവൻ രാത്രിസമയത്തു ഭൂമിക്കു വിട്ടുകളയുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സൂര്യനു ഉത്തരാപക്രമമുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഉത്തര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഷ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. സൂര്യനു ദക്ഷിണാപക്രമമുള്ള കാലം പകൽ കുറഞ്ഞിരിക്കയും രാത്രി അധികമായിരിക്കയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഇക്കാലത്തു ശൈത്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഉത്തരായണത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധവും ദക്ഷിണായനത്തിന്റെ പൂർ്വാർദ്ധവും കൂടിയ വത്സരാർദ്ധം ഉത്തര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഷ്ണകാലവും, സംവത്സരത്തിന്റെ മറ്റൊരു അർദ്ധം ശീതകാലവുമായിത്തീരുന്നു. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ദക്ഷിണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉഷ്ണകാലവും ശീതകാലവും ഇതിനു വിപരീതമായും ഉണ്ടാകുന്നു.

ഉഷ്ണകാലത്തു ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കുവാൻ മറ്റൊരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ട്. സാധാരണദിവസങ്ങളിൽതന്നെ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും സൂര്യരശ്മികൾക്ക് ചൂടു കുറവായും മദ്ധ്യാഹ്നത്തിനടുത്തു ചൂടു അധികമായും ഇരിപ്പാൻ കാരണം സൂര്യന്റെ ഉന്നതിയിൽ വരുന്ന ഭേദംകൊണ്ടാണെന്നു കാണാം. വായുമണ്ഡലം ഭൂമിയെ സർവ്വത്ര ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തടിച്ച പുതപ്പാകുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉന്നതി കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ എത്തുവാൻ ഈ പുതപ്പിൽകൂടി കുറെ അധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം. ഉന്നതി അധികമായാൽ പുതപ്പിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം കുറയും. ഇതു അടുത്തഭാഗത്തുള്ള പരിലേഖത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകും. അതിൽ ഭൂപ്രകൃത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അതിന്റെ മീതെയുള്ള വായുമണ്ഡലഭാഗവും, വിവിധ ഉന്നതികളിൽനിന്നു വരുന്ന മൂന്നു രശ്മികളും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉന്നതി അധികമായിരിക്കുമ്പോൾ രശ്മിക്കു വായുമണ്ഡലത്തെ

കടക്കുവാനുള്ള ദൂരം കുറവെന്നും, 2ഉം 3ഉം രശ്മികളെപ്പോലെ ഉന്നതി കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ വായുമണ്ഡലത്തെക്കുടിപ്പാൻ അധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെന്നും കാണാം. വായുമണ്ഡലത്തിൽകൂടി രശ്മികൾ കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കണങ്ങളിനേയും അതിലുള്ള ധൂളിജാലങ്ങളിനേയും അവ തട്ടി അവയുടെ ഉഗ്രത കുറഞ്ഞുപോകുന്നു. അധികം ദൂരം കടക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ അധികം കുറഞ്ഞുപോകും. സൂര്യനു ഉത്തരാപക്രമമുള്ളപ്പോൾ



പരിലേഖം 19



പരിലേഖം 19

സൂര്യന്റെ ശരാശരി ഉന്നതി ദക്ഷിണാപക്രമകാലത്തെ ശരാശരിയെക്കാൾ അധികമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഉത്തരാപക്രമകാലത്തു ദക്ഷിണാപക്രമകാലത്തെപ്പോലെ സൂര്യരശ്മികളുടെ ഉഗ്രതക്കു ക്ഷയം വരുന്നില്ല. വലത്തുള്ള പരിലേഖത്തിൽ ഒരു വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു രശ്മിജാലങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തു പതിയുന്നതായിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടു രശ്മിജാലങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉഷ്ണം ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഒന്നിലുള്ളതു കുറവുസ്ഥലത്തും മറേറതിലുള്ളതു അധികം സ്ഥലത്തും വിതരണംചെയ്തതായിക്കാണാം. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു കാരോ ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിനും കിട്ടുന്ന ഉഷ്ണം അധികവും അധികമായ സ്ഥലത്തു കാരോ ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിനു കുറവും ആകുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉന്നതനായ സൂര്യനു നന്തനായ സൂര്യനെക്കാൾ തപനശക്തി അധികമാകും.

ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവൃത്തിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്നതു സൂര്യന്റെ ഭക്ഷിണോത്തരായണങ്ങളാണെന്നു സ്പഷ്ടമത്രേ. അതിനാൽ അയനങ്ങൾ കാരോ പ്രദേശത്തും സംവത്സരത്തെ ഉഷ്ണകാലമായും ശീതകാലമായും ഭാഗിക്കുന്നു.

നിരക്ഷരേവയിൽ ഈ ഭേദം കാണുകയില്ല. എന്നാൽ അവിടന്നു വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും ചെല്ലുന്തോറും ഈ ഭേദം അധികമധികമായി വരുന്നു. ഈ ഭേദമാണ് സംവത്സരത്തെ പല ജ്യോതിഷമായി ഭാഗിക്കുന്നത്. ഭക്ഷിണഭാരതത്തിൽ ഉഷ്ണജ്യോതി, ശീതജ്യോതി എന്നു രണ്ടു ജ്യോതികളേ വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവയിൽ കാറുകൊണ്ടും പവ്വതനിരകളുടെ കിടപ്പുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന മഴക്കാലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതിനാൽ ജ്യോതികൾ പലതായിത്തീരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഉഷ്ണജ്യോതി മാർച്ച് തൊട്ടു സപ്തമ്പർവരെയും ശീതജ്യോതി ഒക്ടോബർ മുതൽ ഫിബ്രവരി വരെയുമാകുന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ, ജൂലായി, ആഗസ്റ്റ് ഈ മാസങ്ങളിലും നവമ്പ്രിലും ഉണ്ടാകുന്ന മഴക്കാലങ്ങൾ സംവത്സരത്തെ 5 വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു. ഡിസമ്പ്ര്, ജനുവരി ഒരവിധം ശീതകാലം. ഫിബ്രവരി, മാർച്ച്, എപ്രിൽ, മേയി ഇവ ഉഷ്ണകാലം. ജൂൺ, ജൂലായി, ആഗസ്റ്റ് ഇവ കാലവർഷകാലം. സപ്തമ്പർ, ഒക്ടോബർ ഇവ പലവിധത്തിലും സുഖപ്രദമായ കാണക്കാലം. നവമ്പ്ര് തുലാവർഷകാലവുമാകുന്നു.

സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ശരത്ത്, ഹേമന്തം, ശിശിരം എന്നു ആറു ജ്യോതികൾ ഉത്തരഭാരതത്തിന്നു പററിയവയാകുന്നു. ചൈത്രം, ചൈശ്വം, ജ്യേഷ്ഠം, ആഷാഢം, ശ്രാവണം, പ്രോഷ്യാദം, ആശ്വിനം, കാർത്തികം, മാർഗ്ഗശീർഷം, പൗഷം, മാഘം, ഫാൽഗുനം എന്നീ ചന്ദ്രമാസങ്ങളെ ഇനിയത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്. ചൈത്രാദി ഈരണ്ടു മാസങ്ങൾക്കു വസന്താദി ആറു ജ്യോതികളാണെന്നാകുന്നു പുരാതനഭാരതീയാഭിപ്രായം. ഈ ആറു

ഋതുക്കളിൽ ഗ്രീഷ്മം അത്യുഷ്ണകാലവും ഹേമന്തം അതിശീതകാലവുമാകുന്നു.

ശീതമേഖലയിൽ വസിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യർ സംവത്സരത്തെ മാച്ച് 21-ാം തീയതിതൊട്ടു മൂന്നു മാസകാലങ്ങളെ സ്പ്രിങ്ങ് (Spring), സമ്മർ (Summer), ഓട്ടം (Autumn), വിൻറർ (Winter) എന്ന നാലു ഋതുക്കളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ വേണ്ടിവരുന്നേടത്തു വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, ശരത്ത്, ഹേമന്തം എന്നായി തജ്ജമ ചെയ്യാം. ഗ്രന്ഥവിസ്താരഭയത്താൽ ഋതുക്കളെ വിവരിക്കുന്നില്ല.

6. ചന്ദ്രന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും സഞ്ചാരങ്ങൾ

1. ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരം.

അസ്തമനത്തിനുശേഷം ചന്ദ്രനേയും ആഹ്ളാജനകമായ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തേയും കുറെ ദിവസം കാണാതെയിരുന്ന ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് പിന്നേയും ദൃശ്യമാകുന്നത് പശ്ചിമാംബരത്തിൽ അസ്തമിച്ച സൂര്യനടുത്തായി നമുക്ക് വീതികൂടിയ വൃത്തമാപത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാകുന്നു. വാസ്തവ്യത്തോടുകൂടിയോ എന്നു തോന്നാമോ ഈ ചന്ദ്രനെ നാം ബാലചന്ദ്രൻ (Crescent moon) എന്നു പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നു 12 ഭാഗത്തിലധികം അകന്നിരിക്കും. ബാലചന്ദ്രന്റെ മുഴുത്ത ഭാഗം സൂര്യനിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കും. മുഴുത്ത ഈ മദ്ധ്യഭാഗത്തുനിന്നു ഇരുവശത്തേക്കും വളഞ്ഞു കൂർത്തുവരുന്ന ശൃംഗങ്ങൾ (Horns) എന്ന ഭാഗങ്ങൾ സൂര്യനെതിരായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ബാലചന്ദ്രൻ വലുതായി വരികയും സൂര്യനിൽനിന്നു അകന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, പ്രകാശം വലിക്കുകയും അതു അധികമായി സമയം നീണ്ടുനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആറ് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യോസ്തമനസമയത്തു ചന്ദ്രനെ ഏതാണ്ട് ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തത്തിന്റെ അടുത്തു കാണാം. ചന്ദ്രന്റെ ബാലഭഗ തീച്ചയായും കഴിഞ്ഞു. ശൃംഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി. ആകൃതിയിൽ ചന്ദ്രൻ ഒരല്പവൃത്തവുമായി. പിന്നേയും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നധികമായി അകലുകയും വലുതായി വരികയും, നിലാവുള്ള സമയം അധികമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം കണ്ടതുമുതൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുന്നതോടുകൂടി ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണവൃത്താകൃതിയെ പ്രാപി

ക്കുന്നു. അന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി ചന്ദ്രൻ കിഴക്കുകുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ നിലാവുണ്ടായിരിക്കും. ആ ദിവസത്തെ നാം പെരണ്ണമി എന്നും അന്നത്തെ ചന്ദ്രനെ പൂണ്ണചന്ദ്രൻ (Full moon) എന്നും പറയുന്നു.

പിറേന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു രണ്ടു നാഴിക കഴിഞ്ഞാലേ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നുള്ളൂ. ചന്ദ്രന്റെ പൂണ്ണവൃത്താകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടിയിരിക്കും. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുനിന്നു അല്പം പോയതായി കാണും. പിന്നീടു ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഈ രണ്ടു നാഴിക വൈകി ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുകയും ചന്ദ്രന്റെ ആകൃതിക്ക് ക്ഷയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പത്തുപന്ത്രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പുലരുവാൻ സമയമുള്ളപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ കിഴക്കുഭാഗത്തു ബാലചന്ദ്രാകൃതിയിൽ കാണാം. പക്ഷെ ഇതു ബാലചന്ദ്രനല്ല, വൃദ്ധചന്ദ്രനാകുന്നു. ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രന്റെ മുഴുത്ത ഭാഗം സൂര്യനു നേക്കും ശൃംഗങ്ങൾ സൂര്യനെതിരായും ഇരിക്കും. പെരണ്ണമി കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ തീരെ കാണുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി ചന്ദ്രനും ഉദിക്കുന്നപോലെയിരിക്കും. അന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ, ചന്ദ്രൻ ക്ഷിതിജ്ഞിന മീതെയുണ്ടായിരിക്കാം. സന്ധ്യാപ്രകാശത്തിൽപെട്ട ചന്ദ്രനെ നമുക്കു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിറേന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ പടിഞ്ഞാറു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സ്ഥാനത്തിനടുത്തു ബാലചന്ദ്രനായിക്കാണാം. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാകുവാൻ സുമാർ 29½ ദിവസം വേണം. ഈ കാലത്തെ നാം ഒരു ചാന്ദ്രമാസമെന്നു പറയുന്നു. സൂര്യോസ്തമനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിലാവു കാണുന്ന ചാന്ദ്രമാസാൽത്തെ ശുക്ലപക്ഷമെന്നും മറ്റൊരു അർദ്ധത്തെ കൃഷ്ണപക്ഷമെന്നും പറയുന്നു. നിലാവു തീരെയില്ലാത്ത ദിവസത്തിന്നു അമാവാസിയെന്നു പേർ.

സൂര്യൻതന്നെ നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽകൂടി ദിവസേന ഏതാണ്ട് 1 ഭാഗം വീതം കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനാവ

ഒട്ടേ ഇങ്ങിനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂര്യനിൽനിന്നും ദിവസേന കിഴക്കോട്ടു 12 ഭാഗത്തോളം അകന്നാകുന്നു പോകുന്നു. അതിനാൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനു 13 ഭാഗംവീതം നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. കുറെക്കൂടി കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ മദ്ധ്യമദിനഗതി $13^{\circ}.10' - 35''$ ആകുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ഗതിയിലും ഏറാക്കാവുകൾ ഉണ്ട്. ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽകൂടി അപക്രമമണ്ഡലത്തിന്നു അടുത്തുതന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണപക്ഷാന്ത്യത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അപക്രമമണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരേ സ്ഥാനത്തുതന്നെ നില്ക്കുന്നു. സൂര്യൻ അപക്രമമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ തെക്കോ വടക്കോ മാറിയുമായിരിക്കാം. പിന്നീടു രണ്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെക്കാൾ വേഗം സഞ്ചരിച്ച്, അകന്നാകുന്നു പോകുന്നു. പൗഷ്ണമാസാന്ത്യത്തിൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നു 180° അകന്നിരിക്കും. പന്ത്രണ്ടിനെ ഭാഗം അകലുവാനുള്ള കാലത്തെ ഒരു തിഥിയെന്നു പറയുന്നു. അമാവാസ്യന്ത്യം മുതൽ പൗഷ്ണമാസ്യന്ത്യംവരെ ഇങ്ങിനെ ശുക്ലപക്ഷപ്രതിപദാദി 15 തിഥികളാകുന്നു. പൗഷ്ണമി കഴിഞ്ഞാലും ചന്ദ്രൻ കിഴക്കോട്ടകുന്നാകുന്നു പോകുന്നു. മറുവശത്തു സൂര്യനടുത്തും വരുന്നു. അതിനാൽ പൗഷ്ണമാസ്യന്ത്യം മുതൽ അമാവാസ്യന്ത്യംവരെ കൃഷ്ണപക്ഷപ്രതിപദാദി 15 തിഥികളും ഉണ്ടാകുന്നു.

ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു പകുതി അപക്രമമണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തും മറൊരു പകുതി വടക്കുഭാഗത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായിക്കാണാം. ഈ മാർഗ്ഗത്തിന്നു വിക്ഷേപവൃത്തമെന്നു പേര്. ചന്ദ്രൻ വിക്ഷേപവൃത്തമാർഗ്ഗമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അപക്രമമണ്ഡലത്തെ തെക്കുനിന്നു വടക്കോട്ടു കടക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ രാഹു (പൂർവ്വാതൻ-Ascending Node of the Moon) എന്നും, അവിടന്ന് 6 രാശിയുംകൂടി സഞ്ചരിച്ച് അപക്രമവൃത്തത്തെ വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ടു കടക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ കേതു

(അപരപാതൻ-Descending node) എന്നും പറയുന്നു. രാഹുവിൽനിന്നു ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി അപക്രമവൃത്തത്തിൽനിന്നു അകന്നകന്നു വരുന്നു. ഈ അകലത്തിന്നു വിക്ഷേപം (Latitude) എന്നു പേര്. രാഹുവിൽനിന്നു 3 രാശി സഞ്ചരിച്ചാൽ പരമവിക്ഷേപമായി. അതു 5°-8' ആകുന്നു. അതു വിക്ഷേപാപക്രമവൃത്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവിന്നു തുല്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നേയും ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി വിക്ഷേപം ചുരുങ്ങിവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ കേതുവിൽ എത്തുമ്പോൾ വിക്ഷേപം ശൂന്യമായിത്തീരുകയും കേതുവിൽനിന്നു ചന്ദ്രൻ അകന്നു പോകുന്നതോടുകൂടി ദക്ഷിണവിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചുവന്ന് പിന്നേയും ചുരുങ്ങി ചന്ദ്രൻ രാഹുവിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി വിക്ഷേപം ശൂന്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാഹുകേതുകൾ അപക്രമവൃത്തത്തിൽ സ്ഥിരമായ സ്ഥാനങ്ങളല്ല. അവക്ക് കൊല്ലത്തിൽ സൂര്യൻ 19½ ഭാഗം വിതം വിഗതിയുണ്ട്. രാഹുകേതുകൾക്ക് ഇപ്രകാരം സഞ്ചാരമുള്ളതിനാൽ ഭാരതീയജ്യോതിഷത്തിൽ അവയെ ഗ്രഹങ്ങളായിക്കരുതിവരുന്നു. അവയെ തഥോഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. വിക്ഷേപവൃത്തത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും മന്ദമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ചന്ദ്രമന്ദോച്ചാ എന്നും ചന്ദ്രതുംഗം എന്നും പറയുന്നു. ചന്ദ്രമന്ദോച്ചം വിക്ഷേപവൃത്തമാർഗ്ഗമായി കൊല്ലത്തിൽ 40-41' വീതം കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 9 കൊല്ലംകൊണ്ടു വട്ടം തിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചന്ദ്രനു നക്ഷത്രഗണങ്ങളിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ച് വട്ടം തിരിക്കുവാൻ 27.32 ദിവസം വേണം. ഇതനുസരിച്ച് അപക്രമവൃത്തത്തെ 27 സമഭാഗമാക്കി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അശ്വതി, ഭരണി, മുതലായ പേരുകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളിലും അവയുടെ തെക്കും വടക്കുമായിട്ടാണ് അശ്വതി മുതലായ 27 നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ച

ഗ്രന്ഥം അപക്വമൃത്തത്തിന്നടുത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് അശ്വതി ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലത്തെ അശ്വതി നക്ഷത്രകാലം എന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ 27 നക്ഷത്രകാലങ്ങളേയും കണക്കാക്കി വരുന്നു. അപക്വമൃത്തത്തിന്റെ അശ്വിനാദി ഭാഗങ്ങളിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലങ്ങളെയാണ് അശ്വിനാദി 27 ഞാറുവേലകൾ എന്നു പറയുന്നത്.

അമാവാസ്യാന്ത്യത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൂടി നിലകൂടുന്ന ടത്തുനിന്നു ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിച്ച് 27.32 ദിവസത്തിൽ വട്ടം തിരിച്ച് പിന്നെയും അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കു സൂര്യൻ അവിടെ നിന്നു സമാന്തര 27 ഭാഗം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ പിന്നെയും സൂര്യനെക്കുറിച്ചെത്തുവാൻ രണ്ടിൽ ചിലപാദം ദിവസവും കൂടി വേണം. അതിനാൽ സൂര്യനിൽനിന്നു വിട്ട് ചന്ദ്രനും പിന്നെയും സൂര്യനെ പ്രാപിക്കുവാൻ 29½ ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരുന്നു. ഈ കാലത്തെ ചാന്ദ്രമാസമെന്നു പറയുന്നു. വെണം മുഖ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യൻ മേഷാദി 12 രാശികളിൽ കൂടിപ്പോകുന്ന കാലങ്ങളെ 12 സൗരമാസങ്ങളായും കരുതിവരുന്നു. ഈ 12 സൗരമാസങ്ങൾക്കിടയിൽ 12 ചാന്ദ്രമാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ 11 ദിവസത്തോളം അധികമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ഏതാണ്ട് മുമ്പു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ചാന്ദ്രമാസം സൗരമാസങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി വരുന്നു. ഇതിനെ അധിമാസമെന്നും പറയുന്നു.

മുമ്പു കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ 37 ചാന്ദ്രമാസങ്ങൾ വരുന്നവയിൽ ഏതാണ് അധിമാസമായിക്കരുതേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്നു ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. അതു അല്പം പറയാം. സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽനിന്നു അടുത്ത രാശിയിലേക്കു കടക്കുന്നതിനെ രണ്ടാമത്തെ രാശിയിലേക്കുള്ള സംക്രമം എന്നു പറയുന്നു. 37 ചാന്ദ്രമാസങ്ങൾക്കിടയിൽ 36 സംക്രമങ്ങളുണ്ടാകുവാനു വഴിയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഒരു ചാന്ദ്രമാസം സംക്രമരഹിതമായിരിക്കും. ഈ മാസത്തെയത്രെ അധിമാസമായിക്കരുതുന്നത്.

ഇതു സാമാന്യനിയമം. അധിമാസത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ശുഭകേര്മങ്ങൾക്കു പറ്റിയതായിക്കരുതുന്നില്ല. ചാന്ദ്രമാസങ്ങളെ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൗഷ്ണമിദിവസം ചന്ദ്രനെ ഏതു നക്ഷത്രത്തോടുകൂടി കാണുന്നുവോ ആ പൗഷ്ണമി ഉൾക്കൊണ്ട ചാന്ദ്രമാസത്തിന്നു ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നു. ചൈത്രാദിപേരുകൾ ഇങ്ങിനെ വന്നതാകുന്നു. ചൈത്രമാസത്തിൽ പൗഷ്ണമിദിവസം ചന്ദ്രൻ ചിത്രനക്ഷത്രത്തോടുകൂടിയിരിക്കും. മറ്റു മാസങ്ങളിലെ പൗഷ്ണമിയിന്നാൾ വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, പൂരാടം മുതലായ നക്ഷത്രങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കും. ചൈത്രാദിമാസങ്ങൾ സാമാന്യേന മേഷാദിസംക്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടവയുമായിരിക്കും. അധിമാസത്തെ സംവത്സരഗണനയിൽപ്പെടുത്തുകയില്ല. ബാക്കി ചൈത്രമാസംതൊട്ടു 12 ചാന്ദ്രമാസങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാലത്തെ ഒരു ചാന്ദ്രവർഷമെന്നു പറയുന്നു. പുരാതനസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഭക്ഷിണ ഇന്ത്യയിൽ സൗരവർഷവും, സൗരമാസങ്ങളും, തിയതികളും ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ ചാന്ദ്രവർഷവും, ചാന്ദ്രമാസങ്ങളും, തിഥികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അറബികളെ അനുകരിച്ച് ഇവിടത്തെ മുഹമ്മദീയർ അധിമാസത്തെ വിടാതെ 12 ചാന്ദ്രമാസങ്ങളടങ്ങിയ കാലത്തെ സംവത്സരമായിക്കരുതുന്നു. അതിനാൽ ബാക്കിയുള്ളവക്ക് 36 വയസ്സാവുന്ന കാലത്തിനിടയിൽ ചില മുഹമ്മദീയർക്ക് 37 വയസ്സാവാറുണ്ട്. മീലാദിനബി (നബിദിനം) മുതലായ വിശേഷദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏതു മാസത്തിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്നു കാരണം ഈ സംവത്സരഗണനാസമ്പ്രദായമാകുന്നു.

2. ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം.

കുറെ കാലം കാണാതിരുന്ന ശുക്രനെ സാധാരണയായി ആദ്യമായിക്കാണുക സൂര്യാസ്തമനത്തിനുശേഷം പടിഞ്ഞാറാകുന്നു. ക്ഷിതിജ്ഞാതനിന്നു അധികം ഉയരത്തായിരിക്കയില്ല. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുംതോറും അസ്തമനസമയത്തു ശുക്രന്റെ

ഉന്നതി വലിച്ചുവരുന്നു. അതോടുകൂടി ഗ്രഹത്തിന്റെ ശോഭയും വലിച്ചുവരുന്നു. നിലാവില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ വഴി കണ്ടു നടക്കുവാൻ ആ പ്രകാശം ധാരാളംമതി. ശുക്രപ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ നിഴൽകൂടിക്കാണാം. സൂര്യനുതന്നെ ക്രമഗതി 1 ഭാഗത്തോളമുണ്ടായിരിക്കെ സൂര്യനിൽനിന്നു കിഴക്കോട്ടകുന്നുപോകുന്ന ശുക്രൻ ഈ കാലത്തു ക്രമഗതിയാണെന്നു തീർച്ചതന്നെ. കുറെ കാലം കാണുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതു സൂര്യനു വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സൂര്യനടുത്തായി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഗ്രഹത്തെ മങ്ങിക്കാണാതാകുന്നതിന്നു ഗ്രഹത്തിന്റെ മെഘസ്വ്യാ എന്നു പറയുന്നു. മെഘസ്വ്യാകാലത്തു ഗ്രഹത്തിന്നു ക്രമഗതികൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഘസ്വ്വത്തിന്നു ക്രമമെഘസ്വ്വമെന്നു പറയും. ക്രമമെഘസ്വ്വം കഴിഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാറു ഉദയംകൊണ്ടു ശുക്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നു അകന്നുകുന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ കുറെ കാലം അകന്നതിന്റെശേഷം സൂര്യനോടു അടുത്തടുത്തു വരുന്നു. ശുക്രന്റെ അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ദിവസേന നോക്കിയാൽ, ഇപ്പോഴും ശുക്രനു ക്രമഗതിയുള്ളതായി കാണാം. പക്ഷെ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശുക്രൻ സൂര്യനോടടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്നുപോലെ തോന്നും. സൂര്യനോടടുക്കുന്നതു സൂര്യൻ കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. ഈ സ്തംഭനത്തിനുശേഷം ശുക്രൻ ക്രമഗതി മാറി വക്രഗതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ ശുക്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ കിഴക്കോട്ടും സഞ്ചരിക്കുകയാൽ രണ്ടും മുമ്പത്തെക്കാൾ വേഗം അടുക്കുന്നു. മൂന്നാഴ്ച കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പ് ഗ്രഹത്തിന്നു മെഘസ്വ്വം വരുന്നു. ഇതിന്നു വക്രമെഘസ്വ്വം എന്നു പേര്. വക്രമെഘസ്വ്വം ഏതാണ്ട് പത്തു ദിവസത്തോളമുണ്ടാകും. വക്രമെഘസ്വ്വം കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്രനെ പുലരുന്നതിന്നു മുമ്പ് കിഴക്കു കാണാം. ജ്യോതിഷഭാഷയിൽ ശുക്രൻ വക്രമെഘസ്വ്വം കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കു ഉദയംകൊ

ജ്ഞാനം. വക്രഗതിക്കു ദിവസംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങളിൽകൂടിയുള്ള സൂര്യന്റെ ഗതി കിഴക്കോട്ടും ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗതി പടിഞ്ഞാറോട്ടുമായിരിക്കയാൽ അവ വേഗം അകന്നു വരുന്നു. സൂര്യോദയസമയത്തു ശുക്രന്റെ ഉന്നതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. പിന്നെ പശ്ചിമോന്മുഖമായ ഗതി മന്ദമായിത്തീർന്നു ക്രമേണ ഇല്ലാതെയായി ഗ്രഹം ക്രമഗതിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ കാലത്തും ഗ്രഹം സൂര്യനിൽനിന്നകലുകയും സൂര്യോദയസമയത്തു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉന്നതി വർദ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്യും. ഉന്നതി പരമാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു പിന്നീട് കുറയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രഹത്തിന്റെ ക്രമഗതി അപ്പോൾ സൂര്യന്റെ ഗതിയെക്കാൾ അധികമായിരിക്കും. കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ വളരെ അടുത്തത്തുകയാൽ, ഗ്രഹത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഇതു ഗ്രഹത്തിന്റെ ക്രമമൗഢ്യമാകുന്നു. ജ്യോതിഷഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വക്രഗതിയോടുകൂടി കിഴക്കുഭാഗത്തുനിന്നു ഗ്രഹം ക്രമഗതിയോടുകൂടി കിഴക്കുഭാഗത്തുനിന്നു അസ്തമിക്കുന്നു. സൂര്യൻ രണ്ടു മാസവുംകൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഗ്രഹം മുമ്പത്തെപ്പോലെ ക്രമഗതിയോടുകൂടി പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുനിന്നു ഉദയംകൊള്ളുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാംകൂടി സൂര്യൻ 19½ മാസം വേണം. സൂര്യന്റെയും ഗ്രഹത്തിന്റെയും ഗതികളിൽ വരുന്ന പല ഭേദങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഈ കാലത്തിന്നു ചെറിയ ഏകദേശവകുപ്പു ഉണ്ടായിരിക്കും. കിഴക്കായാലും പടിഞ്ഞാറായാലും ശുക്രനെ സൂര്യനിൽനിന്നു 47½ ഭാഗത്തെക്കാൾ അകന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ശുക്രന്റെ പശ്ചിമോദയം, വക്രഗതിയോടുകൂടിയ പശ്ചിമോസ്തമനം, പിന്നീട് വക്രഗതിയോടെ പൂർവ്വോദയം, ക്രമഗതിയോടുകൂടിയ പൂർവ്വാസ്തമനം, തുടന്നു പശ്ചിമോദയം, സൂര്യനെ 47½ ഭാഗത്തെക്കാൾ വിട്ടുമാറായ്ക്കൂടി ഇവയെല്ലാംകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശുക്രൻ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന

ഒരു ഗ്രഹമാണെന്നുതന്നെത്തോന്നും. ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീടു പറയാം.

ബുധനെ സാധാരണ കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അതു സൂര്യനിൽനിന്നു 28 ഭാഗത്തെക്കാൾ അധികം അകന്നുനില്ക്കാറില്ല. ശുക്രന്റെ ഗതിയിൽപ്പറഞ്ഞ സകല മാറ്റങ്ങളും ബുധന്റെ ഗതിയിലും കാണാം. ഒരാവൃത്തിക്ക് കഷ്ടി 4 മാസം മതി. ഇതിന്നിടയിൽ ഒരു മാസത്തോളം ക്രമമൌഢ്യവും അര മാസത്തോളം വക്രമൌഢ്യവുമുണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 2½ മാസത്തിൽ പകുതി കാലം പടിഞ്ഞാറും പകുതി കാലം കിഴക്കുമായിട്ടാണ് കാണുക. ബുധൻ വളരെ വലിയതുമല്ല. ഇതും സൂര്യന്റെ ചുറ്റും പോകുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായിത്തോന്നും.

ബുധശുക്രന്മാരുടെ സഞ്ചാരത്തിൽനിന്നു പല പ്രകാരത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ളതാകുന്നു ചൊവ്വ (കുജൻ), വ്യാഴം, ശനി ഇവയുടെ സഞ്ചാരം. സൂര്യനിൽനിന്ന് ഇത്ര അകലത്തേ ഇവയെക്കാണുകയുള്ളു എന്നില്ല. ക്രമമൌഢ്യമല്ലാതെ ഇവക്ക് വക്രമൌഢ്യമില്ല. എങ്കിലും ക്രമഗതിയും വക്രഗതിയും ഉണ്ട്. വക്രഗതികാലത്തു ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ളവയായിരിക്കും. ഈ മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങളിലുംവെച്ച് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്നതു വ്യാഴമാകുന്നു. ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളതും അതുതന്നെ. ചിലപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രുദ്രനോളം ശോഭയുണ്ടായിരിക്കും. ശോഭകൊണ്ടു ശുക്രനെ ഒരിക്കലും അതിശയിക്കുന്നില്ല. ശനി ഒരുവിധം മങ്ങിയതാകുന്നു. ചൊവ്വ ചുവന്നതാകുന്നു. രണ്ടും വ്യാഴത്തെക്കാൾ ചെറിയവയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക. ഇവിടെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഗതി ഒന്നാമതായി വിവരിക്കാം.

പുലരുന്നതിന്നു മുമ്പ് ആകാശം നോക്കാത്തവക്ക് ഇതു ആദ്യം ദൃശ്യമാകുക സൂര്യോസ്തമനത്തോടുകൂടി കിഴക്കുഭാഗത്താണ്. കുറെ ഉദിച്ചുപൊങ്ങിയതിന്റെശേഷം അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെക്കൂടി രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം നോക്കിയാൽ വ്യാഴത്തിന്നു അപ്പോൾ വക്രഗതിയുള്ളതായിക്കാണാം. ദിവസങ്ങൾ കഴി

യുതോരും സൂര്യാസ്തമനസമയത്തു കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള ഉന്നതി വലിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും വക്രഗതി വിട്ടു ക്രമഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നു മാസം കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യാസ്തമനസമയത്തു ഈ ഗ്രഹത്തെ ദക്ഷിണോത്തരപ്പുത്തത്തിന്നടുത്തുതന്നെ കാണാം. പിന്നേയും സൂര്യാസ്തമനസമയത്തു വരുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യാസ്തമനസമയത്തു പശ്ചിമകപാലത്തിൽ കാണാം. ഇങ്ങിനെ സൂര്യനെ വളരെ സമീപിക്കുന്നതോടുകൂടി മൌഢ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം കാണാതാവുന്നതിനേയും ജ്യോതിഷികൾ ഗ്രഹത്തിന്റെ അസ്തമനമെന്നു പറയുന്നു. മൌഢ്യകാലം ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളമുണ്ടാകും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹത്തെ പുലരുന്നതിന്നു അല്പം മുമ്പു കിഴക്കു കാണാം. മൌഢ്യം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രഹം കിഴക്കു ഉദയംകൊള്ളുന്നു എന്നു പറയും. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുതോരും സൂര്യാദയത്തിന്നു അധികമധികം മുമ്പായി ഗ്രഹം കിഴക്കുദിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ നാലുമാസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഗ്രഹം വക്രഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. രണ്ടു മാസവും കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യാദയത്തിന്നു ഗ്രഹം പടിഞ്ഞാറസ്തമിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗ്രഹം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ആവർത്തിക്കുവാൻ സൂര്യൻ $13\frac{1}{2}$ മാസം വേണം. വക്രഗതി ഏതാണ്ട് 4 മാസകാലത്തോളമുണ്ടാകും. വക്രഗതികൊണ്ടു 10° തോളം ഗ്രഹം പിന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. വക്രഗതിയുള്ള കാലത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗ്രഹവും സൂര്യനും തമ്മിൽ ആറു രാശി അകലമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹം ഉദിക്കുന്നു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹം അസ്തമിക്കുന്നു.

ശനിയുടേയും ചൊവ്വയുടേയും ഗതികളും ഇപ്രകാരംതന്നെ. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഒരിക്കൽ ആവർത്തിക്കുവാൻ ഇവക്ക് ക്രമേണ $12\frac{1}{2}$ മാസവും, 26 മാസവും വേണം. ശനിയുടെ വക്രഗതി $4\frac{1}{2}$ മാസങ്ങളോളവും ചൊവ്വയുടേതു $2\frac{1}{2}$ മാസങ്ങളോളവും നിലക്കും. വക്രഗതികൊണ്ടു ഇവ ക്രമേണ 7 ഭാഗങ്ങളോളവും

19 ഭാഗങ്ങളോളവും ഹിന്നോട്ടു നീങ്ങും. മൌസ്ത്രകാലം ഇവക്കീ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളവും മൂന്നര മാസത്തോളവുമാകുന്നു.

വ്യാഴം, ശനി, ചൊവ്വ ഇവയുടെ ഭഗോളസഞ്ചാരങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇവ സൂര്യനും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിന്റെ പുറം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളായിത്തോന്നും. ഇവയും ബുധശുക്രന്മാരും കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂര്യസഞ്ചാരമാഗ്നമായ അപക്രമമണ്ഡലത്തിലോ അതിനടുത്തോ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ വടക്കും ചിലപ്പോൾ തെക്കും കാണാം. അതിനാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം സൂര്യസഞ്ചാരതലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു തെക്കോട്ടും മറുഭാഗത്തു വടക്കോട്ടും ചരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന തലങ്ങളിലാവാൻ മതി. പൂർവ്വന്മാർ ഈ തലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന സമവൃത്തങ്ങളിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു തീർച്ചയാക്കി. അപക്രമവൃത്തത്തിൽനിന്നു അതാതു സമയം കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകാശമാഗ്നമായ ദൂരത്തിന്നു ചന്ദ്രന്റേതിനെപ്പോലെ വിക്ഷേപം എന്നു പറയുന്നു.

ക്രമഗതിയിൽ സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഗ്രഹം നില്ക്കുന്ന സമയത്തെ കണക്കാക്കി രണ്ടു അടുത്ത രവിഗ്രഹയുതികളുടെ അന്തരാളകാലത്തെ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ മണ്ഡലകാലം എന്നു പറയുന്നു. 5 ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ശരാശരി മണ്ഡലകാലം ദിവസത്തിന്നു കൃത്യമായിപ്പറയുന്നു. ബുധന്നു 116 ദിവസം, ശുക്രന്നു 584 ദിവസം, ചൊവ്വക്കു 780 ദിവസം, വ്യാഴത്തിന്നു 399 ദിവസം, ശനിക്ക് 378 ദിവസം. ചന്ദ്രന്റെ മണ്ഡലകാലമാകുന്നു ചാന്ദ്രമാസമെന്നത്. ആദിത്യന്റേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഗതിഭേദങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളുടെ മണ്ഡലകാലം അല്പമല്ലാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറെ അധികം കാലത്തെ ശരാശരികൾ കണ്ട് അവയെ പഠിച്ചുവെച്ചു ശരാശരികളിൽനിന്നു വരുന്ന ഭേദങ്ങൾക്ക്

കാരണങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈവിധം ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടമായ ഗവേഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് പൂർവ്വാർ ശാസ്ത്രത്തെ പോഷിപ്പിച്ചത്. ആ ക്ലേശങ്ങളുടെ പാടുകൾ ഇന്നും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. നമുക്ക് ആ പാടുകളെ വന്ദിക്കുക.

7. പ്രാചീനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ.

ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽക്കുതന്നെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന വിശ്വാസം പൊതുജനങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും, വിദ്വാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. വളരെ പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ ഭൂമിയുടെ വ്യാസം ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി അളക്കുവാനും അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വീതം ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ചിന്തകന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതു തീർച്ചയാക്കുന്ന കാര്യം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ആകാശഗോളത്തിന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന നിത്യഭ്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവം നാം കണ്ടു. ആദിത്യാചന്ദ്രന്മാരേയും ഗ്രഹങ്ങളേയും നക്ഷത്രങ്ങളേയും ആ ഗോളത്തിൽ അതതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ദർശിക്കുന്നതരസ്യവങ്ങളിൽ കുറി താഴെവണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു ആ ഗോളം എന്നും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപോലെത്തോന്നുന്നു. മേഘബലവാമുഖങ്ങളിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരദർശിണസ്യവങ്ങൾ തലക്കുമീതെയായി കാണപ്പെടുന്നു. ആകാശം തിരിയാതെ ഉറച്ചുനിന്ന് ഭൂഗോളം മേഘബലവാമുഖങ്ങളിൽക്കൂടി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്നു ചുറ്റും ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വീതം തിരിഞ്ഞാലും ആകാശത്തിന്റെ ദൈനന്ദിനചലനം നമുക്ക് തോന്നാവുന്നതാണ്. ആർട്ടുടോചായ്ൻ പറയുന്നു—

“അനുലോമഗതിന്റെ സ്ഥലം പശ്ചാത്യചലം വിപ്ലോമഗം യദപൽ അചലാനി ഭാനി തദപൽ സമപശ്ചിമഗാനി ലങ്കായാം.”

ഗോളപാദം 9.

[തോണിയിൽ ഇരുന്നു ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്ന ഒരുവൻ (പുഴയുടെ ഇരുകരയിലുമുള്ള) അചലങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ എതിർവഴി

ഈ പോകുന്നതായി എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അങ്ങനെ അമലങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങൾ (നിരക്ഷരേഖയിലുള്ള) ലക്ഷ്യം നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നു സാരം] എന്ന്. ഇതുമാത്രം കേട്ടാൽ ആർക്കുടൻ ഭൂമേണസിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നു തോന്നും. പക്ഷെ അടുത്ത ഗ്ലോക്കത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിധം പറയുന്നു.

“ഉദയാസ്തമയനിമിത്തം നിത്യം പ്രവഹേന വായുനാക്ഷിപ്തഃ ലങ്കാസമപശ്ചിമഗോ ഭവഞ്ജരസ്സഗ്രഹോ ഭൂമതി.”

[ദിവസേന പ്രവഹവായുവിനാൽ ആക്ഷിപ്തമായിട്ട് (=അടിക്കപ്പെട്ട്) ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്ക് കാരണമായിക്കൊണ്ട് നക്ഷത്രപഞ്ചരം ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഭൂമണം ചെയ്യുന്നു] എന്ന്. ഭാരതീയരുടെ ഗ്രന്ഥരചനാരീതിയനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമേണപക്ഷം ആർക്കുടൻ പൂർവ്വപക്ഷമെന്ന നിലയിൽ തള്ളി സ്വപക്ഷം സങ്കാരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായിത്തോന്നുന്നു. “പ്രാണേനൈതി കലാം ഭൂഃ”¹[പ്രാണകാലത്തിൽ ഭൂമി ഒരു കലപോകുന്നു], “ചയഗിയിങ്ങശൂക്ലം”^{*}[ഭൂമി ഒരു ചതുർഗുണത്തിൽ 57753336 വട്ടം തികക്കുന്നു] എന്ന ദശഗീതികാപ്രസ്താവനകൾ രാശിച്ചത്രെ അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണോത്തരത്തിന്റെ, അഥവാ ഖമധ്യത്തിന്റെ ചതുർഗുണങ്ങളെപ്പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.

പ്രാമാണികന്മാരായ പ്രാചീനഭാരതീയപണ്ഡിതന്മാരാരും തന്നെ ഭൂമേണം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസിദ്ധനായ വരാഹമിഹിരൻ തുറന്നു പറയുന്നു.

“ഭൂമതി ഭൂസ്ഥിതേവ ക്ഷിതിരിത്യപരേ വദന്തി നോഡുഗണഃ യദ്യേവം ശ്വേനാദ്യാ ന ഖാത്പുനഃ സ്വനിലയമുപേയഃ.”

പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക, അദ്ധ്യായം 13-7.

* ച=6, യ=30, ഗി=300, യി=3000, ങ്ങ=50,000; ശു=700,000, ഹൃ=70,00,000, ഹൃ=5,00,00, 000.

¹പ്രാണേനൈതി കലാം ഭൂഃ എന്നും പറയുമുണ്ട്.

[ഭൂമണയന്ത്രത്തിൽ വെച്ചതുപോലെ ഭൂമി ഭൂമിക്കുന്നു, അല്ലാതെ നക്ഷത്രഗണമല്ല ഭൂമിക്കുന്നത്, എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അങ്ങിനെയൊക്കെങ്കിൽ പ്രാപ്പിടിയൻ മുതലായ പക്ഷികൾ ആകാശത്തുനിന്നു എങ്ങിനെ പിന്നേയും അവയുടെ കൂടുകളിൽ അണയും?] എന്നു. ആയുർഭടന്റേയും വരാഹമിഹിരന്റേയും കാലത്തിന്നുശേഷം 600 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഭാസ്കരാചാര്യർ ഇതേ അഭിപ്രായംതന്നെ പറയുന്നു. പരമേശ്വരാചാര്യർ കേരളീയജ്യോതിഷികളും ഭൂമണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

യവനാചാര്യന്മാരിൽ ചിലർ ഭൂമണവാദികളായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടേയും മഹാത്മാരായ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വാദം സ്വീകരിക്കാതെയിരുന്നു കോപ്പർനിക്കസ്സി (1473—1543)ന്റെ കാലംവരെ ലോകമാസകലമുള്ള ജ്യോതിഷികൾ ഭൂമി ഉറച്ചുനിന്ന് അതിന്റെ ചുറ്റും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിന്മേൽ അവരവരുടെ ജ്യോതിഷസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുപോന്നു. ഭൂമണവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നവർക്കുപോലും വരാഹമിഹിരന്റെ മോദ്യത്തിന്നു ഉത്തരം പറവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഭൂമി എങ്ങിനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നതു എന്ന പ്രശ്നം പലർക്കും തോന്നിയിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂട്, വെള്ളത്തിന്നു തണുപ്പ്, എന്നതുപോലെ ഇളകാതെ നില്ക്കുന്നതു ഭൂമിയുടെ ഗുണമാണെന്നും മറ്റും അവർ സമാധാനം കണ്ടു. സൂര്യസിദ്ധാന്തകർത്താവു—

“മദ്ധ്യേ സമന്താഭസ്യസ്യ ഭൂഗോളോ വ്യോമീ തിഷ്ഠതി
ബിഭ്രാണഃ പരമാം ശക്തിം ബ്രഹ്മണോ ധാരണാത്മികാം.


സു. സി. 12-32.

[ബ്രഹ്മാവിന്റെ ധാരണാത്മികമായ പരമശക്തിയെ ധരിച്ചുകൊണ്ടു ബ്രഹ്മാണത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും മദ്ധ്യത്തിലായി ഭൂഗോളം ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു] എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.

ഭൂമി ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർക്കു ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. ഭാസ്കരൻ മുതലായവർ നക്ഷത്രങ്ങൾ ശീഘ്രതരമായി പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും അല്പം മന്ദമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, അവ നമുക്ക് ഭഗോളചാരികളായിത്തോന്നപ്പെടുന്നുവെന്നു സമത്വമിച്ചു. എങ്കിലും ഗണിതപടക്കളായിരുന്ന അവർ ദൈവികചലനത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ വാഷികചലനത്തേയും ചന്ദ്രന്റെ മാസികചലനത്തേയും വേർപെടുത്തി ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള വൃത്തങ്ങളിൽ അവ കിഴക്കു നോക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു കല്പിച്ച് ഗണിതപദ്ധതികളെ രൂപവൽക്കരിച്ചു.

സൂര്യന്റെ വാഷികചലനം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ട കാലം പൂർവ്വന്മാർ ഏതാണ്ട് ശരിയായറിഞ്ഞു. ഭാരതത്തിലെ പൂർവാചാതുന്മാർ നിശ്ചയിച്ച കാലങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത കാലത്തു സേർ സൈമൻ ന്യൂക്കോബ് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള കാലത്തേക്കാൾ അധികമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഭേദം അധികമില്ല. ഒരു സംവത്സരത്തിൽ സൂര്യൻ 360° അല്ലെങ്കിൽ $21600'$ സഞ്ചരിക്കുമല്ലോ. അതിനെ സംവത്സരത്തിലെ ദിനസംഖ്യയ്ക്കൊണ്ടു ഹരിച്ച് മദ്ധ്യമദിനഗതി തിട്ടപ്പെടുത്തി. ഈ ഗതിയുപയോഗിച്ചു ദിവസേനയുള്ള സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ചു. ഈ സ്ഥാനത്തെ മദ്ധ്യമസൂര്യനെന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. പിന്നീടു മദ്ധ്യമസൂര്യനിൽനിന്നു സ്പഷ്ടസൂര്യൻ എത്ര നീങ്ങിനില്ക്കുന്നുവെന്നു നിരീക്ഷണംകൊണ്ടറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനോചൂത്തിൽ മദ്ധ്യമസൂര്യനും സ്പഷ്ടസൂര്യനും ഒരുമിച്ചു നില്ക്കുന്നുവെന്നു സങ്കല്പിച്ചാൽ, അവിടന്നു 6 രാശി ചെല്ലുന്നതുവരെ സ്പഷ്ടസൂര്യൻ മദ്ധ്യമസൂര്യന്റെ പിന്നിലായിരിക്കുമെന്നും, പ്രതിമനോചൂത്തിൽ രണ്ടും പിന്നേയും ഒരുമിക്കുമെന്നും, അതിന്റെശേഷം സ്പഷ്ടസൂര്യൻ മനോചൂത്തു എത്തുന്നതുവരെ മദ്ധ്യമസൂര്യന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി. മദ്ധ്യമസൂര്യനും സ്പഷ്ട

സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ മന്ദസംസ്കാരം എന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ സ്ഥൂലമായെങ്കിലും ഒരു ഗണിതനിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പൂർവ്വാർക്കു സാധിച്ചു. സൂര്യൻ പോകുന്ന യഥാർത്ഥമാർഗ്ഗത്തെ അഥവാ സൂര്യകക്ഷിയെ അവർ ഒരു സമവൃത്തമെന്നുതന്നെ കരുതി. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടവെന്ന നിലയിൽ വിചാരിച്ചുവന്ന സൂര്യൻ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നതും പ്രയാസമായിരുന്നു. ഈ കക്ഷയിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതിക്കു ഭേദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതു പ്രയാസമായിത്തോന്നിയിരിക്കണം. ആകാശത്തിന്റെ ഗോളാകൃതിയും, ദൈനികചലനഗതിയുടെ സ്ഥിരതയും പൂർവ്വിന്തകന്മാരെ ഈ വഴിക്കു നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽക്കാണുന്ന കലാതമകഗതി (Angular Velocity) ക്ക് ഭേദം വരുവാൻ കാരണമെന്ത്? ഇതിന്നു ക്ഷേത്രഗണിതപരമായ ഒരു സമാധാനം കണ്ടെത്തി.



പരിലേഖം 20


അതു സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതു ഭൂഗോളമദ്ധ്യം കേന്ദ്രമായ കക്ഷാവൃത്തത്തിലല്ലെന്നും ഭൂഗോളമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു മന്ദോച്ചത്തിന്റെ നേക്കു കക്ഷാവ്യാസാർദ്ധത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിതാംശം നീങ്ങിയ സ്ഥാനം കേന്ദ്രമായി കക്ഷാവൃത്തമദ്ധ്യമായ മറ്റൊരു വൃത്തത്തിലാണെന്നുമായിരുന്നു. ഈ വൃത്തത്തിന്നു പ്രതിവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമണ്ഡലം എന്നു പേരിട്ടു. പ്രതിവൃത്തത്തിൽ സൂര്യൻ നിയതഗതിയോടെ—അതു മദ്ധ്യമഗതിതന്നെ—സഞ്ചരിക്കുന്നതാ

യി സമാധാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു നോക്കുന്നവർക്കു സൂര്യന്റെ ഗതിയിൽ ഏറാക്കുവു കാണുന്നതാണ്. പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു എപ്പോഴും സൂര്യനു ഒരേ ഗതിയുമായിരിക്കും. പരിലേഖത്തിൽ 'ഭ' ഭൂഗോളമദ്ധ്യമാകുന്നു. അതുതന്നെ കക്ഷാകേന്ദ്രവും. മ, മന്ദോച്ചം; ത, പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രം. ര, ര₁, ര₂, ര₃ എന്നവ സൂര്യൻപ്രതിമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന 4 സ്ഥാനങ്ങളും മ, ദ, പ്ര, ഭ എന്നവ ക്രമേണ ര, ര₁, ര₂, ര₃ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ കക്ഷാവൃത്തത്തിൽ ഭൂഗോളമദ്ധ്യസ്ഥനായ ദൃഷ്ടാവ് സൂര്യനെ കാണുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുമാകുന്നു. 'ര' എന്ന സ്ഥാനത്തു സൂര്യൻ നില്ക്കുമ്പോൾ നാം സൂര്യനെ 'മ' എന്ന മന്ദോച്ചത്തിൽ കാണുന്നു. അവിടെന്നു ര₁ വരെ സൂര്യൻ നീങ്ങിയാൽ സൂര്യനെ ദ എന്ന സ്ഥാനത്തു കാണാം. സൂര്യൻ പ്രതിമണ്ഡലത്തിൽ നീങ്ങിയതിനെക്കാൾ കുറവായിട്ടാണ് കക്ഷാമണ്ഡലത്തിൽ നീങ്ങിയതായിട്ടു കാണുക. സൂര്യൻ ര എന്നവിടെനിന്ന് 6 രാശി സഞ്ചരിച്ച് ര₂ എന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ സൂര്യനെ കക്ഷാമണ്ഡലത്തിൽ പ്ര എന്ന സ്ഥാനത്തു കാണാം. ആദ്യം കണ്ട കുറവ് കുറെ വലുപ്പിച്ച് പിന്നീട് ചുരുങ്ങി ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ ര₃ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യനെ ദ, എന്ന സ്ഥാനത്തു കാണാം. സ്പഷ്ടഗതി ഇപ്പോൾ മദ്ധ്യഗതിയെക്കാൾ അധികമാണെന്നു കാണാം. ഇവിടെക്കുണ്ടു ഭേദങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിൽനിന്നു കണ്ട ഭേദങ്ങളോടു കൂടി നിരീക്ഷണമെങ്കിൽ, പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രം കക്ഷാവ്യാസാർദ്ധത്തിന്റെ സമാന്ത 3/80 ഭാഗം നീക്കി നിശ്ചയിച്ചാൽ മതിയെന്നും കണ്ടു.

ഇങ്ങിനെ രവിമാറ്റത്തെ സങ്കല്പിച്ചാൽ, സൂര്യന്റെ ഭൂഗോളസ്ഥിതി ഏതാണ്ടു കൃത്യമായി ഗണിക്കാം. ഇതു വേണ്ടത്ര രൂപീകരണമായിരുന്നില്ല എന്ന സൂചന ഇന്നും ഭാരതീയഗണിതത്തിൽ കാണുവാനുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാരതീയർ ഈ അഭിപ്രായത്തെ കാര്യമായി ഭേദപ്പെടുത്തിയതായിക്കാണുന്നില്ല. കാലക്ര

മത്തിൽ മനോചുപ്രതിമനോചരേഖക്കും മനമായ ചലനമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തെ ഭൂഗോളമദ്ധ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ അതിമനമായി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു സങ്കല്പിച്ചു. ഈ വൃത്തത്തെ മന്ദവൃത്തമെന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ മന്ദവൃത്തപരിധിമേൽ കേന്ദ്രമായ പ്രതിമണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സൂര്യനെ സഞ്ചരിപ്പിച്ച് ഭാരതീയർ സൂര്യന്റെ ഭൂഗോളസ്ഥാനത്തെ (സ്തഷ്ടസൂര്യനെ) ഗണിച്ചുപോന്നു. ഹിപ്പാർക്കസ്, ടോളമി മുതലായ യവനപണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടിലധികം വൃത്തങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു സൂര്യനെ കറക്കൂടി സൂക്ഷ്മമായി ഗണിപ്പാൻ പരിശ്രമിച്ചതായിപ്പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്രകാരം പ്രതിമണ്ഡലത്തേയും, അതിന്റെ കേന്ദ്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന മനോചുവൃത്തത്തേയും സങ്കല്പിച്ചു. ചന്ദ്രന്റെ മനോചുവൃത്തവ്യാസാർദ്ധം കക്ഷാദ്വ്യാസാർദ്ധത്തിന്റെ സുമാർ 7/80 ഭാഗമായിട്ടാണ് പലരും സ്വീകരിച്ചത്.



സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലം നിണ്ണയിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമാർ പരിശ്രമിച്ചു.

പരിലേഖം 21

ഖ ത1 ത: ചന്ദ്രന്റെ ദൈനികസഞ്ചാരമാർഗ്ഗം.


ഭ ത1: ഭൂപൃഷ്ഠക്ഷിതിജം.

ഭ ത: ഭൂഗോളമദ്ധ്യത്തിൽകൂടി സങ്കല്പിക്കുന്ന ക്ഷിതിജ സമാന്തരം.

ചന്ദ്രന്റെ അകലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ അവർക്കു എന്താണ് സാധിച്ചു. ചന്ദ്രസഞ്ചാരം കൃത്യമായി ഗണിക്കുവാൻ സാധിച്ചതോടുകൂടി ഭൂപുഷ്പത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ക്ഷിതിജന്മതലത്തിന്നു സമാന്തരമായി ഭൂഗോളകേന്ദ്രത്തിൽക്കൂടി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലെ ചന്ദ്രോദയാസ്തമനങ്ങൾ ഗണിക്കാമെന്നു വന്നു. പരിലേഖത്തിൽ 'ത' എന്ന സ്ഥാനത്തു ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ആ അസ്തമനം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ 'ദ' എന്നവിടെ നില്ക്കുന്ന ഒരാളുടെ ക്ഷിതിജം ദ ത₁ എന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ 'ത₁' എന്ന സ്ഥാനത്തു ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചന്ദ്രൻ അസ്തമിച്ചതായിക്കാണാം. ഈ സമയത്തിന്റേയും ഗണിച്ച സമയത്തിന്റേയും അന്തരം ചന്ദ്രനു 'ത ത₁' എന്ന സ്വകക്ഷാഭാഗം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സമയമാകുന്നു. 'ത₁ ത' എന്നതു ഭൂവ്യാസാൽത്തിന്നു തുല്യം. അതിനാൽ ഭൂവ്യാസാൽത്തോളം ചന്ദ്രനു സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് കിട്ടിയ അന്തരം എന്നു വരുന്നു. ദൈനികസഞ്ചാരമാഗ്നം സഞ്ചരിച്ചു തീർപ്പാൻ ഇത്ര സമയം വേണമെന്നു അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഈ സമയം കൊണ്ടു ഭൂവ്യാസാൽത്തെ ഗുണിച്ചു നേഞ്ഞ് കിട്ടിയ അന്തരം കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ചന്ദ്രകക്ഷാപരിധിയായി. ആർച്ചഭീയപ്രകാരം ഇപ്രകാരം കിട്ടിയ ചന്ദ്രകക്ഷാപരിധി 2,16,000 യോജനയാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ചന്ദ്രകക്ഷാവ്യാസം 68758 യോജന. $(=2,16,000 \div 3.1416)$. ഇതിന്റെ പകുതി ഭൂമിയിൽനിന്നു ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരവുമാകുന്നു. ഇതു ആർച്ചഭീയ ഭൂവ്യാസാൽമായ 525 യോജനയുടെ $65\frac{1}{2}$ മടങ്ങാണെന്നു കാണാം. ആധുനികപക്ഷപ്രകാരം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം ഭൂവ്യാസാൽത്തിന്റെ 60.27 മടങ്ങാകുന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ സൂര്യന്റെ അകലം നിശ്ചയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അസാധ്യമെന്നുതന്നെ പറയാം. ക്ഷിതിജത്തിലും അതിന്നു സമാന്തരമായ തലത്തിലും അസ്തമിക്കുന്ന സമയങ്ങളുടെ അന്തരം കൃത്യമായിക്കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. യവനന്മാ

രിൽ ചിലർ കൃത്യമായ അർദ്ധചന്ദ്രനെ കാണുന്ന നേരത്തു സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാർ തമ്മിലുള്ള ദിഗന്തരം (പരിലേഖത്തിൽ ഭൂമിയിലഗ്രമായ കോൺ) കണ്ടു അതിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ അകലം നിശ്ചയിക്കുവാൻ നോക്കിയതും ഫലപ്രദമായില്ല. അതിനാൽ പുരാതനഭാരതീയർ ചില സങ്കല്പങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൂര്യന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും കക്ഷാപരിധികൾ കണക്കാക്കി. സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരടക്കം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ പ്രതിമസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ യോജനാത്മകഗതിയാണെന്നായിരുന്നു ആ സങ്കല്പം. ആയുർഭട്ടൻ പറയുന്നതു നോക്കുക.



പരിലേഖം 22

“ശശിരാശയഷ്ടചക്രം
തേഃശകലായോജനാനി.യവന്തഗുണാഃ
പ്രാണേനൈതി കലാം ഭൂഃ
വയുഗാംശോ ഗ്രഹജവോ ഭവാംശേഃ”

ശേഗീതികാ—4

ചതുർത്ഥത്തിലുള്ള ചന്ദ്രപദ്യയങ്ങളെ 12(0)കൊണ്ടു വെരുക്കിയതു ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാശികൾ, അവയെ 30(യ), 60(വ), 10(ഞ) ഇവകൊണ്ടു തുടരെച്ചെരുക്കിയാൽ ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന അംശങ്ങളും, കലകളും, യോജനകളും ആയിത്തീരും. പ്രാണകാലംകൊണ്ടു ഭൂമി ഒരു കല പോകുന്നു. ആകാശപരിധിയോജനകളെ അവരവരുടെ യുഗപദ്യയങ്ങൾകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ (ചന്ദ്രന്റേതടക്കം) കക്ഷാപരിധികൾ

കിട്ടും. സൂര്യകക്ഷ നക്ഷത്രകക്ഷയുടെ 60(വ)ൽ ഒരംശമാകുന്നു. ഇതാണ് ഗീതികയുടെ സാരം. ചതുർച്ചഗത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വട്ടം (=പർവ്വം) പൂർത്തിയാകുമെന്നു പൂർവ്വഗീതികകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗീതികയുടെ പൂർവ്വാലംകൊണ്ടു ചന്ദ്രൻ ചതുർച്ചഗത്തിൽ എത്ര യോജന സഞ്ചരിക്കുമെന്നു വരുന്നു. ആകാശപരിധിയെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യുഗപർവ്വസംഖ്യകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ അതതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷാപരിധികൾ കിട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞതു ചന്ദ്രനും ബാധകമാകയാൽ, ചന്ദ്രനും മറ്റൊല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചതുർച്ചഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യോജനകൾ ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും അതുതന്നെയാണ് ആകാശപരിധിയെന്നും വരുന്നു. 'ഭവാംശേക്ഷഃ' എന്നതുകൊണ്ടു നക്ഷത്രകക്ഷയുടെ പരിധി സൂര്യകക്ഷയുടെ 60 മടങ്ങാണെന്നു വരുന്നു.

ചതുർച്ചഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യോജനകൾ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒന്നായതുകൊണ്ടു ദിവസേന സഞ്ചരിക്കുന്ന യോജനകളും എല്ലാവരിനും ഒന്നായിരിക്കണം. ഇതു 7906 യോജനയെന്നു ചന്ദ്രന്റേയോ മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിന്റേയോ പർവ്വ സംഖ്യയിൽനിന്നും പർവ്വദിനത്തിൽനിന്നും കിട്ടുന്നു. ഈ യോജനകളെ പർവ്വദിനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ കാരോ ഗ്രഹത്തിന്റേയും കക്ഷാപരിധി വരും. കക്ഷാപരിധികളും, കക്ഷാ വ്യാസങ്ങളും, വ്യാസാലങ്ങളും, പർവ്വകാലങ്ങൾക്കു അനുപാതകമാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. അതിനാൽ പർവ്വകാലങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ അകലത്തിൽനിന്നു മറ്റൊല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും അകലങ്ങൾ കണക്കാക്കാം. സൂര്യന്റെ പർവ്വകാലം 365.25 ദിവസങ്ങളും ചന്ദ്രന്റേതു 27.32 ദിവസങ്ങളുമാകുന്നു. $365.25 \div 27.32 = 13.36$. സൂര്യകക്ഷാ വ്യാസാലം ചന്ദ്രകക്ഷാ വ്യാസാലത്തിന്റെ 13.36 മടങ്ങാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഇതു ആധുനികഫലത്തിന്റെ 29ൽ ഒരംശം മാത്രമാകുന്നു. ഭൂചന്ദ്രന്മാരുടെ ഛായകൾ (Shadows) മിക്കവാറും സൂര്യന്റെ ദൃശ്യാസ (കലാതമകവ്യാസം)ത്തെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കയാൽ, ഇതുകൊണ്ടു സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണഗണിതങ്ങളിൽ പിഴവു പറുകയില്ല.


ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബുധശുക്രന്മാരുടെ കക്ഷാപ്യാസങ്ങളെ ആദ്യമായി ആലോചിക്കാം. സൂര്യന്റെ പര്യാലം 365 ദിവസമെന്നും ശുക്രന്റെ മണ്ഡലകാലം 584 ദിവസമെന്നും മാത്രമേ ഇവിടെ കരുതുന്നുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു സാരം. ശുക്രപര്യാലത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗതിയിൽനിന്നു സൂര്യപര്യാലംകൊണ്ടു കാണുന്ന ഗതി കളഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ അടുത്തു വരുന്ന ഗതി കിട്ടും. അതിനാൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ പര്യാലം 'യ' ദിവസമെന്നുവെച്ചാൽ,

$$\frac{21600}{y} - \frac{21600}{365} = \frac{21600}{584}$$

$$\text{അതിനാൽ } \frac{1}{y} = \frac{1}{365} + \frac{1}{584} = \frac{584 + 365}{365 \times 584}$$

$$\therefore y = \frac{365 \times 584}{584 + 365} = 225.$$

ഇതു സ്ഥൂലമാകുന്നു. എങ്കിലും ഫലം ദിവസത്തിന്നു കൃത്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ബുധന്റെ മണ്ഡലകാലത്തിൽനിന്നു പര്യാലം 88 ദിവസമെന്നു കിട്ടും.



പരിലേഖം 23.

ശുക്രൻ സൂര്യനിൽനിന്നു കവിഞ്ഞെക്കുന്നതു $47\frac{1}{4}$ ഭാഗമാണെന്നു നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ വരണമെങ്കിൽ ശുക്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന പൃത്തത്തിന്റെ പ്യാസാലം (പ്രതിമണ്ഡലപ്യാസാലം), അതിന്റെ കേന്ദ്രവും ഭൂമിയുമായുള്ള അകല (ശീശ്വ പൃത്ത പ്യാസാലം) അതിന്റെ 0.73 ഭാഗമാക

ണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞാൽ ശുക്രൻ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിലോ അതിനു നേക്കോ നില്ക്കുന്ന സൂര്യനിൽനിന്നു കവിഞ്ഞകലുന്നതു കാര്യം, അധികമായാൽ കവിഞ്ഞകലുന്നതു അധികമാകും. പരിലേഖത്തിൽ ഭൂ ഭൂമിയും, ശ ശുക്രനും, പ്ര പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രവുമാകുന്നു. വൃത്തം ശുക്രന്റെ പ്രതിമണ്ഡലംതന്നെ. പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രം സൂര്യനായാലും, സൂര്യനിൽനിന്നു ഇപ്പുറത്തായാലും അപ്പുറത്തായാലും ശുക്രന്റെ യോജനാത്മകഗതിക്ക് ഭേദം വരികയല്ലാതെ, കാഴ്ചക്കു ഒരു ഭേദവും വരികയില്ല. പ്രശ÷ഭുപ എന്നതു .73ന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം 100 എന്നു വെക്കുക. പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 100ക എന്നും വെക്കുക. എന്നാൽ പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാർദ്ധം 73ക എന്നും, പരിധി $2 \times 73ക \times 3.1416$ എന്നും വരും. രവിക്ഷയുടെ പരിധി $2 \times 100 \times 3.1416$. ഈ രണ്ടു പരിധികളേയും ശുക്രസൂര്യന്മാരുടെ പര്യവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന യോജനാത്മകഗതി തുല്യമായിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ സങ്കല്പം. അതിനാൽ,

$$\frac{2 \times 73ക \times 3.1416}{225} = \frac{2 \times 100 \times 3.1416}{365} \therefore \frac{73ക}{225} = \frac{100}{365}$$

$$ക = \frac{100 \times 225}{73 \times 365} = .84.$$

അതിനാൽ പൂർവ്വന്മാരുടെ തുല്യയോജനഗതിസിദ്ധാന്തം സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം ശുക്രസഞ്ചാരമാർഗ്ഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനല്ല. സൂര്യനിൽനിന്നു അതിന്റെ ദൂരത്തിന്റെ 16 ശതമാനം ഭൂമിയുടെ നേക്കു നീങ്ങിയ സ്ഥാനത്താണെന്നു വരുന്നു. പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാർദ്ധം=73ക=61.

ബുധൻ കവിഞ്ഞതു സൂര്യനിൽനിന്നു 28 ഭാഗമാത്രം അകന്നു നില്ക്കുന്നു അതിനാൽ പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാർദ്ധം ശീഘ്രവൃത്തവ്യാസാർദ്ധത്തിന്റെ 0.47 ഭാഗമാകണം. അതിനാൽ

ബുധനു സമീകാരം $\frac{47\text{ക}}{88} = \frac{100}{365}$ എന്നു വരും. ഇതിൽനിന്നു

ക = 51. സൂര്യന്റെ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലം 100 എന്നു വെച്ചാൽ, ബുധമാർഗ്ഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയിൽനിന്നു 51ഉം, അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം $51 \times 0.47 = 24$ ഉം എന്നു വരുന്നു. അതിനാൽ ബുധൻ തന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ എപ്പോഴും ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലായിരിക്കും. ഒരിക്കലും സൂര്യനപ്പുറത്ത് പോകാറില്ലെന്നു വരുന്നു.

ഇനി ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ഇവയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ദിനഗതിയിൽനിന്നു ഇവയുടെ ദിനഗതി കളഞ്ഞാൽ, മണ്ഡലകാലഗതി കിട്ടും. ചൊവ്വയുടെ പര്യയകാലം യ ദിനമെന്നുവെച്ചാൽ $\frac{1}{365} - \frac{1}{\text{യ}} = \frac{1}{780}$. അ

തിനാൽ യ = $\frac{780 \times 365}{780 - 365} = 686$. ചൊവ്വയുടെ പര്യയം പ

ര്യയകാലം 686 ദിവസമെന്നു വരുന്നു. ചൊവ്വക്കു ഏറ്റവും വലിയ ക്രമഗതി സൂര്യനു നേക്കു വരുമ്പോഴും, ഏറ്റവും വലിയ പക്രഗതി സൂര്യനിൽനിന്നു 6 രാശി നീങ്ങി നേരെ എതിരായി വരുമ്പോഴും കാണുന്നതിനാൽ ചൊവ്വയുടെ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രവും സൂര്യനു നേക്കായിരിക്കണം. പര്യയകാലത്തിൽനിന്നു കണക്കാക്കി കിട്ടുന്ന മദ്ധ്യമചൊവ്വയിൽനിന്നു സ്പഷ്ട ചൊവ്വ കവിഞ്ഞതു $46^{\circ}-53'$ നീങ്ങിക്കാണുന്നതിനാൽ ചൊവ്വയുടെ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലം കക്ഷാ വ്യാസാർദ്ധത്തിന്റെ $.73$ ഭാഗമായിരിക്കണമെന്നു ക്ഷേത്രഗണിതംകൊണ്ടു കാണാം. ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ അകലം 100 എന്നും, പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിന്റെ അ

കലം 100 ക എന്നും വെച്ചാൽ കക്ഷാ വ്യാസാർദ്ധം $\frac{100\text{ക}}{0.73}$ ആ

യിരിക്കണം. പരിധി $\frac{200 \times 3.1416}{0.73}$ എന്നു വരുന്നു. ചൊവ്വക്കും സൂര്യനും ഒരേ യോജനാത്മകഗതിയെന്നു സങ്കല്പിക്കയാൽ,

$$\frac{200 \times 3.1416}{0.73 \times 686} = \frac{200 \times 3.1416}{365}$$

$$\frac{ക}{0.73 \times 686} = \frac{1}{365}$$

$$ക = \frac{0.73 \times 686}{365} = 1.37.$$

അതിനാൽ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രം സൂര്യനിൽനിന്നു അപ്പുറത്തെ
ന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാർദ്ധം $= \frac{137}{.73} = 188$.

ആകയാൽ ചൊവ്വ തന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ സൂര്യനേയും ഭൂമിയേയും ഒരുമിച്ചു ചുറ്റുന്നു. സഞ്ചരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനിലുമല്ല, ഭൂമിയിലുമല്ല. അതു സൂര്യന്റെയും അപ്പുറത്തു കിടക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്നു നോക്കുന്നവർക്കു ചൊവ്വ സൂര്യനിൽനിന്നു എതിരായി വരുമ്പോൾ (എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടു തമ്മിൽ 6 രാശിഭേദമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ) ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയും, ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ളതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചൊവ്വക്കു അപ്പോൾ വക്രഗതിയുമായിരിക്കും.

വ്യാഴത്തിന്റേയും ശനിയുടേയും മണ്ഡലകാലങ്ങൾ 399 ദിവസവും 378 ദിവസവും, അവയിൽനിന്നു വരുന്ന പര്യവർത്തനകാലങ്ങൾ 4283 ദിവസവും, 10,613 ദിവസവും ആകുന്നു. മദ്ധ്യഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നു സ്പഷ്ടഗ്രഹങ്ങളുടെ കവിഞ്ഞ നീക്കം $11^{\circ} 51'$ യും $6^{\circ} 28'$ യും ആകയാൽ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലം കക്ഷാവാസാർദ്ധങ്ങളുടെ 0.21ഉം 0.11ഉം ആയിരിക്കണം. ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ അകലം 100 എന്നുവെച്ചാൽ, പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അകലം 246 എന്നും 320 എന്നും വരുന്നു.

ചന്ദ്രനെ അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ തെക്കും വടക്കും വിക്ഷേപിച്ചു കാണുന്നതുപോലെ ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ഇവയേയും അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ തെക്കും വടക്കും വിക്ഷേപിച്ചു കാണാം. ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച പൂർവ്വസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ശീഘ്രോച്ചങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവരവരുടെ പ്രതിമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിമണ്ഡലങ്ങളുടെ തലങ്ങൾ അപക്രമവൃത്തതലത്തിനു ചരിഞ്ഞുനിന്നാൽ, ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ചരിവിന്നനുസരിച്ച് അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെറ്റാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങൾതന്നെ അപക്രമവൃത്തതലത്തിലാണെന്നു നിരീക്ഷണഫലങ്ങളിൽനിന്നു കാണുകയും ചെയ്യാം. പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രഷ്ടാവ് ഗ്രഹം സ്വമാഗ്നമായ പ്രതിമണ്ഡലത്തിൽ ഒരേ ഗതിയോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ മാഗ്നങ്ങളേയും ഗതികളേയും മനോച്ചത്തിൽനിന്നു കാണുംപോലെയിരിക്കും. പ്രതിമണ്ഡലം അപക്രമവൃത്തത്തെ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നതായും കാണാം. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതാതു ഗ്രഹത്തിന്റെ പാതങ്ങളെന്നു പറയുന്നു. ഭൂമി പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു അകന്നു നില്ക്കയാൽ നാം ഗ്രഹങ്ങളെ ശീഘ്രമായും, മന്ദമായും, ക്രമമായും, വക്രമായും, കുടിപമായും സഞ്ചരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. പൂർവ്വന്മാർ പാതസ്ഥാനങ്ങളെ കൃത്യമായറിഞ്ഞ് ഗ്രഹവിക്ഷേപങ്ങളെ ഗണിച്ചു.

ഇങ്ങിനെ പൂർവ്വന്മാർ ചന്ദ്രന്റെ അകലം നിണ്ണയിച്ചതിന്റെശേഷം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോടുകൂടിയ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ദിവസേന സ്വമാഗ്നങ്ങളിൽ ഒരേ യോജന സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു സങ്കല്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൂര്യന്റെ അകലവും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശീഘ്രവൃത്തവ്യാസാലും എന്നുകൂടിപ്പറയാറുള്ള പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രഭൂമിനന്തരായും നിണ്ണയിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു അഭിപ്രാ

യംതന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വിചാരിപ്പാനേ വഴിയുണ്ടു. ബുധൻ സൂര്യന്റെ മറ്റൊരു കടക്കുന്നതുകൂടിയില്ല. ച്ചാഴത്തിന്റേയും ശനിയുടേയും പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങൾ സൂര്യനെക്കൂടി ഇരട്ടിയിലധികം അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പുരാതനവനപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണിരുന്ന. പൈതഗോറസ്സ്, അരിസ്റ്റാർക്കസ്സ് മുതലായ അപൂർവ്വ ചില സ്വതന്ത്രർ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടേയും ബുധൻ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും സഞ്ചാരമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതു വിശ്വസിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ കരുതാഞ്ഞായിരുന്നില്ല. ഹിപ്പാർക്കസ്സ് ഓരോ മിനുട്ടിലും ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ 1300ലധികം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം സൂര്യനാണെന്നു സൗഹൃദം 'ഡ്രോമഗോളപരിവർത്തനം' (De Revolutionibus Orbium Celestium) എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിൽ വാദിച്ചതു പോളണ്ടിലെ ജ്യോതിർഗണിതപണ്ഡിതനായിരുന്ന നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ്സ് (1473—1543) ആയിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയാം.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ഡലകാലങ്ങളും പര്യയകാലങ്ങളും അവയിൽനിന്നു വരുത്തിട്ടുള്ള അകലങ്ങളും വളരെ സ്ഥൂലങ്ങളാണെന്നു വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥൂലങ്ങളാണെങ്കിലും പൂർണ്ണന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയും അതിൽനിന്നു സിദ്ധമായ സിദ്ധാന്തവും വിശദമാക്കുവാൻ ഇവ ധാരാളം മതി. പൂർണ്ണസൂരികളുടെ പ്രവൃത്തിയും ഇവിടെക്കാണുന്നപോലെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അനേകാണ്ടുകളിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ട കാലങ്ങളുടേയും ദൂരങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യമങ്ങളെ ആവുവണ്ണം സൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ, സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും അവയിൽനിന്നു ഗണിതപദ്ധതികളേയും രൂപവൽക്കരിച്ചു, ഗണിതാഗതമല

ങ്ങളെ നിരീക്ഷണഫലങ്ങളോടു കൂട്ടുന്നോക്കിയും, വേണ്ടവിടെ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയും, തീവ്രയത്നം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും കരണമാറ്റങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കു വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നു തോന്നുന്ന ഗ്രഹഗതികൾക്കും വ്യവസ്ഥകളെ ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നും, അവയാണ് കോപ്പർനിക്കസ്സ് മുതലായ അനന്തരപണ്ഡിതന്മാർക്കു മാറ്റുദർശികളായിത്തീർന്നതെന്നും ധരിച്ച്, ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിക്കല്ലുകൾ പാലിയ ആ പൂർവ്വസൂരികളിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനത്തോന്നുവാൻ ധാരാളം അവകാശമുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

പ്രാചീനസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ശീശ്ലോച്ചം സ്തഷ്ടസൂര്യനൊരുമിച്ചല്ല, മദ്ധ്യമസൂര്യനൊരുമിച്ചാണ് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. വെറും ശീശ്ലോച്ചങ്ങളല്ല പൂർവ്വന്മാർ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങളായിക്കല്പിച്ചത്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കു ഭൂഗോളകേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റും സങ്കല്പിച്ചപോലെ ശീശ്ലോച്ചങ്ങളുടെ ചുറ്റും മന്ദവൃത്തങ്ങളേയും ആ മന്ദവൃത്തപരിധികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു ചുറ്റും പ്രതിമണ്ഡലങ്ങളേയും സങ്കല്പിച്ച് ബുധൻ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്തഷ്ടസ്ഥാനങ്ങൾ അഥവാ സ്ഥിരങ്ങൾ അവർ ഗണിച്ചുപോന്നു. ഈ ഗണിതങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശരിയാവാതിരുന്നതിനാൽ, ഗണിതഫലങ്ങൾ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽനിന്നു പലപ്പോഴും വ്യതിചലിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇന്നും നട്ടപ്പുള്ള പരഹിതദുഗ്ഗണിതങ്ങൾ ഈ വിധം വ്യതിചലിച്ചവയാണെന്നു കേരളീയർക്കു പൊതുവെ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


ഭൂമിക്കു ചുറ്റും ചന്ദ്രനും അതിന്നു പുറമെയായി സൂര്യനും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടവരും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഭൂഗോളസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗണിപ്പാൻ സാധിച്ചിരുന്നവരും ആയ പൂർവ്വന്മാർക്കു ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾക്കും ഗ്രഹണത്തിന്നും ഉള്ള കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു സംശയവുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല അവയെ ഒരുവിധം സൂക്ഷ്മമായി ഗണിപ്പാനും അവർക്കു സാധിച്ചു.

ഭൂമിക്ക് സ്വയമേവ പ്രകാശമില്ലെന്നു രാത്രിയിൽ നമുക്കു നഭവമാകുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയം കാണുമ്പോൾ ചന്ദ്രനും സ്വയമേവ പ്രകാശമില്ലെന്നുപോലാകാം. പെൺമിഥിവസം ഭൂമിയുടെ ഒരു വശത്തു ചന്ദ്രനും നേരെ മറുവശത്തു സൂര്യനും നില്ക്കുകയാൽ നാം കാണുന്ന ചന്ദ്രപുഷ്പാലത്തെ മുഴുവൻ സൂര്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ആ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചന്ദ്രപുഷ്പാലത്തെ യാകുന്നു പൂണ്ണവൃത്താകൃതിയിൽ ശോഭിക്കുന്ന ചന്ദ്രനായി നാം കാണുന്നത്. ആ സമയം ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് ഭൂമിയെക്കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു നമുക്കുപോലാകാം. ഭൂമിയുടെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അലത്തെ ഭൂമിതന്നെ ആ ദൃഷ്ടാവിൽനിന്നു മറയ്ക്കുന്നു. അമാവാസിദിവസം ഭൂമിയുടെ ഒരേവശത്തുതന്നെ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നില്ക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ—ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന ചന്ദ്രപുഷ്പാലത്തെ ചന്ദ്രൻതന്നെ നമ്മിൽനിന്നു മറയ്ക്കുന്നു.

ഇനി ശുക്ലപഞ്ചമിദിവസം സൂര്യാസ്തമനസമയത്തെ സ്ഥിതിയൊന്നാലോചിക്കുക. സൂര്യൻ ഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തായതിനാൽ ഭൂമിക്കടുത്തുള്ള ചന്ദ്രനിൽനിന്നും പടിഞ്ഞാറുവശത്തായിരിക്കും. അതിനാൽ ചന്ദ്രഗോളത്തിന്റെ പശ്ചിമാലം പ്രകാശിതമായിരിക്കും. ചന്ദ്രനെ സൂര്യനിൽനിന്നു ഏതാണ്ട് 60° അകലെയായി നാം കാണുന്നു. അതിനാൽ ചന്ദ്രന്റെ നേരെ താഴത്തുനിന്നു 30° കിഴക്കോട്ടു ചരിഞ്ഞ ഒരുലായിരിക്കും നാം കാണുക. പരിലേഖത്തിൽ 'കഗന' ചന്ദ്രന്റെ പ്രശോഭിതാലവും 'ചന്ദവ' നാം കാണുന്ന അലവുമാകുന്നു. ഈ അലത്തിൽ പ്രശോഭിതാലത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരംശമേയുള്ളൂ. പ്രശോഭിതാലത്തെ മുഴുവൻ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ നാം ഒരു പൂണ്ണവൃത്തമായിത്തന്നെ കാണും. മൂന്നിലൊന്നു മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ടു പൂണ്ണവൃത്തത്തിന്റെ മൂന്നി

ലൊന്നിൽ കുറവായ ഒരു ഭാഗം കവിഞ്ഞ വീതിയുള്ള ഒരു ചന്ദ്രനെ നാം കാണുന്നു. പളവിന്റെ മുന്നിലൊന്നു ആകാശത്തിൽ പതിഞ്ഞു കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്' പൃത്തത്തിന്റെ മുന്നിലൊ



പരിലേഖം 24.


നിൽ കുറവായി കാണപ്പെടുന്നത്. നാം അന്നു ചന്ദ്രനെക്കാണുന്നതും സകലസഹൃദയന്മാരും കണ്ടാഹ്ളാദിക്കുന്നതും ആയ ആകൃതി പരിലേഖത്തിൽ വലത്തു ഭാഗത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ സമയത്തു ഭൂഗോളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അർദ്ധം സൂര്യനാൽ പ്രശോഭിതമായിരിക്കും. ഭൂമിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രപുഷ്പാലത്തിൽ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും അതിന്റെ ങ്ക ഭാഗം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ, അവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നു പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടു തട്ടുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗം വളരെ ശോഭയോടും മറ്റു ഭാഗം മങ്ങിയ ശോഭയോടുംകൂടി ചന്ദ്രനെ പൂർണ്ണത്താകാരത്തിൽ നാം കാണുന്നു. മങ്ങിയ ഭാഗത്തെ പാശ്ചാത്യർ വിഭ്രതിചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ആഷ്മൂൺ (Ash moon) എന്നു പറയുന്നു.

പഞ്ചമി കഴിഞ്ഞ് സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗാ
ത്തകറ്റും വലിക്കുന്നതോടുകൂടി സൂര്യപ്രകാശിതമായ ചന്ദ്രപു

ഷാൽം നാം അധികമധികമായിക്കുന്നു. ഇതിനെ നാം ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിയെന്നു പറയുന്നു. അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങിനെ സുമാ 15 ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യപ്രകാശിതാൽം മഴുവൻ കാണുന്നു. ഇതത്രെ പൂണ്ണചന്ദ്രൻ. പെണ്ണമി കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ദൂരം ഒരു വശത്തു 180° ത്തെക്കാൾ വലിക്കുന്നതോടുകൂടി മറുവശത്തു അതിനെക്കാൾ ചുരുങ്ങി വരുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശിതാൽം നാം കാണുന്നതും ചുരുങ്ങി വരുന്നു. ഇതിനെ ചന്ദ്രന്റെ ക്ഷയമെന്നു പറയുന്നു. സുമാ 15 ദിവസവുമുടികഴിഞ്ഞുപോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനോടൊരുമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ സൂര്യപ്രകാശിതാൽം നാം ഒട്ടും കാണുന്നില്ല. ആ ദിവസം അമാവാസിതന്നെ.

അമാവാസ്യാന്ത്യത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രദേശത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ അപക്രമവൃത്തത്തിൽനിന്നു വിക്ഷേപംകൊണ്ടു അകന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കയില്ല. ചന്ദ്രൻ ആ സമയത്തു അപക്രമവിക്ഷേപമണ്ഡലങ്ങളുടെ പാതസ്ഥാനങ്ങളായ രാഹുവിലോ, കേതുവിലോ, അവകൂടത്തോ ആണെങ്കിൽ വിക്ഷേപം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ അല്പമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. അതിനാൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നു. പരിലേഖത്തിൽ 'പക' എന്നതു



പരിലേഖം 25.

അപക്രമമണ്ഡലവും 'വിമ' എന്നതു വിക്ഷേപമണ്ഡലവും 'ര' രാഹുവും 'ദ' ചന്ദ്രബിംബമദ്ധ്യവും, 'ദന' വിക്ഷേപവുമകുന്നു. വിക്ഷേപം ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ബിംബവ്യാസാർദ്ധയോഗ

ഞെക്കാൾ കറവായതുകൊണ്ടു ചന്ദ്രൻ സൂര്യബിംബത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറച്ചതായിക്കാണുന്നു. ഇതു ഒരു അപൂർണ്ണസൂര്യഗ്രഹണ(Partial Solar Eclipse)മാകുന്നു. അമാവാസ്യാന്തരം രാഹുവിൽ വെച്ചുതന്നെ സംഭവിച്ചാൽ, ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മുഴുവൻ മറച്ചു എന്നു വരാം. അതു ഒരു പൂർണ്ണഗ്രഹണ(Total Eclipse)മാകുന്നു. സൂര്യന്റേയും ചന്ദ്രന്റേയും ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലത്തിന്നു വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു ആകാശത്തിൽ നാം കാണുന്ന അവയുടെ വലിപ്പങ്ങൾക്കു് അഥവാ ബിംബങ്ങൾക്കു് വ്യാസവും വ്യതിയമുണ്ടാകും. പൂർണ്ണഗ്രഹണസമയത്തു ചന്ദ്രന്റെ ബിംബം സൂര്യബിംബത്തെക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ, ചന്ദ്രൻ സൂര്യബിംബത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗം മറയ്ക്കുമെങ്കിലും ചുറ്റും മറവിൽപ്പെടാത്തതായ ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരിക്കും. അതു ഒരു വലയമായിക്കാണും. ഇതിന്നു വലയഗ്രഹണം (Annular Eclipse) എന്നു പറയുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ ഗതി എല്ലാശ്ലോഷം സൂര്യഗതിയെക്കാൾ അധികമായതുകൊണ്ടും രണ്ടും പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ടായതുകൊണ്ടും ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തും വിട്ടുപോകുന്നതു കിഴക്കുഭാഗത്തും ആയിരിക്കും. സാങ്കേതികഭാഷയിൽ സ്വർഗ്ഗം പടിഞ്ഞാറും മോചനം കിഴക്കുമായിരിക്കും. ദ്രഷ്ടാവിന്റെ അക്ഷകൊണ്ടും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ദക്ഷിണമോ, ഉത്തരമോ ആയ അയനംകൊണ്ടും, ചന്ദ്രവിക്ഷേപംകൊണ്ടും സ്വർഗ്ഗമോചനദിക്ഷകൾ കൃത്യം പടിഞ്ഞാറുനിന്നും തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ മാറിയെന്നു വരാം. ഇങ്ങിനെ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ സാമാന്യസ്വഭാവം. ദ്രുഷ്ടാസ്ഥനായ ദ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്ഥാനഭേദംകൊണ്ടു ചന്ദ്രനെ ഖഗോളത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥാനത്തിന്നു ഭേദം വരും. അതിനാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു കാണുന്ന സൂര്യഗ്രഹണംപോലെതന്നെയായിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റൊരുസ്ഥലത്തുനിന്നു കാണുന്നതു്. സ്വർഗ്ഗമോചനസമയങ്ങൾക്കും സൂര്യന്നു ഗ്രഹണം പററിയ അംശത്തിന്നും ഭേദമുണ്ടാ

വാം. ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് ഗ്രഹണമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു ഉണ്ടായില്ലെന്നുതന്നെ വരും.

എല്ലാ സമയത്തും സൂര്യനിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ മറുവശത്തു കൂടി കാ (Cone) രൂപത്തിൽ ഒരു ഛായ (നിഴൽ) ഉണ്ടായിരിക്കും. സൂര്യനിൽനിന്നു 6 രാശി അകലത്തു അപക്രമവൃത്തമാകുമായി ഈ ഛായ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പൗർണ്ണമാസ്യന്ത്യത്തിൽ സൂര്യനിൽനിന്നു ചന്ദ്രന്റെ അകലവും 6 രാശിയാണല്ലോ. അതിനാൽ അപ്പോൾ ചന്ദ്രനും ഭൂഛായയും അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ ഒരേ പ്രദേശത്തായിരിക്കും. ഈ സമയത്തു ചന്ദ്രനു വിക്ഷേപമില്ലാതിരിക്കുകയോ ചന്ദ്രവിക്ഷേപം ചന്ദ്രന്റേയും ഭൂഛായയുടേയും ബിംബവ്യാസാർദ്ധയോഗത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ ഭൂഛായയിൽ ചന്ദ്രൻ മുഴുവനോ ഏതാനുമോ കടന്നിരിക്കും. അങ്ങിനെ ചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണമോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നു. വിക്ഷേപം കുറവായതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ രാഹുവിന്റേയോ കേതുവിന്റേയോ അടുത്തായിരിക്കണം. ഭൂഛായയുടെ ഗതി എല്ലാപ്പോഴും സൂര്യഗതിക്കു തുല്യമായിരിക്കും. ചന്ദ്രന്റെ ഗതി അതിനെക്കാൾ എപ്പോഴും അധികമായിരിക്കും. അതിനാൽ ചന്ദ്രന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തു സ്തംഭവും പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു മോചനവും ഉണ്ടാകുന്നു. ചന്ദ്രനെ കാണാവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ സമയത്തു ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും കാണാം. എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്തു ഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും.

സൂര്യചന്ദ്രസഞ്ചാരഗണിതത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്ന പൂർവ്വന്മാർ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സൂര്യഗ്രഹണവും സൂക്ഷ്മമായി ഗണിപ്പാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ആമുഖാല്പ്രായത്തിൽ ഹീ, ഹോ എന്നു ചിന്തയ്ക്കുതിഷ്ഠിക്കുക പഠിപ്പിച്ച അപകടം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.

പൗരാണികന്മാരുടെ ശുദ്ധ ഗ്രഹസഞ്ചാരങ്ങളിലും ഗ്രഹണം മുതലായവകളിലും മാത്രമല്ല പതിഞ്ഞിരുന്നത്. നക്ഷത്ര

മണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും, ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഭൂമിയുടേയും ഉത്ഭവത്തിലും ഉത്ഭവകാലത്തിലും പതിഞ്ഞിരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ കോടാനുകോടി നാഴിക അകലെയാണെന്നു തെളിവുകളുടെ നിബ്ബന്ധംകൊണ്ടുമാത്രം നാം ഇന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടിവന്നതാണ്. മനുഷ്യനു സ്വയമേവ അതിന്നു മനസ്സില്ലാത്തപോലെത്തോന്നുന്നു. തന്റെ അല്പത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ആരോപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഒരു വാസനയുണ്ട്. കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ കാലത്തുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങൾ അത്രയധികം അകലെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കുകൂടി പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. നാം തിരിയുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ എതിർവശത്തേക്കു തിരിയുന്നു. നാം ഓടുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവ എതിർവശത്തേക്കു ഓടുന്നതായിത്തോന്നുന്നു. നാം സ്ഥലം മാറി നില്ക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുന്ന ദിക്കുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള വസ്തുവിന്റെ ദിക്ക് അധികം മാറുന്നു. അകലെയുള്ളവയുടേതു അല്പമെങ്കിലും മാറുന്നു. ഇതിന്നു പരിഭ്രംശം (Parallax) എന്നു പറയുന്നു. ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്നനുസരിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്ന ദിക്കിന്നും പരിഭ്രംശം കാണേണ്ടതല്ല എന്നു പണ്ഡിതന്മാർ വാദിച്ചു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അതിരറ്റ ദൂരംകൊണ്ടാണ് അവക്ക് പരിഭ്രംശം കാണാതിരിക്കുന്നത് എന്നു അനവധിപേർ സമ്മതിച്ചില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മളിൽനിന്നു അത്ര അധികം ദൂരത്തല്ലെന്നായിരുന്നു. ഭാരതീയപൗരാണികസൂരികൾ എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരുകല കിഴക്കോട്ടു ഗതിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും യോജനാത്മകഗതി അവക്കും ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെത്തന്നെയാണെന്നും വിചാരിച്ചുവോ എന്നു തോന്നുമാറ് നക്ഷത്രകുടുംബപരിധി, എന്നുവെച്ചാൽ ഗോളപുഷ്പാകാരമായ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിന്റെ മദ്ധ്യവേഷണം, സൂര്യകുടുംബയുടെ 60 മടങ്ങാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“ഭവേദ് ഭക്ഷാ തിഗ്ഗ്മാംശോർഭ്രമണം ഷഷ്ടിതാഡിതം
സദ്യോപരിഷ്ഠാദ് ഭ്രമതി യോജനൈസ്തേമണ്ഡലം.

സൂർയ്യാസ്ഥാനം, അദ്ധ്യായം 12, ശ്ലോകം 80.

സൂർയ്യാസ്ഥാനകക്ഷയെ 60 കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ നക്ഷത്രകക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ആ യോജനകളെക്കൊണ്ടു നക്ഷത്രമണ്ഡലം ഭ്രമിക്കുന്നു, എന്നു സാരം. നക്ഷത്രകക്ഷ ക്ഷേപരത്തം ആകാശം (Perhaps Space) വ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നു അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. തുടന്നു സൂർയ്യാസ്ഥാനം പറയുന്നു—

“കല്പോക്തചന്ദ്രഭഗണാ ഗുണിതാ ശശികക്ഷയാ

ആകാശകക്ഷാ സാ ജേന്യയാ കരവ്യാപ്തിയാ രവേഃ.”

ആയിരം ചതുർയുഗങ്ങളുടങ്ങിയ കല്പകാലത്തിൽ ചന്ദ്രൻ യോജനഗതികൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ആകാശകക്ഷ. സൂർയ്യാന്റെ കരങ്ങൾ എത്രന്നു അതിരാണ് അത് എന്നു സാരം. ഈവിധം അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാ സിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാം. ആർയ്ഭട്ടീയത്തിൽ മാത്രം ചതുർയുഗശശിസഞ്ചാരയോജനകളാണ് ആകാശകക്ഷയെന്നു പറയുന്നു. പൗരാണികസൂരികൾ പ്രായോഗികവശം മാത്രമായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചതെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട്. അല്ല. അവർ അന്വേഷിച്ചതു സത്യത്തെയാക്കുന്നു. അതു എത്ര ഫലിച്ചുവോ ഇല്ലയോ എന്നു മറ്റൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ്.

സൂർയ്യാസ്ഥാനത്തേയും ജ്യോതിർഗ്ഗണിതപാരാ അവർ അന്വേഷിക്കാതിരുന്നില്ല. ജ്യോതിഷവേദാംഗത്തിൽ സൂർയ്യാചന്ദ്രന്മാരെ ഗണിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി 5 സംവത്സരത്തെ ഒരു യുഗം (കൂടിച്ചേരുന്ന കാലമെന്നർത്ഥം) എന്നു കല്പിച്ചതായി കാണുന്നു—

“ത്രിശത്വഹ്നാ സഷ്ട്ഷഷ്ടിരബ്ധു, പഞ്ചത്ത്വോയനേ

മാസാ ദാദശ സൂർയാഃ സൂരേതൽ പഞ്ചഗുണം യുഗം. 28

366 ദിവസങ്ങളോടും 5 ഋതുക്കളോടും 2 അയനങ്ങളോടും കൂടിയതു അബ്ധം. അതിൽ 12 മാസങ്ങളും ആ മാസങ്ങളോടു സം

ബന്ധിച്ച 12 സൂര്യന്മാരും (മാസവിഭാഗേന ദ്വാദശാഭിത്യാ ഇതി ശ്രുതേഃ) ഉണ്ടു്. ഇതിനെ ഓകൊണ്ടു ഗുണിച്ചതു യുഗം, എന്നു ഇതിന്റെ സാരം. കാലക്രമേണ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഗതികൾ കണ്ടുകൂടി സൂക്ഷ്മമായറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മേഷാദിയിൽ ഒരുമിച്ചുനിന്നു അവരവരുടെ ഗതിയോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു പിന്നേയും മേഷാദിയിൽ ഒരുമിച്ചെത്തുവാൻ എത്രകാലം വേണമെന്നു ഗണിച്ചുനോക്കി. അന്നറിഞ്ഞതനുസരിച്ചു് ഈ കാലം 43,20,000 സംവത്സരമെന്നു കിട്ടി. ഈ യുഗത്തെ 10 ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി അവയിൽ 4, 3, 2, 1 ഖണ്ഡങ്ങൾക്കു കൃത, ത്രേത, ദ്വാപര, ഓലി എന്നു പേരുകളും കൊടുത്തു. വർത്തമാനകാലം ഇതിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ കാലത്തിൽ 9 ഖണ്ഡങ്ങളും പത്താമത്തേതിൽ കുറെ സംവത്സരങ്ങളും കഴിഞ്ഞുവെന്നു കണ്ടു. 5000 കലിവർഷം തികഞ്ഞതു 1899 എപിൾ 13-ാം തിയതി വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു.

പണ്ഡിതന്മാർ ഈ യുഗാരംഭത്തിൽ ജന്തുക്കളുടെ സൃഷ്ടിയുണ്ടായെന്നും ചതുർയുഗാന്ത്യത്തിൽ അവയുടെ നാശമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ആലോചിച്ചാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിനെയാവാമെങ്കിലും, ക്രമേണ ചിരാകാലത്തെ സൂക്ഷ്മതരമായ നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു മേഷാദിയിൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചുനിന്നു പിന്നേയും കൃത്യമായി മേഷാദിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടണമെങ്കിൽ ഒരു ചതുർയുഗം പോരാ എന്നും 1000 ചതുർയുഗത്തോളം പോന്നതും കല്പം എന്നു പറയുന്നതുമായ കാലം വേണമെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി വർത്തമാനകല്പത്തിന്റെ ആദിയിലെന്നു വിചാരിച്ചു. ഈ കല്പകാലം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനമെന്നു സങ്കല്പിച്ചുതുടങ്ങി. “സ്വാദ്യുഗാനാം സഹസ്രം ദിനം വേദ സഃ സോഽപി കല്പോ ദൂരാത്രം തു കല്പദായം.” (ആയിരം യുഗങ്ങൾകൂടിയതു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനമാകുന്നു. അതുതന്നെ കല്പം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലും രാവും കൂടിയതു രണ്ടു

കല്പകാലമാകുന്നു.) എന്നു ഭാസ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു. കല്പത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടിയും അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രളയവുമാകുന്നു. “സൃഷ്ടിരേഷാം ദിനാദൌ ദിനാന്തേ ലയഃ.” ഈ പറഞ്ഞതു ഒരു പഴയ ഭാഷയിലാണെങ്കിലും, ഗ്രഹങ്ങളുടേയും മറ്റും ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതു എന്നതിന്നു സംശയമില്ല. ഈവിധം ചിന്തകൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇന്നും തുടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നു പിന്നീടു കാണാം. വർത്തമാനകല്പത്തിൽ 453 ചതുർയുഗം കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടത്രെ.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൈനികചലനത്തേയും * ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതികളേയും സംബന്ധിച്ച ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായം താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

“സൃഷ്ടാ ഭവത്രം കമലോത്ഭവേന

ഗ്രഹൈഃ സഹൈതൽ ഭഗണാദിസംസ്ഥൈഃ

ശശപദ്ഭുമേ വിശ്വസൃജാ നിയുക്തം

തദന്തതാരേ ച തഥാ ധ്രുവതേപ.

13

തതോപരാശാഭിമുഖം ഭവഞ്ജരേ

സഖേചരേ ശീഘ്രതരേ ശ്രമത്വപി

തദ്വല്ലഗത്യേന്ദ്രദിശം നഭശ്ചരാ-

ശ്ചരന്തി നീചോച്ചതരാത്മവർത്തസു.

14

[നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ ആദിയിൽ സംസ്ഥാപിതമായ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഭവത്രത്തെ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് അതിനെ ശാശ്വതഭൂമണത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അറ്റങ്ങളിലുള്ള രണ്ടു താരങ്ങളേയും ഉറച്ചുനില്ക്കുവാനും നിയമിച്ചു. അതിന്നുശേഷം പടിഞ്ഞാറോട്ടു ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി നക്ഷത്രപഞ്ചരം ശീഘ്രതരമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അതിനെക്കാൾ അല്പമായ ഗതിയോടുകൂടി ഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചനീചതപ

* ആയുർഭട്ടൻ ചതുർയുഗത്തെ നാലു സമഭാഗമാക്കി അവയെ കൃത, തൃത, ചോപര, കലിയുഗങ്ങളായിത്തീർക്കുന്നു.

ത്തോടു കൂടിയ തങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്നതായിത്തോന്നുന്നു, എന്നു സാരം.] ഇങ്ങിനെ പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയെല്ലാം കഴിച്ച് “ഭാനാമധ്യസ്തനൈശ്വര, സുരഗുരു, ഭൗമാക്ഷ, ശുക്ര, ബുധ, ചന്ദ്രാഃ.” (നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താഴെ ശനി, പ്യാഴം, ചൊവ്വ, സൂര്യൻ, ശുക്രൻ, ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ) എന്നു ആയുർവ്വേദൻ പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെ നിർത്തി കല്പാദിയിൽ എല്ലാറ്റിനോടും സഞ്ചരിക്കുവാനുജ്ഞാപിച്ചു എന്നു തോന്നിപ്പോകും. നക്ഷത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങൾ പതുക്കെ സഞ്ചരിച്ചു. ഉടനെത്തന്നെ,

“ലങ്കാനഗർവ്വമുദശാശ്ച ഭാനോ-

സ്തസ്യൈവ വാരേ പ്രഥമം ബഭൂവ

മധോഃ സിതാദേർഭിനമാസവഷ-

യുഗാദികാനാം യുഗപൽ പ്രവൃത്തിഃ.

സിദ്ധാന്തശാഭോമണി, മദ്ധ്യമാധികാരം—15.

[ലങ്കാനഗരിയിൽ സൂര്യൻ ചൈത്രമാസത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷാദിയിൽ സ്വപാരത്തിൽ ഉദയംകൊണ്ടു. ഇങ്ങിനെ ദിവസം, മാസം, വഷം, യുഗം മുതലായവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണിച്ചു തുടങ്ങി.]

ആ ഞായറാഴ്ചയേയും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളേയും 24 ഹോര(Hour)കളായി ഭാഗിച്ച്, അവക്ക് ‘ശന്നൈശ്വര, സുരഗുരു, ഭൗമാക്ഷ, ശുക്ര, ബുധ, ചന്ദ്രാ’ എന്ന ക്രമത്തിൽ സൂര്യൻ തൊട്ടു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു അധിപന്മാരേയും കല്പിച്ചു. ആദ്യദിവസത്തെ പ്രഥമഹോരാനാമൻ സൂര്യൻ തന്നെ. ദ്വിതീയഹോരക്ക് ശുക്രൻ. ഈ ക്രമത്തിൽ 8-ാമത്തേയും, 15-ാമത്തേയും, 22-ാമത്തേയും ഹോരകൾക്കും നാമൻ സൂര്യനെ വരും. 23, 24 ഈ ഹോരകൾക്ക് നാമന്മാർ ശുക്രനും ബുധനുമായും. ദിവസം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം പ്രഥമഹോരക്ക് നാമൻ ഈ ക്രമത്തിൽ ചന്ദ്രൻ എന്നു വരും. അതിനാൽ ഈ ദിവസത്തെ ചന്ദ്രവാരമെന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ

നാലാമത്തെ, നാലാമത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് ആഴ്ചയിലെ 7 ദിവസങ്ങൾക്കും വന്നു പോന്നു. യൂറോപ്പിൽ അടുത്ത കാലം വരെ പ്രധാനഭാഷയായിക്കരുതിവന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചിൽ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഈവിധംതന്നെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പുരാതനദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തതായിക്കാണുന്നു.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന്നു കാരണം ആകർഷണമായിരിക്കണമെന്നു പൂർവ്വന്മാർ ഊഹിച്ചു. അവർ ആലോചിച്ചതു സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽനിന്നു കാണാം.

“അദൃശ്യരൂപഃ കാലസ്യ മൂർത്തയോ ഭഗണാശ്രിതഃ
ശീഘ്രമന്യോച്ചപാതാഖ്യാ ഗ്രഹാണാം ഗതിഹേതവഃ.” 2-1

“തദ്വ്യാതരശ്ശിഭിർബലാസൈസ്സ സപ്രേതരപാണിഭിഃ
പ്രാകപശ്ചാദപകൃഷ്ടന്തേ യഥാസന്നം സ്വദിങ്മുഖഃ.” 2-2

ശീഘ്രോച്ചം, മന്യോച്ചം, പാതൻ ഇവ പ്രത്യക്ഷമായിക്കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തവയും നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ ആശ്രയിച്ചവയും കാലത്തിന്റെ മൂർത്തികളും ആകുന്നു. ഇവയത്രെ ഗ്രഹഗതികൾക്ക് കാരണം. ഇവരുടെ വായുരൂപമായ ശശികളെക്കൊണ്ടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളെ വാമദക്ഷിണബാഹുക്കളെക്കൊണ്ടു അടുപ്പത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ഇവ സ്വാഭിമുഖമായി പൂർവ്വപശ്ചിമമാഗ്നങ്ങളിലേക്കു ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഊഹങ്ങളാണ്. ഇവക്ക് ശാസ്ത്രീയരൂപം സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളുമാണ് അന്യോന്യം ആകർഷിക്കുന്നതെന്നു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നതായിത്തോന്നുന്നില്ല. ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷമായിക്കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത മന്യോച്ചശീഘ്രോച്ചങ്ങളാണ്.

“പ്രവഹാവ്യോ മരുത്താംസു സേവാച്ചാഭിമുഖമീരയേൽ

പൂർവാപരാപകൃഷ്ടാഃസു ഗതിം യാന്തി പഥഗപിധാം.” 2-3

പ്രവഹൻ എന്ന വായു ഗ്രഹങ്ങളെ തന്റെ തന്റെ ഉച്ചസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു ചലിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാ

റോട്ടം അപകൃഷ്ടരായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതി പലവിധത്തിലായിത്തീരുന്നു.

“ദക്ഷിണോത്തരതോപ്യേവം പാതോ രാഹുസ്സപരംഹസാ
വിക്ഷിപത്യേഷ വിക്ഷേപം ചന്ദ്രാദീനാമപക്രമാൽ.” 2-6

പാതസ്ഥനായ രാഹു തന്റെ ശക്തികൊണ്ടു അപക്രമമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു ചന്ദ്രാദികളെ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നീക്കിനിർത്തുന്നു. ഈ നീക്കമാണ് വിക്ഷേപം.

‘മഹത്തപാനുണ്ഡലസ്യാക്ഷഃ സ്വപ്ലമേവാപകൃഷ്ടതേ
മണ്ഡലാല്പതയാ ചന്ദ്രസ്തോ ബഹപപകൃഷ്ടതേ.” 2-9


സൂര്യമണ്ഡലം മഹത്തായതുകൊണ്ടു അതു അല്പം മാത്രം അപകർഷിക്കപ്പെടുന്നു (നീക്കപ്പെടുന്നു.) ചന്ദ്രമണ്ഡലം ചെറുതായതുകൊണ്ടു അതു അധികം അപകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇന്നറിയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ(ഭാരകാകർഷണം-Gravitation)മാവട്ടെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളാവട്ടെ പൂർവ്വനാക്കറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അവരുടെ ചില സങ്കല്പങ്ങളെത്തന്നെ അവർ സ്വഷ്ടമായിക്കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാണ്. എങ്കിലും ഗ്രഹസഞ്ചാരത്തിന്നു മതിയായ കാരണം വേണമെന്ന ആലോചന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിലരെപ്പോലെ ‘അതറിഞ്ഞിട്ടെന്തിനാ?’ എന്നു അവർ ചോദിച്ചില്ല. അവർ കാരണം കണ്ടതു പ്രവഹവായുവിലും മന്ദോച്ചശീഘ്രോച്ചപാതങ്ങളുടെ അപകർഷണങ്ങളിലുമാണ്.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച പ്രാചീനസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് കോപ്പർനിക്കസ്സ്, കെപ്ലർ, ന്യൂട്ടൻ എന്നിവരുടെ ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു അടിക്കല്ലുകളായിത്തീർന്നതെന്നു ഇനിയത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽനിന്നു കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെങ്കിലും ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചത്.

ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പു സൂക്ഷ്മമായ വടക്കു കാണുവാനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെപ്പറയാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചോ

അവനതം (=ഗമനക്കാൽ) ഉപയോഗിച്ചോ നിരപ്പാക്കിയ ഒരു കളത്തിൽ 24 അംഗുലം വ്യാസാൽമായി ഒരു വൃത്തം നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ 12 അംഗുലം ഉയരത്തിൽ അഗ്രം കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുറി ശരിക്കു് അധോല്പമായി നാട്ടുക. ഈ കുറിക്ക് ശംകുവെന്നു പേര്. കാലത്തു ശംകുവിന്റെ നിഴൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടായിരിക്കും. ക്രമേണ അതു ചുരുങ്ങുകയും മദ്ധ്യാഹ്നമാകുമ്പോഴേക്കു് നേർ വടക്കോട്ടോ തെക്കോട്ടോ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞാൽ നിഴൽ പിന്നേയും നീളുകയും അസ്തമനത്തോടുകൂടി കിഴക്കോട്ടു തിരിയുകയും ചെയ്യും. ഇതിനിടയിൽ വൃത്തപരിധിയെ നിഴലിന്റെ അറ്റം 2 പ്രാവശ്യം സ്പർശിക്കുന്നു. കാലത്തു ശംകുവിന്റെ അരികത്തു ശുദ്ധയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന് നിഴലിന്റെ അറ്റം വൃത്തപരിധിയെ കടക്കുന്നവിടെ അടയാളം വെക്കുക. വൈകുന്നേരം വൃത്തത്തി



ചരിലേഖം 26.

ന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തും ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം. പിന്നെ ദിവസം കാലത്തും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ അടയാളം വെക്കണം. സൂര്യന്റെ അയനംകൊണ്ടു കാലത്തു വെക്കുന്ന രണ്ടടയാളങ്ങളും വൃത്താസ്പെട്ടിരിക്കും. രണ്ടു അടയാളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

അന്തരാളത്തെ മൂന്നു സമഭാഗമാക്കി ആദ്യദിവസം വെച്ചു അടയാളത്തെ പിറൊ ദിവസത്തെ അടയാളത്തിന്നു നേക്കു ഒരു ഭാഗം നീക്കുക. ഈ കിട്ടിയ അടയാളത്തേയും ആദ്യദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ കിട്ടിയ അടയാളത്തേയും ചേർന്ന രേഖ ശരിക്കു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായിരിക്കും. ഇതിൽനിന്നു തെക്കുവടക്കു രേഖയും ഉണ്ടാക്കാം.

മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഇതിനെക്കാൾ കുറേക്കൂടി എളുപ്പമാണ്. ധ്രുവനക്ഷത്രം ഏതാണ്ട് വടക്കാകുന്നു. എന്നാൽ ശരിക്കു വടക്കല്ല. കൃത്യമായ ധ്രുവത്തിൽനിന്നു അതു രേഖതിയുടേയും അക്കർനാറിന്റേയും നേക്കായി, ചിത്രനക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു എതിർവശത്തേക്കായി 64 കലയോളം നീങ്ങിനില്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ധ്രുവത്തിന്റെ ചുറ്റും ധ്രുവനക്ഷത്രം ആകാശം തിരിയുന്നതോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ പൂത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. രേഖതിയോ, അക്കർനാരോ, ചിത്രയോ ഭക്ഷിണോത്തരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ധ്രുവനക്ഷത്രം ശരിക്കു വടക്കു നില്ക്കും. രേഖതിയോ, അക്കർനാരോ, ചിത്രയോ ഉച്ചയായോ എന്നു തീർച്ചയാക്കുന്നതിൽ വല്ല ചെറിയ പിഴവുകളും വന്നാൽ അതു ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിന്റെ ദിക്കിനെ അധികം ബാധിക്കയില്ല. നാം നില്ക്കുന്നവിടെ രണ്ടു കുറികളെക്കൊണ്ടു ഈ ദിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം. രാത്രി വടക്കു നാട്ടുന്ന കുറി കാണുവാൻ വയ്യാതെ വന്നാൽ, അവിടെ തല്ലാലം ഒരു വിളക്ക് വെച്ച് തെക്കോട്ടു കരെ അധികം മാറിനിന്നു വിളക്കും ധ്രുവനും ഒരേ സ്വരത്തിലായിക്കണ്ടാൽ മാറിനിന്നോടത്തു ഒരു കുറി തറച്ച്, അതിന്റെ ശേഷം വിളക്കിന്റെ നാളത്തിന്നു താഴെ ഒരു കുറിയും തറച്ചാൽ മതി.

ധ്രുവനക്ഷത്രം ഉത്തരധ്രുവത്തിന്നു ചുറ്റും 64 കല വ്യാസാലമായ ഒരു ദൃഢപൂത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ദിവസത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ധ്രുവൻ ഭക്ഷിണോത്തരരേഖയെ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ ധ്രുവത്തിന്റെ മീതെ, പിന്നെ താഴെ.

മീതെ കടന്നു തൊട്ടു താഴെ കടക്കുന്നതുവരെയുള്ള സമയം താഴെ കടക്കുന്നതുതൊട്ടു മീതെ കടക്കുന്നതുവരെയുള്ള സമയത്തിന്നു തുല്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വടക്കോട്ടു തിരിച്ചുവെച്ച ഒരു ദൂരദർശിനിക്കുഴലിന്റെ മദ്ധ്യരേഖയേയും നക്ഷത്രം ഇപ്രകാരം കടന്നുപോകുന്നുവെന്നു കണ്ടാൽ ദൂരദർശിനി കൃത്യം വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. തെക്കുവടക്കു തിരിയത്തക്കവിധം കയറിയ ഒരു ദൂരദർശിനിക്കുഴലിനെ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തെ പരീക്ഷണംകൊണ്ടു കൃത്യമാക്കി നിർത്തിട്ടാകുന്നു ആധുനികന്മാർ നിരീക്ഷണശാലകളിൽ വടക്കു നിശ്ചയിക്കുന്നത്.



ജ്യോതിഷബാലബോധിനി

അപരവണ്ഡം

നിധപരോപനേഹിതജ്ഞ


ഡബ്ബൽ

1. ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

കോപ്പർനിക്കസിന്റെ 'പേര്' മുമ്പ് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഗണിതവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഗ്രഹഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് പൂർവ്വ ഘ്നത്തിൽ വിവരിച്ചതു ഭാരതീയപൂർവ്വജ്യോതിഷികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണെങ്കിലും, ഏതാണ്ട് അതുപോലെത്തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു പുരാതനയവനപണ്ഡിതന്മാർക്കും കോപ്പർനിക്കസിന്റെ കാലംവരെ മറ്റു സങ്കല്പപാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോപ്പർനിക്കസിനു ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നു.

പൂർവ്വഘ്നത്തിൽ വിവരിച്ച ശീശ്ലോച്ചങ്ങൾ അഥവാ പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങൾ മദ്ധ്യമസൂര്യനു നേക്കായിട്ടാണ് കല്പിച്ചത്. എന്നു മാത്രമല്ല ചിലതെല്ലാം സൂര്യന്റെ ഈ ഭാഗത്തും ചിലതു മറ്റുഭാഗത്തുമായി കല്പിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതിന്നു കാരണം ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം യോജനഗതി തുല്യമാണെന്ന സങ്കല്പമായിരുന്നു. കോപ്പർനിക്കസ്സ് ഈ സങ്കല്പം നിരാകരിച്ചു. എല്ലാ ശീശ്ലോച്ചങ്ങളേയും മദ്ധ്യമസൂര്യനു നേക്കു പല സ്ഥാനങ്ങളിലും കല്പിക്കുന്നതിന്നു പകരം സ്പടസൂര്യനിൽത്തന്നെ കല്പിച്ചു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ശീശ്ലോച്ചവൃത്തം സൂര്യകക്ഷതന്നെയെന്നു വെച്ചു. എന്നാൽ ശീശ്ലോച്ചവൃത്തവ്യാസാർദ്ധത്തിന്റേയും പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാർദ്ധത്തിന്റേയും തോതിന്നു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പാടില്ല. ആതോരു സൂര്യനിൽനിന്നും മദ്ധ്യമങ്ങളിൽനിന്നും സ്പഷ്ടഗ്രഹത്തിന്റെ കവിഞ്ഞു നീക്കത്തെ ആശ്രയിച്ചതാണല്ലോ. ഈ നീക്കം നിരീക്ഷണസിദ്ധവും പറയത്തക്ക പിഴവുകൾ ഇല്ലാത്തതു

മാണ്. അതിനാൽ ബുധനേയും ശുക്രനേയും സംബന്ധിച്ച് ശീശ്രോച്ചങ്ങളെ സൂര്യനിലേക്കു നീക്കി ശീശ്രോച്ചവൃത്തവ്യാസാൽങ്ങളെ വലുതാക്കിയതോടുകൂടി പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാൽങ്ങളേയും, അതനുസരിച്ച് പ്രതിമണ്ഡലപരിധികളേയും, യോജനാത്മകഗതികളേയും അതേ തോതിൽ വലിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വ, വ്യാ



പരിലേഖം 27.

ഴം, ശനി ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ശീശ്രോച്ചം സൂര്യനിലേക്കു നീക്കി. അപ്പോൾ ശീശ്രോച്ചവൃത്തവ്യാസങ്ങൾ ചുരുങ്ങി. ഈ തോതിൽ പ്രതിമണ്ഡലവ്യാസാൽങ്ങളേയും, പരിധികളേയും, യോജനാത്മകഗതികളേയും ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു. പരിലേഖത്തിൽ ശുക്രനെ സംബന്ധിച്ചും ചൊവ്വയെ സംബ

സ്വീച്ചം കോപ്പർനിക്കസ്സ് ചെയ്ത ഈ മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഭൂ ഭൂമിയും സൂര്യനും ശ ശുക്രശീശ്ലോചവും ച ചൊവ്വയുടെ ശീശ്ലോചവുമാകുന്നു. 1ഉം 2ഉം വൃത്തങ്ങൾ ശുക്രനേരയും ചൊവ്വയുടേയും പൂർവ്വസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിമണ്ഡലങ്ങളും, 3ഉം 4ഉം ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കോപ്പർനിക്കസ്സ് സങ്കല്പിച്ച പുതിയ കക്ഷകളുമാകുന്നു. 3നും 4നും കേന്ദ്രം എന്ന സൂത്രന്തന്നെ. ശു, ചൊ, പൂർവ്വസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ശുക്രനേരയും ചൊവ്വയുടേയും അന്തരീക്ഷസ്ഥാനങ്ങൾ. ശു, ചൊ, കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ നൂതനസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ആ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളുടേയും അന്തരീക്ഷസ്ഥാനങ്ങൾ. ഏതുപ്രകാരമായാലും ശുക്രനേരയും, ചൊവ്വയേയും ഭൂമിയിൽനിന്നു കാണുന്ന ദിക്ഷകൾക്ക് മാറാമില്ല. ശുക്രനേരയും ചൊവ്വയുടേയും പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങളെ സൂര്യനിലേക്കു മാറിയതോടുകൂടി അവയുടെ കക്ഷാപരിധിക്ക് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും പരിലേഖത്തിൽ കാണാം.

ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹസഞ്ചാരസിദ്ധാന്തത്തിന്നു കുറേക്കൂടി സാരമൂലവും ചാരുതയും വന്നുവെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു പകരം ഭൂമി ബുധാദികളെപ്പോലെ സൂര്യന്നു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു വെച്ചാൽ, സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം മാത്രമല്ല, ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരങ്ങളും പൂർവ്വസിദ്ധാന്തപ്രകാരംതന്നെ ഇപ്പോഴും കാണാം. ഉദാഹരണമായി, ശുക്രനും ഭൂമിയും സൂര്യന്റെ ഒരു വശത്തായി വന്നുവെന്നു കരുതുക. ഈ രണ്ടും ഘടികാരത്തിന്റെ സൂചികൾ തിരിയുന്ന വശത്തിന്നു എതിരായി ഇടത്തോട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ശുക്രൻ ഭൂമിയെക്കാൾ ശീഘ്രതയായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയെ ശുക്രനോടു ചേർക്കുന്ന രേഖ വലത്തോട്ടു തിരിയുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ ഭൂപുഷ്പസ്ഥനായ ഒരു ഭൂഷാപിന്നു ശുക്രൻ വലത്തോട്ടു പോകുന്നതായിത്തോന്നുന്നു, അഥവാ ശുക്രന്നു വക്രഗതിയുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. ചൊവ്വയും ഭൂമിയും സൂ

യുടെ ഒരുവശത്തായി വന്നുവെന്നു കരുതുക. ചൊവ്വ ഭൂമിയെക്കാൾ മന്ദമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭൂമിയെ ചൊവ്വയോടു ചേർന്ന രേഖ വലത്തോട്ടു തിരിയുന്നു, അഥവാ ചൊവ്വയുടെ വക്രഗതിയുള്ളതായിക്കാണുന്നു. ഈ വിധം ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാതരം സഞ്ചാരങ്ങളും സ്തംഭനവും പ്രാചീനസിദ്ധാന്തത്തിലും ആധുനികസിദ്ധാന്തത്തിലും ഒരുപോലെതന്നെ വരുന്നു.

സാരജ്യചാരതകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഉറച്ചുകിടക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളുടേയും നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിന്റേയും രാശിച്ചക്രത്തിന്റേയും കേന്ദ്രഗതമായി സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നുവെന്നു ആദികാലം മുതൽക്കു വിശ്വസിച്ചുപോന്ന ഭൂമി ബുധൻ മുതലായ താരാഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിമാത്രം വിശ്വസിച്ചുപോന്ന സൂര്യന്റെ ചുറ്റും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതു പണ്ഡിതന്മാർക്കു വിശ്വാസയോഗ്യമായിത്തോന്നിയില്ല. പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ അതു പ്ലാറോവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനും ഭാരതത്തിൽ അതു മഹഷിമാർ കരുതലാമലകമ്പോലെ കണ്ടറിഞ്ഞ പരമാർത്ഥത്തിനും വിരുദ്ധമായിരുന്നു.


കോപ്പർനിക്കസ്സ് തന്റെ 'പ്രോമഗോളപരിവർത്തനം' എന്ന ഗ്രന്ഥം 1540 ലായിരുന്നു പരസ്യം ചെയ്തത്. അവിടെ 60 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു 1600 ഫിബ്രവരി 17-ാം തീയതി റോമിൽവെച്ച് ജീവനോടെ തീയിലിട്ട് ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ബ്രൂണോ എന്ന തത്വചിന്തകന്റെ പേരിൽ ചുമത്തിയ കാര്യമായ അപരാധം അദ്ദേഹം കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം വിശ്വസിച്ചു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു തന്നെ പ്രസംഗിച്ചതായിരുന്നു. ഈ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ടൈക്കോബ്രാഹി എന്ന ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, ഈ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും ഈ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനുംകൂടി ഉറച്ചുനില്ക്കു

ന്ന ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നതന്നെ വാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റേയും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുടേയും കാൽമായ സംശയം ഭൂമി സൂര്യന്റെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രംശം (Parallax) കാണേണ്ടതല്ലെ എന്നായിരുന്നു. കോപ്പർനിക്കസ്സും ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വൃത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിക്കരുതി. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു മന്ദോച്ചവൃത്തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതും തന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്നു സ്വീകാര്യം ലഭിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമായിനിന്നു. ഈ സംശയങ്ങളെത്തീപ്പാൻ ട്രെക്കോബ്രാഫി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ വശോളസ്ഥിതികൾ കഴിയുന്നത്ര സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്തു എഴുതിവെച്ചു പോന്നു. ഇത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും നൂതനമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു സാധിച്ചില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ കെപ്ലർ (1571—1630) എന്ന ജർമ്മൻ ജ്യോതിഷി ചെറുപ്പത്തന്നതന്നെ കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. എങ്കിലും മന്ദോച്ചവൃത്തങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്നു സുഖപ്രദമായിത്തോന്നിയില്ല. അതിനാൽ ട്രെക്കോബ്രാഫിയുടെ നിരീക്ഷണഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവയെപ്പറ്റി ഗാഢമായാലോചിച്ചു. അനേകം സങ്കല്പങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗണിതം ചെയ്ത് ഗണിതാഗതഫലങ്ങളെ നിരീക്ഷണഫലങ്ങളോടു കത്തുന്നോക്കിയതിന്റെ ശേഷം ആ യത്നശാലിയായ ഡിമാൻ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വൃത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായത്തെ തള്ളി അവ പലവിധ ച്യുതികളോടുകൂടിയ ആയതവൃത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സമവൃത്തങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യാസങ്ങളും തുല്യമാണല്ലോ. ആയതവൃത്തങ്ങളുടേവ അങ്ങിനെയല്ല. വ്യാസങ്ങളിൽ ഒന്നു എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് വലിയതാകുന്നു. അതിന്നു ഉത്തമാക്ഷാം

(Major axis) എന്നു പേര്. അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടി അതിന്നു ലംബമായ വ്യാസത്തിന്നു അധമാക്ഷിം (Minor axis) എന്നു പറയുന്നു. അധമാക്ഷത്തിന്റെ കരഗ്രന്ഥത്തിന്നു ഉത്തമാക്ഷാൽത്തോളം അകലെയുള്ള ഉത്തമാക്ഷത്തിലെ രണ്ടു



പരിലേഖം 28.

തമ. ഉത്തമാക്ഷം.

യല. അധമാക്ഷം.

രാ. r_1 . നാഭികേന്ദ്രം.

ക. മദ്ധ്യം.

നര = രഗ = ഉത്തർദ്ധ്വകരം.

ചശ: നിയാമകരേഖ.

കര ÷ കത = രത ÷ തവ.

$$= \frac{\text{രബ}}{\text{ബച}} = \text{ച്യുതി.}$$


ബിന്ദുക്കളെ നാഭികളെന്നു പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും നാഭിയിൽ നിന്നു ഉത്തമാക്ഷത്തിന്നു ലംബമായി പരിധിവരെയുള്ള അകലത്തിന്നു ഉത്തർദ്ധ്വകരം (Semilatus Rectum) എന്നു പറയുന്നു. ആയതവൃത്തഗണിതത്തിൽ ഇതിന്നു പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഉത്തമാക്ഷമദ്ധ്യംതന്നെ ആയതവൃത്തത്തിന്റെ മദ്ധ്യം. മദ്ധ്യം തൊട്ടു നാഭിവരെയുള്ള അകലത്തെ ഉത്തമാക്ഷാൽക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഭിന്നത്തെയാകുന്നു ആയതവൃ

ത്തത്തിന്റെ ചുറ്റിയെന്നു പറയുന്നത്. രണ്ടു നാളികളിൽനിന്നും പരിധിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ദൂരങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഉത്തമാക്ഷത്തിന്നു തുല്യമായിരിക്കും. ഒരു നാളിയിൽനിന്നു പരിധിയിലേക്കു സങ്കല്പിക്കുന്ന രേഖയെ ആയതവൃത്തത്തിന്റെ കരം (Radius Vector) എന്നു പറയുന്നു.

ആയതവൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റി ഒന്നിൽ കുറവായിരിക്കും. ചുറ്റി കുറയുന്തോറും രണ്ടു നാളികളും അടുത്തടുത്തു വരികയും ആയതവൃത്തം ആകൃതിയിൽ വൃത്തത്തോടു അടുത്തുവരികയും ചെയ്യും. എല്ലാ ഗ്രഹക്ഷേപങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചുറ്റി ബുധക്ഷേപമാകുന്നു. അതിന്റെ അധമവ്യാസം ഉത്തമവ്യാസത്തിന്റെ 50ൽ കുറവു മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. അതിനാൽ ബുധക്ഷേപത്തോടനുസരിച്ചു വരച്ചാൽ സാധാരണയായ നോട്ടത്തിൽ അതു ഒരു സമവൃത്തത്തിൽനിന്നു ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കയില്ല. ചുറ്റി നന്നെ ചെറുതായി ശൂന്യമാകുമ്പോൾ ആയതവൃത്തം സമവൃത്തമാവുകയും ചെയ്യും.

ഒരു നാളിയിൽനിന്നു അടുത്ത അക്ഷാഗ്രംവരെയുള്ള അകലത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ദൈർഘ്യത്തോളം ആ അക്ഷാഗ്രത്തിൽനിന്നു അകലെ ഉൾപകരത്തിന്നോ അധമാക്ഷത്തിന്നോ സമാന്തരമായി വരച്ച രേഖക്കു നിയാമകരേഖ (Directrix) എന്നു പറയുന്നു. ആയതവൃത്തപരിധിയിലെ ഏതു ബിന്ദുവിൽനിന്നും ഒരു നാളിവരെയുള്ള അകലത്തെ അതിൽനിന്നുണ്ടാക്കിയ നിയാമകരേഖവരെയുള്ള ദൂരംകൊണ്ടു ഹരിച്ചാലും ഫലം ചുറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഒരു നാളിയേയും നിയാമകത്തേയും ഉറപ്പിച്ച് ചുറ്റി ഇന്നതെന്നു നിശ്ചയിച്ചാൽ ആയതവൃത്തത്തെ വരയ്ക്കാം. ഈ ഉപായം സ്വീകരിച്ചാൽ ചുറ്റിയെ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ആക്കി വളർപ്പിക്കാം. ചുറ്റി 1 നോടു അടുത്തുവരുന്നതോറും കേന്ദ്രവും, മറ്റൊന്നാളിയും, ആയതവൃത്തത്തിന്റെ അകന്നു അറ്റവും അകന്നുകൂടുന്നവരും. ചുറ്റി 1നു തുല്യമാകുമ്പോൾ ആ അകന്നു അറ്റം

ഈ ആയതവൃത്തം മുറിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന രണ്ടൊരണ്ടും അകന്നു പോകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വക്ത്രേഖക്ക് ഉന്മീലിക (Parabola) എന്നു പറയുന്നു. ചുതി 1നെക്കാൾ വലിച്ചാൽ വക്ത്രേഖ ഉന്മീലികയെക്കാൾ വികസിക്കുന്നു. പരിലേഖത്തിലെ ആയതവൃത്തത്തിന്റെ ചുതി 2ഉം, പ്രോന്മീലികയുടേതു ഏതാണ്ട് 2½യും ആകുന്നു. ഉന്മീലികക്കു എല്ലായ്പ്പോഴും ചുതി 1തന്നെ. എ



പരിലേഖം 29.

- (1) ആയതവൃത്തം.
- (2) ഉന്മീലിക.
- (3) പ്രോന്മീലിക.

ന്നുകൊണ്ടു സഞ്ചാരപഥത്തിന്റെ വളവ് അല്പം കണക്കിലെടുത്ത്, പിന്നീട് ആ ഗ്രഹമോ ധൂമകേതുവോ ഉന്മീലികയി


ല്ലാറിന്നും പൊതുവില്പുള്ള നാളിനെന്നു നിയാമകം യമ എന്നതുമാകുന്നു. ധൂമകേതുക്കൾ ഉന്മീലികകളിലും പ്രോന്മീലികകളിലും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ആകാശഗതിക്കും വന്നു സഞ്ചാരമാറ്റത്തിന്നു വക്ത്രവലിച്ചാൽ സഞ്ചാരമാറ്റം ആയതവൃത്തമായി മാറിയെന്നുവരാം. അതുപോലെ വല്ല ഗ്രഹമോ, ധൂമകേതുക്കളോ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ആയതവൃത്തത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറമെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകാശ

ലോ പ്രോമ്പീലികയിലോ സഞ്ചരിച്ചു എന്നും വരാം. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഗ്രഹമോ ധൂമകേതുവോ പിന്നീടു സൂര്യനെ സമീപിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ 4-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാണാം.

കെപ്ലർ തന്റെ ഗവേഷണഫലങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം 3 നിയമങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യൻ നാഭികളിൽ ഒന്നാകുന്ന ആയതപ്പുത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
2. ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റേയും സഞ്ചാരത്തിൽ സൂര്യനേയും ഗ്രഹത്തേയും ചേർന്ന കരംകൊണ്ടു തുല്യസമയങ്ങളിൽ തുല്യക്ഷേത്രഫലമുള്ള ത്രികോണങ്ങളെ ഉളവാക്കുന്നു.
3. ഗ്രഹകക്ഷികളുടെ ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധനത്തിന്നു അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ പർച്ചയകാലവും അനുപാതകമാകുന്നു.

ഇവയിൽ 1ഉം 2ഉം നിയമങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തേയും 3-ാം നിയമംകൊണ്ടു ഭൂകക്ഷിയുടെ ഉത്തമവ്യാസവും ഭൂമിയുടെ പർച്ചയകാലവും അറിയുന്നവക്ക് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ പർച്ചയകാലങ്ങളിൽനിന്നു അവയുടെ കക്ഷികളുടെ ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധങ്ങളേയും കണക്കാക്കാം. കെപ്ലർ ഈ ഗണിതംകൊണ്ടു വരുത്തിയ ഫലങ്ങളോടു ടൈക്കോബ്രാഹിയുടെ നിരീക്ഷണഫലങ്ങൾ



പരിലേഖം 30

സാമാന്യേന ഒത്തുകളുണ്ടു. പരിലേഖത്തിൽ ര സൂര്യനും, മ, പ്ര എന്നവ ആയതപ്പുത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ മന്ദോച്ചവും പ്രതിമന്ദോച്ചവുമാകുന്നു. ഗ, ഗ₁, ഗ₂ എന്നവ

ളുടെ പർച്ചയകാലങ്ങളിൽനിന്നു അവയുടെ കക്ഷികളുടെ ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധങ്ങളേയും കണക്കാക്കാം. കെപ്ലർ ഈ ഗണിതംകൊണ്ടു വരുത്തിയ ഫലങ്ങളോടു ടൈക്കോബ്രാഹിയുടെ നിരീക്ഷണഫലങ്ങൾ

ഗ്രഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളുമാകുന്നു. ഗ്രഹം 'മ ഗ' എന്ന കക്ഷാഭാഗവും 'ഗ₁ ഗ₂' എന്ന കക്ഷാഭാഗവും സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ തുല്യമെങ്കിൽ, 'മ ര ഗ' എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 'ഗ₁ ര ഗ₂' എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലത്തിന്നു തുല്യമാകും. ഇതാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ നിയമം. രമ, രഗ, എന്ന കരങ്ങൾ രഗ₁, രഗ₂, എന്ന കരങ്ങളെക്കാൾ നീളമുള്ളവയാകയാൽ $\angle$ ഗരമ എന്ന കോണിന് $\angle$ ഗ₁രഗ₂ എന്ന കോണിനെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഇതിൽനിന്നു ഗ്രഹം മനോച്ചത്തിൽ മന്ദമായും, പ്രതിമനോച്ചത്തിൽ ശീഘ്രമായും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു വരുന്നു. പരിലേഖത്തിൽനിന്നു മനോച്ചം മുതൽ പ്രതിമനോച്ചംവരെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗതി വലിച്ചുവരുന്നതും പ്രതിമനോച്ചംതൊട്ടു മനോച്ചംവരെ ചുരുങ്ങിവരുന്നതും കാണാം.

സൂര്യനിൽനിന്നു ഗ്രഹങ്ങളുടെ അകലങ്ങളും, പശ്ചാത്തലങ്ങളും, ഗ്രഹങ്ങൾ കാരോ സെക്കണ്ടിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന നാഴികകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അകലങ്ങളും പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കെപ്ലർയുടെ മൂന്നാം നിയമം കത്തുന്നോക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഗ്രഹം	ഗ്രഹകക്ഷയുടെ ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധം (പ) (10 ലക്ഷം നാഴികകൾ)	പശ്ചാത്തലം (ഭ) ദിവസങ്ങൾ	$\frac{p^3}{b^2}$	സെക്കണ്ടിൽ ഗരാശരി പോകുന്ന നാഴിക
ബുധൻ	36.0	88.0	6.02	29.55
ശുക്രൻ	67.2	224.7	6.01	21.61
ഭൂമി	92.9	365.3	6.01	18.38
ചൊവ്വ	141.6	687.0	6.01	14.99
വ്യാഴം	483.3	4332.6	6.01	8.06
ശനി	886.2	10759.2	6.01	5.95

R. S. Ball.

കെപ്ലർ തന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച്, ഗ്രഹസഞ്ചാരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തു ഇറാലിക്കാരനായ ഗലീലിയോ

(1564—1642) ഫ്ലോറൻസിലുള്ള സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നു വെ നിസ്സിൽ അഭ്യാസനായി. അവിടെവെച്ച് ഹോളണ്ടിൽ അ കലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അടുത്തന്നപോലെ കാണുവാൻ സാധി പിടുന്ന ഒരുപകരണം സ്റ്റിക്കുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും യുദ്ധകാ ലത്തു ശത്രുസൈന്യങ്ങളുടെ സഞ്ചാരങ്ങളെ കണ്ടറിവാൻ നല്ല താണെന്നു വിചാരിച്ച അധികൃതന്മാരുടെ കല്പനപ്രകാരം അതു രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കയാണെന്നുമുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞു. സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു മടങ്ങി എത്തിയതിന്റെ ശേഷം അല്പദി വസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹവും സ്റ്റിക്കുകാചങ്ങളെ ഒരു കഴ ലിൽ അതാതു സ്ഥാനങ്ങളിൽവെച്ച് അതുപോലെ ഒരുപകര ണമുണ്ടാക്കി. ഈ ഉപകരണത്തെയാണ് നാം ഇന്നു ദൂരദർശി നി (Telescope) എന്നു പറയുന്നത്. ഇതു ക്രിസ്തവർഷം 1609 ലായിരുന്നു. ഗലീലിയോ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ദൂരദർശിനിയെ പിന്നേയും പിന്നേയും പരിഷ്കരിച്ചു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലി യതിന്നു 30 മൈൽ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ 1 മൈൽ മാത്രം അകലെയുള്ളവയെപ്പോലെ കാണിപ്പാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ആ ദൂരദർശിനിയുടെ ഉപചയനശക്തി (Magnifying Power) 30 ആയിരുന്നു.

ഗലീലിയോ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഗ്രഹ ണ്ങളേയും ആകാശഗംഗയേയും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. വ്യാഴത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ബിംബം വിശദമായിക്കണ്ടു. എ ന്നു മാത്രമല്ല അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന 4 ഉപഗ്രഹങ്ങ ലേയും കണ്ടു. ഇതു കോപ്പർനിക്കസ്സ് വിഭാവനം ചെയ്ത സൗ രവ്യഗ്രഹത്തിന്റെ മാതൃകയായിത്തോന്നി. ശനിയെ നോക്കിയു പ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വലയം പ്രത്യക്ഷമായി. ബുധശുക്രന്മാർക്കു ചന്ദ്രനുള്ളതുപോലെ വൃദ്ധിക്കുയവും കണ്ടു. ക്ഷയിച്ചും വളർച്ചയും വരുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പ വും കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അവ സഞ്ചരി ച്ചാൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഉദാഹരണമാ യി പൂർവ്വസിദ്ധാന്തപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ബുധനെ ഒരിക്കലും പ്ത

ണ്ണുവൃത്താകാരത്തിൽ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ഗലീലിയോവിന്നു ബുധനെ പൂണ്ണവൃത്താകാരത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ആ കാശഗംഗയെ നോക്കിയപ്പോൾ, ആ പ്രഭാവലയം അസംഖ്യം ചെറുതാരങ്ങളുടെ സമൂഹമായിക്കണ്ടു. സന്തുഷ്ടനായ ഗലീലിയോ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരേയും പ്രഭുക്കന്മാരേയും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ക്രമേണ കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന ബോധം അവരിൽ ഉദിച്ചു. ഗലീലിയോ ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു. ഇതെല്ലാം യോറോപ്പിലെ പുരോഹിതന്മാരെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർക്കു കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരു വാദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മന്ദോച്ചുവൃത്തങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ന്യൂനത കെപ്പരും തീർത്തുകളഞ്ഞു. ഗലീലിയോ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോപ്പർനിക്കസ്സ് 'സിദ്ധാന്തമാണ്' ശരിയെന്നു പലേടത്തും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതെല്ലാം മാറിയെഴുതുവാൻ പുരോഹിതക്കോടതി കല്പിച്ചു. ഈ കല്പനക്കാവട്ടെ കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം ലോകർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെത്തടയുവാൻ ഒട്ടും കെൽപുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുരോഹിതവർഗ്ഗം കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഗണിതത്തിനാസ്സദമാക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ഭൂമിയേയും അതിലെ പാപികളായ മനുഷ്യരേയും വിശ്വകേന്ദ്രനിവാസികളാക്കി പരിപാവനമായ ദിവ്യലോകത്തുനിന്നു വിട്ടുരസ്ഥന്മാരാക്കുന്ന വല്ല സംഗതികളും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻവേണ്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗലീലിയോവിന്റെ ഗ്രന്ഥം മാറിയെഴുതിയതായിക്കേട്ടിട്ടില്ല.

ഗലീലിയോ മരിച്ച് 11½ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ന്യൂട്ടൻമാരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു. ഐസാക്ക് എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. ഈ കുട്ടിയാണ് സർവ്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഇന്നും ആരാധ്യനായ സേർ ഐസാക് ന്യൂട്ടൻ (1642—1727) ആയിത്തീർന്നത്. ഗലീലിയോവും അതി

നാശേഷം ഏകഗതം വസ്തുക്കളുടെ ചലനഭേദങ്ങളെ ഗണിക്കുന്നതിന്നു ആസ്പദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന ചില മൗലികവസ്തുധർമ്മങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ ധർമ്മങ്ങളെ വസ്തുക്കളുടെ (1) ജഡതം (അപേതനതം Inertia), (2) ആവേഗാനുപാതിതം (3) പ്രതികാരസമതം എന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽപ്പറയാം.

(1) ഒരു വസ്തു ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പുറമെനിന്നു യാതൊരു ബലവും അതിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കാതെ അതു ഇളകുന്നതല്ല, എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരേ വഴിക്ക് ഒരേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്മേൽ പുറമെനിന്നു ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ലാതെ അതിന്റെ ചലനവേഗതക്കോ ചലിക്കുന്ന ദിക്കിന്നോ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നതല്ല. ഗണിതം കലത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു ഇതു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വസ്തുധർമ്മത്തെ ജഡതം എന്നു പറയുന്നു.


(2) ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനവേഗതകൊണ്ടു അതിന്റെ ദ്രവ്യമാനത്തെപ്പൊരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഫലത്തിന്നു ആവേഗം (Momentum) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ചലനം അതിന്മേൽ ആരോപിക്കുന്ന ആവേഗത്തിന്നനുപാതകമായിരിക്കും. 4 റാത്തൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു വസ്തു സെക്കണ്ടിൽ 60ടി വേഗത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു 8 റാത്തൽ തൂക്കമുള്ളതും നിശ്ചലമായതും ആയ ഒരു വസ്തുവോടു ചേർന്നു രണ്ടും കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു വെക്കുക. രണ്ടുംകൂടിച്ചേർന്നതിന്റെ ആവേഗം ആദ്യവസ്തുവിന്റെ ആവേഗമായ 240നു തുല്യമായിരിക്കണം. അതിനാൽ രണ്ടുംകൂടിച്ചേർന്നതിന്റെ ശേഷം ചലനവേഗത സെക്കണ്ടിൽ 20ടി ($=\frac{240}{12}$)യായിരിക്കണം. ചലനം നേർ പടിഞ്ഞാറോട്ടുമായിരിക്കും. രണ്ടു വസ്തുക്കളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു സെക്കണ്ടിൽ 40ടി പ്രകാരം തെക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു ആവേഗം 240ഉം

തെക്കോട്ടു ആവേഗം 320ഉം ആവത്തക്കവിധത്തിൽ ഏതാണ്ടു് തെക്കുപടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കും. സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിക്കിലേക്കു ആവേഗം 400ഉം വേഗത സെക്കണ്ടിൽ 333 $\frac{1}{3}$ ടിയുമാകും. 3261. തെക്കോട്ടു മാറിയാൽ 24ടി പടിഞ്ഞാറോട്ടു മാറും എന്ന വിധത്തിൽ സഞ്ചരിക്കയും ചെയ്യും. വേഗതക്കെന്നപോലെ ആവേഗത്തിന്നും ദിക്ക് ഗണ്യമെന്നു സാരം.

(3) നാം ഒരു കല്ലെടുത്തു നിലത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ലിന്നേല്പറിഞ്ഞാൽ നിലത്തുള്ള കല്ല് തകരുന്നതു അതിൽ നാം ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാകുന്നു. എന്നാൽ എറിഞ്ഞ കല്ലു എന്തിന്നു തകരുന്നു? അതിന്മേൽ ആർ ബലം പ്രയോഗിച്ചു? ഈ പ്രശ്നത്തിന്നു ന്യൂട്ടൻ കണ്ട ഉത്തരം നിലത്തു കിടന്നിരുന്ന കല്ല് പ്രതികാരമായി ഉപയോഗിച്ച ബലംകൊണ്ടു എറിഞ്ഞ കല്ല് തകുന്നു എന്നാണ്. ഉപയോഗിച്ച ബലവും പ്രതികാരമായി ഉരുളിച്ച ബലവും തുല്യമായിരിക്കും, അവയുടെ ദിക്കുകൾ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു ന്യൂട്ടൻ പരീക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാണിച്ചു.

ഒരു കേന്ദ്രത്തിന്നു ചുറ്റും ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നകന്നു പോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ആ വസ്തുവിന്മേൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതു ജഡത്വം ഹേതുവായി തല്പോലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിക്ക് നോക്കി കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു അകന്നുകുന്നു പോകും. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നകന്നു പോകാതെ നിൽക്കുന്ന ശക്തിക്ക് അഭികേന്ദ്രശക്തി(Centripetal force)യെന്നു പറയുന്നു. ഒരു ചെറിയ കയറിന്റെ ഒരറ്റത്തു കല്ല് കെട്ടി മറ്റൊരു അറ്റം കയ്യിൽ പിടിച്ചു ചുറ്റുമ്പോൾ കയ്യിന്മേൽ ഒരു വലി തോന്നുന്നതു കല്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭികേന്ദ്രശക്തിയുടെ പ്രതികാരമാകുന്നു. വൃത്തത്തിൽ ഒരു സാധനം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്മേൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു ഹ്യൂഗൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഗ്രഹസഞ്ചാരത്തിന്മേൽ പതിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ചന്ദ്ര

നേരയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും കക്ഷാമാഗ്നമായ ഗതിക്കുള്ള കാരണം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ന്യൂട്ടൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു പഴം (An apple) ഞെട്ടിയറ' വീഴുന്നതു കണ്ടു. ഉടനെ പഴം വീണതു ഭൂമിയുടെ ആകർഷണംനിമിത്തമാണെന്നും ഈ ആകർഷണംതന്നെയാണ് ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയിൽനിന്നു വിട്ടുപോകാതെ നിർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നി. അന്നു ചന്ദ്രകക്ഷയുടെ വിസ്താരം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽനിന്നു ഓരോ സെക്കണ്ടുതോറും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലേക്കു എത്രകണ്ടു പതിക്കുന്നുവെന്നു കണക്കാക്കി. പരിലേഖത്തിൽ ക എന്നതു ഭൂമദ്ധ്യവും



വൃത്തം ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചന്ദ്രകക്ഷയുമാകുന്നു. 'ചഗ' എന്നതു അഭികേന്ദ്രശക്തിയില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഒരു സെക്കണ്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രേഖയാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ മണിക്കൂറിൽ 2287 മൈൽ പ്രകാരം സ്വകക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു സെക്കണ്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 'ചഗ' എന്ന ദൂരം

പരിലേഖം 31.

$$= \frac{2287 \times 1760 \times 3 \times 12}{60 \times 60} = \frac{2287 \times 176}{10} \text{ ഇഞ്ച്. ക്ഷേത്രഗണി}$$

തംകൊണ്ടു ചഗ² = ഗര × ഗല. ഇതിൽനിന്നു ഗര = 0.05353 ഇഞ്ച് എന്നു കിട്ടും. ഭൂപൃഷ്ഠത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഒരു സെക്കണ്ടിൽ പതിക്കുന്നതു 193.3 ഇഞ്ചാണെന്നു വെച്ചാൽ, അതു ചന്ദ്രകക്ഷയിൽ പതിക്കുന്നതിന്റെ 36.11 മടങ്ങാണെന്നു വരുന്നു. ഇതിന്റെ വക്രമൂലം 60.1. ചന്ദ്രകക്ഷാപ്രാസാധം ഭൂപ്രാസാധത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഇത്ര മടങ്ങാകയാൽ, ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ദൂരം വലുതുംതോറും ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിന്നു ശക്തി കുറഞ്ഞുവരുമെന്നും, ആ കുറവ് ദൂരത്തിന്റെ വക്രത്തിന്നു വ്യസ്താനപാതമായിട്ടായിരിക്കാമെന്നും ന്യൂട്ടൻ ഉപഹിച്ചു. ഈ നിയമം

സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും വ്യാഴത്തിനും വ്യാഴത്തെ ചുറ്റുന്ന 4 ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും പരദമോ എന്നു അന്നറിയുന്ന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുനോക്കി. എല്ലാറ്റിനും പരദമെന്നു കണ്ടു ന്യൂട്ടൻ തന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണനിയമം (Law of Gravitation) താഴെ പറയും പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“വിശ്വത്തിലുള്ള ഏതു രണ്ടു വസ്തുക്കളും അവയുടെ ദ്രവ്യമാനഘാതത്തിന്നു ക്രമാനുപാതമായും അവയുടെ ഗുരുത്വകേന്ദ്രങ്ങൾ (Centres of Gravity) തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിന്നു വ്യസ്താനുപാതമായും അന്യോന്യം ആർഷിക്കുന്നു.”


ഇതിന്നു ശേഷം ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ വിട്ടുപോകാതെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ അന്യോന്യാകർഷണംകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കെപ്ലർയുടെ നിയമങ്ങൾ മുമ്പു വിവരിച്ച വസ്തുധർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും ഗുരുത്വാകർഷണനിയമത്തിൽനിന്നും ഗണിതമാർഗ്ഗമായി അനുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും വിചാരമേറ്റെ കെപ്ലർയുടെ നിയമങ്ങളിൽനിന്നു ഗുരുത്വാകർഷണനിയമം അനുമാനിച്ചുകൂടെ എന്നും ന്യൂട്ടൻ നോക്കി. അദ്ദേഹം ഗ്ലാഷനീയ മാംവണ്ണം ഇതിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചു. ന്യൂട്ടന്റെ ക്രിയാപദ്ധതി ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണിക്കുവാൻ പാറിയതല്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വരുത്തിയ ഗണിതസൂത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു പ്രത്യേകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. G_1, G_2 എന്നു ദ്രവ്യമാനമുള്ള രണ്ടു ഗോളങ്ങൾ ‘ക’ ഉത്തമവ്യാസാൽമായ ഒരായതവൃത്തത്തിൽ ‘പ’ എന്ന പര്യയകാലത്തിൽ അന്യോന്യം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ,

$$p^3 \div k^3 = 4\pi^2 \div g(G_1 + G_2)$$

ഇവിടെ π എന്നതു ഒരു വൃത്തപരിധിയെ വൃത്തവ്യാസംകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന 3.1416 എന്ന സംഖ്യയും g എന്നതു ഒരു ഭാരപ്രമാണത്തോളം തുക്കമുള്ള രണ്ടു ഗോളങ്ങൾ ഒരു ദൈർഘ്യപ്രമാണത്തോളം രണ്ടു ഗോളകേന്ദ്രങ്ങളും വരുമാറ് വെച്ചാൽ

അവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണശക്തിയുടെ അളവും ആകുന്നു. ഇതിനു ഗുരുത്വാകർഷണഗുണകാരം (Constant of Gravitation) എന്നു പേർ.

ഈ ഗുണകാരം കൃത്യമായി കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചതു 1798ൽ ഹെൻറി കാവെണ്ടിഷ് എന്ന ആംഗ്ലേയശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അതിലഘുവായ ആകർഷണം കാണുവാൻ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു വ്യാവർത്തനതുലാസ്സ് (Torsional Balance) അദ്ദേ




വ്യാവർത്തന തുലാസ്സ്
പരിലേഖം 32

ഹം ഉപയോഗിച്ചു. രണ്ടു ചെറിയ കാരിയ ഗോളങ്ങളെ ലഘുവായതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു ശലാകയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പുള്ള പട്ടന്തൽകൊണ്ടു തൂക്കിയിട്ടു ഇളക്കത്തെ നിർത്തുക. ഇയ്യക്കട്ടികളോടുകൂടിയ ശലാകയെ അല്പം തിരിച്ചാൽ

അതു അങ്ങോട്ടമിങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കരാട്ടം പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള സമയത്തിൽനിന്നും കാരിയഗോളങ്ങളുടെയും ശലാകയുടേയും തൂക്കം നീളം ഇവയിൽനിന്നും ശലാക ഒരു കോൺ തിരിഞ്ഞുനിന്നാൽ അതിന്നു ഗോളങ്ങളിന്മേൽ പ്രയോഗിച്ച ശക്തി എത്രയുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കാം. ഇങ്ങിനെ കണക്കാക്കിയ ഈ ഉപകരണത്തെ വ്യാവർത്തനതുലാസ്സ് എന്നു പറയുന്നു.

ഗോളാകൃതിയിലുള്ള രണ്ടു വലിയ ഊയക്കട്ടികളെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഒരു കാലിന്മേൽ തിരിക്കാവുന്ന ഒരു മേശമേൽ കയറ്റി രണ്ടു കട്ടികളും തുലാസ്സിന്റെ രണ്ടു ഗോളങ്ങളുടേയും മറുവശങ്ങളിൽ തുല്യദൂരത്തു വരത്തക്കവണ്ണം കാവണ്ടിഷ് മേശയെ നിർത്തി. പിന്നീടു മേശ തിരിച്ച് കട്ടികളെ ഗോളങ്ങളുടെ മറു

ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നതി. ഇതിന്നു മേശ താഴ്ന്നി തിരിച്ചു പൊ
ന്നിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഗോളങ്ങളിനേലുള്ള ഈയക്കട്ടിക
ളുടെ ആകർഷണംനിമിത്തം ശലാക സ്വസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു
അല്പം തിരിഞ്ഞ് ഇരുവശത്തുമായി ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ



ട്ടം നിന്നതി
ന്റെ ശേഷം
ശലാക മുന്പ
ത്തെ സ്ഥാന
ത്തുനിന്നു എ
ത്ര തിരിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടെന്നു നോ
ക്കി, സൂക്ഷ്മ
മായി കുറിച്ചു
ടുത്തു. തെറ്റു
കൾ പരിഹ
രിപ്പാൻ ഇതെ

പരിലേഖം 33

1, 2. ഈയക്കട്ടികൾ.

I, II. മേശ തിരിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ സ്ഥാനം.

3, 4. വ്യാവർത്തനതുലാസ്സിലെ ഈയഗോളങ്ങൾ.

ല്ലാം ആവർത്തിച്ചു. ഈയക്കട്ടികളേയും ഈയഗോളങ്ങളോ
ടുകൂടിയ വ്യാവർത്തനതുലാസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേയും പരിലേഖ
ത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാര്യകൊണ്ടും മറ്റും പ്രതിരോധവും വരാതിരിപ്പാൻ
എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളേയും ഭദ്രമായി മൂടി അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ
ചില പോരങ്ങളിൽകൂടി വെളിച്ചം കടത്തി മറ്റു പോരങ്ങളിൽ
വെച്ച ചില കഴൽക്കണ്ണാടികളിൽകൂടി ഗോളങ്ങളുടെ സ്ഥിതി
നോക്കി കണ്ടു. കണ്ട അളവുകളിൽനിന്നു ഈയക്കട്ടികളും ചെ
റിയ ഗോളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കണക്കാക്കി. ഇതിൽ
നിന്നു ഗുരുത്വാകർഷണഗുണകാരത്തേയും ഗണിച്ചു. അതു
10-69 എന്നായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ, കാരോ റാത്തൽ തു

10 *

* $10^9 = 1000,000,000$. (9 പത്തുകൾ ഒന്നായിപ്പെരുക്കിയത്).

കുറച്ചു രണ്ടു ഗോളങ്ങൾ അവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ 1 അടി അകലെയായി വെച്ചാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം $\frac{1.069}{10^9}$ പൗണ്ടൽ ആകുന്നു. കേരളക്കരയിലെ 1 റാത്തൽ തൂക്കത്തിന്നു തുല്യമാകുവാൻ 32.1 പൗണ്ടൽ വേണം. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ആകൃതിവൈരുദ്ധ്യംകൊണ്ടു ഒരേ സാധനത്തിന്റെ തൂക്കത്തിൽ സ്ഥലത്തിന്നനുസരിച്ച് ഭേദങ്ങൾ കാണാം. പൗണ്ടലിന്നു ആ ഭേദമില്ല.

ഇതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനം എളുപ്പത്തിൽ ഗണിക്കാം. കേരളം നിരക്ഷരേഖയിൽനിന്നു വളരെ അകലെയല്ലാത്തതുകൊണ്ടു കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തുനിന്നു ഭൂകേന്ദ്രത്തിലേക്കു 3963.3 മൈൽ എന്നുതന്നെ കരുതാം. ഈ കേന്ദ്രവും ഒരു റാത്തൽ ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം 32.1 പൗണ്ടലാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനം y ടൺ (=2240യ റാത്തൽ) ആണെന്നു കരുതിയാൽ താഴെ കാണുന്ന സമീകാരം കിട്ടും.

$$\frac{2240y \times 1}{(3963.3 \times 1760 \times 3)^2} \times \frac{1.069}{10^9} = 32.1$$

$$\therefore y = \frac{32.1 \times 10^9 \times (3963.3 \times 5280)^2}{2240 \times 1.069} = 5.87 \times 10^{21}$$

ഭൂമിയുടെ തൂക്കം 5.87×10^{21} ടൺ എന്നു കിട്ടുന്നു. ഭൂമിയോളം വേറൊരു ജലഗോളം ഇതിന്റെ $\frac{1}{11}$ ഭാഗം മാത്രമേ തൂങ്ങുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭൂദ്രവ്യത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത $5\frac{1}{2}$ എന്നു പറയാം. ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യഭേദമുള്ള പാറകളുടെ ശരാശരി സാന്ദ്രത $2\frac{1}{2}$ യുടേയും ദീർഘവും ഇടയിലാകുന്നു. അതിനാൽ ഭാരം കൂടിയ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്താണ് അധികമുള്ളതെന്നു വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അധികം ഇരുമ്പായിരിക്കാം. സ്വർണ്ണത്തേക്കാളും പ്ലാറ്റിനത്തെക്കാളും കട്ടികൂടിയ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഭൂഗർഭത്തിലുണ്ടായെന്നും വരാം.

കാവണ്ടിച്ച് തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതു 1798 ലെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതിന്നു 23 കൊല്ലം മുമ്പ് നെവിൽ മാസ്കലിൻ എന്നു പേരായ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമായി ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്കോട്ടലാണ്ടിലെ പെത്ത്ഷയറിൽ ഉള്ള സ്കീഫാലിയപുരത്തും ആവുവണ്ണം അളന്ന് അതിന്റെ തൂക്കം ഒരുവിധം കണക്കാക്കി. ഈ പൂർത്തത്തിന്റെ പാർപ്പത്തിൽ ഒരു കട്ട തൂക്കിയാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കണക്കാക്കാവുന്ന അധോല്പരേഖയിൽനിന്നു കട്ട കെട്ടിയ ചരട് ആകർഷണംകൊണ്ടു പൂർത്തത്തിന്റെ ഗുരുത്വകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് നില്ക്കും. ഈ ചെറിയ ചരിവ് കൃത്യമായി അളന്ന് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണവും പൂർത്തത്തിന്റെ ആകർഷണവും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനം കണ്ടു. ഇതിൽനിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്നു കിട്ടിയ ഭൂമിയുടെ ആക്ഷേപികസാന്ദ്രത 4.7 എന്നായിരുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള അനേകം അനിശ്ചിതാവസ്ഥകളെക്കൊണ്ടു കിട്ടിയ ഫലം കാവണ്ടിഷിന്നു കിട്ടിയ ഫലത്തോളം കൃത്യമായിക്കരുതിക്കൂടാ. വ്യാവർത്തനതുലാസ്സ് പലവിധത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ച് പലരും കാവണ്ടിഷിന്റെ പരീക്ഷണം സമ്പ്രദായഭേദത്തോടെ നടത്തി. അവരിൽ ചിലർക്ക് ഭൂമിയുടെ ആപേക്ഷികസാന്ദ്രത 5.49 എന്നും വേറെ ചിലർക്കു 5.53 എന്നും ലഭിച്ചു.

സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം അറിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ പര്യവൃത്തത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം ഗണിക്കാം. ഭൂമിയുടേയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടേയും പര്യവൃത്തങ്ങളും മനോചൂഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു കൃത്യമായി അന്നെ കാണാം. കെപ്ലറുടെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം വഴിയായി പര്യവൃത്തങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹങ്ങളുടെ സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ദൂരങ്ങളുടെ തോതും അറിയാം. എന്നിരിക്കെ, ആ തോതനുസരിച്ച് സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള അകലം കണക്കാക്കുവാൻ


സാധിച്ചാൽ, മറ്റൊരാൾ അകലങ്ങളും അതിൽനിന്നറിയാം. സൂ
 ത്വന്ന ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ചൊ
 വ്വയും ശുക്രനും ഭൂമിക്ക് വളരെ അടുത്തുവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ അ
 ടുത്തുവരുന്നപോൾ ഭൂമിയും അടുത്തുവന്ന ഗ്രഹവും സൂര്യന്റെ ഒരു
 വശത്തായിരിക്കും. ഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര അടുത്തുവന്നാലും അതി
 സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം കൂടാതെ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം
 നിണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത്ര സൂക്ഷ്മമായ നിരീ
 ക്ഷണം സാധിച്ചതു ദൂരദർശിനിയുടെ ആവിർഭാവത്തിനുശേഷം
 മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാൽ ദൂരദർശിനിയുടെ ഒരു ചെറിയ വി
 വരണത്തിനുശേഷം ഗ്രഹങ്ങളുടെ അകലത്തേയും മറ്റു സംഗ
 തികളേയും സംബന്ധിച്ച് പറയാം.

2. ദൂരദർശിനിയും വിരാജനിയും

വെള്ളെഴുത്തുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണട എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ചില്ല് തൊട്ടു നോക്കിയാൽ നട്ടഭാഗം കുറെ തടിച്ചും അവിടുന്നു നാലുഭാഗത്തേക്കും കുറെ തടി കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. കണ്ണിൽനിന്നു കുറെ അകലെയായി ഈ ചില്ല് പിടിച്ച് അതിൽക്കൂടി അതിന്റെ അപ്പുറത്തു വളരെ അകലെയല്ലാതെയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെ നോക്കിയാൽ അതു അല്പം വലുതായിക്കാണാം. ഈവിധം ചില്ല്കളെ സ്തൂപികാചങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. മദ്ധ്യഭാഗം തടിച്ച കാചങ്ങളെ ഗംഭൂപകാചങ്ങൾ (Convex lens) എന്നു പറയുന്നു. മദ്ധ്യഭാഗം കുഴിഞ്ഞവയെ ദരിലകാചങ്ങൾ (Concave lens) എന്നു പറയുന്നു. ദരിലകാചങ്ങളിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ വസ്തുക്കൾ ചെറുതായിക്കാണാം.

ഒരു ഗംഭൂപകാചത്തെ സൂര്യനു നേക്കു പിടിച്ച് മറ്റുഭാഗത്തു ഒരു കടലാസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി വേണ്ട സ്ഥാനത്തു പിടിച്ചാൽ, കാചത്തിന്മേൽ പതിച്ച രശ്മികളെല്ലാം അതിൽക്കൂടിക്കടക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടുന്നതായി കാണാം. ഇവിടെയാണ് കടലാസ്സെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സൂര്യൻ അതിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാചത്തിന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് വ്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ കടലാസ്സു ചൂടുപിടിച്ച് കരിയുകയോ കത്തുകയോ ചെയ്യും. കിരണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ കാചത്തിന്റെ നാഭിയെന്നു പറയും. കാചമദ്ധ്യം തൊട്ടു നാഭിവരെയുള്ള അകലത്തെ നാഭ്യന്തരം (Focal Distance) എന്നു പറയുന്നു.


പരിലേഖത്തിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ നാളത്തിന്നു നേരെയായി ഒരു ഗവ്വകാലം വെച്ച് അതിൽക്കൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന നാളത്തിന്റെ രശ്മികൾ ഒരു പലകമേൽ പതിഞ്ഞതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളത്തിന്റെ മീതത്തെ ഭാഗത്തുനിന്നു



പരിലേഖം 34.

വരുന്ന രശ്മികൾ കാലത്തിൽക്കൂടിക്കടന്നു താഴേയും, താഴത്തെ ഭാഗത്തുനിന്നു വരുന്ന രശ്മികൾ കാലത്തിൽക്കൂടിക്കടന്നു മീതേയും കേന്ദ്രീഭവിക്കയാൽ നാളം തലതിരിഞ്ഞ നിലയിൽ പലക

മേൽ കാണപ്പെടുന്നു. കാലത്തിന്റെ ഇരുപറ്റത്തും ന എന്നടയാളം വെച്ചതു ഇരുപറ്റുമുള്ള നാളികളാകുന്നു. സൂര്യനെപ്പോലെ വളരെ അകലെയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽനിന്നു വരുന്ന സമാന്തരകിരണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാകുന്നു നാളി. മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കുറെ അടുത്തിരിക്കയാൽ നാളിയിൽനിന്നു കുറെ അകലെ കിരണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കയും അവയുടെ നാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.



പരിലേഖം 35.


മ. മുഖകാലം.

പ. ആലോകനകാലം.

ഒരു ഗന്ധകാചത്തെ ഒരു നീണ്ട കുഴലിന്റെ അറ്റത്തു പിടിപ്പിച്ച് ആ കുഴൽ അകലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ നേർക്കു തിരിച്ചുവെച്ചാൽ, ആ വസ്തുവിന്റെ ഹായ കാചത്തിൽനിന്നു കുറെ അകലെ കുഴലിന്റെ അകത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഹായയുടെ മറുഭാഗത്തു മറ്റൊരു കാചം വെച്ച് അതിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ കുഴലിനകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഹായ വലുതായിക്കാണും. ഇതാണ് പുരുഷത്തിൽ ഒരു ദൂരദർശിനികയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന കാചത്തിന്നു മുഖകാചം എന്നും പിമ്പിൽ വെക്കുന്നതിന്നു ആലോകനകാചം എന്നും പറയുന്നു. മുഖകാചത്തിന്റെ നാഭ്യന്തരം വളരെ ദീപ്തമായിരിക്കുകയും ആലോകനകാചത്തിന്റേതു ഹ്രസ്വമായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോക്കുന്ന സാധനം അടുത്തു വന്നതായിത്തോന്നുകയുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ മുഖകാചനാഭ്യന്തരം ആലോകനകാചനാഭ്യന്തരത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങുണ്ടോ അത്ര മടങ്ങു സാധനം നമ്മോടുത്തതായിത്തോന്നുമെന്നു ഗണിതശാസ്ത്രം വഴി കാണാം. ഇങ്ങിനെ അടുപ്പിക്കുന്നതിന്നു ദൂരദർശിനിയുടെ ഉപചയനഗർത്തിയെന്നു പറയുന്നു. ഗലീലിയോന്റെ ദൂരദർശിനികയിൽ ആലോകനകാചമായി ഉപയോഗിച്ചതു ഒരു ദരിലകാചമായിരുന്നു. അതു മുഖകാചത്തിന്റേയും അതു വഴിയായുണ്ടാകുന്ന ഹായയുടേയും ഇടയിലായിരുന്നു വെച്ചത്.

ഇവിടെപ്പറഞ്ഞതു ദൂരദർശിനിയുടെ എത്രയോ ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നാം ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടി നോക്കുന്ന സാധനം വ്യക്തമായിക്കാണണമെങ്കിൽ, മുഖകാചത്തിലും ആലോകനകാചത്തിലും വളരെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. സേർ ഐസാക് ന്യൂട്ടൻ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഒരു സ്തംഭികത്രികോണാപരികയിൽക്കൂടിക്കടത്തിയാൽ അതു അനേകവണ്ണങ്ങളുള്ള രശ്മികളായി വേർതിരിയുമെന്നു കാണിച്ചു. അനേകവണ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെ കാര്യമായി 7 തരങ്ങളാക്കുമെന്നു കണ്ടു. അവ ഊത (Violet), പഷ്പലം (Indigo), നീ

ലം (Blue), പച്ച (Green), മഞ്ഞ (Yellow), പിങ്കിളം (Orange), ചുവപ്പ് (Red) ഇവയാകുന്നു. ഈ ക്രമം താഴെ കൊടുത്ത വിധം കാണാവേക്കാം.




പരിഭേദം 36.

“ഊത, പുഷ്പ, നീലം, ച
പച്ചയും, മഞ്ഞ, പിങ്കിളം,
ചുവപ്പു, മിവയേഴത്രെ
ക്രമാൽ വണ്ണങ്ങൾ രാജികേ.”

ഘനികയിൽ കൂടിക്കടക്കുമ്പോൾ ഊതരശ്മികൾ അധികം വളയുകയും പിന്നീടുള്ളവ അതിൽ കുറവായി വളയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാകുന്നു രശ്മികൾ പലതായി വിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള രശ്മികൾ ഒന്നായിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ശുഭ്രരശ്മികളാവുന്നതെന്നു സേർ ഐസാക് ന്യൂട്ടൻ വിചാരിച്ചു. പരീക്ഷണാത്മകം പൂത്താകാത്ത ഒരു പലകമേൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പൂത്തകോണാംശങ്ങളെ ഈ ക്രമത്തിൽ ഈ വണ്ണങ്ങളുള്ള ചായങ്ങളിട്ട്, പലകയെ അതിശീഘ്രം തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതു ഒരുവിധം വെളുത്ത നിറമായിക്കണ്ടു.

ഭൂദർശനിയുടെ മുഖകാലത്തിൽ കൂടി രശ്മികൾ കടക്കുമ്പോൾ അവ വക്രിഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാഭിയിൽ കേന്ദ്രീഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശുഭ്രവണ്ണമായ രശ്മികൾ വക്രിഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി അവ പല വണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുകയും നാഭിയുടെ അടുത്തായി പല വണ്ണങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രതി

പ്ലായകളെ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നു കയറി അവ്യക്തമായി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്നു ഒരു നിവാരണം കണ്ടല്ലാതെ വ്യക്തമായ പ്രതിച്ഛായ ദൂരദർശിനിയിൽ ഉണ്ടാകയില്ല. പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷം തീക്കല്ലിന്നും സാധാരണസ്പർശികത്തിന്നും ഒരു വക്രണശക്തിയാണെന്നെങ്കിലും തീക്കല്ലിന്നു സ്പർശികത്തിന്റെ ഇരട്ടി വണ്ണവിശ്ലേഷണശക്തിയുണ്ടെന്നറിവായി. അതിനാൽ പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ചപ്രകാരം തീക്കല്ലിന്റെ




തീക്കല്ല്.

സ്പർശികം.

പരിലേഖം 37.

ഒരു ദരിലകാചവും സാധാരണ സ്പർശികത്തിന്റെ ഒരു ഗുഡ്വലകാചവും കൂടി ഇടത്തു് വെച്ചാൽ കിരണങ്ങൾ വക്രീഭവിക്കുമെങ്കിലും അവ പല വണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുകയില്ല. ഈ ഉപായംകൊണ്ടു ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ച നൂനത ഒരുവിധം തീർപ്പാകുന്നു. എങ്കിലും വലിയ കാചങ്ങളിൽ ഇതു തീരെ തീർത്തുകൂവാൻ സാധിക്കയില്ല. വണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിക്കാതെ കിരണങ്ങളെ വക്രീഭവിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കാചയോഗത്തിന്നു നിവണ്ണകാചം (Achromatic Lens) എന്നു പേര്.

ആലോകനകാചവും ഒറക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. സാധാരണയായി അതിന്റേയും മുഖകാചത്തിന്റെ നാഭീയുടേയും ഇടയിലായി മുഖകാചത്തിൽനിന്നു നാഭീവഴിയായി വരുന്ന കിരണങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി



ആലോകനകാചത്തിലേക്കു് നയിക്കുവാൻ ക്ഷേത്രകാചം (Field Lens) എന്ന മറ്റൊരു കാച

പരിലേഖം 38.

വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. പരിലേഖത്തിൽ ചെറിയ ആലോകനകാചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷേത്രകാചത്തെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടുംകൂടി ഒരു ചെറിയ കഴലിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും.

ഇവിടെ വിവരിച്ച വിധം ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി സാധനങ്ങളെ നോക്കിയാൽ, താഴത്തെ ഭാഗം മീതെയായും മീതത്തെ ഭാഗം താഴെയായും കാണും. ജ്യോതിസ്സുകളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ ഇതാണ് നല്ലത്. അധികം ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ചിപ്പുകളിൽകൂടി കടക്കുന്നപ്രകാരം അല്പമെങ്കിലും മങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ നിലത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ഇതുകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തൃപ്തിയാകയില്ല. അതിനാൽ നിലത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൂരദർശിനിയിൽ തല തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന പ്രതിച്ഛായയെ നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ ഒരു ജോഡി കാചങ്ങൾകൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ജോഡിയും ഒരു ചെറിയ കഴലിൽ വെച്ച് ക്ഷേത്രകാചത്തിന്റെ മുമ്പിലായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. മുഖകാചമൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നാലു കാചങ്ങളും കൂടിയ കഴലിന്നു ആലോകനക്കുഴൽ (Eye Piece) എന്നു പറയുന്നു. ആലോകനക്കഴലിനെ വേറെ എടുത്തു ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനി (Microscope) ആയി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാറും.

ഈ വിധത്തിലുള്ള ദൂരദർശിനികളുടെ വലിപ്പം അറിവാൻ മുഖകാചത്തിന്റെ വ്യാസം പറയുന്നു. ഉപചയനശക്തിയും കൂട്ടത്തിൽ പറയും. മുഖകാചത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പ്രകാശനശക്തി. മുഖകാചത്തിന്നു 3 ഇഞ്ച് വ്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൂരദർശിനിയുടെ റസ്ഡ്റമാനം (Aperture) മൂന്നിഞ്ചാണെന്നു പറയും. ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ശൂന്യന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയവും, വ്യാഴത്തിന്റെ നാലു ഉപഗ്രഹങ്ങളും, ശനിയുടെ വലയവും, ആകാശഗംഗയിലെ ചില താരങ്ങളും പടലങ്ങളും, സൂര്യനിലെ കളങ്കങ്ങളും, ചില ഇരട്ടനക്ഷത്രങ്ങളും നല്ലവണ്ണം കാണാം. ഉപചയനശക്തി 60, 80 എന്ന തോതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നക്ഷത്രനിരീ

ക്ഷണശാലകളിൽ ഇതിലും വലിയ ദൂരദർശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. കലിഫോർണിയയിലെ മൌണ്ട് വിൽസനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൂരദർശിനിയാണ് അടുത്തകാലംവരെ ഈ വിധം ദൂരദർശിനികളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെത്തന്നെ 200 ഇഞ്ച് റസ്സ് മാനമുള്ള മറ്റൊന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതു സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടില്ല.


മുഖകാചത്തിനു പകരം വളരെ വിസ്താരമുള്ളതും നടുക്കുഴിഞ്ഞതുമായ ലോഹക്കണ്ണാടികളിൽനിന്നു ഗ്രഹതാരങ്ങളുടെ പ്രകാശം പ്രതിബിംബിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിച്ഛായയെ മുമ്പു വിവരിച്ച ആലോകനക്ഷേപലിതകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന മറ്റൊരുവിധം ദൂരദർശിനിയും ഉണ്ട്. പ്രസിദ്ധനായ സേർ വില്യം ഹെർസച്ചൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു ഈ വിധം ദൂരദർശിനിയായിരുന്നു. ഈവക ദൂരദർശിനികൾ വളരെയധികം വലുതായിരിക്കും.

ദൂരദർശിനി എത്രതന്നെ നന്നായിരുന്നാലും അതിനെ ഉറപ്പുള്ള കാലുകളിന്മേൽ കയറ്റി ആകാശത്തിൽ വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കു തിരിച്ചു, തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ദിക്കുകളുടേവാൻ അങ്കിതവൃത്തങ്ങളും സൂക്ഷ്മദർശിനികളും ഉണ്ടെങ്കിലേ നിരീക്ഷണം സൂക്ഷ്മമാകുമുള്ളൂ. അതെല്ലാം ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുവാൻ ആലോചിക്കുന്നതു സാഹസമായിരിക്കും. എങ്കിലും അല്പം ചിലതു സൂചിപ്പിക്കാം. കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു ഉറച്ച തൂണുകളിൽ കിടന്നു തിരിയുന്ന അക്ഷത്തിന്മേൽ നിർത്തി ആകാശത്തിലെ ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തത്തിൽ മാത്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂരദർശിനിക്ക് സംതരണദർശിനി (Transit Instrument) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ തിരിച്ചൽ അളക്കുവാൻ മൂറൽ സ്കാൾ എന്ന അംശകലാഭൂജിതമായി ലോഹംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വൃത്തവും അക്ഷത്തിന്മേൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്ര

ഹങ്ങളും ഉച്ചയാകുന്നതു നോക്കി അപ്പോഴത്തെ അവയുടെ ഉന്നതികൾ അളന്നു വരുന്നത്.

ഭൂദർശനിയെ മറ്റൊരു വിധവും സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. ഏതു പ്രദേശത്താണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങൾക്ക് നേരെയായി ഉറപ്പുള്ള തെക്കുവടക്കു സ്തംഭങ്ങളിൽ കിടന്നു തിരിയുന്ന ഒരു അക്ഷത്തിന്മേൽ ഏതു ദിക്കിലേക്കും നോട്ടം വരത്തക്കവണ്ണം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഭൂദർശനി അക്ഷം തിരിയുന്നതോടൊപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള അഹോരാത്രവൃത്തത്തിൽ നോക്കിത്തിരിയുന്നു. അക്ഷം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വീതമായി ഒരു വലിയ ക്ലോക്കയന്ത്രംകൊണ്ടു തിരിച്ചാൽ ഭൂദർശനി അഹോരാത്രവൃത്തത്തിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെത്തന്നെ എപ്പോഴും നോക്കിനിന്നുകൊണ്ടുതിരിയും. ഒരു ജ്യോതിസ്സിനെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷണം ചെയ്യുവാനും ആകാശഭാഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും ഈവിധം സ്ഥാപിച്ച ഭൂദർശനികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവക്ക് ദ്രുവത്തനിരീക്ഷണി (Equatorial) എന്നു പറയുന്നു.

ഭൂദർശനികളെ ഏതുവിധം കയറ്റിയാലും, ജ്യോതിസ്സുകളെ അവയിൽ കൂടി നോക്കി അവയുടെ ദിക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന




പരിലേഖം 39

തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഗതി ജ്യോതിസ്സ് ഭൂദർശനിക്കുഴലിന്റെ കൃത്യമായ മദ്ധ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ വേണ്ട അളവുകൾ എടുക്കുന്നതാണ്. ജ്യോതിസ്സ് മദ്ധ്യത്തിൽ പെടുവെന്നറിവാനായി നന്നെ നേരിയ കമ്പികൾ ഒരു

അകലത്തിൽ മേൽക്കീഴായി അഞ്ചോ ഏഴോ എണ്ണവും അവയെ എല്ലാം വിലങ്ങനെ മദ്ധ്യത്തിൽ മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഒരു കമ്പിയും പിടിപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ കൂട് മുഖകാചത്തിന്റെ നാഭിയിൽത്തന്നെ വെച്ചിരിക്കും. ഈ കമ്പികൾക്ക് ലൂതാസു

ത്രങ്ങൾ (Spider lines) എന്നു പറയുന്നു. കഴലിൽകൂടി നോക്കി ജ്യോതിസ്സ് നടുക്കുള്ള കമ്പി വലങ്ങുന്നതുള്ള കമ്പിയെ മുറയുന്നവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതു ദൂരദർശിനിക്കഴലിന്റെ മദ്ധ്യരേഖക്കു നേരെ വന്നുവെന്നറിയാം. വളരെ അടുത്തു നില്ക്കുന്ന രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമോ, ഗ്രഹബിംബങ്ങളോ അളക്കുവാനും ഈ കൂട് ഉപയോഗമായിത്തീരുന്നു. ഇതിനെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും വേണ്ടത്ര നീക്കുവാൻ പഠിയ്ക്കുകയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ദൂരദർശിനിയെപ്പോലെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രഗവേഷണത്തിൽ ഉപയോഗമുള്ള മറ്റൊരു യന്ത്രമാകുന്നു വിരാജിനി (Spectroscope). നേരെ വരുന്ന ഒരു ശുഭകിരണാവലിയെ സ്ലിടുകൂട്ടി കോണഘനികയിൽ കൂടിക്കടത്തിയാൽ അതു പലവിധ വണ്ണങ്ങളായ കിരണാവലികളായി പലതരത്തിൽ വക്രീഭവിക്കുമെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. ഈ കിരണങ്ങളെ ഒരു പലകമേൽ പതിപ്പിച്ചാൽ ഉത്ത, നീല മുതലായ വിവിധ വണ്ണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രകാശനിരയായിക്കാണാം. ഈ പ്രകാശനിരക്ക് വിരാജിക (Spectrum) എന്നു പറയുന്നു. പക്ഷെ അല്പം വിസ്താരമുള്ള ഒരു കിരണാവലിയെ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാലുണ്ടാവുന്ന വിരാജികയിൽ ഒരു വണ്ണം മറ്റൊന്നിന്റെ മീതെ വീണ് വണ്ണങ്ങൾ ക്രമമായും സ്പഷ്ടമായും കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും. വിരാജികയെ സ്പഷ്ടമാക്കുവാൻ കിരണാവലിയെ ഒരു നിവൃണ്ണകാചത്തിന്റെ നാഭിയിൽ വെച്ചു ലോഹത്തകിടിലുള്ള നേരിയ പിള



പ്പിൽ കൂടിക്കടത്തി കാചത്തിനേൽ പതിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷമാത്രം ഘനി

കയിൽകൂടി കടത്തുന്നു. പിളപ്പ് കാചത്തിന്റെ നാഭിയിലാകയാൽ കാചം വിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന കിരണങ്ങൾ സമാന്തരമായിരിക്കും. ഈ കിരണങ്ങൾ ഘനികയിൽപ്പതിച്ച് പുറത്തു വരുന്നോടൊത്തു വെളിച്ചം വെളിച്ചമായിത്തീർത്തത്, വെളിച്ചംകൊണ്ടു സരിച്ച് വക്രിഭവിച്ച്, കാരോ വെളിച്ചമായ കിരണങ്ങൾ സമാന്തരമായി, എന്നാൽ പല വെളിച്ചങ്ങളിലുള്ളവ വക്രതകൊണ്ടു സരിച്ച് പല വഴികളായി വരുന്നു. ഇവയെ ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ മുഖകാചത്തിന്റെ നാഭിയിൽ ആലോകനകാചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വക്രണത്തിനനുസരിച്ച് വഴിക്കുവഴിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആലോകനകാചത്തിൽകൂടി നോക്കിയാൽ ഈ കേന്ദ്രീകൃതവെളിച്ചം വഴിക്കുവഴി സ്പഷ്ടമായിക്കാണാം. കിരണാവലിയെ ത്രികോണഘനികയിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച പിളപ്പും കാചവും കൂടിയ കഴലിനു സംധാനിക (Collimator) എന്നു പറയുന്നു. സംധാനികയേയും ദൂരദർശിനിയേയും വേണ്ട ടിക്കുകളിലേക്കു ഘനികയെ നേരെ തിരിച്ചുനിർത്തുവാൻ പറിയ രചനാവിശേഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ത്രികോണഘനിക കൂടാതെ രശ്മികളെ വെളിച്ചമായി വേർപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മറ്റു ഏർപ്പാടുകളും ഇന്നറിയാം.

വിരാജനിയുടെ സംധാനികയെ സൂക്ഷ്മം നേരേയോ സൂക്ഷ്മപ്രകാശം പ്രതിബിംബിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ നേരേയോ തിരിച്ചുവെച്ചു ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രകാശനിര കാണാം. ഇതിന്റെ ഒരറ്റം ഉത്തരം മറ്റൊരു ചുവപ്പും ആയിരിക്കും. ഈ പ്രകാശനിരയെ മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടു കിടക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ ഇരുണ്ട വരകളേയും വരകളുടെ കൂട്ടങ്ങളേയും കാണാം. എന്നാൽ ചൂടുകൊണ്ടു ശുദ്ധവെളിച്ചമായിത്തീരുന്ന ഘനവസ്തുക്കളേയോ ദ്രാവകങ്ങളേയോ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വിരാജികയിൽ ഈ ഇരുണ്ട രേഖകൾ ഉണ്ടാകയില്ല. വിരാജിക അവിച്ഛിന്നമായിരിക്കും. ചൂടു പ്രകാശിക്കുന്ന ബാഷ്പങ്ങളിൽ

നിന്നുണ്ടാവുന്ന വിരാജിക ഒരു പ്രകാശനിരയായിരിക്കയില്ല. പ്രകാശപാശങ്ങളും അവയുടെ കൂട്ടങ്ങളും ആയിരിക്കും. ഈ പാശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുളടഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളും കാണാം. ഉദാഹരണമായി ഒരു വിളക്കിന്റെ നാളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ് വെച്ചാൽ നാളം മഞ്ഞനിറമായിത്തീരും. സംധാനികയുടെ വിളപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ നാളം വെച്ച് വിരാജനികൊണ്ടു പരിശോധിച്ചാൽ സൂര്യവിരാജികയിൽ മഞ്ഞപ്രകാശം കാണുന്ന സ്ഥാനത്തു രണ്ടു മഞ്ഞപ്രകാശപാശങ്ങൾ കാണാം. സജ്ജിക (Sodium) ത്തിന്റെ ഏതു സംയുക്തദ്രവ്യം നാളത്തിൽ വെച്ചാലും ഈ മഞ്ഞപ്രകാശപാശങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രകാശപാശങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥാനത്തുതന്നെ സൂര്യവിരാജികയിൽ രണ്ടു കൃഷ്ണരേഖകൾ കാണുന്നു. ഒരു കഴലിൽ കടുക്കി വിദ്യുൽപ്രവാഹംകൊണ്ടു പ്രകാശിതമാക്കിയ അബ്ജനകവായു (Hydrogen) വെ സംധാനികയുടെ വിളപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ വിരാജികയിൽ ചുവപ്പ്, നീല, ഉത്ത ഈ പ്രകാശങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന കൃഷ്ണരേഖകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലായി അതതു നിറങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശപാശങ്ങളെ കാണാം. ഇങ്ങിനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു, ബാഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശം പ്രത്യേകം വണ്ണങ്ങളോടുകൂടിയവയായിരിക്കുമെന്നും, അതിനാൽ അതിന്റെ വക്രിത പ്രത്യേകം അളവോടുകൂടിയതായിരിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ ആ വണ്ണത്തോടുകൂടിയ പ്രകാശം അതു പുറപ്പെടുന്ന വസ്തുവെക്കാൾ ചൂടു കുറഞ്ഞതും ആ വണ്ണത്തിലുള്ള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ ബാഷ്പത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ബാഷ്പത്താൽ നിപാനം (Absorption) ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും, അതിനാൽ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രകാശപാശങ്ങൾക്കു പകരം കൃഷ്ണരേഖകൾ കാണപ്പെടുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കി. ഒരാവരണത്തിൽ കൂടി കടന്നുവരുന്ന ശുദ്ധപ്രകാശത്തിന്റെ വിരാജികയിൽ ഇരുണ്ട രേഖകൾ കണ്ടാൽ, ആ രേഖകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പ്രകാശപാശങ്ങളെ ആവരണത്തിലെ വസ്തുക്കൾ നിപാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു മന

സ്തിലാക്കാം, അതിനാൽ ആ വസ്തുക്കളിന്നവയെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങിനെ സൂര്യന്റേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ചില രചനാവിശേഷങ്ങളും അവയിൽ അടങ്ങിയ ദ്രവ്യങ്ങളും ജ്യോതിഷികൾക്കു ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇടയായി.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിരാജനിയ്ക്കിലെ സംധാനികയെ ഒരു വലിയ ദൂരദർശിനിയുടെ മുഖകാചത്തിന്റെ നാഭിയോടു ചേർത്തു വെക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ മാത്രമേ പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര പ്രകാശം കിട്ടുകയുള്ളൂ.

ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ് പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംഗതികൂടി പ്രസ്താവിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രകാശത്തിന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നു നല്കുവാൻ പരക്കുവാൻ സമയം വേണമെന്നും, അതു സഞ്ചരിക്കുന്നതു തരംഗരൂപമായിട്ടാണെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ തരംഗങ്ങൾ സൂര്യൻ പ്രാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാശം (Ether) എന്ന വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതു പല ചിന്തകർക്കും സൗകര്യം നൽകിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രതരംഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും ആയ ഭാഗങ്ങൾ അഥവാ ഉച്ചവും നീചവും (Crest and Trough. മുടിയും അടിയും) നാം കാണുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയുടെ മൂല്യത്തെ ഉച്ചമെന്നും അതിന്റെ ഏറ്റവും താണ സ്ഥിതിയെ നീചമെന്നും കല്പിച്ചാൽ എല്ലാ തരംഗങ്ങളും ഉച്ചനീചങ്ങൾ പകലും രാത്രിയുപോലെ ഇടകലന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരകളെന്നു സങ്കല്പിക്കാം. ഉച്ചസ്ഥാനം തൊട്ടു അടുത്ത ഉച്ചസ്ഥാനംവരെയുള്ള അകലത്തിന്നു തരംഗത്തിന്റെ വീചിവിസ്താരമെന്നു പറയുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന പലവിധവർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള രശ്മികളുടെ വീചിവിസ്താരങ്ങളെ വ്യവഹരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമാണദൈർഘ്യം 39-37 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള മീറ്റർ എന്ന അളവുകോലിന്റെ ലക്ഷത്തിലൊരംശത്തിന്റെ ലക്ഷത്തിലൊരംശമാകുന്നു. ഇതിന്നു അ

ണമാത്ര എന്നു പേർ പറയുന്നു. അണമാത്രാത്മകമായി പലവണ്ണങ്ങളിലുള്ള രശ്മികളുടെ വീചിവിസ്കാരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. ഊത-3930—4001, പുഷ്കലം 4000—4201, നീല 4200—4901, പച്ച 4900—5400, മഞ്ഞ 5400—5876, പിങ്കിലും 5875—6439, ചുവപ്പ് 6438—7668.

ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ജ്യോതിസ്സുകളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി മുമ്പു വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശഗോളത്തിൽ സ്ഥിരമല്ലെന്നും, അവയ്ക്ക് നിരന്തരമായി ചലനം ഉണ്ടെന്നും അറിവായി. ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രം നമുക്ക് നേരെ അടുത്തുവരികയോ, നമ്മിൽ നിന്നു നേരെ അകന്നു പോകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടിയുള്ള സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം സ്പഷ്ടമാക്കയില്ല. എന്നാൽ വിരാജനി വഴിയായ നിരീക്ഷണംകൊണ്ടു അതും അറിയാം. നക്ഷത്രം നമ്മിൽനിന്നു അകന്നുപോകുമ്പോൾ അവയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രശ്മികളുടെ വീചിവിസ്കാരം അകന്നു പോകുന്ന വേഗതയ്ക്കു അനുസരിച്ച് വലിച്ചതായും നക്ഷത്രം സഞ്ചരിച്ച് നമുക്കടുത്തു വരുമ്പോൾ വീചിവിസ്കാരം ചുരുങ്ങിയതായും നമുക്കുഭവപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഫലം വിരാജികയിലെ കൃഷ്ണരേഖകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അകന്നു പോകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രശ്മികളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന വിരാജികയിൽ കൃഷ്ണരേഖകൾ സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു ചുവപ്പിലേക്കും അടുത്തുവരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രശ്മികളിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന വിരാജികയിൽ കൃഷ്ണരേഖകൾ ഊതയിലേക്കും തെറിക്കാണാം. ഈ വ്യതിയാനങ്ങളെ അളന്ന് ഭൂമിയേയും നക്ഷത്രത്തേയും ചേർക്കുന്ന സൂത്രത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിനുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ വേഗത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗണിക്കുന്നു.

3. ആധുനികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ (തുടച്ചു)

കെപ്ലറുടെ മൂന്നാംനിയമത്തിൽനിന്നു സൂര്യനും സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ തോതു അഥവാ സൗരവ്യൂഹത്തിന്റെ തോതു അറിയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഗ്രഹങ്ങളുടെ പര്യായകാലങ്ങളെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് അവയെ വഴ്തിച്ചാൽ, ആയ തവൃത്തങ്ങളാകുന്ന ഗ്രഹപദ്ധതികളുടെ ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധങ്ങളുടെ തോതായി. ഈ സംഖ്യകളുടെ ഘനമൂലങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധങ്ങളുടെ തോതും സിദ്ധിക്കുന്നു. മുമ്പു അറിഞ്ഞിരുന്ന അഞ്ചു താരാഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഭൂമിയുടേയും പിന്നീടു ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി കണ്ടറിഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ (Uranus), വരണൻ (Neptune)* എന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഉത്തമവ്യാസാർദ്ധങ്ങളുടെ തോതു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബുധൻ 38,710	ചൊവ്വ 1,52,369	ഇന്ദ്രൻ 19,19,098
ശുക്രൻ 72,333	വ്യാഴം 5,20,280	വരണൻ 30,07,067
ഭൂമി 1,00,000	ശനി 9,53,884.	


(From Br. Nautical Almanac 1930.)

ഇവക്ക് കേരളീയ ജ്യോതിർഗണിതത്തിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഭാഷയിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മദ്ധ്യമന്ദകണ്ഠങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. മന്ദകണ്ഠ എന്നുവെച്ചാൽ സൂര്യനിൽനിന്നു ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമാകുന്നു. ഗ്രഹക്ഷേപകൾക്ക് മനോമൂല തിമനോമൂലങ്ങളുള്ളതിനാൽ, ഈ മന്ദകണ്ഠങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വ

* In Greek legend Uranus is the first king of Gods, which corresponds to INDRA and in Roman mythology Neptune is the God of the Sea, which corresponds to Varuna.

നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനോചുസ്ഥാനം, കക്ഷാചുതി മുതലായ വ അറിയുന്ന ജ്യോതിഷികൾക്ക് ഇഷ്ടസമയത്തു ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യമുള്ള അകലങ്ങളുടെ തോതും ഗണിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സൂര്യന്റെ ഒരു വശത്തു ഭൂമിയും ചൊവ്വയും വരുമ്പോൾ മുമ്പു പറഞ്ഞ തോതനുസരിച്ച് (മന്ദകണ്ഠഭേദങ്ങളെ തല്പ്ലാലം അവഗണിച്ച്) രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ തോതു 52369 (=1,52,369 - 1,00,000) എന്നു വരും. ഈ സംഖ്യക്കനുസരിച്ച ശരിയായ ദൂരം അറിഞ്ഞാൽ, മറ്റു സംഖ്യകൾക്കനുസരിച്ച ദൂരങ്ങൾ അതിൽനിന്നും തോതിൽ നിന്നും ത്രൈരാശികൾക്കൊണ്ടു വരുത്തുകയും ചെയ്യാം.

ഇതിനായി ഭൂമിയിൽ കഴിയുന്നത്ര തെക്കുവടക്കു അകലമുള്ള രണ്ടു നിരീക്ഷണശാലകളിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചൊവ്വയുടെ ഖഗോളസ്ഥാനങ്ങൾ,



പരിലേഖം 41

ന ചൊവ്വയുടെ ഖഗോളസ്ഥാനങ്ങൾ, ഒരേ സമയത്തുള്ളവ സൂക്ഷ്മമായി വരുത്തുന്നു. പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തം ഭൂമിയും ഭൂ അതിന്റെ മദ്ധ്യവും, ന ന, എന്നതു നിരക്ഷവൃത്തവും, വ എന്നതു ഗ്രീണിച്ച് നിരീക്ഷണശാലയും ത എന്നതു തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗൺ നിരീക്ഷണശാലയും ഗ ഗ്രഹവുമാകുന്നു. ഈ രണ്ടു നിരീക്ഷണശാലകളും തമ്മിലുള്ള കിഴക്കുവടിക്കത്താറു നീക്കത്തിന്നു ഗണിതഫലങ്ങളിൽ ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തേണ്ടിവരും. അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചന ഇവിടെ വിട്ടുകളയുന്നു. നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ രണ്ടു നിരീക്ഷണശാലകളിലും ചെയ്തതിന്നുശേഷം

ഒരു നിശ്ചിതദിവസം രാത്രി രണ്ടു സ്ഥലത്തുനിന്നും നിരീക്ഷണം ചെയ്തു ഗ്രഹം ദക്ഷിണോത്തരവൃത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഖ


ഗോളസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 'തഗവ' എന്ന കോണിനു തുല്യമായിരിക്കും. ഇതു വ എന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നു ത എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു ദ്രഷ്ടാവ് നീങ്ങിനില്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹത്തിൽ കാണുന്ന പരിഭ്രംശ (Parallax)മത്രെ. ഈ പരിഭ്രംശത്തിൽനിന്നും, വ, ത ഇവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ഗ്രഹത്തിന്റെ ദിക്കിന്നു വിപരീതമായ (ലംബമായ) ദ്രവ്യാസാധം ഗ്രഹത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഓണ് കണക്കാക്കുന്നു. ഗ്രഹത്തിന്റെ പരിഭ്രംശം എന്നു പറയുന്ന ഈ കോണ് കുറെ വികലകളോളമേ ഉണ്ടായിരിക്കുവുള്ളൂ. ദ്രവ്യാസാധത്തെ പൃത്തവികലകളെക്കൊണ്ടു ഗുണിച്ച് ഈ പരിഭ്രംശംകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ, ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള ദൂരം വ്യാസാധമായ പൃത്തത്തിന്റെ പരിധി കിട്ടും. ഇതിൽനിന്നു ഗ്രഹത്തിന്റെ ദൂരവും കണക്കാക്കാം. ഈ ദൂരത്തെ 1,00,000 കൊണ്ടും 152369 കൊണ്ടും പെരുക്കി 52369 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യന്റേയും, സൂര്യനിൽനിന്നു ചൊവ്വയുടേയും അകലങ്ങൾ കിട്ടും. ഇങ്ങിനെ കിട്ടുന്ന ഭൂകക്ഷാ ഉത്തമവ്യാസാധം 929 ലക്ഷം മൈലാകുന്നു. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉത്തമവ്യാസാധങ്ങളെ തോതിൽനിന്നു ത്രൈരാശികംകൊണ്ടു വരുത്തുകയും ചെയ്യാം. അവയെല്ലാം ഇനിയത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്യും.

ചൊവ്വ ഭൂമിക്ക് അടുത്തുവരുന്നതുപോലെ ശുക്രനും ഭൂമിക്ക് വളരെ അടുത്തുവരുന്നു. അപ്പോൾ ശുക്രനും ഭൂമിയും സൂര്യന്റെ ഒരേ വശത്തായിരിക്കും. ഭൂമിയിൽനിന്നു നോക്കുന്നവർക്കു സൂര്യനേയും ശുക്രനേയും ഒരേ വഴിക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ശുക്രനു അപ്പോൾ വക്രമൌഢ്യമദ്ധ്യമായിരിക്കയാൽ ശുക്രനെ സാധാരണ അങ്ങിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ ചില കാലങ്ങളിൽ വക്രമൌഢ്യമദ്ധ്യം വരുമ്പോൾ ശുക്രനു വിക്ഷേപം നന്നെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭൂവാസികൾക്കു ശുക്രനെ സൂര്യബിംബത്തിന്മേൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി

യായിക്കാണാം. ഈ കറുത്ത പുള്ളി സൂര്യബിംബത്തിന്മേൽ കൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടു കടന്നു പോകും. ഇതിന്നു സുമാം $7\frac{1}{2}$ മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും. ഇതിന്നു ശുക്രസംതരണം (Transit of Venus) എന്നു പറയുന്നു. ശുക്രസംതരണം $105\frac{1}{2}$ കൊല്ലം, 8 കൊല്ലം, $121\frac{1}{2}$ കൊല്ലം, 8 കൊല്ലം ഈ ക്രമത്തിൽ കാലം കൂടുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ചുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ 243 കൊല്ലത്തിൽ 4 വട്ടം. 1874 ഡിസമ്പ്ര് 9-ാം തീയതിയും 1882 ഡിസമ്പ്ര് 6-ാം തീയതിയും ശുക്രസംതരണമുണ്ടായി. ഇനി 2004 ജൂൺ 8-ാം തീയതിയും 2012 ജൂൺ 6-ാം തീയതിയും ശുക്രസംതരണമുണ്ടാകുമെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നത്തേതു 2117 ഡിസമ്പ്ര് മാസത്തിലായിരിക്കും. ബുധസംതരണം ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 3 കൊല്ലം, 6 കൊല്ലം, 7 കൊല്ലം, 13 കൊല്ലം ഇങ്ങിനെയുള്ള കാലങ്ങൾ ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ശരാശരി 10 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ബുധസംതരണമുണ്ടാകും.

സംതരണാവസരങ്ങളിൽ ശുക്രനെ വളരെ സൗകൃത്യത്തോടെ കാണാം. 1874ലും 1882ലും സംതരണമുണ്ടായപ്പോൾ നിരീക്ഷണം ചെയ്തതും അതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടേയും ശുക്രന്റേയും സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള അകലം നിണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശുക്രസംതരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ ശുക്രനു വക്രഗതിയും സൂര്യനു ക്രമഗതിയും ആകയാൽ ശുക്രൻ കിഴക്കേ ഭാഗത്തു സൂര്യബിംബത്തെ പ്രവേശിച്ച് പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തു വിട്ടുപോകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കൃത്യം ഒരേ സമയത്തും സൂര്യബിംബത്തിന്മേൽ ഒരേ വഴിക്കും പോകുന്നതായി കാണുകയില്ല. സൂര്യഗ്രഹണസമയത്തു സ്പർശ, ഗ്രാസ, മോചനങ്ങൾക്ക് ഭേദമുള്ളതുപോലെ ഇവിടേയും ഭേദമുണ്ടായിരിക്കും. ഭൂമിയിൽ തെക്കുവടക്കു ഭേദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു കാണുമ്പോൾ സൂര്യബിംബമാകുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വടക്കും തെക്കുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടു ചുരുക്കുവൃത്തങ്ങളിൽകൂടി ശുക്രൻ കടന്നുപോകുന്നതു കാണാം. (പരിലേഖം നോക്കുക) കടന്നുപോകുവാൻ വേണ്ടിവരുന്ന സമയങ്ങളിൽനിന്നു ഈ ജ്യാമിക

ഉടെ ദൈർഘ്യങ്ങളും ബിംബകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള അകലങ്ങളും ഗണിക്കാം. ഈ അകലങ്ങളുടെ അന്തരം വികലാത്മകമായി സിദ്ധിക്കും. ഇതു രണ്ടു നിരീക്ഷണസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം സൂര്യശുക്രന്മാരിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോണുകളുടെ അന്തരമാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യനിലും ശുക്രനിലും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോണുകൾ നമ്മിൽനിന്നു അവയുടെ ദൂരങ്ങൾക്ക് വ്യസ്താനുപാതമായിരിക്കും. ദൂരങ്ങളുടെ തോതു അറിയുന്നതിനാൽ കോണുകളുടെ തോതും അറിയാം. അതിനാൽ കോണുകളുടെ അന്തരത്തിൽനിന്നു കോണുകൾതന്നെ കാണാം. പിന്നീടു ഇതിൽനിന്നു സൂര്യനഭിമുഖമായി നില്ക്കുന്ന ഭൂവ്യാസാ



പരിലേഖം 42.

ലും സൂര്യനിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോണു്, അഥവാ സൂര്യന്റെ പരിഭ്രംശം, കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ്ട് ഈ വിധത്തിലായിരുന്നു 1874ലും 1882ലും ശുക്ര സംതരണനിരീക്ഷണത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ ദൂരം കണക്കാക്കിയത്. നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കാർച്ചമായ ബുദ്ധിമുട്ടു ഗ്രഹബിംബം സൂര്യബിംബത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും വിട്ടുപോകുന്നതും ആയ കൃത്യസമയം സെക്കണ്ടുകൾക്ക് ശരിയായിട്ടെങ്കിലും കാണുവാനായിരുന്നു. സൂര്യന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇരുണ്ട (ആപേക്ഷികമായി) പ്രദേശത്തു നിന്നു ശുക്രബിംബം സൂര്യബിംബത്തിലേക്കു കടന്നു കരെ ദൂരം വട്ടത്തിൽ കറുത്ത പുള്ളിയായിക്കാണുന്ന ശുക്രനും പുറമെയുള്ള കറുത്ത പ്രദേശവും തമ്മിൽ ചേർക്കുന്നതായ ഒരു ഇരുപാലം നിലനില്ക്കും. ഇപ്രകാരംതന്നെ ശുക്രബിംബം സൂര്യബിംബത്തിൽനിന്നു പുറത്തു പോകുന്നതിന്നു മുമ്പും ആ ഇരുപാലം കാണാം. ഇതായിരുന്നു കൃത്യസമയം അറിയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർന്നത്.

സൂര്യന്റെ ദൂരം അറിഞ്ഞാൽ $p^2 \div k^3 = 4\pi^2 \div g(U_1 + U_2)$ എന്ന സൂത്രത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടേയും ദ്രവ്യമാന

യോഗം കണക്കാക്കാം. അതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനം കളഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റേതു ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂമിയുടെ തൂക്കം കണക്കാക്കുവാൻ ചെയ്തതുപോലെ, ഇവിടെയും ദ്രവ്യമാനയോഗം 'യ'ട്ടൺ എന്നു വെക്കുക. എന്നാൽ

$$\frac{(365.26 \times 24 \times 60 \times 60)^2}{(92900000 \times 5280)^3} = \frac{4 \times (3.1416)^2 \times 10^9}{1.069 \times 2240\pi}$$

ഇതിൽനിന്നു $y = 1.954 \times 10^{27}$ എന്നു കിട്ടും. സൂര്യന്റേയും ഭൂമിയുടേയും ദ്രവ്യമാനയോഗം 1.954×10^{27} ടൺ എന്നു വരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനം 5.87×10^{21} ടൺ മാത്രമാകുന്നു. ഇതു കിഴിച്ചാൽ 1.954×10^{27} എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യത്തിൽനിന്നു ഒരു ഭേദവും വരികയില്ല. സൂര്യന്റെ തൂക്കം അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയുടെ തൂക്കം നിസ്സാരമെന്നു സാരം.

ഇപ്രകാരം ചന്ദ്രന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള അകലത്തിൽനിന്നും ഭൂചന്ദ്രന്മാരുടെ ദ്രവ്യമാനയോഗം കുറേ അധികം കൃത്യമായി വരുത്തി അതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായി വരുത്തിയ ദ്രവ്യമാനം കളഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദ്രവ്യമാനം സിദ്ധിക്കും. അതു 7.2×10^{22} ടൺ ആകുന്നു.

നൂട്ടൻ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുധർമ്മങ്ങളുടേയും ആവിഷ്കരിച്ച ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റേയും ഫലമായി ഭൂമി ഒരായതവൃത്തത്തിൽ അതിന്റെ നാഭികളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ അണുക്കളേയും അകലത്തിന്റെ വ്യത്യാസംകൊണ്ടു ഒരേ ശക്തിയിൽ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. സൂര്യനടുത്തുള്ള അണുക്കളെ അധികവും അകലെയുള്ള അണുക്കളെ കുറവും ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂകേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആകർഷണംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വക്രത മാത്രമേ ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുമുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ സഞ്ചാര പഥത്തിന്നു സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ കേന്ദ്രത്തിന്മേലുള്ള ആകർഷണത്തെക്കാൾ അധികം ആകർഷണമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ മേലുള്ള ആകർഷണത്തിൽ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന

ഭാഗത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്നേക്കു വിട്ടു നില്ക്കുവാൻ പ്രചോദിതമാകുന്നു. എന്നു ചൊല്ലാൽ സൂര്യന്നു നേക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ സൂര്യനിലേക്കു മാറ്റിനിർത്തുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതു മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആകർഷണത്തെക്കാൾ കുറവു ആകർഷണമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആകർഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടെന്നവണ്ണം ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്നെതിരായ ഭാഗത്തേക്കു വിട്ടു നില്ക്കുവാനും പ്രചോദിതമാകുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യന്റെ എതിർ വശത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സൂര്യന്നെതിരായ വശത്തേക്കു അകറ്റിനിർത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൂദ്രവ്യങ്ങളുടെ അന്യോന്യമുള്ള ആകർഷണം ഇതിന്നു അല്പമൊന്നു എതിരായി പ്രവൃത്തിക്കും. എങ്കിലും ഭൂമി ജലംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗോളമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആകൃതിക്കു വലിയ മാറ്റം വരും. സഭാ സൂര്യന്നു നേരെയായും എതിരായും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂദ്രവ്യം നല്ലവണ്ണം മുഴച്ചുകൂടും. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ പലഭാഗങ്ങളും ഉറച്ചു കട്ടിയായതുകൊണ്ടു ഈ പ്രചോദനങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിതിഭേദവും വരുന്നില്ല. ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുരുത്വത്തിന്നു അതിലഘുവായ ഒരു മാറ്റം മാത്രമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂപുഷ്പത്തിൽ അധികഭാഗവും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സമുദ്രജലം ഈ പ്രചോദനത്തിന്നു വശപ്പെട്ടു സൂര്യന്നു നേക്കായും സൂര്യന്നെതിരായും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞൊന്നു മുഴച്ചുകൂടുന്നു.

ഭൂമിയുടെ കക്ഷി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചെറുതായി ഭൂമി സൂര്യന്നു വളരെ അടുത്തു വന്നാൽ ആകർഷണാന്തരംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രചോദനശക്തി വലുതായി ഭൂമിയുടെ കട്ടിയായ ഭാഗങ്ങളും സ്വസ്ഥാവസ്ഥയിൽനിന്നിളകി ഭൂമി ആകെ ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പോകുവാൻപോലും വഴിയുണ്ടു്. വ്യോമചാരികളായ ചില ഗോളങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള

അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി പിന്നീടു പറയപ്പെടും. ഭൂമി സൂര്യനിൽനിന്നു ഈ അതിരിനെക്കാൾ വളരെ അധികം അകലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഈവിധം കരത്യാഹിതം ഭൂമിക്കോ ഭൂവാസികൾക്കോ ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു നമുക്കുറച്ചിരിക്കാം.

1850ൽ റോഷെ (Roche) എന്ന പണ്ഡിതൻ ഈ അതിരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഒരു വലിയ ഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ ഗോളം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വെക്കുക. രണ്ടിലേയും ദ്രവ്യത്തിന്നു ഒരേ സാന്ദ്രതയെങ്കിൽ, ചെറിയ ഗോളത്തിന്റെ കക്ഷാപ്രാസം വലിയ ഗോളത്തിന്റെ പ്രാസത്തിന്റെ 2.45 മടങ്ങിൽ കുറവായി വന്നാൽ ചെറിയ ഗോളം ആകർഷണാനന്തരംകൊണ്ടു പൊട്ടിത്തകരും. സാന്ദ്രതക്കു ഭേദമുണ്ടെങ്കിൽ, സാന്ദ്രത തുല്യമാകുന്നതുവരെ വലിയ ഗോളം വികസിക്കുകയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാവുന്ന പ്രാസത്തിന്റെ 2.45 മടങ്ങിനേക്കാൾ ചെറിയ ഗോളത്തിന്റെ കക്ഷാപ്രാസം ചുരുങ്ങിവന്നാൽ ചെറിയ ഗോളം തകന്നുപോകും. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർണ്ണയിച്ച അതിർ. ഇതിനെ 'പരിവർത്തകരുടെ അപായസീമാ' എന്നു പറയാം.

ചന്ദ്രനു ഭൂമിമേലും ആകർഷണശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു അത്ര ശരിയല്ല. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അവയുടെ ഗുരുത്വകേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയുന്നതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഭൂമി ചന്ദ്രന്റെ 81 മടങ്ങിൽ അധികം ഭാരമുള്ളതും ഭൂമിയുടെ പ്രാസാലും രണ്ടു ഗോളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ 60ൽ കരംഗത്തോളമുള്ളതുകൊണ്ടാൽ ഈ ഗുരുത്വകേന്ദ്രം ഭൂകേന്ദ്രത്തിലല്ലെങ്കിലും ഭൂഗർഭത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കു ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. സ്വഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂ

ചന്ദ്രഗുരുത്വകേന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണംകൊണ്ടു ഭൂമിക്കും ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ട്. ഈ പരിവർത്തനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഓരോ അണുവിന്മേലുള്ള ചന്ദ്രാകർഷണം പരിവർത്തനപഥത്തിന്റെ വക്രതക്കു ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂകേന്ദ്രത്തെക്കാൾ ചന്ദ്രനു അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ഭൂഭാഗത്തിന്മേലും അകലെ നില്ക്കുന്ന ഭൂഭാഗത്തിന്മേലും ഉള്ള ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒരംശം കേന്ദ്രത്തെക്കാൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളെ കറുക്കുടി ചന്ദ്രനോടു അടുപ്പിക്കുവാനും അകന്ന ഭാഗങ്ങളെ കറുക്കുടി അകറ്റുവാനും പറ്റിയ പ്രചോദനമായിത്തീരുന്നു. ഈ പ്രചോദനത്തിനു വശപ്പെട്ടു സമുദ്രജലം ചന്ദ്രനു നേക്കും ചന്ദ്രനു എതിരായും മുഴച്ചുകൂടുന്നു.

ഇങ്ങിനെ സൂര്യന്റെ ആകർഷണാനന്തരംകൊണ്ടും ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണാനന്തരംകൊണ്ടും സമുദ്രജലം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ദിക്കു നോക്കിനില്ക്കുന്ന ഭൂവ്യാസങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ മുഴച്ചുകൂടിയിരിക്കെ ഭൂമി തന്റെ അക്ഷത്തിന്റെ ചുറ്റും ഭ്രമിക്കയാൽ ഈ മുഴക്കം ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിനു നാം വേലികയററമെന്നു പറയുന്നു. പ്രചോദനശക്തിക്ക് വേലാനിർമ്മാണശക്തി (Tide Producing Force) എന്നു പറയുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം സൂര്യന്റെ ആകർഷണത്തെക്കാൾ എത്രയോ കുറവാണെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെക്കാൾ എത്രയോ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭൂവ്യാസം ചന്ദ്രന്റെ അകലത്തിന്റെ പരയത്തക്ക ഒരംശവും സൂര്യന്റെ അകലത്തിന്റെ നിസ്സാരമായ ഒരു അംശവുമാകുന്നു. അതിനാൽ ചന്ദ്രാകർഷണാനന്തരംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചാന്ദ്രവേലാനിർമ്മാണശക്തി സൗരവേലാനിർമ്മാണശക്തിയെക്കാൾ എത്രയോ അധികമാകുന്നു. സൂര്യനെക്കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വേലി നാം അറിയുന്നതേ ഇല്ല. വേലികയററത്തെ ചന്ദ്രനായി എല്ലാവരും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു വാവുകൾക്കും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ വേലാനിർമ്മാണശക്തികൾ ഒരേ വഴിക്കു പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനാൽ

വേലികയറത്തിന്നു ശക്തി കൂടുന്നു. രണ്ടു വാവുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വേലികയറത്തിന്നു ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു ഏവരുടേയും അനുഭവമത്രെ.

സമുദ്രജലത്തിന്നു മുഴുകുകയാണെന്നും മുഴുകി ജലത്തിന്നു സഞ്ചരിക്കുവാനും സമയം വേണം. അതിനാൽ വേലികയറം ചന്ദ്രനെ അനുഗമിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ചന്ദ്രൻ ഒരുമിച്ചുതന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. അതിനും പുറമെ തുറന്ന സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കയറവും ഈ വിളംബകാലവും അധികമില്ലെങ്കിലും ഉൾക്കടലുകളിലും കായലുകളിലും വളരെ അധികമാകുന്നു. തുറന്ന സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വരുന്ന മുഴുകി വെള്ളം ഉൾക്കടലുകളിൽ തിങ്ങിക്കടക്കേണ്ടി വരികയാലാണ് കയറം വളരെ അധികമാകുന്നത്.


വേലികയറത്തെ നിത്യം അളന്നു കണക്കാക്കി സൂര്യനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽനിന്നു ചന്ദ്രന്റെ ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു എത്രയും ദൃഢമായതും കൃത്യഫലം കിട്ടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതുമായ മാർഗ്ഗമാകുന്നു.

മേഘബന്ധവാമുഖഗതമായ അക്ഷത്തിന്നു ചുറ്റും ദിവസത്തിൽ ഒരു പട്ടം വീതമായി ഭൂമി ഭൂമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നാൽ, കൂട്ടിൽനിന്നു പറന്നുപോയ പക്ഷികൾ എങ്ങിനെ കൂട്ടിൽ മടങ്ങിവരും എന്ന വരാഹമിഹരാചാര്യരുടെ ചോദ്യത്തിന്നു നാം ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൂമി പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ടു മേഘബന്ധവാമുഖങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന അക്ഷത്തിന്നു ചുറ്റും ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദയംതൊട്ടുദയംവരെയുള്ള കാലമായ നാക്ഷത്രദിനത്തിൽ ഒരു പട്ടം വീതമായി നിത്യം ഭ്രമണംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ജ്യോതിസ്സുകളോടുകൂടിയ ആകാശം നിത്യം കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണല്ലോ ഭൂഭ്രമണസിദ്ധാന്തം. ഈ ഭ്രമണത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മണ്ണും വെള്ളവുമല്ലാതെ അതിന്റെ ചുറ്റും

മുള്ള വായുമണ്ഡലം പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു വരാഹമിഹിരൻ ആലോചിച്ചാൻ വഴിയില്ല. ഭൂമിയുടെ വ്യാസവും പരിധിയും ഒരുവിധം കൃത്യമായി വരാഹമിഹിരന്നറിയാമായിരുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിന്നു ഭൂമണത്തിൽ പങ്കില്ലെങ്കിൽ സദാ മണിക്കൂറിൽ 1000ത്തിൽപരം നാഴികവീതം ഊതുന്ന ഒരു കാര്യം ഭൂമിയുടെ നിരക്ഷപ്രദേശത്തുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു വരാഹമിഹിരന്നു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ വായുമണ്ഡലത്തിന്നു ഭൂമണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നായിരിക്കയില്ല ആചാര്യന്റെ അഭിപ്രായം. ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് വായുമണ്ഡലം ഭൂമിയോടു കൂടിത്തീർത്താൽ, ആ തിരിച്ചൽ എങ്ങിനെ നിലനിന്നുപോകും എന്നായിരുന്നിരിക്കാം സംശയം. ഇതിന്നുള്ള സമാധാനം ന്യൂട്ടന്റെ വസ്തുധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതും ഗുരുതപാകഷ്ണവുമാണ് നല്കുന്നത്. പ്രഥമവസ്തുധർമ്മത്താൽ വായുമണ്ഡലം ഒരിക്കൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതേ വഴിക്ക് അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കണം. ഗുരുതപാകഷ്ണംകൊണ്ടു ഈ മാറ്റത്തെ വളച്ച് വായുമണ്ഡലത്തെ കട്ടിയായ ഭൂമിയോടുകൂടി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുരുതപാകഷ്ണത്തിന്നു ഇങ്ങിനെ വായുവെ വളച്ചുകൊണ്ടു ഭൂമിയോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുവാൻ മാത്രമല്ല സാധിക്കുന്നത്. ഭൂപുഷ്പത്തിന്മേൽ വായുവിൽനിന്നു ഒരു വലിയ മർദ്ദം (Atmospheric Pressure) ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. വായുമണ്ഡലം മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമണത്തിൽ ചേരുന്നത്. ഭൂമിയിലുള്ള സകലവസ്തുക്കളും നാം എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഭൂമി ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തീവണ്ടിക്കും അതിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും സകലസാമാനങ്ങൾക്കും ആ ചലനം ഉള്ളതുകൊണ്ടു, തീവണ്ടിയിൽ നാം പെരുമാറുന്നതിന്നു ആ പൊതുവിലുള്ള ചലനം പ്രതിബന്ധമോ സഹായമോ ആയിത്തീരുന്നില്ല. കാരണം ന്യൂട്ടന്റെ പ്രഥമവസ്തുധർമ്മംതന്നെ. അതുപോലെ ഭൂമിക്കും അതിലും അതിന്മേലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്കും പൊതുവിലുള്ള ഭൂമണം വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഭൗതികബന്ധങ്ങളെ ഒരു വി

ധത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ബന്ധങ്ങൾ ഭൂമിയും വായു മണ്ഡലവും നിശ്ചലമായ വിധത്തിൽത്തന്നെ നടന്നുപോകുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമേ ഭൂഭ്രമണമുണ്ടെന്നു നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തിൽനിന്നു നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇനി ഭൂമിക്ക് ഭ്രമണമുണ്ടെന്നു സംശയംകൂടാതെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റയാം. ഭൂമിച്ചുറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ അക്ഷത്തിന്മേൽ പ്രത്യേകശക്തികൾ ചെലുത്താതെ അക്ഷത്തിന്റെ ദിക്കിനു മാറ്റം വരികയില്ലെന്നു വസ്തുതയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ഗണിതശാസ്ത്രം കൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കാം. സൈക്കിൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചക്രങ്ങൾ അതിവേഗം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മാത്രമാകുന്നു അതു ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മറിയതിരിക്കുന്നത്. ലോഹംകൊണ്ടു ഒരു വിധം തൂക്കമുള്ള ഒരു വട്ടുണ്ടാക്കി അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു



പരിലേഖം 43

ക്ഷത്തെ പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം വൃത്താകാരമായ വലയങ്ങളിൽ കയറി നിൽക്കിയാൽ, ആധാരമായ ലോഹവലയങ്ങളുടെ ഭ്രമണരൂപമായ ചലനങ്ങളൊന്നും ആ

ധേയമായ ലോഹത്തട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതിന്നു ഭൂമിയന്ത്രം (Gyroscope) എന്നു പേര്. ഭൂമിയന്ത്രത്തെ കാറുകൂടി തട്ടാത്തതായ ഒരു കണ്ണാടിപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ച് ലോഹത്തട്ടിനെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചാൽ അതു വളരെ നേരം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ തിരിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അക്ഷം ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ നേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ, തട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ നേക്കുതന്നെ അക്ഷം തിരിഞ്ഞുനില്ക്കും. ഇതിൽനിന്നു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദിക്കിന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഭൂമി തിരിയുന്നതോടുകൂടി ക്ഷിതിജത്തിനും ഖമധ്യത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഭൂമിയേയും അതിലുള്ള വസ്തുക്കളേയും അപേക്ഷിച്ച് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദിക്കിന്നും അതിനെ നോക്കിനില്ക്കുന്ന അക്ഷത്തിന്റെ ദിക്കിന്നും മാറ്റമുള്ളതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നു വരുന്നു.

ഫുക്കോട് (Foucault 1819—1868) എന്ന ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പാരീസിലെ പാണിയൻ എന്ന കെട്ടിടത്തിൽ 200 അടി നീളമുള്ള ഒരു ചരടിന്മേൽ ഒരു ലോലക്കുത്ത കെട്ടിതുക്കി, അതിനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സമയം കഴിയുന്തോറും അതു ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തലത്തിന്റെ ദിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ കിഴക്കുനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു പ്രക്ഷേപണം വെക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇതു നിരക്ഷരേഖയിൽവെച്ചു ചെയ്താൽ ഭോലനതലത്തിന്നു മാറ്റം വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിരക്ഷരേഖയിൽനിന്നു വടക്കോട്ടു വടക്കോട്ടു മാറി ചെയ്താൽ ഭോലനതലത്തിന്റെ ഭ്രമണത്തിന്നു വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇങ്ങിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നു ചെയ്താൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ അക്ഷജ്യാവു (Sin Latitude)കൾക്ക് അനുപാതമായി ഭോലനതലഭ്രമണത്തിന്റെ വേഗത മാറുന്നു. ഇതിൽനിന്നു ഈ പരീക്ഷണം മേരുവിൽനിന്നു ചെയ്താൽ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ 24

മണിക്കൂറാണെന്നു അനുമാനിക്കാം. ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു പ്രദേശത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽനിന്നുമാത്രം ഈ അനുമാനം സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭൂമണത്തിൽനിന്നു നമുക്കെന്തു മനസ്സിലാക്കാം. മേരുവിന്റെ മീതെ ലോലകം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ നേരെ താഴെ മേരുബന്ധവാമുഖരേഖക്കു ചുറ്റും ഭൂമി ഭ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ലോലകത്തിന്റെ ദോലനതലത്തിന്നു മാറ്റം വരുവാൻ അവകാശമില്ല. അതു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഒരു തലത്തിൽ ആടിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു, ഭൂമി ആ തലത്തെ അപേക്ഷിച്ചു തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ ഭൂഭ്രമണത്തിന്നു തെളിവുകളായി വേറേയും ചില ന്യായങ്ങൾ പറയാം. ഭൂമി ഒരു ഗോളമാകുന്നു. അതു മേരുബന്ധവാമുഖത്തേക്കു ചുറ്റും ഭ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിരക്ഷരേഖയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഭ്രമണവശാലുള്ള വേഗത അധികവും അവിടന്നു വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും മാറിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ആ വേഗത കുറവും മേരുബന്ധവാമുഖങ്ങളിൽ കേവലം ശൂന്യവും ആയിരിക്കണം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ടു നിരക്ഷരേഖയിലേക്കും, തെക്കുനിന്നു വടക്കോട്ടു നിരക്ഷരേഖയിലേക്കും ഊതുന്ന കാറ്റുകളും ഒഴുകുന്ന സമുദ്രപ്രവാഹങ്ങളും ഭൂമിയുടെ നിരക്ഷപ്രദേശത്തു കിഴക്കോട്ടുള്ള വേഗത കിട്ടായ്ക്കയാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടു തെറ്റാതിരിക്കയില്ല. നിരക്ഷരേഖയുടെ വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വടക്കൻ കാറ്റുകൾക്കും തെക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ തെക്കൻ കാറ്റുകൾക്കും ഈ ദിഗ്ഭ്രംശം വന്നു കാണുന്നു. ഇതിൽനിന്നും ഭൂമി പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ടു തിരിയുന്നതായി അനുമാനിക്കാം.

വ്യാഴം, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ദൂരദർശിനികയിൽ കൂടിക്കാണാം. ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ സൂര്യൻതന്നെ സ്വന്തം അക്ഷത്തിന്റെ ചുറ്റും ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വീതമുള്ള ഭ്രമണമുള്ളതുകൊണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഒരു മുഖം മാ

ത്രം നാം കാണുന്നത്, ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഭൂമിക്ക് ഭ്രമണമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആകാശം ഭ്രമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നതെന്നു ആലോചിക്കുന്നതാകുന്നു ന്യായം. എന്നു മാത്രമല്ല, ഭൂമി സ്ഥിരമായി നിന്നു എത്രയോ അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും 24 മണിക്കൂറുകൊണ്ടു ഭൂമിയെ ഒരു വട്ടം ചുറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അവയുടെ വേണ്ടിവരുന്ന വേഗത അതിഭയങ്കരവും ഭാവനാതീതവുമായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കാം പൂർവ്വന്മാരിൽ ചിലരെ ഭൂമിയാണ് തിരിയുന്നതെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

ലഘുവായ ഒരു പരീക്ഷണവുമൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂമിക്ക് ഭ്രമണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭ്രമണവശാലുണ്ടാകുന്ന വേഗത ഒരു ഉയർന്ന സ്കാലത്തിന്റെ മുകളിലാകത്തു അധികവും അടിഭാഗത്തു കുറവും ആയിരിക്കും. അതിനാൽ കാറ്റില്ലാത്ത സമയം നോക്കി സ്കാലത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്നു താഴത്തേക്കു ഒരു കല്ല് ഇട്ടാൽ അതു നേർ താഴത്തുനിന്നു അല്പം കിഴക്കോട്ടു മാറി വീഴുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷണം ഇറാലിയിലെ പൈസാ പട്ടണത്തിലുള്ള ചരിഞ്ഞ മണിമാളികയുടെ മുകളിൽനിന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താഴത്തിട്ട സാധനം അല്പം കിഴക്കോട്ടു മാറി വീണതായിക്കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ഈ നിത്യഭ്രമണംകൊണ്ടുതന്നെയാകുന്നു മേൽബഡവാമുഖരേഖയായ അക്ഷത്തിന്റെ നോട്ടം എന്നും ഖഗോളത്തിൽ സ്ഥിരമായിക്കാണുന്നത്. സ്ഥിരമായ ടിക്കിലേക്കു നോക്കുന്ന ഈ അക്ഷത്തിന്റെ ചുറ്റും ഭൂമി തിരിയുമ്പോൾ ആകാശം ഈ അക്ഷം രണ്ടു വശത്തേക്കും നീട്ടിയാൽ ചെന്നു മുട്ടുമെന്നു തോന്നുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറി താച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോലെ എതിർ വശത്തേക്കു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപോലെ തോന്നുന്നു. ഈ ഭ്രമണത്തോടുകൂടി ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും സ്വകക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷത്തിന്റെ നോട്ടത്തിന്നു (ടിക്കിന്നു) മാറ്റം വരുന്നില്ല. നക്ഷത്രങ്ങൾ വെറും കണ്ണുകളെക്കൊണ്ടു മാത്രമല്ല

യന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടുപോലും അളക്കുവാൻ പ്രയാസമായ ദൂരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആകാശം അടുത്താണെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അനന്തമായ ദൂരത്താണെന്നു കരുതേണ്ടിവരുന്നു. ഭൂമിയുടെ അക്ഷം അനന്തദൂരത്തിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്ന സ്ഥാനത്തിന്നു ഭൂമിയുടെ കക്ഷയിലുള്ള സഞ്ചാരംകൊണ്ടു വരുന്ന ഭേദം കക്ഷയിൽ ഏതു സ്ഥാനത്തുനിന്നും നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ മേഘബദ്ധവാമുഖരേഖ ആകാശത്തിൽ ചെന്നു മുട്ടുന്ന ഉത്തരദക്ഷിണധ്രുവങ്ങൾ നമുക്ക് അചലങ്ങളായിത്തോന്നുന്നു.

നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത്രയധികം അകലെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു പൂർവ്വാർ കരുതിയിരുന്നില്ല. നക്ഷത്രകക്ഷാപരിധി രവികക്ഷാപരിധിയുടെ 60 മടങ്ങ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഭാരതീയസിദ്ധാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണുന്നത്. അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഭ്രംശം വന്നു കാണപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പൂർവ്വാർ ഭൂസഞ്ചാരസിദ്ധാന്തം സ്വീകരിപ്പാനുള്ള മുഖ്യമായ തടസ്സം. ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ചില നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഭൂസഞ്ചാരംകൊണ്ടു വലോളസ്ഥാനപരിഭ്രംശം വരുന്നുണ്ടെന്നു കാണുവാൻ തുടങ്ങി. അതു പിന്നീടു പറയാം. ഇതുകൂടാതെ ഒരുവിധം ഭ്രംശഭ്രാന്തിയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നു ദൂരദർശിനി നിരീക്ഷകന്മാർക്കു മനസ്സിലായി. അതിന്നു അപേരണം (Aberration) എന്നു പറയുന്നു.

തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, മഴ പെയ്യുന്നതു മിക്കവരും നോക്കിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നില്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽനിന്നു നേരെ താഴത്തേക്കു വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ, വണ്ടി കാടുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നല്ലവണ്ണം ചാഞ്ഞ് വണ്ടിക്കു നേരെ വന്നടിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇതിന്നു കാരണം എന്തെന്നാലോചിക്കാം. മഴത്തുള്ളികൾ അപ്പോഴും നേരെ താഴത്തേ

ക്കുതന്നെ വിഴുന്ന്. കാര്യ ഇല്ലതന്നെ. മഴത്തുള്ളികൾ പെട്ടെന്നല്ല താഴത്തെത്തുന്നത്. അവ ഒരു വേഗതയിൽ മുകളിൽനിന്നു താഴത്തേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നു. സഞ്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മഴത്തുള്ളികൾ വണ്ടിയുടെ വേഗതക്കനുസരിച്ചും നമോടടുത്തുവരുന്നു. പക്ഷെ വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു വണ്ടിയാണ് മഴത്തുള്ളികളോടടുക്കുന്നതു എന്ന ബോധമുണ്ടാകാതെ മഴത്തുള്ളികളാണ് വണ്ടിയോടടുക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനാൽ മഴത്തുള്ളികളിൽ അവക്കു കീഴ്പോട്ടുള്ള യഥാർത്ഥസഞ്ചാരത്തിന്നു പുറമെ, വണ്ടിയാത്രക്കാരോടടുത്തുവരുന്ന ഒരു സഞ്ചാരവും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ആരോപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ചരിഞ്ഞു പീഴുന്നതായി യാത്രക്കാർക്കു തോന്നുന്നത്. നേരെ മുകളിൽനിന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികളെ യാത്രക്കാർ യഥാർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വണ്ടി കാട്ടുന്ന വശത്തേക്കു കറേനീങ്ങിനില്ക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു പോകുന്നു.


നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു അവയുടെ വെളിച്ചംവഴിയാകുന്നു. വെളിച്ചം അതു പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരവേഗത സെക്കണ്ടിൽ 1,86,000 മൈൽ വീതമാണെന്നു ഇന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു നിരീക്ഷണംകൊണ്ടും പരീക്ഷണംകൊണ്ടും അറിയാം. ഇങ്ങിനെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു വെളിച്ചം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയും വെളിച്ചം കാണുന്ന ഭൂവാസികളും സെക്കണ്ടിൽ 18 മൈൽ വീതം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം വെളിച്ചം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് കറേനീങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതായി ഭൂവാസികൾക്ക് തോന്നുന്നു. വെളിച്ചത്തിന്റെ വേഗതയപേക്ഷിച്ചു ഭൂമിയുടെ വേഗത അല്പമായതിനാൽ ഈ നീക്കം അല്പമായിരിക്കും. എങ്കിലും

ലും ഇങ്ങിനെ ഒരു നീക്കമുണ്ടെന്നു സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണംകൊണ്ടറിയാം. ഈ നീക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം. മേടമാസത്തിൽ സൂര്യനെ മേടം രാശിയിൽ നാം കാണുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്നു ഭൂമിയെ നോക്കിയാൽ ഭൂമിയെ തുലാം രാശിയിൽ കാണാം. തുലാം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമി മകരം രാശി നോക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മേടമാസത്തിൽ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും മകരം രാശിയിലേക്കു അല്ലമെന്നു നീങ്ങിക്കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ മാസങ്ങൾ മാറുംതോറും നക്ഷത്രങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു തോന്നുന്ന രാശിയും മാറുന്നു. ഈ രാശി എപ്പോഴും സൂര്യനിൽനിന്നു കൃത്യം 3 രാശി ($=90^\circ$) പിന്നിലായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലം അപക്രമവൃത്തത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യമായ രാശികൂടങ്ങളിൽ നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറം ഒരു നന്നെ ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ ഒരു കൊല്ലംകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപക്രമവൃത്തത്തിൽതന്നെ നില്ക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഒരു വരയിൽ ഒരു കൊല്ലംകൊണ്ടു അങ്ങോട്ടുനീങ്ങാട്ടും നീങ്ങിക്കാണപ്പെടും. അപക്രമവൃത്തത്തിനും രാശികൂടങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനം ൧ ചുറ്റുമായ കറയുതവൃത്തത്തിൽ ഒരു കൊല്ലംകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. നക്ഷത്രനിരീക്ഷകന്മാർ ഈ അപേരണത്തിനുള്ള സംസ്കാരം ചെയ്തിട്ടു മാത്രമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റു ജ്യോതിസ്സുകൾക്കും ഈ സംസ്കാരം വേണം. ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമഫലം $20\frac{1}{2}$ വികലമാത്രമാകുന്നു. ഇതു വെളിച്ചത്തിന്റെ വേഗതയെ ആശ്രയിച്ചതല്ലാതെ, നക്ഷത്രത്തിന്റേയോ ഗ്രഹത്തിന്റേയോ ദൂരത്തെ ആശ്രയിച്ചതുമല്ല.

അപേരണം ഭൂമി സ്വകക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ന്യായമായ ഒരു തെളിവുവകുന്നു. ഗുരുതപാകഷ്ണസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ആകാശംകൊണ്ടു രണ്ടു ഗോളങ്ങൾ അന്യോന്യം ചരിവത്തോടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവ രണ്ടും അവയുടെ ഗുരുതപ

കേന്ദ്രത്തിന്നു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കണം. സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം ഭൂദ്രവ്യമാനത്തെക്കാൾ എത്രയോ അധികം മടങ്ങാകയാൽ അ വയുടെ ഗുരുത്വകേന്ദ്രം സൂര്യഗോളത്തിന്നകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ഭൂമി സൂര്യന്നു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കു ന്നതായിത്തന്നെ കരുതണം. ഇങ്ങിനെ ഭൂമിയുടെ കക്ഷാമാർഗ്ഗ മായ സഞ്ചാരത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പല ന്യായങ്ങളും ഉണ്ട്.

നക്ഷത്രനിരീക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗ തിയും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. വെളിച്ചം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ




പരിലേഖം 44

ഒരു ദ്രവ്യത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ച് സാന്ദ്രത കൂടിയ മറ്റൊരു ദ്രവ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്പമൊന്നു കനിയുന്നു. സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രവ്യത്തിൽനിന്നു സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രവ്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്പമൊന്നു നിവരുകയും ചെയ്യുന്നു. വായു

വിൽകൂടി സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സ് കട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നേയും വായുവിൽകൂടിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രകാശശക്തിയുടെ മാർഗ്ഗം പരിലേഖത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും കുറെ അധികം ഭൂരം വായുമണ്ഡലം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തിന്നു സാന്ദ്രത കൂടും. മേല്പോട്ടു ചെല്ലുന്തോറും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യും. ഏതാണ്ട് 200 മൈൽ അകലത്തു വായു ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. കുറെ കൂടിചെന്നാൽ അന്തരീക്ഷം തീരെ ശൂന്യവുമായിരിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന വെളിച്ചം ശൂന്യമായ അന്തരീക്ഷ

ത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ക്രമേണ കട്ടികൂടി വരുന്ന വായുമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി നക്ഷത്രരശ്മികൾ കനിയുവാൻ



പരിലേഖം 45

തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ കറുകുനിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രശ്മികൾ കണ്ണിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പിന്നോട്ടു നിട്ടിയാലുണ്ടാവുന്ന വഴിക്കായിരിക്കും നാം ന

ക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുക. പരിലേഖത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു രശ്മി വരുന്ന മാർഗ്ഗത്തേയും നാം നക്ഷത്രത്തെക്കാണുന്ന ദിക്കിനേയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വളവു ഉള്ളതിൽ അധികമായിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രശ്മികൾക്കു വായുമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ അല്പമായ വക്രതനിമിത്തം നാം നക്ഷത്രങ്ങളേയും മറ്റു ജ്യോതിസ്സുകളേയും യഥാർത്ഥസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു അല്പമൊന്നു പൊങ്ങിക്കാണുന്നു. നക്ഷത്രനിരീക്ഷകന്മാർ ഇതിനുള്ള സംസ്കാരവും ചെയ്യുന്നു. ഖമലൂത്തിൽകൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന രശ്മികൾക്ക് വക്രത സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഖമലൂത്തിൽനിന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകലം വലിക്കുംതോറും ഈ സംസ്കാരവും വലിച്ചുവരുന്നു. അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ കേവല സമവൃത്താകൃതി വിട്ടു മേൽകീഴ്വിസ്താരം ചുരുങ്ങിക്കാണും. സൂര്യന്റെ മേൽഭാഗം അല്പമൊന്നു ഉയർന്നിട്ടാണ് നാം കാണുന്നതെങ്കിലും, അടിഭാഗം അധികം ഉയർന്നുകാണുന്നതിനാൽ വിസ്താരം ചുരുങ്ങിത്തോന്നുന്നു.

അസ്തമിക്കുന്നതും ഉദിക്കുന്നതും ആയ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രഗണങ്ങളും കറു വലുതായിത്തോന്നാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു

തോന്നൽ മാത്രമാണ്. വെറും മാനസികപ്രാമോഹം. സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രാസങ്ങളോ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമോ ഭാഗം, കല, വികലകളായി അളന്നുനോക്കിയാൽ ഉദയസമയത്തും, അവ ഉച്ചയാവുമ്പോഴും, അസ്തമനസമയത്തും ഒരു ഭേദവും കാണുകയില്ല. സൂര്യഗോളത്തിന്റെ പ്രാസം നാം കാണുന്നതു ഒരു കോണായിട്ടാണ്, അല്ലാതെ വാരയായിട്ടോ, അടിയിയിട്ടോ, ഇഞ്ചായിട്ടോ അല്ല. ഈ കോണിന്റെ ഭുജങ്ങൾ കണ്ണുതൊട്ടു സൂര്യൻവരെ നമുക്ക് ചെറുതായിത്തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ സൂര്യനെ ചെറുതായിത്തോന്നും. ഭുജങ്ങൾ വലുതായിത്തോന്നിയാൽ സൂര്യനേയും വലുതായിത്തോന്നും. സൂര്യൻ താണു നില്ക്കുകയും നാം അതിനെ നോക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിലത്തു നാം അറിയുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയും അപ്പുറത്തായി സൂര്യൻ ഇരിക്കുവാൻ, അതു വളരെ അകലത്താണെന്നു നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു. അതോടുകൂടി കോണിന്റെ ഭുജങ്ങളും വലുതെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും വലുതായിത്തോന്നുന്നു.

വെളിച്ചത്തിന്നു സഞ്ചരിക്കുവാൻ സമയം വേണമെന്നു ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് 1675ൽ റോമർ (Roemer) എന്ന പേരായ ഡെൻമാക്കിലെ ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഭൂരദശിനിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പുറം പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കാണാം. അവയിൽ നാലെണ്ണം 1 $\frac{1}{2}$ ദിവസംതൊട്ടു 16 $\frac{1}{2}$ ദിവസംവരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ പുറം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിന്റെ മറവിൽപെട്ടു അദൃശ്യമാവുകയും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തുവന്നു ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരീക്ഷകന്മാർ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ മറയുകയും പുറത്തുവരികയും ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ കണക്കാക്കി എഴുതിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കണക്കാക്കിയ സമയവും, വാസ്തവത്തിൽ കാണുന്ന സമയവും ത

മ്മിൽ ഭേദം കണ്ടു. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭേദം തീർന്നുപോകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യാഴം നമ്മിൽനിന്നു അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ കണക്കാക്കിയതിൽനിന്നു താമസിച്ച് കാണുകയും വ്യാഴം അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കണക്കാക്കിയ സമയത്തിന്നു മുമ്പു കാണുകയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി. ഇതിന്നു കാരണം വെളിച്ചം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു നമ്മെ പ്രാപിക്കുന്നതെന്നും, അധികദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ സംഭവം വൈകിക്കാണെന്നുവെന്നും, കുറവു ദൂരമാത്രം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ളപ്പോൾ സംഭവം കുറെ മുമ്പിട്ടു കാണുന്നുവെന്നും റോമർ മനസ്സിലാക്കി. ഏതു സംഭവവും നാം അറിയുന്നതു സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശം വഴിയാണല്ലോ. ഗ്രഹസഞ്ചാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ അന്നു കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടു അതാതു കാലത്തു ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള ഗ്രഹത്തിന്റെ അകലങ്ങളും അവയുടെ അന്തരങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ കണക്കാക്കുമായിരുന്നു. ഈ അന്തരങ്ങളിൽനിന്നും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ മറവും, വെളിച്ചവും, കണക്കാക്കിയതും കണ്ടതും ആയ സമയഭേദങ്ങളിൽനിന്നും റോമർ വെളിച്ചം സെക്കണ്ടിൽ 1,86,000 മൈൽ പ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു കണക്കാക്കി. ഇതു 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഫിസ്റ്റോ, ഫ്ലൂക്കോട് മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണശാലകളിൽവെച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും വെളിച്ചം സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത കണക്കാക്കി.

സൂര്യൻ അപക്രമവൃത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ആ വൃത്തത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യർ രാശികൂടങ്ങൾ. ഭൂമിയുടെ അക്ഷം നില്ക്കുന്നതു ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങളെ നോക്കിട്ടാകുന്നു. ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങളിൽനിന്നു ദക്ഷിണോത്തരരാശികൂടങ്ങൾ 23½ അംശം അകന്നിരിക്കുന്നു. ഭൂമി സൂര്യന്നു പുറം സഞ്ചരിക്കുന്നതു അപക്രമവൃത്തതലത്തിൽ

ലാണെന്നു സ്പഷ്ടമത്രെ. ഈ തലത്തിന്നു ലംബമായ രേഖ രാശികൂടങ്ങളെ നോക്കിനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ അക്ഷം ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്ന അപക്രമവൃത്തതലത്തിന്റെ ലംബത്തിന്നു $23\frac{1}{2}^\circ$ ഭാഗം ചരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നുവെന്നു വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ എന്നും ഒരു വശത്തേക്കു ചരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന അക്ഷത്തിന്നു പുറം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഭൂമി അപക്രമവൃത്തതലത്തിലുള്ള കരായതവൃത്തത്തിൽ സൂര്യന്നു പുറം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ വടക്കുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിന്റെ വടക്കെ തല സൂര്യന്നു നേക്കും, തെക്കെ തല സൂര്യനിൽനിന്നകന്നും ചരിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ കാലത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് വടക്കുള്ള അയനസന്ധി. അപ്പോഴായിരിക്കും അക്ഷത്തിന്റെ വടക്കെ അറ്റം സൂര്യനിലേക്കു ഏറ്റവും ചരിഞ്ഞുനില്ക്കുക. ഇതുപോലെ സൂര്യൻ ഘടികാരമണ്ഡലത്തിന്റെ തെക്കുള്ള കാലം മുഴുവൻ അക്ഷത്തിന്റെ വടക്കെ അറ്റം സൂര്യനിൽനിന്നകന്നും തെക്കെ അറ്റം അടുത്തും ചരിഞ്ഞുനില്ക്കും. ഈ കാലത്തിന്റെ മദ്ധ്യമായ തെക്കെ അയനസന്ധിയിൽ അക്ഷത്തിന്റെ വടക്കെ അറ്റം സൂര്യനിൽനിന്നു ഏറ്റവും അകന്നു ചരിഞ്ഞിരിക്കും.

ഘടികാരമണ്ഡലം അപക്രമമണ്ഡലത്തെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൂർ്വാപരവിഷുവത്തുകൾക്ക് അപക്രമവൃത്തമാഗ്ഗമായി ഒരു ചെറിയ വക്രഗതിയുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഫലമായി ധ്രുവങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ രാശികൂടങ്ങളുടെ പുറം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു (5-ാം അദ്ധ്യായം നോക്കുക). വിഷുവത്തുകളുടെ ഈ സഞ്ചാരത്തെ അയനചലനമെന്നു നാം പറയുന്നു. അയനചലനത്തിനുള്ള കാരണവും സേർ ഐസാക് ന്യൂട്ടൻ ഗുരുതപാകഷ്ണമാണെന്നു സമർത്ഥിച്ചു.


ഭൂമി കൃത്യമായ ഒരു ഗോളമല്ലെന്നും നിരക്ഷരേഖ വഴിയിൽ അല്പം വീർത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഭൂമി ഉറച്ചുകട്ടിയാവുന്നതിന്നു മുമ്പു അക്ഷത്തിന്നു പുറമുള്ള ഭ്രമണം

കൊണ്ടു ഇങ്ങിനെ വീർത്തുപോയതാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. കുഴച്ച കളിമണ്ണ് ഒരു ഗോളമായി ഉരുട്ടി ഒരു പലകമേൽ വെച്ച് ആ ഗോളത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽകൂടി പോകുന്ന രേഖയുടെ ചുറ്റും പലകയെ വേഗം തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഗോളം ഒന്നമരുന്നതും നാലു ഭാഗത്തേക്കും വീർക്കുന്നതും നമുക്കു കാണാം. ഈ നിലയിലായിരിക്കണം ഭൂമി നിരക്ഷരേഖയിൽ വീർക്കുവാൻ ഇടയായത്.

സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ഒന്നായി ആകർഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനിലുള്ള ഓരോ അണവും ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ അണവിനേയും ആകർഷിക്കുന്നു. രണ്ടും കൃത്യമായ ഗോളങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫലം രണ്ടു ഗോളങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന്നു തുല്യമാണെന്നു ഗണിതശാസ്ത്രം വഴി സ്ഥാപിക്കാം. എന്നാൽ ഭൂമി കൃത്യമായ ഒരു ഗോളമല്ല. ഭൂഗോള മദ്ധ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുമായി കഴിയുന്നത്ര വലിപ്പത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഗോളം നീക്കി ബാക്കിയുള്ളതു നിരക്ഷരേഖ വഴിയായി ഈ ഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റും പോകുന്ന ഒരു വലയമായി സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഭൂമിമേലുള്ള സൂര്യന്റെ ആകർഷണത്തെ രണ്ടു വക്രപ്പകളായിത്തീർക്കാം. ഒന്നാമത്തേതും മുഖ്യമായതും നടുക്കുള്ള വലിയ ഗോളത്തിന്മേലുള്ള ആകർഷണംതന്നെ. അതു ആ ഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണെന്നു മിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും സങ്കല്പിക്കാം. രണ്ടാമത്തേതു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തിന്മേലുള്ള ആകർഷണം. ഇതാകുന്നു അയനചലനമുണ്ടാക്കുന്നത്.

വടക്കുള്ള അയനസന്ധികാലത്തു സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടേയും സ്ഥിതി പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ര എന്നതു സൂര്യനും ക ദ ഗ ദ₁ എന്നതു വടക്കെ അയനസന്ധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ നിരക്ഷരപ്രദേശവും മ, ബ എന്നിവ മേഘബന്ധവാമുഖങ്ങളാകുന്നു. ന ദ ന₁ ദ₁ എന്നതു അപക്രമപ്പത്തലം ഭൂപുഷ്പത്തെ ഹേദിക്കുന്ന രേഖയാകുന്നു. ഇതു അപക്രമമണ്ഡലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള സൂര്യ

ന്റെ ആകർഷണം ഭൂകേന്ദ്രത്തിലുള്ളതിനെക്കാൾ അധികമായ തുകൊണ്ടു വേലികയറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ ആ പ്രദേശത്തെ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സൂര്യനു നേക്കു വലിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുന്നു. ക എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ആകർഷണം ഭൂകേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആകർഷണത്തെക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ടു ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സൂര്യനു വിപരീതമായ ദിക്കിലേ



പരിലേഖം 46

ക്കു വലിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമി തെറ്റാതെ ഉരുണ്ട ഒരു ഗോളമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗോളത്തിന്റെ സൂര്യോഭിമുഖമായ വശത്തും എതിർവശത്തും തുല്യവും എതിരായതും ആയ ശക്തികൾ അപക്രമതലത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ വേലികയറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലാതെ വേറെയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ നിരക്ഷരേഖയുടെ വഴിക്ക് ഗോളം വിട്ടുനില്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുള്ളതിനാൽ അപക്രമ പൃത്തതലത്തിന്റെ ഒരു വശത്തു സൂര്യനോടടുത്ത ഭാഗത്തെ സൂര്യനു നേക്കും മറുവശത്തു സൂര്യനിൽനിന്നകന്ന ഭാഗത്തെ സൂര്യനിൽനിന്നു എതിരായും വലിക്കുന്ന ശക്തികൾ നിരക്ഷരപ്രദേശത്തിന്റെ ഗ, ക എന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപക്രമതലത്തോടുള്ള ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തെ നിന്തുവാൻ പാറിയവയായിത്തീരുന്നു. ഭൂമിക്ക് ഭ്രമണമില്ലെങ്കിൽ, അക്ഷം നിവരുകയും ചെയ്യും. ഭ്രമണമുള്ളതിനാൽ ഈ ശക്തികളുടെ ഫലം തീരെ പ്രത്യാസപ്പെടുപോകുന്നു,

ഈ ശക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ക എന്ന ഭാഗം ക ട എന്ന വഴിക്കു സഞ്ചരിക്കും. ഈ ശക്തികൾ ഉള്ളതിനാൽ ക എന്ന ഭാഗം ഒന്നു ക്രമേണ താണു സഞ്ചരിച്ച് അപക്വമത്തെ ന എന്നവിടെ ചെന്നു സ്തംഭിക്കും. ഗ എന്ന ഭാഗം ഈ ശക്തികളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നു ക്രമേണ പൊന്തി സഞ്ചരിച്ച് അപക്വമത്തെ ന₁ എന്ന ഭാഗത്തു ചെന്നു സ്തംഭിക്കും. അക്ഷത്തിന്റെ ചരിവിന്ന് ഒരു മാറ്റം വരികയുമില്ല. ക, ഗ എന്ന ഭാഗങ്ങൾ ട, ട₁ എന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെല്ലാതെ ന, ന₁ എന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഫലമായി നിരക്ഷുപ്തതും അപക്വമവൃത്തസ്ഥാനീയമായ ഭൂപുഷ്പവൃത്തത്തെ ഭ്രമണവശത്തിന്നു വിപരീതമായ വശത്തേക്കു അല്പമൊന്നു നീങ്ങി ഹേദിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ ഖഗോളത്തിൽ ഘടികാരമണ്ഡലം അപക്വമവൃത്തത്തെ മുറിയുന്ന വിഷുവസ്ഥാനങ്ങൾ അല്പം വിചലനമായി നീങ്ങുന്നു.

ദക്ഷിണായനസന്ധിയിലും ഇപ്രകാരംതന്നെ സംഭവിക്കും. രണ്ടു അയനസന്ധികളുടേയും ഇടയിൽ ഇത്ര പ്രബലമായി സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയനമദ്ധ്യങ്ങൾവരെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു ഈ നീക്കം പിന്നേയും വലുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. ചന്ദ്രനും അപക്വമവൃത്തത്തിനടുത്തായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ തന്റെ ആകർഷണകൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തെ നിവർത്തി നിൽക്കുവാൻ പാറിയ ശക്തികൾ ഉല്ലാസിപ്പിക്കുകയും അവയെക്കൊണ്ടു അയനചലനത്തിന്റെ വേഗത വലുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയനചലനത്തിന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാരണമാകയാൽ ഇതിന്നു ചന്ദ്രവിസംബന്ധിയായ അയനചലനം (Luni Solar Precession) എന്നു പറയുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടും അയനചലനം അല്പമായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന്നും അയനചലനത്തിന്നും കാരണം പറയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടു ഗുരുതപാകഷ്ണസിദ്ധാന്തത്തെ വിഭാജനം പ്രത്യേകം ഞ്ഛിച്ചുപോന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടേയും ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ

ക്കും കെപ്ലറുടെ നിയമങ്ങൾ മൂന്നും പറയുമെന്നു കണ്ടു. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള അകലവും പര്യയകാലവും അറിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹത്തിന്റേയും ഉപഗ്രഹത്തിന്റേയും കൂടിയ ദ്രവ്യമാനമറിയാമെന്നായി. ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിന്മേൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണശക്തി മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ ദ്രവ്യമാനങ്ങളും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കാക്കി വന്നു. ഇതിന്നിടയിൽ സേർ വില്ല്യം ഹെർസ്പെർട്ട് ഓർഗ്ഗിനിക്കൊണ്ടു ആകാശത്തെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇറാനസ് (Uranus) എന്ന ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തി. ഗുരുതാകർഷണസിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചു ഇന്റന്റെ ചലനവിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അതിന്റെ ഖഗോളസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കിപ്പോന്നു. ക്രമേണ ഈ കണക്കാക്കിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു ഈ ഗ്രഹം തെറ്റി നില്ക്കുന്നതായി മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ വിദ്വാന്മാർ ഇന്റനെ സ്വപഥത്തിൽനിന്നു ആകർഷണംകൊണ്ടു തെറ്റിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഊഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1843ൽ കേമ്പ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്ന ജോൺ സി. ആഡംസ് ഇന്റന്റെ വ്യതിയാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്നു കാരണമായ ഗ്രഹത്തിന്റെ തൂക്കവും സ്കൂട്ടനിൽനിന്നുള്ള അകലവും സഞ്ചരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗവും അതിനെക്കാണുന്ന ഖഗോളസ്ഥാനവും കണക്കാക്കി. 1845ൽ തനിക്കു കിട്ടിയ ഫലങ്ങൾ ശരിയോ എന്നു നിരീക്ഷണംകൊണ്ടറിവാൻ കേമ്പ്രിഡ്ജ് നിരീക്ഷണാലയാലുക്കനെ അറിയിച്ചു. ആഡംസിന്റെ ഗണിതത്തിൽ വിശ്വാസം പോരായ്മയാൽ, അല്യക്ഷൻ അല്പം അമാന്തിച്ചു. അതിന്നിടയിൽ 1845ൽ ഫ്രാൻസിൽ ലെവെറിയർ എന്ന യുവാവും ഇന്റനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണക്കാക്കി 1846ൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. രണ്ടു യുവഗണകന്മാർക്കും കിട്ടിയ ഫലങ്ങളുടെ ഐക്യരൂപം കണ്ടു വിസ്മയിച്ച ചിലർ ഗ്രഹത്തെക്കാണുവാൻ ഓർഗ്ഗിനിക്കൊണ്ടു ആകാശം തിരയുവാൻ തുടങ്ങിയ യ

താം ചില്ലറ അമാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു വ്യഥാവിധായി. 1846 സപ്തമ്പർ മാസത്തിൽ ലെവറിയരുടെ എഴുത്തു കിട്ടിയ ഡോക്ടർ ഗാലെ എന്ന ബർലിനിലെ നിരീക്ഷകൻ തന്റെ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തി. ഈ സംഭവത്തിനടുത്തു ഡോക്ടർ ഗാലെ ആ പ്രദേശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പടം തയ്യാറാക്കിത്തീർന്നിരുന്നതിനാൽ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടിക്കണ്ടതു ഒരു ഗ്രഹമാണെന്നു തീർച്ചയാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഒട്ടും പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. ഈ ഗ്രഹത്തെ നെപ്റ്റ്യൻ (വരുന്നൻ) എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. ആഡംസും ലെവറിയരും ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു വിസ്മയമായും ഗുരുതപാകഷ്ണസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിജയപതാകയായും ജ്യോതിഷികളും മറ്റു വിപ്രജ്ഞനങ്ങളും കരുതി.

പലരും ദൂരദർശിനികൊണ്ടു ആകാശത്തെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ചൊവ്വയുടേയും വ്യാഴത്തിന്റേയും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അനേകം ചെറുഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തി. 1801 മുതൽ 1880 വരെയുള്ള കാലത്തിനിടയിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ 219 കാളം ചെറുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ന്യൂക്കോമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പുലർ അസ്ട്രോണമി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1880നു ശേഷവും പുതിയ ചെറുഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറുഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ആയിരക്കണക്കായി പറയേണ്ടിവരും.

ആഡംസും ലെവറിയരും വരുന്നനെക്കണ്ടതുപോലെ വരുന്നന്റെ വൃതിയാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അറിസോണാ നിരീക്ഷണശാലാധിപനായ ഡോക്ടർ പെർസിവാൽ ലോവൽ പ്ലൂട്ടോ എന്ന ഒരു ഗ്രഹം വരുന്നന്റേയും അപ്പുറത്തുണ്ടെന്നു തീർച്ചയാക്കി അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേയും ഗതികളേയും ഗണിച്ചു. 15 കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം 1930 മാർച്ചിൽ നിരീക്ഷകന്മാർ അതിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.

4. സെമരവൃഹം

പൂർവ്വന്മാർ നക്ഷത്രങ്ങളെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്ന തേജോബിന്ദുക്കളായും സൂര്യനേയും ചന്ദ്രനേയും ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാറ്റ വസ്തുക്കളേയും ഗ്രഹങ്ങളായും കരുതിപ്പോന്നു. കേവലം വൃത്തങ്ങൾ അന്യോന്യം മുറിയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളായ രാഹുകേതുക്കളേയും ഗ്രഹങ്ങളായിക്കരുതി. അവയെ തമോഗ്രഹങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞു. ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി ഇവയെ താരാഗ്രഹങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞു. സൂര്യനു അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം അവർ നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ സ്ഥാനം ഇന്നറിയുന്ന സംഗതികൾക്കനുസരിച്ചുതല്ലായിരുന്നു. താരാഗ്രഹങ്ങൾ കേവലം സൂര്യനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു അതിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നോ, ഭൂമി അവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നോ ഉള്ള വിവരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനു സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനംതന്നെ അവർ നല്കിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭൂമിയേയും അതിലുള്ള അജ്ഞരായ നിവാസികളേയും സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ശരിയെന്നു സമ്മതിക്കാമെങ്കിലും, ഇന്നുള്ള വിജ്ഞാനപ്രകാശത്തിൽ ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ആലോചനകൾക്കും പറയത്തക്ക ന്യൂനതയുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

ഇന്നു ചൊവ്വ, ബുധൻ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഭൂമി എന്നു നാം അറിയുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ. ഭൂമിയടക്കമുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും സൂര്യന്റെ ആകർഷണത്താൽ ബദ്ധപ്പെട്ടവരായി

ആയതവൃത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇവക്കും പുറമെ അനേകം ചെറുഗ്രഹങ്ങളും ധൂമകേതുക്കളും ഉൽക്കാസമൂഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടു അവയെല്ലാംകൂടിപ്പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് സൗരവ്യൂഹം (Solar System) എന്നത്. ഇതുവരെ ജ്യോതിഷം വളർന്നുവന്ന രീതിയെ അല്പമെങ്കിലും വ്യക്തമാക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പല സംഗതികളും ഏതാണ്ട് ചരിത്രക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞുപോന്നു. എന്നാൽ അറിയേണ്ടതായ പല സംഗതികളും വിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ സൗരവ്യൂഹത്തെ സംക്ഷിപ്തമായി വർണ്ണിക്കുന്നു.

I. സൂര്യൻ

സൗരവ്യൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു സൂര്യൻ. അതു വലിപ്പംകൊണ്ടും തേജസ്സുകൊണ്ടും മറ്റംഗങ്ങളെ എത്രയോ അതിക്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് സൂര്യന്റെ കരങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും, ബുദ്ധിയും, ബോധവും, ആത്മാവുതന്നെയും ആ കരങ്ങൾ വഴിയായല്ലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു എന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഈ തേജോഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം 8,64,400 മൈലാകുന്നു. ഭൂമിയുടെ നിരക്ഷവ്യാസം 7927 മൈൽ മാത്രവുമാകുന്നു. ഭൂമിയെ 1 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ളതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ തോതിൽ സൂര്യന്റെ വ്യാസം 9 അടി 1 ഇഞ്ചായിരിക്കും. സൂര്യവ്യാസം ഭൂവ്യാസത്തിന്റെ 109 മടങ്ങ് എന്നു വരുന്നു. ചന്ദ്രകക്ഷാവ്യാസം ഭൂവ്യാസത്തിന്റെ 60 മടങ്ങ് മാത്രമാകയാൽ ചന്ദ്രകക്ഷയോളം വലിയ ഒരു വലയത്തെ സൂര്യഗോളത്തിന്മേൽ വെച്ചാൽ, സൂര്യന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ആ വലയത്തിന്നു പുറത്തായിരിക്കും. ഭൂകക്ഷാവ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ 215 മടങ്ങ് മാത്രമേയുള്ളൂ. സൂര്യന്റെ ഘനപരിമാണം ഭൂമിയുടേതിന്റെ 13 ലക്ഷം മടങ്ങാകുന്നു. സൂ

യുഗോളത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത 1.41 മാത്രമാകുന്നു. അതിനാൽ സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം ഭൂദ്രവ്യമാനത്തിന്റെ 3.33 ലക്ഷം മടങ്ങാണെന്നു വരും. സൂര്യന്റെ ഉപരിഭാഗത്തും അന്തർഭാഗത്തും ഒരു സാന്ദ്രതയാകുവാൻ തരമില്ല. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ നിറത്തിൽനിന്നും, കുറേക്കൂടി സൂക്ഷ്മമായി ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വിരാജികയിൽനിന്നും, സൂര്യന്റെ ഉപരിഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം 6000 ഡിഗ്രി സെൻറിഗ്രേഡാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ ഉപരിഭാഗത്തിന്നു തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ 60 മടങ്ങും ഉരുകിയ പച്ചിരുമ്പിന്റെ 4 മടങ്ങും ചൂടുണ്ടെന്നു സാരം. ഈ ഉഷ്ണത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കരിയുകയും, ഉരുകുകയും, ബാഷ്പമാകുകയും ചെയ്യുമെന്നു മാത്രമല്ല, സംയുക്ത വസ്തുക്കൾ അവയുടെ സംയുക്താവസ്ഥ വെടിഞ്ഞു മൂലധാതുക്കളായി വേർതിരിയുകയും ചെയ്യും. സൂര്യന്റെ പുറഭാഗത്തുള്ള ഈ ഉഷ്ണത്തിൽനിന്നും, പുറഭാഗത്തുനിന്നു ദിനംപ്രതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉഷ്ണത്തിൽനിന്നും വെളിച്ചത്തിൽനിന്നും മറ്റു ശക്തികളിൽനിന്നും സൂര്യഗോളത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം ഇതിലധികമായിരിക്കണമെന്നു തിച്ചയാക്കാം. സൂര്യന്റെ ബഹിർഭാഗത്തുനിന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ വിരാജികയെ പരിശോധിച്ചാൽ, അവിടത്തെ മദ്നം ഭൂവായുമണ്ഡലമദ്നത്തിന്റെ ആയിരത്തിലൊരംശം മാത്രമാണെന്നു അനുമാനിക്കാം. അതുഷ്ണംകൊണ്ടും മദ്നക്കുറവുകൊണ്ടും ബഹിർഭാഗത്തെ വാതകം എത്രയോ നേരിയതായിരിക്കും. ഭൂമിക്കടുത്തു കാണുന്ന വായു ശുദ്ധജലത്തിന്റെ 773ൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ടിയുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യഗോളത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ള വാതകത്തിന്നു ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പത്തു കോടിയോളം കോടിയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കട്ടിയുള്ളൂ. അടിയിലേക്കു ചെല്ലുന്തോറും മീതെയുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഭാരംകൊണ്ടു വാതകത്തിന്റെ മദ്നവും കട്ടിയും കൂടി വരുന്നു. ഉഷ്ണവും വലിക്കുന്നു. സൂര്യഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ മദ്നം ഭൂവായുമണ്ഡലമദ്നത്തിന്റെ

1000 കോടി മടങ്ങുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കണക്കാക്കാം. അവിടെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെറും വാതകരൂപമാകയില്ല. പാറപോലെ കട്ടിയായ ദ്രവ്യവുമായിരിക്കയില്ല. താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം അണുക്കളുടെ അംഗങ്ങളെക്കൂടി വേറിട്ട് എല്ലാംകൂടി അടുത്തു ദ്രാവകപ്രായമായ നിലയിലാണ് സൂര്യഗോളത്തിന്റെ അന്തർഭാഗം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ കട്ടി ശുദ്ധജലത്തിന്റെ 85 മടങ്ങ്, എന്നുവെച്ചാൽ രസത്തിന്റെ $6\frac{1}{2}$ മടങ്ങ് ആയിരിക്കണം. കേന്ദ്രത്തിലെ ഉഷ്ണം 500 ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെന്ററിഗ്രേഡാവാൻ മതിയെന്നാണ് സേർ ജെയിംസ് ജീൻസ് 'നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതുതൊട്ടു 200 ലക്ഷം ഡിഗ്രി വരെ കണക്കാക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

ദ്രവ്യത്തിന്നു ഇത്രയധികം കട്ടിയുണ്ടാകുവാൻ തരമുണ്ടോ എന്നു ആധുനികഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളായി പരിചയമില്ലാത്തവർ സംശയിച്ചേക്കാം. സൂര്യന്റെ അത്യുഷ്ണംകൊണ്ടു സംയുക്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ അണുക്കളായി വേർതിരിയുമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അണു ഒരു കടുകിൻമണിപോലെയോ വെടിയുണ്ടപോലെയോ കട്ടിയായ ഒരു സാധനമാണെന്നും പക്ഷെ അതു നന്നെ ചെറുതായിരിക്കുമെന്നുമാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ധാരണ. എന്നാൽ അങ്ങിനെയല്ലെന്നു 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സേർ ഏർണസ്റ്റ് റത്ഥർഫോർഡ് മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. മൂലധാതുക്കളുടെ അണു (Atom)കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിഷമം കുറഞ്ഞ ഘടനയോടുകൂടിയതും ലഘുവായതും അബ്ജകനവാതക (Hydrogen) ത്തിന്റെ അണുവാകുന്നു. ഒരു ഘന ഇഞ്ച് അബ്ജകനത്തിൽ 8×10^{20} അണുക്കൾ ഉണ്ടെന്നു കരുതാം. അത്രക്കു ചെറുതാകുന്നു അണു. ഇതുതന്നെ കേന്ദ്രസ്ഥമായതും പ്രോട്ടോൺ (Proton) എന്നു പറയപ്പെടുന്ന

10²⁰ എന്നുവെച്ചാൽ 20 പത്തുകൾ ഒന്നായിപ്പെരുക്കിയതെന്നതും, അഥവാ 10 ലക്ഷം മടങ്ങ് കോടിവട്ടം.

ഈ ആയ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചുറ്റും അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ അകലെയുള്ള ഒരു കക്ഷയിൽ ഏതാണ്ട് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന വേഗതയിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യോത(Electron)വും കൂടിയതാകുന്നു. പ്രയോതത്തിന്റെ തൂക്കത്തിൽ 1840ലൊരംശം മാത്രമേ വിദ്യോതത്തിന്നു തൂക്കമുള്ളൂ. അതിനാൽ അണുവിന്റെ തൂക്കം എന്നു പറയുന്നതു മിക്കവാറും പ്രയോതത്തിന്റെ തൂക്കം മാത്രമാകുന്നു. സാധാരണ ഉഷ്ണാവസ്ഥയിൽ ഈ അണുവിന്റെ വലിപ്പം എന്നു പറയുന്നതു പുറത്തെ വിദ്യോതകക്ഷയുടെ വ്യാസത്തോളം വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെയാണ്. അബ്ജനകവാതത്തിൽ സാധാരണയായി ഈ അണുക്കൾ തമ്മിലും ധാരാളം ഒഴിഞ്ഞ ദേശമുണ്ടായിരിക്കും. വാതകത്തിന്മേലുള്ള മദ്നം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ദേശം വലുതാകുകയും, മദ്നം വലുതാകുമ്പോൾ ഈ ദേശം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതിനാലാകുന്നു മദ്നംകൊണ്ടു വാതകങ്ങളുടെ ഘനപരിമാണം ചുരുങ്ങുന്നത്. ദ്രാവകങ്ങളിലും ഘനവസ്തുക്കളിലും അണുക്കൾ തമ്മിൽ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിലും മദ്നംകൊണ്ടു ആ ഇടം പറയാൻ മാത്രം ചുരുക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല.

ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നേരിയ അബ്ജനകവാതകത്തിന്റെ അണുവെപ്പറിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഹീലിയം എന്ന വാതകത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ 4 പ്രയോതങ്ങളും 2 വിദ്യോതങ്ങളുംകൂടിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു വളരെ അകലെയായി 2 വിദ്യോതങ്ങൾ അതിശീഘ്രം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പ്രാണവായുവിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ 16 പ്രയോതങ്ങളും 8 വിദ്യോതങ്ങളും ഒന്നായി കൂടിയിരിക്കും. ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റും 8 വിദ്യോതങ്ങൾ പല അകലങ്ങളിലായി പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വാതകങ്ങളുടെ അണുക്കൾ മാത്രമല്ല ഇപ്രകാരം ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്വർണ്ണം,

വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഈയം, രസം മുതലായ ലോഹങ്ങൾ മൂലധാതുക്കളാകുന്നു. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അണു കേന്ദ്രത്തിൽ 197 പ്രയോതങ്ങളും 118 വിദ്യോതങ്ങളും ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പുറം 79 വിദ്യോതങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. മൂലധാതുക്കളുടെ അണുക്കളുടെ തുക്കം കേന്ദ്രത്തിലുള്ള പ്രയോതങ്ങളുടെ എണ്ണത്തേയും, അവയുടെ രസശാസ്ത്രപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യോതങ്ങളുടെ എണ്ണത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രയോതങ്ങൾ അധികമോ കുറവോ ആവാം. അതനുസരിച്ച് അണുക്കളുടെ തുക്കവും അധികമോ കുറവോ ആകുന്നു.

സൂര്യനിൽനിന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചവും ഉഷ്ണവും നമുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയായി അനുഭവപ്പെടാത്ത മറ്റു ശക്തികളും തരംഗരൂപമായിട്ടാണ് സൂര്യനിൽനിന്നു നാലു ഭാഗത്തേക്കും വികിരിണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മൂലധാതുക്കളുടെ അണുക്കളിലുള്ള പ്രയോതവിദ്യോതങ്ങൾതന്നെ ഈവിധം ശക്തികളുടെ കൂട്ടുകൂട്ടാണെന്നുതന്നെക്കരുതാം. ശക്തിയും ദ്രവ്യവുമായ ഭേദം ഒന്നു നേരെപ്പോകുന്ന തരംഗങ്ങളാണെന്നും മറ്റേതു കട്ടക്കീൽപ്പെട്ടതുപോലെ പുറം പുറമായിപ്പോകുന്ന തരംഗങ്ങളാണെന്നും മാത്രമെന്നു ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പുറം കക്ഷകളിലായി അതിശീഘ്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന വിദ്യോതങ്ങൾ ആ സഞ്ചാരംകൊണ്ടും ശക്തികളുടെ ഇരിപ്പടമാകുന്നു. അണുക്കൾക്ക് ക്ഷോഭം തട്ടുമ്പോൾ പ്രയോതങ്ങളുടെ ശക്തി കുറവുപോകുകയും വിട്ടുപുറത്തുള്ള കക്ഷകളിൽനിന്നു അകത്തുള്ള കക്ഷകളിലും, പുറമെനിന്നു ശക്തിയെ സ്വീകരിച്ച് അകത്തുള്ള കക്ഷകളിൽനിന്നു തെറിപുറത്തുള്ള കക്ഷകളിലും വിദ്യോതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിച്ഛേദനംകൊണ്ടും സംയോജനംകൊണ്ടും അഥവാ നാശംകൊണ്ടുതന്നെയും ശക്തി ഉളവായി തരംഗരൂപമായി പുറത്തു പോകുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രകാശ

വും ഉണ്ണവും എങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്നു എന്നതു വളർക്കാലം ശാ
 സ്രജ്ഞന്മാർ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു സാധനമെന്നു കരുതിയിരുന്ന. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ സൂര്യഗോളം കത്തി എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായിപ്പോകുമായിരുന്നു. ഗുരുതപാകഷ്ണസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ സൂര്യൻ സ്വദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുരുതപാകഷ്ണംകൊണ്ടു ചുരുങ്ങിവരികയും അതോടുകൂടി ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു ആലോചിപ്പാൻ തുടങ്ങി. വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ ചൂടു പിടിക്കുന്നതും ചിററിക്കൊണ്ടിടിക്കുമ്പോൾ ചൂടുണ്ടാകുന്നതും അനുഭവമാണല്ലോ. ഒരു ഗോളം ചുരുങ്ങുക എന്നതു നാലുപുറത്തുനിന്നും ദ്രവ്യം കേന്ദ്രത്തിലേക്കു വീഴുക മാത്രമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു കണക്കാക്കാവുന്ന ഉണ്ണും ഇപ്പോഴത്തെ ശക്തിവിതരണത്തിന്നു മതിയാകയില്ലെന്നു വ്യക്തമായി. ഭൂമിയിൽ നക്ഷത്രം വീഴുന്നതുപോലെ സൂര്യഗോളത്തിലും വീഴുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽനിന്നാണ് സൂര്യനു ഇത്രയധികം ഉണ്ണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആലോചിച്ചു. ഇതും സൂക്ഷ്മമായ ഗണിതംവഴി ആലോചിച്ചു വെക്കു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തോന്നിയില്ല. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അണുക്കളുടെ സ്വഭാവം ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായതോടുകൂടിയാണ് നിരന്തരം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശവും ഉണ്ണവും മാത്രം ശക്തികളും എങ്ങിനെ സൂര്യനിലുണ്ടാകുന്നുവെന്നു അറിവായത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സൂര്യൻ തീരെ ചൂടില്ലാത്തതും എന്നാൽ എത്രയോ അധികം വലിയതുമായ ഒരു ഗോളമായിരുന്നിരിക്കണം. ഗുരുതപാകഷ്ണവശാൽ ചുരുങ്ങിവരികയും അങ്ങിനെ ചുരുങ്ങുന്നതോടുകൂടി ചൂടുപിടിച്ചുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചൂടു അധികമാകുമ്പോൾ അണുക്കളുടെ അസ്ഥിമതം വലുതായി അടുക്കിത്തീർത്തു ശീശ്ശം സഞ്ചരിച്ചു അന്യോന്യം തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രയോതവിപ്രോതങ്ങളുടെ സ്ഥാനഭ്രംശംകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിനാശംകൊണ്ടും ഉളവാകുന്ന ശക്തി

യാണു് സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്തിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണമെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഏതെല്ലാം നിലയിലാണു് അണുക്കളിൽ ഈ മാറ്റം വരുന്നതെന്നു തീർച്ച പാഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, അതാണു് സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്തിനും പ്രകാശത്തിനും കാരണമെന്നും എല്ലാവർക്കും ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. ഒരു സെക്കണ്ടിൽ വികിരിണം ചെയ്യുന്ന ശക്തികൾക്കു സൂര്യൻ സ്വശരീരത്തിൽനിന്നു 40 ലക്ഷം ടൺ ദ്രവ്യം ചിലവാക്കുന്നു എന്നാണു് കണക്കാക്കിട്ടുള്ളതു്. ഈ തോതനുസരിച്ചു് ദ്രവ്യം ചിലവാക്കുവാൻ സൂര്യനു് ഇനിയും അനേകം കോടി വർഷങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതാണു്. സൂര്യനു വാൽകൃം വരുന്നതോടുകൂടി ചിലവാക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിനും തന്മൂലമായി സൂര്യനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ശക്തികൾക്കും കുറവു വരുമെന്നും അതിനാൽ സൂര്യന്റെ ആയുഷ്കാലം കുറെ അധികം നീണ്ടുനില്ക്കുമെന്നും സേർ ജയിംസ് ജീൻസ് മുതലായവർ സയുക്തികം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

സൂര്യനിലുള്ള അണുക്കളുടെ പുറമെയുള്ള വിദ്യോതങ്ങൾ കാരോണോരോന്നായി ഉഷ്ണംകൊണ്ടു വിട്ടുപോയിട്ടും അകത്തേക്കു ചെല്ലുന്തോറും പ്രദ്യോതങ്ങളും, മറ്റു അണുക്കേന്ദ്രങ്ങളും, വിദ്യോതങ്ങളും ശക്തിവിതരണംചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വളരെ അടുത്തു വരുന്നതിനാലാണു് സൂര്യന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്നു മുമ്പു് പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം കട്ടി കൂടിട്ടുള്ളതെന്നു നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാം. ഭാരമേറിയ അണുക്കേന്ദ്രങ്ങളും രവീകേന്ദ്രത്തിനടുത്തുണ്ടെന്നു വരാം. എന്നുവെച്ചാൽ, സ്വർണ്ണം രസം, റേഡിയം, ഉറാനിയം എന്നീ ധാതുക്കളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കാൾ കട്ടികൂടിയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. വിരാജികയിൽനിന്നും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്നതു സൂര്യഗോളത്തിന്റെ ബഹിർഭാഗത്തെ മാത്രമാണു്.

സൂര്യനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തോടുകൂടിക്കാണുന്ന ഭാഗത്തിന്നു ദീപ്തിമണ്ഡലം (Photosphere) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ, ദീപ്തി

മണ്ഡലം വെള്ളം വാറിയ കഞ്ഞിപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാഴ്ച ചില ലോഹങ്ങളുടെ ബാഷ്പങ്ങൾ മേഘരൂപമായി ഭീപ്തിമണ്ഡലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നറിയുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി ഭീപ്തിമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ കറുത്ത അടയാളങ്ങളെ കാണാം. ഈ അടയാളങ്ങൾ സൂര്യബിംബത്തിന്റെ കിഴക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട 12 തൊട്ടു 14 ദിവസംകൊണ്ടു പടിഞ്ഞാറു മറഞ്ഞുപോകുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങളിൽ ചില വ അല്പം ദിവസം മാത്രവും ചിലവ കുറെ മാസങ്ങളോളവും നിലനിന്നു കാണുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങളെ നോക്കി സൂര്യൻ തന്റെ അക്ഷത്തിന്റെ ചുറ്റും സമാന് 25 ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വീതമായി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുവെന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭൂമിക്ക് സങ്കല്പിച്ചവിധത്തിൽ ഒരു നിരക്ഷവൃത്തവും അതിന്റെ ദക്ഷിണോത്തരപാശ്ചാത്യങ്ങളും സൂര്യനും കല്പിക്കാം. നിരക്ഷപ്രദേശത്തു കുറെ വേഗത്തിലും അവിടന്നു തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നീങ്ങുതോറും കുറെ മന്ദമായും സൂര്യൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. നിരക്ഷദേശത്തുനിന്നു 30° നീങ്ങിയേടത്തു ഭ്രമണത്തിന്നു 26½ ദിവസം വേണം. സൂര്യന്റെ ബഹിർഭാഗം വളരെ ആഴത്തോളം വാതകമായിരിക്കണമെന്നതിന്നു ഇതൊരു തെളിവാണ്. നിരക്ഷദേശത്തുനിന്നു അല്പം തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നീങ്ങി കുറെ വിസ്താരത്തിലുള്ള രണ്ടു മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് കറുത്ത അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ അടയാളങ്ങളെ രവികല്പമാഷങ്ങൾ (Sun Spots) എന്നു പറയുന്നു.

രവികല്പങ്ങളുടെ ആകൃതി വിവിധമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും കല്പങ്ങൾ ഒന്നായിച്ചേരുകയും ചിലപ്പോൾ ഒന്നു പലതായി വേർതിരിയുകയും ചെയ്യും. കല്പങ്ങളുടെ അകത്തെ ഭാഗം വളരെ ഉരുണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ അതിർ അല്പം വിസ്താരത്തിൽ ഒരുവിധം ശോഭയോടുകൂടിയതും നാലു ഭാഗ

സൂചന:—സൂര്യനെ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മഷിക്കണ്ണാടി ആലോകനകാലത്തിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്നു അപകടം പറ്റും.

ത്തുമുള്ള ദീപ്തിമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ജിഹ്വകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും. കല്പഷ്ടങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഭ്രമണംകൊണ്ടു പൂർവ്വഭാഗത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും പശ്ചിമഭാഗത്തു മറയുമ്പോഴും സൂര്യബിംബത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അല്പം കുഴിഞ്ഞതുപോലെ കാണാം. അതിനാൽ കല്പഷ്ടങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ദീപ്തിമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴികളെപ്പോലെ യിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശം കാഴ്ചക്കു ഇരുണ്ടിരുന്നാലും വിരാജനികൊണ്ടു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശവും ഉഷ്ണവും ധാരാളമുള്ള പ്രദേശമായിക്കാണുന്നു. നാലു ഭാഗത്തുമുള്ള പ്രകാശത്തെക്കാൾ ഇവിടെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞതിനാൽ മാത്രം ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു.

കല്പഷ്ടങ്ങൾ ചില കാലങ്ങളിൽ കുറവും ചില കാലങ്ങളിൽ അധികവുമായിരിക്കും. $11\frac{1}{2}$ സംവത്സരത്തിനിടയിൽ ഈ ഏറ്റക്കുറവുകൾ ഒരു വട്ടം സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നേയും അവ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്നനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ കാന്തശക്തിക്കും മേഘബന്ധവാമുഖങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ധ്രുവദീപ്തിക്കും ഏറ്റക്കുറവുകളുണ്ടെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

സൂര്യന്റെ ഉപരിഭാഗം പല വേഗതകളിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, നദികളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളതുപോലെ ദീപ്തിമണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ചുഴലികളാണ് കല്പഷ്ടങ്ങളെന്നും ഈ ചുഴലികളിൽകൂടി അന്തർഭാഗത്തുള്ള ബാഷ്പങ്ങൾ മേല്പോട്ടു വരുമ്പോൾ അവയുടെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വികാസംകൊണ്ടു തണുക്കുകയാൽ അവിടെ ഉഷ്ണവും പ്രകാശവും കുറയുന്നു എന്നുമാണ് ആധുനികാഭിപ്രായം.

സൂര്യന്റെ പൂർണ്ണഗ്രഹണസമയത്തു ദീപ്തിമണ്ഡലത്തെ ചന്ദ്രൻ തീരെ മറയ്ക്കുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ സൂര്യമണ്ഡലത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരേ വീതിയിൽ ചുവന്നതും അതിമനോഹരവുമായ ഒരാവരണം കാണാം. ഇതിന്നു രാഗമണ്ഡലം (Chromosphere) എന്നു പേര്. രാഗമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു പല

പ്രോമിനൻസ് പ്രകാശപ്രകാശങ്ങൾ (Prominences) അനേകസംഖ്യയിൽ നാഴിക ഉയരുന്നതും നാലു ഭാഗവും പ്രസരിക്കുന്നതും കാണാം. 'വിരാജനികൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയിൽനിന്നു രാഗമണ്ഡലവും അതിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശപ്രകാശങ്ങളും ഉണ്ണുകൊണ്ടു തിളങ്ങുന്ന അബ്ജനകവാതകമാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണഗ്രഹണസമയത്തുതന്നെ വീതി നന്നെ കുറഞ്ഞ രാഗമണ്ഡലത്തിന്റെ ചുറ്റും രവിബിംബവ്യാസത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗം വിസ്താരത്തിൽ മങ്ങിയ ശുഭ്രവണ്ണത്തിൽ ഒരാവരണവും കൂടിക്കാണാം. ഇതിന്നു കിരീടമണ്ഡലം (Corona) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ നാലു കോണുകളിൽ കുറെ അധികം വിസ്താരമുള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ ആകൃതി ഏതാണ്ട് ഒരു സമചതുരമാകുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലത്തിനടുത്തുകൂടി ചില ധൂമകേതുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതു നിരീക്ഷണം ചെയ്യുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അവ കിരീടമണ്ഡലത്തിൽക്കൂടിക്കടന്നിട്ടും അവക്ക് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള മാറ്റം വരാതെ കണ്ടതിനാൽ കിരീടമണ്ഡലത്തിലെ വസ്തുവളരെ നേരിയ ധൂളിപടലമായിരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വിധം ധൂളിപടലം സൂര്യമണ്ഡലത്തിന്റെ ചുറ്റും കുറെ അധികം ദൂരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു കരുതുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമനത്തിനുശേഷം രാശിച്ചക്രം വഴിയായി ആയതപ്പത്താലാകൃതിയിൽ കാണുന്ന പ്രകാശം ഈ ധൂളികളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായിക്കരുതുന്നു. ഇതിന്നു രാശിമണ്ഡലപ്രകാശം (Zodiacal Light) എന്നു പറയുന്നു. ചിലർ ചന്ദ്രനില്ലാത്ത നിമ്ബരാത്രികളിൽ ഈ പ്രകാശം രാശിച്ചക്രം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതായിക്കാണുന്നു. അതു ശരിയാണെങ്കിൽ കിരീടമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം ഭൂക്ഷ്വരെയെങ്കിലും വ്യാപിച്ചതായിക്കരുതണം.

II. ചന്ദ്രൻ

ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെങ്കിലും ന

മൂടെ ശ്രദ്ധയെ ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാകുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രകാശം നമ്മെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നു. അനേകശതാബ്ദം ചന്ദ്രന്റെ ശീതളരശ്മിയിൽ ആനന്ദിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടേയും മേൽ ചന്ദ്രൻ തന്റെ വശ്യവൃത്തി പ്രയോഗിച്ച് അവയുടെ ജീവിതത്തേയും മനസ്സിനേയും പല വിധത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയതായിക്കാണാം. ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയത്തിൽനിന്നു ചന്ദ്രനു സ്വയമേവ പ്രകാശമില്ലെന്നും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചന്ദ്രനിൽനിന്നുള്ള പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് ചന്ദ്രികയായി നാം കാണുന്നതെന്നും അനുമാനിക്കാം.

ചന്ദ്രനിൽ നാം ചില അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നു. ആ അടയാളങ്ങൾക്ക് ആകെക്കൂടി ഒരു മുയലിന്റെ ആകൃതിയുള്ളതിനാൽ ചന്ദ്രനെ നാം ശശാങ്കനെന്ന് പറയുന്നു. ചന്ദ്രൻ എന്നു വാക്കിന്നു ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥവുമാണ്. കറെകാലം ജനങ്ങൾ ഈ അടയാളങ്ങളെ സമുദ്രങ്ങളെന്നു വിചാരിച്ചു പോന്നു. ഓദഗ്നിനികൊണ്ടു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രപുഷ്പം മുഴുവൻ ചൈതന്യമറ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെക്കൊണ്ടും അവയിൽനിന്നു മുമ്പു പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉരുകിയ പാറകളെക്കൊണ്ടും പലവിധ ഭ്രൂണങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ആ പാറകളുടേയും ഭ്രൂണങ്ങളുടേയും നിറഭേദംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ നാം കാണുന്ന അടയാളങ്ങൾ.

ചന്ദ്രൻ 27 $\frac{1}{3}$ ദിവസംകൊണ്ടു ഭൂമിക്കു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഒരു മുഖംതന്നെ ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനാൽ, ഈ 27 $\frac{1}{3}$ ദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ തന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചുറ്റും ഒരു വട്ടം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഭ്രമണഗതിക്ക് ഭേദമില്ലാത്തതിനാലും പരിവർത്തനഗതിക്ക് ഭേദമുള്ളതിനാലും ചന്ദ്രന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തും കിഴക്കുവശത്തും സാധാരണ കാണുന്ന ഭാഗം വിട്ടു അല്പവൃംകൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന്നു

ചന്ദ്രദോളനം (Libration of the Moon) എന്നു പേര്. ചന്ദ്രൻ നമ്മിൽനിന്നു ശരാശരി 2,39,000 മൈൽ അകലെയാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നും ചന്ദ്രന്റെ ശരാശരി ബിംബവ്യാസത്തിൽനിന്നും ചന്ദ്രഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം 2160 മൈലാണെന്നു കണക്കാക്കാം. ചന്ദ്രഗോളത്തോളം പോന്ന ഒരു ജലഗോളത്തിന്റെ $3\frac{1}{2}$ മടങ്ങ് മാത്രമാകുന്നു ചന്ദ്രന്റെ തൂക്കം. ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം ഭൂപുഷ്പത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആവിൽ കരംശം മാത്രം ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം ചന്ദ്രപുഷ്പത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കമ്പിത്തുലാസ്സിൽ ഇവിടെ 6 റാത്തൽ തൂങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം ചന്ദ്രനിൽ 1 റാത്തൽ മാത്രമേ തൂങ്ങുകയുള്ളൂ. ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിന്റെ പുറം ഒരു വായുമണ്ഡലമുണ്ടായാലും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ മാത്രം ചന്ദ്രാകർഷണത്തിനു ശക്തിയില്ല. നിരീക്ഷണം കൊണ്ടു ചന്ദ്രപുഷ്പത്തിൽ വായുമണ്ഡലമില്ലെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകാശമാഗ്നമായ സഞ്ചാരത്തിൽ പലപ്പോഴും ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു വേഗതയിൽ ചന്ദ്രനോടുത്തുവന്നു പെട്ടെന്നു മറയുകയും, മറയുകഴിഞ്ഞു, അതേ വേഗതയിൽ പെട്ടെന്നു പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ പുറം വായുമണ്ഡലമുണ്ടെങ്കിൽ, വായുവിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രശ്മികളുടെ വക്രതകൊണ്ടു, മറയുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വേഗത മന്ദീഭവിക്കുകയും പുറത്തു വരുമ്പോൾ ശീഘ്രഭവിക്കുകയും വേണം. ചന്ദ്രബിംബത്തിൽ വെള്ളമോ ഹിമമോ ഉണ്ടായിരിപ്പാനും തരമില്ല. വായുമർദ്ദമേല്ക്കാത്ത വെള്ളവും ഹിമവും അല്പനേരംകൊണ്ടു ആവിയായിത്തീരുകയും അതു ചന്ദ്രനെ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും.

നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭ്രമണത്തിന്നു $27\frac{1}{3}$ ദിവസമാണെങ്കിലും സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് $29\frac{1}{2}$ ദിവസം വേണം. അതിനാൽ ചന്ദ്രപുഷ്പത്തിൽ കാരോ പ്രദേശത്തും $14\frac{1}{2}$ ദിവസത്തോളം പോന്ന പകൽ കഴിഞ്ഞു അത്ര

പോന്ന ഒരു രാത്രിയുണ്ടാകുന്നു. പകൽസമയത്തു കടുത്ത ചൂടും രാത്രിസമയത്തു അതിനെക്കാൾ അസഹ്യമായ തണുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും.


III. ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും

ഭൂമിയുടേയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടേയും സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള അകലം, ഗോളവ്യാസം, തൂക്കം, സാന്ദ്രത, പര്യയകാലം, സെക്കണ്ടിൽ കക്ഷികളിൽ നഞ്ചരിക്കുന്ന നാഴിക ഇവയെല്ലാം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗ്രഹം	സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള മദ്ധ്യമൂലം		ഗോളവ്യാസം (മദ്ധ്യം)		തൂക്കം 10 ²¹ ടൺ	സാന്ദ്രത		പര്യയകാലം (ഭിവസം)	സെക്കണ്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂലം
	ലക്ഷം നാഴിക	ഭൂമിയുടെ 1	നാഴിക	ഭൂമി 1		ജലം 1	ഭൂമി 1		
ബുധൻ	360	0.387	3,009	0.381	0.322	6.85	1.23	87.97	29.55
ശുക്രൻ	672	0.723	7,575	0.957	4.739	4.85	0.87	224.70	21.61
ഭൂമി	929	1.000	7,913	1.000	5.870	5.58	1.00	365.26	18.38
ചൊവ്വ	1416	1.524	4,216	0.533	0.625	4.01	0.72	686.98	14.99
വ്യാഴം	4833	5.203	85,743	10.84	1846.1	1.38	0.25	4332.6	8.06
ശനി	8862	9.539	71,115	8.99	522.2	0.72	0.13	10,759	5.95
ഇന്ദ്രൻ	17828	19.19	30,878	3.90	84.5	1.22	0.22	30,687	4.20
വരൂണൻ	27935	30.07	32,932	4.16	98.1	1.11	0.20	60,127	3.36
പ്ലൂട്ടോ	37160	40.	—	—	—	—	—	സൂര്യൻ 250 കൊല്ലം.	2.96

വട്ടികയിൽനിന്നു പല സംഗതികളും ഗ്രഹിക്കാം. എങ്കിലും ആദ്യമായി സൂര്യനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന 9 പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടേയും താരതമ്യവലിപ്പവും അവയുടെ സ്ഥിതിയും മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിയുന്നതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഇതിനായി 15 മൈൽ വ്യാസമുള്ളതും സമനിരപ്പായതും പല്ലുപോലും ഇല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞതും ആയ വൃത്താകാരമായ ഒരു മൈതാനത്തെ സങ്കല്പിക്കുക. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ 12ടി 1ഇ വ്യാസമുള്ള, എന്നുവെച്ചാൽ ഭീഷ്മകായനായ ഒരു പുരുഷന്റെ ഇരട്ടി

ഉയരമുള്ള ഒരു തേജോഗോളത്തെ സങ്കല്പിക്കുക. ഇതിനെ സൂര്യനെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽനിന്നു 326 വാർ അകലെയായി സമുത്തത്തിൽനിന്നു വലിയ ഭേദമില്ലാത്ത കരായതവൃത്തത്തിൽ അതിമന്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നതും 1 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ളതും ആയ ഒരു പുനക്കായയെ ഭൂമിയെന്നു കരുതാം. ഇതു കേന്ദ്രമായി 5 ടി വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കടലക്കുഴ തുല്യമായിരിക്കും ചന്ദ്രൻ. തേജോഗോളത്തിന്റേയും പുനക്കായയുടേയും ഇടയിൽ 126 വാറയും 236 വാറയും അകലെ തേജോഗോളത്തിന്റെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഉണങ്ങിയ നെല്ലിക്കുരുവും ഒരു പച്ചനെല്ലിക്കുരുവും ബുധശുക്രന്മാരെന്നു സങ്കല്പിക്കാം. പുനക്കായയുടെ വഴിയിൽനിന്നു 170 വാറയോളം വിട്ടു സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പുനക്കുരു ചൊവ്വയുമായിരിക്കും. ഈ നാലു ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ചന്ദ്രന്റേയും വലിപ്പം താരതമ്യത്തിന്നു വേണ്ടി താഴെ പരിലേഖത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇവക്കും പ




ബുധൻ. ശുക്രൻ. ചന്ദ്രൻ. ഭൂമിയും ചൊവ്വ.

പരിലേഖം 47

റമെ, മദ്ധ്യത്തിലെ വലിയ തേജോഗോളത്തിൽനിന്നു $7\frac{1}{2}$ ഫർലോങ്ങ് $1\frac{1}{2}$ മൈൽ, $2\frac{1}{2}$ മൈൽ, $3\frac{1}{2}$ മൈൽ ഈ അകലങ്ങളിലായി വലിയ ഉരുണ്ട ഒരു മത്തങ്ങയും, ഒരു കുമ്പട്ടിക്കുരുവും, രണ്ടു ഇടത്തരം വടോപ്പുള്ളി നാരങ്ങകളും ഇടത്തോട്ടു ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ സൗരവൃഹത്തിലെ പ്രധാന ഗോളങ്ങളുടേയും അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടേയും ഒരു ചിത്രമായി. അവസാനം പറഞ്ഞ 4 ഗോളങ്ങളും വ്യാഴം, ശനി, ഇന്ദ്രൻ, വരണൻ എന്നീ വലിയ ഗ്രഹഗോളങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ചാണെന്നു പറയേണ്ടതി

ഒരു വ്യാഴത്തിന്റെ വ്യാസം ഭൂവ്യാസത്തിന്റെ സമാൻ 11 മടങ്ങാകുന്നു. അതിനാൽ ഭൂമിയെക്കാണിച്ച തോതിൽനിന്നു തോതു അഞ്ചിലൊന്നായിച്ചുരുക്കി ഈ 4 ഗ്രഹങ്ങളേയും താഴെ പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയുടെ മദ്ധ്യങ്ങളിലെല്ലാം അതേ തോതിൽ ഭൂമിയേയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൈതാ



പരിലേഖം 48

നത്തിൽ വരണപഥത്തിന്റേയും പറമെ 2 നാഴിക വീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഇനിയും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറത്തെ പരിധിയിൽ ഒരു നെല്ലിക്കയംകൂടി 250 കൊല്ലംകൊണ്ടു തേജോഗോളത്തെ ചുറ്റുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ സൗരവ്യൂഹത്തിന്റെ മാതൃക ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി.

മാതൃക പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ ചൊവ്വഴ പകരം നില്ക്കുന്ന പുനഃരവിന്ദനവും വ്യാഴത്തിനു പകരം നില്ക്കുന്ന ഉരണമത്തങ്ങയുടേയും ഇടയിൽ നെടിയതും നേരിയതുമായ ആയിരത്തിൽപരം പൂഴിത്തരികൾ തേജോഗോളത്തിനു ചുറ്റും, മൂന്നോ നാലോ കടലുകളും ഇരുപതോളം കടുകിൽമണികളും മത്തങ്ങ, കുമ്പളിക്ക, പുനഃര, നാരങ്ങകൾ ഇവയുടെ ചുറ്റും, അനവധി നേരിയ പൂഴിത്തരികൾ കുറായും കൂട്ടമായും അത്രായതവൃത്തങ്ങളിൽ തേജോഗോളത്തിനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കണം.

175ൽപരം ചതുരശ്ര നാഴിക വിസ്തീർണ്ണമുള്ള നമ്മുടെ മൈതാനത്തിലെ കായ്മമായ നിവാസി രണ്ടാൾ ഉയരമുള്ള തേജോഗോളം മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയതു ഒരു മത്തങ്ങ മാത്രമാകുന്നു. ഈ മൈതാനത്തിലെ ശുന്യത നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ഈ മൈതാനം വിട്ടാൽ നാലു പുറവും ആയിരക്കണക്കിൽ നാഴികകൾക്കുള്ളിൽ ശുന്യതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ അത്യന്തമായ ശുന്യതക്കിടയിൽ സ്ഥാപിതമായ സൗരവ്യഹത്തിന്റേയും അതിലെ നിവാസികളായ നമ്മുടേയും പ്രപഞ്ചമദ്ധ്യത്തിലുള്ള സ്ഥാനം എന്തോ!

ഓരോ ഗ്രഹത്തെപ്പറ്റിയും അല്പം ചില സംഗതികൾക്കുടി പറയുവാനുണ്ട്. 1772ൽ ബോഡ്സ് എന്നൊരാൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള അകലങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചു. 0, 3, 6, 12 മുതലായ സംഖ്യകളെ എഴുതി അവയോടു 4 കൂട്ടിയാൽ

4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388, 772.

എന്നീ സംഖ്യകൾ കിട്ടും. ഈ സംഖ്യകൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള അകലങ്ങൾക്ക് അനുപാതകമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത്. അന്നു ശനിവരെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളേ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ചൊവ്വയുടേയും വ്യാഴത്തിന്റേയും

യും ഇടയിലുള്ള ചെറുഗ്രഹങ്ങളേയും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവക്കും, ശനി മുതലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉള്ള സംഖ്യകളെ വിട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉഴഹം ഏതാണ്ട് ശരിയായിരുന്നു. അകലങ്ങൾക്ക് അനുപാതമായ സംഖ്യകളെ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

3.9, 7.2, 10, 15.2, 26.5, 52.0, 95.4, 191.9, 300.7, 400
 ബു ശു ഭു ചൊ ചെ.ഗ വ്യാ ശ ഇ വ പ്ലു

ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയതും സൂര്യനു ഏറ്റവും അടുത്തതും ബുധനാകുന്നു. സൂര്യനു ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കരേ മുഖംമാത്രം സൂര്യനു നേർക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു അനുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രഹം ഉറച്ചു കട്ടിയാവുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന്മേലുണ്ടായിരുന്ന വേലികയറ്റം ഭ്രമണത്തിന്നു തടസ്സമായിത്തീരുകയും, ആ തടസ്സംമൂലം ക്രമേണ ഭ്രമണം മന്ദീഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ പരിവർത്തനകാലത്തിൽ ഒരു ഭ്രമണം എന്നായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ സഭാ സൂര്യനെ കരേ മുഖംതന്നെ ഗ്രഹം കാണിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നില വരുവാനും കാരണം വേലികയറ്റംതന്നെ.

പിന്നത്തെ ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ 23ൽ ചിലപാനം മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കൽ സ്വന്തം അക്ഷത്തിനു ചുറ്റും തിരിയുന്നുവെന്നു ചില നിരീക്ഷകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കുറെ മുമ്പു സ്കെപ്പാർലി എന്ന നിരീക്ഷകനും അടുത്ത കാലത്തു പെർസിവൽ ലോവലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതു ബുധനെപ്പോലെത്തന്നെ ശുക്രനും പരിവർത്തനത്തോടുകൂടി കരേ മുഖംതന്നെ സൂര്യനെക്കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. ശുക്രന്റെ വൃശ്ചികയങ്ങൾ ഭൂദർശിനിയിൽ കൂടിക്കാണുവാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാകുന്നു. വക്രമൗഢ്യത്തിന്നു മുമ്പു പടിഞ്ഞാറും, അതിന്നുശേഷം കിഴക്കും ബാലചന്ദ്രാകാരത്തിൽ അതിനെ വലുതായിക്കാണാം. അപ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഗ്രഹം

നമോടു ഏറവും അടുത്തിരിക്കുക. ക്രമമെടുത്തതിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഏതാണ്ട് പൂണ്ണ ചന്ദ്രാകൃതിയിൽ കാണാമെങ്കിലും, അധികരിച്ച അകലംകൊണ്ടു ഗ്രഹം ചെറുതായിരിക്കും. ശുക്രന്റെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല. ശുക്രൻ എന്ന വാക്കിന്നു വെളുത്തതു എന്നാണർത്ഥം. ഇത്ര വെളുത്തിരിപ്പാൻ കാരണം അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള കട്ടിയായ മേഘപടലങ്ങളിൽനിന്നു സൂര്യപ്രകാശം നല്ലവണ്ണം പ്രതിബിംബിക്കുന്നതിനാലാണെന്നു നിരീക്ഷകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ബുധനേരവും ശുക്രനേരവും ഒരല്പംതന്നെ എന്നും സൂര്യാഭിമുഖമാകയാൽ അവിടെ കഠിനമായ ചൂടും മറ്റൊ അല്പത്തിൽ അത്യധികം തണുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബുധന്റെ സൂര്യാഭിമുഖമായ ഭാഗത്തു സഭാ 350 ഡിഗ്രി സെൻറിഗ്രേഡ് ഉഷ്ണമുണ്ടാകുമെന്നു നിരീക്ഷണവിദഗ്ധർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ശുക്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്നടുത്ത ഗ്രഹം ഭൂമിയാണല്ലോ. ഭൂമിയുടെ പുറഭാഗത്തെ സ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. കാലാവസ്ഥകളിൽ കാണുന്ന ഭേദത്തിന്നു കാരണം ഭ്രമണാക്ഷം പരിവർത്തനതലത്തിലേക്കു 23½ ഭാഗം ചരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടം വീതം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പകൽ സമീകൃതമാൻ വയ്ക്കാത്ത ചൂടും രാത്രി അതുപോലെ അസഹ്യമായ തണുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതികൊണ്ടും, ആദ്യകാലം മുതലേ ഇവിടെ വേണ്ടത്ര വെള്ളവും, പ്രാണവായുവും, അംഗാരാമൃതവും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും ആകുന്നു ഭൂപുഷ്പം ജീവജാലങ്ങൾക്കു വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത്.

അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ വമിക്കുന്ന ഉരുക്കിയ പാറ കണ്ടാൽ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം ഇപ്പഴം വളരെ ചൂടുള്ളതും ദ്രാവകാവസ്ഥ

യിൽ ഇരിക്കുന്നതുമാണെന്നു തോന്നും. ചൂടുള്ളതുതന്നെ. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ചലനവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നു അന്തർഭാഗം കട്ടിയാണെന്നുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ ചൂടുണ്ടായിട്ടും മേൽ ഭാഗത്തുള്ള പാറകളുടെ മദ്ദനംകൊണ്ടാകുന്നു പാറകൾ ഉരുകാതിരിക്കുന്നത്. ജലാശയങ്ങളിൽനിന്നു വെള്ളം താണുചെന്നു ആവിയാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കവിഞ്ഞ മദ്ദനംകൊണ്ടു മേലെയുള്ള പാറകൾ പൊട്ടുകയും ദ്വാരങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവി പുറത്തുപോകുന്നതോടുകൂടി താഴെയുള്ള മദ്ദനം മുന്പത്തെക്കാൾ കുറവായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ പാറ ഉരുകി ദ്വാരങ്ങളിൽകൂടി പുറത്തു വരുന്നു. ഇങ്ങിനെയാകുന്നു അഗ്നിപവ്വതങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി. ഭൂമിയുടെ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥിതി ആർക്കും നല്ലവണ്ണം അറികയില്ല. ലോഹമയമായിരിപ്പാനാണ് വഴി. ഭൂമിക്കുള്ള കാനതശക്തിക്കു അതായിരിക്കണം കാരണം.

ചൊവ്വ ഭൂമിയെക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ ഗ്രഹമാണെങ്കിലും, ഗ്രഹകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു 5800ഉം 14,500ഉം മൈലുകൾ അകലെയായി 7 മ 39 മി 14 സെക്കണ്ടിലും 30 മ 17 മി, 54 സെക്കണ്ടിലും അതിനെ ചുറ്റുന്ന രണ്ടു കൊച്ചു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്നുണ്ട്. ഗ്രഹം 24 മ 38 മി 22.7 സെക്കണ്ടിൽ ഒരു വട്ടം വീതമായി പരിവർത്തനമെത്തിലേക്കു 27° ചരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന അക്ഷത്തിന്നു ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൊവ്വയിലെ സുഖത്സരം നമ്മുടെ 687 ദിവസത്തോളമുണ്ടായിരിക്കും. അവിടത്തെ ആകാശം നിമ്ബലമായിരിക്കയാൽ ഗ്രഹപുഷ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമായിക്കാണാം. ഗ്രഹത്തിന്റെ ചുവന്ന നിറത്തിന്നു കാരണമിതാകുന്നു.

ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണകാലം സൂര്യൻ 24½ മണിക്കൂറും ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ പരിവർത്തനകാലം സൂര്യൻ 7½ മണിക്കൂറും ആകയാൽ ആ ഉപഗ്രഹം ചൊവ്വയുടെ ദിക്ഷചക്രത്തിൽ പടിഞ്ഞാറുദിച്ച് കിഴക്കുസ്ഥിതിക്കുന്നു. ഉദിച്ചുസ്ഥിതിക്കുന്നതിന്നു ഏതാണ്ട് 5½ മണിക്കൂർ മതി. അതിനാൽ ചൊവ്വയിൽ ഈ

ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ 2 ഉഭയമോ, 2 അസ്തമനമോ ഒരേ രാത്രിയിൽതന്നെ പലപ്പോഴും കാണാം. ഇതിന്നിടയിൽ തന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചൊവ്വയിൽ കവികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വണ്ണന ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കും. മറ്റൊരു ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഗ്രഹഭ്രമണകാലത്തെക്കാൾ കഷ്ടി 5½ മണിക്കൂർ മാത്രം അധികമാകയാൽ, അതു കിഴക്കുതന്നെ ഉദിച്ചു പടിഞ്ഞാറുതന്നെ അസ്തമിക്കും. ഗതി അതിമന്ദമായിരിക്കും. ഉദിച്ചസ്തമിക്കുവാൻ 66 മണിക്കൂറോളം വേണം. അതിനിടയിൽ 2½ ദിവസത്തിലധികം കഴിയും. ഇതിന്റേയും വൃദ്ധിക്ഷയം വിചിത്രമായിരിക്കും.

ചൊവ്വ സൂര്യനിൽനിന്നു ഭൂമിയെക്കാൾ 1½ മടങ്ങോളം മാത്രം അകലെയാകയാൽ, പൊതുവിൽ അവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെക്കാൾ തണുപ്പു കൂടിയതായിരിക്കും. ചൊവ്വയുടെ ദിനദൈർഘ്യത്തിനും ഭ്രമണാക്ഷത്തിന്റെ ചരിവിനും ഭൂമിയുടേവയോടു അടുപ്പമുണ്ടാകയാൽ, അവിടത്തെ ഋതുക്കൾക്ക് ഭൂമിയിലെ ഋതുക്കളോടു വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. നിരീക്ഷകന്മാർ ചൊവ്വയുടെ നിരക്ഷപുത്തപാർശ്വങ്ങളിൽ ഉഷ്ണകാലത്തു കുറയുന്നതും ശീതകാലത്തു വർദ്ധിക്കുന്നതുമായ വെളുത്ത അടയാളങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതു വെള്ളം തണവുകൊണ്ടു ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന ഹിമസമുച്ചയങ്ങളാകുവാനാണ് വഴി.

ഉത്തരഭാഗത്തെ ഹിമസമുച്ചയം ഉരുക്കുന്ന കാലത്തു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തു വലക്കണ്ണികളെപ്പോലെ സംഘടിപ്പിച്ചതായ ചില രേഖകൾ ഇരുട്ടയായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നു ചില നിരീക്ഷകന്മാർ കരുതി, അവിടത്തെ ബുദ്ധിമാന്ദരമായ നിവാസികൾ ജലസേചനത്തിന്നുണ്ടാക്കിയ ചാലുകളാണ് ഇവ എന്നും, ആ ചാലുകളുടെ വക്കത്തുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾ തഴക്കുമ്പോഴാണ് ചാലു ഇരുട്ടിച്ചതായിത്തോന്നുന്നതെന്നും വാദിച്ചു. പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തെ സൂക്ഷ്മതരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടു ചാലുകൾ ഇരുട്ടിക്കുന്നതു ഒരു തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നതായിരുന്നു.

നെന്നും, ചൊവ്വയിലെ ജലസേചനപദ്ധതി വാങ്ങി അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചസമയത്തുകൂടി നിരക്ഷരേഖയിൽ ഉണ്ണി 10 ഡിഗ്രി സെൻറി ഗ്രേഡായിരിക്കുകയും എന്നും, അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ അതുവെള്ളം ഉറയ്ക്കുവാൻ പററിയ വിധത്തിൽ താണുപോകുമെന്നും, രാത്രി നമ്മെപ്പോലെയുള്ളവക്ക് ഒരു വിധത്തിലും സഹിക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ശൈത്യമുണ്ടാകുമെന്നും നിരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവികൾ ചൊവ്വയിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു അഭിജ്ഞന്മാർ നിസ്സംശയം സമ്മതിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. കലഹംകൊണ്ടു ചൊവ്വയെ പാപപക്ഷിലമാക്കുവാൻ നമ്മെപ്പോലെയുള്ളവർ ചൊവ്വയിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതിന്നു തെളിവുകളുണ്ടെന്നു കരുതുകയും ചെയ്യാം. ജീവിതവൈചിത്ര്യത്തിന്നു അതിരുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഈ കാഴ്ചത്തിൽ കണ്ടുവന്ന നമുക്ക് തീർച്ചയായിപ്പറഞ്ഞുകൂടാ.

ചൊവ്വയുടേയും വ്യാഴത്തിന്റേയും ഇടയിലുള്ള ചെറുഗ്രഹങ്ങളിൽ പലതിന്റേയും സഞ്ചാരമാർഗ്ഗങ്ങളും പര്യവേക്ഷണങ്ങളും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലതെല്ലാം അധികം ആയതമായ വൃത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, നമുക്കടുത്തു വരാറുണ്ട്. അവയുടെ അകലം അളന്നും സൗരവ്യവസ്ഥത്തിന്റെ തോതു നിശ്ചയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറസ്, പാലാസ്, ജൂനോ, വെസ്റ്റ എന്നീ നാലെണ്ണങ്ങളുടെ വ്യാസങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ 485 മൈ, 304 മൈ, 118 മൈ, 243 മൈ ലക്ഷമാണെന്നു നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 മൈലിലധികം വ്യാസമില്ലാത്തവയും ഈ ചെറുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വലിയ പിണ്ഡങ്ങളുടെ അടുത്തുവരുന്ന ഗോളങ്ങൾ പിണ്ഡത്തിന്റെ ആകർഷണാനന്തരംകൊണ്ടു പൊട്ടിത്തകരുമെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വയുടേയും വ്യാഴത്തിന്റേയും ഇടയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാമാന്യം വലിയ ഒരു ഗ്രഹം അത്യായതവൃത്ത

ത്തിൽ സഞ്ചരിക്കയാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ അരികത്ത് അതിരുകൾ വീഞ്ഞ് വരികയും, അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹം പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോകയും ചെയ്തതിൽനിന്നുണ്ടാകുകയാണ് ഈ ചെറുഗ്രഹങ്ങളെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നത്.

ഗ്രഹങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയതാകുന്നു വ്യാഴം. അതിന്റെ ഭൂമനകാലം 9 മ 55 മി 20 സെ ആകുന്നു. അതിനെ ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടിക്കാണുന്നതുതന്നെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാകുന്നു. അതു തൊറൊന്നെ ഉരുണ്ടതായിട്ടല്ല നാം കാണുന്നത്. ഒരു വശം എതിരായ വശത്തെക്കാൾ അല്പം വിസ്താരം കൂടിയിരിക്കും. വിസ്താരം കൂടിയ വശത്താകുന്നു അതിന്റെ നിരക്കുരേഖ. നിരക്കുരേഖയ്ക്കു സമാന്തരമായി രണ്ടു ഭാഗത്തും നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നവയും മങ്ങിയ ചുവപ്പോടുകൂടിയതും ആയ പടലങ്ങളും അവയിൽ ചില ഇരുണ്ട അടയാളങ്ങളും കാണാം. നാം കാണുന്നതു ഉറച്ച ഗ്രഹപുഷ്പമല്ലെന്നും അതിന്റെ മീതെയുള്ള മേഘപടലങ്ങളെയാണെന്നും ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാർ പറയുന്നു. മേഘപടലങ്ങൾതന്നെ വളരെ തണുത്ത അംഗാരാമൃതവാതകം ഉറച്ച ദ്രാവകബാഷ്പങ്ങളാവാം. ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ആദ്യമായി ആകർഷിക്കുന്നതു അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി കാണുന്ന നാലു ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ്. അല്പനേരം ഗ്രഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹത്തോടു അല്പം അടുക്കുന്നതും അതിൽനിന്നു അകലുന്നതും കാണാം. ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന്റെ ചുറ്റും 9 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി അറിയും. അവയുടെ ഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള ദൂരവും പര്യവേക്ഷണങ്ങളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഉപ ഗ്രഹം	ഗ്രഹത്തിൽനിന്നു ഇള ദൂരം (മൈൽ)	പശ്ചാത്തലം ഭി. മ മി. സെ	ഉപ ഗ്രഹം	ഗ്രഹത്തിൽനിന്നു ഇള ദൂരം (മൈൽ)	പശ്ചാത്തലം
I	2,61,000	1 18 27 34			സൂര്യൻ
II	4,15,000	3 13 13 42	VI	—	251 ഭിവസം
III	6,64,000	7 3 42 33	VII	—	265 „
IV	11,67,000	16 16 32 11	VIII	—	26 മാസം
V	1,12,000	0 11 57 22	IX	—	3 കൊല്ലം

From Ball's Story of the Heavens.

ഇതിൽ IX-ാമത്തേതിന്നും VIII-ാമത്തേതിന്നും ഗതി വക്രമാകുന്നു. ഇതു അസാധാരണമാകുന്നു. ഉപഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടുപോയ അംശങ്ങളാണെന്നാണ് അഭിജ്ഞത. നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്തു ഭൂമിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നും ചന്ദ്രൻ വേർപെട്ടുപോയ സ്ഥാനത്താണ് ശാന്തസമുദ്രമെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയൊരാൾ വഴിയുണ്ടെന്നു ഈ ഭാഗം 9-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നു കാണാം. വ്യാഴത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 7 ഉപഗ്രഹങ്ങളും വ്യാഴത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഉത്ഭവിച്ചവയായിരിക്കണം. അവ ഗ്രഹഭ്രമണത്തിന്റെ വഴിക്കുതന്നെ ഗ്രഹത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവസാനത്തെ രണ്ടും അങ്ങിനെയല്ല. ഗ്രഹഭ്രമണത്തിന്നെതിരായ വഴിക്കാകുന്നു അവ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടു ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹത്തിന്റെ ആകർഷണംകൊണ്ടു പുറമെയുള്ള പിണ്ഡങ്ങളെ ബലരാക്കി തന്റെ പുറം പരിവർത്തനം ചെയ്തിപ്പിച്ചതായിരിക്കണം. ഇതു എങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പറയും. (ഈ ഭാഗം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ആയത്വത്തവിവരണവും നോക്കുക) ശനിയുടെ 9-ാമത്തെ ഉപഗ്രഹവും വരണന്റെ ഏകമായ ഉപഗ്രഹവും ഇങ്ങിനെ ഉത്ഭവിച്ചവയാവാൻ വഴിയുണ്ട്. പ്ലൂട്ടോ എന്ന പുതിയ ഗ്രഹം വരണന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നും പുറമെനിന്നുള്ള ആകർഷണംകൊണ്ടു വരണനെ വിട്ടു ഗ്രഹമായി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെ

നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിന്നു മതിയായ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്ഷണം വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻതന്നെ പ്രയാസം കാണുന്നു.

സൗരവ്യ ഹത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹമാകുന്നു ശനി. അതിന്റെ ഭ്രമണകാലം 10 മ 14 മി ആകുന്നു. ഭൂദർശിനിയിൽകൂടി നോക്കിയാൽ ഒന്നാമതായിക്കാണുന്നതു അതിന്റെ പുറമുള്ള ഒരു ശുഭ്രവലയമാകുന്നു. ചെറിയ ഭൂദർശിനിയിൽകൂടി ഇതു കറവലയമെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും വലിയവയിൽകൂടി ഇതു മൂന്നെണ്ണമായിക്കാണാം. ഉപഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ ഈ മൂന്നു വലയങ്ങളും ഗ്രഹത്തിന്നു ചുറ്റും വെച്ചേറെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വലയങ്ങളെ ഗ്രഹം നില്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയനുസരിച്ച് വീതിയുള്ള ഒരു വരയായും, വീതി കുറഞ്ഞും കൂടിയുമുള്ള ആയതവൃത്തങ്ങളായും കാണാം. വലയങ്ങളെ അല്പം വീതിയുള്ള ആയതവൃത്തമായിക്കാണുമ്പോൾ, ഗ്രഹത്തെ അതിന്നുള്ളിൽ വെച്ച ഒരു പന്തുപോലെ ഭംഗിയിൽ കാണാം. ഈ വലയങ്ങൾ കൂടാതെ ശനിക്ക് പത്തു ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റേയും കക്ഷകൾക്കുള്ളിലാകുന്നു വലയങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. ഈ വലയങ്ങൾ മൂന്നും ശനിയുടെ മൂന്നു ഉപഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു എന്നും റോഷെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അപായസീമയുടെ ഉള്ളിൽ കടക്കയാൽ പൊട്ടിത്തകൻപോയി ആ ക്ഷണങ്ങൾ ശനിയുടെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെയാണ് നാം ഇന്നു വലയങ്ങളായിക്കാണുന്നതെന്നും വിചാരിപ്പാൻ വ്യായമുണ്ട്. ശനിയുടെ പത്തു ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളും, ഗ്രഹകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ദൂരങ്ങളും, പശ്ചാത്തലങ്ങളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഉപഗ്രഹം	ഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള ദൂരം (മൈൽ)	പര്യയകാലം ദി. മ. മി. സെ.
മീമാസ്	115,000	0 22 37 6
എനസിലാഡ്സ്	148,000	1 8 53 7
ററിത്തിസ്	183,000	1 21 18 26
ഡയോണി	235,000	2 17 41 9
റിയ	329,000	4 12 25 12
ററിറാൻ	760,000	15 22 41 27
ഹൈപ്പേരിയൻ	921,000	21 6 38 31
ഇയാപ്റ്ററസ്	2215,000	79 7 56 40
ഫോബ്	—	550 10 34
തെമിസ്	—	20 20 24

Ball's Story of the Heavens.

ഇന്ദ്രനും വരണനും അവരുടെ അക്ഷങ്ങൾക്കു ചുറ്റും തിരുന്ന കാലം ഇപ്പഴം നിണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ദ്രനും നാലു ഉപഗ്രഹങ്ങളും വരണനും ഒരു ഉപഗ്രഹവും ഉണ്ട്. അവയുടെ ഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള അകലങ്ങളും പര്യയകാലങ്ങളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇന്ദ്രന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ—

1. ഏരിൽ 119,000 മൈ. 2 ദി 12 മ 29 മി 21 സെ.
2. അംബ്രിൽ 166,000 ,, 4 ,, 3 ,, 27 ,, 37 ,,
3. റിററാനിയ 272,000 ,, 8 ,, 16 ,, 56 ,, 30 ,,
4. കാബറോൻ 364,000 ,, 13 ,, 11 ,, 1 ,, 6 ,,

വരണന്റെ ഉപഗ്രഹം—

220,000 ,, 5 ,, 21 ,, 2 ,, 44 ,,

പൂട്ടോ എന്ന അവസാനത്തെ ഗ്രഹത്തിന്റെ സഞ്ചാര മാർഗ്ഗത്തേയും വലിപ്പത്തേയും ഭ്രമണത്തേയും പറ്റി ഇപ്പഴം വേണ്ടവിധം കൃത്യമായി അറിവായിട്ടില്ല. ഗ്രഹം ഏതാണ്ട് ഭൂമിയോളം വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നു ഊഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

IV. ധൂമകേതുക്കൾ അഥവാ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ.

ഒരു കാലത്തു ഗ്രഹണംതന്നെ ജനങ്ങളെ ഭയാക്രാന്തരാക്കിയിരുന്നു. ഇന്നും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഗ്രഹസഞ്ചാരവും നിരീക്ഷകന്മാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഗ്രഹഗതികളിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് അവയുടെ ഖഗോളസ്ഥാനങ്ങളും, ഗ്രഹണം മുതലായവയും ഗണിക്കുവാൻ പ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ സാധിച്ചു. ഇതു പ്രപഞ്ചം നിയമാത്മകമാണെന്ന് ബോധത്തെ കൂടി ജനങ്ങളിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ചില വ്യോമസംഭവങ്ങൾ അടുത്ത കാലംവരെ ജനങ്ങളെ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ നിയമാതീതമായി ജനങ്ങൾക്കു തോന്നി. അവയിൽ ഒന്നാകുന്നു ധൂമകേതുക്കളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വെളിവാട്. കുറച്ചുകാലംമാത്രം ഈ അതുഭുതവസ്തു ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെട്ട പിന്നേയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഗാധതയിൽപ്പോയി മറയുന്നു. മറ്റൊരു സംഭവമാകുന്നു ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുള്ള നക്ഷത്രപ്രപാതം, അഥവാ ഉൽകാപതനം. ഇടക്ക് ചില പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾതന്നെ ആകാശത്തു കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അഹിതസൂചകങ്ങളാണെന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാർപോലും ഇന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

പുരാതനകാലങ്ങളിൽ കാണപ്പെട്ട അനേകം ധൂമകേതുക്കളെപ്പറ്റി പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രേ. അടുത്ത കാലത്തും ഈവക സംഭവങ്ങളെ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1680ൽ ഒരു വലിയ ധൂമകേതു പ്രത്യക്ഷമായി. ഒക്ടോബർ മാസം തൊട്ടു കാണുവാൻ തുടങ്ങിയ ഈ വസ്തു ഡിസമ്പർ 18-ാം തീയതി വരെ സൂര്യനോടടുത്തു വന്നു. അല്പം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൂര്യനെ വലംവെച്ച്, വന്നു വഴിക്കുതന്നെ പോയി. എപ്രിൽമാസത്തോടുകൂടി തീരെ അപ്രത്യക്ഷമായി. ധൂമകേതുവിന്റെ സഞ്ചാരവും ഗുരുത്വാകർഷണനിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമായിരിക്കണമെന്നു കരുതിയ സേർ. ഐസാക് ന്യൂട്ടൻ അതിന്റെ സ

ബാരമാറ്റം നിർണ്ണയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്നു അതു ഉന്മീലികയിൽ
 നിന്നു വിഭിന്നമെന്നു തോന്നിയില്ല. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ
 ആ ധൂമകേതു സൗരവ്യൂഹത്തിന്നു പുറത്തുനിന്നു വന്നു ഒരു പ
 ക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പുറത്തുള്ള വലിയ ഗ്രഹത്തിന്റെ ആകർഷ
 ണംവഴി സൗരവ്യൂഹത്തെ പ്രവേശിച്ച് സൂര്യന്റെ ആകർഷണ
 ത്തിൽപെട്ട് അതിനെ സമീപിച്ച് വലംവെച്ച്, അപ്പോൾ വ
 ലിച്ച് വന്ന വേഗതയോടുകൂടി സൂര്യനെ വട്ട് ഇനി വരാത്തവ
 ണ്ണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കണം. ചല
 നഗണിതനിയമങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത വായനക്കാർ പ്രത്യേ
 കം ചിലതു കാക്കുവാനുണ്ട്. സൂര്യന്റെ നേക്കു വരുന്ന വസ്തു
 കൾ സൂര്യനിൽ പതിക്കുകമാത്രം ചെയ്യും. നേക്കു വരാത്തവ
 അതിനെ പുറം പ്രോന്മീലിക വഴിയായോ, ഉന്മീലിക വഴിയാ
 യോ, ആയതവൃത്തം വഴിയായോ സഞ്ചരിച്ചു വിട്ടുപോകും. പഥ
 ത്തിന്റെ ആകൃതി സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള അകലത്തേയും അപ്പോ
 ളുള്ള വേഗതയേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പഥം പ്രോന്മീലിക
 യോ ഉന്മീലികയോ ആയാൽ പിന്നെ ആ വസ്തു മടങ്ങിവരിക
 യില്ല. ആയതവൃത്തമാണെങ്കിൽ മടങ്ങിവരാതെ കഴിക്കുമില്ല.
 ഇതെല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്ക് മറ്റൊരു ആകർഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ.
 ഇതു സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല, ആകർഷിക്കുന്ന ഏതു
 വസ്തുവെ സംബന്ധിച്ചും ശരിയാകുന്നു. ഇതു ഇടയിൽ പറഞ്ഞ
 തുമാത്രം. നൂട്ടൻ ധൂമകേതുവിന്റെ മാറ്റം ഉന്മീലികയെന്നു
 നിർണ്ണയിച്ചു. പക്ഷെ ഹാലി എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ
 ണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ധൂമകേതുകുളുടെ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചു
 ഇതിന്റെ പരിവർത്തനകാലം 575 സംവത്സരങ്ങളായിരിക്കണ
 മെന്നു ഊഹിച്ചു. 531ലും 1106ലും ഇതുപോലത്തെ ധൂമകേതു
 കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ധൂമ
 കേതു ഇനി 2255ലായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. പശ്ചാത്തകാലം
 ക്ലപ്തമായ ധൂമകേതുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതു ആയതവൃത്തങ്ങളിലാ
 യിരിക്കും. അത്യായതവൃത്തങ്ങളുടെ ഒരു നാടിക്കടുത്ത പ്രദേശം
 മാത്രം കണ്ടാൽ, അതു ഉന്മീലികയിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയുവാൻ

പ്രയാസപ്പെടും. ഇതിനും പുറമെ ഉന്മീലികയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ധൂമകേതുക്കളുടെ പഥങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടു ഗതിയിൽ ഭേദം വന്ന് അത്യായതവൃത്തങ്ങളാകുവാനും, നേരെ മറിച്ച് അത്യായതവൃത്തരൂപമായ പഥങ്ങൾ ഗതിഭേദംകൊണ്ടു ഉന്മീലികയാകുവാനും എളുപ്പമുണ്ട്. അതിനാൽ സൗരവ്യം ഹത്തിന്റെ പുറമെനിന്നു വന്ന ധൂമകേതുക്കൾ സൗരവ്യം ഹത്തിലെ സ്ഥിരവാസികളാകുവാനും, സ്ഥിരവാസികൾ വിട്ടു പോകുവാനും വഴിയുണ്ട്.

1682ൽ മറൊരു ധൂമകേതു പ്രത്യക്ഷമായി. ഹാലി അതിന്റെ സഞ്ചാരമാറ്റം വളരെ നിഷ്കൃഷ്ടയോടെ ഗണിച്ചു. അതിന്റെ പര്യായകാലം 75 കൊല്ലമാണെന്നു കണ്ടു. പഴയ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കെപ്ലർ അതിനെ 1607ൽ കണ്ടിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. അതിനും മുമ്പു 1531ലും 1456ലും വലിയ ധൂമകേതുക്കളെ കണ്ട റിക്കാർഡുകളും ഉണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം പര്യായകാലം $75\frac{1}{2}$ കൊല്ലമെന്നും, ഈ ധൂമകേതു 1758ൽ പിന്നേയും കാണപ്പെടുമെന്നും ഒരു വിധം തീർച്ചയാക്കി. എങ്കിലും വലിയ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടു മടങ്ങിവരുന്നതിൽ താമസം വരുമോ എന്നു സംശയിച്ചിരുന്നു. ആ കാലം സമീപിച്ചപ്പോൾ ക്ലെയററ്റ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ യത്നിച്ചു വ്യാഴത്തിന്റേയും ശനിയുടേയും ആകർഷണം കൊണ്ടു 618 ദിവസത്തോളം താമസം നേരിടാമെന്നു കണ്ട് 1759 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നത്തെ വരവെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ധൂമകേതു ആ തവണ സൂര്യന് ഏറ്റവും അടുത്തുവന്നതു 1759 മാർച്ച് 12-ാം തീയതിയായിരുന്നു. ഈ ധൂമകേതുവെ ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു (Halley's Comet) എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതാണ് 1910 ഏപ്രിൽ മേയിമാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെട്ടത്. ഒരു ദിവസം പുലരുന്നതിന്നു മുമ്പ് കണ്ടതായി കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നക്ഷത്രരൂപം ലഘുജ്വല ഭാഗം ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേതുവെന്ന ഭാഗം

കിഴക്കു ക്ഷിതിജം തൊട്ടു നാലുത അമ്പതു ഭാഗം ഉയരത്തേക്കു നീണ്ടു കിടന്നിരുന്നതായി കാക്കുന്നു. കേതുവിന്നു വളരെ വിസ്താരവും ശോഭയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അസ്തമനത്തിന്നു ശേഷം പടിഞ്ഞാറു ക്ഷിതിജത്തിൽനിന്നു കുറെ ഉയരത്തായി കണ്ടിരുന്നു. കേതുവിന്നു ഒരു ചെറിയ വളവുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാറു പതിനേഴു ഭാഗത്തോളം നീട്ടമുള്ള അതിന്റെ അടിഭാഗം വീതി ചുരുങ്ങിയതും മുകൾ ഭാഗം വീതിയേറിയതുമായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ കുറെ ദിവസം കണ്ടു. ദിവസത്തോറും അതു ചെറുതായി വന്നു തീരെ കാണാതായി. ഇതു ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട കാലം യിൽനിന്നു മാത്രം എഴുതുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ 3ഉം, 5ഉം, 7ഉം, 13ഉം കൊല്ലങ്ങളിൽ സൂര്യനെ അത്യായതവൃത്തങ്ങളിൽ പശ്ചയനം ചെയ്യുന്ന കുറെ ധൂമകേതുക്കളെ ജ്യോതിഷികൾക്കറിയാം. ഒരിക്കൽ മാത്രം കണ്ടു പിന്നെ കാണാത്തതായ ധൂമകേതുക്കളും ഉണ്ട്.

ധൂമകേതുക്കളുടെ പഥം അപക്രമവൃത്തത്തിന്നരികത്തുതന്നെ വേണമെന്നില്ല. ആകാശത്തിൽ ഏതു ഭാഗത്തും പ്രത്യക്ഷമായി ഏതു വഴിക്കും സഞ്ചരിച്ച് സൂര്യനെ ചുറ്റി ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോയെന്നു വരാം.

ധൂമകേതുക്കളെ വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവുന്നതിന്നു മുമ്പ് ഭൂരശ്മിനികളിൽകൂടി കാണുമ്പോൾ ചിലത് ഒരു മേഘശകലംപോലേയും ചിലതു ഒരു മങ്ങിയ നക്ഷത്രംപോലേയും കാണപ്പെടുന്നു. ദിവസം കഴിഞ്ഞോറും മങ്ങിയ നക്ഷത്രംപോലെ യിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്നു ചുറ്റുമുള്ള ആവരണം വലിച്ചു വരുന്നു. സൂര്യനോട് അടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആവരണത്തിന്റെ തുടച്ചുയെന്ന നിലയിൽ ഒരു കേതു(കൊടിക്കൂറ എന്നർത്ഥം)വും ഉണ്ടാകുന്നു. കേതു എല്ലാപ്പോഴും സൂര്യനിൽനിന്നു എതിർഭാഗത്തേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കും. കേതു ചെറുതും വലുതുമായാകാം.

സൗരവ്യൂഹത്തിൽ സ്ഥിരവാസികളായ ധൂമകേതുക്കളുടെ പഥങ്ങളായ ആയതവൃത്തങ്ങളുടെ ഒരറ്റം സൂര്യനടുത്തും മറൈ

അറം ഏതെങ്കിലും വലിയ ഗ്രഹത്തിന്റെ കക്ഷക്കടുത്തും കിടക്കുന്നതിനാൽ ധൂമകേതുക്കൾ സൗരവ്യംഗത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു സഞ്ചരിച്ച് സൗരവ്യംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടു പഥങ്ങൾക്ക് വക്രത വരികയാൽ ഇവിടെ സ്ഥിരവാസികളായി കൂടിയവയാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമുണ്ട്.

ധൂമകേതുക്കളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽകൂടിയും പുറമെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ കേന്ദ്രം തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെ കട്ടിയായ വസ്തുവാണെന്നു കരുതിക്കൂടാ. ഒന്നുകിൽ ധൂമഗ്രഹമായതോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറു കട്ടകൾ അന്യോന്യം വളരെ അടുത്തല്ലാതെ ഒന്നായിച്ചേർന്നവയോ ആയിരിക്കാം. സൂര്യനടുത്തു വരുമ്പോൾ ആവരണവും കേതവും ഉണ്ടായി വലിച്ച് വരുന്നതിനാൽ കേന്ദ്രം സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണംകൊണ്ടു ബാഷ്പമായി മാറുന്ന വസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടു നിമ്നിച്ചതായിരിക്കണം. കേന്ദ്രം വാതകമായിരുന്നുകൂടാ. ചുരുങ്ങിയ വാതകപിണ്ഡത്തിന്നു ഗുരുത്വാകർഷണംകൊണ്ടു ഒന്നായി നില്പാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ധൂമകേതുക്കളുടെ അനേകലക്ഷം നാഴിക നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കേതുക്കളിൽകൂടി ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും കടന്നുപോകാറുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതികളിൽ ഒരു ഭേദവും വന്നു കാണാറില്ല. അതിനാൽ കേതുവിലെ ദ്രവ്യം വളരെ നേർത്തുള്ളതാണെന്നു വരുന്നു. കേതു സൂര്യനിൽനിന്നു എതിരായ ഭാഗത്തേക്കു തിരിഞ്ഞിരിപ്പാൻ കാരണം സൂര്യരശ്മികൾക്കുണ്ടെന്നറിയുന്ന ലഘുവായ മട്ട്ഗന്ധകത്തിയാകുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ സൂര്യരശ്മികളുടെ അടി തട്ടി അകന്നു പോകുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും ആവരണത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കേതുവിലെ ലഘുവായ ദ്രവ്യം സൂര്യനടുത്തു വരുന്ന ഓരോ തവണയും ധൂമകേതുക്കൾക്ക് നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നു. ആവർത്തിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധൂമകേതുക്കളുടെ കേതു ചെറുതായി വരുന്നു. അതിനാൽ കേതുവിന്റെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കി സൗരവ്യംഗത്തിലെ സ്ഥിരവാ

സിയെന്ന നിലയിൽ ധൂമകേതുക്കൾക്ക് എത്ര പഴക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു കൂടി ഉറഹിക്കാം.

വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവുന്ന ധൂമകേതുക്കൾ വളരെ അപൂർവ്വമാണെങ്കിലും ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടിക്കാണുന്നവ ഓരോ കൊല്ലവും ആറോ ഏഴോ ഉണ്ടായിരിക്കും. വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഇവ അശുഭസൂചകങ്ങളെന്നും അല്ലാത്തപ്പോൾ വിശേഷഫലങ്ങളില്ലാത്തവയാണെന്നും കരുതുന്നതു ന്യായരഹിതമാകുന്നു.

V. ഉൽക്കകൾ.

ഇരുട്ടുള്ള മിക്ക രാത്രികളിലും ആകാശത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുന്നതുപോലെ കാണാം. ആകാശത്തിൽ ഒരു തേജസ്സ് ഇരുപതോ മുപ്പതോ ഭാഗം നിമിഷനേരംകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ച് മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു തീക്കട്ട കുറെക്കൂടിപ്പതുക്കെ കുറെ അധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണാം. അപൂർവ്വം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ തീക്കട്ടകൾ നിലത്തെത്താറുണ്ട്. അവയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വലിയതോ ചെറിയതോ ആയ ശിലകളായിരിക്കും. ഇവയിൽ ചിലതു വെറും കല്ലുകൾ തന്നെ. ചിലതു ലോഹപിണ്ഡങ്ങളുമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ വീണ പിണ്ഡങ്ങളെ പല കാഴ്ചബങ്കുകളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദിരാശി കാഴ്ചബങ്കളാവിൽ 6 ചെറിയ കല്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1914 ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി പൊന്നാനി താലൂക്ക് കുറുപ്പുറത്തു വീണ കല്ലാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയത്. അതിന്റെ തൂക്കം 7 റാത്തലാകുന്നു. 1896ൽ മധുരയിലെ തിരുപ്പത്തൂരിൽ വീണ കല്ലിന്റെ തൂക്കം 7 കൗൺസ് മാത്രമാകുന്നു. കൽക്കത്താ കാഴ്ചബങ്കളാവിൽ അനവധി ട്രൻ തൂക്കമുള്ള ഒരു വ്യോമശില സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ ജോഹന്നസ്ബർഗ്ഗിലെ കാഴ്ചബങ്കളാവിൽ ഏതാണ്ട് പത്തു പന്ത്രണ്ട് ഘനടി പരിമാണമുള്ള ഒരു കല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റും അനേകം കാഴ്ചബ

ജ്വാലകളിൽ ഈ വിധം കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോഹ ശിലാപിണ്ഡങ്ങളിലെ ദ്രവ്യം നമുക്ക് അപരിചിതമല്ല. അതു ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കല്ലുകളും ലോഹങ്ങളും തന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധിച്ചാൽ അവയെ തിരിച്ചറിവാൻ പറ്റിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. കടലിന്റെ അടിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന കല്ലുകളിൽ ചിലത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാകുന്നു. അവ കടലിൽ വീണ വ്യോമശിലകളായിരിക്കണം.

വലിയ കല്ലുകൾ വീഴുമ്പോൾ അവ പൊട്ടി ഇടിമുഴക്കം പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നു. എല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണു കത്തി ജ്വലിക്കുന്നപോലേയും ഇരിക്കും. ഭൂമിയിൽ വീണാൽ ആ ശക്തിയോടുകൂടി കുറെ അധികം ആഴത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. അവയെ എല്ലായ്പ്പോഴും കുറെ ആഴം കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടിവരും. അമേരിക്കയിൽ അറിസോണ എന്ന സ്ഥലത്തു ചരിത്രാതീത കാലത്തു വീണ ഒരു ശില വളരെ വിസ്താരത്തിൽ അധികം ആഴത്തിൽ ഭൂമിയിലുണ്ടാക്കിയ ദ്വാരം ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടു പോൽ.

ഇപ്രകാരം വീഴുന്ന കല്ലുകൾക്ക് ഉഷ്ണം എവിടെനിന്നുണ്ടാകുന്നു? അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യന്റേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും അടുത്തല്ലാതെ ഇത്രയധികം ഉഷ്ണമില്ല. മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും വളരെ തണുത്തിരിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഈ കല്ലുകൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽത്തന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ തണുത്തുപോകും. മാത്രമല്ല ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നാണോ ഇവ പുറപ്പെടുന്നതെന്നും ഗവേഷകന്മാർ സംശയിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അതും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വായുമണ്ഡലത്തിൽ അതിവേഗമുള്ള സഞ്ചാരംകൊണ്ട് ഇത്ര ഉഷ്ണം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രപക്ഷം. സേർ വില്യം തോമ്സൻ സെക്കണ്ടിൽ 125 അടി വീതം സഞ്ചരിപ്പിച്ച ഒരു സാധനത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു ഉഷ്ണമാപനി (Thermometer) പിടിപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ, അതിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഉ

ണ്ണം വലിച്ചതായി കണ്ടു. ഭൗതികശാസ്ത്രതത്വങ്ങളനുസരിച്ച് ഇപ്രകാരം വലിക്കുന്ന ഉണ്ണിം വേഗതയുടെ വർഗ്ഗത്തിന്നനുപാത കമായിരിക്കും. ഭൂമി സ്വകക്ഷയിൽ സെക്കണ്ടിൽ 98000 ടി വീതം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ സഞ്ചാരത്തിൽ നിശ്ചലമായ ഒരു ശിലാകഷണത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അതു വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വേഗതയോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ണിം $(98000 \div 125)^2 = 6,00,000$ ഡിഗ്രിയായിരിക്കണമല്ലോ. ഈ ഉണ്ണിത്തിന്റെ നൂറിലൊരംശത്തിൽ ഉരുകി ബാഷ്പമാവാത്ത വസ്തുക്കളില്ല. വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ള വായു വളരെ നേരിയതായതുകൊണ്ട് അതിൽ ഭൂമിയുടെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ണിം 6,00,000 ഡിഗ്രിയോളമുണ്ടാകയില്ല. എങ്കിലും കല്ലുകളേയും ലോഹങ്ങളേയും ഉരുകി ബാഷ്പമാക്കുവാനും ഭസ്മമാക്കുവാനും മതിയായ ഉണ്ണിം ഉണ്ടാകുമെന്നു തീർച്ചതന്നെ. ഭൂമിയായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പിണ്ഡങ്ങളുടെ വേഗതകൊണ്ടും വായുമണ്ഡലത്തിലെ സഞ്ചാരവേഗത വലിച്ചുവെന്നു വരാം. വീഴുന്ന ശിലകളെ ഭൂതലത്തിൽനിന്നു 200 കാളം മൈൽ ഉയരത്തു പ്രജ്വലങ്ങളായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അത്ര ഉയരമെങ്കിലും വായുമണ്ഡലം പ്ലാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ഏതാണ്ട് ഒരുവിധം കട്ടിയുള്ള വായു 50 മൈൽ ഉയരത്തോളമേയുള്ളുവെന്നു പറയുന്നു.

ഈ ശിലാലോഹപിണ്ഡങ്ങൾ എവിടെനിന്നു വരുന്നു? സാധാരണ രാത്രികളിൽ കുറെ അധികം നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മൂന്നോ നാലോ നക്ഷത്രപാതം കാണാം. എന്നാൽ ചില രാത്രികളിൽ അനേകശതം തേജോബിന്ദുക്കൾ ആകാശത്തിൽ നാനാഭാഗത്തേക്കും പായുന്നതു കാണാം. ഇവയെ ഉൽക്കകൾ (Shooting Stars—meteors) എന്നു പറയുന്നു. ഇവ ആകാശത്തിൽ പായുന്ന മാഗ്നങ്ങളെ ഇരുവശത്തേക്കും വിട്ടിയാൽ, എല്ലാം ഖഗോളത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തുകൂടിപ്പോകുന്ന

തായിക്കാണാം. ഈ സ്ഥാനത്തിന്നു ഉൽക്കാപതനത്തിന്റെ വികിരണകേന്ദ്രം (Radiant Point) എന്നു പറയുന്നു. അപ്പോൾ വികിരണകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ഉൽക്കകൾ നാലുഭാഗത്തേക്കും പായുന്നുവെന്നു വരുന്നു. ഉൽക്കാപിണ്ഡങ്ങൾ ഭൂമി ണ്ടലത്തോട് അടുത്തുവരുന്ന ദിക്കാണ് വികിരണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ദിക്കെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

മുപ്പത്തിമൂന്നോ മുപ്പത്തിനാലോ സംവത്സരങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ചിങ്ങം രാശിയിലുള്ള ഒരു വികിരണകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു അനേകസഹസ്രം ഉൽക്കകൾ പായുന്നതായിക്കാണാം. 1799, 1833, 1866 ഈ കൊല്ലങ്ങളിൽ നവമ്പ്ര 12, 13 ഈ തിയതികളിൽ (തൃലാം 27, 28 തിയതികളിൽ) അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഈ ഉൽക്കാപതനം കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നു ചൊയ്ക്ക നിരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു സൂര്യനു ചുറ്റും ഇന്ദ്രകുക്ഷിപര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു അത്യായതവൃത്തത്തിൽ സ്വകുക്ഷിയിൽ പത്തിലൊരംശം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഉൽക്കാസമൂഹം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, സൂര്യനെ തൃലാം രാശിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ കാണുന്ന കാലം അതായതു ഭൂമി സ്വകുക്ഷിയിൽ മേടം രാശിയുടെ അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവയുടെ കക്ഷയെ കടന്നുപോകുമെന്നും, അപ്പോൾ കക്ഷയുടെ ആഭാഗത്തു ഉൽക്കാസമൂഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവയെ ഭൂമി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും, ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതു 33½ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലാണെന്നും ജ്യോതിഷികൾക്കു തീർച്ചയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണമൂലം എല്ലായിടത്തും ഉൽക്കാപതനം കണ്ടില്ലെന്നു വരും. രാത്രിസമയത്തു ചിങ്ങം രാശി കാണുന്ന നേരം നിരീക്ഷകൻ ഉള്ള പ്രദേശത്തെ വായുമണ്ഡലം ഭൂഭ്രമണവശാൽ ഉൽക്കാസമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും വേണം.

ഇത്രതന്നെ ഭയംകരമാകാറില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കൊല്ലവും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പരാസവസ്സ് നക്ഷത്രഗണത്തിലെ ഒരു

വികിരണകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഉൽക്കാപതനം കാണാറുണ്ട്. ഇതിനും കാരണം ഭൂക്ഷ്കതൊട്ടു പ്ലൂട്ടോവിന്റെ കക്ഷക്കപ്പറം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതും 124 കൊല്ലം പശ്ചാത്തലമായതും ആയ ഒരു ഉൽക്കാസമൂഹമാണെന്നു നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമൂഹം സ്വകക്ഷ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കയാലാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഭൂമി ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

ഇവ കൂടാതെ ചെറിയതും വലിയതുമായ ഉൽക്കാസമൂഹങ്ങളും ചെറുപിണ്ഡങ്ങളും മറ്റു അണുപ്രായമായ വസ്തുക്കളും സൗരവ്യൂഹത്തിലും അതിന്നു പുറത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അവയെ ഭൂമി എതിരിടേണ്ടിവരുമ്പോഴാണ് നക്ഷത്രപതനങ്ങളും, ഉൽക്കാമാരികളും, ശിലാപതനങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. ചെറിയ പിണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ണുകൊണ്ടു ഉജ്വലമായി വായുമണ്ഡലത്തിൽതന്നെ ബാഷ്പമായും ഭസ്മമായും പോകുന്നു. അല്പം വലിയവ തീരെ നശിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു. അത്യധികം തപിതമായ പിണ്ഡങ്ങൾ പെട്ടെന്നു തണുത്തുപോകയാൽ, അവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങളെക്കൊണ്ടാകുന്നു അവയെ പിന്നീടു തിരിച്ചറിയുന്നത്.

സൗരവ്യൂഹത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന ഉൽക്കാസമൂഹങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ആകർഷണമൂലം സൂര്യനെ സമീപിച്ച് ചുറ്റി പിന്നേയും സൂര്യനെ വിട്ടുപോകും. ഇവയുടെ കക്ഷകൾ ഉന്മീലികയോ പ്രോന്മീലികയോ ആവാം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണകൊണ്ടു ഇവയുടെ കക്ഷകളുടെ ആകൃതി ആയത്വത്തമായി മാറാത്ത പക്ഷം ഇവ തിരിച്ചുവരുന്നതല്ല. മാറിയാൽ ഇവ പിന്നേയും പിന്നേയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരവാസികളായി സൗരവ്യൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കൂടാം. സിംഹരാശിസംബന്ധിയായ ഉൽക്കാസമൂഹം പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് സൂര്യന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്തുകൂടി പോകേണ്ടതിന്നു പകരം ഇന്ദ്രന്റെ വളരെ അരികെ വന്നതിനാൽ അതിന്റെ ശക്തിയായ

ആകർഷണം നിമിത്തം വലത്തുഭാഗത്തേക്കു തള്ളപ്പെട്ടതിനാലാണ് അതു സൗരവ്യഹത്തിലെ സ്ഥിരവാസിയായി ഇന്നും സൂര്യനെ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും, അതിനാലാണ് സഞ്ചാരപഥം ഇന്ദ്രകക്ഷവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതെന്നും അഭിജ്ഞാൻ പറയുന്നു. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിൽപിന്നെ ഈ ഉൽക്കാസമൂഹം നൂറിലധികം വട്ടം സൂര്യനെ വലംവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിനാലാണത്രെ ഉൽക്കാസമൂഹം സ്വകക്ഷയിൽ പത്തിലൊരംശം മാത്രം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഴക്കം അധികമാകുമ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷണം നിമിത്തം ഈ സമൂഹം സ്വകക്ഷയിൽ അധികം വ്യാപിക്കുമെന്നും അനുമാനിക്കുന്നു. വരാസപസ്സ് സംബന്ധിയായ ഉൽക്കാസമൂഹത്തിനു നല്ലവണ്ണം പഴക്കം തട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു ഈ അഭിപ്രായത്തിൽനിന്നു വരുന്നു.

ധൂമകേതുക്കളുടേയും ഉൽക്കാസമൂഹങ്ങളുടേയും സഞ്ചാരമാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും സഞ്ചരിക്കുന്ന തലങ്ങൾതന്നെ അപക്രമതലത്തിൽനിന്നു എത്രയോ വേറിട്ടു നില്ക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സിംഹസംബന്ധിയും വരാസപസ്സ് സംബന്ധിയും ആയ ഉൽക്കാസമൂഹങ്ങളുടെ പഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ധൂമകേതുക്കളേയും നിരീക്ഷകന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ധൂമകേതുക്കളായി സഞ്ചരിച്ച് ആവരണവും കേതുവുമണിഞ്ഞ് സാധുക്കളായ ഭൂവാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തി കാലാന്തരത്തിൽ ആ അംശം നശിച്ച് പോയിട്ടായിരിക്കാം ഉൽക്കാകളായി ആ സാധുക്കളെത്തന്നെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവ മിക്കവയും സൗരവ്യഹത്തിനു പുറത്തുനിന്നു കുടിയേറിപ്പാത്ത പരദേശീയരുമാവാം. ഏതായാലും ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും അനേകം സംഗതികൾ ഇന്നും അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. ഭാവിഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്നു അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാവുന്നവയെന്നാശിക്കാം.

5. നക്ഷത്രങ്ങൾ

പൂർവ്വജന്മം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാഴ്ചയായി നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ ആകാശത്തിൽ കണ്ടറിവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കൂട്ടത്തിൽ ചില ഭചയങ്ങളേയും, ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളേയും, ക്ഷയോപചയതാരങ്ങളേയും പറഞ്ഞു. ദൂരദർശിനി നിർമ്മിച്ച് അതിനെ പരിഷ്ക്കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് നക്ഷത്രലോകത്തിന്റെ അപാരതയും മഹത്വവും ക്രമേണ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടത്.

ഒന്നാമതു ആകാശഗംഗ വെറും ഒരു പ്രകാശമല്ല. നാം കാണുന്ന അവിച്ഛിന്നപ്രകാശം അടുത്തടുത്തുള്ള അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന പ്രകാശങ്ങളെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിനാൽ തോന്നുന്നതാകുന്നു. ആകാശഗംഗയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂടിപ്പോകുന്ന മഹാവൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപോലെത്തോന്നുന്നു. ഈ വൃത്തത്തിൽനിന്നു അതിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങുതോറും കൂട്ടമായിക്കിടക്കുന്ന ചെറുനക്ഷത്രങ്ങളുടെ സംഖ്യ ചുരുങ്ങിവരുന്നു. എന്നാൽ പ്രകാശമുള്ള വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ ആകാശത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

കാർത്തിക അടുത്തടുത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭചയമാകുന്നു. ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി അതിൽ 40-ാം 50-ാം നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാണാം. വലിയവയിൽ കൂടി 600-ൽ പരം നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുത്ത അതിൽ 2000-ൽ പരവും എണ്ണിട്ടുണ്ടത്രെ. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ശോ

ഭയങ്കര ഒരു വസ്തുവിൽ അന്തർഭൂതമായതിനാലാകുന്നു കാർത്തിക ഒരു പ്രത്യേകതിരുങ്ങൽ നാം കാണുന്നത്. കർക്കടകഗണത്തിലെ മങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭവയമുണ്ടെന്നു പൂർവ്വചണ്ഡം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിലേഖത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് അളിഗ്രാമഭവയം (Bee Hive Cluster) എന്നാകുന്നു. അതിനെ ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ആകൃതി ഒരു തേനിച്ചുള്ളപ്പോലെയിരിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങളെ വേറിട്ടു കാണുകയില്ലെങ്കിലും അതു അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെന്നു തോന്നാതിരിക്കയില്ല. സീതാവേണിയും അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഭവയമാകുന്നു. വരാസവസ്ത്വ് നക്ഷത്രഗണിതത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു, എന്നുവെച്ചാൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ടു ഭവയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബൃഹച്ഛപാനഗണത്തിൽ അവിടവിടെ ചില പ്രകാശങ്ങൾ കാണുന്നവ ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ ഭംഗിയുള്ള ഭവയങ്ങളാണെന്നു കാണാം. മദ്ധ്യകേരളത്തിൽനിന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തവയും നിരക്ഷരേവയുടെ ദക്ഷിണ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു നല്ലവണ്ണം കാണാവുന്നവയും ആകാശഗംഗയുടെ കപ്പലങ്ങളെന്നു തോന്നുന്നവയും ആയ രണ്ടു വലിയ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്നു മഹാതിനെക്കാൾ ചെറുതാകുന്നു. മാഗലൻ എന്ന നാവികൻ ഇവയെ ആദ്യം കാണുവാൻ ഇടയായതിനാൽ ഇവയെ മാഗലമേഘങ്ങൾ (Magellanic Clouds) എന്നു പറയുന്നു. വലിയ ദൂരദർശിനികളിൽക്കൂടി ഇവയെ നല്ലവണ്ണം നക്ഷത്രങ്ങളായി വേർതിരിച്ചു കാണാം.

ഈ ഭവയങ്ങളെല്ലാം ആകാശത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും വിസ്തീർണ്ണമുള്ളവയാകുന്നു. ഈ പ്ലാത്തിൽപ്പെട്ടവയല്ലാതെ, ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽക്കൂടിയും മങ്ങിയ നക്ഷത്രത്തെപ്പോലെ കാണുന്ന നൂറോളം ഭവയങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം

മേ വെറും കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമാകയുള്ളു. വലിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഇവയെ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളായിക്കാണാം. ചിലതു വലുതും ചിലതു ചെറുതും ആയിരിക്കും. എല്ലാദിനവും ആകൃതി വർത്തുളം തന്നെ. ഇവ മിക്കവയും ആകാശഗംഗയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല അധികം എണ്ണയും കാണപ്പെടുന്നതു ഖഗോളത്തിന്റെ കരളത്തിലുമാകുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണം പിന്നീടു മനസ്സിലാവും.

ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങളായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന വളരെയധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ, മൂന്നോ, നാലോ, അധികമോ ആയി വേർതിരിയുന്നു. വസിയ്ക്കുന്ന അരുന്ധതിയും വളരെ അടുത്തു നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു. ഇതു വെറും കണ്ണുകൊണ്ടുതന്നെ കാണാം. എന്നാൽ എത്ര സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാലും വസിയ്ക്കുന്ന ഒറ്റ നക്ഷത്രമായല്ലാതെ തോന്നുകയില്ല. മൂന്നിന്മേൽ കുറയാതെ രസ്യമാനമുള്ള ഒരു ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി വസിയ്ക്കുന്ന രണ്ടായിക്കാണാം. ധ്രുവനക്ഷത്രംതന്നെ വലിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി രണ്ടായി പിരിയുന്നു. നമുക്കേറ്റവും അടുത്താണെന്നു കരുതിവരുന്ന കിനാരവസ്സ് 1 എന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഏതാണ്ട് 'ഒരേ വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളായിക്കാണാം. അതിൽ ഒന്നു വലിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി രണ്ടായിക്കാണാം. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ചെറുതിനെ പ്രത്യംസന്ന കിനാരവസ്സ് (Proxima Centauri) എന്നു പറയുന്നു. ഇന്നറിയാത്തതോളം ഇതാകുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം.


ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്നായോ അടുത്തായോ കാണുന്നു. അവ നമ്മിൽനിന്ന് ഒരേ സൂത്രത്തിലോ ഏതാണ്ട് ഒരേ സൂത്രത്തിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. ചിലതു അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടു പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാകയാൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവയെ ദ്വന്ദ്വതാരങ്ങൾ (Binaries) എന്നു പറയുന്നു. വസിയ്ക്കുന്ന ധ്രുവവും വെറും ഇ

രട്ടനക്ഷത്രങ്ങളാകുന്നു. കിനാരവസ്സ് 1 ഒരു ദ്വന്ദ്വമെന്നു പറയാം. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒരു ത്രയതാരമാകുന്നു. അന്വേകം ദ്വന്ദ്വതാരങ്ങളേയും അവയുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളേയും ജ്യോതിഷികൾക്കറിയാം. നമ്മിൽനിന്നുള്ള ദൂരം അറിഞ്ഞാൽ, പശ്ചാത്തലങ്ങളുടെ വിസ്താരവും അറിയാം. ഇവയിൽനിന്ന് 'പ² ÷ ക³ = 4π² ÷ ഗ(ദൃ₁ + ദൃ₂)' എന്ന സൂത്രംകൊണ്ട് അവയുടെ ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കാം. പശ്ചാത്തലങ്ങളുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങളിൽനിന്ന് ഓരോന്നിന്റേയും ദ്രവ്യമാനം വെച്ചേറെ കണക്കയും ചെയ്യാം. കിനാരവസ്സ് 1ൽ വലിയതു സൂര്യനെക്കാൾ 14 ശതമാനം അധികവും ചെറിയതു 3 ശതമാനം കുറവും തുക്കമുള്ളവയെന്നറിയുന്നു. പ്രത്യാസനകിനാരവസ്സിന്റെ തൂക്കം നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു നന്നെ ചെറിയ ഒരു ചുവന്ന നക്ഷത്രമാണെന്നു മാത്രം അറിയാം.

രട്ടൻ, പ്രോസിയോൺ എന്നീ വലിയ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളും ദ്വന്ദ്വങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെ വലിയ ദൂരദർശിനികളിൽകൂടി ദ്വന്ദ്വങ്ങളായിക്കാണുകയില്ല. വിരാജനിയിൽകൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിരാജികയിലെ ഇരുണ്ട വരകളുടെ എതിർ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള നീക്കങ്ങളിൽനിന്ന് ഒന്നു നമുക്ക് നേരേയും മറേറത് എതിരായും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നറിയാം. ഇങ്ങിനെയൊന്നത്രെ അവയെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണെന്നു നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രട്ടനിലെ വലിയ താരത്തിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ 2.45 മടങ്ങാണെന്നും ചെറിയതിന്റേതു 0.82 ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും അറിയാം. പ്രോസിയോൻ വലിയതിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ 124 ശതമാനവും ചെറിയതിന്റേതു 39 ശതമാനം മാത്രവുമാകുന്നു. വലിപ്പത്തിലും ശോഭയിലും ഇവ തമ്മിൽ ഇതിൽ കവിഞ്ഞ നിലയിൽ അന്തരമുണ്ട്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രധാനമാർഗ്ഗങ്ങളെ പിന്നീടു വിവരിക്കാം. പൂർവ്വലബ്ധത്തിൽ ചില താരങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിന്നു വൃദ്ധിക്ഷയമുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ

വൃദ്ധിക്ഷയം പല പ്രകാരത്തിലാകുന്നു. ചിലതിൽ പ്രകാശം കുറഞ്ഞു കറുപ്പായതിലുള്ളതും ക്രമേണ ചുരുങ്ങി ഏറ്റവും താണനിലയിലെത്തുന്നു. പിന്നീട് ചുരുങ്ങിവന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ച് മുമ്പുള്ള നിലയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതു ക്ലിപ്ത സ



പരിലേഖം 49.


ആരോഗ്യോപദേശത്തിന്റെ ക്ഷയോപചയം.

മയങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. തിരുവാതിരയിൽ നിന്നു വടക്കോട്ടുള്ള പ്രാജിത 2 എന്ന നക്ഷത്രവും

രാഹു എന്ന ഗണത്തിലെ ആരോഗ്യോപദേശം എന്ന നക്ഷത്രവും ഈ വിധത്തിലുള്ള ക്ഷയോപചയതാരങ്ങളാകുന്നു. ആരോഗ്യോപദേശത്തിന്റെ മഹിമാങ്കം മിക്കപ്പോഴും 2.5 ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഏതാണ്ട് 2½ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുനേരംകൊണ്ടു പ്രകാശം മങ്ങി മഹിമാങ്കം 4 ആയിത്തീരുന്നു. പിന്നെ പ്രകാശം വർദ്ധിച്ച് അത്രനേരംകൊണ്ടു മഹിമാങ്കം പിന്നേയും 2.5 ആകുന്നു. ആകെ ആവർത്തനകാലം 2ദി. 20മ. 49 മിനുട്ടാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണം ഒരു പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഇരുണ്ട നക്ഷത്രം അല്പസമയത്തേക്ക് ആട്ടിത്തേതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ക്രമേണ നമ്മിൽനിന്നു മാറിപ്പിന്നെ ആ മാവ് വിപരീതക്രമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം കുറേനേരത്തേക്കു ഗ്രഹണമുണ്ടാകുന്നു. ഈ ക്ഷയോപചയരീതി വേറേയും നക്ഷത്രങ്ങളിലുണ്ടാകും. ക്ഷയോപചയക്രമവും ആവർത്തനകാലവും, ചുറ്റും പോകുന്ന ഇരുണ്ടതോ മങ്ങിയതോ ആയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വലിപ്പത്തേ

യും, പരിവർത്തനകാലത്തേയും, പരിവർത്തനതലത്തിന്റെ ചരിവിനേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ മങ്ങിയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് അതു പ്രകാശമുള്ളതായിത്തീരുന്നൂ. പിന്നീടു സാവധാനത്തിൽ മങ്ങിപ്പോകുന്നു. കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതു പിന്നേയും പ്രകാശമുള്ളതായിത്തീരുന്നൂ. ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടതു കൈകവസ്റ്റ് 4 (Cepheus) എന്ന നക്ഷത്രത്തിലാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ വിധം നക്ഷത്രങ്ങളെ കൈകവസ്റ്റ് ക്ഷയോപചയങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. സാധാരണനക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഗോളമായങ്ങളിലും മറ്റും ഈ വിധം ക്ഷയോപചയതാരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറവിന്റെ ക്രമം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിപികയിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഈ വിധം മാറ്റം വ



പരിലേഖം 50.

കൈകവസ്റ്റ് 4ന്റെ ക്ഷയോപചയം.

രുവാനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വലിയ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തർഗതമുള്ള അണുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കണം കാരണം എന്നു ഹിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ വിധം ക്ഷയോപചയങ്ങളുടെ സാധാരണതപം കണ്ട് ഇതു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശൈശവാദി വാല്യകൃാന്തം വരുന്ന ഒരു ദശാഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വരുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നു ജ്യോതിഷികളിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഒരു കാര്യം നിരീക്ഷകന്മാർ മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറ്റായം. ചെറിയ മാഗ്നീറ്റ്യൂഡിൽ ഓരോന്നിയിൽകൂടി

അനവധി കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയങ്ങളെക്കാണാം. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തുള്ളവയാകയാൽ നമ്മിൽനിന്ന് ഒരേ ദൂരത്താണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതിനാൽ അവിടത്തെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളേയും സംബന്ധിച്ചു ഇവിടെനിന്നു കാണുന്ന പ്രകാശത്തിന് അനുപാതകമായിരിക്കും അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉജ്വലത എന്നു വരുന്നു. 1912ൽ ഇവയെ ഒരു നിരീക്ഷക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുറവു ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ക്ഷയോപചയ പരിവർത്തനകാലം കുറവാണെന്നും, അധികം ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാലം അധികമാണെന്നും കണ്ടു. എന്നു മാത്രമല്ല നക്ഷത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉജ്വലതയും പരിവർത്തനകാലവും തമ്മിൽ ഒരു നിയതബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ട് അതും മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ മാഗ്നീറ്റ്യൂഡിന്റെ അളവിലെല്ലാ ആകാശത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗങ്ങളിലായാലും, രണ്ടു കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയങ്ങൾക്ക് ഒരേ പരിവർത്തനകാലമാണെന്നു കണ്ടാൽ അവ രണ്ടിനും യഥാർത്ഥ ഉജ്വലത ഒന്നുതന്നെയെന്നു തീരുമാനിക്കാം. അവയിൽ ഒന്നു കുറവു മങ്ങിയതായിക്കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അത്ര അധികം ദൂരത്തായതുകൊണ്ടാവാവേ വഴിയുള്ളൂ എന്നു വന്നു. ഉദാഹരണമായി ഒരേ പരിവർത്തനകാലമുള്ള രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിന്റെ 16ൽ ഒന്നു മാത്രം ശോഭയുള്ളതായിക്കണ്ടു എന്നു വെക്കുക. പരിവർത്തനകാലം ഒന്നായതുകൊണ്ടു രണ്ടും ഒരേ ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നു മങ്ങിക്കാണുന്നതിനാൽ അത് അധികം അകലെയാണെന്നു കരുതുകതന്നെവേണം. എത്ര അകലെ? കാഴ്ചയുള്ള പ്രകാശം അകലത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിനു വിപരീതപാതമായാൽ 16ൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രം 16ന്റെ വർഗ്ഗമുപമായ 4 മടങ്ങ് അകലെയാണെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ഇതു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകലം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതായിത്തീർന്നുവെന്നു പിന്നീടു കാണാം.

കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയതാരങ്ങളുടെ പ്രകാശപരിവർത്തനകാലം കുറെ മണിക്കൂർ മുതൽ അനേകമാസംവരേയും ഉണ്ട്. കൈകവസ്സ് 4ന്റെ പരിവർത്തനകാലം $5\frac{1}{2}$ ദിവസമാകുന്നു. കേതവസ്സ് ഗണത്തിലെ മിര എന്ന നക്ഷത്രവും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു. അതിന്റെ പ്രകാശപരിവർത്തനകാലം 11 മാസമാകുന്നു. അതിനെ മിക്ക രാത്രികളിലും വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല. കാണുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ 40 ദിവസംകൊണ്ട് ഉച്ചത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിധം നല്ല പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രമായിരിക്കും. ഉടനെ ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ പതുക്കെ. 2 മാസംകൊണ്ടു കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത നിലയെത്തും. പിന്നത്തെ 8 മാസം ഭൂരശ്മിനിയിൽകൂടി മാത്രം അതിനെ കാണാം. ഏതാണ്ട് ഈ കാലം മുഴുവനും അതിന്റെ പ്രകാശം വളരെ മന്ദമായി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എട്ടുമാസം കാണാതിരുന്നാൽ 3 മാസം മാത്രം കാണുകയും ആ കാലത്ത് അതിന്റെ പ്രകാശം വലിച്ചും ക്ഷയിച്ചും വിരികയും ചെയ്തയാലാണ് അതിനെ പാശ്ചാത്യപൂർവ്വാർ മിര എന്നു നാമകരണം ചെയ്തത്. 'മിര' എന്ന വാക്കിന് 'അതിശയകരമായത്' എന്നാകുന്നു അർത്ഥം.

ചില താരങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമവും കാണുവാൻ കഴികയില്ല. അനിയന്ത്രിതമെന്ന പോലെ അവയുടെ പ്രകാശം വലിച്ചും കുറഞ്ഞും കാണാം.

ചിലപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. 1572 നവമ്പ്ര 11-ാം തീയതി ജാതുൽനക്ഷത്രഗണത്തിൽ ടൈക്കോബ്രാഹി ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടു. അപ്പോൾ തന്നെ അതിനു രോഹിണിയോളം ശോഭയുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസം അതിന്റെ ശോഭ വലിച്ചുവന്ന് ശുക്രനോളം ശോഭയുള്ളതായിത്തീർന്നു. കണ്ണിനു സൂക്ഷ്മതയുള്ളവക്ക് അതിനെ പകൽകൂടിക്കാണാമായിരുന്നു. ഡിസമ്പ്ര മാസത്തിൽ അതു മങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. മേയിമാസമാകുമ്പോഴേക്കും

അതു കാണാതെയായി. ആ കാലത്തു റൂറൽനിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1604ൽ സപ്പ്ചർ (Ophiuchus) ഗണത്തിൽ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടതിന്റെ ചരിത്രം കെപ്ലർ എഴുതിട്ടുണ്ട്. 1866ൽ കിരീടമണ്ഡലഗണത്തിൽ വസിഷ്ഠനോളം ശോഭയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം പെട്ടെന്നു കാണപ്പെട്ടു. ഇങ്ങിനെ ഇടക്കിടെ കാണാറുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ട് മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്റ്റോടനംകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്നു ചില ആധുനികപരമാണുഗവേഷകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

റൂറൽനിന്നുണ്ടെ ആവിർഭാവം മുതൽക്കു മാത്രം ജ്യോതിഷികൾക്കു പരിചയമായി വന്നിട്ടുള്ളവയാണ് ശുക്ലപടലങ്ങൾ. ഇവ മൂന്നു തരങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തരം വേനൽമേഘപോലെയോ, എഞ്ചിനിൽനിന്നു വമിക്കുന്ന നീരാവിപോലെയോ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ജായറഗണത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ശുക്ലപടലം വളരെ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ശബരഗണത്തിൽ ത്രിമുന്തികളുടെ തെക്കഭാഗത്തായി ഒരുവുപോലെ കാണുന്ന മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടുക്കുള്ളതിനെ ആവരണം ചെയ്തു കിടക്കുന്നതും കാന്തികഗണത്തെ ആസക്തം മൂടിക്കിടക്കുന്നതും ഇതുപോലത്തെ ശുക്ലപടലങ്ങളാകുന്നു. ഈവക ശുക്ലപടലങ്ങൾ മേഘവണ്ഡങ്ങളെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മേഘശുക്ലപടലങ്ങൾ (Irregular Nebulae) എന്നു അവയെപ്പറയാം. മേഘശുക്ലപടലങ്ങളെല്ലാം വളരെ നേരിയ വാതകങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തരം റൂറൽനിന്നിടകൂടി ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കാണുന്നതുപോലെയിരിക്കും. മിക്കതും പൂത്താകാമായിരിക്കും. മദ്ധ്യത്തിൽ നക്ഷത്രംപോലെ ഒരു പ്രകാശമേറിയ ഭാഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അഭിജിത്തിന്നടുത്തുള്ള ഒരു ശുക്ലപടലം അസ്യാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വലയംപോലെയിരിക്കുന്നു. പ്രായേണ ഇവയെ ഗ്രഹബിംബങ്ങളെപ്പോലെ കാണുന്നതുകൊണ്ടു ഗ്രഹശുക്ലപടലങ്ങൾ (Planetary Nebulae) എന്നു പറയുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ശുക്ലപടലങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ അല്പശത

ങ്ങളോളമേ ഉള്ളു. മൂന്നാമത്തെ തരം ശുക്ലപടലങ്ങളാകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്. ആകൃതിയിൽ അവ പട്ടന്തുൽപ്പഴുവിന്റെ കൂടുപോലെയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വൃത്താകൃതിയോടടുത്തതും കാണാം. ഇവയെ കോശശുക്ലപടലങ്ങൾ എന്നു പറയാം. കട്ടികൂടിയ മദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ബാഹുക്കൾ ക്രമേണ വലിപ്പമേറിയവയെന്നു വൃത്തങ്ങളിൽ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആകൃതിയിലും ഇവയിൽ ചിലതിനെ കാണാം. അതിനാൽ ഇവയെ സമ്പൃതശുക്ലപടലങ്ങൾ (Spiral Nebulae) എന്നും പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലുള്ള 100 ഇഞ്ച് രസ്യമാനത്തോടുകൂടിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഈ വിധം 20 ലക്ഷത്തിൽപരം ശുക്ലപടലങ്ങളെ കാണാമെന്നു പറയുന്നു. ഇവയിൽ വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവുന്നതു ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. പൂർവ്വഖണ്ഡത്തിൽ മിരാൾ നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു അതിനെ കാണാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിലേഖത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിരീക്ഷകൻ ഇതിനെ കൊമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു വിളക്കു പോലെ കാണാമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഇതിനെ വ്യക്തമായിക്കാണാം. ആകൃതിയിൽ നീണ്ട അണ്ഡംപോലെ ഇരിക്കും. മദ്ധ്യഭാഗത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ബാഹുക്കൾ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നതും കാണാം. വലിയ ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ഇതിന്റെ ബഹിർഭാഗത്തെ വെച്ചേറെ നക്ഷത്രങ്ങളായിത്തന്നെ തിരിച്ചു കാണാം. ഈ വിധം ശുക്ലപടലങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ ഏതു ഭാഗത്തും ഏതാണ്ടൊരുപോലെ അടുത്തു കിടക്കുന്നതായിക്കാണാം. ചില ദിക്കിൽ കുറെ അധികമായും കാണാതെയില്ല.

ശുക്ലപടലങ്ങളെക്കൊണ്ടും ആകാശഗർഭഗതിലെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു തിളങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഇവയെ 'ഭൂമിക്ക് നേരെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ആകാശതുരങ്കങ്ങളോ എന്നു തോന്നും. അങ്ങിനെ വ

രാൻ അപകാശവുമില്ല. അതിനാൽ ഇവ ചില കൃഷ്ണപടല ദ്വേഷമോടെ മറവാണെന്നാണ് അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. ഈ വക മരവുകളിൽ പ്രധാനമായ ഒരു ശബരഗണത്തിലുള്ള മേഘശുക്ലപടലത്തിലും മറ്റൊന്നു ധനുനക്ഷത്രഗണത്തിലും ആകുന്നു.

നക്ഷത്രങ്ങളെ ദൂരദർശിനികൊണ്ടു നിരീക്ഷണം ചെയ്തും അവയുടെ ഛായാപടം എടുത്തും അവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തവൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി പണ്ടു വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ അവ ഖഗോളത്തിൽ സ്ഥിരങ്ങളല്ലെന്നും അവക്ക് അതിമന്ദമായ ചലനമുണ്ടെന്നും ബോദ്ധ്യമായി. എന്നാൽ ഈ ചലനത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും പൊതുവിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ടെന്നു സംശയിപ്പാൻ ഇടയായി. അതു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ സൂര്യന്റേയും അതോടുകൂടി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ചലനംകൊണ്ടു തോന്നുന്നതാണെന്നും, ഈ ചലനം ജാസി നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ നേക്കാണെന്നും, അനവധി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തെ പരിശോധിച്ചതിന്റെശേഷം തീർച്ചയാക്കി. ഇതു ആദ്യമായിച്ചെയ്തതു സേർ വില്യം ഹെർസച്ചൽ (1738—1822) ആയിരുന്നു. പിന്നീടു ആർഗ്ഗലാണ്ടർ മുതലായവരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചു. ഇവക്ക് കിട്ടിയ ഫലങ്ങളിൽ ചില ചില്ലറ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സൂര്യൻ അഭിമുഖീകരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഖഗോളസ്ഥാനം ജാസി നക്ഷത്രഗണത്തിൽതന്നെയെന്നു രണ്ടുപേരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും അവരവരുടെ അകലം അനുസരിച്ച് ജാസിയിൽനിന്നു ദൂരേക്ക് മാറുകയും ഖഗോളത്തിൽ ജാസിക്കെതിരായ ദക്ഷിണ നൗകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നടക്കാവിൽകൂടി ക്വാറിൽ പോകുമ്പോൾ മുന്തിലുള്ള മരങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും അകലുന്നതും പിന്നിലുള്ളവ അടുക്കുന്നതും നമുക്കനുഭവമാണല്ലോ. അതുപോലെയാകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ ചലനം. ഹെർസച്ചലിന്റെ കാലത്തു നക്ഷത്രങ്ങളു

ടെ യഥാർത്ഥം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സൂര്യന്റെ വേഗത നിശ്ചയിക്കുവാനോ ആലോചിക്കുവാൻ തന്നെയോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്ത കാലത്തു സൂര്യൻ ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സെക്കണ്ടിൽ 12 മൈൽ വീതം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൂര്യഗോളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷചലനംകൊണ്ടു മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു കാണുന്ന ചലനം കഴിച്ചാലും അവക്ക് പലവഴിക്കായി സഞ്ചാരമുള്ളതായിക്കാണുന്നു. ആകെക്കൂടിക്കാണുന്ന ചഗോളചലനത്തിന്നു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷചലനം (Proper Motion) എന്നു പറയുന്നു. ആകാശത്തിൽ ഒരേ പ്രദേശത്ത് അടുത്തുകാണുന്ന ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒരേ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു. സപ്തർഷികളിൽ 2, 3, 4, 5, 6 ഇവയും സപ്തർഷിമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു രണ്ടു ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും കിരീടമണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രവും, പ്രാജിതഗണത്തിലെ 2-ാം നക്ഷത്രവും മറ്റു വേറെ ചില നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരേ വഴിക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണത്രെ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം അകലെ കിടക്കുന്ന രുദ്രനും പെടും. സപ്തർഷികളിലെ 1ഉം 7ഉം മറ്റൊരു വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കാലാന്തരത്തിൽ സപ്തർഷിമണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതിക്കു മാറ്റം വരും. ഋഷഭഗണത്തിലെ 39 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നായി ഒരേ വഴിക്കും വരാസവസ്തു ഗണത്തിലെ 10 ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റ് അടുത്തുള്ള 8 നക്ഷത്രങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടു മറ്റൊരു വഴിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതായിരുന്നു. മറ്റു ചില നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരേ വഴിക്കായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിന്നു നക്ഷത്രപ്രവാഹം (Star Drift) എന്നു പറയാറുണ്ട്. നക്ഷത്രപ്രവാഹത്തെ കാര്യത്തോടുകൂടി, കാര്യം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഗണങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ചില ഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരേ വഴിക്കു നാം കാണുന്നു എന്ന ബന്ധത്തിന്നു പൂ


മെ, അതിനേക്കാൾ അടുത്തതും അത്ഭുതവത്തായതും ആയ ചില ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു വരുന്നു. ചേയങ്ങളിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിക്കവയും അന്യോന്യാകർഷണംകൊണ്ടും, അടുപ്പംകൊണ്ടും, ഉരുഭവംകൊണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നു തീർച്ചയാക്കാം.

ആകാശഗംഗയുടെ കിടപ്പും, അതിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അതിരറ്റ എണ്ണയും അവയെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും എണ്ണയും കണ്ടാലോചിച്ച് ഇവയെല്ലാം അന്യോന്യബന്ധങ്ങളോടുകൂടി ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ടവയാണോ, അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതിയും അതിൽ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനവും എന്തായിരിക്കും എന്നു മുമ്പു കെപ്ലറും, ശ്രീശങ്കരാചാര്യോപമനായ തത്വചിന്തകൻ കാൻററും, മറ്റു ചിലരും ആലോചിച്ചതുപോലെ നിരീക്ഷണവിചക്ഷണനായ സേർ വില്യം ഹെർസച്ചൽ ആലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ ആലോചനയെ സഫലമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റേയും ദൂരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥപ്രകാശം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതു ന്യായരഹിതമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ മങ്ങിക്കാണുന്നത് അവയുടെ ചെറുപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമാവാം, ചിലതു മങ്ങിക്കാണുന്നതു സ്വയം അധികം പ്രകാശമില്ലാത്തതിനാലാവാം, ചിലത് അത്യധികദൂരംകൊണ്ടും മങ്ങിക്കാണുന്നവയായിരിക്കാം. പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്കടുത്താവാനാണ് അധികം അവകാശമെന്നു സാമാന്യേന കരുതാമെങ്കിലും ഒന്നിനേയും കുറിച്ച് ഒന്നുംതന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൂടാ. ഈ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല വഴികളും ആലോചിച്ചു. അവയെയെല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാദ്ധ്യമല്ല. അവയിൽ ഒരു വഴി തന്റെ ദൂരദർശിനിയെ ആകാശത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ച് വെച്ച് അതിൽക്കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം തിട്ട

പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതിൽനിന്നു നക്ഷത്രപഞ്ചരത്തിന്റെ ആകൃതി ഒരുവിധം ഉഛരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. 20 ഇഞ്ച് രസ്യമാനമുള്ള ഒരു ദൂരദർശിനിയായിരുന്നു ഇതിനുപയോഗിച്ചത്. അതിൽകൂടി 15 കല വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തം മാത്രം ഒരു നോട്ടത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ ദൂരദർശിനിയുടെ ദൃക്ഷക്ഷേത്രം 15 കല വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തമായിരുന്നു. ആകാശഗംഗാമദ്ധ്യവൃത്തത്തിൽനിന്നു 15° , 30° , 45° , 60° , 75° , എന്നിങ്ങനെ പല അകലയായി സങ്കല്പിച്ച 5 വൃത്തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ ഒരുഭാഗത്തെ 6 വീഥികളായിത്തിരിച്ച്, കാരോ വീഥിയിലും പല ഭാഗത്തും ദൂരദർശിനിയുടെ ദൃക്ഷക്ഷേത്രത്തിൽക്കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണി ശരാശരി ഒരു ദൃക്ഷക്ഷേത്രത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാണെന്നു കണക്കാക്കി. ഫലം പ്രഥമാദിവണ്ഡങ്ങളിലെ എണ്ണം 53, 24, 14, 8, 5, 4 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു.

ദൂരദർശിനി തിരിക്കുന്ന വഴിക്കുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളേയും കാണുക, ജ്യോതിസ്സുകളെല്ലാം ഒരേ അകലത്തായി നില്ക്കുക ഈ രണ്ടു ഉപാധികളും ഒത്താൽ നിരീക്ഷണഫലത്തിൽനിന്നു ഭവഞ്ജരത്തിന്റെ ആകൃതി കൃത്യമായിത്തന്നെ കാണാം. ദൂരദർശിനിയിൽ ഒരു നോട്ടത്തിന്നു കാണുന്ന അന്തരീക്ഷഭാഗം കൂടികാകൃതി (Cone shape)യിലായിരിക്കും. ഒരേ ആകൃതിയുള്ള കൂടികകളുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ നീളത്തിന്റെ ഘനത്തിന് അനുപാതകമാകുമെന്നു ഗണകന്മാർക്കറിയാം. അതിനാൽ കൂടികകളുടെ ഉള്ളിന് അനുപാതകമായിരിക്കേണ്ട നക്ഷത്രസംഖ്യകളുടെ ഘനമൂലങ്ങൾക്കനുപാതകമായിരിക്കും കൂടികകളുടെ ദൈർഘ്യം. അതിനാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വീഥികളുടെ അതിർ 53, 24, 14, 8, 5, 4 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഘനമൂലങ്ങൾക്ക് അനുപാതകമായ അകലങ്ങളിലായിരിക്കണം. 53ന്റെ ഘനമൂലം 3.76ഉം 4ന്റെത് 1.59ഉം ആകുന്നു. അതിനാൽ ആകാശഗംഗയുടെ മദ്ധ്യരേഖയിലേക്കുള്ള അകലം 3.76 ആണെങ്കിൽ അതിനെ

തിരായ വശത്തേക്കുള്ള അകലം 1.59 എന്നു വരുന്നു. നക്ഷത്രപഞ്ചരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യാസം 1.59 ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാസം 3.76. അഥവാ ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യാസം 1 ആണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും വലിയതു $3.76 \div 1.59 = 2.37$. നാം ഈ പഞ്ചരത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലെന്നും വന്നു. ഈ ആകൃതി പരിലേഖത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉള്ളി



പരിലേഖം 51.

പുള്ളത് ഈ ആകൃതിയും പുറമെയുള്ളതു പിന്നീടു ഭേദപ്പെടുത്തിയ ആകൃതിയും ആകുന്നു. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആകൃതി ശരിയാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉപാധികൾ രണ്ടും ഒത്തിരിക്കണം. ഉപാധികൾ രണ്ടും പഞ്ചരത്തിലില്ലായ്കയാൽ പല ഭേദങ്ങളും കല്പിക്കേണ്ടിവന്നു.

ഒന്നാമതു നക്ഷത്രപഞ്ചരത്തിന്റെ അകന്നതോ അടുത്തതോ ആയ അതിരവരെ ഹെർസച്ചലിന്റെ ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടിക്കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത് ആകാശത്തിൽ അവിടവിടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത കൂട്ടങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ ആകൃതിക്കുതന്നെ പലേടത്തും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കല്പിക്കേണ്ടിവരും. നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാം അന്യോന്യം ഒരേ അകലത്തു നില്ക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചതും ശരിയല്ല. അധികം ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രായേണ നമുക്കടുത്തിരിക്കും. ദൂരദർശിനിയുടെ കാരോ ദൃക്ഷേത്രത്തിലും കണ്ട നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശോഭയെക്കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷഭാഗത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ കറയധികം അടുത്തടുത്ത സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ എന്നു തോന്നി. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് സെർ വില്യം ഹെർസച്ചലിനും അദ്ദേഹത്തി

ന്റെ അടുത്ത അനുഗാമികൾക്കും ഭവഞ്ജരത്തിന്റെ കൃത്യമായ ആകൃതി സുദൃഢമായിപ്പറയുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭവഞ്ജരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അതിരിനെക്കാൾ 5 മടങ്ങ് അകലെയായിരിക്കണം ഏറ്റവും അകലെയുള്ള അതിരെന്നും, ഭവഞ്ജരത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും, സൂര്യനടുത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ അന്യോന്യം അടുത്തു നില്ക്കുന്നുവെന്നും വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് ശരിയായിരിക്കുക എന്നു മാത്രം അവർ പറയുവാൻ സാധിച്ചു. ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം ഉപഹങ്ങളാണ് ശരിയെന്നു പിന്നീട് കാണാം.

കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ഭവഞ്ജരങ്ങളുടേയും, പടലങ്ങളുടേയും അകലം ഏതാണ്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ കണക്കാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവഞ്ജരത്തിന്റെ ആകൃതി വിലും ഹെർസച്ചൽ ആലോചിച്ചതുപോലെയാണെന്നും, എന്നാൽ സൂര്യൻ ഭവഞ്ജരകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു പറയത്തക്ക അകലത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നും, കോശശക്തി പടലങ്ങളെല്ലാം നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭവഞ്ജരത്തിനു പുറത്തുള്ള ഭവഞ്ജരങ്ങളാണെന്നും വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ നിരീക്ഷണനിരൂപണഗണനവിചക്ഷണന്മാരായ ജ്യോതിഷികൾക്കു നിണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ജ്യോതിസ്സുകളുടെ അകലത്തെ നിണ്ണയിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചിലതു പറയാം.

6. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അകലവും

ആകാശഗംഗാസ്വരൂപവും

അടുത്ത ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അകലം അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായതു ക്ഷേത്രഗണിതമാർഗ്ഗമാകുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ സാരമായ ഭാഗം ഒരു ഉപതാനരേഖ (Base line) യും അതിന്റെ അ



ഗുണങ്ങളിൽനിന്നുളക്കാവുന്ന രണ്ടു കോണുകളുമാകുന്നു. പരിലേഖത്തിൽ 'ദ' എന്നത് ഉപതാനരേഖയും 'ഗ' എന്നതു ഭൂരം അറിയേണ്ട വസ്തുവും ആകുന്നു. 'ദ' എന്ന ഉപതാനത്തിന്റേയും $\angle$ ഗദന, $\angle$ ഗനദ ഈ കോണുകളുടേയും അളവുകൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രഗണിതം വഴി ദഗ, നഗ എന്ന രണ്ടു രേഖകളേയും കൃത്യമായി കണക്കാക്കാം. $\angle$ ദഗന എന്നത് ഉപതാനാഗ്രങ്ങളിൽനിന്നു വസ്തുവെ കാണുന്ന ദിക്ഷകളുടെ അന്തരമാകുന്നു. ഇതിന് ഉപതാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 'ഗ' എന്ന വസ്തുവിന്റെ ദിഗ്ഭ്രംശം (Parallax) അല്ലെങ്കിൽ 'പരിഭ്രംശം' എന്നു പറ

പരിലേഖം 52. യുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ ഭൂരം അളന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ ഭൂവ്യാസാൽ ഉപതാനവും ഉപതാനാഗ്രങ്ങളായ ഭൂപുഷ്പസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും ചന്ദ്രബിംബമദ്ധ്യത്തെക്കാണുന്ന സ്തൂത്രങ്ങളും ഭൂവ്യാസാൽവുമായുള്ള കോണുകളും ചന്ദ്രഗതി വഴിക്ക് അറിഞ്ഞി

രുന്നു. ഭൂവ്യാസാലം ചന്ദ്രനിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോണിനെ ചന്ദ്രന്റെ പരിഭ്രമമെന്നു പറയുന്നു. ഇവിടെ ചന്ദ്രനു നേരിട്ടു നില്ക്കുന്ന, എന്നു വെച്ചാൽ ഭൂചന്ദ്രസൂത്രത്തിനു വിലങ്ങനെ നില്ക്കുന്ന, ഭൂവ്യാസാലത്തെയാണ് നാം ഉപതാനമായിക്കരുതുന്നത്. സൂര്യന്റെ ദൂരം അളന്ന മാറ്റത്തിൽ ഭൂപൃഷ്ഠത്തിൽ അകലെ നില്ക്കുന്ന രണ്ടു നിരീക്ഷണശാലകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെയാണ് ഒന്നാമത് ഉപതാനമായിക്കരുതുന്നത്. എങ്കിലും ഗണിതത്തോടുകൂടിയോ ഗണിതത്തിനുശേഷമോ സൂര്യബിംബകേന്ദ്രത്തിന് അഭിമുഖമായി നില്ക്കുന്ന ഭൂവ്യാസാലം സൂര്യനിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോണിനെ സൂര്യന്റെ പരിഭ്രമമായിപ്പറയുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണപദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപതാനരേഖയുടെ ലക്ഷ്യമോ പത്തു ലക്ഷ്യമോ മടങ്ങുള്ള അകലങ്ങളെ ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി ഗണിക്കാം. സ്വല്പതിരങ്ങൾ തീരെ ഒഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു വരികയുള്ളൂ.

സൂര്യനിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ അകലം അറിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഉപതാനരേഖ കരസ്ഥമാകുന്നു. സൂര്യനു ചുറ്റുമുള്ള സഞ്ചാരംകൊണ്ടു ഭൂമി ഒരിക്കൽ നില്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 18,60,00,000 മൈൽ അകലെപ്പോകുന്നു. ഇതിനെ ഉപതാനരേഖയായിക്കരുതി ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഖഗോളസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ഭ്രംശം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവയുടെ അകലം ആ ഭ്രംശത്തിൽനിന്നു നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഇങ്ങിനെ കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിരീക്ഷണം ചെയ്തുകിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളിൽനിന്നു സൂര്യന്റേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും അന്തരീക്ഷസഞ്ചാരംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ഥാനമാറ്റങ്ങളെ വകവെക്കുവാൻ കുറെ പാടുപെടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ദൂരദർശിനിയുടെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം ഒട്ടുംതന്നെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാലായിരുന്നു ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കുവാൻ ധീഷ

ണാനിധികളായ പണ്ഡിതന്മാർക്കു മടിച്ചത്. ദൂരദർശിനികൊണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അപേരണം, അന്തരീക്ഷചാരം മുതലായ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷകന്മാർ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷസഞ്ചാരം മറുക്കുവയുടേതിനെക്കാൾ വളരെയധികമായിക്കണ്ടപ്പോൾ, അവ നമുക്ക് കുറെ അടുത്തതാണെന്നു ജ്യോതിഷികൾ സംശയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ 1838ൽ ജർമ്മൻ ജ്യോതിഷിയായ ബസ്സൽ ജായരഗണത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രം (ജായര 61) നമുക്ക് വളരെ അടുത്തതാണെന്നു വിചാരിച്ച് അതിന്റെ ദൂരം നിശ്ചയിക്കുവാൻ പട്ടംകൂട്ടി. രണ്ടുകൊല്ലത്തോളം ജായര 61ന് അടുത്തുള്ള നന്നെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി പല അളവുകളും എടുത്ത് കണക്കാക്കി, ഭൂകക്ഷയുടെ വ്യാസാർദ്ധം ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ 0.35 വികലയോളം പോന്ന ഒരു കോൺ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടു. സാങ്കേതികഭാഷയിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വാഷ്ഠികപരിഭ്രംശം 0.35 വികലയെന്നു തീർച്ചയാക്കി. അടുത്ത കാലത്തു എഡിങ്ങ്ടൻ സർവീകരിച്ചുകാണുന്ന വാഷ്ഠികപരിഭ്രംശം 0.31 വികലയാകുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതു നമ്മിൽനിന്നു സൂര്യനെക്കാൾ 6,65,000 മടങ്ങ് അകലെയാകുന്നു. സെക്കണ്ടിൽ 1,86,000 മൈൽ വീതം സഞ്ചരിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ എത്തുവാൻ $10\frac{1}{2}$ കൊല്ലം വേണം. സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഭാഷയിൽ ജായര 61 എന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദൂരം $10\frac{1}{2}$ ദിപ്തിവർഷമാകുന്നു. ഒരു ദിപ്തിവർഷത്തിന്നു 5.87×10^{12} * നാഴികയെന്നു കാണാം.

ഈ കാലത്തിനടുത്തുതന്നെ ഹെൻഡർസൻ, സ്കോവ്, എന്നിവർ കിനാറവസ്സ് 1, അഭിജിത്ത് എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളു

* 12 പത്തുകളെ ഒന്നായിപ്പെരുക്കിയ ഫലത്തെ ചുരുക്കത്തിന്നുവേണ്ടി 10^{12} പത്തെ (സ്വപ്നം പത്തുണ്ട്) എന്നെഴുതുന്നു. ഉം $10^2=100$, $10^5=1,00,000$.

ടേയും അകലങ്ങൾ അളന്നു. ഇവ ക്രമേണ 4.31 ദീപ്തിവർദ്ധനും 27 ദീപ്തിവർദ്ധനുമാകുന്നു. കിനാരവസ്സ് 1നടുത്തു നില്ക്കുന്ന പ്രത്യാസനകിനാരവസ്സാകുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം. അതിന്റെ അകലം 4.27 ദീപ്തിവർദ്ധനും മാത്രമാകുന്നു. അതു എത്രയോ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രമാകയാൽ വലിയ ദൂരദർശിനികളിൽ കൂടിയല്ലാതെ അതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള തൂണു എന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദൂരം 8.6 ദീപ്തിവർദ്ധനും പ്രോസിഡോന്റെ ദൂരം 10.9 ദീപ്തിവർദ്ധനും, രോഹിണിയുടേതു 21.7ഉം ഷഡ്യാസ്യന്റേതു 27.2ഉം ആകുന്നു. ഇവയെല്ലാമാകുന്നു അറിയുന്നേടത്തോളം നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ. ധ്രുവനക്ഷത്രം നമ്മിൽ നിന്നു 46.5 ദീപ്തിവർദ്ധനും അകലെയാണത്രെ.

കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയതാരങ്ങളെപ്പറ്റി മുമ്പു പറഞ്ഞതു കാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ചില കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയതാരങ്ങളുടേയും അകലം ക്ഷേത്രഗണിതമാർഗ്ഗമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അളന്ന ഒരു ക്ഷയോപചയതാരത്തിന്റെ 100ൽ കരംശംമാത്രം പ്രകാശമുള്ള മറ്റൊരു ക്ഷയോപചയതാരത്തെക്കാണുകയും, അവക്ക് രണ്ടിന്നും ഒരേ പ്രകാശപരിവർത്തനകാലമായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, രണ്ടാമത്തേതു മറ്റേതിന്റെ 10 മടങ്ങ് അകലെയാണെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. ഈ പത്തു മടങ്ങ് അകലമുള്ള താരം ഒരു ഭവയത്തിലോ ശുക്ലപടലത്തിലോ ആയെന്നു വരാം. അവിടെ ദീർഘപരിവർത്തനകാലമുള്ള മറ്റൊരു കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയതാരമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ പരിവർത്തനകാലവും തേജസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിശ്ചയിക്കാം. അതിന്നുശേഷം മറ്റൊരു പ്രദേശത്തു അതേ പരിവർത്തനകാലമുള്ള ഒരു കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയതാരത്തെ 25ൽ കരംശം തേജസ്സുള്ളതായി ഇവിടന്നു കണ്ടാൽ, അതു മുമ്പു കണ്ട ഭവയത്തെക്കാളോ പടലത്തെക്കാളോ 5 മടങ്ങ് അകലെയാണെന്നുമാനിക്കാം. മിക്ക ഭവയങ്ങളിലും ശുക്ലപടലങ്ങളിലും കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളതിനാൽ

ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി വളരെ അകലെയുള്ള ഭവയങ്ങളുടേയും ശുക്ലപടലങ്ങളുടേയും അകലം നിണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ 10 ലക്ഷം ദീപ്തിവർഷംവരെയുള്ള അകലത്തെ നിണ്ണയിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പറയുന്നത്. 100 ദീപ്തിവർഷം അകലംതന്നെ ക്ഷേത്രഗണിതമാഗ്ഗംകൊണ്ടു നിശ്ചയിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണത്രെ. പരിവർത്തനകാലം അതിദീർഘമായ കൈകവസ്സു് ക്ഷയോപചയങ്ങൾ സൂര്യനെക്കാൾ 10,000ത്തിലധികം മടങ്ങ് തേജസ്സുള്ളവയാണ്. അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഗാധതയിലേക്കു കറയൊക്കെ എത്തിനോക്കുവാൻ ജ്യോതിഷികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആകാശത്തിൽ അവിടവിടെയായിക്കാണുന്ന പുതിയ താരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉച്ചതേജസ്സ് എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെയാണെന്നുള്ളതിന്നു തെളിവുകളായ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവിടന്നു ഒരു പുതിയ താരം മങ്ങിക്കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതു അധികം ദൂരത്തായതുകൊണ്ടു മാത്രമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പുതിയ താരങ്ങളുടെ കവിഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽനിന്നു അവ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ദൂരം നിണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്.

നീലനിറമുള്ള എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ തേജസ്സാണെന്നു ജ്യോതിഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നീലനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽനിന്നു അവയുടെ അകലം നിണ്ണയിക്കാം.

നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തെ വിരാജനികൊണ്ടു പരിശോധിച്ചാൽ അതു സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാമെന്നും, അവയിൽനിന്നു ദൂരത്തെ അനുമാനിക്കാമെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ള ന്യായങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമായ ചില സംഗതികളിൽ ധാരാളം അവ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

നൂറോളമുള്ള ഗോളഭവയങ്ങളുടെ അകലം കൈകവസ്സു് ക്ഷയോപചയതാരങ്ങൾവഴി നിണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവയിൽ ഏറ്റവും അടുത്തതു കിനാരവസ്സ് നക്ഷത്രഗണത്തിലാകുന്നു. അതിന്റെ ദൂരം 22,000 ദീപ്തിവർഷമാകുന്നു. ഏറ്റവും അകന്ന ഗോളഭവയം 2,20,000 ദീപ്തിവർഷം അകലേയുമാകുന്നു. ഇവയുടെ എല്ലാം ദിക്കും ദൂരവും അറിയുന്നതിനാൽ മൗണ്ട് വിൽസൻ നിരീക്ഷണശാലാധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഷേപ്ലി ഇവയെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതതു സ്ഥാനത്തു സങ്കല്പിച്ചു. ഇവയെല്ലാം ആകാശഗംഗാമധ്യതലത്തിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഏറ്റവും നീണ്ട വ്യാസം 2,50,000 ദീപ്തിവർഷം ദൈർഘ്യമുള്ളതാകുന്നു. ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ വശത്തായി സൂര്യൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാലാകുന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവയെ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രമായി നാം കാണുന്നത്. വൃശ്ചികസ്പന്ധരഗണങ്ങളിൽ അതിനിബിഡമായി മേഘംപോലെ കാണുന്ന ആകാശഗംഗാവണ്ഡം ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണെന്നും അതിൽനിന്നു 47,000 ദീപ്തിവർഷം അകന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആകാശഗംഗയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും മേഘഗ്രഹശുക്ലപടലങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ സർവ്വേക്ഷല്ലകൾപോലെയാണ് ഗോളഭവയങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെന്നു ഒരു വിധം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഗോളഭവയമണ്ഡലകേന്ദ്രമായ നക്ഷത്രമേഘത്തിലാകുന്നു. വില്യം ഹെർസച്ചലും തന്റെ അനുഗാമികളും നിശ്ചയിച്ച ആകൃതിതന്നെയാണ് ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിനുള്ളത്. എന്നാൽ അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ സൂര്യൻ ആകാശഗംഗാമണ്ഡലകേന്ദ്രസ്ഥനല്ല. മധ്യത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് ശരാശരിയെക്കാൾ കുറവ് അധികം പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ അംഗമായിട്ടാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നാം വളരെ പ്രകാശമുള്ളവയായിക്കാണുന്നത്. ഇവയെല്ലാംകൂടി

ഒരു പ്രത്യേകഭവയമെന്ന നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ആകാശഗംഗാമദ്ധ്യതലത്തിനു വളരെ അടുത്താകുന്നു ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മദ്ധ്യം.

ആകാശഗംഗയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷഭേദത്തിന്റെ സ്വരൂപം ഒന്നു നന്നായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു വിസ്താരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നു മാത്രം മദ്ധ്യത്തിൽ കനമുള്ള ഒരു 'ഇഡ്'ലി'പോലെയാകുന്നു. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യതലം ഒരു വൃത്തമാണെന്നു. ആ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലാകുന്നു വൃശ്ചികസൂര്യധരഗണങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന നിബിഡമായ നക്ഷത്രമേഘം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു വ്യാസാർദ്ധത്തിന്റെ സുമാർ $\frac{2}{5}$ ഭാഗം അകലത്ത് മദ്ധ്യവൃത്തതലത്തിന്നടുത്തുതന്നെ കേന്ദ്രമായ ഒരു ഉപസമൂഹത്തിലെ അംഗമാകുന്നു സൂര്യൻ. ഇവിടുന്നു വിപുലമായ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിന്റെ വിസ്താരമേറിയ ഭാഗത്തേക്കു നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണമില്ലാത്തതും നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്നായിക്കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെറും പ്രകാശരൂപമായി ആകാശഗംഗയെ നാം കാണുന്നത്.

ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചലനവുമില്ലാതെ നിന്നാൽ അവയെല്ലാം ഗുരുതപാകർഷണംകൊണ്ടു കേന്ദ്രത്തിലേക്കു പതിച്ച് അടിഞ്ഞുകൂടും. അങ്ങിനെ വരാതിരിക്കുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിന്നു ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലായിരിക്കണമെന്നു ഹ്രാൻസിലെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഹെൻറി പോൻക്കറ 1913ൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകയും അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ 50 കോടി വർഷംകൊണ്ട് ഒരു പരിവർത്തനം തികക്കണമെന്നു ഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്തന്നെ ഒരു നിരീക്ഷകൻ ഇതു നോക്കിക്കണ്ടതായി പ്രസ്താവിച്ചു. ഭൂമി ഒരു പമ്പരംപോലെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അക്ഷത്തിന്നു ദിഗ്മാറ്റം വരുന്നതു ഗോളാകൃതിയിൽനിന്നു ക

വിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിന്മേൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടാണെന്നു നാം കണ്ടു. സൗരവ്യൂഹംതന്നെ ഒരു ചമ്പരമാകുന്നു. ഇതിന്റെ അക്ഷം ദക്ഷിണോത്തരരാശികൂടങ്ങളെ ചേർക്കുന്ന രേഖയുമാകുന്നു. ഈ സൗരവ്യൂഹാക്ഷത്തിന്ന് ആകാശഗംഗാപശ്ചാത്തലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 37 കോടി കൊല്ലത്തിൽ വട്ടം തിരിക്കുന്ന ഒരു ചലനമുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകൻ കണ്ടത്. പിന്നീട് അളവുകളെല്ലാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 37 കോടിയെന്നതിനെ മാറി 53 കോടിയാക്കുകയും ചെയ്തു. എഡിങ്ടൻ ഇത് അക്ഷത്തിന്റെ ചലനമല്ലെന്നും പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ എതിർവശത്തേക്കുള്ള ചലനമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭ്രമണം പമ്പരത്തിന്റെ ഭ്രമണംപോലെയാണല്ലോ. കേന്ദ്രത്തിനടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കുറവേഗത്തിലും അകലെയുള്ളവ കുറേ മന്ദമായും സഞ്ചരിക്കും. ഇതു സൗരവ്യൂഹത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെയാണത്രെ. അങ്ങിനെ സൂര്യന് ഒരു പരിവർത്തനം തിരിക്കുവാൻ 23 കോടി കൊല്ലം വേണമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിവർത്തനയാത്രയിൽ സൂര്യനും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഏതാണ്ട് സെക്കണ്ടിൽ 200 മൈൽ വീതം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിന്റെ വിസ്താരവും ഭ്രമണകാലവും അറിഞ്ഞാൽ, ആകർഷണഗണിതവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്ക് അതിന്റെ ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കാം. ഇങ്ങിനെ ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യനിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ 24,000 കോടി മടങ്ങ് ദ്രവ്യമുണ്ടെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നാം കാണുന്ന മേഘശുക്ലപടലങ്ങളിലും ഗ്രഹശുക്ലപടലങ്ങളിലും ഉള്ള ദ്രവ്യവും പെട്ടും. നമുക്കറിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശരാശരി തൂക്കത്തെക്കാൾ സൂര്യന്റെ തൂക്കം കുറവു അധികമാകുന്നു. ഈ സംഗതികളെല്ലാം ആലോചിച്ച് ആകാശഗംഗയിൽ 40,000 കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൂറിനു

ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി ഫോട്ടോ എടുത്തു കിട്ടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 150 കോടി മാത്രമാകുന്നു. അതിനാൽ ആകാശഗംഗയിലെ ഒരു ചെറിയ അംശം നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണവിശ്വം ധർമ്മാർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആകാശഗംഗയുടെ ദൃഢമാനതയെ രവിദൃഢമാനത്തിന്റെ 11,000 കോടിയാണെന്നും 18,000 കോടിയാണെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആകാശഗംഗാമണ്ഡലനിരൂപണത്തിൽനിന്നു കോശശുക്ലപടലങ്ങളെ വിട്ടു വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കും. ഇതിന്നു കാരണം വിശേഷിച്ചൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് കുറെ അടുത്തതാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുള്ള കോശശുക്ലപടലം മിരാൻ നക്ഷത്രഗണത്തിൽ കാണുന്നതാകുന്നു. ഇതു M31 എന്ന നമ്പ്ര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ അകലം നമ്മിൽനിന്നു 9,00,000 ദീപ്തിവർഷമാണത്രെ, എന്നു വെച്ചാൽ ആകാശഗംഗയുടെ കവിഞ്ഞ വിസ്താരത്തിന്റെ 3-6 മടങ്ങ്. ഇതിലും അടുത്ത മറ്റൊരു കോശശുക്ലപടലമുണ്ട്. അതു ത്രി കോണമണ്ഡലത്തിലെ M33 എന്നതാകുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത്. ഇതിന്റെ അകലം നമ്മിൽനിന്നു 850,000 ദീപ്തിവർഷമാകുന്നു, ആകാശഗംഗാമഹാപ്രാസത്തിന്റെ 3.4 മടങ്ങ്. ഇതിന്റെ ആകൃതി പട്ടുന്തൽ പഴുവിന്റെ കൂടുപോലെയല്ല. ഏതാണ്ട് സമവൃത്തം പോലെയാകുന്നു. മണ്ഡലത്തിന്റെ മദ്ധ്യവൃത്തത്തിന്നു നേരെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി. മറ്റൊരു വശത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ ഇതിന്റേയും ആകൃതി പട്ടുന്തൽ പഴുക്കൂടുപോലെയൊരാം. ഈ രണ്ടു കോശശുക്ലപടലങ്ങളെപ്പോലെ, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള 20 ലക്ഷത്തിൽപരം കോശശുക്ലപടലങ്ങൾ ആകാശഗംഗയുടെ പുറത്തു കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അവയെ ആകാശഗംഗാമണ്ഡലനിരൂപണത്തിൽനിന്നു കേവലം വിടേണ്ടിവന്നത്.

കോശശുക്ലപടലങ്ങളെ ദൂരദർശിനികൊണ്ടും വിരാജനികൊണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവ കാരോന്നം ആകാശഗംഗാമ

ണ്ഡലത്തെപ്പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഭേദങ്ങളെക്കൊണ്ടും മേഘശുക്ലിപടലാദികളെക്കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതായിക്കാണുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ആകാശഗംഗാമണ്ഡലവും കോശശുക്ലിപടലങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള വില കോശശുക്ലിപടലങ്ങളുടെ തുക്കം കണക്കാക്കിട്ടുണ്ട്. M31ന്റെ തുക്കം സൂര്യന്റെ 350 കോടി മടങ്ങ് മാത്രമാകുന്നു. അറിഞ്ഞേടത്തോളം അടുത്തുള്ള കോശശുക്ലിപടലങ്ങളിൽ കുറെ അധികം വലിയ ഒരു ശുക്ലിപടലമാണ് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗാമണ്ഡലം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കോശശുക്ലിപടലം നമ്മുടേതാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായവുമില്ല.

അന്തരീക്ഷസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് കോശശുക്ലിപടലങ്ങൾ. അവയിൽ കുറെ വലിയ ഒരു ഗ്രാമമാകുന്നു ആകാശഗംഗാമണ്ഡലം. ഇവിടത്തെ നിവാസികളാകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഇവയുടെ ഇടയിൽ വലിപ്പംകൊണ്ടും പ്രഭാവംകൊണ്ടും സൂര്യനെക്കാൾ മഹാത്മാരും എളിയവരുമുണ്ടെന്നു പിന്നീട് കാണാം. ഇവയിൽ സാമാന്യം ഭേദമായ ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനെന്നു കരുതുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത ആദിത്യൻ. നമ്മുടെ നക്ഷത്രഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർ ഒരു വിധം നാം മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്തിന് അതിരണ്ടോ ഇല്ലയോ? അതിരുണ്ടെന്നാണ് പ്രബലപ്പെടുത്തുന്ന അല്ല, പ്രബലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആധുനികാഭിപ്രായം. കുറെക്കൂടി കൃത്യമായിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിരില്ലെങ്കിലും, പരിമിതമായതെന്നാണ് അഭിപ്രായം. അതിനെ ഗോളമെന്ന നിലയിൽ കരുതിയാൽ അതിൽ പ്രകാശത്തിന്നു സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൂരത്തിന്റെ 500ൽ ഒരംശം മാത്രം അടുത്തു കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ മാത്രമേ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരദർശിനികൊണ്ടു കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം 14 കോടി ദീപ്തിവർഷമാണെന്നു ഡോക്ടർ ഹബ്ബിൾ മുതലായ ഗവേഷകാഗ്രേസരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ സീതാവേണി കുന്നി മുതലായ ന

ക്ഷത്രങ്ങളുടെ വഴിക്ക് അധികം അടുത്തടുത്തു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമാന്യേന ഒരേ അക്ഷതയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഈവിധം ദൂരങ്ങളെ ഉറഹിക്കുന്നത്.

ചില കോശശുക്രപടലങ്ങളുടെ ബഹിർഭാഗത്തെ ദൂരദർശിനികൊണ്ടു വെച്ചേറേ നക്ഷത്രങ്ങളായി വേർതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ അങ്ങിനെ വേർതിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്തർഭാഗത്തെ ദ്രവ്യം മിക്കവാറും വാതകരൂപത്തിലാണിപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതെന്നും, അവിടെ ഇപ്പോഴും സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

7. ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തം

ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തത്തെ കണ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ഗോളത്തിന്റെ പുറഭാഗത്തുമാത്രം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദേശത്തിന്നതിരില്ല. എങ്കിലും ആ ദേശം പരിമിതമാകുന്നു. ഗോളപൃഷ്ഠത്തിന്നു അതിരില്ലായ്മയും എന്നാൽ പരിമിതാവസ്ഥയും ഒരുമിച്ചു വരുവാൻ കാരണം അതു എവിടേയും നീളത്തിനും വീതിക്കും ലംബമായ ഘനത്തിന്റെ വശത്തേക്കു വളയുന്നതുകൊണ്ടും വളഞ്ഞത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. വൃത്തപരിധിയും പരിമിതവും അതിരില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ഗോളപൃഷ്ഠനിവാസിയാല ജീവിക്ക് നീളവും വീതിയുമല്ലാതെ ഘനം എന്ന കണങ്ങുന്നറിവാൻ സാധിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഗോളപൃഷ്ഠത്തിന്റെ പരിമിതാവസ്ഥ ചില അനുമാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുവാനല്ലാതെ അതു കാണുവാനോ വിഭാവനം ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ദൈവമാനികജീവിക്ക് ഒരു ത്രൈമാനികവസ്തുവിന്റെ ബാഹ്യം പരിമിതമെന്നറിവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അതുപോലെത്തന്നെ നീളം, വീതി ഘനം എന്നീ മൂന്നു മാനങ്ങളെമാത്രം അറിവാൻ സാധിക്കുന്ന ത്രൈമാനികരായ നമുക്ക് ചതുർമാനികലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യം മാത്രമായ ത്രൈമാനികദേശത്തിന്നു അതിരില്ലെങ്കിലും അതു പരിമിതമാകുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കും. എങ്കിലും നാം അധിവസിക്കുന്നതും നീളം, വീതി, ഘനം ഈ മൂന്നു മാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നതും ആയ പ്രപഞ്ചം ഒരു ചതുർമാനികലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യം മാത്രമാണെന്നും അതിൽ ഏതു വഴിക്കു പോയാലും അതിരില്ലെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും അതു പരിമിതമാകുന്നു എന്നുമാണ് ആ

പേക്ഷികസിദ്ധാന്തം നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഏതു വശത്തേക്കു പോയാലും ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെ എത്തുന്നതുപോലെ കോശശുക്ലപടലങ്ങളായ നക്ഷത്രഗ്രാമങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഈ പ്രത്യക്ഷലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്കു നോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുതന്നെ എത്തും. അതിനാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട രശ്മികൾ അനേകകോട്ടുണ്ടു് തെ സഞ്ചാരത്തിനുശേഷം പുറപ്പെട്ടുപോകും ആ നക്ഷത്രം നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്തു് ഒരുമിച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഒരു മങ്ങിയ പ്രേതരൂപത്തെ ഉരുവിപ്പിച്ചു എന്നു വരാം.

ദൃശ്യവസ്തുക്കളുടെ നാലാമത്തെ മാനം സമയമാകുന്നു. വസ്തുക്കളിൽനിന്നു പ്രകാശരൂപമായും ശബ്ദരൂപമായും മറ്റും വരുന്ന ചില തരംഗങ്ങളിൽനിന്നാണ് നമുക്ക് വസ്തുജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ വസ്തുക്കളെ നാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾവഴി നേരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതു തരംഗങ്ങളാകുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന മാനസികഭാവങ്ങളെ നാം പ്രാപ്യാനിച്ച് വസ്തുക്കൾക്ക് രൂപം, സ്ഥാനം മുതലായ ചില ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രാപ്യാനമല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തെ നാം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രാപ്യാനത്തിൽ സമയത്തെ നാം വസ്തുക്കളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തി നിയതഗതിയോടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രവാഹമായിക്കല്പിച്ച്, നീളം, വീതി, ഘനം എന്നീ മൂന്നു മാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു വസ്തുക്കൾക്ക് രൂപവും സ്ഥാനവും നല്കുന്നു. സമയത്തിന്നു വസ്തുക്കളുടെ ചരിത്രത്തിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഇതു പ്രാപ്യാതാക്കളായ നമ്മുടെ പ്രാമോഹങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്. സമയത്തിന്റെ കല്പിപ്പില്ലാതെ വസ്തുക്കളില്ല. നീളം, വീതി, ഘനം, സമയം ഈ നാലു മാനങ്ങളും തുല്യനിലയിൽ കലന്ന് ഒരു ഗണിതതന്ത്രത്തിന്നു മാത്രമേ യഥാർത്ഥവസ്തുസ്വഭാവം വെളിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ നാലു മാനങ്ങളേയും ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ

ണിതതന്ത്രത്തിന്നു പഴയ ഗണിതംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത മില സംഗതികളെ സങ്കാരണം വിശദീകരിപ്പാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് ബുധകക്ഷയുടെ മനോച്ചപ്രതിമനോച്ചരേഖയുടെ നിരീക്ഷണസിദ്ധമായ ഭ്രമണഗതി. ആ ഗതിക്ക് മുഴുവൻ കാരണം പറവാൻ ഗുരുതപാക്ഷണസിദ്ധാന്തത്തിന്നു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊന്നാണ് സൂര്യബിംബത്തിന്റെ അരികിൽകൂടി വരുന്ന നക്ഷത്രരശ്മികളുടെ വക്രത. ഇതു പൂണ്ണഗ്രഹണസമയത്തേ കാണുവാൻ സാധിക്കുവുള്ളു. നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്നു നക്ഷത്രത്തിന്റെ തൂക്കത്തേയും വലിപ്പത്തേയും അനുസരിച്ച് ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതിനാൽ നക്ഷത്രവിരാജികയിലെ ഇരുണ്ട രേഖകൾ ചുവപ്പുവണ്ണത്തിന്റെ നേക്കു തെറിക്കാണെന്നെന്നു ഈ ഗണിതതന്ത്രപ്രകാരം കാണുന്നതും പരീക്ഷണത്തിൽ ഒത്തു കാണുന്നു. ഇതു നക്ഷത്രം അടുത്തായാലും അകലെയായാലും സംഭവിക്കും. ഭൂന്റെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ തൂക്കം അറിഞ്ഞതിന്റെശേഷം അതിന്റെ വ്യാസം കണക്കാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഈ തത്വത്തെ അവലംബിച്ചാകുന്നു. ഗ്രഹഗുരുത്വപടലങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽക്കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതും ഈ തത്വം മൂലമാകുന്നു. ചതുർമാനഗണിതതന്ത്രത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാവും നിർമ്മാതാവുമായ ഋഷിവർമ്മൻ ഡോക്ടർ ആറുബട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആകുന്നു. ഈ ഗണിതതന്ത്രത്തിലേക്കു ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ഇതുപ്രകാരം നാം ഒരു വസ്തുവെ നോക്കി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്ന അളവുകൾ ആ വസ്തുവെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്കുള്ള ചലനവേഗതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ദൃഷ്ടാവിന്റേയും ദൃശ്യവസ്തുവിന്റേയും ചലനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചായിരിക്കും ദൃഷ്ടാവിന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുസ്വരൂപജ്ഞാനം. അതിനാൽ ഈ ഗണിതതന്ത്രതത്വത്തെ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തം (Theory of Relativity) എന്നു പറയുന്നു. ഋജുവെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്ന രേഖകൾ വക്രമായിരിക്കാം. വക്ര

മെന്നു തോന്നുന്നവ ഋജുവായിരിക്കാം. അപരിമിതമെന്നു കരുതിപ്പോന്ന അന്തരീക്ഷം പരിമിതമായിത്തീർന്നു. ഗുരുതപാകഷണത്തെ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തം നിഷേധിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കഴിയുന്നതും ഋജുരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആയതവൃത്തങ്ങളിൽ പോകുന്നതായിത്തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ പരിധികൾക്കുള്ളിൽ യഥാർത്ഥഗണിതത്തിന്റെ ആസന്നരൂപമെന്നു കരുതാവുന്ന ഗുരുതപാകഷണഗണിതത്തിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്. ചെറിയ അന്തരങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽപ്പെടുകയില്ലെന്നു സാരം.

ഐൻസ്റ്റീനും അദ്ദേഹത്തെത്തുടർന്നു ഡി. സിറാർ മുതലായവരും ദ്രവ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അല്പമൊന്നു ഇവിടെപ്പറയാം.

ഐൻസ്റ്റീന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആ സകലമായ ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിന്നാധാരമെന്നു കരുതുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വലിപ്പം. ദ്രവ്യം ചുരുങ്ങിയാൽ വക്രത ചുരുങ്ങി അന്തരീക്ഷം വലുതായിരിക്കും. ദ്രവ്യം അധികമായാൽ വക്രത അധികമായി അന്തരീക്ഷം ചെറുതായിരിക്കും. ഇതാണത്രെ ബന്ധം. അതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം എത്രയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കാം. ഈ നിശ്ചയിച്ചതിൽനിന്നു വിഭിന്നമായി വേറിട്ട് അന്തരീക്ഷ (Space)മേ ഇല്ല. സൂർ്യന്റേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും വലിപ്പം കാര്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ദ്രവ്യമുണ്ടെന്നു കരുതിക്കൂടാ. ഇവയെല്ലാം അതാതിന്റെ വലിപ്പങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ മടങ്ങ് അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. വെളിച്ചം സെക്കണ്ടിൽ 1,86,000 നാഴിക സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഒരു മിനുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന 1.116 കോടി നാഴികയെ 1 ഇഞ്ചായി സങ്കല്പിച്ചാൽ, സൂർ്യൻ ഒരു ചെറിയ കടുകിൻമണി

യോജമേ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. സൂര്യനു ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും വെറും ധൂളികുളമാകും. ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം $8\frac{1}{2}$ ഇഞ്ചായിരിക്കും. ഈ തോതിൽ അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം 36 മൈലുകളോളമുണ്ടാകും. ഈ കട്കിൻമണി ക്ഷേത്രം മറ്റും പ്രദ്യോതവിദ്യോതങ്ങളായിത്തക്കതു 36 മൈൽ വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഗോളത്തിൽ ഒരുപോലെ വിതരണം ചെയ്താൽ അവിടെ എത്ര ദ്രവ്യമുണ്ടാകുമെന്നു സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. കേവലം ശുന്യമല്ലെന്നുള്ളൂ. നമുക്കടുത്തുള്ള ശുക്ല പടലങ്ങളുടേയും മറ്റും ദ്രവ്യമാനവും അകലവും നോക്കിക്കണക്കാക്കിയാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂചിത്ര ശരാശരി വായുവിന്റെ $\frac{1.94}{10^{28}}$ ഭാഗം മാത്രം സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു നേരിയ പശുവുണ്ടായിരിക്കും. ഇതു 4 ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയും ഘനവും ഉള്ള പ്രദേശത്തു 1 പ്രദ്യോതവും 1 വിദ്യോതവും വീതം മാത്രമാണെന്നു സേർ ജെയിംസ് ജീൻസ് പറയുന്നു. ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടിക്കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ പ്രദേശത്തുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഒരു സാമാന്യമതിപ്പാണ് ഇത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ദ്രവ്യം ഇത്ര നേരിയതാണെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷവാദപ്രകാരം അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം 8400 കോടി ദീപ്തിവർഷമാണെന്നും പരിധി 52,800 കോടി ദീപ്തിവർഷമാണെന്നും വരുമത്രെ. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കാണാത്തതുമായ സകലകോശശുക്ലപടലങ്ങളും. ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ആപേക്ഷികഗണിതതന്ത്രംകൊണ്ടു വ്യവഹരിക്കാമെങ്കിലും തീരെ ഭാവനാതീതമാകുന്നു. ഭൂപൃഷ്ഠത്തിൽ ഏതു സ്ഥാനവും ഭൂപൃഷ്ഠത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി വിചാരിക്കാവുന്നതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതു സ്ഥാനവും അതിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ദൃഷ്ടാ വിരിക്കുന്ന സ്ഥാനംതന്നെ അയാൾക്ക് കേന്ദ്രം. അവിടന്നു 52,800 കോടി ദീപ്തിവർഷം ഒരേ ദിക്കു നോക്കി സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടെത്തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പരിധി 52,800 കോടി ദീപ്തിവർഷമാണെന്നു പറയുന്നതിന്നു ഇതു മാത്രമാണ് അർത്ഥം.

ഐൻസറിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തു പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും ആസക്തമായി അതിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അതിന്നു വികാസമാവട്ടെ സങ്കോചമാവട്ടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അകലത്തിന്റെ വക്രത്തിന്നു വ്യസ്താനപാതമായ ആകർഷണം വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന സമീകാരങ്ങൾ ആപേക്ഷികഗണിതതന്ത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അകലത്തിന്നനുപാതമായ വികർഷണമുണ്ടെന്നു വരുത്തുന്ന സമീകാരങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ആകർഷണവികർഷണങ്ങൾ തുല്യമായ നിലയിലാണ് ഐൻസറിൻപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നില. സംഗതിവശാൽ ആകർഷണം വികർഷണത്തെക്കാൾ അധികമായിവന്നാൽ പ്രപഞ്ചം ക്രമേണ ചുരുങ്ങുകയും വികർഷണം ആകർഷണത്തെക്കാൾ അധികമായാൽ അതു വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. അകലം അധികമായാൽ ആകർഷണത്തിന്നു ശക്തി കുറയുന്നു. എന്നാൽ അകലം വലിക്കുന്നതോടും വികർഷണത്തിന്നു ശക്തി വലിച്ചുവരുന്നു. രണ്ടിന്റേയും അതിരിൽ ആകർഷണവികർഷണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും. അങ്ങിനെയിരുന്നാൽ പ്രപഞ്ചം ഒരു നിലയിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിൽപ്പു മനമേൽ നില്ക്കുന്ന സൂചിയുടേതുപോലെ അസ്ഥിരവുമാകുന്നു. അതിന്നെങ്ങോട്ടും വീഴാം.

ഐൻസറിന്റെ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷസ്വഭാവവാദത്തിന്നു കാര്യമായ ന്യൂനതയുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. പരിമിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തപ്രകാരം വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നീളം, വീതി, ഘനം, സമയം ഇവ നാലും തുല്യ നിലയിൽ കലർന്നതായിട്ടാണ് കരുതിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആസക്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഐൻസറിൻ ഇത് അത്ര നിഷ്ക്കർഷയോടെ ഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂനത തീർത്തുകൊടുവാനായിരിക്കാം 1917ൽ ലിഡൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗണിതശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായ ഡി. സിറാർ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചസ്വഭാവത്തെ ചർച്ചചെയ്തത്. അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ

ദ്രവ്യമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ചല്ല അതിന്റെ വലിപ്പം. എന്നു മാത്രമല്ല അത് അതിന്റെ സ്വഭാവമെന്ന നിലയിൽ സ്വയം മേവ സദാ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ദൃഷ്ടാവിൽനിന്ന് അകലുന്തോടും സമയത്തിന്റെ ഗതി മന്ദീഭവിച്ച് വരുന്നതിനാൽ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശശക്തികളുടെ വീചിവിസ്താരം വലുതാകുകയും അതിനാൽ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ വിരാജികയിൽ ഇരുണ്ട രേഖകൾ ചുവപ്പിന്റെ വഴിക്കു തെറ്റിക്കാണുകയും ചെയ്യും. ഇതു പ്രകാശത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം നമ്മിൽനിന്നകലുമ്പോൾ വിരാജികയിലെ രേഖകൾ തെറ്റുന്നതിൽനിന്നും, ഐൻസ്റ്റീന്റെ പ്രപഞ്ചവാദപ്രകാരം നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശം അതിന്റെ തുക്കത്തേയും വലിപ്പത്തേയും ആശ്രയിച്ച് മാറുന്നതിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ പ്യാസാൽ 200 കോടി ടീ പ്ലവത്സരങ്ങളാണെന്നു ഡി. സിറർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നിരീക്ഷകന്മാർ അകലെയുള്ള കോശശുക്ലപടലങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ വിരാജികകളിൽ കൃഷ്ണരേഖകൾ ചുവപ്പിലേക്കു നല്ലവണ്ണം തെറ്റിയതായിക്കാണുന്നു. ഇതിനുള്ള ഏകകാരണം ശുക്ലപടലങ്ങൾ നമ്മിൽനിന്ന് അകന്നുപോകുന്നതാണെന്നു വിചാരിച്ചാൽ, അവയെല്ലാം സെക്കണ്ടിൽ 1000ത്തിൽപരം നാഴികവീതം നമ്മിൽനിന്നു പാഞ്ഞുപോകുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിവരും. മിലതിനെല്ലാം സെക്കണ്ടിൽ 5000ത്തോളവും 7000ത്തോളവും നാഴിക ഗതിയുള്ളതായിക്കരുതേണ്ടിവരുന്നു. ഇതു വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസം. എന്നാൽ ഡി. സിററുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം വിരാജികയിലെ കൃഷ്ണരേഖാവ്യതിയാനം മുഴുവൻ ശുക്ലപടലങ്ങളുടെ പലായനം കൊണ്ടുതന്നെ വരണമെന്നില്ല. അവയുടെ വെറും ഭൂതകൊണ്ടും ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം സംഭവിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതു മാത്രമേ പലായനംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതായിക്കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. സ്വ

യഥേവ ശുക്ലപടലങ്ങൾ അന്യോന്യം അകന്നുവരുന്നവെന്നും ഡി. സിറാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ജ്യോതിഷികൾ ഐൻസ്റ്റീന്റെ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷവാദത്തിൽ വിശ്വാസം വിട്ട് ഡി. സിറാർ വാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഡി. സിറാർ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തെ തീരെ അധർമ്മിച്ച് പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമെന്ന നിലയിലാണ് തന്റെ അന്തരീക്ഷവാദവും ഗണിതവും കൊണ്ടുപോയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദപ്രകാരം അന്തരീക്ഷത്തിനു വക്രതയുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വികാസംകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ച് പുറപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തുതന്നെ വരുന്നതല്ല. നിരീക്ഷകന്മാരാവട്ടെ M33, M31 എന്നീ ശുക്ലപടലങ്ങളുടെ പ്രേതരൂപങ്ങളെ അവക്ക് എതിരായ ചഗോളസ്ഥാനങ്ങളിൽ h3433, M83 എന്നീ ശുക്ലപടലങ്ങളായിക്കാണുന്നുവോ എന്നു ശങ്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അടുത്ത കാലത്തു ബൽജിയത്തിലെ ഗണിതവിദഗ്ദ്ധനായ ആബെ. ജി. ലേ മെയിറാറും മാറ്റു ചിലങ്കും ഐൻസ്റ്റീനെയും ഡി. സിറാർവേയും വാദങ്ങൾ അന്യോന്യം വിരുദ്ധമല്ലെന്നും പ്രപഞ്ചം ഐൻസ്റ്റീൻ വിചാരിച്ച വിധത്തിൽ തുടങ്ങി വികാശം ആകാശത്തെക്കാൾ അധികമായി വരികയാൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വികസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവസാനത്തിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ശൂന്യപ്രായതകൊണ്ട് ഡി. സിറാർ വാദം ശൂന്യപ്രപഞ്ചമായി കലാശിക്കുമെന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിന്ത നാം അധിവസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം ഐൻസ്റ്റീൻപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി സഞ്ചരിച്ച് (=മാറിക്കൊണ്ട് വന്ന്) ഡി. സിറാർപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എത്രകണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഫബ്രുവരി കണക്കാക്കിയ സംഗതികളിൽ നിന്ന് എഡിഞ്ച്മൻ ഐൻസ്റ്റീൻ വിചാരിച്ച വിധത്തിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം 120 കോടി ദീർഘമായിരുന്നുവെന്നും വികസിച്ചു ഇപ്പോൾ വ്യാസാർദ്ധം 200

കോടി ഭീഷ്മിവർഷമായിട്ടുണ്ടെന്നും കണക്കാക്കി. പക്ഷെ നിരീക്ഷണംകൊണ്ട് ഇന്നു കാണുന്ന സംഗതികളെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതുവിധ സങ്കല്പത്തിനും കൃത്യമായി ഒത്തു കാണുന്നില്ല. കോശശുക്ലപടലങ്ങളുടെ പലായനഗതി ദൂരത്തിന്നനുപാതകമാകുമെന്നു ഡി. സിറാർ പറഞ്ഞതു ശരിക്ക് ഒക്കുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് അനുപാതമായിക്കരുതി അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ കാലം കണക്കാക്കിക്കിട്ടുന്നത് അനേകശതകോടിവർഷമുണ്ടാണെങ്കിലും, മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങളിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്ന കാലത്തിൽനിന്ന് ഇത് എത്രയോ മടങ്ങ് ചുരുക്കവുമാണ്. വിരാജികയിലെ ഇരുണ്ട രേഖകൾ ചുവപ്പിലേക്കു തെറ്റിക്കാണുവാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ച കാരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ വേറേയും കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അടുത്ത കാലത്തു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടുത്തുകൂടി കോശശുക്ലപടലങ്ങളോ ഭൂപടങ്ങളോ ആയിത്തീരാത്ത ദ്രവ്യം വളരെ നേരിയ നിലയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അതിൽകൂടി രശ്മികൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തരംഗവിചികിതങ്ങൾ വിസ്താരം കൂടി വിരാജികയിലെ കൃഷ്ണരേഖകൾ ചുവപ്പിലേക്കു തെറ്റാവുന്നതാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഒരു നിയമത്തിലും പെടാതെ അമിതമായി കാണുന്ന കൃഷ്ണരേഖാവ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതുമാവാം.

ഏതുവിധമായാലും ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഐൻസ്റ്റീൻ തന്നെ താൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഗണിതതന്ത്രത്തിൽ ഒരു വികർഷണവും കൂടിക്കലർത്തി തന്റെ ആദ്യസിദ്ധാന്തത്തെ അല്പം ഭേദപ്പെടുത്തി, ഗണിതവും നിരീക്ഷണവും പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ത്യഗതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞുകൂടാ. അന്ത്യഗതി അതിവിദൂരമെന്നു കരുതി തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യപ്പെടാം.

ഇവയെല്ലാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷപണ്ഡിതന്മാരുടെ ചിന്തകൾ വായനക്കാരെ അല്പമൊന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റത്തക്കതാണ്. ഇനിയത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തേയും അന്തരീക്ഷത്തേയും, മറ്റു കോശശുക്ലപടലങ്ങളേയും വിട്ട്, നാം അധിവസിക്കുന്ന കോശശുക്ലപടലമാകുന്ന ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമൊന്നു ലോചിക്കാം.

8. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലതയും വലിപ്പവും.

സൂര്യന്റേയോ, ചന്ദ്രന്റേയോ, ഗ്രഹങ്ങളുടേയോ അകലം അറിഞ്ഞാൽ അവയുടെ വലിപ്പം നിണ്ണയിക്കുവാൻ കട്ടം പ്രയാസമില്ല. ഭൂദർശിനികൂടാതെത്തന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ബിംബപ്രാസം കലകളായോ വികലകളായോ അളക്കാം. ഭൂദർശിനിയിൽകൂടി നോക്കിയാൽ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും പറയത്തക്ക ബിംബമുള്ളതായിക്കാണാം. ആ ബിംബപ്രാസങ്ങളും വികലകളായി ആലോകനകാപത്തിന്റെ നാഭിയിൽ വെക്കുന്ന നേരിയ കമ്പികൾ വഴിയായി കൃത്യമായളക്കാം. ദ്രഷ്ടാവിന്നഭിമുഖമാണല്ലോ ഇങ്ങിനെ കിട്ടുന്ന വ്യാസം. ഗ്രഹത്തിന്റെ അകലമായ നാഴികകളെ വ്യാസത്തിലുള്ള വികലകളെക്കൊണ്ടു വെരുകി വൃത്തവ്യാസാൽത്തിന്നു തുല്യമായ ചാപത്തിലുള്ള വികലകളെക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യാസം നാഴികകളായി കിട്ടും.

ഈ വിധത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വ്യാസം കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എത്ര വലിയ ഭൂദർശിനിയിൽകൂടി നോക്കിയാലും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ബിംബം കാണുകയില്ല. അവയെ ശോഭയുള്ള ബിന്ദുക്കളായേ കാണുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ബിംബമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതു ഭൂദർശിനിയുടെ മുഖകാപത്തിന്റെയും മറ്റും ന്യൂനതകളെക്കൊണ്ടും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലുള്ള ചില ന്യൂനതകളെക്കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വ്യാസം മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി നിശ്ചയിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

I. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉഷ്ണനില.

ഒന്നാമതായി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുറഭാഗത്തുള്ള ഉഷ്ണനിലയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ചൂടുപിടിച്ചുവരുന്ന ഒരു സാധന

ത്തിന്റെ വണ്ണം ചുവപ്പ്, ഇളംചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, വെളുപ്പ് ഇവയായി മാറുന്നതു നാം കാണുന്നു. ഉണ്ണും വലിക്കുമ്പോൾ നിറം മാറിവരുന്നു. അതിനാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിറത്തിൽനിന്നു തന്നെ അതിന്റെ ഉണ്ണുനില ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സൂക്ഷ്മതയായ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു വരുന്ന പ്രകാശത്തെ വിരോധനിയിൽ കൂടി കടത്തി പരിശോധിച്ചാൽ, ചുവപ്പുതൊട്ട് ഉരുതവരെ യുള്ള നിറങ്ങൾ ഏതു തോതിൽ കലന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണാം. ഏറ്റവും അധികമുള്ള നിറമായിരിക്കും കാഴ്ചയിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിറം. ഈ ഏറ്റവും അധികമായ നിറം എത്ര ഉണ്ണും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു പ്ലാങ്ക് മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഒരുവിധം കൃത്യമായിത്തന്നെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വണ്ണത്തിൽനിന്ന് അതിന്റെ ഉണ്ണുനില മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സൂര്യനിൽനിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നും പ്രകാശം മാത്രമല്ലാ വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പലതരം തരംഗങ്ങളും അവയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. മിക്കവയും അദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ വീചിവിസ്താരം കൂടിയ ചില തരംഗങ്ങളാണ് ചൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. വീചിവിസ്താരം കുറവുള്ള തരംഗങ്ങൾക്ക് രാസപരിണാമങ്ങൾ (Chemical Changes) വരുത്തുവാൻ കഴിയും. ഇവയാണ് രോഗബീജങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും, സസ്യങ്ങൾക്ക് വായുവിൽനിന്ന് അംഗാരത്തെ സ്വീകരിപ്പാൻ സാധിപ്പിക്കുന്നതും. ഈ തരം അദൃശ്യരശ്മികൾ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രിയിൽ മാറാങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. ചൂടുണ്ടാക്കുന്ന രശ്മികളുടെ തീക്ഷ്ണത പ്രത്യേകതരം സൂക്ഷ്മമായ ചില ഉണ്ണുമാപനികൾ വഴിയായും ഗ്രഹിക്കാം. തരംഗരൂപമായ എല്ലാ തരം രശ്മികളും ശക്തിവാഹകരാകുന്നു. പരീക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് കാരോ നിലയിലുള്ള ഉണ്ണുത്തിലും തപിച്ചുനിലുക്കുന്ന കാരോ ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിൽനിന്നും ഇന്നിന്നവിധത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഇത്ര ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുമെ

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉജ്വലതയും വലിപ്പവും. ഇതു ലിപിക(Graph)വഴി വിശദമാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങിനെ 2000°, 3000°, 4000°, മുതലായ ഉഷ്ണനിലകളുടെ ഒരുവിധം ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. സൂര്യനേയോ, നക്ഷത്രങ്ങളേയോ വിരാജനി, ഉഷ്ണമാപനി, ഫോട്ടോകൾഡാസ്സ് മുതലായ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിച്ചു അവയുടെ ഉഷ്ണനിലയുടെ ലിപികകൾ അഥവാ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാം. പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ഉഷ്ണനിലചിത്രങ്ങളോട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി സൂര്യന്റേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും പുറഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം കണക്കാക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ വെറും വണ്ണത്തിൽനിന്നും, ഒട്ടാകെ വികിരണം ചെയ്യുന്ന ശക്തികളുടെ വിതരണരൂപത്തിൽനിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉഷ്ണനില കണക്കാക്കിവരുന്നു.

ഇങ്ങിനെ സൂര്യന്റെ ബഹിർഭാഗത്തെ ഉഷ്ണനില 6000° സെൻറിഗ്രേഡാണെന്നും, അന്തർഭാഗത്ത് 11,000°യാണെന്നും നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപൂർവ്വം ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉഷ്ണനില ഇതിലും അധികമാകുന്നു. 'പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ താരം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുറഭാഗത്തുള്ള ഉഷ്ണം 28,000°യാകുവാൻ മതി. അദ്ദേഹം നീലനിറത്തോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഉഷ്ണനിലയാകുന്നു. തിരുവാതിര, ചോതി, തൃക്കേട്ട മുതലായ ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുറഭാഗത്തെ ഉഷ്ണനില 3000°യുടെ അടുത്താകുന്നു. സാമാന്യമായി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുറഭാഗത്തുള്ള ഉഷ്ണനില 2500° മുതൽ 30,000°വരെ കാണുമെന്നു പറയാം. ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശതരംഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശത്തെപ്പോലെ ഉഷ്ണത്തേയും കണ്ടറിവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ആകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവംതന്നെ മാറിയതായിത്തീരാനും. ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അത്യധികം തേജസ്സോടുകൂടി പ്രകാശിക്കും. ഇന്നു മങ്ങി ചെറുതായിക്കാണുന്ന ചില താരങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ ഒന്നാംതരം നക്ഷത്രങ്ങളായി കാണപ്പെടും.

II. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലതയും വലിപ്പവും

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മഹിമാകും ഇവിടെനിന്നു കാണുന്നവക്കു തോന്നുന്ന പ്രകാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ പ്രകാശമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം അതിന്റെ അകലംകൊണ്ടു അതിനെക്കാൾ പ്രകാശം കുറഞ്ഞതും, എന്നാൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ അടുത്തതും ആയ ഒരു നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ മങ്ങിയതായിത്തോന്നാം. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളേയും സൂര്യനേയും ഒരു അകലത്തു നിന്തിയാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യന്റെ എത്ര മടങ്ങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാശം ശോഭയുള്ളതായിക്കാണുന്നുവോ, അതാണ് അവയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം. ഈ യഥാർത്ഥപ്രകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലത (Luminosity) എന്നു പറയുന്നു. ഇതു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷശോഭയെക്കാണിക്കുന്ന മഹിമാകത്തിൽനിന്നും ദൂരത്തിൽനിന്നും കണക്കാക്കാം. പ്രത്യക്ഷശോഭ ദൂരത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിനു പ്രസ്താനപാതമാണല്ലോ. അതിനാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷശോഭയെ അതിന്റെ അകലത്തിന്റെ വർഗ്ഗം കൊണ്ടു ഗുണിച്ചു സൂര്യന്റെ അകലത്തിന്റെ വർഗ്ഗംകൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലത ലഭിക്കുന്നു. നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷശോഭ സൂര്യന്റെ പ്രത്യക്ഷശോഭയുടെ അംശമായി കണക്കാക്കുകയും വേണം. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പൂണ്ണചന്ദ്ര പ്രകാശത്തിന്റെ 6,19,000 മടങ്ങാണെന്നും, പൂണ്ണചന്ദ്രപ്രകാശം ഷഡാസ്ത്രൻ (പ്രാജിതാ 1) എന്ന നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ 90,000 മടങ്ങ് ശോഭയുള്ളതാണെന്നും സോറനർ എന്ന ജ്യോതിഷി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഉജ്ജ്വലത പ്രകാശത്തെമാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷപ്രകാശത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വണ്ണത്തിന്നനുസരിച്ച് ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഈ പറഞ്ഞവിധം ഫലം വരുത്തിയാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സമസ്തവികിണ്ണശക്തിയായി. നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തെ ഉഷ്ണത്തിൽനിന്നു ഓരോ ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിൽനിന്നും വികിരണം ചെയ്യുന്ന ശക്തി കണക്കാക്കാം.

ഇതുകൊണ്ടു നക്ഷത്രത്തിന്റെ സമസ്തവികീർണ്ണശക്തിയെ ഹരിച്ചാൽ നക്ഷത്രഗോളത്തിന്റെ ബാഹ്യതലം ഇത്ര ചതുരശ്ര ഇഞ്ചൊന്നെന്നു കിട്ടും. അതിൽനിന്നു നക്ഷത്രത്തിന്റെ വ്യാസവും ഘനപരിമാണവും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങിനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ഉജ്ജ്വലമാണെന്നും അവയിൽ ചിലതു സൂര്യനെക്കാൾ എത്രയോ വലിയവയാണെന്നും വരുന്നു. സ്. ഡൊറാഡസ്സ് എന്ന നക്ഷത്രം സൂര്യനെക്കാൾ 3,00,000 മടങ്ങ് ഉജ്ജ്വലമായതാണത്രെ. എന്നാൽ വുകം 359 എന്ന ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലത സൂര്യന്റെ ഉജ്ജ്വലതയുടെ 50,000ത്തിൽ ഒരംശം മാത്രമാകുന്നു. സ്. ഡൊറാഡസ്സിന്റെ ഉജ്ജ്വലത വുകം 359ന്റെ ഉജ്ജ്വലതയുടെ 1500 കോടി മടങ്ങാണെന്നു വരുന്നു. ഇത്ര വലിയ അന്തരം അധികം കാണുകയില്ലെങ്കിലും സാമാന്യേന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വലതയിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിലും ലക്ഷം മടങ്ങായി കണക്കാക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അന്തരം കാണുന്നു. തൃക്കേട്ടയുടെ വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ 450 മടങ്ങാണത്രെ. അതിനാൽ അതിന്റെ ഘനപരിമാണം സൂര്യന്റേതിനെക്കാൾ 911 ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിയതാണെന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ 40കാ 50കാ മടങ്ങ് മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നു വരുമ്പോൾ തൃക്കേട്ടയിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത സൂര്യദ്രവ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയുടെ ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷത്തിലൊരം ശമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും അന്തർഭാഗം കട്ടികൂടിയതാകുവാനേ തരമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത്ര ഉജ്ജ്വലതയുണ്ടാകുവാൻ മതിയായ അണുപരിണാമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകയില്ല. പുറഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നേരിയ വാതകംകൊണ്ടാകുന്നു ഇവക്ക് ഇത്ര വലിപ്പമുള്ളത്. അവുപുരുഷൻ 1 എന്ന നക്ഷത്രം സൂര്യന്റെ 640 ലക്ഷം മടങ്ങും തിരുവാതിര 156 ലക്ഷം മടങ്ങും വലിയതാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇത്ര വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ അധികമില്ല. മിക്ക വക്കും സൂര്യനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ. ഭൂമി സൂര്യന്റെ 26 മടങ്ങ് പ്രകാശമുള്ളതും അതിന്റെ വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ 58% മാത്രം അധികമായതും ആകുന്നു. അതിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ 2.45 മടങ്ങാകുന്നു. ഭൂമിന്റെ പുറം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ചെറുനക്ഷത്രത്തിന്റെ വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ 30ൽ കരംശം മാത്രമാകുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ അതു സൂര്യന്റെ 27000ത്തിൽ കരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ളതാകുന്നു. അതിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ 0.82 ഭാഗത്തോളമുണ്ട്. അതിനാൽ അവിടെയുള്ള ദ്രവ്യം സൂര്യനിലുള്ള ദ്രവ്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ കുട്ടികൂടിയതെന്നു വരുന്നു. അതിലെ 1 ഘന ഇഞ്ച് ദ്രവ്യം 1 ടൺ തുങ്ങുമെന്നു കണക്കാക്കാം. 1 ഘന ഇഞ്ച് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ തൂക്കം 11 ഔൺസോളമേ ഉണ്ടാകൂള്ളൂ. പ്രോസിയോൻ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുറം സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെത്തന്നെയാകുന്നു.

ഇൻറർഫറോ മീറ്റർ (Interfero Meter) എന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വ്യാസം നേരിട്ട് അളക്കുവാൻ സാധിക്കുമത്രെ. അളന്നു കിട്ടിയ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി കിട്ടിയ ഫലങ്ങളോടു കൂത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഭൂമിന്റെ പുറം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറിയ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വ്യാസം കണക്കാക്കിയതു ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തം വഴിയാണെന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

III. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തൂക്കം

സൂര്യന്റെ തൂക്കം കണക്കാക്കുവാൻ സാധിച്ചതു അതിന്റെ പുറം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ അകലം, വ്യയകാലം ഇവയിൽനിന്നാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ള ഗോളങ്ങളാണെങ്കിലും ഒന്നിനേറിയം പുറം ഗ്ര

ഫങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്നതായി ഭൂദർശിനിയിൽ കൂടിയോ വിരാജനിയിൽ കൂടിയോ കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശവശാൽ അന്യോന്യം ബലപ്പെട്ടവരായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ദ്വന്ദ്വതാരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ദ്വന്ദ്വതാരങ്ങളുടെ അകലം അറിഞ്ഞാൽ രണ്ടു താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലവും അറിയാം. അതിൽനിന്നും പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും ഓരോന്നിന്റെ കക്ഷകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും അവയുടെ തൂക്കം വെച്ചോ അറിയാമെന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിനാരവസ്സ് 1ലെ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തൂക്കവും അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് (അപരഖണ്ഡം 5-ാം അദ്ധ്യായം). ഇതേ വിധത്തിൽതന്നെ പ്രോസിയോൻ നക്ഷത്രത്തിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 1.24 മടങ്ങാണെന്നും, അതിന്റെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന നന്നെ ചെറിയ നക്ഷത്രത്തിന്റേതു സൂര്യന്റെ 39% മാത്രമാണെന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ നക്ഷത്രം ഒരു ദ്വന്ദ്വതാരമാകുന്നു. അതിൽ ഒന്നു സൂര്യന്റെ 75 മടങ്ങും മറോതു 63 മടങ്ങും തൂക്കമുള്ളവയായിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചാപനം 27 എന്ന നക്ഷത്രം 4 എണ്ണം കൂടിയവയാണത്രെ. അവയുടെ എല്ലാം കൂടിയ തൂക്കം സൂര്യന്റെ 940 മടങ്ങാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യനെക്കാൾ തൂക്കം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളും കുറെ അധികമുണ്ട്. ക്രൂഗർ 60 എന്ന ദ്വന്ദ്വതാരത്തിലെ ഭാഗതാരങ്ങളിൽ ഒന്നിന്നു സൂര്യന്റെ 25%വും മറോതിന്നു 20%വും മാത്രമേ തൂക്കമുള്ളൂ. തൂക്കം അറിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ശരാശരി തൂക്കത്തെക്കാൾ അല്പം അധികമാകുന്നു സൂര്യന്റെ തൂക്കം. ഉജ്ജ്വലതയിലും ഘനപരിമാണത്തിലും നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വലിയ അന്തരം അവയുടെ തൂക്കത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അവയുടെ തൂക്കത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതാം. അണുക്കൾ ഒരു തരത്തിൽ പെടുന്നതുപോലേയും സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളുടെ കണങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ പെടുന്നതുപോലേയും, ഉ

പ്രഹരങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും, ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റൊന്നിലും പെട്ടെന്നുപോലേയും, സൂര്യനും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരേ തരത്തിൽ പെട്ടെന്നു വസ്തുക്കളെന്നു വരുന്നു. ഇതേ വിധത്തിൽ ഭവയങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ശുക്ലപടലങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിലും പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചം നാം ഒന്നേ അറിയുന്നുള്ളു.

IV. പലതരം നക്ഷത്രങ്ങൾ.

നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രകാശത്തിലും വലിപ്പത്തിലും വളരെ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ തൂക്കം നോക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഒരേ വസ്തുതയിൽപ്പെട്ടവയെന്നു വരുന്നു. ചുവന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ രണ്ടു തരങ്ങളുണ്ട്. ക്രൂഗർ 60ൽ വലിയതിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ നാലിലൊന്നാണെങ്കിലും വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു മാത്രമാകുന്നു. അതിനാൽ അതിലുള്ള ദ്രവ്യം സൂര്യദ്രവ്യത്തിന്റെ 7 മടങ്ങ് കട്ടികൂടിയതാകുന്നു. ഭൂമിയെക്കാൾ രണ്ടു മടങ്ങോളം കട്ടി. ഇതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം 3200° യാകയാൽ ഇതു ചുവന്നിരിക്കുന്നു. ഉജ്വലത സൂര്യന്റെ 400ൽ ഒരംശം മാത്രമേയുള്ളൂ. ചെറിയതിന്റെ തൂക്കം സൂര്യന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും, വ്യാസം ആറിലൊന്നും, സാന്ദ്രത 40ൽ ഒന്നും മാത്രമാകുന്നു. ഉപരിഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം ഇതിനും 3200° തന്നെ. ഉജ്വലത സൂര്യന്റെ 14,000ത്തിൽ ഒരു ഭാഗവുമാകുന്നു. പ്രത്യാസനകിനാരവസ്സ് ഇതുപോലെ ചുവന്നതും ചെറിയതും, തൂക്കം കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു. ഇവയെക്കാൾ പ്രകാശം കൂടുമെങ്കിലും, സൂര്യനെക്കാൾ വളരെ കുറവു പ്രകാശമുള്ളതും ഏതാണ്ട് ചുവന്നതും ആയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. സൂര്യന്റെ നിറം മഞ്ഞ കലർന്നു വെളുപ്പാണെന്നു പറയാം.

തിരുവാതിര, ചോതി, തൃക്കേട്ട മുതലായ അപൂർവ്വം ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുവന്നവയാണെങ്കിലും ഇവിടുന്നുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് വലിയവയാകുന്നു. അവ വളരെ ഉജ്വലമായവയും സൂര്യനെക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കായി വലിയവയുമാണ്. ഇവയൊന്നും തു

കാണുകയുണ്ടാകുന്ന സൂര്യനെ 100 മടങ്ങിലധികം കവിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നില്ല. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത വളരെ ലഘുവുമാകുന്നു. കവിഞ്ഞ വലിപ്പംകൊണ്ടു മാത്രം ഇത്രയധികം പ്രകാശമുല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചുവന്ന ഭീമന്മാരാണ് (Red Giants) എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു.


വെളുത്ത ഒരുതരം നക്ഷത്രങ്ങൾ നന്നെ ചെറിയവയാകുന്നു. എങ്കിലും അവ തൂക്കത്തിൽ അത്ര ചുരുങ്ങിയവയല്ല. ഇവയിലെ ദ്രവ്യം വളരെ കട്ടികൂടിയതാകുന്നു. ഉപരിഭാഗത്തെ പ്രകാശവും ഉഷ്ണവും സൂര്യനെക്കാൾ അധികമാണെങ്കിലും ഇവയുടെ ചെറുപ്പംകൊണ്ടു വളരെ മങ്ങിയവയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയിലും പ്രോസിഡോനിയിലും ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന മങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവയാകുന്നു. വാൻമാനന്റെ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നതു ഭൂമിയെക്കാൾ വലുതല്ല. ഉപരിഭാഗത്തെ ഉഷ്ണം 7000° ആണത്രെ. അതിന്റെ തൂക്കം നല്ലപോലെ അറിയുകയില്ലെങ്കിലും സൂര്യന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നു കറയാതെയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഹരിക്കുന്നു. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ ഭൂദ്രവ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയെക്കാൾ ഇതിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്നു ശരാശരി 66,000 മടങ്ങ് സാന്ദ്രതയുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഫനഇഞ്ച് കറികല്ലിന്റെ തൂക്കം 1½ ഔൺസിൽ അധികമുണ്ടാകയില്ല. ഒരു ഫനഇഞ്ച് സ്വണ്ണം 11 ഔൺസോളം തൂങ്ങുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ വാൻമാനന്റെ നക്ഷത്രത്തിലെ ഒരു ഫനഇഞ്ച് ദ്രവ്യം 5½ ട്രണ്ണുകളിലും തൂങ്ങുമെന്നു കാണുന്നു. ഈവിധം താരങ്ങളെ വെളുത്ത കൃശ താരങ്ങൾ (White Dwarfs) എന്നു പറയുന്നു. ഇവ വളരെ അധികമില്ല. ഗ്രഹശുക്ലപടലങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥരായ താരങ്ങൾ ഈ പറ്റത്തിൽ പെട്ടവയാകുന്നു.

V. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുകൂലത.

മറ്റുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം അവയിൽ എന്തെല്ലാം ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ വണ്ണങ്ങളുടേയോ വിരാജിതമാസ

രൂപത്തിന്റേയോ ക്രമത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ അനക്രമമായ ഒരു പരമ്പരയിൽ പെടുന്നതായിക്കാണാം. വണ്ണം ചുവപ്പ്, ഇളംചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, വെളുപ്പ്, നീല ഈ വിധത്തിൽ മാറുന്നതോടുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ഉജ്വലതയും വർദ്ധിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇവക്ക് പ്രമുഖാനുക്രമതാരങ്ങൾ (Stars of the Main Sequence) എന്നു പറയുന്നു. വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം മടങ്ങാണ് പ്രകാശം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട താരങ്ങളുടെ വ്യാസങ്ങളിൽ ഒന്നും സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ 20 മടങ്ങിലധികമില്ല. ഒന്നുംതന്നെ 20ൽ ഒരംശത്തിൽ കുറവുമില്ല. എന്നാൽ ഉജ്വലത സൂര്യന്റെ 10,000 മടങ്ങ് അധികമുള്ളവയും 10,000 ത്തിൽ ഒരംശത്തോളം കുറവായവയും ഉണ്ട്. വ്യാസം സൂര്യന്റെ $\frac{1}{2}$ ഭാഗം തൊട്ട് $1\frac{1}{2}$ മടങ്ങുവരെയുള്ള അറ്റത്തിക്കുള്ളിൽ അറിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മിക്കതും പെടും. ഇവയുടെ ഉജ്വലതയുടെ അതിർ സൂര്യന്റെ നൂറിലൊരംശം തൊട്ട് നൂറുമടങ്ങുവരെ എന്നു വിചാരിച്ചാൽ വലിയ തെറ്റില്ല. ഈ അതിരുകളിൽനിന്നു വിട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രമുഖാനുക്രമതാരങ്ങളിൽ അധികമില്ല. എച്ച്. എൻ. റസ്സൽ എന്ന ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദ്യം നിർമ്മിച്ചതും അതിനാൽ റസ്സൽ പ്രഭേഖം (Russell Diagram) എന്നറിയപ്പെടുന്നതും, സേർ ജെയിംസ് ജീൻസിന്റെ “നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചം” (The Universe Around Us) എന്ന പുസ്തകത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുമായ പരിഭേഖത്തിൽനിന്ന് ഈ സംഗതികളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിക്കാം. സൂര്യന്റെ ഉജ്വലത 1 എന്നു കരുതി മറ്റുനക്ഷത്രങ്ങളുടേവ അതിന്റെ അംശങ്ങളായും മടങ്ങുകളായും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു 100, 10, 1, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ എന്നവയെല്ലാം വ്യാസത്തിന്റെ അളവുകളാകുന്നു. 10 എന്ന വരയിൽ ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ പത്തു മടങ്ങായിരിക്കും. മിതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വ്യാസം അധികവും താഴെയുള്ളവയുടെ വ്യാസം കുറവും ആയിരിക്കും.

കേര. ഉദാഹരണമായി പ്രാജിത 1ൽ ഒന്നാമത്തേതിന്റെ വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ പത്തു മടങ്ങാണെന്നും, ഉജ്ജ്വലത സൂര്യന്റെ 100 മടങ്ങാണെന്നും നിറം മഞ്ഞയാണെന്നും പരി



- തൃ. തൃക്കേട്ട
- തി. തിരുവോണം
- ജാ. ജാസി 24
- വൃ. വൃശ്ചികം 13
- രൂ. രുദ്രൻ
- പപ₂. പ്രാജിത 1ൽ രണ്ടാമത്തേതു
- പപ₁. പ്രാജിത 1ൽ ഒന്നാമത്തേതു
- കാ. കാണം
- പൃ₁. പ്രോസിഡോൻ
- സു. സൂര്യൻ
- സ. 70 സ്പഷ്ടരനിൽ ഒന്നാമത്തേതു
- കി. കിനാരവസ് 1ൽ രണ്ടാമത്തേതു
- ജ. ജായര 61
- കൃ. കൃഗർ 60ൽ രണ്ടാമത്തേതു
- രൂ₂. രുദ്രൻ-ചെറിയതു
- വ. വാൻമാനന്റെ നക്ഷത്രം.

പരിഭ്രമം 53.

ലേഖത്തിൽനിന്നു കാണാം. രുദ്രന്റെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറിയ നക്ഷത്ര(രൂ₂ എന്നതു)ത്തിന്റെ വ്യാസം സൂര്യവ്യാസത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 3%മെന്നും ഉജ്ജ്വലത സൂര്യന്റെ ഏതാണ്ട് $\frac{1}{400}$ കാളമാണെന്നും നിറം വെളുപ്പാണെന്നും കാണാം.

VI. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗം.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തെ സ്ഥിതികളെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കറിയാത്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽനിന്നും ഗണിതത്തിൽനിന്നും

അനുമാനിക്കുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഉണ്ണും കുറഞ്ഞ താരങ്ങളുടെ ബഹിർഭാഗത്തു സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളുടെ കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു വന്നേക്കാം. ഉണ്ണും അധികമായ താരങ്ങളുടെ ബഹിർഭാഗത്തു ദ്രവ്യം മൂലധാതുക്കളായി വേർതിരിയും. അതിനാൽ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം മൂലധാതുക്കളായ വാതകങ്ങളായി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നാലോചിപ്പാൻ വഴിയുണ്ട്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ വാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിയമമനുസരിച്ച് അകത്തേക്കു ചെല്ലുന്തോറും മദ്നംകൊണ്ടു അവ കട്ടികൂടിവരികയും, ഗണിതംകൊണ്ടു കാണുന്ന തോതിൽ ഉണ്ണും വർദ്ധിച്ചാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദ്രവ്യത്തെ തീരെ നശിപ്പിച്ച് ശക്തിരൂപമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തേക്കു ചെല്ലുന്തോറും അണുകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന വിദ്യോതങ്ങളെ കാരോണോരോന്നായി വേർപെടുത്തുമെങ്കിലും, അങ്ങിനെ വേർപെട്ട വിദ്യോതങ്ങളും, വേർപെടാതെ ബാക്കിനില്ക്കുന്ന വിദ്യോതങ്ങളോടുകൂടിയ അണുകേന്ദ്രങ്ങളും, ചില അണുകേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രവും മദ്നംകൊണ്ടു അടുത്തുകൂടി വർദ്ധിച്ചു ഉണ്ണത്തോടുകൂടിയ ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ നിലയിലാണ് നക്ഷത്രഗാർത്തിലുള്ള ദ്രവ്യം നിലകൊള്ളുന്നതെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിവരുന്ന. ഇതിന്നു ചില തെളിവുകളും ഉണ്ട്. ഭ്രമണംകൊണ്ടു രണ്ടും മൂന്നും നാലുമായി വേർതിരിഞ്ഞ് അന്യോന്യം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അസംഖ്യമാണ്. ഇതു സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള ദ്രവ്യം ദ്രാവകധർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയവയാവാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു ഗണിതശാസ്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നു. എഡിങ്ങ്ട്ടൻ മുതലായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ഈ ദ്രാവകപ്രായമായ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉണ്ണനില 3 കോടി ഡിഗ്രി സെന്ററിഗ്രേഡ് മുതൽ 6 കോടിവരെയായിരിക്കണമെന്നാകുന്നു. ചിലർ സൂര്യന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ ഉണ്ണ 2 കോടി ഡിഗ്രി മാത്രമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രദ്യോതവിദ്യോതങ്ങൾ വേർപെട്ട് എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനാലാകുന്നു അന്തർഭാഗങ്ങൾക്ക് കട്ടി

കൂടുന്നത്. അണക്കുളുടെ തുക്കം മുഴുവൻ പ്രയോജനങ്ങളുടെ തുക്കമാണല്ലോ. വെളുത്ത കൃശന്മാരങ്ങളിൽ ഈ വിധം ദ്രവ്യം മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു അവ ചെറിയവയെക്കീലും വളരെ തുക്കമുള്ളവയായിരിക്കുന്നത്.

9. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം

ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം അനാദിയാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആദിയിൽ എങ്ങിനെ ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നോ ഒരു കാലത്തും മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അവഗമ്യമാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇന്നു നക്ഷത്രങ്ങളായും കോശശുക്ലപടലങ്ങളായും കാണുന്ന ദ്രവ്യം അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സർവ്വത്ര ഒരേ വിധത്തിലെന്ന നിലയിൽ നിന്നിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിൽനിന്നു ഇന്നറിയുന്നതും അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതും ആയ വസ്തുധർമ്മങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചു വഴി ഒരുവിധം കാണാമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുള്ളു. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിസ്താരത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ അധികം ദ്രവ്യമില്ല. ഇവിടെ ഒരു കടുകിൽമണി, ഇവിടെന്നു മുപ്പതോ, നാല്പതോ നാഴിക പോയാൽ അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ കടുകിൽമണികൾ, ഇടക്ക് കുറെക്കൂടി വലിയവ, പക്ഷെ അതിലധികം ചെറിയവ, ഈ നിലയിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്കുടുത്ത പ്രദേശത്തു നാം ദ്രവ്യം കാണുന്നത്. മാറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ദ്രവ്യം ഇതിലും വിരളമാണത്രെ. കോശശുക്ലപടലങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും കേവലം ശൂന്യമെന്നു പറയാം. ഇന്നുള്ള സകല വസ്തുക്കളേയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപോലെ വിതരണം ചെയ്താൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രത നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിന്റെ $\frac{1.94}{10^{28}}$ ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ നേമ് പറയാമെന്നല്ലാതെ എന്താണെന്നു നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഇത്രയും നേരിയ വസ്തുവിൽനിന്നു ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും മാറ്റം എങ്ങിനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ് ആലോചിക്കു

നന്ത്. ആകാശംകൊണ്ടു അവിടവിടെകുന്നായി അടിഞ്ഞുകൂടി ശുക്ലപടലങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നുവിചാരിക്കാം. നമ്മുടെ പുറം കാണുന്ന വായു ഇങ്ങിനെ അടിഞ്ഞുകൂടാത്തതു എന്തുകൊണ്ട്? നിശ്ചലമാണെന്നു തോന്നുന്ന വായുവിന്റെ കണങ്ങൾ സ്വയമേവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവ അന്യോന്യം തട്ടിമുട്ടി അങ്ങമിങ്ങും പായുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഖ്യയില്ലാത്ത വായുക്കണങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നാം ചൂടെന്നു പറയുന്നത്. അടച്ചുവെച്ച വായുക്കണങ്ങളുടെ ഈ അടിക്കളയാണ് വായുവിന്റെ മട്ടനമെന്നു പറയുന്നതും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തു കുറെ വായു കുന്നായി കൂടിയാൽ അതിന്റെ പുറഭാഗത്തു പായുന്ന കണങ്ങളെ വിട്ടുപോകാതെ പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ പോന്ന ആകാശം കുന്നായിക്കൂടിയ വായുവിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ആ വായു കുന്നായി കൂടിനില്ക്കുകയുള്ളൂ. ചന്ദ്രന്റെ ബലത്തിന്റെ പുറം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വായുവിന്റെ കണങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ ചന്ദ്രന്റെ ആകാശത്തിന്നു കഴിയാത്തതിനാലാണ് അവയെല്ലാം ചന്ദ്രനെ വിട്ടുപോയത്. ഇവിടെ കാണുന്ന വായു കുറെ കുന്നായി കൂടിയാൽ, ആ കൂട്ടത്തിന്നു പുറഭാഗത്തുള്ള കണങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ, ആ കൂട്ടം സ്ഥിരമായി നില്ക്കുകയല്ല, പുറമേനിന്നു മറ്റു വായുക്കണങ്ങളെ ആകർഷിച്ച് കൂട്ടത്തിൽകൂട്ടി വലിക്കുകയല്ല ഉണ്ടാകയില്ല.

ആദിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നേരിയ വസ്തു നമുക്ക് തീച്ചയാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ഷോഭം വഴിക്ക് കുന്നായിക്കൂടി സ്ഥിരമായി നില്ക്കണമെങ്കിൽ, ഇന്നു കാരോ കോശശുക്ലപടലത്തിലും കാണുന്നതിൽ കുറവല്ലാത്ത ദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഗണിതശാസ്ത്രം വഴി സ്ഥാപിക്കാം. സഹസ്രലക്ഷം കണക്കിലുള്ള സൂര്യന്മാരുണ്ടാകത്തക്ക ദ്രവ്യത്തിന്നേ ആദികാലത്തിൽ കുന്നായി കൂടിനില്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അ

വിടവിടെ ഉണ്ടായ ക്ഷോഭംവഴി സമസ്താന്തരീക്ഷത്തിലെ നേരിയ വസ്തു ഈ വിധത്തിൽ കഷണങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കാം. കൂടുതൽനിന്നെടുത്തു പറമ്പിൽ പരത്തിയ ചളി കഷണകഷണങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞു കട്ടകളാവുന്നതുപോലെ എന്നു വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങിനെ വേർതിരിയുന്ന ആദ്യപിണ്ഡങ്ങളിലെ വസ്തു ആകർഷണവശാൽ പിണ്ഡകേന്ദ്രത്തോടുത്തു കട്ടികൂടി വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ കട്ടികൂടി വരുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ ക്ഷോഭത്തിൽ അല്പം ഭ്രമണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ഭ്രമണത്തിന്റെ വേഗതയും പിണ്ഡത്തിന്റെ വലിപ്പം ചുരുങ്ങുന്നതോടുകൂടി വലിച്ചുവരാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങിനെ ഭ്രമിക്കുന്ന പിണ്ഡം ഗോളാകൃതി വിട്ടു പരന്നുപോകയും ചെയ്യും. ഭ്രമണമില്ലെങ്കിൽ ഗോളാകൃതിക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടുകയില്ല. ഭൂദർശി നികളിൽകൂടി ഗോളാകൃതിയിലും പച്ച തോതിലും പരന്ന ആകൃതിയിലും കോശപടലങ്ങളെക്കാണുന്നു. ഭ്രമണവേഗത കൂടുമ്പോൾ പിണ്ഡത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ മദ്ധ്യത്തെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന വലയങ്ങളായിത്തീരും. ഇങ്ങിനെയുള്ള ശുക്ലപടലങ്ങളേയും കുറെ അധികം കാണുന്നു.

ഭ്രമണമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും, കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യപിണ്ഡങ്ങൾക്കു കട്ടികൂടി വരുന്നു. മിരാൾ നക്ഷത്രഗണത്തിൽ കാണുന്ന M 31 എന്ന കോശശുക്ലപടലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത വെള്ളത്തിന്റെ $\frac{5}{10^{22}}$ ഭാഗവും വായുവിന്റെ $\frac{6.5}{10^{19}}$ ഭാഗവുമാകുന്നു. മാറ്റ ശുക്ലപടലങ്ങളുടേയും നമ്മുടെ ആകാശഗംഗാ മണ്ഡലത്തിന്റേയും സാന്ദ്രത ഇതിന്റെ നൂറു മടങ്ങിന്റേയും നൂറിലൊരംശത്തിന്റേയും ഇടയിലാകുന്നു. ഇത്ര കട്ടിയുള്ള ദ്രവ്യം ഒന്നിച്ചുകൂടി സ്ഥിരമായി നില്ക്കുവാൻ അതിൽ നൂറോ ആയിരമോ കണക്കായിപ്പറയാവുന്ന സൂര്യന്മാരുണ്ടാകുവാനുള്ള ദ്രവ്യമുണ്ടായാൽ മതി. കട്ടികൂടിയ വസ്തുക്കൾക്ക് ആകർഷണം കൂടുമല്ലോ. ഇന്നു നാം കാണുന്ന ഭൂവയങ്ങളിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈ സംഖ്യകളിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടതല്ല. അതി

നാൽ ആദ്യപിണ്ഡങ്ങൾ ആകർഷണവശാൽ ചുരുങ്ങി അതിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്നു ഇവിടെപ്പറഞ്ഞ സാന്ദ്രത എത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ അവ പിന്നേയും ഖണ്ഡങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയും ആകർഷണവശാൽ കട്ടികൂടി ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ പിന്നേയും ഖണ്ഡങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നു. ഈ ഖണ്ഡങ്ങൾ പിന്നേയും കട്ടികൂടി നക്ഷത്രങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഒരേ ഖണ്ഡത്തിൽനിന്നുണ്ടായ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരേ കൂട്ടമായി നില്ക്കും. ആ കൂട്ടത്തിന്നു ഭ്രമണമില്ലെങ്കിൽ അതിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടുത്തടുത്തു നിന്നു ഗോളഭവയങ്ങളായിത്തീരും. വലിയ ഭ്രമണമുണ്ടെങ്കിൽ അവ അകന്നുനില്ക്കുകയും അവയുടേയും കോശശുക്ലപടലത്തിലെ മാറ്റം നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും പരിവർത്തനത്തിലും ആകർഷണത്തിലും പെട്ടു അന്യോന്യം അകന്നുപോകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂട്ടംകൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഭവയങ്ങളും ഇപ്രകാരമുത്ഭവിച്ചവയാവാൻ വഴിയുണ്ട്. പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും ഒന്നായി സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നു ചെറിയ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അധികരിച്ച ഗതികൊണ്ടു ഈ കൂട്ടങ്ങളെ തീരെ വട്ടുപോകുന്നു. ആകാശഗംഗാമണ്ഡലകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു 47,000 ദീപ്തിവർഷം അകന്ന ഒരു പ്രത്യേക നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗമാകുന്നു സൂര്യൻ എന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടവും ഇങ്ങിനെ ഉത്ഭവിച്ചതാവാതെ വഴിയുള്ളൂ. ആകാശത്തിൽ വളരെ ശോഭയോടുകൂടിക്കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മിക്കവയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവയുമാകുന്നു. ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി അടുത്ത കോശശുക്ലപടലങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവയിലും ധാരാളം വേറെവേറെയായി നില്ക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെക്കാണുന്നുണ്ട്.

ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു ഗോളങ്ങൾ ആകർഷണം കൊണ്ടു പിന്നേയും ചുരുങ്ങിവരുന്നു. അതോടുകൂടി അവയുടെ ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കണം തു

ക്കും കൂടിയവയും കറഞ്ഞവയുമായ പലവിധ അണക്കുടിയേയും ഉത്ഭവം. പിന്നേയും ഉണ്ണും കൂടുകയും കട്ടി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അണക്കുടിയുടെ കേന്ദ്രവിദ്യോത്തമങ്ങൾ വേർപെടുവാനും ശക്തിരൂപമായി മാറുവാനും തുടങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വരൂപം സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരുവിധം മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധികം ഭ്രമണമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ വലിപ്പവും അന്തർഗതത്തെ സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് ദ്വന്ദ്വപതാരങ്ങളായി പിരിയുന്നു. അന്യോന്യാകർഷണംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വേലിയുടെ ഒരു ഫലം അവ അകന്നുകുന്നു പോകുകയെന്നു. ദ്വന്ദ്വപതാരങ്ങളായിപ്പിരിഞ്ഞവയിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഭ്രമണവശാൽ പിന്നേയും ഈരണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങളും പിന്നേയും ഈരണ്ടായിത്തീരുന്നവയും. ഇങ്ങിനെ രണ്ടോ, മൂന്നോ, നാലോ, അധികമോ മാത്രമുള്ള ചെറിയ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ദ്വന്ദ്വങ്ങളായി മാറാത്തവ കറുപ്പായും നില്ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഉത്ഭവിച്ച ദ്വന്ദ്വപതാരങ്ങൾ മിക്കവയും ഇന്നും വിരാജനികൊണ്ടു മാത്രം ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണെന്നറിവാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. ദൂരദർശിനിയിൽകൂടി ദ്വന്ദ്വങ്ങളായിക്കാണുന്നവ മിക്കവാറും ശുക്ലപടലഖണ്ഡങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളായിപ്പിരിയുന്നതോടുകൂടി ആകർഷണംകൊണ്ട് അന്യോന്യം പരിവർത്തനം ചെയ്തുപോന്നവയായിരിക്കണം. ഇവയുടെ കക്ഷകളുടെ ച്യുതി സാമാന്യേന ഇന്നും അധികമായിക്കാണുന്നു. വിരാജനി ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ കക്ഷകൾ അധികവും അല്പച്യുതിയോടുകൂടിയവയാകുന്നു. ഈ സംഗതിയും ഇവയുടെ ഉത്ഭവങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കാണിക്കുന്നു. സൗരവ്യൂഹത്തിൽത്തന്നെ അത്യായതപുത്തസഞ്ചാരികളായ ഉൽക്കാചയങ്ങളും, ധൂമകേതുക്കളും പുറമെനിന്നു വന്നവരാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

നമ്മുടെ സൂര്യൻ ദ്വന്ദ്വപതാരങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല. അതിന്റെ പുറം കറുത്ത ഗ്രഹങ്ങളാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതു നക്ഷത്ര

ങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണമാണെന്നു കരുതുവാൻ നിരീക്ഷണത്താലോ മറുവിധത്തിലോ അവകാശം കാണുന്നില്ല. ആ കാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിന്റേയോ മറു കോശശുക്ലപടലങ്ങളുടേയോ അന്തർഭാഗത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾ അന്യോന്യം വളരെ അകലെയായി നില്ക്കുന്നു. മറു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആകർഷണംകൊണ്ടും ശുക്ലപടലത്തിന്റെ ആസക്തമായ ഭ്രമണവേഗതകൊണ്ടും നിയന്ത്രിതമായ സഞ്ചാരവും അവയുണ്ട്. അതിനാൽ വേറിട്ട് ഉത്ഭവിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുടെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ വളരെ അടുത്തുവരികയെന്നതു കാലാന്തരത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കാവുന്ന സംഗതിമാത്രമാണ്. എന്നാൽ സൂര്യനും മറ്റൊരു വലിയ നക്ഷത്രവും ഒരിക്കൽ അടുത്തുവന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആകർഷണംകൊണ്ടു സൂര്യഗോളത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ള ദ്രവ്യം വേലികയറ്റത്തിൽ സമുദ്രജലമെന്നപോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കു മുഴുകുകയുണ്ടായിരിക്കും. നക്ഷത്രം സൂര്യനിൽനിന്നു അകന്നു പോകുന്നതോടുകൂടി പുകയിലസിഗാറിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു ഭാഗം സൂര്യനിൽനിന്നു വിട്ടു മുന്പുള്ള ഭ്രമണവേഗതമൂലം സൂര്യന്റെ ചുറ്റും പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഇവ കാലാന്തരത്തിൽ ഖണ്ഡങ്ങളായി വേർപെട്ടു ഗ്രഹഗോളങ്ങളായിത്തീർന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷികൾ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നത്. നക്ഷത്രം അകലെയായിരുന്നപ്പോൾ ആകർഷണം കുറവായിരുന്നതിനാലും അടുക്കുംതോറും ആകർഷണം വലിച്ചു പിന്നീടു നക്ഷത്രം അകലുമ്പോൾ ആകർഷണം കുറഞ്ഞുവന്നതിനാലും സൂര്യനിൽനിന്നു വിട്ടുപോന്ന ഭാഗത്തിന്റെ മദ്ധ്യം വിസ്ഫോമുള്ളതായും ഇരുഭാഗത്തേക്കും കൂർത്തതായും ഇരിക്കണമെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മാഗ്നറ്റുകൾ ഒരു തലത്തിലല്ലായിരുന്നതിനാൽ വിട്ടുനിന്ന ഭാഗം ഒരു പിരിഞ്ഞ ചുരുട്ടുപോലെയായിട്ടുണ്ടാകും. ഇതാകുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന തലങ്ങൾ തമ്മിലും അവയുടെ ലംബങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണാക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലും ചുരുങ്ങിയ ദിഗ്ഭേദം ഇന്നും കാണുവാനുള്ള കാരണം.

ഗ്രഹങ്ങളിൽ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള വ്യാഴവും ശനിയും വലിയവയായി രിപ്പാനും അവിടന്ന് ഇരുവശത്തേക്കുമുള്ളവ ചെറിയവയായിരിപ്പാനും കാരണം അതാതു കാലം അകന്നുപോന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. സൂര്യനടുത്ത ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കട്ടികൂടുവാനും അകന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കട്ടി കുറഞ്ഞിരിപ്പാനും ഉള്ള കാരണവും ഇവിടെക്കാണാം. സൂര്യനിൽനിന്ന് ആദ്യം വേർപെട്ട ഭാഗം വളരെ നേരിയതും പിന്നീടു വിട്ടതു കഠിന കട്ടികൂടിയതുമാവാൻ അവകാശമുണ്ടല്ലോ. ഗ്രഹങ്ങളായിത്തീർന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഠിന ഉൽക്കാസമൂഹങ്ങളിലും ധൂമകേതുക്കളിലും ഉണ്ടാകുവാനും മതി.

1916ൽ സേർ ജെയിംസ് ജീൻസ് ഈ അഭിപ്രായം അവതരിപ്പിച്ചതിനു മുമ്പു ജ്യോതിഷികൾ അധികവും വിശ്വസിച്ചുപോന്നിരുന്നതു ലാപ്ലാസ്സ് (1749—1827) എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. അതുപ്രകാരം ഭ്രമണം ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ശുക്ലപടലത്തിൽനിന്നു സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ശുക്ലപടലം ചുരുങ്ങുകയും കാരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന്റെ പുറഭാഗത്തുനിന്ന് കാരോ വലയങ്ങൾ വിട്ടു നില്ക്കുകയും കാലാന്തരത്തിൽ ഈ വലയങ്ങൾ ഒന്നായിക്കൂടി ഗ്രഹങ്ങളാവുകയും അന്തർഗം പിന്നേയും ചുരുങ്ങി സൂര്യനാവുകയും ചെയ്തു. ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഗ്രഹകുടുംകങ്ങളുടെ വിഭിന്നതക്കും ഗ്രഹഭ്രമണാക്ഷങ്ങളുടെ പലപ്രകാരത്തിലുള്ള ചരിവിലും കാരണം കാണുവാൻ സാധിക്കയില്ല. കക്ഷകളുടെ ആയതവൃത്താകൃതികൾക്കും കാരണം കാണുന്നില്ല. വലയരൂപത്തിൽ വേറിട്ടുപോയ ഭാഗം ഒന്നായിക്കൂടി ഒരു ഗോളമാകുവാനും പ്രയാസം. ലാപ്ലാസ്സിന്റെ കാലത്തു ശുക്ലപടലങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സംഘട്ടനംകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായതെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതും ശാസ്ത്രലോകം സ്വീകരിച്ചില്ല.

സൂര്യനു ഗ്രഹങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച രീതിയിൽതന്നെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉഭയകാലത്തു ഗ്രഹങ്ങൾ കുറെക്കൂടി ആയതമായ പൂത്തങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ആ കാലത്ത് കാരോ ഗ്രഹം മറ്റു ചില ഗ്രഹങ്ങളോടോ സൂര്യനോടുതന്നെയോ കുറെ അടുത്തു വന്നുവെന്നു വരാം. അപ്പോഴുണ്ടായ വേലികളിൽനിന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കാം.

രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ അടുത്തുവന്നു ഗ്രഹങ്ങളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നു നാം കണ്ടു. അതുകൊണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ സാധാരണവുമല്ല. എങ്കിലും അനേകലക്ഷം ശുക്ലപടലങ്ങളും കാരോണിലും അനേകകോടി താരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ, സൂര്യനും അതിനു ചുറ്റും പോകുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുമല്ലാതെ വേറൊരാരിടത്തും ഇങ്ങിനെയുണ്ടാകയില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു സാഹസവും അശാസ്ത്രീയവുമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യൂഹങ്ങൾ അതിദുർല്ലഭമാണെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ട്.

10. സൗരവ്യഹത്തിന്റേയും ശുക്രപടല അഭ്യുദയം ഉത്ഭവകാലം.

സൂര്യന്റേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഉത്ഭവകാലത്തെപ്പറ്റി പൗരാണികന്മാർ ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഊഹം ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൂത്രത്തിൽ നിന്നിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഇവയുടെ ഉത്ഭവം എന്നായിരുന്നു. ഇനിയും ഇവ ഒരു സൂത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇവ അവ്യക്തത്തിൽ ലയിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചുപോലെത്തോന്നുന്നു. മനുഷ്യരുടെ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണസിദ്ധമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറെ കൂടി വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ലോകർ വീണ്ടും ആലോചിച്ചാൽ തുടങ്ങിയത് അടുത്തകാലത്താകുന്നു. 1715ൽ, എന്നു വെച്ചാൽ 236 കൊല്ലം മുമ്പ്, ഹാലി എന്ന പ്രസിദ്ധജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കടൽവെള്ളത്തിലെ ഉപ്പുനദികൾവഴിയായി കൊല്ലത്തോറും കലിച്ചുവന്നതാണെന്ന വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ഭൂമിയുണ്ടായി നദികൾ ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങിട്ട് കാലം എത്രയായെന്നു കണക്കാക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്നു തൃപ്തികരമായ ഒരു ഫലവും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭൂമിയിൽ അവിടവിടെയായി അടിഞ്ഞുകൂടിപ്പുള്ള മണ്ണിന്റേയും ആ വിധം പാറകളിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച പാറകളുടേയും ആഴം കണക്കാക്കി അതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ പ്രായം നിശ്ചയിക്കാമെന്നു കരുതി. പാറകളുടെ പഴക്കം അനുസരിച്ച് അവിടവിടെക്കാണുന്ന ഘനങ്ങളെല്ലാംകൂടി അവർ 5,29,000 ഫുട്ട് കിട്ടി. 1000 കൊല്ലത്തിൽ 1 ഫുട്ട് മണ്ണുണ്ടാവുമെന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെക്കണ്ട മണ്ണുണ്ടാകുവാൻ 53 കോടി കൊല്ലം വേണമെന്നും, 4000 കൊല്ലത്തിൽ 1 ഫുട്ട് പ്രകാരം 212 കോ

ടി കൊല്ലം വേണമെന്നും കാണാമല്ലോ. വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പലതും ആലോചിച്ച ഭൂമിയുടെ പഴക്കം 160 കോടി കൊല്ലമായിരിക്കണമെന്നു കണക്കാക്കി. ഈ ശ്രമം മറ്റൊരുവിധത്തിൽ ഫലപ്രദമായിത്തീർന്നു. ഭൂമിയിൽ പാറകളുടെ മേൽഭാഗത്തു മണ്ണടിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെയുള്ള സുദീർഘകാലത്തിൽ പകുതിയോളം കാലം ഭൂമി സസ്യങ്ങളാലൂടെ ജന്തുക്കളാലൂടെ ഇല്ലാതെ കിടന്നുവെന്നും പിന്നീടു ക്രമേണ ഓരോ തരം ജീവികൾ ഉണ്ടായിയെന്നും എല്ലാവിധത്തിലും അവസാനമായി മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിയെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. അനേകതരം ജീവികൾ ഉണ്ടായി നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരം ജീവികൾക്കും ഉത്ഭവംകൊണ്ടുതന്നെ പരമ്പരകളെക്കുറിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഇതെല്ലാം പരിണാമവാദത്തെ പലവിധത്തിലും സഹായിച്ചു.

ഭൂമിയിൽ കഴിച്ചാൽ ഉഷ്ണ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. സൂര്യൻ ഒരു വിധത്തിൽ ഉഷ്ണമുള്ള ഒരു ഗോളം ക്രമേണ തണുത്തു മേൽഭാഗത്തുനിന്നു മദ്ധ്യത്തിലേക്ക് ഇന്നു കാണുന്ന തോതിൽ ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എത്തുവാൻ എത്ര കാലം വേണമെന്നു ഭൗതികശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാർ ഗണിച്ചു. അവർക്കു കിട്ടിയ ഫലം ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു കിട്ടിയതിൽനിന്നു വളരെ വലിയതായിരുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണല്ലോ അണുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിച്ചുവന്നത്. ഉദാഹരണം എന്ന ഒരു മൂലധാതുവുണ്ട്. കാലം ചെല്ലുന്പോൾ അതിന്റെ ചില അണുക്കൾ വിദ്യോതപ്രദ്യോതങ്ങളെ വിടുകയുണ്ടെന്ന് കാര്യത്തിന്റെ അണുക്കളായിത്തീരുന്നു. ഇന്നു അണു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു ഭാഗത്തെ അണു ഇന്നു സമയത്ത് ഇങ്ങിനെ അധഃക്രമമാകുമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടായെങ്കിലും, ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ ഈ വൃത്തി ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ സൂചികളുടെ പരിവർത്തനംപോലെ കൃത്യമായി നടന്നുവരുന്നതായി കാണുന്നു. 1 കൗൺസ് ഉദാഹരണം 10 കോടി

കൊല്ലത്തിൽ ഇപ്രകാരം 0.013 കുൻസും, 100 കോടി കൊല്ലത്തിൽ 0.116 കുൻസും, 200 കോടി കൊല്ലത്തിൽ 0.216 കുൻസും, 300 കോടി കൊല്ലത്തിൽ 0.306 കുൻസും കാര്യം സംജാതമാക്കും. ഭാഗ്യവശംവെന്നപോലെ ഇങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന ഈയം ആദ്യംതൊട്ടുള്ള ഈയത്തിൽനിന്നു അണുഭാരം (Atomic Weight) വഴി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാം. പാറകളുടെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉരാനിയംകഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വന്ന ഈയം എത്രയെന്നു കണക്കാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ പാറകൾ ഉറച്ച് കട്ടിയായി 140 കോടി കൊല്ലങ്ങളായെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഉരാനിയത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമുണ്ട്. രണ്ടു തരങ്ങളും ഈയമായി മാറുന്നതു വെച്ചേറെ തോതുകളിലാകുന്നു. ഇന്നു ഭൂമിയിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന രണ്ടു തരങ്ങളും ഇന്നു തോതിലാണെന്നു കണക്കാക്കി, അതിൽനിന്നു റതർഫോർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭൂമിയുടെ പ്രായം 340 കോടി കൊല്ലത്തിൽ കുറവായിരിക്കുമെന്നും, മിക്കവാറും ഇതിലും വളരെക്കുറവായ ഒരു കാലമായിരിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബുധകക്ഷയുടെ ചില മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാലോചിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉത്ഭവകാലം 100 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പും 1000 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്കു പിമ്പും ആയിരിക്കണമെന്നും ചന്ദ്രകക്ഷാസ്വരൂപത്തിൽനിന്നു 400 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കണമെന്നും ജ്യോതിഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

എല്ലാംകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം 200 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നു സേർ ജെയിംസ് ജീൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതു ഈ കാലംതന്നെയാകുന്നു.

ആകാശഗംഗാമണ്ഡലത്തിലും മറ്റു കോശശുക്ലപടലങ്ങളിലും ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രായം അനുമാനിക്കുവാനും

ഗണകോത്തമരും ഭൗതികശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധരും ആയ ജ്യോതിഷികൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു 'നക്ഷത്രശക്തിസമതപവാദം'മാകുന്നു. ചലനംകൊണ്ടു മാത്രം ഒരു വസ്തു ധരിക്കുന്ന ശക്തി അതിന്റെ ദ്രവ്യമാനം ഉള്ളതെ വേഗതവർഗ്ഗംകൊണ്ടു പെരുക്കിക്കിട്ടിയ സംഖ്യകൊണ്ടു കണക്കാക്കാം. ഉത്ഭവത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സഞ്ചാരവേഗതയിൽനിന്നും ദ്രവ്യമാനത്തിൽനിന്നും കണക്കാക്കുന്ന ശക്തി എത്രതന്നെ വിഭിന്നമായിരുന്നാലും വേണ്ടത്ര കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാതരം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഉള്ള ശരാശരി ശക്തി തുല്യമായിത്തീരും. ഈ കാലം ഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് 'നക്ഷത്രശക്തിസമതപവാദം'. പലവിധത്തിൽ തുക്കമുള്ള വാതകകണങ്ങൾ ഒന്നായിക്കലത്തിയാൽ അല്പനേരം കൊണ്ട് കാരോ വാതകത്തിന്റേയും കണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശരാശരി ശക്തി തുല്യമായിരിക്കുമെന്നു പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും ഗണിതത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കലശ്ശന്ന സമയത്തു കണങ്ങളുടെ സഞ്ചാരവേഗതാ ശരാശരി എല്ലാറ്റിനും തുല്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ ശക്തി കണങ്ങളുടെ തുക്കത്തിന് അനുപാതമാകുന്നു. അതിനാൽ പലവിധവാതകങ്ങളിലും ഉള്ള ശക്തി അവയെ കലശ്ശന്ന സമയത്തു വിഭിന്നമായിരിക്കും. എന്നാൽ അല്പനേരംകൊണ്ട് അയ്യോന്യമുള്ള സംഘട്ടനംമൂലം അധികം ശക്തിയുള്ള കണങ്ങൾ അവയുടെ ശക്തി കുറവുള്ളവക്ക് നല്കി എല്ലാതരം കണങ്ങൾക്കും ശരാശരി ശക്തി തുല്യമായി വരുന്നു. തുക്കം അധികമുള്ള കണങ്ങൾ മന്ദമായും, കുറവുള്ളവ ശീഘ്രമായും സഞ്ചരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഇതുപോലെ ഭാരമേറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ മന്ദമായും ഭാരം കുറഞ്ഞവ ശീഘ്രമായും അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പ്രായേണ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വണ്ണവും വിരാജികയും അവയുടെ തുക്കത്തിന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. വണ്ണവും വിരാജികയും നോക്കി നക്ഷത്രങ്ങളെ തരംതിരിച്ച്, കാരോ തരത്തിന്റേയും ശരാശരി തുക്കവും ശരാശരി വേഗതയും കണ്ട് അവയിൽനിന്നു

ചലനവശാലുള്ള ശക്തി കണക്കാക്കിയാൽ, അത് എല്ലാതരങ്ങളിലും കൃത്യമായല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് തുല്യമായിക്കാണുന്നു. തുല്യത പ്രാപിക്കുന്നത് വാതകകണങ്ങളിലെന്നപോലെ സംഘട്ടനംകൊണ്ടല്ല. അന്യോന്യമുള്ള ആകർഷണംകൊണ്ടാകുന്നു. തുക്കമധികമുള്ള ഒരു താരവും കുറവുള്ള ഒന്നും അന്യോന്യം ആകർഷിക്കുമ്പോൾ, തുക്കം കുറവുള്ളതു മറ്റേതിനെക്കാൾ ശീഘ്രതയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെറിയതിന്നു ശക്തി കൂടി വരുന്നു. ഈ വിധത്തിലാണ് ചിരകാലംകൊണ്ടു പലതരങ്ങളിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു ശരാശരി ശക്തി തുല്യമായി വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പുണ്യതുല്യത വന്നുചേർന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരുവിധം തുല്യതയുണ്ട്. വളരെ ഭാരമേറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു ശക്തി കുറവായിക്കാണുന്നു. ഭാരം വളരെ ചുരുങ്ങിയവക്ക് ശക്തി കൂറുള്ളതുമുണ്ട്. മദ്ധ്യവർത്തികൾക്കാണ് ശരാശരി ശക്തി എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് അല്പം അധികമായിക്കാണുന്നത്. ഗണിതവാദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു തീർച്ചയാക്കുന്നതു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് 5 ലക്ഷം കോടി മുതൽ 10 ലക്ഷം കോടിവരെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇതു നമ്മുടെ ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ 2500 മടങ്ങ് മുതൽ 5000 മടങ്ങ് വരെയുള്ള കാലവുമാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി എത്ര കോടി കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആദിത്യന്റെ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായതെന്ന് കാര്യംനോക്കേണ്ട സംഗതിയാകുന്നു.

ദൈവതാരങ്ങളുടെ കക്ഷകളിൽ ചൂതിസംബന്ധമായി വന്ന മാറ്റങ്ങളും, അന്തരീക്ഷസഞ്ചാരികളായ ഭൂയങ്ങളിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പവും സ്ഥിതിയും ആലോചിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫലം ഇതുതന്നെയെന്നു പറയുന്നു. ഭൂയങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അന്യോന്യം അകന്നുപോകുന്നുവെന്നും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയവയെക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൂട്ടം പിരിയുന്നുവെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നാലാമത്തെ മാർഗ്ഗം നക്ഷത്രഗോളങ്ങളിൽനിന്നു വികിരണം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയുടെ തുകയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ്. ഈ ശക്തി നക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ കാലം ചെല്ലുന്തോറും നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ക്ഷയിച്ചുവരുന്നു. വികിരണം ചെയ്യുന്ന ശക്തി നക്ഷത്രത്തിന്നു പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ സെക്കണ്ടിൽ സ്വശരീരത്തിൽനിന്നു 40 ലക്ഷം ടൺ ദ്രവ്യം ശക്തിരൂപത്തിൽ വികിരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ തോതിൽ സൂര്യനിലുള്ള ദ്രവ്യം മുഴുവൻ ശക്തിരൂപമായി മാറുവാൻ $1\frac{1}{2}$ ലക്ഷം കോടി കൊല്ലങ്ങൾ വേണ്ടിവരും, അഥവാ, മതി. മുഴുവൻ ഈ തോതിൽ മാറുകയില്ലെന്നു തീർച്ചതന്നെ. ഒരു നിലയെത്തുമ്പോൾ ശക്തിവികിരണം തീരെ നിലച്ച് സൂര്യൻ ക്രമേണ തണുത്തു ഇരുണ്ടുപോകാം. സൂര്യന്റെ തൂക്കം ഇന്നുള്ളതിന്റെ പകുതിയാകുമ്പോൾ ശക്തിവികിരണം ഇന്നുള്ളതിന്റെ അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേയുണ്ടാകയുള്ളൂ. പിന്നേയും ചുരുങ്ങിപ്പോകും. ഇങ്ങിനെ സൂര്യൻ തീരെ കെട്ടു പോകുവാൻ $1\frac{1}{2}$ ലക്ഷം കോടി കൊല്ലത്തെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികം കാലം വേണ്ടിവരും. കഴിഞ്ഞുപോയ കൊല്ലങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ തൂക്കം കണക്കാക്കിട്ടുള്ളതു സേർ ജെയിംസ് ജീൻസിന്റെ “നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു സൂര്യന്റെ തൂക്കം ഇന്നുള്ളതിന്റെ—

ഇപ്പോൾ സൂര്യന്റെ തൂക്കം						1
200	കോടി	കൊല്ലം	മുമ്പു	സൂര്യന്റെ	തൂക്കം	1.00013
1,00,000	”	”	”	”	”	1.07
2,00,000	”	”	”	”	”	1.16
5,70,000	”	”	”	”	”	2.0
7,10,000	”	”	”	”	”	4.0
7,40,000	”	”	”	”	”	8.0
7,50,000	”	”	”	”	”	20.0
7,60,000	”	”	”	”	”	100.0


പത്തു മടങ്ങായിരുന്ന കാലത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യനാശം അതിരഹിതമായിരുന്നുവെന്നും ആ കാലത്തെ ആയുഷ്ഠാലഗണനയിൽ ഗണ്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കാണാം. ഈ വിധം കണക്കു സൂര്യനെപ്പോലെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പറ്റിയതാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നു സൂര്യൻ മുതലായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു 8 ലക്ഷം കോടി കൊല്ലങ്ങളിലധികമായിട്ടില്ലെന്നു വരുന്നു. ഇതു മുമ്പു കണ്ട കാലാവധിക്കുള്ളിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു.

എസ്. ഡൊറാഡ്സ് പോലെ അപൂർവ്വം ചില അത്യുജ്വലതാരങ്ങളുടെ കാലം ഇതിൽനിന്നു ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അവയുടെ കൂട്ടങ്ങളിലുള്ള മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചതോടുകൂടി അവയും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നോ അജ്ഞാതമായ കാരണംകൊണ്ടു തടഞ്ഞുപോയ ശക്തിവികിരണം അടുത്ത കാലത്തു ആരംഭിച്ചതായിരിക്കാമെന്നു വിദഗ്ദ്ധർ ചൊല്ലുന്നതിനുകൾ പറയുന്നു.

സൂര്യന്നു അനേകകോടി വർഷം ജീവിതം ഇനിയുമുണ്ടെന്നു ഈ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാം. ഭൂമിയുടെ നിലയും ശ്രേയസ്സും സൂര്യന്റെ സ്ഥിതിഗതികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. യാദൃച്ഛികമായ വല്ല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്തപക്ഷം അനേകലക്ഷം കൊല്ലങ്ങളോളം ഭൂമി ജീവിക്കുവാൻ നിവാസയോഗ്യമായിരിക്കും. ഈ കാലത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യന്നു തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികഭൗതികസംസ്കാരങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും പതുക്കെയായാലും ദേവതുല്യന്മാരാകുവാനും സമയം ലഭിക്കും. അവസരം അയാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിലരെല്ലാം ഗന്ധർവ്വതുല്യരായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മതിമറക്കാതെ ശാസ്ത്രചിന്തയിലും, ആദ്ധ്യാത്മികബോധത്തിലും, കലാസാദനങ്ങളിലും ഉറപ്പിച്ചു വിനയത്തോടുകൂടി യത്നശാലികളായി യഥാർത്ഥയശസ്വികളായിത്തീ

ഭവാൻ അന്തരീക്ഷവർത്തികളായ താരങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിച്ച് നി
ലനിർത്തിവരുന്ന ആ ശക്തി—അതു ദിവ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാ
ണ്?—എന്നും സഹായമായിരിക്കട്ടെ.

ശുഭം.



സൂചിക

(ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക)

അക്കർനാർ 11, 37
 അഗസ്റ്റ് 11, 26, 37
 അണമാത്ര 155, 156
 അത്തം 24
 അത്രി 20
 അധമാക്ഷം 128
 അധിമാസം 80
 അനിഴം 23
 അന്തരിക്ഷചലനം (നക്ഷത്രങ്ങളുടെ—) 233
 അൻറാസ്സ് 23
 അപക്രമനതം 64
 അപക്രമമണ്ഡലം 62
 അപക്രമം 61
 അപായസീമ 164
 അപേരണം 172
 അഭിജിത്ത് 21, 31, 37
 അമാവാസി 77
 അയനചലനം 67, 182
 അയിംഗിതി 32
 അരിസ്റ്റോട്ടൽ 3
 അരുന്ധതി 20
 അവിട്ടം 31
 അവ്യക്തത്വം 21
 അഗ്രതി 15
 അഗ്നിനീഭേദകം 17
 അഹോരാത്രവൃത്തങ്ങൾ 40

അഭിഗ്രാമഭേദം 223
 അക്ഷവൃത്തങ്ങൾ 54
 അക്ഷം 54
 അംഗിരസ്സ് 20
 അംഗം 6
 ആകാശഗംഗ 38, 234, 236,
 237, 238, 243—246
 ആകാശപരിധി 97
 ആർഗോൻ 15
 ആർട്ടുർ 31
 ആഭിത്യൻ (വാഷികചാരം) 59,
 60, 61, 62
 ആയുടേൻ 2, 3, 88, 89, 90, 96
 ആയുടേയം 3, 52, 53
 ആത്മജെസ്റ്റ് 2
 ആയതവൃത്തം 127
 ആയില്യം 26, 29
 ആലോകനകാലം 146
 ആലോകനക്ഷത്രം 149
 ആവേശാനുവാതിതം 135
 ഇന്ദ്രൻ 157, 183, 210
 ഉച്ഛ്വാസകാലം 7
 ഉജ്ജയനി 50
 ഉദ്ധവജരം 31
 ഉത്തമാക്ഷം 127
 ഉത്തരവലയം 55

ഉത്തരായണകാലം 43
 ഉത്രാതി 13
 ഉത്രം 26
 ഉത്രാടം 31
 ഉൽക്കകൾ 216—221
 ഉന്നതി 6
 ഉന്മണ്ഡലം 42
 ഉന്മീലിക 130
 ഉപചയനശക്തി 133, 146
 ഉരൽപകരം 128
 ഋതുക്കൾ 74, 75
 ഋഷഭഗണം 13
 ഏഡിങ്'ട്ടൻ 256
 ഐൻസ്റ്റീൻ 251, 252, 254
 ഓയൻ 10
 ഓണം 31, 37
 കന്നി 30
 കവാലം 7
 കർക്കടകം 27
 കർക്കടകവലയം 54
 കരം 129
 കല 6
 കല്പം 112
 കക്ഷ (സൂത്രം) 92
 കാർത്തിക 13, 122
 കാവേണ്ടിഷ് 139
 കാശം 155
 കാസ്റ്റർ 17
 കിനാരവസ്സ് 23, 37
 കിനാരവസ്സ് (1) 224
 കിനാരവസ്സ് (2) 37
 കിനാരവസ്സ് (പ്രത്യാസനം) 224
 കിരീടമണ്ഡലം 21, 195
 കരഭം 34

കൃഗതാരങ്ങൾ(വെളുത്തം) 267
 കൃഷ്ണപടലങ്ങൾ 232
 കൃഷ്ണപക്ഷം 77
 കേതവസ്സ് 16
 കേതു 78
 കെപ്ലർ 3, 127, 133
 കൈകവസ്സ് 36
 കൈകവസ്സ് ക്ഷയോപചയങ്ങൾ
 227, 228
 കോപ്പർനിക്കസ്സ് 3, 90, 123, 126
 കോശതൂകുപടലങ്ങൾ 8, 231, 246
 കൂതു 20
 ക്രമചാരം 68
 ക്രാന്തി 61
 ക്രാന്തിമണ്ഡലം 16, 62
 ഖഗോളം 5, 65
 ഖമല്യം 5
 ഖമല്യാന്തരം 6
 ഗതി 68
 ഗസുലകാലം 144
 ഗലീലിയോ 3, 132, 133
 ഗാലക്സി 38
 ഗുരുത്വാകർഷണം 138, 139
 ഗുർവ്വക്ഷരം 7
 ഗുഹങ്ങൾ 25, 198
 ഗുഹങ്ങളുടെ അകലം 97
 ഗുഹണം 107, 108, 109
 ഗുഹസഞ്ചാരം 81—87
 ഗ്രീനിച്ച് 56
 ഘടികാമണ്ഡലം 41
 ചതയം 34
 ചന്ദ്രൻ 195—198
 „ പുണ്യം 77
 „ ബാലം 76

ചന്ദ്രസഞ്ചാരം 76—81
 ചന്ദ്രതൂംഗം 79
 ചന്ദ്രശൃംഗങ്ങളും 76
 ചന്ദ്രമന്ദോച്ചം 79
 ചന്ദ്രന്റെ അകലം 95
 ,, വൃദ്ധിക്ഷയം 106
 ചാന്ദ്രഗണങ്ങൾ 34
 ചാന്ദ്രമാസം 77
 ചാന്ദ്രവർഷം 81
 ചിങ്ങം 26, 37
 ചിത്ര 30, 37
 ചെറുഗ്രഹങ്ങൾ 206
 ചൊവ്വ 38, 85, 86, 101,
 204, 205, 206
 ചോതി 20, 37
 ച്യുതി 127, 129
 ജഡതപം 135
 ജായര 32, 37
 ജാസി 21, 23
 ജീൻസ് (സേർ ജെയിംസ്—)
 189, 195, 268, 282
 ഞാറുവേല 80
 ടൈക്കോബ്രാഹി 127
 ടോളമി 2
 ഡി. സിററ 252, 254
 തമോഗ്രഹങ്ങൾ 79
 തിരുവാതിര 10, 37
 തുലാം 23
 തൃക്കേട്ട 23, 37
 ത്രികോണമുത്തി 15
 ത്രിമുത്തികൾ 10
 ത്രിശങ്ക 23, 37
 ക്ഷിണനൈരുകം 26

ക്ഷിണവലയം 55
 ക്ഷിണായനകാലം 43
 ക്ഷിണോത്തരവൃത്തം 7, 42
 ഭരിലകാലം 144
 കിഷ്കുന്തം 5
 കിഷ് 6
 കിനം. സാവനം—69
 ,, നക്ഷത്രം—70
 കീഴ്വട്ടിമണ്ഡലം 192
 ദൃഗ്വൃത്തം 6
 ദൂരദർശിനി 133, 134
 ദൈനികചലനം 39
 ഭൂവൃത്തം 40
 ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ 20, 224
 ധനു 31
 ധൂമകേതു 211, 216
 ശുക്രവൃത്തങ്ങൾ 56
 ശുക്രൻ 14, 25, 35, 37, 241
 ശുക്രങ്ങൾ 40
 ശുക്രോന്നതി 41
 നതി 6
 നദ്യന്തകം 11
 നക്ഷത്രഗണങ്ങൾ 8
 നക്ഷത്രപ്രവാഹം 233
 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
 അന്തർഭാഗം 163
 ഉജ്വലത 261
 ഉത്ഭവം 272
 ഉഷ്ണനില 259
 തരങ്ങൾ 266
 തൂക്കം 264
 നാഭി 128, 144
 നാഭ്യന്തരം 144

നാഴിക 7
 നിയമകരേഖ 129
 നിരക്ഷപ്രദേശം (രേഖ, വൃത്തം) 50, 54
 നിരക്ഷനക്ഷത്രങ്ങൾ 41
 നിരയനക്ഷത്രങ്ങൾ 41
 നിവണ്ണകാലം 148
 നൂട്ടൻ 4, 134, 137, 138, 147
 ന്യൂക്കോമ്പ് (സൈമൻ) 4
 പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക 89
 പരിഭ്രംശം 110, 127
 പാതൻ (വൃശ്ച—, അപര—) 78, 79
 പാശ്ചാത്താപം 65
 പുണർതം 18
 പുലസ്ത്യൻ 20
 പുലഹൻ 20
 പൂയം 28
 പൂരാടം 26
 പൂരോത്താതി 13
 പൂരം 26
 പൈതഗോറസ്സ് 17
 പെരണ്ണമി 77
 പ്രതികാരസമത്വം 135
 പ്രതിമണ്ഡലം (വൃത്തം) 92, 99
 പ്രതിമന്ദോച്ചം 69
 പ്രതിമണ്ഡലകേന്ദ്രങ്ങൾ 103
 പ്രത്യാസനകിനാരവസ്സ് 24
 പ്രപഞ്ചവികസനം 257, 258
 പ്രമുഖാനുകൂലതാരങ്ങൾ 268
 പ്രവഹവായു 89, 115
 പ്രാജിതം 13
 പ്രാണകാലം 7
 പ്രോക്സിമ സെന്റോറി 24
 പ്രോമ്പീലിക 130
 പ്രോസിഡോൻ 17, 37, 225

പ്ലാനറ്റോ 3
 പ്ലൂട്ടോ 184, 210
 ഫ്ലൂക്കോട് 169
 ഫോമൽ 11, 37
 ബഡവാമുഖം 53
 ബുധൻ 37, 84, 99, 100, 202, 203
 ബുധസംതരണം 160
 ബുഹുപാനം 11, 223
 ബുഹുഗോപഖണ്ഡം 34
 ബോഡ്സിന്റെ നിയമം 201
 ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ 2
 ബ്രഹ്മണി 12, 37
 ബ്രഹ്മസിദ്ധാന്തം 3
 ബ്രൗൺ (ഡബ്ബിൾ—) 4
 ഭഗോളം 65
 ഭരണി 15
 ഭാദ്രപദമുഷ്ടം 13
 ഭാരകാകഷ്ണസിദ്ധാന്തം 4
 ഭാസ്കരൻ 54, 90, 113, 114
 ഭീമതാരങ്ങൾ (ചുവന്ന) 267
 ഭുഗോളം 46, 47, 48
 ഭുവുമാനം 141
 ഭൂമേണന്ത്രായങ്ങൾ 168, 171
 ഭൂമദ്ധ്യരേഖ 56
 ഭൂമി 203, 204
 ,, ഉത്തരവകാലം 280—282
 ഭൂമിയന്ത്രം 169
 മകം 26
 മകരം 34
 മകരവലയം 55
 മന്ദകണ്ഠം 157
 മന്ദവൃത്തം 94
 മന്ദസംസ്കാരം 92
 മന്ദോച്ചം 69

മയദീപി 36
 മരീചി 20
 മഹിമാങ്കം 36, 37
 മാഗലമേഘങ്ങൾ 223
 മിഥുനം 17, 37
 മിരാൾ 14
 മീനം 16
 മൂലം 23
 മേഘ 51
 മേഘം (=മേഘം) 15
 മെഘം (വക്ര—, ക്രമ—) 82
 മൂലം സങ്കൽ 151
 യുഗം 112
 രസ്തമാനം 149
 രവികല്പം 193
 രവിദ്രവ്യമാനം 162
 രാഗമണ്ഡലം 194
 രാശികൾ 64
 രാശികൂടങ്ങൾ 64
 രാശികൂടവൃത്തങ്ങൾ 64
 രാശിമണ്ഡലം 195
 രാഹു 78
 രുദ്രൻ 11, 37, 225
 രേവതി 16
 രോഹിണി 12
 ലഘുബാല 36
 ലഘുഗാനം 17
 ലങ്ക 50
 ലംബം 6
 ലാപലസ്സ 278
 ലിപ്ത 6
 ലുബ്ധകൻ 11
 ലുതാസ്യതങ്ങൾ 151
 ലെവെറിയർ 4

ലേ മെയിൻ 258
 വക്രചാരം 68
 വസ്ത്രം. ആയത—ആർത—നാക്ഷത്ര
 —നിരയന—സെന്റർ—69
 വരാഹമിഹിരൻ 23, 89, 90, 166, 167
 വരാസവസ്ത്വ 15, 223
 വരണൻ 157, 184, 210
 വസിഷ്ഠൻ 20, 224
 വായുഗോളം 42, 65
 വാരകൃമം 114, 115
 വികല 6
 വിചിത്ര 16
 വിഗതി 68
 വിനാഴിക 7
 വിരാജനി 144, 152
 വിരാജിക 152
 വിവിധ 6
 വിഷ്ണുക്കൾ 45
 വിഷ്ണുവത്ത് പൂർവ്വ— 62
 „ അപര— 63
 വിഷ്ണുവന്ദനം 41
 വിക്ഷേപം 69, 79
 „ പരമ— 79
 വിക്ഷേപവൃത്തം 79
 വിചിവിസ്താരം 155
 വൃകം 23
 വൃത്തം 6
 വൃത്തപാദം 56
 വൃത്തികഗണം 22
 വേദംഗജ്യോതിഷം 66
 വേലാനിർമ്മാണശക്തി 165
 വേലികയറം 165
 വ്യാവർത്തനത്തുലാസ്സ് 139
 വ്യാളഗണം 36

വ്യാഴം 38, 84, 85, 101, 207
 ഗതതാരകം 34
 ശനി 38, 85, 86, 101, 209
 ശബരഗണം 10
 ശബര (2) 37
 ശീഘ്രോച്ചങ്ങൾ 123, 124
 ശുക്രൻ 37, 82, 83, 98, 99, 202, 203
 ശുക്രസംതരണം 16
 ശുക്രവടലം 15, 231
 ,, (ഉത്ഭവകാലം) 283—286
 ശുക്രവക്ഷം 77
 ഷഡാസ്ത്രൻ 13, 37
 സമമണ്ഡലം 6
 സപ്തഷികം 20
 സപ്തഗണം 23
 സപ്തധരഗണം 23
 സമയം. പ്രത്യക്ഷ—70
 പ്രാദേശിക—70
 സ്റ്റാണ്ടേഡ്—71
 സാക്ഷദേശം 50
 സിദ്ധാന്തഗിരോമണി 53
 സീതാവേണി 20, 26, 223
 സൂർയൻ 186, 195
 ,, കാല—, മദ്ധ്യമ—, ഘടികാര
 തമദ്ധ്യമ—, സൂട— 70
 സൂർയസിദ്ധാന്തം 3, 29, 53, 90,
 111, 115
 സൈരിയസ്സ് 11

സൗരഗണങ്ങൾ 35
 സൗരവൃഹം 157, 185
 സംക്രമം 80
 സംതരണദർശിനി 150
 സംധാനിക 153
 സംവത്സരം 44
 സ്വദേശപ്രാണൻ 57
 സ്വദേശവിനാശിക 57
 സ്വസ്തികം 7
 ഹബ്ബു 256
 ഹാൻസൻ 4
 ഹാലി 213, 280
 ഹിൽ (ജി. ഡബ്ല്യു—) 4
 ഹിപ്പാർക്കസ്സ് 2
 ഹീ 1
 ഹോ 1
 ഹോരായിവന്ദൻ 114
 ഹെർസ്പെർഗ് 232, 234, 236
 ഹംസം 32
 ക്ഷയോപപായതാരങ്ങൾ 15, 226,
 227, 228
 ക്ഷിതിജം 5
 ക്ഷീരപഥം 38
 ക്ഷേത്രകാലം 149
 റസ്സൽ (എച്ച്. എൻ.—) 268
 രേതർഫോർഡ് 282
 രോമർ 177
 റോഷെ 164

ശുദ്ധിപത്രം

ഭാഗം	വരി	അബദ്ധം	സുബദ്ധം
11	22	Faumal hot	Fomalhaut
42	1	ഘടിക മദ്ധ്യാന്തരാളം	ഘടികാഖമദ്ധ്യാന്തരാളം
65	15	കാരോന്നം	കാരോന്നം.
67	13	71-64	71.64
71	11	72½°	82½°
77	14	സയ്യന്നെതിരായും	സൂര്യന്നെതിരായും
79	20	40-41'	40°-41'
88	17	ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്നു ചുറ്റും	ഒരു അക്ഷത്തിന്നു ചുറ്റും
96	13	ഖയുഗാംശോ	ഖയുഗാംശോ
99	3	അധികമാകും	അധികമാകും
100	12	പശ്ചം പശ്ചകാലം	പശ്ചകാലം
109	4	കൂടി കാ	കൂടികാ
110	25	ഒരുകല	ഒരു കല
111	9	ഗുണിതം	ഗുണിതം
111	26	ത്രിശതൃഹ്നം	ത്രിശതൃഹ്നം
„	„	സഷട്ഷഷ്ടിരബ്ദ	സഷട്ഷഷ്ടിരബ്ദ
114	10	മുദശാശ്വ	മുദയാശ്വ
115	12	ബദ്ധാസൈന്ധ	ബദ്ധാസൈന്ധ
115	13	സ്വദിങ് മുഖം	സ്വദിങ് മുഖം
137	23	36-11	3611
140	27	10-69	1-069
		10	10 ⁹
169	15	എന്ന	എന്നം
169	16	1819-1668	1819-1868
170	12	മേരുബദ്ധവാമുഖത്തേക്കു	മേരുബദ്ധവാമുഖരേഖക്കു
181	18	നിത്തുവാൻ	നിവത്തുവാൻ
190	14	വികിരിണം	വികിരണം
192	6	വികിരിണം	വികിരണം
193	26	ഇരുണ്ടിരിക്കും	ഇരുണ്ടിരിക്കും
195	27	ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു	ഉപഗ്രഹം

209	7	ചുറ്റുമുള്ള	ചുറ്റുമുള്ള
214	25	എന്നതും	എന്നതും
214	29	മറ്റൊ	മറ്റൊ
224	24	കാണുന്നു.	കാണുന്നതു

131-ാം ഭാഗത്തെ പരിലേഖത്തിൽ ഗ കറുത്ത ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു മുലയിൽ വരികയും, 168-ാം ഭാഗത്തെ പരിലേഖം പുസ്തകം തിരിച്ചുപിടിച്ചു നോക്കുകയും വേണം. 156-ാം ഭാഗം 3, 4, 5 ഈ വരികൾ താഴെ കാണാപ്രകാരം തിരുത്തണം.

“ഉത്ത 3930—4000, ചുഷ്കലം 4001—4200, നീല 4201—4900, പച്ച 4901—5400, മഞ്ഞ 5401—5875, പിച്ഛിളം 5876—6438, ചുവപ്പ് 6439—7668.”

