

GENERAL MATHEMATICS

BOOK II FOR FORM V

(According to the Syllabus issued in July 1950)

Approved as a Text-Book by the Madras Text-Book Committee
Vide Fort St. George Gazette, Part I-B, page 69
dated May 19, 1954.

J. Pavamani, B.A., L.T.

Headmaster, B. E. M. High and Training School, Tellicherry.

സാമാന്യഗണിതശാസ്ത്രം

രണ്ടാം പ്ലസ്കം - 5-ാം ഫോറത്തിനു.

(1950 ജൂലായിമാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പാഠ
പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചെഴുതിയത്).

37170
510
PAV/S

PUBLISHED BY THE
MISSION BOOK DEPOT
MANGALORE

1954

Price: Re. 1 As. 8]

[വില: 1 രൂ. 8 അ.

GENERAL MATHEMATICS

BOOK II FOR FORM V

(According to the Syllabus issued in July 1950)

Approved as a Text-Book by the Madras Text-Book Committee
Vide Fort St. George Gazette, Part I-B, page 69
dated May 19, 1954.

J. Pavamani, B. A., L. T.

Headmaster, B. E. M. High and Training School, Tellicherry.

സാമാന്യഗണിതശാസ്ത്രം

രണ്ടാം പുസ്തകം—5-ാം ഫോറത്തിനു.

(1950 ജൂലായിമാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പാഠ
പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചെഴുതിയത്).

PUBLISHED BY THE
BASEL MISSION BOOK DEPOT
MANGALORE

1954

Price: Re. 1 As. 8]

[വില: 1 രൂ. 8 അ.

First Edition. . . . 1952

Reprint 1954.



PRINTED AT THE
BASEL MISSION PRESS, MANGALORE, S.K.

മുഖവുര

4-ാം ഫോറത്തിനു വേണ്ടി എഴുതിയ ഒന്നാംപുസ്തകത്തെപ്പോലെ ഈ പുസ്തകവും 1950 ജൂലായി 18-ാം-നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ സാമാന്യഗണിതശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യതിക്കുസരിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

ഗണിതശാസ്ത്രപഠനം ദൈനംദിനജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകണം എന്ന നിഷ്ക്കഷയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പാരമ്പര്യത്തിൽ സ്റ്റോക്കും, ഓഫറിയും, ഇൻഷുറൻസ്, കമ്മീഷൻ, നികുതികൾ മുതലായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവസംബന്ധിച്ച വർത്തമാനക്കുടലാസ്സുകളിലുണ്ടാവുന്ന വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് വിവരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

കണക്കു ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ശീശ്രദ്ധയും, സൂക്ഷ്മതയും വളരെ മുഖ്യമായതുകൊണ്ടു ഗുരുനാഥൻ അവയെ പരിശോധിച്ചാൻ ഇടക്കിടെ പരീക്ഷനടത്തുകയും, അതിന്റെ ഫലം വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കുകയും വേണം. ഈ ആവശ്യം ചില ചോദ്യക്കുടലാസ്സുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ചേർത്തതായി കാണാം.

ഗവൺമെണ്ടു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ സാങ്കേതികപദങ്ങൾമാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാംപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങൾക്കു പുറമെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കാണാം.

മദിരാശി S. S. L. C. പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു യുക്തമായ സ്ഥലത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം കാണുന്ന സംഖ്യകൾ പരീക്ഷനടന്ന കൊല്ലങ്ങളാണ്.

ഒന്നാംപുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം ഈ പുസ്തകവും 30 കൊല്ലത്തിൽപരം ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നു എനിക്കു സിദ്ധിച്ച പരിചയത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഇതിനുമുമ്പു ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രാഥമികഗണിതശാസ്ത്രത്തെപ്പോലെതന്നെ പുതിയ പാരമ്പര്യതിക്കുസരിച്ചു, 4-ാം ഫോറത്തിനുവേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകവും ജനസമ്മതമായി തീർന്നിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഈ പുസ്തകവും എഴുതുമ്പോഴായി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനീവിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും പ്രയോഗികമായ ഇടപാടുകളിൽ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനും ഈ എന്റെ എളിയ ഉദ്യമവും പ്രയോജനകരമായിത്തീരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ഇതിനെ ഞാൻ അവർക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു.

തലശ്ശേരി, 20-10-1951.

ജെ. പാവാമണി.

വിഷയവിവരം

അദ്ധ്യായം

ഭാഗം.

1. സമുലഗണനം. ചുരുക്കവഴികൾ	1
2. ചില സാമാന്യ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം	14
3. 1. സ്റ്റോക്കും ഓഹരിയും 2. ഇൻഷുറൻസ് 3. കമ്മീഷൻ 4. നികുതികൾ 5. ലീവാളി	16
4. കൂട്ടുപലിശ	31
5. വസ്തുവലുതം	38
6. പൈതൃകഗൊറസ്സിന്റെ പ്രമേയം	52
7. വൃത്തം	60
8. വൃത്തങ്ങളുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ	71
9. ത്രികോണനിർമ്മാണം	78
10. a. തോതനുസരിച്ചു വരക്കുക b. ലിശകൾ. c. മേൽ നോട്ടക്കോണം കീഴ് നോട്ടക്കോണം d. കോണമാനി.	82
11. ചില ചതുർജ്ജകോശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും കോശരൂപവും	92
12. ഏകകാലികസമതലങ്ങൾ.	102
13. ഏകകാലികസമതലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യാവുന്ന കണക്കുകൾ	113
14. സരളരേഖാലേഖാചിത്രങ്ങൾ	122
15. പരീക്ഷക്കുടലാസ്സുകൾ	125
സാങ്കേതികപദങ്ങൾ	132
ഉത്തരങ്ങൾ	134

അദ്ധ്യായം 1.

സ്ഥൂലഗണനം. (Approximation).

ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൃത്യമായി ഗണിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം ജനസംഖ്യയുടെ കണക്കെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ജനനമരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ചില ആളുകൾ രാജ്യം വിട്ടുവെന്നും, മററു ചിലർ രാജ്യത്തേക്കു വന്നുവെന്നും വരാം. ഇങ്ങിനെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളെ സുമാറായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്.

കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാൽകൂടി വലിയ സംഖ്യകളെ സുമാറായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്. മദിരാശിസംസ്ഥാനത്തിലെ നിലനികുതി ഇത്ര ഉറപ്പിക എന്നു പറയുന്നതിന്നു പകരം ലക്ഷങ്ങളോ, ആയിരങ്ങളോ ആയിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇങ്ങിനെ പറയുമ്പോഴാണ് കേൾവികാർക്കു അതിന്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബോധമുണ്ടാകുന്നത്. നികുതി 51,75,32,378 ഉറപ്പികയും ചെലവു് 55,60,87,914 ഉറപ്പികയും എന്നു പറയുന്നതിന്നു പകരം നികുതി 5175 ലക്ഷം ഉറപ്പികയെന്നും, ചെലവു് 5561 ലക്ഷം ഉറപ്പികയെന്നും പറയുമ്പോഴാണ് ഈ സംഖ്യകളെ കാർക്കുവാൻ അവയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാനും എളുപ്പമാകുന്നത്.

നാം സുമാറായിട്ടു പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്ര (Unit of Measurement) സംഖ്യയുടെ വലിപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു വൻകരയിലെ ജനസംഖ്യയെ കോടിയായും, ഒരു രാജ്യത്തിലേതു ലക്ഷമായും, ഒരു പട്ടണത്തിലേതു ആയിരമായും, ഒരു ഗ്രാമത്തിലേതു നൂറായും ആണ് പറയുന്നത്.

35,739 ജനങ്ങളുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ ആയിരമായിട്ടു പറയുന്നവെന്നു വിചാരിക്കുക. 35 മുഴു ആയിര

ങ്ങളും, 739 ഒന്നുകളും ആകുന്നു. ഈ സംഖ്യയെ 35 ആയിരം എന്നു പറയുന്നതിലുള്ള സ്ഥലിതം (Error) 739 ആണു. 36 ആയിരമെന്നു പറയുന്നതായാൽ സ്ഥലിതം 261 മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടു ആയിരങ്ങളായി പറയുമ്പോൾ 36 ആയിരമെന്നു പറയുന്നതാണ് അധികം ശരി. ഇങ്ങിനെ അടുത്ത ആയിരത്തിന്റെ എണ്ണം പറയുന്നതാണെങ്കിൽ 34,500 മുതൽ 35,499 വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളേയും 35 ആയിരം എന്നു പറയാം. ഇങ്ങിനെ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്ഥലിതം 500ൽ കവിയാകയില്ല.

ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില 29ക. 3ണ.യാണെന്നു വിചാരിക്കുക. വില 29ക.യാണെന്നു പറയുന്നതായാൽ സ്ഥലിതം=3ണ. 30ക. എന്നു പറയുന്നതായാൽ സ്ഥലിതം=13ണ.

ഇങ്ങിനെ അടുത്തുള്ള എണ്ണം പറയുന്നതായാൽ സ്ഥലിതം ഒരിക്കലും മാത്രയുടെ പകുതിയിൽ കവിയാകയില്ലെന്നു ഈ രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ഇങ്ങിനെ അടുത്തുള്ള വില പറയുന്നതിന്നു അതിന്റെ സുമാർവില (Approximate value) നിശ്ചയിക്കുക എന്നോ സ്ഥൂലഗണനം എന്നോ പറയുന്നു.

ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറയാം. ഒരു മാത്രയുടെ ഭിന്നിതങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയിൽ കുറഞ്ഞതിനെ വിട്ടുകളകയും പകുതിയേയും, പകുതിയിൽ അധികമായതിനേയും 1 ആയി ഗണിക്കുകയും ചെയ്യണം.

മേൽപറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയെ നമുക്കു ആവശ്യമുള്ളത്ര കൃത്യമായി വൃക്കമാക്കാം.

35739—3574 പത്തുകൾ

—357 നൂറുകൾ

—36 ആയിരങ്ങൾ

മേൽപറഞ്ഞ സംഖ്യകളിൽ മാത്രം മാറുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ എണ്ണവും മാറുന്നു. കാരോ അവസരത്തിലും നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രയുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ ഗണ്യസംഖ്യകൾ (Significant figures) എന്നു പറയുന്നു.

35739നെ രൂറുകളായി പറയുമ്പോൾ 357 രൂറു എന്നു മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. മാത്രം റൂറാണെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 357 എന്നു മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ആയിരങ്ങളായി പറയുമ്പോൾ ഗണ്യസംഖ്യ 36 ആണ്.

മരം തൂക്കുന്ന ഒരു തുലാസ്സ്, സ്വസ്ഥ്വമോ കഷ്ടതയോ തൂക്കുന്ന ഒരു തുലാസ്സിനോളം കൃത്യമായിരിക്കേണ്ടമെന്നില്ല. കാരോ അവസരത്തിലും ആവശ്യമായ കൃത്യത നാം അളക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ വിലയേയോ സ്വഭാവത്തേയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

വാഷാണം തൂക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗൺസിന്റെ 1000ൽ കരംശംവരെ കൃത്യമായി തൂക്കം കാണേണ്ടിവരും. ഒരു കപ്പലിന്റെ തൂക്കം ഇത്ര ആയിരം ടൺ എന്നു മാത്രമാണ് പറയുന്നതു. താഴെ എഴുതിയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു ഗണ്യസംഖ്യകൾ എന്താണെന്നു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കും.

1. കോമറിൻ എന്ന കപ്പലിന്റെ തൂക്കം = 15,000 ടൺ
2. ഒരു ബസ്സിൽ കയറാറാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തൂക്കം = 2240 റാത്തൽ
3. ഒരു കത്തിന്റെ തൂക്കം = 2 കൗൺസ്
4. ഒരു ഗുളികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള അമീനിന്റെ തൂക്കം } = 0.007 ഉറപ്പികരതതൂക്കം.

മാത്ര	ഗണ്യസംഖ്യ
1. 1000ടൺ	15
2. 1 റാത്തൽ	2240
3. 1 കൗൺസ്	2
4. 0.001 ഉറപ്പികരതതൂക്കം	7

റണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ 2240 എന്ന സംഖ്യയിൽ 0ന് വിധിയുണ്ടു. നാലാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഗണ്യസംഖ്യ നിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശേഷം 0.007ൽ ഉള്ള പൂജ്യങ്ങൾക്കു വിധയില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തു ഒരു ദിവസം പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവു 1 അംഗുലത്തിന്റെ $1\frac{1}{10}$ വരെ കൃത്യമായിട്ടാണു വർഷമാനപത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു. അതുകൊണ്ടു 3 അംഗുലം മഴയെ 30 എന്നാണ്

ഏഴുതന്നതു. കാരണം മാത്രം 01 ആയതുകൊണ്ടു ഗണ്യസംഖ്യ 30 ആണ്. 3 അല്ല. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ 0നു വിലയുണ്ട്.

1 അംഗവും 10 സമഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ചു സാധനങ്ങളെ അളക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ഈ അളവുകോൽ കൊണ്ടു ഒരു സാധനത്തെ അളന്നു അതിന്റെ നീളം 5'3 അംഗുലമാണെന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുക. അതിന്റെ നീളം 5'3"നും 5'4"നും ഇടയിലാണ്. സാധനത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി അതു 3-ാമത്തെ കുറിയോടോ 4-ാമത്തെ കുറിയോടോ അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ കുറിയോടു അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീളം 5'3" എന്നും 4-ാമത്തെ കുറിയോടാണു അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 5'4" എന്നും ഗണിക്കുന്നു.

അതിനാൽ നീളം 5'3" എന്നു പറയുമ്പോൾ നീളം 5'25 അംഗുലത്തിനും 5'35"നും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നീളമാവാം. അവയിൽ താഴെ പറയുന്ന 10 നീളങ്ങളും പെട്ടിരിക്കുന്നു.

5'25"; 5'26"; 5'27"; 5'28"; 5'29"; 5'30"; 5'31"; 5'32"; 5'33"; 5'34". അതായതു നീളങ്ങളുടെ സീമകൾ (limits) 3'25" ഉം 3'35"ഉം ആണ്.

ഉദാ: - (1) $\frac{1}{13}$ എന്ന ഭിന്നിതത്തെ ദശാംശഭിന്നിതമാക്കി അതിനെ ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണേണ്ടതുകൊണ്ടു 4-ാമത്തെ സ്ഥാനം കാണണം.

$$\frac{1}{13} = .2307$$

$$= .231 \text{ (ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം).}$$

(2) 127 പുസ്തകത്തിന്നു 536 ക. 8 റണ. വിലയായാൽ 1 പുസ്തകത്തിന്റെ വില (i) പൈവരെ (ii) അണവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

1 പുസ്തകത്തിന്റെ വില = 4 ക. 3 റണ. $7\frac{1}{27}$ പ. $1\frac{1}{27}$ യെക്കാൾ ചെറുതാകകൊണ്ടു വിട്ടുകളയണം.

$$7\frac{1}{27} \text{ പ. } \frac{1}{2} \text{ റണ. യെക്കാൾ വലുതാകകൊണ്ടു 1 റണ. യായി കരുതണം.}$$

$$\therefore \text{പുസ്തകത്തിന്റെ വില} = 4 \text{ ക. 3 റണ. 7 പ. (പൈവരെ കൃത്യം)}$$

$$= 4 \text{ ക. 4 റണ.}$$

$$\text{(അണവരെ കൃത്യം)}$$

അഭ്യൂഹം 1.

1. താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളെ ആയിരംവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.
46375; 809700; 1499682; 70101046.
2. ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം 93,142,357 നാഴികയാണ്. ഈ ദൂരത്തെ (a) ആയിരം (b) ലക്ഷം (c) മില്യൻ (d) കോടിനാഴികവരെ കൃത്യമായി കാണുക.
3. താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളെ (a) പൈ (b) അണ (c) ഉറപ്പിക വരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.
(i) 21ക. 13ണ. $7\frac{1}{4}$ പ. (ii) 9ണ. $3\frac{1}{2}$ പ. (iii) 7ണ. $7\frac{3}{4}$ പ.
(iv) $11\frac{1}{2}$ പ.
4. താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളെ (a) പൂണ്ണസംഖ്യവരെ (b) 1 ദശാംശ സ്ഥാനംവരെ (c) 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.
(i) 23.045.
(ii) 169.7375.
(iii) 0.81542.
(iv) 0.436099.
5. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 352,837,778 ആണ്. ഇത് (a) മില്യൻ ആയി 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ (b) കോടിയിൽ 1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക. (1939)
6. $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{5}{9}$ എന്നീ ഭിന്നിതങ്ങൾക്കു സമമായ ദശാംശഭിന്നിതങ്ങളുടെ വില (a) 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ (b) 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.
7. താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളെ 3 ഗണ്യസംഖ്യകൾവരെ കൃത്യമാക്കത്തക്ക വണ്ണം എഴുതുക.
60080; 7.5459; 0.043956; 0.0073281; $3.\dot{7}$; $12.\dot{2}\dot{7}$; $0.0\dot{6}$; $3.1\dot{2}$.
8. 2 ദശാംശസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ ഒരു സ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി എഴുതിയാൽ അതു 12.9 ആകും. എന്നാൽ ആ സംഖ്യയുടെ വില എന്തല്ലോ?
9. ഒരു ഓൺസിന്റെ $\frac{1}{16}$ വരെ കൃത്യമായി തുകവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തുലാസ്സിൽ തൂക്കിയ ഒരു കത്തിന്റെ തുക 1.72 ഓൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും കവിഞ്ഞതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുമായ തുക ഒരു ഓൺസിന്റെ 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

10. ഒരു ദിവസത്തിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം മിനുട്ടുവരെ കൃത്യമായി ഗണിച്ചപ്പോൾ 12 മണിക്കൂർ 7 മിനുട്ടു എന്നു കണ്ടു. എന്നാൽ ആ ദിവസത്തിൽ പകലിന്റെ ഏറ്റവും കവിഞ്ഞതും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുമായ ദൈർഘ്യം സെക്കണ്ടുവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

11. ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഒരു ഉറപ്പികയുടെ 2 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുന്നതായാൽ 3.73 ക.യായിരിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും കവിഞ്ഞതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുമായ വില പൈസ വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

12. താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളെ 3 ഗണ്യസംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി എഴുതുക. ഓരോന്നിലും സ്വീകരിച്ച മാത്ര എഴുതുക.

- (i) ഒരു ജന്മിയുടെ സ്വത്ത് 1,99,524 ക. വിലക്കുണ്ട്.
- (ii) ഒരു പെട്ടിയിലുള്ള വായുവിന്റെ തൂക്കം 0.02316 ഗ്രാം.
- (iii) ഒരു കമ്പിയുടെ വ്യാസാർദ്ധം 0.9243 അംഗുലം.
- (iv) ഒരു മുറിയുടെ നീളം 43.765 അടി.

13. താഴെ എഴുതിയ സംഖ്യകൾ 4 ഗണ്യസംഖ്യകൾ വരെ കൃത്യമാണെങ്കിൽ അവ ഏതു സീമകൾക്കി (Limits) ടയിലായിരിക്കുമെന്നു കാണുക.

(a) 10.29. (b) 0.4035. (c) 7.001. (d) 625000.

14. ഒരു ഭാരതീയഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ആര്യഭട്ടൻ $\pi = 3\frac{17}{120}$ എന്നാണ് ഗണിച്ചത്. π യുടെ വില 3.1415963 എന്നു കരുതുന്നതായാൽ അയാൾ ഗണിച്ച വിലക്കു സമമായ ദശാംശഭിന്നിതം ഈ വിലയോടു എത്ര ഗണ്യസംഖ്യകളോളം യോജിക്കും? (1935)

കൂട്ടൽ, കിഴിക്കൽ, പെരുക്കൽ, ഹരിക്കൽ എന്നീ ക്രിയകളുടെ ഫലം സുമാറായി കാണുന്ന ചുരുക്ക വഴികൾ (Contracted Methods)

കൂട്ടൽ (Addition).

235.87647, 4.504239, 1056.0396, 64.1405, 0.025698 ഇവയുടെ തുക 1 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി കാണണമെന്നു വിചാരിക്കുക.

2-ാം ദശാംശസ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുക 5-ൽ അധികമായാൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തോടു 1 കൂട്ടേണ്ടതുകൊണ്ടു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെ വിട്ടുകൊടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതേപ്രകാരം 3-ാം സ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുക 5-ൽ അധികമാ

യാൽ 2-ാംസ്ഥാനം 1 കണ്ടു വല്പിക്കുകയും അതുനിമിത്തം ചിലപ്പോൾ 1-ാം സ്ഥാനം വല്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു 3-ാംസ്ഥാനത്തേയും വിട്ടുകുളവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂട്ടേണ്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം 10ൽ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ 1-ാംസ്ഥാനത്തിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയെ വല്പിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിന്നു പുറമെ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളും കൂടി എടുക്കുന്നതായാൽ ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതു കൃത്യമായിരിക്കും. 2 സ്ഥാനങ്ങൾ അധികം എടുക്കുന്നതിന്നു പകരം അവയിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തെ കൃത്യമാക്കി (b)യിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ചേർത്താലും മതി.

ക്രിയ താഴെ കാണിക്കുംപ്രകാരം ആവാം.

(a)	(b)	(c)
235.8 76	235.8 8	235.87647
4.5 04	4.5 0	4.504239
1056.0 39	1056.0 4	1056.0396
64.1 40	64.1 4	64.1405
0.0 25	0.0 3	0.025698
<u>1360.5 84</u>	<u>1360.5 9</u>	<u>1360.586507</u>
$\therefore$ തുക = <u>1360.6</u>		

സുമാരായി കണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ 1 ലക്ഷംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുവാൻ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും എടുത്തു വലത്തു വശത്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.

കിഴിക്കൽ (Subtraction).

314.072568ൽ നിന്നു 49.1980574 കിഴിച്ചു കിട്ടുന്ന ഫലത്തെ 2 ലക്ഷംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

3-ാം സ്ഥാനത്തെ കൃത്യമാക്കി എഴുതിയാൽ ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതു കൃത്യമായില്ലെന്നു വരാം. അതുകൊണ്ടു 2 സ്ഥാനങ്ങളും കൂടി അധികമെടുത്തു കിഴിക്കുക.

314.07 25	314.072568
49.19 80	49.1980574
<u>264.87 45.</u>	<u>264.8745106</u>

$\therefore$ കിഴിച്ചുകിട്ടുന്ന ഫലം = 264.87.

രണ്ടുത്തരങ്ങളേയും ഒരുതന്നോക്കുക.

പെരുക്കൽ (Multiplication).

104.76153നെ 72.15496കൊണ്ടു പെരുക്കിക്കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലത്തെ 2 ലശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

1. ഒന്നാമതായി ഗുണനഫലത്തിലെ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ എത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു നിശ്ചയിക്കുക. ഇതിന്നായി തലിൽ ഗുണിക്കേണ്ടുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഒന്നിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ ഒരു സ്ഥാനം മാത്രം വരത്തക്കവണ്ണം എഴുതുക. ഇങ്ങിനെ എഴുതുന്നതിന്നു പ്രമാണരൂപ (Standard Form)ത്തിൽ എഴുതുക എന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ എഴുതുന്നതു ഗുണനഫലത്തിന്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്നു എളുപ്പത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുവാനാണു്.

ഉദാഹരണമായി 72.15496നെ പ്രമാണരൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതായാൽ അതു 7.215496 ആയ്കിലും.

$$\begin{aligned}\text{ഗുണനഫലം} &= 104.76153 \times 72.15496 \\ &= 1047.6153 \times 7.215496\end{aligned}$$

ഗുണനഫലം 1047×7 നും 1048×8 നും ഇടയിലായിരിക്കും. അതായതു ഗുണനഫലം 7329ൽ കവിഞ്ഞു 8384ൽ കുറഞ്ഞു ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഗുണനഫലത്തിന്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ 4 സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

2. 1047.6153നെ ഗുണമായി കരുതി ആവശ്യപ്പെട്ട 2 ലശാംശസ്ഥാനത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു വര വരക്കുക.

$$\begin{array}{r|l} 1047.6153 & \\ \hline & 7.215496 \\ \hline 7333.30 & 7 \\ 209.52 & 3 \\ 10.47 & 6 \\ 5.23 & 8 \\ 41 & 9 \\ 9 & 4 \\ & 6 \\ \hline 7559.06 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\therefore \text{ഗുണനഫലം} = 7559.06.$$

3. വരയുടെ നേരെ വലത്തായി ഗുണകാരനെ എഴുതുക.

4. 4-ാം ദശാംശസ്ഥാനത്തിലുള്ള 3നെ 7കൊണ്ടു പെരക്കിയാൽ 21 കിട്ടും. ഇതിനെ 3-ാം സ്ഥാനംവരെ കൃത്യമാക്കിയാൽ 2 കിട്ടും. 3-ാം സ്ഥാനത്തിലുള്ള 5നെ 7കൊണ്ടു പെരക്കിക്കിട്ടുന്ന 35നോടു 4-ാം സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ 2ഉം കൂട്ടി 7ന്റെ ചുവടെ 7 എന്നെഴുതുക. 7കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം പൂർത്തിയാക്കുക.

5. പിന്നെ പെരക്കേണ്ടതു 2കൊണ്ടാണ്. ഇതു 1-ാം ദശാംശസ്ഥാനത്തിലായതുകൊണ്ടു 3-ാം ദശാംശസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരക്കം കിട്ടുവാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടു 2-ാം ദശാംശസ്ഥാനത്തിലുള്ള 1നെ പെരക്കണം. 3-ാം സ്ഥാനത്തിലുള്ള 5നെ 2കൊണ്ടു പെരക്കിക്കിട്ടുന്ന 10നെ, 3-ാം സ്ഥാനംവരെ കൃത്യമാക്കി കിട്ടുന്ന 1നെ ആലുത്തെ ഗുണിതമായ 2നോടു കൂട്ടി തുകയായ 3നെ 3-ാം ദശാംശസ്ഥാനത്തു ചേർക്കുക. 2കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം പൂർത്തിയാക്കുക.

6. ഇതേപ്രകാരം ശേഷമുള്ള അക്കങ്ങളെക്കൊണ്ടു പെരക്കുക. ക്രിയ ഉദാഹരണത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

7. എല്ലാ അക്കങ്ങളും എഴുതിപ്പെരക്കുന്ന ക്രിയയും ഈ കറുക്കുവഴിയും വിദ്യാർത്ഥി ഒത്തുനോക്കണം.

മൂന്നു സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടതു കൃത്യമായി കാണുവാൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടതിലും ഒരു സ്ഥാനം അധികംവരെ കൃത്യമായി കണ്ടു അതിനെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യകൊണ്ടു ഗുണിക്കുക.

ഹരിക്കൽ (Division).

65134.4087നെ 397.523601കൊണ്ടു ഹരിച്ചുകിട്ടുന്ന ഹരിതഫലത്തെ 2 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കുക.

1. ഹരിതഫലത്തിന്റെ പൂണ്ണസംഖ്യയിൽ എത്ര സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്നു നിശ്ചയിക്കുക.

ഇതിന്നായി ഹാരകത്തെ പ്രമാണരൂപത്തിലെഴുതുക.

$$\text{ഹരിതഫലം} = \frac{65134.4087}{397.523601} = \frac{651.344087}{3.97523601}$$

∴ ഹരിതഫലം $6\frac{5}{4}1$ നും $6\frac{5}{3}2$ നും ഇടയിലായിരിക്കും.

അതായതു ഹരിതഫലത്തിന്റെ പൂണ്ണസംഖ്യ 163നും 217നും ഇടയിലായിരിക്കും. പൂണ്ണസംഖ്യയിൽ 3 സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും.

2. ഹരിതത്തെ 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണേണ്ടതുകൊണ്ടു

അതിൽ ആകെ 5 സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം. ഉത്തരം 5 സ്ഥാനങ്ങൾ വരെ കൃത്യമായിരിപ്പാൻ 6 സ്ഥാനങ്ങൾ കാണണം.

3. ഹാരകത്തിൽ 6 സ്ഥാനം നിർത്തി ശേഷമുള്ളവയെ വിട്ടുകളയുക.

4. ഈ ഹാരകത്തെക്കൊണ്ടു ഒരിക്കൽ ഹരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതു സ്ഥാനങ്ങൾ ഹാര്യത്തിൽ നിർത്തി ശേഷമുള്ളവയെ വിട്ടുകളയുക.

5. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഹരിച്ചശേഷം ഹാര്യത്തിൽ പുതുതായി സ്ഥാനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന്നു പകരം ഹാരകത്തിൽനിന്നു ഓരോ സ്ഥാനം നീക്കിക്കളയുക.

ക്രിയ താഴെ കാണാംപ്രകാരമായിരിക്കും.

	163·850
3·975236	651·344
	397·524
	253·820
	238·514
	15·306
	11·926
	3·380
	3·180
	·200
	·199
	1

(a) 6നെ 1കൊണ്ടു പെരുക്കി അടുത്ത സ്ഥാനം വരെ കൃത്യമാക്കി കിട്ടുന്ന 1നെ 3×1 നോടു ചേർത്തു 4 എണ്ണെഴുതുക. (b) ഇതേപ്രകാരം നീക്കിക്കളയുന്ന ഓരോ അക്കത്തേയും പെരുക്കി അടുത്ത സ്ഥാനംവരെ കൃത്യമാക്കുക.

എല്ലാ അക്കങ്ങളും എഴുതി ഹരിക്കുന്ന ക്രിയയും താരതമ്യത്തിനായി താഴെ ചേർക്കുന്നു.

		163·850
397523601	651344	08700
	397523	601
	253820	4860
	238514	1606
	15306	32540
	11925	70803
	3380	617370
	3180	188808
	200	4285620
	198	7618005
	1	6667615

അദ്വൈതം 2.

1. താഴെ എഴുതിയ സംഖ്യകളുടെ തുക (a) പൂർണ്ണസംഖ്യവരെ (b) 2 ദശാംശസ്ഥാനവരെ (c) 3 ദശാംശസ്ഥാനവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

- (i) $5.210562,$ $4.370956,$ $18.86483,$
 $0.409201,$ $15.67301.$
- (ii) $8.632454,$ $0.008458,$ $16.859249,$
 $4.45625.$
- (iii) $5.3,$ $3.21,$ $0.142857,$ $1.845,$
 $0.0432.$

2. താഴെ എഴുതിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(a) പൂർണ്ണസംഖ്യവരെ (b) 1 ദശാംശസ്ഥാനവരെ (c) 2 ദശാംശസ്ഥാനവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

- (i) $4.5249,$ $7.4795.$
- (ii) $10.8629,$ $3.5432.$
- (iii) $1.45,$ $3.6.$

3. 1.3456 നെ $4,$ $12,$ 16 ഇവകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഗുണനഫലത്തെ 3 ദശാംശസ്ഥാനവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.

4. താഴെ കാണുന്ന ഗുണനഫലങ്ങളെ രണ്ടു ദശാംശസ്ഥാനവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.

- (i) $10.365 \times 21.347.$
- (ii) $7.8193 \times 0.2345.$
- (iii) $34.37093 \times 12.75.$
- (iv) $319.784 \times 0.003134.$

5. ഗുണനഫലം ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൃത്യമായി കാണുക.

- (i) 41.381×0.0314 (3 ഗണ്യമായ അക്കംവരെ).
- (ii) $0.0032758 \times 0.120135$ (2 ഗണ്യമായ അക്കംവരെ).
- (iii) 53.48×8678.396 (ആയിരംവരെ).
- (iv) 356.807×56794.78 (ലക്ഷംവരെ).
- (v) $0.37642567 \times 28.5631$ (5 ദശാംശസ്ഥാനവരെ).
- (vi) $0.0001 \times 9.71 \times 5.836$ (5 ദശാംശസ്ഥാനവരെ).
- (vii) $0.02 \times 0.0203 \times 0.123$ (7 ദശാംശസ്ഥാനവരെ).

6. താഴെ എഴുതിയ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗം മൂന്നു ഗുണമായ അക്കംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

49.33; 4.978; 0.0317.

7. 2.93ന്റെ ത്രിമാനം (cube) 1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

8. ഹരിതഫലം ആവശ്യപ്പെടുത്തു കൃത്യമായി കാണുക.

(i) $56.9812 \div 47.87631$ (4 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ).

(ii) $1378.03157 \div 35.3781$ (2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ).

(iii) $756796.54 \div 4878.70563$ (1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ).

(iv) $68327 \div 7836$ (5 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ).

(v) $0.056068246 \div 8.0327$ (3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ).

(vi) താഴെയുള്ളവയെ 4 ഗുണസംഖ്യകൾവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

(a) $97.521 \div 6543$.

(b) $19.41377 \div 1.34177$.

(c) $583 \div 721$.

(d) $91.372153 \div 1.53276$.

9. 3.203458612ന്റെ വ്യുൽക്രമ (reciprocal)നെ 6 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

10. ഹരിതഫലത്തെ 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

(a) $8.26 \div 3.1762$.

(b) $1.927 \div 3.08$.

11. കാരോ സമവാക്യത്തിലും x ന്റെ വില പൂർണ്ണസംഖ്യവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

(a) $2.03x = 1830.26$.

(b) $0.0318973x = 35.78364$.

12. 1901, 1911 എന്നീ കൊല്ലങ്ങളിൽ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ റേൽ റേലിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

റേലിന്റെ തരം	1901 ലെ എണ്ണം	1911 ലെ എണ്ണം	ശതമാനം വർദ്ധനവ് (+) ക്ഷയം (—)
പരത്തി (കടയൽ)	24,089	32,553	
പരത്തി (റേലിൽ)	623,783	580,321	
ചണ	533	2,428	
കയർ	42,376	58,794	
മറ്റു റേലുകൾ	7,886	9,252	
ആകെത്തുക			

ശതമാനം കാണിക്കുന്ന കള്ളികളും, ആകത്തുകയുടെ വരിയും 1 ലക്ഷംശ സ്ഥാനംവരെ കൃത്യമാക്കി പൂരിപ്പിക്കുക. (1914)

13. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ 22, 934, 523 പവൻ വിലക്കുള്ള 61,325,694 ശതത്തൂക്കം ഗോതമ്പും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും 16,837, 425 പവൻ വിലക്കുള്ള 41,568, 705 ശതത്തൂക്കം ഗോതമ്പും ബ്രിട്ടീഷുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ (i) അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും (ii) ബ്രിട്ടീഷുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഒരു ശതത്തൂക്കം ഗോതമ്പത്തിന്നു എന്തു വിലയെന്നു ഫെനി വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

ബ്രിട്ടീഷുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഗോതമ്പിന്റെ വില ആകെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണെന്നു, പൂണ്ണസംഖ്യവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1915)

14. ഇന്ത്യാഗവർണ്മെന്റുവകയുള്ള തീവണ്ടിപ്പാതകളിൽനിന്നു രണ്ടു കൊല്ലങ്ങളിലുണ്ടായ വരവു താഴെ ചേർക്കുന്നു:

കൊല്ലം	തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ നീളം	ആകെ വരവു
1903	21,131 നാഴിക	36,00.82,035 ക.
1912	25,125 ,,	61,65,07,005 ക.

(i) ഓരോ കൊല്ലത്തിലും ഒരു നാഴിക വീതം വരവെത്രയെന്നു ഉറപ്പിക വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

(ii) 1903-12 വരെയുള്ള കൊല്ലങ്ങളിൽ നാഴികവീതമുള്ള വരവ് എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചുവെന്നു 1 ലക്ഷംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1922)

15. 1911, 1921 എന്നീ കൊല്ലങ്ങളിലെ കാനേഷുമാരി കണക്കുപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ജനസംഖ്യ (ആയിരമായി) താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനം	1911	1921
ബങ്കാൾ	45,483	46,696
മദ്രാസ്	41,405	42,319
ബോംബെ	19,626	19,348
ഐക്യസംസ്ഥാനങ്ങൾ	46,807	45,376
പഞ്ചാബ്	19,579	20,685

(a) ആദ്യത്തെ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷയ വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം.

(b) എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും ജനസംഖ്യയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവിന്റെ ശതമാനം 1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1925)

അദ്ധ്യായം 2.

ചില സാമാന്യ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം (Approximate equivalents for common units).

നാം സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന അളവുകളും മെട്രിക് (Metric) അളവുകളും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം അറിയുന്നതു നന്നായിരിക്കും. 1 മീറ്റർ = 39.37079 അംഗുലം എന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി 39.37" എന്നെഴുതാം. ഇതിൽനിന്നു $1'' = \frac{1}{39.37}$ മീറ്റർ = $\frac{1.0.0}{39.37}$ സെ. മീ. = 2.54 സെ.മീ. എന്നു ഗണിക്കാം.

∴ 1 അടി = 30.48 സെ. മീ.

1 കിലോമീറ്റർ = 1000 മീറ്റർ = 39370.79" = 3280.9 അടി (1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം).

$\frac{5}{8}$ നാഴിക = $\frac{5 \times 25.4}{8}$ അടി = 3300 അടി

അതുകൊണ്ടു എളുപ്പത്തിൽ കാക്കുവാൻ 1 കി. മീ. = $\frac{5}{8}$ നാഴിക എന്നു കരുതാറുണ്ട്.

1 റാത്തൽ = 453.60 ഗ്രാം എന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു 1 ഗ്രാം = .0353 ഓൺസ് എന്നു ഗണിക്കാം.

1 കിലോഗ്രാം = 1000 ഗ്രാം = 35.3 ഓൺസ് = 2.2 റാത്തൽ (1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം). 1 റാത്തൽ = 453.6 കി. ഗ്രാം.

1 ശതക്കുറുപ്പ് = 453.6 × 112 ഗ്രാം = 50.8 കി. ഗ്രാം. (1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം).

1 ലീറർ = 1000 ചെനസെൻറി ലീറർ = 33.81 ഓവകൗൺസ് എന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു 1 ഓവകൗൺസ് = 30.00 ചെന സെ. മീ. (2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം) എന്നു ഗണിക്കാം.

$6\frac{1}{4}$ ഗാലൻ = 1 ചെന അടി = 1728 ചെനാംഗുലം. ഇതിൽനിന്നു 1 ഗാലൻ = 4.5460 ലീറർ എന്നു ഗണിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 3.

1. എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉയരം 29002 അടിയാണ്. ഇതു മീറ്ററിന്നു കൃത്യമാക്കി എഴുതുക. 1 മീറ്റർ = 39.37".

2. 1 അംഗുലം = 2.54 സെ. മീ. എന്നു കരുതി 1 ചതുരശ്ര അംഗുലം എത്ര ച. സെ. മീ. നും 1 ചെനാംഗുലം എത്ര ച. സെ. മീ. നും സമമാണെന്നു 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.

3. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ 100 വാറ 11 സെക്കണ്ടിലും ഒരു ഫ്രെഞ്ചുകാരൻ 100 മീറ്റർ 12.5 സെക്കണ്ടിലും ഓട്ടമെങ്കിൽ 100 വാറ ഓട്ടപ്പെടുന്നതായി അതിൽ ആർ ജയിക്കും? എത്ര സെക്കണ്ടുകൊണ്ട്? സെക്കണ്ടിന്റെ $\frac{1}{10}$ വരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുക. 1 മീറ്റർ = 39.4".

4. 1 വാറ തുണിക്കു 4 കി. 6 പെ. വിലയായാൽ 1 മീറ്റർ തുണിയുടെ വില ഫ്രേങ്കിന്നു കൃത്യമായി കാണുക. 1 ഫ്രേങ്ക് = 2 പെൻസ്. 100 മീറ്റർ = 109 വാറ.

5. ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവു 40 മില്യൻ മീറ്റർ എന്നും 1 വാറ = .91 മീറ്റർ എന്നും കരുതുന്നതായാൽ ചുറ്റളവു എത്ര നാഴികയെന്നെന്നു നാഴികയുടെ 1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുക.

6. 1 മീറ്റർ = 39.37". 1 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ എത്ര (1) ച. അം. (2) ച. അ. (3) ച. വാറ ഉണ്ടെന്നു 4 ഗണ്യസംഖ്യകൾവരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുക.

7. 1 ച. മീ. = 1.196 ച. വാറ എന്നു കരുതി 1 ഏക്കർ എത്ര ച. കിലോ മീറ്ററിന്നു സമമാണെന്നു പൂണ്ണസംഖ്യവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

8. ഒരു മോട്ടോർകാർ മണിക്കൂറിൽ 48.055 കി. മീ. വീതം ഓടുന്നു. ഇതു സെക്കണ്ടിൽ എത്ര അടിക്കു സമമാണെന്നു അടിവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

9. 1 ലീറർ = 33.81 ഓവകൗൺസ് എന്നും $1'' = 2.5$ സെ. മീ. എന്നും കരുതി 1 ചെനാംഗുലം എത്ര ഓവകൗൺസിന്നു സമമാണെന്നു 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

10. 1 മീറ്റർ = 39.3708". എന്നാൽ 83 കിലോമീറ്ററും 51 നാഴികയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അടിയുണ്ടെന്നു അടിവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1913)

11. 1 മീറ്റർ = 39.371". 1 കിലോഗ്രാം = 2.2046 റൺ. 1 ഫുറീറ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം = 1000 കി. ഗ്രാം. എന്നാൽ 1 ഫു. അടി വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം കൗൺസിലിന്റെ $\frac{1}{10}$ വരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1924)

12. 1 മീറ്റർ = 39.37079 അംഗുലം. എന്നാൽ 5 നാഴികയും 8 കിലോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാരവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1929)

അദ്ധ്യായം 3.

ബേങ്കുടപാടുകളേയും സൈവിങ്സ് സട്ടീഫിക്കറുകളേയും പറ്റി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രായോഗികമായ ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠിക്കാം.

1. സ്റ്റോക്കും ഓഹരിയും (Stocks and Shares).

വമ്പിച്ച വ്യവസായങ്ങൾക്കോ ഗവണ്മെന്റു, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുതലായ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ വകയായുള്ള ചില പദ്ധതികൾക്കോ ആവശ്യമായ മൂലധനം (capital) പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നു കടമായിട്ടാണു വാങ്ങാറുള്ളതു. ഈ മൂലധനത്തെ മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് (stock) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വ്യവസായത്തിന്നു മൂലധനമായി 1 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വേണമെന്നു വിചാരിക്കുക. അതിനെ സൗകര്യത്തിനായി 1000 1000 ഉറുപ്പിക വീതമുള്ള ഓഹരികളാ (shares) യി ഭാഗിക്കുന്നു. പണം മുടക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിക്കനുസരിച്ചു ഓഹരികൾ എടുക്കുന്നു. 100 ക.യുടെ ഓഹരിക്കു 100 ക. തന്നെ വില വേണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി 1948 ൽ നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ് വിറ്റഴിഞ്ഞ 100 ക.യുടെ കടപ്പത്രത്തിന്നു (Bond) 99 ക. മാത്രമേ വിലയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രസ്തുത

പത്രത്തിന്മേൽ 3% പലിശ കൊടുക്കാമെന്നു ഗവണ്മെണ്ടു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവയെ 3% പത്രങ്ങളെന്നോ ചുരുക്കി 3%ങ്ങൾ എന്നോ പറഞ്ഞാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

കാഹരികൾ 3 തരം ഉണ്ടു്.

1. പ്രഥമാവകാശ ഓഹരികൾ (Preference Shares).

കാരോ കാഹരിക്കും ഇത്ര വീതം പലിശ കൊടുക്കുമെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഈ കാഹരികൾക്കുള്ള പലിശ കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രം വേറെ തരം കാഹരികളുടെ പലിശ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഈ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

2. കടപ്പത്രങ്ങൾ (Debentures).

ചിലപ്പോൾ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ മൂലധനം പോരാതെ വരുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സ്വത്തു പണയമായി കാണിച്ചു വിലക്കുന്ന കാഹരികളേയാണ് കടപ്പത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ കാഹരികളുടെ പലിശ പ്രഥമാവകാശ കാഹരികളുടെ പലിശയെപ്പോലെതന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കമ്പനിയുടെ സ്വത്തുതന്നെ ഈ കാഹരികൾക്കു പണയമായതുകൊണ്ടു ഈ കാഹരികളാണ് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളത്. ഇതേ കാരണത്താൽ ഇവയുടെ മേലുള്ള പലിശ മറ്റു കാഹരികളുടെ പലിശയേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും.

3. സാധാരണ ഓഹരികൾ (Ordinary Shares).

ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 തരം കാഹരികളുടെ പലിശ കൊടുക്കുകയും ചരതമുതലി (Reserve Fund) ലേക്കും മറ്റും പണം നീക്കുകയും ചെയ്തശേഷം ബാക്കിയാകുന്ന ആദായത്തെ ഇത്തരം കാഹരിക്കാർക്കു് (share holders) വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ആദായത്തെ ഓഹരി വീതം (Dividend)

എന്നു പറയുന്നു. ഈ കാഹരിവീതം കമ്പനിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നതു സ്വച്ഛമാണല്ലോ. കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള അധികാരം ഈ കാഹരിക്കാകാണുള്ളത്. മിക്കവ്യവസായങ്ങളുടേയും മൂലധനത്തിന്റെ അധികഭാഗം ഇത്തരം കാഹരികളാണ്.

4. നീക്കിവെച്ച കാഹരികൾ (Deferred Shares).

ഇവയുടെ പലിശ പേരിടുന്നതല്ല പ്രകാരം മറ്റു കാഹരികളുടെ പലിശ കൊടുത്തശേഷമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ.

ഒരു കാഹരിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായത്തിന്നനുസരിച്ചായിരിക്കും പൊതുജനങ്ങൾ അതിന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന വിധം. അതുകൊണ്ടു സാധാരണ ചരക്കുകളെപ്പോലെതന്നെ കാഹരികളുടെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ കാഹരികൾക്ക് തരം വിലകളുണ്ട്.

1. മുഖവില (Face Value).

ഇതു കാഹരിപത്ര (Share Certificate) ത്തിന്മേൽ അച്ചടിച്ച വിലയാണ്.

2. നാമമാത്രവില (Nominal Value).

ഉദാഹരണമായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ച 1948ലെ ഗവൺമെൻ്റ് കടപ്പത്രങ്ങളെ 99ക.യ്ക്കാണ് ആദ്യം വിറ്റിരുന്നത്. ഈ വിലയെ ആ കാഹരികളുടെ നാമമാത്രവിലയെന്നു പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ മുഖവിലയെ നാമമാത്രവിലയെന്നും പറയാറുണ്ട്.

3. അങ്ങാടിവില (Market Value).

100ക. കാഹരിയിന്മേൽ കൊല്ലത്തോറും ഒരു കമ്പനി 5ക. ആദായം വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. അന്നത്തെ പലിശനിരക്കു 100നു 4ക. വീതമാണെങ്കിൽ ആ കാഹരി 125ക.യ്ക്കു വാങ്ങുന്നതു ന്യായമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ റൊക്കംവില (Cash price) മുഖവിലയെക്കാൾ അധികമോ കുറവോ ആകുമ്പോൾ കാഹരിയെ യഥാക്രമം മെച്ചത്തിനോ (at a premium) കിഴിവിനോ (at a discount) വില്ക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. മുഖവിലയ്ക്കുതന്നെ കാഹരി വില്ക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ വില തുല്യ വില (Par value) യാണെന്നു പറയുന്നു.

ഉദാ:—(1) 100ക.യുടെ $2\frac{1}{4}\%$ ഓഹരിയുടെ വില 75ക.യാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പലിശവീതം കാണുക.

75ക. കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഓഹരിയുടെ വില = 100ക.

100ക. ഓഹരിമേൽ പലിശ = $2\frac{1}{4}\%$ ക.

∴ 75ക.യുടെ യഥാർത്ഥ പലിശ = $2\frac{1}{4}\%$ ക.

$$\begin{aligned} \therefore 100ക.യുടെ \quad ,, \quad ,, &= 2\frac{1}{4} \times \frac{100}{75}ക. \\ &= 3ക. \end{aligned}$$

(2) $3\frac{1}{4}\%$ ഓഹരി 92ക.യ്ക്ക് വില്പനയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ 3450ക.യ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതായാൽ എനിക്കു എത്ര സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും? അതിൽനിന്നു കൊല്ല നോട്ടുള്ള വരവെത്ര?

92ക.യ്ക്ക് കിട്ടുന്നതു = 100ക. സ്റ്റോക്ക്.

$$\begin{aligned} \therefore 3450 \quad ,, \quad ,, &= \frac{100ക.}{92} \times 3450 \quad ,, \\ &= 3750ക. \quad ,, \end{aligned}$$

$$\therefore \text{വരവു} = \frac{3750}{100} \times 3\frac{1}{4}\% = 121ക. 14\text{സ.}$$

ഓഹരികളുടെ വില ദിവസത്തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതു ക്രയവിക്രയംചെയ്യു ആദായം സമ്പാദിക്കുവാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരെ ദല്ലാളി (Brokers)കൾ എന്നും ഇവരുടെ ആദായത്തെ ദല്ലാൾ കമ്മീഷൻ (Brokerage) എന്നും പറയുന്നു.

ഇതു് സാധാരണ 100നു $\frac{1}{8}$ വീതമാണ്. 100ക.യുടെ ഓഹരിയ്ക്ക് $92\frac{1}{4}\%$ വിലയാണെങ്കിൽ ദല്ലാളി അതിനെ $(92\frac{1}{4} - \frac{1}{8})$ ക.യ്ക്ക്, $92\frac{1}{8}\%$ ക.യ്ക്ക് വാങ്ങുകയും, $(92\frac{1}{4} + \frac{1}{8})$ ക.യ്ക്ക്, $92\frac{3}{8}\%$ ക.യ്ക്ക് വില്പനയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങി വില്പനത്തിനാൽ അയാൾക്കു 2 പ്രാവശ്യം $\frac{1}{8}\%$ ക. വീതം $\frac{1}{4}\%$ ക. ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സ്പെക്യുലേഷൻ.

സ്റ്റോക്കുകളുടെ വില താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിലാണ് വർത്തമാന പത്രികകളിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടെ വില: $103\frac{1}{8} - \frac{5}{8}$. ആ ഓഹരിയുടെ വില അന്നു 103ക. 2സ.യ്ക്കും 103ക. 10സ.യ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. വാങ്ങുന്ന ആൾ 103ക. 10സ. + 2സ. ($\frac{1}{8}\%$ ദല്ലാൾ കമ്മീഷൻ) അഥവാ 103ക. 12സ. കൊടുക്കണം. വില്പന ആൾക്കു 103ക. 2സ. — 2സ. അഥവാ 103ക. കിട്ടും.

ഓഹരികൾ മുഴുവനായി മാത്രമേ വില്പനാദുള്ളൂ. ഒരു ഓഹരിയുടെ ഒരുശം

വാങ്ങുകയോ വില്പനയോ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വിലക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയോ വില്പനയോ ചെയ്യാം.

ഉദാ: (3) $2\frac{1}{2}\%$ ഓൾ 93നും 3% ഓൾ 108നും വില്പനയോട് ഏതോഹരി വാങ്ങുന്നതാണ് അധികം ആദായകരം?

1-ാം ഓഹരി: 93ക. മേൽ പലിശ = 2ക. 4ണ.

2-ാം ,, : 108 ,, ,, ,, = 3ക.

,, ,, : 93 ,, ,, ,, = $\frac{93}{108} \times 3$ ക.

= 2ക. 9ണ. 4പ.

∴ 2-ാം ഓഹരി വാങ്ങുന്നതാണ് അധികം ആദായകരം.

ഉദാ: (4) 4% ഓൾക്ക് 103 വിലയുള്ളപ്പോൾ എന്റെ കൈയിലുള്ള 4170ക. യുടെ ആ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റതിനാൽ എനിക്ക് 4115ക.യുടെ 5% സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ 5% ഓളുടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വില കാണുക. ലോൾ കമ്മീഷൻ = $\frac{1}{8}\%$.

4115ക. സ്റ്റോക്കിന്റെ വില = 4170ക.യുടെ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം.

$$= \frac{4170 \times 102\frac{7}{8}}{100} \text{ക.}$$

$$\therefore 100 \text{ക.} \quad ,, \quad ,, = \frac{4170 \times 102\frac{7}{8}}{4115} \text{ക.}$$

$$= 104\frac{1}{4} \text{ക.}$$

$$\therefore \text{പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വില} = (104\frac{1}{4} - \frac{1}{8}) \text{ക.}$$

$$= 104\frac{1}{8} \text{ക.}$$

അ ഭൂ ങ്ങ 4.

1. ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ 3% ഓൾക്ക് $101\frac{1}{4}$ ക. വിലയുള്ളപ്പോൾ 1700ക.യുടെ കടപ്പത്രത്തിന്നു എന്തു വില കൊടുക്കണം? അതിൽനിന്നു കൊല്ലത്തോടുമുള്ള വരവു കാണുക. യഥാർത്ഥപലിശനിരക്കെത്രയാണ്?

2. ഒരു പരത്തി മില്ലിന്റെ 4325ക. $3\frac{1}{2}\%$ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ 95നും വില്പനയോട് എനിക്കെന്തു വില കിട്ടും? ലോൾ കമ്മീഷൻ $\frac{1}{8}\%$ വീതം കൊടുക്കേണ്ടിവന്നാൽ എന്തു വില കിട്ടും?

3. മദ്ധ്യസംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെ 3% കടപ്പത്രത്തിന്നു 99ക. വിലയുണ്ടു. തന്റെ മകൾക്ക് കൊല്ലത്തോടും 100ക. കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഒരാൾ കടപ്പത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതായാൽ അവയ്ക്കു എന്തു വിലയാകും?

4. 3 മില്ലുകളുടെ കാഹരിക്കളുടെ വിലയും കാഹരി വീതവും (dividend) താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഏതിൽ പണം മുടക്കുന്നതാകുന്നു ഏറ്റവും ആദായകരം? കാരോ കാഹരിയിൽനിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ പലിശനിരക്കു കാണുക.

വില	കാഹരിവീതം
135	6
78	$3\frac{1}{4}$
105	$4\frac{1}{2}$

5. 7250 ക. 5% സ്റ്റോക്കിനു ഞാൻ 7431 ക. 4 ണ. കൊടുത്തെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ അന്നത്തെ അങ്ങാടിവില കാണുക.

6. ഒരു ബേങ്കിന്റെ 10 ക.യുടെ കാഹരിക്കു 8 ക. 12 ണ. വിലയുണ്ടു. ബേങ്കുകാർ ഒരു കൊല്ലം $7\frac{1}{2}\%$ കാഹരി വീതമായി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരാൾക്കു 53 ക. 4 ണ. കിട്ടിയെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര കാഹരി വാങ്ങിയിരിക്കണം? അതിനു അയാൾ എത്ര വില കൊടുത്തു? യഥാർത്ഥ പലിശ നിരക്കെത്ര?

7. ഒരുളുടെ കൈയിൽ 3700 ക. $3\frac{3}{4}\%$ സ്റ്റോക്കുണ്ടു. അതിനു $97\frac{1}{2}$ വിലയുള്ളപ്പോൾ വിറ്റ 111 നുള്ള $4\frac{1}{2}\%$ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതായാൽ അയാൾക്കു കൊല്ലത്തോറും എത്ര അധികം ആദായം ഉണ്ടാകും?

8. $3\frac{1}{2}\%$ ഞാൾക്കു 95 $\frac{1}{2}$ വിലയുള്ളപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റോക്ക് വിറ്റാൽ 2289 ക. കിട്ടും? ലൊൾ കമ്മീഷൻ = $\frac{1}{8}\%$.

9. 1075 ക. മുടക്കി $6\frac{1}{2}\%$ ഞാൾ 107 $\frac{3}{8}$ നു വാങ്ങുന്നതായാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിലെ വരവു കാണുക. ലൊൾ കമ്മീഷൻ = $\frac{1}{8}\%$.

10. 3% ഞാൾക്കു 95 $\frac{1}{2}$ വിലയുള്ളപ്പോൾ 7620 ക.ക്കു ഒരാൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി, വില 93 $\frac{1}{2}$ ആയപ്പോൾ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം സ്റ്റോക്കും, വില 96 ആയപ്പോൾ 3600 ക.യുടെ സ്റ്റോക്കും ബാക്കി സ്റ്റോക്കു മുഖവിലക്കും വില്പനയായാൽ അയാൾക്കു ആകെ ലാഭമോ, നഷ്ടമോ? എത്ര?

11. $3\frac{1}{2}\%$ ഞാളെ 87 $\frac{1}{2}$ ക്കു വില്പനയോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൽനിന്നു കൊല്ലത്തിൽ 73 ക. 8 ണ. വരവുണ്ടാവാൻ ഞാൻ എത്ര പണം മുടക്കണം? ലൊൾ കമ്മീഷൻ = $\frac{1}{8}\%$.

12. ഒരുളുടെ കൈയശം 3% ഞാളുടെ 10000 ക. സ്റ്റോക്കുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ അതു വിറ്റ 87 $\frac{3}{8}$ വിലക്കു $3\frac{1}{2}\%$ ഞാൾ വാങ്ങിയതിനാൽ അയാളുടെ കൊല്ലത്തോറുമുള്ള വരവു 10 ക. വലുപ്പം 3% ഞാളുടെ അങ്ങാടിവിലയെത്രയായിരുന്നു? ലൊൾ കമ്മീഷൻ = $\frac{1}{8}\%$.

2. ഇൻഷുറൻസ് (Insurance).

യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലത്തു അത്യാഹിതങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ജീവനും വസ്തുക്കൾക്കും നാശം വരുന്നതു സാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ നാശങ്ങൾക്കൊണ്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ചെയ്യുന്ന എക്സാസിനു ഇൻഷുറൻസ് (insurance) എന്നു പറയുന്നു. ഒരാൾ താൻ പെട്ടെന്നു മരിക്കുന്നതായാൽ തന്റെ അവകാശിക്കു ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം കൊല്ലത്തോറുമോ വേറെ നിശ്ചയിച്ച കാലാവധിക്കോ ഗഡുവുകളാ (instalments) യി ഒരു സംഖ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അടക്കുന്നു. ഈ സംഖ്യക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വരി (Insurance premium) എന്നു പറയുന്നു. ഇതേപ്രകാരം ആകാശ വിമാനത്തിലോ, കപ്പലിലോ അയക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അഗ്നിബാധകൊണ്ടു നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന വസ്തുക്കൾ, മോട്ടോർ കാർ മുതലായവയുടെ വില തിരിച്ചുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം കമ്പനികളിൽ പണം അടക്കാം. ഇങ്ങിനെ പണം അടക്കുന്ന ആളും കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള കരാർ എഴുതിട്ടുള്ള പത്രത്തിന്നു Insurance Policy എന്നു പറയുന്നു. പലതരം നഷ്ടങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവക്കു യോജിച്ച കരാറുകളും ഉണ്ടു. മുഖ്യമായ ചിലതിന്റെ പേർ മാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. Life, Fire, Marine, Motor, Provident, Educational Endowment, Old Age Endowment, Sickness Endowment എന്നീ ഇൻഷുറൻസുകൾ ഉണ്ടു. ഇപ്രകാരം തങ്ങൾക്കു വരാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കോ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ആയി കരുതൽ ചെയ്യുന്നതിന്നു ഇൻഷുർ ചെയ്യുക (insure) എന്നു പറയുന്നു. കാരോ കമ്പനിയും തങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വരി കാണിക്കുന്ന പട്ടികകൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തുവരുന്നു.

ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ അവകാശിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കു ഒരു

നിശ്ചിത വയസ്സു പൂർത്തിയാകുമ്പോഴോ 1000ക. കിട്ടത്തക്കവണ്ണം All India General Insurance Companyൽ അടക്കേണ്ടുന്ന സംഖ്യകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്കോ ആൾ അതിന്നു മുമ്പു മരിക്കുന്നതായാൽ അപ്പോഴോ 1000ക. കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അടക്കേണ്ടുന്ന കൊല്ലംതോറുമുള്ള വരികൾ.

എനിയത്തെ പിറന്നാളി ന്നു വയസ്സു	അവധി എത്രയോൾ ആളുടെ വയസ്സു (കൊല്ലം)					
	65	60	55	50	45	40
കൊല്ലം	ക. ണ.	ക. ണ.	ക. ണ.	ക. ണ.	ക. ണ.	ക. ണ.
20	28 6	30 7	33 10	38 6	45 7	56 5
21	29 1	31 4	34 10	39 11	47 4	59 5
22	29 13	32 2	35 11	41 1	49 4	62 10
23	30 9	33 1	36 13	42 9	51 8	66 5
24	31 6	34 0	38 1	44 4	54 0	70 6
25	32 4	35 0	39 6	46 1	56 12	74 15
26	33 3	36 1	40 12	48 0	59 12	80 2
27	34 3	37 3	42 4	50 2	63 1	86 2
28	35 3	38 7	43 13	52 7	66 13	93 4
29	36 4	39 13	45 9	54 15	71 0	101 13
30	37 6	41 4	47 7	57 11	75 10	112 3
31	38 9	42 12	49 7	60 11	80 14	
32	39 14	44 6	51 10	64 1	86 15	
33	41 4	46 2	54 0	67 14	94 2	
34	42 12	48 0	56 11	72 3	102 12	
35	44 6	50 0	59 10	77 0	113 3	
36	46 2	52 3	62 14	82 7		
37	47 15	54 9	66 7	88 11		
38	49 14	57 2	70 6	96 0		
39	51 15	59 15	74 12	104 11		
40	54 2	63 0	79 10	115 2		
41	56 8	66 6	85 2			
42	59 1	70 2	91 7			
43	61 15	74 5	98 14			
44	65 0	78 15	107 12			
45	68 6	84 1	118 9			
46	72 1	89 13				
47	76 1	96 6				
48	80 7	104 1				
49	85 5	113 2				
50	90 11	123 15				

ഉദാ: (1) ഒരാൾ ആകാശവിമാനത്തിൽ അയച്ച ആഭരണങ്ങളുടെ വിലയിന്മേൽ $\frac{3}{4}\%$ വീതം 64ക. 9ണ. ഇൻഷുറൻസ് വരി അടച്ചുവെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വില കാണുക.

വരി $\frac{3}{4}\%$ ക.യെന്നെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വില = 100ക.

$$\therefore 64\text{ക. 9ണ.} = \frac{64\text{ക. 9ണ.}}{12\text{ണ.}} \times 100\text{ക.} \\ = 8575\text{ക.}$$

ചിലപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ തങ്ങൾ അടച്ച ഇൻഷുറൻസ് വരിയും കൂടി തിരിച്ചു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം വരി അടക്കുന്നു.

ഉദാഹരണമായി 21725ക. വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ കച്ചവടക്കാരൻ അയച്ച ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ താൻ അടക്കുന്ന വരിയും തിരിച്ചുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം $1\frac{1}{4}\%$ വരി അടക്കുന്നതായാൽ വരി ഏതൊരു സംഖ്യയിന്മേൽ അടക്കണം?

$$\text{വരി} = \text{ആകെ സംഖ്യയുടെ } 1\frac{1}{4}\%.$$

$$\therefore \text{ചരക്കുകളുടെ വില} = \frac{21725\text{ക.}}{98\frac{3}{4}\%}$$

$$= 21725\text{ക.}$$

$$\therefore \text{ആകെ സംഖ്യ} = \frac{21725\text{ക.} \times 100}{98\frac{3}{4}}\text{ക.}$$

$$= 22000\text{ക.}$$

അഭ്യാസം 5.

1. പട്ടിക നോക്കി താഴെയുള്ളവ കണക്കാക്കുക:

(a) 21 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് തന്റെ 55-ാം വയസ്സു പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസം 3000ക. കിട്ടുവാൻ അയാൾ കൊല്ലത്തോറും എത്ര പണം അടക്കണം?

(b) 30 വയസ്സു പൂർത്തിയായ ഒരാൾ തന്റെ മരണശേഷം തന്റെ അവ കാശിക്കോ, തനിക്ക് 65 വയസ്സുകയോ 2500ക. കിട്ടുവാൻ കൊല്ലത്തോറും ഏതൊരു സംഖ്യ അടക്കണം? അണവരെ കൃത്യമാക്കി എഴുതുക.

(c) 40 വയസ്സായ ഒരാൾ തനിക്ക് 60 വയസ്സുകയോ 1000ക. കിട്ടുവാൻ ആകെ എത്ര പണം അടക്കണം? ഈ സംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യയേക്കാൾ എത്ര അധികമാണ്?

(d) 27 വയസ്സായ ഒരാൾ തനിക്ക് 50 വയസ്സുകയോ, തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു തന്റെ മരണശേഷമോ 4000ക. കിട്ടത്തക്കവണ്ണം മേൽപറഞ്ഞ കമ്പനി

യിൽ പണം അടച്ചിരുന്നു. അയാൾ 36-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ കമ്പനിക്കു എന്തു നഷ്ടം വരും? (അയാൾ അടച്ച സംഖ്യയിന്മേലുള്ള പലിശ ഗണിക്കേണമെന്നില്ല).

2. 11125 ക. വിലയുള്ള ഒരു മോട്ടോർ കാറിന്മേൽ $3\frac{1}{4}\%$ പ്രകാരം ഇൻഷുറൻസ് വരി കാണുക.

3. ആകാശവിമാനത്തിൽ അയച്ച സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 87,500 ക.യും അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് വരി 656 ക. 4 ഞ.യും ആണെങ്കിൽ വരി വിലയുടെ എത്ര ശ. മാ. ആണ്?

4. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വിലയുടെ $\frac{3}{4}\%$ വീതമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വരി 289 ക. 2 ഞ. ആണെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ വില കാണുക.

5. കപ്പൽമാർഗ്ഗമായി അയച്ച ചരക്കുകളുടെ വിലയുടെ $\frac{2}{3}$ ഭാഗത്തിന്മേൽ $1\frac{1}{2}\%$ വീതം ഇൻഷുറൻസ് വരിയായി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 405 ക. അടച്ചു. ചരക്കു നഷ്ടമായതിനാൽ കമ്പനി കരാറുപ്രകാരമുള്ള സംഖ്യ കച്ചവടക്കാരനു കൊടുത്താൽ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ നഷ്ടം കാണുക.

6. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തന്റെ ചരക്കുകളെ $2\frac{3}{4}\%$ വീതം 148 ക. 8 ഞ. വരി അടച്ചു ഇൻഷുർ ചെയ്തു. ചരക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവയുടെ വിലയും അടച്ചവരിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ ചരക്കുകളുടെ വില കാണുക.

7. ഒരാൾ തന്റെ ഗുദാമിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെ അവയുടെ വിലയും $3\frac{1}{4}\%$ വീതമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വരിയും തിരിച്ചുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം 43850 ക.ക്കു ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അടച്ച വരിയെത്ര? സാധനങ്ങളുടെ വിലയെത്ര?

8. ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു കമ്പനിക്കു 73800 ക. ചെലവായി. അതു കത്തിപ്പോയാൽ അതിന്റെ വിലയും $1\frac{3}{4}\%$ വീതം അടക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് വരിയും തിരിച്ചുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ഏതൊരു സംഖ്യക്കു ഇൻഷുർ ചെയ്യണം?

3. കമ്മീഷൻ (Commission).

മോട്ടോർകാർ, ബൈസിക്ലിൾ, റേഡിയോ മുതലായ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്കാർ അവയെ നേരിട്ടു പൊതുജനങ്ങൾക്കു വില്പനാറില്ല. കാരണം അവ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു അയച്ചു അവയെ വില്പിക്കുവാൻ. ഇതിനായി അവർക്ക് പലസ്ഥല

ങ്ങളിലും വില്പനക്കാർ (sale agents) ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഏജൻറുമാർക്കു വിലയുടെ ഏതാനും ഭാഗം പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കണം. ഈ പ്രതിഫലത്തെ കമ്മീഷൻ (Commission) എന്നു പറയുന്നു. സാധാരണമായി ഇതു വിലയുടെ ഒരു ശതമാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.

ഉദാ: Ford Motor Company ഒരു ഏജൻറിനു $7\frac{1}{2}\%$ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ 12,500 ക. വിലയുള്ള ഒരു കാർ വിറ്റാൽ അയാൾക്കു എത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടും?

$$\begin{aligned} 100 \text{ ക. മേൽ കമ്മീഷൻ} &= 7\frac{1}{2} \text{ ക.} \\ \therefore 12,500 \text{ ക. ,,} &= \frac{12500}{100} \times \frac{15}{2} \text{ ക.} = 937\frac{1}{2} \text{ ക.} \end{aligned}$$

അദ്ധ്യായം 6.

1. ഒരു സൈക്കിൾ ഏജൻറിനു വില്പനയിന്മേൽ $3\frac{1}{2}\%$ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നു. അയാൾ മാസത്തോറും 275 ക. വിലയുള്ള 11 സൈക്കിൾ വില്പന ചെയ്താൽ അയാളുടെ മാസത്തോറുമുള്ള വരവു കാണുക.

2. ഒരു ജന്മി തന്റെ കായ്സ്ഥലം പാട്ടത്തിന്മേൽ $\frac{5}{4}\%$ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നു. 75 ക. കമ്മീഷൻ കിട്ടുവാൻ കായ്സ്ഥലം എത്ര പാട്ടം പിരിക്കണം?

3. ഒരു റേഡിയോ ഏജൻ്റ് തന്റെ കമ്മീഷനിൽ പകുതി റെക്കം വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവയ്ക്കു കിഴിവായി കൊടുക്കുന്നു. 375 ക. വിലയുള്ള ഒരു റേഡിയോ അയാൾ 345 ക. റെക്കം വിലയ്ക്കു വില്പനചെയ്താൽ കമ്പനി അയാൾക്കു എത്ര ശ. മ. കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കണം?

4. തനിക്കുള്ള $5\frac{1}{4}\%$ കമ്മീഷൻ കിഴിച്ച ഒരു ഏജൻ്റ് സാധനങ്ങളുടെ വിലയായി 615 ക. 14 ണ. അടയ്ക്കുന്നവെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വില കാണുക.

5. ഒരു കമ്പനി A എന്നൊരാളെ മാസത്തിൽ 100 ക. ശമ്പളവും വില്പനയിന്മേൽ $1\frac{1}{2}\%$ കമ്മീഷനും കൊടുക്കുമെന്ന നിശ്ചയത്തിന്മേൽ ഒരു ഏജൻറായി നിയമിക്കുന്നു. B എന്ന ഏജൻറിനു ശമ്പളം ഇല്ലാതെ വില്പനയിന്മേൽ $2\frac{1}{4}\%$ കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തിൽ ഓരോ ആളും 8500 ക. ക്കു സാധനങ്ങൾ വിറ്റാൽ ആർക്കാണ് അധികം വരവു? എത്ര?

6. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വിറ്റ തൂണികളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.			
	വിറ്റ വാര.	1 വാര തൂണിയുടെ വില.	കമ്മീഷൻ.
മിൽ	420	1 ക. 14 ണ.	8 $\frac{1}{2}$.
കൈത്തറി	125	2 ക. 10 ണ.	15.
വിഭേശി	160	3 ക. 2 ണ.	12 $\frac{1}{2}$.

a. ആകെ കിട്ടിയ കമ്മീഷൻ എത്ര?

b. മിൽതൂണിയിൽനിന്നു കിട്ടിയത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടുവാൻ (1) കൈത്തറി തൂണിയിന്മേൽ എത്ര ശ. മ. കമ്മീഷൻ കിട്ടണം? (2) വിഭേശത്തൂണി എത്ര വാരകൂടി വില്ക്കണം?

7. ഒരു മൊത്ത വ്യാപാരി സംധനങ്ങളെ 10% ലാഭത്തിന്നു വില്ക്കുന്നു. ഒരു ചില്ലറവ്യാപാരി അവയെ 15% ലാഭത്തിന്നു വില്ക്കുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ വില്പനയിന്മേൽ 4 $\frac{1}{2}$ % കമ്മീഷൻ മൊത്തവ്യാപാരിയിൽനിന്നു വസ്തുത ചെയ്യുന്നു. എങ്ങിനെ വില്ക്കുന്നതാണ് മൊത്തവ്യാപാരിയ്ക്കു അധികം ആദായകരം? അങ്ങിനെ വില്ക്കുന്നതായാൽ 7500 ക. മുതലുള്ള സംധനങ്ങളിന്മേൽ എത്ര അധികം ആദായം കിട്ടും?

8. ഒരു മൊത്തവ്യാപാരിയിൽനിന്നു ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 20% കമ്മീഷൻ കിട്ടും. ഒരു ചില്ലറവ്യാപാരി തന്റെ വിലയിന്മേൽ 25% കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കും. ചില്ലറവ്യാപാരിയുടെ വില മൊത്തവ്യാപാരിയുടെ വിലയേക്കാൾ 15% അധികമാണെങ്കിൽ ആരിൽനിന്നു വാങ്ങുന്നതാണ് എനിക്കധികം ആദായകരം? 225 ക. മുതലുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഞാൻ വാങ്ങുന്നതായാൽ എനിക്കു എത്ര പണം ആദായപ്പെടുത്താം?

4. നികുതികൾ (Taxes).

ഗവണ്മെണ്ടു, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുതലായവയുടെ ഭരണച്ചെലവു നിവൃത്തിക്കുന്നതു പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നു പിരിക്കുന്ന നികുതികളിൽനിന്നാണ്. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ നികുതികളിൽ മുഖ്യമായവ ആദായനികുതിയും എക്സൈസ് നികുതിയുമാണ്. സംസ്ഥാനഗവണ്മെണ്ടു കൽ നിലനികുതി വ്യാപാരനികുതി മുതലായവ പിരിക്കുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ വീട്ടുനികുതി തൊഴിൽ നികുതി, വാഹനനികുതി മുതലായവ പിരിക്കുന്നു.

ഒരുളുടെ ഒട്ടാകെ വരവി (Gross Income) ത്തിന്നു നികുതികളും മറ്റു ചെലവുകളും കിഴിച്ചു ബാക്കിയാകുന്ന വരവിനെ അയാളുടെ അസ്സൽ വരവു (Net income) എന്നു പറയുന്നു.

ആദായനികുതി സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ കൊല്ലത്തോറും മറ്റുന്നതു കൊണ്ടും നിരക്കുകൾ പല ഉപാധികൾക്കുപിന്നെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതു കണക്കാക്കുന്ന ക്രമം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല.

വീട്ടുനികുതി വാടകയുടെ ഒരു ശതമാനമായും തൊഴിൽനികുതി ഉറപ്പികൾ ഇത്ര വെെ എന്നും വാഹനനികുതി അരക്കൊല്ലത്തേക്കു ഇത്രയെന്നും ആണ് പറയാറുള്ളതു. വിവിധ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ പലവിധ നിരക്കുകൾ നടപ്പിലുള്ളതുകൊണ്ടു പൊതുവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള അട്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ.

ഉദാ: (1) ഒരാൾ അടക്കുന്ന നികുതികൾ ഉറപ്പികൾ 1൩. 2പ. വീതം വരുന്നു. നികുതികൾ കിഴിച്ചുള്ള അസ്സൽ വരവു 400ക. 8൩. ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒട്ടാകെ വരവെത്ര?

1ക.യിൽ നികുതി കഴിച്ചുള്ള വരവു = 14൩. 10പ.

14൩. 10പ. അസ്സൽ വരവുണ്ടെങ്കിൽ

ഒട്ടാകെ വരവു = 1ക.

$$\therefore 400ക. 8൩. \dots = \frac{16}{14\frac{5}{6}} \times 400\frac{1}{2}ക. \\ = 432ക.$$

അ ട്യാ സ ം 7.

1. ഒരു റേഡിയോവിന്റെ വില 375ക. വില്പനനികുതി 1ക.ക്കു 6പ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒട്ടാകെ വില കാണുക.

2. ബിൽ തയ്യാറാക്കുക:—

വജനു 2ക. 1൩. പ്രകാരം 40 നോട്ടുപുസ്തകം. ഗ്രോസ്സിനു 17ക. 4൩. പ്രകാരം $1\frac{1}{2}$ ഗ്രോസ്സു പെൻസിൽ. റീമിനു 10ക. 6൩. പ്രകാരം $5\frac{1}{2}$ റീം കടലാസ്സു. വില്പനനികുതി 1ക.ക്കു 3പ.

3. ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വീട്ടുനികുതി വാടകയുടെ $7\frac{1}{2}\%$ ആണ്. ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ അരക്കൊല്ലത്തേക്കു 168ക. 12൩. വീട്ടുനികുതി കൊടുക്കു നെങ്കിൽ 1 മാസത്തിൽ അയാൾ പിരിക്കുന്ന വാടക കണക്കാക്കുക.

4. ഒരു സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്കു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി. വില നനികതി 1 ക. 3 പ. വീതം കൊടുത്തതിനാൽ ആകെ വില 429 ക. 9 ണ. 9 പ. ആയാൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ അസ്സൽ വില കാണുക.

5. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നികുതികൾ ഉറപ്പികൾ 1 ണ. 10 പ. വീതം വരുന്നു. അയാളുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ നികുതി 467 ക. 8 ണ. ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ മാസാന്തര ശമ്പളം കാണുക.

6. ചില വിഭാഗ സാമാനങ്ങളിന്മേൽ കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടു 27½% നികുതി പിരിക്കുന്നു. ഒരു കച്ചവടക്കാരനും നികുതിയടക്കം 1912 ക. 8 ണ. വിലയായ സാമാനങ്ങളിന്മേൽ അയാൾ എത്ര നികുതി അടച്ചിരിക്കും?

7. മാസത്തിൽ 350 ക. ശമ്പളമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലത്തിൽ നികുതി കഴിച്ചുള്ള അസ്സൽ വരവു 3871 ക. 14 ണ. ആണെങ്കിൽ അയാൾ 1 ക. 3 പ. എത്ര വീതം നികുതി കൊടുക്കുന്നു?

5. ദീപാളി (Bankruptcy).

തന്റെ കടം മുഴുവൻ വീട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത ആളെ ഒരു ദീപാളി (bankrupt) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടേയോ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെയോ മുതൽ (assets) ആകെ കടത്തേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ കടക്കാർ തങ്ങളുടെ കടത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതു സാധാരണമായി ഉറപ്പികൾ ഇത്ര അണവീതം എന്നാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത്. ഇതിനെ ഓഹരി വീതം (dividend) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ ദീപാളിയാവാൻ ചിലപ്പോൾ ഗവണ്മെണ്ടു കടക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അയാളുടെ സ്വത്തു വിറ്റു കടം തീർപ്പാൻ ഒരു കായ്ക്കാരനെ (Official receiver) നിയമിക്കുന്നു.

ഒരു കച്ചവടക്കാരനും 36000 ക. കടവും 24000 ക. വിലക്കുള്ള സ്വത്തും ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. കായ്ക്കാരന്റെ ചെലവു 1500 ക.യാണെങ്കിൽ വീതിക്കുവാനുള്ള സംഖ്യ = 22500 ക.

$$\therefore 1 \text{ ക. കടത്തിന്മേൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ} = \frac{22500}{36000} \text{ ക.} = \frac{5}{8} \text{ ക.} \\ = 10 \text{ ണ}$$

അട്ടാസം 8.

1. 57,500ക. കടമുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയുടെ കടക്കാർ ഉറപ്പികൾ 11ണ്. 7പ. വീതം തിരിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിൽ അയാളുടെ മുതലിന്റെ വില കാണുക.

2. ഒരു ബേങ്കിന്റെ കടം 2,10,000ക.യും സ്വത്തിന്റെ വില 87,500ക.യും ആണെങ്കിൽ കടക്കാർ 1ക.ക്കു എത്ര വീതം തിരിച്ചു കിട്ടും?

3. ഒരു മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ സ്വത്തുകൾ 1,75,726ക.ക്കു വിറ്റതിനാൽ കടക്കാർ ഉറപ്പികൾ 13ണ്. 8പ. വീതം കിട്ടിയെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ കടമെത്രയായിരുന്നു? 5,000ക. കടം കൊടുത്ത ഒരാൾക്കു എത്ര നഷ്ടം വന്നു?

4. ഒരു ബേങ്കിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വില: 75,000ക. റെക്കം പണം: 92,545ക. പുറമെനിന്നു ഹുടാക്കിയ കടങ്ങൾ: 53,742ക. ഗവണ്മെണ്ടു നിയമിച്ച കാര്യക്കാരന്റെ ശമ്പളവും മറ്റുചെലവുകളും 8,387ക.യും ആകെ കടം 6,20,800ക.യും ആണെങ്കിൽ കടക്കാർ 1ക.മേൽ എത്ര വീതം തിരിച്ചു കിട്ടും?

5. ഒരു ജീവാളി 9750ക. വിലക്കുള്ള സാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടു. അവ ആ വിലക്കുതന്നെ വില്ക്കുന്നതായാൽ കടക്കാർ ഉറപ്പികൾ 13ണ്. വീതം കിട്ടും. എങ്കിലും അവയുടെ $\frac{2}{3}$ ഭാഗം മുതലിൽ $17\frac{1}{2}\%$ ഉം, ബാക്കി $23\frac{3}{4}\%$ കറച്ചു വില്ക്കേണ്ടിവന്നാൽ കടക്കാർ ഉറപ്പികൾ എത്ര വീതം കിട്ടും?

(Bom. Matric 1878)

6. 5,700ക. വിലക്കു മുതലുള്ള ഒരു ജീവാളി തന്റെ കടക്കാർ ഉറപ്പികൾ 7ണ്. 6പ. വീതം കൊടുക്കാമെന്നു കണക്കാക്കി. ഒരു കടവംകൂടി വെളിപ്പെട്ടതിനാൽ ഉറപ്പികൾ 6ണ്. 4പ. വീതംമാത്രം കൊടുപ്പാൻ സാധിച്ചവെങ്കിൽ പുതിയ കടം എത്രയാണ്?

7. ഒരു ജീവാളികളിച്ചയാൾക്കു 480ക. കടമുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഉറപ്പികൾ 9ണ്. 6പ. വീതം കൊടുത്തു. കറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ സ്ഥിതി നന്നാവുകയും അയാൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കടത്തിന്മേൽ 5ണ്. 4പ. വീതം വീണ്ടും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അയാൾ ആകെ കൊടുത്തതിന്റെ സംഖ്യ എത്രയാണ്? രണ്ടു തവണയായി കൊടുത്തതു കൂട്ടിയാൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന കടത്തിന്മേൽ ഉറപ്പികൾ എത്ര വീതമായി?

(Oct. 1948)

8. ഒരു പാപ്പർപുള്ളിയുടെ സ്വത്തിൽനിന്നു 4,500ക. കിട്ടുകയും, ആ പണത്തിൽനിന്നു $2\frac{1}{2}\%$ പിരിച്ചെടുത്ത ചെലവിലേക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പാപ്പർപുള്ളിയുടെ കടം 7,020ക.യാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കടക്കാർ ഉറപ്പികൾ എത്ര വീതം കിട്ടുമെന്നു കാണുക.

(Oct. 1949)

9. 1545ക. മുതലുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തന്റെ കടത്തിന്റെ $\frac{1}{3}$ നേൽ ഉറപ്പികൾ 10ണ. ദി. വീതവും ബാക്കിയിനേൽ 7ണ. 9പ. വീതവും കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അയാളുടെ ആകെ കടം കാണുക.

10. ഒരു ലീവാളിക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ അയാളുടെ കടത്തിന്നു സമമാണ്. ഇതിൽ 2000ക.നേൽ 11ണ. വീതമേ അയാൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതു പിരിയുവാൻ 100ക. ചെലവാകുകയും ചെയ്തു. തന്റെ കടക്കാൾ 13ണ. ദി. വീതം കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അയാളുടെ കടമെത്രയായിരുന്നു?

അദ്ധ്യായം 4.

കൂട്ടുപലിശ (Compound Interest).

നിങ്ങൾ ഒരു ബേങ്കിലോ മറ്റോ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതായാൽ ഒരു കൊല്ലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബേങ്കുമസ്ഥനാർ അവർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കനുസരിച്ചു നിങ്ങൾക്കു പലിശ തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങാതെ ബേങ്കിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അതു മുതലിനോടു കൂട്ടി രണ്ടുംകൂടി പുതിയ കൊല്ലത്തെ മുതലായി കരുതുന്നു. ഇങ്ങിനെ പലിശ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന മുതലിനേലുള്ള പലിശക്കു കൂട്ടുപലിശ അല്ലെങ്കിൽ പലിശക്കു പലിശ (Compound Interest) എന്നു പറയുന്നു.

ഒരാൾ 5% പലിശക്കു ഒരു ബേങ്കിൽനിന്നു 100ക. കടം വാങ്ങുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അയാൾ ബേങ്കിൽ 5ക. പലിശ അടക്കണം. അടക്കാത്തപക്ഷം പുതിയ കൊല്ലത്തെ മുതൽ 100ക.യും അതിനേൽ 1 കൊല്ലത്തെ പലിശയായ 5ക.യും കൂടി 105ക. ആയിത്തീരുന്നു. 2-ാം കൊല്ലത്തെ പലിശ 105ക. മേലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

$$\therefore 2\text{-ാം കൊല്ലത്തെ പലിശ} = 105 \times \frac{5}{100} \text{ക.} = 5\frac{1}{4} \text{ക.}$$

$$\therefore 2 \text{ കൊല്ലങ്ങളിലെ കൂട്ടുപലിശ} = (5 + 5\frac{1}{4}) \text{ക.} = 10\frac{1}{4} \text{ക.}$$

കൂട്ടപലിശ കാണുന്ന വഴി താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1-ാം കൊല്ലത്തെ മുതൽ = 100 ക.

„ „ പലിശ = 5 ക.

2-ാം കൊല്ലത്തെ മുതൽ = 105 ക.

„ „ പലിശ = 5.25 ക.

∴ 2-ാം കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ

പലിശയടക്കം മുതൽ = 110.25 ക.

∴ കൂട്ടപലിശ = $(110\frac{1}{4} - 100)$ ക. = 10 ക. 4 ണ.

∴ കൂട്ടപലിശയും സാധാരണ പലിശയും

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം = 10 ക. 4 ണ. - 10 ക. = 4 ണ.

ബേങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന്മേൽ സാധാരണമായി അരക്കൊല്ലത്തോറും പലിശ കൂട്ടുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി ഒരാൾ 625 ക. 4% പലിശ പ്രകാരം ഒരു ബേങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അയാൾക്കു കിട്ടേണ്ടുന്ന സഞ്ചിതാഴെ ചേർത്ത പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്നു.

1 കൊല്ലത്തെ പലിശ 4% ആയതുകൊണ്ട്

അരക്കൊല്ലത്തെ പലിശ = 2%.

ക.

1-ാമത്തെ അരക്കൊല്ലത്തെ മുതൽ = 625.

„ „ പലിശ (2%) = 12.5

2-ാമത്തെ അരക്കൊല്ലത്തെ മുതൽ = 637.5

„ „ പലിശ = 12.75

∴ 1 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പലിശ

യടക്കം മുതൽ = 650.25

∴ കൂട്ടപലിശ = 650 ക. 4 ണ. - 625 ക. = 25 ക. 4 ണ.

ഈ കണക്കിലെപ്പോലെ കൊല്ലത്തിൽ 4% പ്രകാരം അരക്കൊല്ലത്തോറും പലിശ കൂട്ടുന്നതായാൽ അതു 4.04% ആണെന്നു കാണാം. ഇതിനെ യഥാർത്ഥപലിശ നിരക്കു (Effective rate) എന്നു പറയാം.

പലിശയുടെ വീതം 100ന്റെ നിശ്ശേഷഹാരകമായി (Aliquot Part) മാറാവുന്നതാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായി

10%, 5%, 12½%, 6¼%..... ആണെങ്കിൽ പലിശ എടുപ്പിൽ കാണാം.

പലിശയുടെ വീതം 16 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മുതലിനെ 100കൊണ്ടു മനസ്സിൽ ഹരിച്ചു വീതത്തെ കുറിക്കുന്ന സംഖ്യകൊണ്ടു പെരുക്കി പലിശ കാണാം.

പലിശവീതം $7\frac{1}{2}$, 15, $13\frac{3}{4}$, $17\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ അവയെ 100ന്റെ നിശ്ശേഷഹാരകങ്ങളായി പിരിക്കേണ്ടതാണ്.

$$\begin{aligned} \text{ഉദാഹരണമായി, } 7\frac{1}{2}\% &= 5\% + 2\frac{1}{2}\% \\ &= \frac{1}{20} + \frac{1}{10} \text{ ന്റെ } \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

മുതൽ എപ്പോഴും മുഴു ഉറപ്പികയോ, പവനോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സംഖ്യയെ ഉറപ്പികയുടെ ദശാംശഭിന്നിതമായി മാറ്റണം. പലിശ പൈവരെയോ, ചെനിവരെയോ കൃത്യമായി കാണേണ്ടതുകൊണ്ടു ഉത്തരം 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. ഇതിനായി കാരോ വരിയിലും സംഖ്യ 4 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. ഒടുവിലത്തെ ഉത്തരത്തെ 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി എഴുതുക.

ഒരു സ്ത്രീയിലെ ഒരു വിനോദപ്രദർശനത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ 720 ക. 2ന. 30% പലിശകൊടുക്കുന്ന ഒരു ബേങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 1 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അതത്രയായിത്തീരമെന്നു കാണുക. ക.

$$1\text{-ാമത്തെ അരക്കൊല്ലത്തെ മുതൽ} = 720 \cdot 125$$

$$\begin{aligned} \text{“ “ “ “ പലിശ } \left\{ \begin{aligned} 1\% &= 7 \cdot 2013 \\ \frac{1}{2}\% &= 3 \cdot 6006 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$2\text{-ാമത്തെ അരക്കൊല്ലത്തെ മുതൽ} = 730 \cdot 9269$$

$$\begin{aligned} \text{“ “ “ “ പലിശ } \left\{ \begin{aligned} 1\% &= 7 \cdot 3093 \\ \frac{1}{2}\% &= 3 \cdot 6547 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$1 \text{ കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പലിശ}$$

$$\text{യടക്കം മുതൽ} = \underline{741 \cdot 8909}$$

741.891ക. (3 ലക്ഷംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം)
= 741ക. 14ണ. 3പ.

പലിശ കാണാൻ ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിക്കാം:—

മുതൽ P ക.യും പലിശനിരക്കു $r\%$ വും പലിശയടക്കം മുതൽ A ക.യും ആണെന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ഓരോ കൊല്ലവും പലിശയടക്കം മുതൽ കൊല്ലാരംഭത്തിലുള്ള മുതലിന്റെ $(1 + \frac{r}{100})$ ഇരട്ടിയാണെന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ.

$\therefore$ 1-ാം കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള പലിശയടക്കം മുതൽ $= P(1 + \frac{r}{100})$ ക.

ഇതേപ്രകാരം 2-ാം കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള പലിശയടക്കം മുതൽ

$$= P(1 + \frac{r}{100}) (1 + \frac{r}{100})$$

$$= P(1 + \frac{r}{100})^2$$

ഈ സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചു 420ക.ക്കു $2\frac{1}{2}\%$ വീതം 2 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പലിശ കാണുക.

$$\begin{aligned} A &= P(1 + \frac{r}{100})^2 = 420(1 + \frac{2\frac{1}{2}}{100})^2 \\ &= 420 \times \frac{41}{40} \times \frac{41}{40} = 441.2625 \end{aligned}$$

$\therefore$ പലിശയടക്കം മുതൽ = 441ക. 4ണ. 2പ. (പൈവരെ കൃത്യം).

പലിശ നേരിട്ടു കണ്ടു ഈ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

പലിശക്കു പലിശ കൂട്ടുന്നക്രമം (Compound Interest Law) അനുസരിച്ചു വർദ്ധിക്കുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംബന്ധകളുടേയും വില മേൽപറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിലെപ്പോലെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു മോട്ടോർകാറിന്റെ വില കൊല്ലത്തോളം 15% കുറയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 11,275ക. വിലയുള്ള ഒരു കാറിന് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വിലയുണ്ടാകും?

	ക. ണ. പ.
ഇപ്പോഴത്തെ വില	= 11,275 - 0 - 0
ഒന്നാം കൊല്ലത്തിലെ കുറവ് (15%)	= 1,691 - 4 - 0
2-ാം കൊല്ലാരംഭത്തിലെ വില	= 9583 - 12 - 0
,, കൊല്ലത്തിലെ കുറവ്	= 1437 - 9 - 0
2-ാം കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള വില	= 8146 - 3 - 0

സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈ കണക്കു ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള വില $= 11275(1 - \frac{15}{100})^2$ ക. എന്നു എഴുതണം.

അദ്ധ്യായം 9.

1. താഴെ പറയുന്ന സംഖ്യകളുടെ നേരെ എഴുതിട്ടുള്ള നിരക്കുപ്രകാരം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നതായാൽ അവ 2 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ എത്രയായിത്തീരുമെന്നു ഗണിക്കുക. സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (a) 875ക. 5% . | (b) 240ക. $6\frac{1}{4}\%$. |
| (c) 117ക. 3ണ. 4% . | (d) 175ക. $2\frac{1}{2}\%$. |
| (e) 1250ക. $3\frac{1}{2}\%$. | |

2. താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുപ്രകാരം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നതായാൽ ഒരു സംഖ്യയെ എത്രകൊണ്ടു ചെലക്കിയാൽ 2 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള പലിശയടക്കം മുതൽ കാണാം?

- (a) 5% . (b) $6\frac{1}{4}\%$. (c) 4% . (d) 3% . (e) $3\frac{3}{4}\%$.

ഈ വഴി ഉപയോഗിച്ച് 10000ക. മേൽ 2 കൊല്ലത്തെ കൂട്ടുപലിശ കാണുക. നേരിട്ടു പലിശ കണ്ടു കിട്ടാത്ത ഉത്തരവും ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

3. ഒരാൾ 8500ക. 5% സാധാരണ പലിശക്കു കടംവാങ്ങിയ ഉടനെ അതേ നിരക്കിന് 2 കൊല്ലത്തേക്കു കൂട്ടുപലിശക്കു കടം കൊടുത്താൽ അയാൾക്കു എത്ര ആദായം കിട്ടും?

4. 2 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ പൈവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

- (a) 126ക. 5% പ്രകാരം.

- (b) 4500 ക. കൂടി $4\frac{1}{2}\%$ പ്രകാരം.
 (c) 710 ക. കൂടി $7\frac{1}{2}\%$ പ്രകാരം.
 (d) 561 ക. 2 ണ. കൂടി $7\frac{1}{2}\%$ പ്രകാരം.

5. 2 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൈസയെ കൃത്യമായി കാണുക.

- (a) 225 ക. കൂടി 4% പ്രകാരം.
 (b) 250 ക. കൂടി $4\frac{1}{2}\%$ പ്രകാരം.
 (c) 1256 ക. 8 ണ. കൂടി 3% പ്രകാരം.

6. ഒരു ബേങ്ക് അറക്കൊല്ലത്തോടും പലിശ മുതലിനോടു കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന സംഖ്യകളിന്മേൽ അവയ്ക്കു നേരെ എഴുതിയ നിരക്കു പ്രകാരം 1 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ കാണുക. ഓരോ സംഖ്യയിന്മേലുമുള്ള കൂട്ടു പലിശ സാധാരണ പലിശയെക്കാൾ എത്ര അധികമാണ്? പൈസയെ കൃത്യമായി എഴുതുക.

- (a) 488 ക. 12 ണ. 4% . (b) 712 ക. 8 ണ. 3% .
 (c) 143 ക. 4 ണ. 6 പ. $2\frac{1}{2}\%$. (d) 187 ക. 14 ണ. 3 പ. $3\frac{1}{2}\%$.

7. ഒരു നഗരത്തിൽ 137325 ജനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ജന സംഖ്യയുടെ $2\frac{1}{2}\%$ ജനനവും $1\frac{3}{4}\%$ മരണവുമുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജനസംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യയെ കൃത്യമായി കാണുക.

8. 1951ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 3618 ലക്ഷമാണ്. ജനസംഖ്യ 10 കൊല്ലത്തിൽ 13% വീതം വർദ്ധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ തോതിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതായാൽ 1971ലെ ജനസംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും? ആയിരംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

9. ചില വസ്തുക്കളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിലയും കൊല്ലത്തോടും വിലയിലുള്ള കുറവും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കൊല്ലത്തിന്റെ ശേഷം ഓരോന്നിന്റേയും വില എത്രയായിരിക്കും? അണവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

	വില (ക.)	കുറവ് (%)
School building	18800	4
Motor Bus	12750	12
Radio	925	$17\frac{1}{2}$
Typewriter	635	8

10. ഒരാൾ 4500 ക. കൊല്ലത്തിൽ 5% പ്രകാരം കൂട്ടുപലിശക്കു കടം വാങ്ങുന്നു. ഒന്നാം കൊല്ലാവസാനത്തിൽ അയാൾ മുതലും പലിശയും വകയായി 2000 ക. മടക്കിക്കൊടുക്കുകയും രണ്ടാം കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ശേ

ക്കിച്ച കടം തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം കൊല്ലാവസാനത്തിൽ അയാൾ എത്ര സംഖ്യ മടക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കണം? (1946)

11. ഒരു സർവ്വകലാശാലയിൽ ആലായം നിവേതനങ്ങളായും സമ്മാനങ്ങളായും കൊടുക്കുവാനുള്ള $3\frac{1}{2}$ ലക്ഷം ക. ധനം കൊല്ലത്തിൽ $3\frac{1}{2}\%$ വീതം കൂട്ടുപലിശ കൊടുക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു ബേങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരോ കൊല്ലാവസാനത്തിലും ബേങ്കിൽനിന്നു സർവ്വകലാശാല 10000 ക. വീതം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ തീയതിക്കു സർവ്വകലാശാലയുടെ പേരിൽ എത്ര സംഖ്യയുണ്ടായിരിക്കും? (Oct. 1948)

12. 6 മാസത്തോളം പലിശ മുതലിനോടു കൂട്ടുന്നതായാൽ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകളുടെ കൊല്ലത്തിലെ യഥാർത്ഥ പലിശനിരക്കു (Effective rate) കാണുക.

- (a) 10% (b) 6% (c) 5% (d) 3% .

13. കൂട്ടുപലിശ പൈപ്പരെ കൃത്യമായി കാണുക.

(a) $1\frac{1}{2}$ കൊല്ലത്തേക്കു.

1. 6241 ക. 12 ണ. മേൽ $4\frac{1}{2}\%$ പ്രകാരം.

2. 3732 ക. 8 ണ. „ $3\frac{1}{2}\%$ „

3. 1040 ക. 10 ണ. „ $2\frac{1}{2}\%$ „ .

(b) $1\frac{1}{4}$ കൊല്ലത്തേക്കു.

1. 173 ക. 14 ണ. മേൽ 4% പ്രകാരം.

2. 209 ക. 9 ണ. „ 3% „ .

(c) 1. 309 ക. 11 ണ. „ $2\frac{1}{2}\%$ „ 1 കൊ. 2 മാസത്തേക്കു.

2. 87 ക. 3 ണ. „ $3\frac{3}{4}\%$ „ 1 കൊ. 5 മാസത്തേക്കു.

14. സാധാരണമായി ബേങ്കുകളിൽ ജൂൺ 30-ാംനെയും ഡിസെമ്പർ 31-ാംനെയും പലിശ മുതലിനോടു കൂട്ടുന്നു.

(a) എൻറ പേരിൽ 1950 ജനുവരി 1-ാംനെയും ഒരു ബേങ്കിൽ 594 ക. 15 ണ. ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ കൊല്ലം ഒക്ടോബർ 1-ാംനെയും ഞാൻ പണം തിരിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ പൈപ്പരെ കൃത്യമായി കാണുക. പലിശ നിരക്കു 3% .

(b) ഒരു വായനശാലയുടെ പേരിൽ 1950 ജൂലായി 1-ാംനെയും ഒരു ബേങ്കിൽ 407 ക. 7 ണ. ഉണ്ടായിരുന്നു. 1951 ഫെബ്രുവരി 28-ാംനെയും പണം തിരിച്ചെടുത്തതിൽ വായനശാലക്കു കിട്ടിയ സംഖ്യ അണവരെ കൃത്യമായി കാണുക. പലിശനിരക്കു $2\frac{1}{2}\%$.

അദ്ധ്യായം 5.

വക്രമൂലം (Square Root).

$3 \times 3 = 3^2 = 9$. ഒരു സംഖ്യയെ അതിനെക്കൊണ്ടു തന്നെ പെരുക്കി കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലത്തെ ആ സംഖ്യയുടെ വക്രം (square) എന്നും സംഖ്യയെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ വക്രമൂലം (Square Root) എന്നും പറയുന്നു. 9, 3ന്റെ വക്രവും, 3, 9ന്റെ വക്രമൂലവുമാണ്. വക്രമൂലത്തെ $\sqrt{\quad}$ എന്ന അടയാളം കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി $\sqrt{36}$, 36ന്റെ വക്രമൂലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. $\therefore \sqrt{36} = 6$. $\sqrt{n^2} = n$.

1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വക്രങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അവയുടെ ഒടുവിലത്തെ അക്കങ്ങൾ 1, 4, 5, 6, 9 ആണെന്നു കാണാം. അതിനാൽ യാതൊരു സംഖ്യയുടേയും വക്രം 2, 3, 7, 8 എന്ന അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ലെന്നു തെളിയുന്നു. 10ന്റെ വക്രം 100 ആയതുകൊണ്ടു ഒരു സംഖ്യയുടെ വക്രത്തിന്റെ ഒടുവിലുള്ള പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയായിരിക്കണമെന്നു സ്పഷ്ടമാകുന്നു.

$$7 \times 7 = 49. \quad \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{16}{25}. \quad .2 \times .2 = .04.$$

49, $\frac{16}{25}$, .04 എന്നീ സംഖ്യകൾ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ടു പെരുക്കി കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലങ്ങളാകുന്നു; അതായതു അവയുടെ വക്രമൂലം കൃത്യമായി നിണ്ണയിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ കൃത്യമായി വക്രമൂലം നിണ്ണയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അനേകം സംഖ്യകളുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി 2 എന്ന സംഖ്യയുടെ വക്രമൂലം ഇത്രയെന്നു നമുക്കു കൃത്യമായി പറവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം നാം അറിയുന്ന യാതൊരു സംഖ്യയേയും അതുകൊണ്ടു തന്നെ പെരുക്കിയാൽ 2 ഗുണനഫലമായി കിട്ടുന്നതല്ല.

ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമൂലത്തെ കൃത്യമായി നിശ്ചയിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഒരു കൃത്യവർഗ്ഗം (Perfect Square) എന്നു പറയുന്നു. 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള പൂർണ്ണസംഖ്യകളിൽ 10 എണ്ണം മാത്രം കൃത്യവർഗ്ഗങ്ങളാണ്.

$$\sqrt{9 \times 25} = \sqrt{225} = 15; \quad \sqrt{9} \times \sqrt{25} = 3 \times 5 = 15.$$

$$\therefore \sqrt{9 \times 25} = \sqrt{9} \times \sqrt{25}. \quad \text{ഇതേപ്രകാരം } \sqrt{4 \times 49} \\ = \sqrt{4} \times \sqrt{49}. \quad \text{പൊതുവെ പറയുന്നതായാൽ} \\ \sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}; \quad \sqrt{abc} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \times \sqrt{c}.$$

ഒരു സംഖ്യയെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാ (prime factors) യി പിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ വർഗ്ഗമൂലം കാണാമെന്നതു ഇതിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ഉദാഹരണമായി 1225 ന്റെ വർഗ്ഗമൂലം കാണുക.

$$1225 = 5 \times 5 \times 7 \times 7 = 5^2 \times 7^2$$

$$\therefore \sqrt{1225} = \sqrt{5^2 \times 7^2} = 5 \times 7 = 35.$$

ഒരു കൃത്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ ജോടികളായിരിക്കുമെന്നു അനുമാനിക്കാം.

588നെ ഘടകങ്ങളായി പിരിച്ചു അതു ഒരു കൃത്യവർഗ്ഗമല്ലെന്നു പരിശോധിക്കുക.

$$588 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7 = 2^2 \times 7^2 \times 3$$

$\therefore$ 588 ഒരു കൃത്യവർഗ്ഗമല്ല. അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയോ, പെരുകുകയോ ചെയ്താൽ ഫലം ഒരു കൃത്യവർഗ്ഗമായിരിക്കും.

$$10^2 = 100; \quad 100^2 = 10000; \quad 1000^2 = 1000000.$$

ഇതിൽനിന്നു പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ സംഖ്യയിലുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു അനുമാനിക്കാം.

അഭ്യാസം 10 A. (വാങ്മൂലം).

1. സംഖ്യകളെ നോക്കി വർഗ്ഗമൂലം പറയുക.

1600, 22500, 90000, 2560000, 10000000.

2. താഴെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ കൃത്യവർഗ്ഗങ്ങൾ ഏവ?
1960, 1210000, 4900, 20008, 14763.

3. താഴെയുള്ള സംഖ്യകളെ കുറഞ്ഞു എഴുതുക: പെരക്കിയാൽ ഗുണനഫലം കൃത്യവർഗ്ഗമാകും?
2700, 338, 100000, 20000, 1500. ഗുണനഫലത്തിന്റെ വർഗ്ഗമൂലം പറയുക.

4. ചില സമചതുരങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രഫലം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവയുടെ നീളം എത്ര?

625 ച. അടി. 4900 ച. വാര; 160000 ച. അം.; 16900 ച. സെ.മീ.

$$\sqrt{400 \div 100} = \sqrt{4} = 2. \quad \sqrt{400} \div \sqrt{100} = 20 \div 10 = 2.$$

$$\therefore \sqrt{400 \div 100} = \sqrt{400} \div \sqrt{100}$$

പൊതുവെ പറയുന്നതായാൽ $\sqrt{a \div b} = \sqrt{a} \div \sqrt{b}$

$$\text{അഥവാ } \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭിന്നിതത്തിന്റെ വർഗ്ഗമൂലം അതിന്റെ അംശത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തെ ഹേദകത്തിന്റെ വർഗ്ഗമൂലം കൊണ്ട് ഹരിച്ചുകിട്ടുന്ന ഫലമാണ്.

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}.$$

$$\sqrt{\frac{18}{49}} = \sqrt{\frac{9}{49}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{49}} = \frac{3}{7}. \quad \text{ഇതിൽനിന്നു ഒരു ഭിന്നിതത്തെ ഏറ്റവും}$$

ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലേക്കു മാറ്റണമെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

മിശ്രസംഖ്യകളെ ഭിന്നിതരൂപത്തിലെഴുതണം.

$$\sqrt{1\frac{17}{64}} = \sqrt{\frac{81}{64}} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}.$$

അഭ്യാസം 10 B.

1. താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി പിരിച്ചു അവയുടെ വർഗ്ഗമൂലം കാണുക.

1089; 1936; 2304; 53361; 63504; 148225; 480249;
571536; 680625; 883600.

2. വക്ത്രമൂലം കാണുക. ആവശ്യമുള്ളേടത്തു ഭിന്നിതങ്ങളെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലേക്കു മാറ്റുക.

$$\frac{1}{441}, \frac{1^2}{1875}, \frac{125}{605}, \frac{1458}{2048}, \frac{17}{9}, 2\frac{2}{49}, 3\frac{1}{225}, \frac{71453}{1621}, 105\frac{51}{225}, 191\frac{453}{764}.$$

3. താഴെ വരുന്ന സംഖ്യകൾ കാരോന്നം ഒരു കൃത്യവക്ത്രമാകുവാൻ അവയെ പെരുക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കാണുക.

$$648, 605, 1584, 1083, 19845, 87846.$$

$$\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5; \quad \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7.$$

$$\therefore \sqrt{16+9}, (\sqrt{16} + \sqrt{9})\text{നു സമമല്ല.}$$

പൊതുവെ പറയുന്നതായാൽ $\sqrt{a+b}, (\sqrt{a} + \sqrt{b})$ നു സമമല്ല.

$$\sqrt{16-9} = \sqrt{7}, \quad \sqrt{16} - \sqrt{9} = 4 - 3 = 1.$$

$$\therefore \sqrt{16-9}, (\sqrt{16} - \sqrt{9})\text{നു സമമല്ല.}$$

പൊതുവെ പറയുന്നതായാൽ $\sqrt{a-b}, (\sqrt{a} - \sqrt{b})$ നു സമമല്ല.

$$1^2 = 1; \quad 9^2 = 81.$$

$$10^2 = 100; \quad 99^2 = 9801.$$

$$100^2 = 10000.$$

$$999^2 = 998001.$$

ഇതിൽനിന്നു താഴെ പറയുന്ന സംഗതികൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

1 അക്കമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ വക്ത്രത്തിൽ 1 കോ, 2 കോ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

2 അക്കമുള്ള " " " 3 കോ, 4 കോ " "

3 " " " 5 കോ, 6 കോ " "

സംഖ്യയുടെ വക്ത്രത്തിലുള്ള അക്കങ്ങൾ ആ സംഖ്യയിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ഇരട്ടിയോ, ഇരട്ടിയിൽ ഒന്നു കുറവോ ആയിരിക്കുമെന്നു നമുക്കു ഇതിൽനിന്നു അനുമാനിക്കാം. ഇതിൽനിന്നു താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളും അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

1കോ 2കോ അക്കമുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ വക്ത്രമൂലത്തിൽ 1 അക്കമുണ്ടായിരിക്കും.

3കോ 4കോ " " " " 2 അക്കമുള്ളതായിരിക്കും.

5കോ 6കോ " " " " 3 " "

ഒരു സംഖ്യയുടെ വക്ത്രമൂലം കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നതു സംഖ്യയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലുള്ള അക്കത്തിന്മേൽ ഒരു കൂത്തും ഒന്നു ഇടവിട്ടു

ശേഷമുള്ള അക്കങ്ങളിനേൽ കത്തുകൾ ഇടുന്നതിനാലുമാണ്.

ഉദാഹരണമായി 546121ന്റെ വക്രമൂലത്തിൽ 3 അക്കങ്ങളുണ്ട്. 2992900ന്റെ വക്രമൂലത്തിൽ 4 അക്കങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു സംഖ്യയെ പലകങ്ങളായി പിരിച്ചു അതിന്റെ വക്രമൂലം കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിലും എളുപ്പമായ വിധത്തിൽ വലിയ സംഖ്യകളുടെ വക്രമൂലം കാണാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം.

ഉദാ: — (1) 1849ന്റെ വക്രമൂലം കാണുക: —

1849ന്റെ വക്രമൂലത്തിൽ 2 അക്കങ്ങളുണ്ട്.

10-ാം സ്ഥാനത്തിലെ അക്കത്തിന്റെ വക്രം 18ൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വക്രമായ 16 ആയിരിക്കണം.

∴ 10-ാം സ്ഥാനത്തിലെ അക്കം = 4

ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലെ അക്കം x എന്നു വിചാരിക്കുക.

$$\begin{aligned}\therefore 1849 &= (40+x)^2 = 40^2 + 2 \cdot 40 \cdot x + x^2 \\ &= 1600 + 80x + x^2\end{aligned}$$

$$\therefore 249 = x(80+x)$$

$$\therefore x = \frac{249}{80+x}$$

$x=3$ എന്നു ഊഹിക്കാം.

വക്രമൂലം കാണുന്നവിധം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

43

വിവരണം.

4	1849 16	(i)	ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം മുതൽ ഓരോ അക്കം ഇടവിട്ടു കത്തിടുക.
83	249 249	(ii)	ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടമായ 18ൽ അടങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ വക്രമായ 16 കിട്ടത്തക്കവണ്ണം 4 ഹാരകവും ഹരിതഫലവുമായി എഴുതുക. ശിഷ്ടം = 2.

(iii) രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടമായ 49 ഇറക്കി ഇടുക.

(iv) ഹരിതഫലത്തെ 2കൊണ്ട് പെരുക്കി ഹാരകമായി എഴുതുക. മുമ്പു വിവരിച്ചപ്രകാരം ഊഹിച്ചു 3 ചേർക്കുക. വക്രമൂലം = 43.

ഈ മാർഗ്ഗം വ്യക്തമാക്കുവാൻ $a^2 + 2ab + b^2$ എന്ന വ്യഞ്ജകത്തിന്റെ വക്രമൂലം കാണുന്ന വഴി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

$$\begin{array}{r} a+b \\ a \overline{) a^2+2ab+b^2} \\ \underline{a^2} \\ 2a+b \overline{) +2ab+b^2} \\ \underline{+2ab+b^2} \end{array}$$

വക്രമൂലത്തിൽ രണ്ടിലധികം സ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ക്രിയ മേൽകാണിച്ച പ്രകാരം തന്നെയാണു്. കാരോ ഘട്ടത്തിലും അതുവരെയുള്ള ഹരിതഫലത്തെ 2കൊണ്ടു് പെരുകി പുതിയ ഹാരകമായി ചേർക്കണം.

ഉദാ:— (2) 10404ന്റെ വക്രമൂലം കാണുക:—

$$\begin{array}{r} 102 \\ 1 \overline{) 10404} \\ \underline{1} \\ 202 \overline{) 404} \\ \underline{404} \end{array}$$

അ ഭൂ ാ സ ം 11.

A

വക്രമൂലം കാണുക:—

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 1369. | 14. 2819041. |
| 2. 3136. | 15. 1525225. |
| 3. 6724. | 16. 13704804. |
| 4. 9801. | 17. 40972801. |
| 5. 10609. | 18. 64032004. |
| 6. 38025. | 19. 89321401. |
| 7. 13924. | 20. 259371025. |
| 8. 95481. | 21. 18671041. |
| 9. 107584. | 22. 231496225. |
| 10. 210681. | 23. 3344771556. |
| 11. 231361. | 24. 657836167041. |
| 12. 501264. | 25. 10074538384. |
| 13. 1164241. | 26. 9999400009. |

(3) ദശാംശഭിന്നിതങ്ങളുടെ വക്രമൂലം.

15.21ന്റെ വക്രമൂലം കാണുക:—

പുണ്ണസംഖ്യകളുടെ വക്രമൂലം കാണാൻ ചെയ്ത പ്രകാരം ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനമായ 5ന്റെ മേൽ ഒരു കുത്തിടുക. വലത്തോട്ടു ഒരു അക്ഷം വിട്ടു 1ന്മേൽ ഒരു കുത്തിടുക. അതുകൊണ്ടു വക്രമൂലത്തിന്റെ പുണ്ണസംഖ്യയിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ദശാംശഭിന്നിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരിക്കും. ശേഷമുള്ള ക്രിയ പുണ്ണസംഖ്യകളുടെ വക്രമൂലം നിശ്ചയിപ്പാൻ ചെയ്ത ക്രിയപോലെ തന്നെയാണ്.

$$\begin{array}{r} 3.9 \\ 3 \overline{) 15.21} \\ \underline{9} \\ 69 \overline{) 6.21} \\ \underline{6.21} \end{array}$$

(4) 0.005625ന്റെ വക്രമൂലം കാണുക.

$$\begin{array}{r} .075 \\ 7 \overline{) 0.005625} \\ \underline{49} \\ 145 \overline{) 725} \\ \underline{725} \end{array}$$

∴ വക്രമൂലം = .075.

ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തു ഒരു കുത്തിടുന്നതായാൽ പിന്നീടു വേണ്ടതു വലത്തുവശത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ പുജ്യത്തിന്മേലാണ്. പിന്നീടുള്ള കത്തുകൾ 6ന്മേലും 5ന്മേലുമാണ് ഇടേണ്ടത്. വക്രമൂലത്തിന്റെ ദശാംശഭിന്നിതത്തിൽ 3 സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു ദശാംശഭിന്നിതത്തെ അതിനെക്കൊണ്ടു തന്നെ പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലത്തിൽ ഭിന്നിതത്തിലുള്ള ദശാംശസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇരട്ടി ദശാംശസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഒരു ദശാംശഭിന്നിതത്തിന്റെ വക്രത്തിൽ ഭിന്നിതത്തിലുള്ള ദശാംശസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇരട്ടി ദശാംശസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, ഒരു ദശാംശഭിന്നിതത്തിലെ ദശാംശസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിന്നിതം ഒരു കൃത്യവക്രമായിരിക്കില്ലെന്നും നമുക്കു അനുമാനിക്കാം.

B.

താഴെ കാണുന്ന ദശാംശഭിന്നിതങ്ങളുടെ വക്രമൂലം കാണുക.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. 73.96. | 9. 0.00010201. |
| 2. 10.7584. | 10. 0.0003418801. |
| 3. 3.8025. | 11. 36.58193289. |
| 4. 0.9801. | 12. 0.00139876. |
| 5. 0.185761. | 13. 2704.416016. |
| 6. 25.5025. | 14. 0.00203401. |
| 7. 100.861849. | 15. 0.3486784401. |
| 8. 4096.640025. | 16. 0.0000164025. |

ഉദാ: — (5) ഒരു തോട്ടത്തിൽ കുറെവരി തെങ്ങുകളുണ്ട്. വരികളുള്ളത്ര തെങ്ങുകൾ ഓരോ വരിയിലുമുണ്ട്. ആകെ 1225 തെങ്ങുകളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരികളുണ്ട്?

വരികളുടെ എണ്ണം x എന്നു വിചാരിക്കുക.

$\therefore$ ഓരോ വരിയിലുമുള്ള തെങ്ങുകൾ $= x$.

$\therefore$ ആകെ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം $= x \times x = 1225$.

$\therefore x = \sqrt{1225} = 35$.

$\therefore$ വരികളുടെ എണ്ണം $= 35$.

(6) 73ന്റെ വക്രമൂലം കാണുക.

ഇതു 3ൽ അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യവക്രമൂലം. ഇതിന്റെ വക്രമൂലം 8നും 9നും ഇടയിലാണെന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. കൃത്യവക്രങ്ങളുടെ വക്രമൂലം കാണാൻ നാം ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗം ഇതിന്റെ വക്രമൂലവും കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

	8.544
8	73.00000000
	64
165	900
	825
1704	7500
	6816
17084	68400
	68336
	64

8.5ന്റെ വക്രവും 73ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 2-ാമത്തേ ശിഷ്ടമായ .75 ആകുന്നു. 8.54നെ വക്രമൂലമായി കരുതുന്നതായാൽ വ്യത്യാസം 3-ാമത്തെ ശിഷ്ടമായ .0684 മാത്രമാണ്. 8.544നെ വക്രമൂലമായി കരുതുന്നതായാൽ വ്യത്യാസം അതി

ലും കുറഞ്ഞു, .000064 മാത്രമായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെ അധികം സ്ഥാനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഖ്യയുടെ

വക്രവും 73ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞുവരുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും തീരെ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ വക്രമൂലം കൃത്യമായി നിണ്ണയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളെ കരണീയുതസംഖ്യകൾ (Irrational Numbers) അല്ലെങ്കിൽ കരണികൾ (Surds) എന്നു പറയുന്നു.

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ എന്നിവയും കരണികളാണ്.

$\sqrt{73}$ ഒരു കരണീയുതസംഖ്യയാണെങ്കിലും നമുക്കു ആ വശ്യമുള്ളത്ര കൃത്യമായി അതിനെ നിണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

73ന്റെ വക്രമൂലം 8.5 എന്നു കരുതുന്നതായാൽ വക്രമൂലം ഒരു ദശാംശസ്ഥാനത്തോളവും, 8.54 എന്നു കരുതുന്നതായാൽ 2 ദശാംശസ്ഥാനത്തോളവും കൃത്യമാണ്.

$\sqrt{2} = 1.414$. ഇതിൽനിന്നു $\sqrt{200}$, $\sqrt{50}$, $\sqrt{0.2}$, $\sqrt{\frac{2}{49}}$ അനുമാനിച്ചെഴുതുക.

$$\sqrt{200} = \sqrt{2 \times 10 \times 10} = \sqrt{2} \times 10 = 1.414 \times 10 = 14.14.$$

$$\sqrt{50} = \sqrt{2 \times 5 \times 5} = \sqrt{2} \times 5 = 1.414 \times 5 = 7.07.$$

$$\sqrt{0.2} = \sqrt{\frac{2}{10 \times 10}} = \frac{\sqrt{2}}{10} = 1.414 \div 10 = .1414.$$

$$\sqrt{\frac{2}{49}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{49}} = \frac{\sqrt{2}}{7} = \frac{1.414}{7} = .202.$$

ഒരു ഭിന്നിതത്തെ സാധാരണ ഭിന്നിതമോ ദശാംശഭിന്നിതമോ ആയി കരുതി അതിന്റെ വക്രമൂലം കാണാവുന്നതാണ്.

$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}. \quad \frac{1}{4} = .25 \quad \therefore \sqrt{\frac{1}{4}} = \sqrt{.25} = .5 = \frac{1}{2}.$$

$\frac{1}{2}$ യുടെ വക്രമൂലം $\frac{1}{2}$ ദശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കാണുക.

$$\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

ഇതിന്റെ ഹേദകം ഒരു കൃത്യസംഖ്യയല്ല. അതുനിമിത്തം ഹേദകത്തെ കൊണ്ടു ഹരിക്കുന്നതിനാൽ ഭിന്നിതത്തിന്റെ വില കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഹേദകത്തെ $\sqrt{2}$ കൊണ്ടു വെരയ്ക്കുക.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{ഭിന്നിതത്തിന്റെ വില ആവശ്യമുള്ളത്ര കൃത്യമായി കാണത്തക്ക രൂപത്തിലാണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു.}$$

ഉത്തരം 3 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കാണേണ്ടതുകൊണ്ട് $\sqrt{2}$ ന്റെ വില 4 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കണ്ടു 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക.

$$\therefore \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1.4142}{2} = .7071 = \underline{\underline{.707}}.$$

(3 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യം).

$\frac{1}{2} = .5$. $.5$ ന്റെ വക്രമൂലം 3 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കണ്ടു മേലെഴുതിയ ഉത്തരം ശരിയോയെന്നു പരിശോധിക്കുക.

(7) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ന്റെ വക്രമൂലം 2 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കാണുക.

$$\frac{2}{3} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2.449}{3} = .816 = \underline{\underline{.82}}.$$

(2 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യം).

$$\frac{2}{3} = .6 \quad \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{.6} = .82 \quad (2 \text{ ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യം}).$$

(8) $\sqrt{\frac{5}{24}}$ $24 = 2^2 \times 2 \times 3$. $\therefore 24$ നെ 2×3 കൊണ്ട് പെരുക്കുന്നതിനാൽ ഒരു കൃത്യവക്രം കിട്ടുന്നു.

$$\therefore \frac{5}{24} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{24}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{6}}{\sqrt{24} \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{12} = \frac{5.477}{12} = .456 = \underline{\underline{.46}}.$$

(2 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യം).

$$\frac{5}{24} = .208\bar{3} \quad \therefore \sqrt{\frac{5}{24}} = \sqrt{.208\bar{3}} = .456 = .46.$$

(2 ലശാംശസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യം).

(9) സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു നിലത്തിന്റെ നീളം വീതിയുടെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടിയാണ്. അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 15 ഏക്കറാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവു കാണുക.

വീതി $2x$ വാരയാണെന്നു വിചാരിക്കുക.

എന്നാൽ നീളം $= 2x \times 1\frac{1}{2}$ വാര $= 3x$ വാര.

$\therefore$ ക്ഷേത്രഫലം $= 3x \times 2x$ ച. വാര. $= 6x^2$ ച. വാര.

$$= 4840 \times 15 \text{ ച. വാര.}$$

$$\therefore x^2 = \frac{4840 \times 15}{6} = 12100$$

$$\therefore x = \sqrt{12100} = 110.$$

$$\therefore \text{ചുറ്റളവ്} = 2(3x + 2x) \text{ വാര} = 2 \times 5 \times 110 \text{ വാര.}$$

$$= 1100 \text{ വാര.}$$

C

1. 308 അടി നീളവും 231 അടി വീതിയുമുള്ള സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വയലിന്റെ 3 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സമചതുരവയലിന്റെ നീളം കാണുക.

2. താഴെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വക്രമൂലം 3 ലംഗംഗസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കാണുക.

- | | | |
|--------|-----------|--------------|
| 1. 3. | 4. 290. | 7. 0.007. |
| 2. 5. | 5. 3.256. | 8. 0.1. |
| 3. 10. | 6. 12.1. | 9. 0.000056. |
| | | 10. 0.081. |

3. താഴെയുള്ളവയുടെ വക്രമൂലം കാണുക.

- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1. $\frac{1}{47761}$ | 2. $7\frac{18}{43}$. | 3. $65\frac{64}{81}$ |
| 4. $14\frac{21}{44} \times 2\frac{7}{55} \times \frac{9}{20}$ | 5. $14\frac{3}{4} \div 3\frac{17}{33}$. | |

4. താഴെ എഴുതിയ സാധാരണ ഭിന്നിതങ്ങളുടേയും മിശ്രസംഖ്യകളുടേയും വക്രമൂലം 3 ലംഗംഗസ്ഥാനത്തോളം കൃത്യമായി കാണുക. അവയുടെ ലംഗംഗ ഭിന്നിതങ്ങളാക്കി വക്രമൂലം കണ്ട ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

$$\frac{1}{8}, \frac{2}{5}, \frac{3}{8}, 4\frac{1}{13}, 5\frac{3}{10}.$$

$$5. \sqrt{5} = 2.2361; \sqrt{3} = 1.7321$$

ഇവയിൽനിന്നു താഴെയുള്ളവയുടെ വില അനുമാനിക്കുക.

$$300, 20, 125, 147, 27, 675, .05, .0003, \frac{3}{4}, \frac{5}{9}.$$

6. സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിന്റെ നീളവും, വീതിയും 5 : 3 എന്ന സംബന്ധത്തിലാകുന്നു. അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 7935 ച. അടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവു കാണുക.

7. 1 ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ നീളം (1) വരെ (2) അടി (3) അംഗുലം വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

8. ഒരു തോട്ടത്തിൽ റബ്ബർമരങ്ങൾ വരിയായി കഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വരിയിലുള്ള മരങ്ങളുടെ 5 ഇരട്ടി വരികളുണ്ട്. ആകെ 23120 മരങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരികളുടെ എണ്ണം കാണുക.

9. കറെ പുരുഷന്മാരും അവരുടെ 4 ഇരട്ടി എണ്ണം സ്ത്രീകളും കൂടി വരിയിട്ടു 756 ക. പിരിക്കുന്നു. ആകെ പുരുഷന്മാരുള്ളത്ര അണ ഓരോ പുരുഷനും, സ്ത്രീകളുള്ളത്ര വൈ ഓരോ സ്ത്രീയും വരിസംഖ്യയായി കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം വെച്ചേറെ കാണുക.

10. ഒരു കോർ മണിക്കൂറിൽ 3 നാഴികവീതം നടക്കും. 16 ഏക്കർ 401 ച. വാർ വിന്യീസ്റ്റുള്ള ഒരു സമചതുര വയലിന്റെ ചുറ്റും ഒരിക്കൽ നടപ്പാൻ അയാൾക്കു എത്ര സമയം വേണം? [Allahabad Entrance.]

11. രണ്ടു ചതുരങ്ങളുടെ വിന്യീസ്റ്റും 1521 : 1849 എന്ന സംബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ അവയുടെ നീളം തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം കാണുക.

12. ഒരു കൃഷിക്കാരനും രണ്ടു നിലങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നു 3564 ചാർ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരവും, മറേറ്റു 1628 ചാർ നീളവും 891 ചാർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സമകോണചതുരവുമാണ്. ഇവ കൊടുത്തു, പകരം അതേ വിന്യീസ്റ്റുള്ള ഒരു സമചതുരനിലും അയാൾ വാങ്ങുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ നീളവും അതിന്നു ചുറ്റും വേലി കെട്ടാൻ വാർക്കു 2 റ്റ. വീതം എത്ര ചിലവാകുമെന്നും കാണുക. (1927)

13. സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വയലിന്റെ നീളം വീതിയുടെ 3 ഇരട്ടിയും വിന്യീസ്റ്റും 363 ഏക്കറുമാണ്. അതിന്റെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടാൻ വാർക്കു 2 റ്റ. വീതം എത്ര ചിലവാകും? (1928)

14. 6.4 ഏക്കർ വിന്യീസ്റ്റുള്ള ഒരു സമചതുരനിലത്തിന്റെ ചുറ്റും $2\frac{1}{2}$ ചാർ വീതിയുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽ ചരലിട്ടുവാൻ ച. വാർക്കു 3 റ്റ. പ്രകാരം എത്ര ചിലവാകും? (1929)

15. ഒരു സമചതുര കളിസ്ഥലത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരേ വീതിയിൽ ഒരു പാതയുണ്ട്. പാതയുടെ വിന്യീസ്റ്റും 4719 ച. വാർയും, പാതക്കും കളിസ്ഥലത്തിനുംകൂടി വിന്യീസ്റ്റും 10 ഏക്കറുമാണെങ്കിൽ പാതയുടെ വീതി എത്ര അടിയാണ്? (1939)

പട്ടിക ഉപയോഗിച്ചു വശമൂലം കാണൽ.

A

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5	2.550	2.551	2.553	2.555	2.557	2.559	2.561	2.563	2.565	2.567
6.6	2.569	2.571	2.573	2.575	2.577	2.579	2.581	2.583	2.585	2.587
6.7	2.588	2.590	2.592	2.594	2.596	2.598	2.600	2.602	2.604	2.606
6.8	2.608	2.610	2.612	2.613	2.615	2.617	2.619	2.621	2.623	2.625
6.9	9.627	2.629	2.631	2.632	2.634	2.636	2.638	2.640	2.642	2.644

B

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
65	8.062	8.068	8.075	8.081	8.087	8.093	8.099	8.106	8.112	8.118
66	8.124	8.130	8.136	8.142	8.149	8.155	8.161	8.167	8.173	8.179
67	8.185	8.191	8.198	8.204	8.210	8.216	8.222	8.228	8.234	8.240
68	8.246	8.252	8.258	8.264	8.270	8.276	8.283	8.289	8.295	8.301
69	8.307	8.313	8.319	8.325	8.331	8.337	8.343	8.349	8.355	8.361

സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗമൂലം നേരിട്ടു വായിക്കത്തക്കവണ്ണം പട്ടികകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു പട്ടികയിൽ നിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

A എന്ന പട്ടിക നോക്കി 6.57ന്റെ വർഗ്ഗമൂലം വായിക്കുക. 2.563 ആണെന്നു കാണാം. വർഗ്ഗമൂലം ഗണിച്ചു ഇതു ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. 657ന്റേയും 0657ന്റേയും വർഗ്ഗമൂലങ്ങൾ അനുമാനിക്കുക.

B എന്ന പട്ടിക നോക്കി 69.3ന്റെ വർഗ്ഗമൂലം വായിക്കുക. ഗണിച്ചു 8.325 ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. 693ന്റേയും 6930ന്റേയും വർഗ്ഗമൂലങ്ങൾ അനുമാനിക്കുക.

അത്യാസം (വാൻമൂലം).

1. പട്ടിക നോക്കി താഴെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗമൂലം വായിക്കുക. ഗണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

69.4, 6.83, 6.68, 65.7, 68.6, 6.79, 6.95, 67.1.

താഴെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗമൂലം അനുമാനിക്കുക.

.677, 677, 682, .666, .0651, .0067.

അത്യാസം 11 D.

1. താഴെയുള്ള പട്ടിക നോക്കി 23, 89, 52 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും വായിക്കുക. ഗണിച്ചും ഉത്തരങ്ങൾ കാണുക.

2. പട്ടികയിൽനിന്നു $\sqrt{12}$ കാണുക. അതു 2 $\sqrt{3}$ ആണെന്നുള്ള സത്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിലയും കാണുക. 2 വിലകളും സമമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

3. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ എന്ന സത്യം ഉപയോഗിച്ചു $\sqrt{2}$ ന്റെ വിലയിൽ നിന്നു $\sqrt{8}$, $\sqrt{72}$, $\sqrt{98}$, $\sqrt{50}$ അനുമാനിക്കുക. പട്ടിക നോക്കി നിങ്ങളുടെ അനുമാനം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

4. വർഗ്ഗമൂലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പഠിച്ച താഴെ പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നു പട്ടികയിലെ വിലകൾ വായിച്ചു സ്ഥാപിക്കുക.

$$(1) \sqrt{(a+b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}. \quad (2) \sqrt{(a-b)} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}.$$

$$(3) \sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}. \quad (4) \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

ഉദാഹരണമായി $a=576$, $b=49$ എന്നു കരുതുക.

$$\sqrt{(a+b)} = \sqrt{(576+49)} = \sqrt{625} = 25$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{576} + \sqrt{49} = 24 + 7 = 31.$$

1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും; n ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


n	n^2	$\sqrt{n}$	n	n^2	$\sqrt{n}$	n	n^2	$\sqrt{n}$	n	n^2	$\sqrt{n}$
1	1	1.000	26	676	5.099	51	2601	7.141	76	5776	8.718
2	4	1.414	27	729	5.196	52	2704	7.211	77	5929	8.775
3	9	1.732	28	784	5.291	53	2809	7.280	78	6084	8.832
4	16	2.000	29	841	5.385	54	2916	7.348	79	6241	8.888
5	25	2.236	30	900	5.477	55	3025	7.416	80	6400	8.944
6	36	2.449	31	961	5.568	56	3136	7.483	81	6561	9.000
7	49	2.646	32	1024	5.657	57	3249	7.550	82	6724	9.055
8	64	2.828	33	1089	5.745	58	3364	7.616	83	6889	9.110
9	81	3.000	34	1156	5.831	59	3481	7.681	84	7056	9.165
10	100	3.162	35	1225	5.916	60	3600	7.746	85	7225	9.220
11	121	3.317	36	1296	6.000	61	3721	7.810	86	7396	9.270
12	144	3.464	37	1369	6.083	62	3844	7.874	87	7569	9.327
13	169	3.606	38	1444	6.164	63	3969	7.937	88	7744	9.381
14	196	3.742	39	1521	6.245	64	4096	8.000	89	7921	9.434
15	225	3.873	40	1600	6.325	65	4225	8.062	90	8100	9.487
16	256	4.000	41	1681	6.403	66	4356	8.124	91	8281	9.539
17	289	4.123	42	1764	6.481	67	4489	8.185	92	8464	9.592
18	324	4.243	43	1849	6.557	68	4624	8.246	93	8649	9.644
19	361	4.359	44	1936	6.633	69	4761	8.307	94	8836	9.695
20	400	4.472	45	2025	6.708	70	4900	8.367	95	9025	9.747
21	441	4.583	46	2116	6.782	71	5041	8.426	96	9216	9.798
22	484	4.690	47	2209	6.856	72	5184	8.485	97	9409	9.849
23	529	4.796	48	2304	6.928	73	5329	8.544	98	9604	9.899
24	576	4.899	49	2401	7.000	74	5476	8.602	99	9801	9.950
25	625	5.000	50	2500	7.071	75	5625	8.660	100	10000	10.000

അദ്ധ്യായം 6.

പൈത്താഗൊറസിന്റെ പ്രമേയം.

(Theorem of Pythagoras).

A ഒരു സമകോണായ ABC എന്നൊരു സമകോണത്രികോണം വരക്കുക; എന്നാൽ BC അതിന്റെ വിപുലരേഖയായിരിക്കും.



AB ഒരു ഭുജമായ സമചതുരത്തെ AB യിന്മേലുള്ള സമചതുരമെന്നും, അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലത്തെ ചുരുക്കി AB^2 എന്നും പറയുന്നു. നിങ്ങൾ വരച്ച സമകോണത്രികോണത്തിലുള്ള AB^2 , AC^2 , BC^2 എന്നീ ക്ഷേത്രഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുക. BC^2 , $AB^2 + AC^2$ എന്നീ ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധവും കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ഗണിക്കുന്നതായാൽ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ എന്നു കാണാം. വേറെയും സമകോണത്രികോണങ്ങളെ വരച്ചു ഇതേ പരീക്ഷണം ചെയ്യുക. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു താഴെ പറയുന്ന സത്യം അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.


ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ വിപുലരേഖയിന്മേലുള്ള സമചതുരം മറ്റു രണ്ടു ഭുജങ്ങളിന്മേലുള്ള സമചതുരങ്ങളുടെ തുകയോടു സമമാകുന്നു. ഈ ബന്ധം ഒന്നാമതായി കണ്ടുപിടിച്ചതു ഗ്രീക്കു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ പൈത്താഗൊറസ് ആയതുകൊണ്ടു ഇതിനെ പൈത്താഗൊറസിന്റെ പ്രമേയം എന്നു പറയുന്നു.

ഒരു കോൺ സമകോണല്ലാത്ത ത്രികോണങ്ങളും വരച്ചു അവയുടെ ഭുജങ്ങൾ തമ്മിൽ മേല്പറഞ്ഞ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഭുജത്തിന്മേലുള്ള സമചതുരം മറ്റു രണ്ടു ഭുജങ്ങളിന്മേലുള്ള സമചതുരങ്ങളുടെ തുകയോടു സമമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭുജത്തിന്നെതിരായ കോൺ ഒരു സമകോണായിരിക്കും.

ബൈത്താഗോറസിന്റെ പ്രമേയത്തെ താഴെ വിവരിച്ച പ്രകാരം എളുപ്പത്തിൽ തെളിയിക്കാം.

തരിച്ച കടലാസ്സെടുത്ത സൗകര്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ $(a+b)$ നീളമുള്ള



രണ്ടു സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചപ്രകാരം അവയെ ഭാഗിക്കുക.

ഇടതുവശത്തുള്ള സമചതുരത്തിലെ 4 സമകോണത്രികോണങ്ങളുടെ ഭുജങ്ങൾ a'' , b'' , c'' ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതു വിപുലരേഖയിന്മേലുള്ള സമചതുരമാണ്.

വലതുവശത്തുള്ള സമചതുരത്തിലും a'' , b'' , c'' എന്നീ ഭുജങ്ങളുള്ള 4 സമകോണത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ട്; ബാക്കിയുള്ളതു a'' , b'' നീളമുള്ള രണ്ടു സമചതുരങ്ങളാണ്. ഇടത്തും വലത്തും ഉള്ള സമചതുരങ്ങൾ സമമായതുകൊണ്ട് $c^2 = a^2 + b^2$ എന്നു തെളിയുന്നു. c , ചിത്രത്തിലുള്ള സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ വിപുലരേഖയും a , b മറ്റു ഭുജങ്ങളും ആകുന്നു.

ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ഭുജങ്ങളുടെ നീളം അറിയുന്നതായാൽ ഈ പ്രമേയം ഉപയോഗിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഭുജത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം.

ഉദാ:— 1. 25 അടി നീളമുള്ള ഒരു കോണിയുടെ ഒരറ്റം ഒരു ചുവരിന്മേൽ 24 അടി ഉയരത്തോളം എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടി ഭാഗം ചുവരിൽനിന്നു എത്ര ദൂരത്തായിരിക്കണം?


$$\begin{aligned} \text{ചിത്രത്തിൽ } AB^2 &= AC^2 - BC^2 \\ &= (25^2 - 24^2) \text{ ച. അടി.} \\ &= 49 \text{ ച. അടി.} \end{aligned}$$

$$\therefore AB = 7 \text{ അടി.}$$

$$\therefore \text{ആവശ്യപ്പെട്ട ദൂരം } = \underline{\underline{7 \text{ അടി.}}}$$



2. (a) ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ നീളം a സെ. മീ. ആകുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം നിണ്ണയിക്കുക.



കണ്ണത്തിന്റെ നീളം d സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ

$$d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

$$\therefore d = \sqrt{2}a$$

അതായതു കണ്ണം = സമചതുരത്തിന്റെ $\sqrt{2}$ ഇരട്ടി.

$$\sqrt{2}a = d. \therefore a = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{d\sqrt{2}}{2}.$$

കണ്ണത്തിന്റെ നീളത്തിൽനിന്നു ഈ സൂത്രം വഴിയായി സമചതുരത്തിന്റെ നീളം നിണ്ണയിക്കാം. ഈ ആവശ്യം $\sqrt{2} = 1.414$ (സുമാർ) എന്നു കാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

10 സെ. മീ. നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ ഒരു കണ്ണം അളക്കുക. നീളം ഗണിച്ചു കാണുക.

$$\begin{aligned} \text{നീളം} &= d \text{ സെ. മീ.} = \sqrt{2}a \text{ സെ. മീ.} = \sqrt{2} \times 10 \text{ സെ. മീ.} \\ &= 1.414 \times 10 \text{ സെ. മീ.} = 14.14 \text{ സെ. മീ. (2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യം).} \end{aligned}$$

ചില സമചതുരങ്ങളുടെ നീളം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കണ്ണത്തിന്റെ നീളം അളന്നും ഗണിച്ചും കാണുക. 2 ഉത്തരങ്ങളും നീളയളവിന്റെ 1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ സമമാണോ എന്നു നോക്കുക.

9 സെ. മീ.; 3"; 8 സെ. മീ.; 4".


(b) ഒരു സമകോണചതുരത്തിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം.

$ABCD$ എന്ന സമകോണചതുരത്തിൽ

$AB = l''$, $BC = b''$ എന്നു കരുതുക.

B ഒരു സമകോണായതുകൊണ്ടു

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = l^2 + b^2$$



$\therefore AC$ എന്ന കണ്ണത്തിന്റെ നീളം d'' ആണെങ്കിൽ

$$d^2 = l^2 + b^2. \therefore d = \sqrt{l^2 + b^2}$$

BD എന്ന കണ്ണം AC കൂടെ സമമായതുകൊണ്ടു അതിന്റെ നീളവും നമുക്കു ഗണിക്കാം.

ഉദാ. 40' നീളവും 9' വീതിയുമുള്ള ഒരു വറാന്തയുടെ ഏതിർ മൂലകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഗണിക്കുക. തോതനുസരിച്ചു ഒരു പടം വരച്ചും ദൂരം കാണുക. ഏതിർമൂലകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം = കണ്ണത്തിന്റെ നീളം.

$$\therefore d^2 = 40^2 + 9^2 = 1600 + 81 = 1681$$

$$\therefore d = \sqrt{1681} = 41 \quad \therefore \text{ആവശ്യപ്പെട്ട ദൂരം} = 41'.$$

നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുമുറികൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ (Badminton, Basket ball, Tennikoit court) മുതലായവയുടെ നീളവും വീതിയും ഏതിർ മൂലകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും അളന്നു ഒരു പട്ടികയുണ്ടാക്കുക. ഗണിച്ചു കിട്ടുന്ന ദൂരങ്ങളുമായി ഒത്തു നോക്കുക. ക്ലാസ്സുമുറിയിലെ ഇഷ്ടിക, മേശ, blackboard, പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയേയും അളന്നു മേല്പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം ചെയ്യുക. മൂന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

(c) ദ്വിസമഭുജസമകോണത്രികോണ


(Isosceles right angled triangle) ത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം.

$AB = BC = a$ സെ. മീ. എന്നു കരുതുക.

$ABCD$ ഒരു സമചതുരമായതുകൊണ്ടു

$AB = BC$. B ഒരു സമകോൺ.

$\therefore ABC$ ഒരു ദ്വിസമഭുജത്രികോണമാകുന്നു.



അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം $= ABCD$ യുടെ $\frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$ ച. സെ. മീ.

ഇതിൽ $a =$ ത്രികോണത്തിന്റെ സമഭുജങ്ങളുടെ നീളം.


വേറൊരു വിധത്തിലും ഒരു ദ്വിസമഭുജസമകോണത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കണ്ടുപിടിക്കാം.

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \text{ ആധാരം} \times \text{ഉന്നതി} = \frac{1}{2} AB \times BC.$$

$$= \frac{1}{2} a \times a \text{ ച. സെ. മീ.} = \frac{a^2}{2} \text{ ച. സെ. മീ.}$$

ഭുജങ്ങളുടെ നീളത്തിന്റെ സംബന്ധം: $1 : 1 : \sqrt{2}$ എന്നു കാർക്കുക.

(d) ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഭുജം a സെ.മീ. ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉന്നതി നിണ്ണയിക്കുക.



AD, BC ക്കു ലംബമായതുകൊണ്ടു

$$BD = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2} \text{ സെ. മീ.}$$

$$AD^2 = AB^2 - BD^2$$

$AD = h$ സെ. മീ. എന്നു വിചാരിക്കുക.

$$\therefore h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$\therefore h = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

അതായതു ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ഉന്നതി = ഭുജത്തിന്റെ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ഇരട്ടി.

$$\triangle ABC \text{ ത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം} = \frac{1}{2} BC \times AD$$

$$= \frac{a}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a \text{ ച. സെ. മീ.}$$

$$= \frac{\sqrt{3} \cdot a^2}{4} \text{ ച. സെ. മീ.}$$

അതുകൊണ്ടു ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം = ഭുജത്തിന്മേലുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ഇരട്ടി.

$\sqrt{3} = 1.732$ (സുമാർ) എന്നു കാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

(e) $\triangle ABD$ ത്തിന്റെ കോണുകൾ $90^\circ, 60^\circ, 30^\circ$ യും അവക്കെതിരായ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം $a, \frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2}$ സെ. മീ. ഉം ആണ്. ഈ ആകൃതിയുള്ള

ത്രികോണങ്ങളുടെ ഭുജങ്ങൾ $2 : \sqrt{3} : 1$ എന്ന സംബന്ധത്തിലായിരിക്കും.

3. സംഖ്യകളുടെ വക്രമൂലം രൂപങ്ങൾ വരച്ചു നിർണ്ണയിക്കാം.

(a) ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള വേറൊരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക. ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ കണ്ണിത്തിന്മേലുള്ള സമചതുരം സമചതുരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായതുകൊണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ട സമചതുരം സമചതുരത്തിന്റെ കണ്ണിത്തിന്മേലുള്ള സമചതുരമാണ്.

(b) ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള വേറൊരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക.

$$\triangle ABD \text{ ത്തിൽ, } AD = \sqrt{3} BD$$

$$\therefore AD^2 = 3BD^2; \angle B = 60^\circ$$

ഈ സത്യം ഉപയോഗിച്ചു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക.

(c) ഒരു രൂപം വരച്ച അതിൽനിന്നു $\sqrt{12}$ നിണ്ണയിക്കുക.

$$2^2 + 3^2 = 13 \quad \therefore \sqrt{13} = \sqrt{2^2 + 3^2}$$

ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ടു ഭുജങ്ങൾ 2ഉം 3ഉം അംഗുലമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിപുലരേഖ $\sqrt{13}$ അം. ആയിരിക്കും.

ഏതു സംഖ്യയും രണ്ടു വക്രങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കണമെന്നില്ല.

അതുകൊണ്ടു സാധാരണമായി താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലാണു വക്രമൂലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു.

$$\left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2 = n$$

$$\therefore \sqrt{n} = \sqrt{\left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{n-1}{2}\right)^2}$$

വക്രമൂലം കാണേണ്ടുന്ന സംഖ്യ n എന്നു വിചാരിക്കുക $\frac{n+1}{2}, \frac{n-1}{2}$

നീള അളവുകൾ യഥാക്രമം വിപുലരേഖയും, ഒരു ഭുജവും ആയ സമകോണത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഭുജം $\sqrt{n}$ നീള അളവു ആയിരിക്കും.

$$n = 13 \text{ ആണെങ്കിൽ, } \frac{n+1}{2} = 7, \frac{n-1}{2} = 6.$$

സൌകര്യമുള്ള നീളം ഏതെങ്കിലും സമകോണത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക.

അദ്ധ്യായം 12.

1. ഒരു സമകോണചതുരത്തിന്റെ നീളം 21 സെ.മീ.ഉം വീതി 20 സെ.മീ.ഉം ആണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം കാണുക.

2. കോണമാപകം ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ത്രികോണം സമകോണത്രികോണമാണോ എന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ പരിശോധിക്കും?

3. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 3 : 4 : 5 എന്ന സംബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ അതു ഒരു സമകോണത്രികോണമാണെന്നു തെളിയിക്കുക.

4. ഒരു സമചതുരവയലിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 10 ഏക്കറാണ്. അതിന്റെ ഒരു മൂലയിൽനിന്നു എതിർമൂലയിലേക്കുള്ള ദൂരം വാരവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

5. സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വയലിന്റെ നീളവും വീതിയും 15 : 8 എന്ന സംബന്ധത്തിലാണ്. അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 95767.5 ച. വാരയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം കാണുക. (1938)

6. 2" നീളമുള്ള AB എന്നൊരു ആധാരത്തിന്മേൽ അതിന്റെ ഇരുവശത്തും ABC , ABD എന്ന രണ്ടു സമഭജത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ CD യുടെ നീളം അംഗുലത്തിന്റെ ദശാംശംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1936)

7. ഒരു സമഭജത്രികോണത്തിന്റെ ഭജത്തിന്റെ നീളം 5 സെ.മീ. ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം ച.സെ.മീ.ന്റെ ശതാംശം വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

8. ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ കണ്ണത്തിന്മേലുള്ള സമചതുരം സമചതുരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണെന്നു തെളിയിക്കുക.

9. ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം 2.6 ചങ്ങലയാണ്. എന്നാൽ സമചതുരത്തിന്റെ നീളം ഒരു കണ്ണിവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

10. 26' നീളമുള്ള ഒരു കോണി ഒരു ചുവരിനോടു ചാരിവെച്ചിരിക്കുന്നു. കോണിയുടെ അഗ്രം 24' ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടി ചുവരിൽ നിന്നു എത്ര ദൂരമാണ്? കോണിയുടെ അടി 2' വഴുതിയാൽ അതിന്റെ അഗ്രം എത്ര അടി താഴും? ഒരു പടം വരച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

11. ഒരു തെരുവിന്റെ ഇരുവശത്തും ചുവരുകളുണ്ട്. $32\frac{1}{2}$ അടി നീളമുള്ള ഒരു കോണി ഒരുവശത്തുള്ള ചുവരിന്മേൽ ചാരിവെച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ അഗ്രം 28 അടി ഉയരത്തിലായിരുന്നു. ചുവടിച്ചുകൊണ്ടെ മറുവശത്തുള്ള ചുവരിന്മേൽ ചാരിവെക്കുന്നതായാൽ കോണിയുടെ അഗ്രം $31\frac{1}{2}$ അടി ഉയരത്തിലായിരിക്കുമെങ്കിൽ തെരുവിന്റെ വീതി കാണുക. ഒരു പടം വരച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

12. രണ്ടു തൂണുകളുടെ ഉയരം 12ഉം 32ഉം അടിയും അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം 15 അടിയും ആണെങ്കിൽ അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഗണിക്കുക. പടം വരച്ചും കാണുക.

13. ഒരു സമചതുരവയലിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു കമ്പിത്തൂണുണ്ട്. വയലിന്റെ നീളം 20 വാരയും, തൂണിന്റെ ഉയരം 30 അടിയും ആണെങ്കിൽ വയലിന്റെ ഒരു മൂലയിൽനിന്നു തൂണിന്റെ അഗ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അംഗുലംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

14. ഒരു സമഭജത്രികോണത്തിന്റെ ഉന്നതി 2.5" ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭജത്തിന്റെ നീളം അംഗുലത്തിന്റെ ദശാംശംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

15. സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മുററത്തിന്റെ വീതി 3 വാരയും

അതിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം $9\frac{1}{4}$ വരയും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്ര ഫലം എത്ര?

16. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങൾ $4''$, $2\cdot9''$, $2\cdot9''$ ആകുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. രൂപം വരച്ചും ക്ഷേ. ഫ. കാണുക.

17. ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ വിപുലരേഖയുടെ നീളം 18 സെ. മീ. ഉം, ശേഷമുള്ള ഭുജങ്ങളിലൊന്നു മറ്റേതിന്റെ $\frac{3}{4}$ ഉം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ഷേ. ഫ. കാണുക.

18. ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഭുജത്തിന്റെ നീളം 12 സെ. മീ. ഉം, വിപുലരേഖ ശേഷമുള്ള ഭുജത്തേക്കാൾ 9 സെ. മീ. അധികവുമാണെങ്കിൽ വിപുലരേഖയുടെ നീളം കാണുക.

19. ഒരു തുറമുഖത്തുനിന്നു രണ്ടു കപ്പലുകൾ ഒരേ സമയത്തു പുറപ്പെടുന്നു. ഒന്നു തെക്കോട്ടു മണിക്കൂറിൽ 18 $\frac{3}{4}$ നാഴികയും, മറ്റേതു കിഴക്കോട്ടു മണിക്കൂറിൽ 11 നാഴികയും വീതം പോകുന്നതായാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എപ്പോൾ 65 നാഴികയാകും?

20. ഒരു വേലിയിൽനിന്നു 15' അകലെയായി നാട്ടീട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റിയോടു ഒരു ആട്ടിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആട്ടിന്നു 23' ദൂരത്തോളം മേയാമെങ്കിൽ വേലിയുടെ എത്ര നീളത്തോളം അതിന്നു മേയാമെന്നു അടിവരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുക. തോതനുസരിച്ചു ഒരു പടം വരയ്ക്കുക. (1911)

21. ഒരു കാളവണ്ടിയുടെ കൂട് വൃത്താകൃതിയിലാണ്. വണ്ടിയുടെ വീതി 3' ഉം, ഉയരം 4' ഉം കൂടിന്റെ ഉയരം 5' ഉം ആണെങ്കിൽ കൂടിന്റെ വ്യാസം കാണുക.

22. ഒരു പാലത്തിന്റെ രണ്ടു തൂണുകൾ തമ്മിൽ 28' ദൂരമുണ്ട്. ഈ തൂണുകളിന്മേൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു കമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഉയരം 4' ആണെങ്കിൽ കമാനം ഒരു ചാപമായിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം കാണുക. (1914)

23. 30' ഉയരമുള്ള ഒരു കവുങ്ങു മുറിഞ്ഞു അതിന്റെ അഗ്രം മുരട്ടിൽനിന്നു 15' ദൂരത്തായി നിലത്തു കയറ്റുന്നു. മുറിഞ്ഞ ഭാഗം തടിമരം വിടാതെ നില്ക്കുന്ന വെങ്കിൽ എവിടെവെച്ചാണ് കവുങ്ങു മുറിഞ്ഞതു?

24. താഴെ കാണുന്ന ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ ഉള്ള സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുക:—

5 ച. അ., 10 ച. അ., 15 ച. അ., 8 ച. സെ. മീ., 12 ച. സെ. മീ., 17 ച. സെ. മീ.

25. താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗമൂലം പടം വരച്ചു നിർണ്ണയിക്കുക. ഗണിച്ചുകിട്ടുന്ന ഉത്തരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക:—

3, 7, 19, 20, 31, 43, 59.

26. താഴെ പറയുന്ന നീളങ്ങളുള്ള സരളരേഖകൾ വരയ്ക്കുക:—

$\sqrt{14}$ സെ.മീ., $\sqrt{18}$ അം., $\sqrt{27}$ സെ.മീ., $\sqrt{11}$ അം., $\sqrt{33}$ സെ.മീ., $\sqrt{6}$ അം.

27. 2" നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ (a) ഇരട്ടി, (b) 3 ഇരട്ടി (c) പകുതി (d) $\frac{1}{3}$ വലിപ്പമുള്ള സമചതുരം നിർമ്മിക്കുക.

28. 2, 3, 5 സെ.മീ. നീളമുള്ള 3 സമചതുരങ്ങളുടെ തുകയോടു സമമായ ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ നീളം അളയ്ക്കുക. ഗണിച്ചു ഉത്തരം കാണുക.

29. ഒരു സരളരേഖ വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ (a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3}$ ഇരട്ടി നീളമുള്ള സരളരേഖകൾ വരയ്ക്കുക.

അദ്ധ്യായം 7.

വൃത്തം (The Circle).

ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസവും പരിധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

3, 5, 7 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള 3 വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. അവയുടെ പരിധിയിൽ ഒരു അടയാളം ഇട്ടശേഷം വക്രരേഖകളുടെ നീളം അളക്കുന്ന മാറ്റം ഉപയോഗിച്ചു അവയുടെ പരിധി അളയ്ക്കുക. കാരോ വൃത്തത്തിന്റെയും പരിധിയെ വ്യാസംകൊണ്ടു ഹരിക്കുക. ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യ സ്ഥിരമാണെന്നും അതു സുമാർ 3 $\frac{1}{7}$ ആണെന്നും കാണാം.

പരിധിയും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു പരിധി വ്യാസം $=\pi$ എന്നെഴുതുന്നു. π യുടെ വില ആവശ്യമുള്ളത്ര കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാം. സാധാരണമായി അതിനെ 3.1416 എന്നോ 3 $\frac{1}{7}$ എന്നോ ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി

യേയും വ്യാസത്തേയും c, d എന്ന അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതായാൽ $\frac{c}{d} = \pi$.

$$\therefore c = \pi d.$$

വ്യാസാർദ്ധം r ആണെങ്കിൽ $C = 2\pi r$.

ഈ സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വൃത്തങ്ങളുടെ പരിധി നിണ്ണയിക്കാം.

ഉദാ:—(1) ഒരു ചക്രത്തിന്റെ വ്യാസം $10\frac{1}{2}$ " ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിധി കാണുക.

$$c = \pi d = 3\frac{1}{7} \times 10\frac{1}{2}.$$

$$\therefore \text{പരിധി} = 33 \text{ അംഗുലം.}$$

(2) ഒരു കിണറ്റിന്റെ ആർദ്രയുടെ നീളം 22 അടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം എത്രയാണ്?

$$r = \frac{c}{2\pi} = \frac{22}{2 \times 3\frac{1}{7}}.$$

$$\therefore \text{വ്യാസാർദ്ധം} = \underline{\underline{3\frac{1}{2} \text{ അടി.}}}$$

അദ്ധ്യായം 13.

1. താഴെ പറയുന്ന വ്യാസങ്ങളുള്ള വൃത്തങ്ങളുടെ പരിധികളെത്ര?

(a) 35 സെ. മീ. (b) 4 വാ. 1 അ. 5 അം. (c) 23 ചങ്ങല 52 കണ്ണി.

2. താഴെ പറയുന്ന പരിധികളുള്ള വൃത്തങ്ങളുടെ വ്യാസാർദ്ധങ്ങൾ കാണുക.

(a) 264 അം. (b) 68 വാ. 1 അ. 4 അം. (c) 7 ചങ്ങല 92 കണ്ണി.

3. ഒരു കമ്പി 7" വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തമായി വളയ്ക്കാം. അതിനെ ഒരു ചതുരമാക്കുന്നതായാൽ ചതുരത്തിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും?

4. ഒരു വണ്ടിയുടെ ചക്രത്തിന്റെ വ്യാസം 30" ആണ്. അത് 1400 പ്രാവശ്യം ചുറ്റുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം പോകും?

5. ഒരു വണ്ടിയുടെ രണ്ടു ചക്രങ്ങളുടെ വ്യാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 4" ആണ്. ഒരു നാഴിക ദൂരം പോകുമ്പോൾ വലിയ ചക്രം 720 പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നെങ്കിൽ അതേ ദൂരം പോകുമ്പോൾ ചെറിയതു എത്ര പ്രാവശ്യം അധികം ചുറ്റും?

ങ്കിൽ OAB എന്ന വൃത്തകോണാംശത്തെ സുമാറായി AB ആധാരവും വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം ഉന്നതിയുമായ ഒരു ത്രികോണമായി കരുതാം.

വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം r ആണെന്നു വിചാരിക്കുക.

എന്നാൽ OAB എന്ന വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം $\left. \vphantom{\begin{matrix} \\ \end{matrix}} \right\} = \frac{1}{2} AB \times r$

ഇതേപ്രകാരം OBC എന്ന വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം $\left. \vphantom{\begin{matrix} \\ \end{matrix}} \right\} = \frac{1}{2} BC \times r$

„ $OCD \dots\dots \left. \vphantom{\begin{matrix} \\ \end{matrix}} \right\} = \frac{1}{2} CD \times r$

$$\begin{aligned} \therefore \text{വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം} &= \frac{1}{2}(AB + BC + CD + \dots)r \\ &= \frac{1}{2} \times \text{വൃത്തപരിധി} \times r \\ &= \frac{1}{2} \times 2\pi r \times r \\ &= \pi r^2. \end{aligned}$$

ഈ സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചു വൃത്തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രഫലം ഗണിക്കാം.

ഉദാ:— (1) $7''$ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

$$r = 3\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ക്ഷേത്രഫലം} = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \text{ ച. അ.}$$

$$= 38\frac{1}{2} \text{ ച. അ.}$$

(2) ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 616 ച. സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധമെത്ര?

$$\pi r^2 = 616$$

$$\therefore r^2 = \frac{616 \times 7}{22} = 196$$

$$\therefore r = 14$$

$$\therefore \text{വ്യാസാർദ്ധം} = \underline{\underline{14 \text{ സെ. മീ.}}}$$

യുടേയും തോട്ടത്തിന്റേയും ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ സമമാണെങ്കിൽ നടയുടെ വീതി അടിയുടെ ലംഗംഗംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

10. 14" നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൽ വരക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലമെത്ര? ആ വൃത്തത്തിൽ വരക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലമെത്ര?

11. 44" നീളമുള്ള ഒരു കമ്പികൊണ്ടു ഒരു വൃത്തവും ഒരു സമചതുരവും ഉണ്ടാക്കുന്നതായാൽ ഏതായിരിക്കും അധികം വലിപ്പമുള്ളത്? കിണറുകൾ വൃത്താകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു ഒരു കാരണം ഈ ഉത്തരത്തിൽനിന്നു അറുമാനിക്കാമോ?

12. 12 സെ.മീ. നീളവും 5 സെ.മീ. വീതിയുമുള്ള ഒരു കടലാസ്സിൽനിന്നു മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം എത്രയാണ്? അത്തരം എത്ര വൃത്തങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം? ബാക്കിയാകുന്ന കടലാസ്സിന്റെ ക്ഷേത്രഫലമെത്ര?

13. ഒരു കക്ഷണം കടലാസ്സിന്റെ നീളം 18 അംഗുലവും വീതി 7 അംഗുലവുമാണ്. അതിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും അല്പവൃത്തങ്ങളാകണമെങ്കിൽ അതിൽനിന്നു കുറഞ്ഞത് എത്ര ച. അംഗുലം കടലാസ്സു മുറിച്ചെടുക്കണം?

14. ഒരു കക്ഷണം കടലാസ്സിന്റെ നീളം 12 സെ.മീ.ഉം വീതി 7 സെ.മീ.ഉം ആണ്. അതിൽനിന്നു മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അല്പവൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലമെത്ര? വീതി 5 സെ.മീ. ആണെങ്കിൽ അല്പവൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം എത്രയായിരിക്കും?

15. വൃത്താകാരമായ ഒരു കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന്നു ചുറ്റും ഇരിമ്പുവേലി കെട്ടുവാൻ വാരക്കു 1 ക. 4 ണ. പ്രകാരം 3025 ക. ചിലവാകുന്നു. തോട്ടത്തിൽനിന്നു ഏകദിന്നു 284 ക. വീതം വരവുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വരവു കാണുക.

16. രണ്ടു വൃത്തങ്ങളുടെ വ്യാസങ്ങൾ 3:4 എന്ന സംബന്ധത്തിലാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ (a) പരിധികൾ (b) ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ ഏതു സംബന്ധത്തിലായിരിക്കും?

17. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം വേറൊരു വൃത്തത്തിന്റെ നാലിരട്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തേതിന്റെ പരിധി രണ്ടാമത്തേതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ്? ഒന്നാമത്തേതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം രണ്ടാമത്തേതിന്റെ പകുതിയാണെങ്കിൽ വ്യാസങ്ങൾ ഏതു സംബന്ധത്തിലാണ്?

18. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഇരട്ടി ക്ഷേത്രഫലമുള്ള ഒരു വൃത്തം നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ വരക്കും?

19. രണ്ടു വൃത്തങ്ങളുടെ വ്യാസാല്പം 1ഉം 2ഉം അംഗുലമാണെങ്കിൽ രണ്ടും

ക്രിയത്ര ക്ഷേത്രഫലമുള്ള ഒരു വൃത്തം നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ വരക്കും? അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം എത്രയാണു്?

20. ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളിന്മേൽ അവ വ്യാസങ്ങളായ അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം മറ്റു രണ്ടിന്റേയും ക്ഷേത്രഫലങ്ങളുടെ തുകയോടു സമമാണെന്നു തെളിയിക്കുക.

21. വൃത്താകാരമായ ഒരു തോട്ടത്തിന്നു ചുറ്റും 7 അടി വീതിയിൽ ഒരു നടയുണ്ടു്. നടയുടെ ക്ഷേത്രഫലം 3674 ച. അടിയുണ്ടെന്നെങ്കിൽ തോട്ടത്തിന്റെ വ്യാസം കാണുക.

22. വൃത്താകാരമായ ഒരു കളത്തിന്റെ വ്യാസം d അടിയും അതിന്നു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നടയുടെ വീതി a അടിയുമാണെങ്കിൽ നടയുടെ ക്ഷേത്രഫലം $\pi a (d+a)$ ച. അടിയുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുക.

23. 4 അംഗുലം വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്ത (Inscribed) ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. (1938)

24. ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 3 സെ. മീ. ആണു്. എന്നാൽ അതിന്റെ പരിവൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

വൃത്തകോണാംശങ്ങൾ (Sectors).

രണ്ടു വ്യാസാർദ്ധങ്ങളാലും അവകിടയിലുള്ള ചാപത്താലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന്നു വൃത്തകോണാംശ (Sector) മെന്നു പേർ. വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ അതിരുകളായ രണ്ടു വ്യാസാർദ്ധങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ കോൺ (Angle of the Sector) എന്നു പറയുന്നു.

ഒരു കോണാംശത്തിന്റെ ചാപരേഖ അതിന്റെ കോണിന്നു ക്രമാനുപാതമായി മാറുന്നുവെന്നതു വ്യക്തമാണു്.

ഒരു മുഴു വൃത്തത്തെ ഒരു കോണാംശമായി കരുതുന്നതായാൽ അതിന്റെ ചാപരേഖ വൃത്തപരിധിയും അതിന്റെ കോൺ 360° ഉം ആയിരിക്കും.

∴ വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ കോൺ 1° ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാപരേഖ = പരിധിയുടെ $\frac{1}{360}$.

കോൺ n° ആണെങ്കിൽ ചാപരേഖ = പരിധിയുടെ $\frac{n}{360}$. വ്യാസാർദ്ധം r ആണെങ്കിൽ,
 ചാപരേഖ = $\frac{n}{360} \times 2\pi r$.

ഇതേ ന്യായപ്രകാരം, വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ കോൺ n° ഉം വ്യാസാർദ്ധം r ഉം ആണെങ്കിൽ കോണാംശത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം = $\frac{n}{360} \times \pi r^2$.

ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം നിണ്ണയിപ്പാൻ ഉപയോഗിച്ച ന്യായപ്രകാരം ഒരു വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം.

$$= \frac{\text{ചാപരേഖ} \times \text{വ്യാസാർദ്ധം}}{2} \text{ എന്നു തെളിയിക്കാം.}$$

ഒരു കോണാംശത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം r ഉം അതിന്റെ ചാപരേഖ l ഉം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം,

$$A = \frac{lr}{2}.$$


ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കോണാംശങ്ങളുടെ വലിപ്പം അവയുടെ കോണുകളുടെ വലിപ്പത്തിന്നു ക്രമാനുപാതമായതുകൊണ്ടു വിവിധ പരിമാണങ്ങളെ ചിത്രങ്ങൾ മുഖേന താരതമ്യപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണമായി ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണങ്ങളെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കോണാംശങ്ങളെക്കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കാം. സമുദ്രങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണം മില്യൻ ചതുരശ്രനാഴികയായി താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ശാന്തസമുദ്രം: 68; അത്ലാന്തിക്: 35; ഹിന്ദുസമുദ്രം: 25;

ആർക്ടിക്: 5.4; ശേഷമുള്ളവ: 11.6.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണമായ 145 മില്യൻ ച. നാഴികയെ ഒരു വൃത്തംകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതായാൽ ശാന്തസമുദ്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോണാംശത്തിന്റെ കോൺ = $\frac{68}{145} \times 360^\circ = 169^\circ$ (ഡിഗ്രി വരെ കൃത്യം).

ഇതേപ്രകാരം മറ്റു കോണാംശങ്ങളുടെ കോണുകൾ യഥാക്രമം 87, 62 13, 29, ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും.



5 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരച്ചു കേന്ദ്രത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ കോണുകളെ വരയ്ക്കുക.

ഓരോ കോണാംശത്തിന്മേലും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ പേർ എഴുതുക. ഇങ്ങിനെ വരയ്ക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ വിസ്തീർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

9 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ കോൺ = 140° . എന്നാൽ അതിന്റെ ചാപരേഖയുടെ നീളവും ക്ഷേത്രഫലവും കാണുക.

$$\text{ചാപരേഖയുടെ നീളം, } l = \frac{n}{360} \times 2\pi r$$

$$= \frac{140}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 9 \text{ സെ. മീ.} = 22 \text{ സെ. മീ.}$$

$$\text{ക്ഷേത്രഫലം, } A = \frac{n}{360} \times \pi r^2 = \frac{140}{360} \times \frac{22}{7} \times 9 \times 9 \text{ ച. സെ. മീ.}$$

$$= 99 \text{ ച. സെ. മീ.}$$


$A = \frac{lr}{2}$ എന്ന സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

വൃത്തഖണ്ഡങ്ങൾ (Segments of Circles).

7 അംഗുലം വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൽ $3\frac{1}{2}$ അം. നീളമുള്ള ഒരു ജ്യാവു വരയ്ക്കുന്നതിനാലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ വൃത്തഖണ്ഡത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

വ്യാസാർദ്ധം $3\frac{1}{2}$ ആയതുകൊണ്ട്

$$OA = OB = AB$$



$\therefore \angle AOB$ ഒരു സമളജ്യത്രികോണമാണ്. ചെറിയ ഖണ്ഡം = $\angle AOB$ എന്ന കോണാംശം — $\triangle AOB$.

$$= \left(\frac{60}{360} \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \right) \text{ ച. സെ. മീ.}$$

$$= 1.11 \text{ ച. സെ. മീ. (2 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യം.)}$$

വലിയ ഖണ്ഡം ഒരു കോണാംശത്തിന്റേയും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റേയും തുകയായിരിക്കും.

അഭ്യാസം 15.

1. താഴെ പറയുന്ന വൃത്തകോണാംശങ്ങളുടെ ചാപങ്ങളുടെ നീളവും ക്ഷേത്രഫലവും കാണുക.

(a) വ്യാസം 7 സെ. മീ., കോൺ 72° .

(b) വ്യാസാർദ്ധം 9 അംഗുലം, കോൺ 35° .

(c) ,, 4 അടി, ,, 245° .

2. ഒരു വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ വ്യാസം 12.6 സെ. മീ. ഉം ചാപം 11 സെ. മീ. ഉം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? ക്ഷേത്ര ഫലവും കാണുക.

3. ഒരു വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ കോൺ 60° യും, ചാപം 10 അംഗുലവും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാസമെത്രയാണ്?

4. ഒരേ ധ്രുവക (Meridian) ത്തിലുള്ള രണ്ടു പട്ടണങ്ങളുടെ അക്ഷാംശ (Latitude) ങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം 21° ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം നാഴികവരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുക. (ഭൂമി 8000 നാഴിക വ്യാസമുള്ള ഒരു ഗോളമാണെന്നു കരുതുക).

5. 6 സെ. മീ. വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരച്ചു അതിനെ 3 സമാംശങ്ങളായി ഭാഗിക്കുക.

6. ഒരു സമ്മിശ്രലോഹത്തിൽ ചെമ്പ്, നിക്കൽ, തുത്തനാകം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ 55:24:21 എന്ന സംബന്ധത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വൃത്തകോണാംശങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രഫലങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുടെ തൂക്കങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകുറയ്ക്കുക വണ്ണം $2''$ വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തെ മൂന്നു അംശങ്ങളായി ഭാഗിക്കുക. ഓരോ കോണാംശത്തിന്റേയും കോണിന്റെ വലിപ്പം ഡിഗ്രിവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1936)

7. ഒരു വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ വ്യാസം 3 സെ. മീ. ഉം അതിന്റെ ചുറ്റളവ് 10 സെ. മീ. ഉം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലമെത്ര?

8. ഒരു വൃത്തകോണാംശത്തിന്റെ കോൺ 63° യും ക്ഷേത്രഫലം 55 ച. അംഗുലവുമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവു കാണുക.

9. 40 അടി നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരവയലിന്റെ ചുറ്റും വേലിയുണ്ണ്. വയലിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നാട്ടിയ ഒരു കുറിയോടു 21 അടി നീളമുള്ള ഒരു കയറുകൊണ്ടു വേലിക്കു പുറമെ കെട്ടിയ ഒരു പശുവിന്നു മേയ്ക്കുന്ന നിലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. വേലിക്കു 14 അടി നീളം മാത്രമേയുള്ളുവെങ്കിൽ അതിന്നു മേയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പടം വരച്ചു കാണിക്കുക. നിലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

10. ഒരു മൈതാനത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടിന്റെ തറ 28 അടി നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരമാണ്. വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിലുള്ള ഒരു കുറിയോടു 35 അടി നീളമുള്ള ഒരു കയറുകൊണ്ടു കെട്ടിയ ഒരു പശുവിന്നു മേയ്ക്കുന്ന നിലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. (1919)

11. 7 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു ജ്യാവിനെതിരായി കേന്ദ്രത്തിലുള്ള കോൺ (a) 60° (b) 90° (c) 120° ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുടേയും ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. രണ്ടാകൂട്ടി വൃത്തത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കിട്ടുന്നുവോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. (ഉത്തരം 1 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി കാണുക.)

12. ഒരു ലവണത്തിൽ Sodium, Nitrogen, Oxygen എന്നിവയുടെ തൂക്കത്തിന്റെ അനുപാതം $23:14:48$ ആണെങ്കിൽ വൃത്തകോണാംശങ്ങൾ കൊണ്ടു ലവണത്തിന്റെ യോഗം സൂചിപ്പിക്കുക. കോണുകളുടെ വലിപ്പം ഡിഗ്രിയുടെ ദശാംശംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

13. ഏല്പാ, യൂറോപ്പ്യ, ആഫ്രിക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, വടക്കു അമേരിക്ക, തെക്കു അമേരിക്ക എന്നീ വൻകരകളുടെ വിസ്തീർണ്ണം 17.0 , 3.8 , 11.4 , 3.0 , 8.0 , 6.8 , മില്യൻ ചതുരശ്ര നാഴിക ആകുന്നു. 3 അംഗുലം വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരച്ചു വൻകരകളുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം കോണാംശങ്ങൾകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുക. ഓരോ കോണാംശത്തിലും കോണിന്റെ വലിപ്പവും (ഡിഗ്രിവരെ കൃത്യമായി) അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വൻകരയുടെ പേരും വൃത്തിയായി ചേർക്കുക. (1922)

അദ്ധ്യായം 8.


വൃത്തങ്ങളുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ

(Some Properties of Circles).

O കേന്ദ്രമായി 5 സെ.മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക. അതിൽ 8 സെ.മീ. നീളത്തിൽ AB എന്നൊരു ജ്യാവ് വരയ്ക്കുക. AB യുടെ മദ്ധ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന്നു M എന്നു പേർ കൊടുക്കുക.

വേറെ വൃത്തങ്ങളും ജ്യാവുകളും വരച്ചു ഇതേ പരീക്ഷണം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്തു അനുമാനിക്കുന്നു?

അനുമാനം— (1) ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തേയും ഒരു ജ്യാവിന്റെ മദ്ധ്യബിന്ദുവിനേയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സരളരേഖ ആ ജ്യാവിന്നു ലംബമാണ്.



വൃത്തങ്ങളും ജ്യാവുകളും വരച്ചു താഴെ പറയുന്ന സംഗതികൾ അനുമാനിക്കാമോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

(2) ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ഒരു ജ്യാവിലേക്കുള്ള ലംബരേഖ ആ ജ്യാവിനെ രണ്ടു സമാംശങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു.

(3) ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ജ്യാവുകളുടെ ദ്വിഭാജകലംബങ്ങൾ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്നു.

(4) ഒരേ നീളമുള്ള ജ്യാവുകൾ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സമദൂരത്താണ്.

(5) ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ഒരേ ദൂരത്തിലുള്ള ജ്യാവുകളുടെ നീളം സമാനമാണ്.

(6) രണ്ടു ജ്യാവുകൾ സമമല്ലെങ്കിൽ വലിയതു ചെറിയതിനെക്കാൾ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിനോടു അധികം അടുത്തിരിക്കും.

അഭ്യാസം 16.

1. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം 8 സെ.മീ. ആണ്. അതിലുള്ള രണ്ടു ജ്യാവുകളുടെ നീളം 6.4 ഉം 4 ഉം സെ.മീ. ആണെങ്കിൽ അവയിൽനിന്നു കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഗണിക്കുക. വൃത്തം വരച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

2. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം 2" ആകുന്നു. അതിൽ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു 1 ഉം 1.5 ഉം അംഗുലം അകലെയാണിരുന്ന രണ്ടു ജ്യാവുകൾ വരച്ചു അവയുടെ നീളം അളക്കുക. നീളം ഗണിച്ചു അളന്നുകിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

3. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു 3 സെ.മീ. അകലെയുള്ള ഒരു ജ്യാവിന്റെ നീളം 7 സെ.മീ. ആകുന്നു. എന്നാൽ വൃത്തം വരക്കുക. വ്യാസാർദ്ധം ഗണിച്ചു നിങ്ങൾ വരച്ച വൃത്തം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

4. ഒരു ചാപരേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാപരേഖ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള മുഴു വൃത്തം നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ വരക്കും?


5. ഒരു വൃത്തം വരക്കുക. അതിൽ P എന്നൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക.

(a) P മദ്ധ്യബിന്ദുവായിട്ടുള്ള ജ്യാവു വരക്കുക.

(b) P യിൽക്കൂടി വരക്കാവുന്ന ജ്യാവുകളിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞതു ഏതാണ്?

6. ഒരു വൃത്തം വരച്ചു അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു സമദൂരത്തായി രണ്ടു ജ്യാവുകൾ വരക്കുക. അവയുടെ നീളം താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. ഇവയിലും അധികം ദൂരത്തായി വേറൊരു ജ്യാവു വരക്കുക. അതിന്റെ നീളവും ആദ്യം വരച്ച ജ്യാവുകളുടെ നീളവും താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.

കാരോന്നം മറേതിനെ 2 സമഭാഗങ്ങളാക്കത്തക്കവണ്ണം AB, CD എന്ന 2




സമസരളരേഖകളെ വരക്കുക. അവയുടെ അറ്റങ്ങളെ ക്രമത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായാൽ ഒരു സമകോണചതുരം കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട്?

O കേന്ദ്രവും OA വ്യാസാർദ്ധവും ആയി ഒരു വൃത്തം വരക്കുന്നതായാൽ അതു B, C, D എന്ന ബിന്ദുക്കളിൽക്കൂടികടന്നുപോകുന്നതായി കാണാം. AB ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു വ്യാസമായതുകൊണ്ടു ADB ഒരു അർദ്ധവൃത്തമാണ്. ADB എന്ന കോൺ ഒരു സമകോ

ണമെന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. പടത്തിലുള്ള വേറെയും 3 അല്പവൃത്തങ്ങളേയും അവയിൽ അടങ്ങിയ കോണുകളേയും കണ്ടുപിടിക്കുക.

AB വ്യാസമായ ഒരു അല്പവൃത്തം വരയ്ക്കുക.

അതിന്റെ പരിധിയിന്മേൽ P എന്നൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക. AP, BP ചേർക്കുക. എന്നാൽ APB എന്ന കോണിനെ അല്പ വൃത്തത്തിലുള്ള കോൺ (angle in a semicircle) എന്നു പറയുന്നു.



ഇതിനെ അളക്കുക.


പടത്തിൽ കാണുന്നപ്രകാരമുള്ള അല്പവൃത്തത്തിലെ വേറെയും കോണുകളെ അളക്കുക. കോണുകളുടെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? അവ സമകോണ (90°) കളാണെന്നു കാണാം.

വിവിധ വ്യാസാല്പങ്ങളുള്ള കുറെ അല്പവൃത്തങ്ങൾ വരച്ചു അവയിലേയും കോണുകളെ അളക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തു അനുമാനിക്കുന്നു?

ഒരു അല്പവൃത്തത്തിലെ കോൺ ഒരു സമകോണാകുന്നു.

സ്पर्ശരേഖകൾ (Tangents).

P യിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു സമരേഖ P എന്ന ബിന്ദുവിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു തിരിയുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ആ




സമരേഖ Q എന്ന സ്ഥാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ വൃത്തത്തെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളിൽ ഛേദിക്കുന്നു. ഇതേപ്രകാരം PR എന്ന സ്ഥാനത്തിലെത്തുമ്പോഴും അതു വൃത്തത്തെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളിൽ ഛേദിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചുറ്റി PU എന്ന സ്ഥാന

ത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതു വൃത്തത്തിന്നു പുറത്താകുന്നു.

PR എന്ന സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു PU എന്ന

സ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നതിലിടക്കു ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സരളരേഖ വൃത്തത്തെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളിൽ ഛേദിക്കാതെ വൃത്തവുമായി സന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്. ഇതു പടത്തിൽ PTS എന്ന സ്ഥാനമാണു്. സരളരേഖ ആ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്നും വൃത്തത്തിന്നും പൊതുവിൽ T എന്നൊരു ബിന്ദുവുണ്ടു്. ഇങ്ങിനെ ഒരു സരളരേഖ അതിനെ എത്രതന്നെ നീട്ടിയാലും ഒരു വൃത്തത്തെ ഛേദിക്കാതെ ഒരു ബിന്ദുവിൽമാത്രം അതിനോടു സന്ധിക്കുമ്പോൾ ആ സരളരേഖയെ വൃത്തത്തിന്റെ **സ്पर्ശരേഖ (Tangent)** യെന്നും സരളരേഖ വൃത്തത്തെ **സ്पर्ശിക്കുന്നു (Touch)** യെന്നും പറയുന്നു. സരളരേഖക്കും വൃത്തത്തിന്നും പൊതുവിലുള്ള ബിന്ദുവിനെ, അതായതു് ഒരു സരളരേഖ ഒരു വൃത്തത്തെ ഏതു ബിന്ദുവിൽ സ്पर्ശിക്കുന്നുവോ ആ ബിന്ദുവിനെ **സ്पर्ശബിന്ദു (Point of Contact)** യെന്നും പറയുന്നു.

പടത്തിൽ PS എന്ന സരളരേഖ വൃത്തത്തെ T എന്ന ബിന്ദുവിൽ സ്पर्ശിക്കുന്നു. PS വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു സ്पर्ശരേഖയും T അവയുടെ സ്पर्ശബിന്ദുവുമാണു്. വൃത്തത്തെ ഛേദിക്കുന്ന PQ , PR എന്ന സരളരേഖകളെ വൃത്തത്തിന്റെ **ഛേദരേഖകൾ (Secants)** എന്നു പറയുന്നു.



OT ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു വ്യാസാൽമാണു്. T യിൽക്കൂടി OT ക്കു ലംബമല്ലാത്ത ഒരു സരളരേഖ വരക്കുക. അതു വൃത്തത്തെ വേ

റൊരു ബിന്ദുവിലും കൂടി ഛേദിക്കുന്നതായി കാണാം. T യിൽക്കൂടി OT ക്കു ലംബമായി ഒരു സരളരേഖ വരക്കുക.


അതു വൃത്തത്തെ മേദിക്കുന്നില്ലെന്നും T യിൽ അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നുവെന്നും കാണാം.

അതായതു ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ളൊരു ബിന്ദുവിൽകൂടി വ്യാസാർദ്ധത്തിന്നു ലംബമായി വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു സരളരേഖ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു സ്പർശരേഖയായിരിക്കും.


ഇതിൽനിന്നു ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ളൊരു ബിന്ദുവിൽകൂടി ഒരു സ്പർശരേഖ വരക്കുന്ന മാർഗ്ഗം അനുമാനിക്കാം.

O കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള P എന്നൊരു ബിന്ദുവിൽകൂടി ഒരു സ്പർശരേഖ വരക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുക.

OP എന്ന വ്യാസാർദ്ധം വരക്കുക. OP ക്ക് ലംബമായി APB എന്ന സരളരേഖ വരക്കുക. എന്നാൽ APB വൃത്തത്തിന്റെ P എന്ന ബിന്ദുവിലെ സ്പർശരേഖയാണ്.



സ്പർശരേഖകളുടെ മേൽപ്രസ്താവിച്ച ലക്ഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വൃത്തത്തിന്നു പുറമെയുള്ളൊരു ബിന്ദുവിൽനിന്നു വൃത്തത്തിന്നു ഒരു സ്പർശരേഖ വരക്കാം.



O വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും P അതിന്നു പുറമെയുള്ളൊരു ബിന്ദുവുമാണെന്നു വിചാരിക്കുക.

OP എന്ന സരളരേഖ വ്യാസമായി വൃത്തത്തെ T യിൽ മേദി

ദിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുക. OT, PT എന്ന

സരളരേഖകൾ വരക്കുക. എന്നാൽ PT വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു സ്पर्ശരേഖയായിരിക്കും.

$LOTP =$ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ $= 1$ സമകോൺ. OT ഒരു വ്യാസാർദ്ധമായതുകൊണ്ട് അതിന്നു ലംബമായ TP ഒരു സ്पर्ശരേഖയായിരിക്കണം.

OP വ്യാസമായ വൃത്തം O കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തെ വീണ്ടും U എന്ന ബിന്ദുവിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് UP യും ഒരു സ്पर्ശരേഖയാണ്. ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്നു ഒരു വൃത്തത്തിലേക്കു രണ്ടു സ്पर्ശരേഖകൾ വരുകയാണെന്നു ഇതിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. അവ സമമാണെന്നും അവയ്ക്കും OP യ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കോണുകൾ സമമാണെന്നും കാണാം. OTP ഒരു സമകോണായതുകൊണ്ട് സ്पर्ശരേഖയുടെ നീളം ഗണിക്കാം.

$$PT^2 = OP^2 - OT^2$$

വ്യാസാർദ്ധം $= 2.5$ സെ.മീ. ഉം P എന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു 6.5 സെ.മീ. അകലെയാണെന്നും വിചാരിക്കുക.

എന്നാൽ $PT^2 = (6.5^2 - 2.5^2)$ ച. സെ.മീ. $= 36$ ച. സെ.മീ.

$\therefore PT = 6$ സെ.മീ.

പടം വരച്ചു സ്पर्ശരേഖ അളക്കുക.

അദ്ധ്യായം 17.

1. $3''$ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൽ രണ്ടു വ്യാസങ്ങൾ വരക്കുക. വ്യാസങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു വൃത്തത്തിന്നു സ്पर्ശരേഖകൾ വരക്കുക. സ്पर्ശരേഖകളാൽ നിർമ്മിതമായ ക്ഷേത്രം ഏതു തരമാണ്? രണ്ടു വ്യാസങ്ങളും പരസ്പരം ലംബങ്ങളാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം ഏതുതരമായിരിക്കും?

2. $1''$ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയെ 3 സമംശങ്ങളായി ഭാഗിക്കത്തക്കവണ്ണം പരിധിയിന്മേൽ 3 ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഈ ബിന്ദുക്കളിൽനിന്നു വൃത്തത്തിന്നു സ്पर्ശരേഖകൾ വരക്കുക. അവയാൽ നിർമ്മിതമായ ക്ഷേത്രം ഏതുതരമാണ്?

3. ഒരു വൃത്തത്തിൽ OA, OB എന്ന രണ്ടു വ്യാസാർദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ 100° യാണ്. എന്നാൽ A, B എന്ന ബിന്ദുക്കളിൽനിന്നു വരച്ച സ്पर्ശരേഖകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയായിരിക്കും? (1935)

4. $3''$ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക. അന്യോന്യം 90° ചരിഞ്ഞു രണ്ടു സ്പർശരേഖകൾ വരയ്ക്കുക. സ്പർശരേഖകൾക്കും വൃത്തത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം ച. അംഗുലത്തിന്റെ 2 ഭാഗംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

5. 5 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു 13 സെ. മീ. അകലെയുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്നു വൃത്തത്തിലേക്കു രണ്ടു സ്പർശരേഖകൾ വരയ്ക്കുക. അവയുടെ നീളം അളക്കുക. നീളം ഗണിക്കുക.

6. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം r സെ. മീ. ആണ്. വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു d സെ. മീ. അകലെയുള്ളൊരു ബിന്ദുവിൽനിന്നു വൃത്തത്തിലേക്കു ഒരു സ്പർശരേഖ വരയ്ക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും?

$r=3$; $d=8$; $r=4$; $d=7$. എന്നാൽ നീളം കാണുക. സ്പർശരേഖ വരച്ച ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

7. $2''$ വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിലേക്കു ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്നുള്ള സ്പർശരേഖയുടെ നീളം $2.1''$ ആണെങ്കിൽ ആ ബിന്ദു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു എത്ര അകലെയാണ്? സ്പർശരേഖ വരച്ച ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

8. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു 9 സെ. മീ. അകലെയുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്നു വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള സ്പർശരേഖയുടെ നീളം 6 സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം കാണുക. വൃത്തം വരയ്ക്കുക.

9. $1.5''$ വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക. അതിന്നു (a) ഒരു സമചതുരം (b) ഒരു സമഭജിതുകോണം പരിലേഖനം ചെയ്യുക. (circumscribe)

10. 3.5 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്നു ഒരു സമങ്കുടികോണ ക്ഷേത്രം പരിലേഖനം ചെയ്യുക.

11. $2''$ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്നു ഒരു സമഅക്ഷകോണക്ഷേത്രം പരിലേഖനം ചെയ്യുക.

12. 3.5 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്നു അന്യോന്യം 60° ചരിഞ്ഞ രണ്ടു സ്പർശരേഖകൾ വരയ്ക്കുക. സ്പർശരേഖകൾക്കും വൃത്തത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം ച. സെ. മീ.ന്റെ 2 ഭാഗംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.

13. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 7 ഉം 8 ഉം 9 ഉം സെ. മീ. ആണ്. അതിൽ ഒരു വൃത്തം അന്തർലേഖനം ചെയ്യുക. (Inscribe) അതിന്റെ വ്യാസാർദ്ധം അളക്കുക.

14. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ളൊരു പറമ്പിന്റെ അതിരുകളുടെ നീളം 92 ഉം, 46 ഉം, 68 ഉം അടിയാണ്. ആ പറമ്പിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്താകാരമായ കിണറിന്റെ വ്യാസം കാണുക.

അദ്ധ്യായം 9.

ത്രികോണനിർമ്മാണം

(Construction of Triangles).


a. സമകോണത്രികോണം (Right angled Triangle).

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോൺ ഒരു സമകോൺ ആണെന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന്നു പുറമെ ഏതെങ്കിലും 2 അംഗങ്ങൾ (elements) ∞ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം. ഇവയിൽ ഒന്നു ഒരു ഭുജമായിരിക്കണം. അതിനാൽ ഒരു സമകോണത്രികോണം നിർമ്മിക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന നിദ്ദിഷ്ടങ്ങൾ മതിയാകും.

1. സമകോണിന്റെ ഭുജങ്ങൾ.
2. സമകോണിന്റെ ഒരു ഭുജവും ഒരു കോണം.
3. വിപുലരേഖയും ഒരു കോണം (സ്പ്രിംഗ് കോൺ).
4. വിപുലരേഖയും ഒരു ഭുജവും.

1ഉം 2ഉം 3ഉം സാധാരണ ത്രികോണങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടവയായതുകൊണ്ട് 4-ാമത്തേതു മാത്രം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

ഉദാ. 1. $\triangle ABC$ ത്തിൽ $\angle A = 90^\circ$, $AB = 2.4''$, $BC = 3''$. ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചു AC അളക്കുക.



നിർമ്മാണം. A ഒരു സമകോണായതുകൊണ്ടു $AC \perp AB$. അതിനാൽ $2.4''$ നീളത്തിൽ AB വരച്ചു അതിന്നു ലംബമായി ഒരു സരളരേഖ വരയ്ക്കുക. ഈ സരളരേഖയ്ക്ക് C യിൽ ഹേലിക്കത്തക്കവണ്ണം B കേന്ദ്രവും $3''$ വ്യാസം ഉൾപ്പടെ ഒരു ചാപരേഖ വരയ്ക്കുക. എന്നാൽ ABC ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും. AC അളക്കുക. പൈത്തഗോറസിന്റെ പ്രമേയം ഉപയോഗിച്ചു AC യുടെ നീളം ഗണിക്കുക.

സ്പ്രിംഗിന്റെ പ്രമേയം ഉപയോഗിച്ചു AC യുടെ നീളം ഗണിക്കുക.

$$AC^2 = BC^2 - AB^2 = (3^2 - 2 \cdot 4^2) \text{ ച. അം. } = (9 - 5 \cdot 76) \text{ ച. അം. } \\ = 3 \cdot 24 \text{ ച. അം.}$$

$$\therefore AC = \sqrt{3 \cdot 24 \text{ അം.}} = 1 \cdot 8 \text{ അം.}$$


നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വരക്കുന്നതായാൽ $AC = 1 \cdot 8''$ എന്ന് കാണാം.

b. 2 ഭുജങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിലല്ലാത്ത ഒരു കോണം തന്നാൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ത്രികോണത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കാം.


ഉദാഹരണമായി $AB = 8$ സെ. മീ. $A = 30^\circ$. $\triangle ABC$ നിർമ്മിക്കണം. BC യുടെ നീളം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓരോന്നും ആകുമ്പോൾ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക.

B യിൽനിന്നു അതിരെന്നതിരായ ഭുജത്തിലേക്കുള്ള ലംബരേഖയുടെ നീളം 4 സെ. മീ. ആണ്.

1. അതിനാൽ BC യുടെ നീളം 4 സെ. മീ. ന്ന കവാകമ്പോൾ $\triangle ABC$ നിർമ്മിക്കാവുന്നതല്ല.




2. $BC = 4$ സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ B കേന്ദ്രവും 4 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധ്യമായി വരക്കുന്ന ചാപരേഖ B കൈതിരായ ഭുജത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ മാത്രം കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിശ്ചിത അളവുകളുള്ള $\triangle ABC$ നിർമ്മിക്കാം. ഇതു ഒരു സമകോണത്രികോണമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്?



3. $BC = 4$ സെ. മീ. നേക്കാൾ വലിയതും AB യേക്കാൾ ചെറിയതും ആണെന്നു വിചാരിക്കുക. ഉദാഹരണമായി

$BC = 5$ സെ. മീ. എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ B കേന്ദ്രവും വ്യാസാർദ്ധം 5 സെ. മീ. ഉം ആയി വരക്കുന്ന ചാപരേഖ B കൈതിരായ ഭുജത്തെ 2 വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ബിന്ദുക്കളിൽ ഛേദിക്കുന്നുവെന്നും നിശ്ചിത അളവുകളുള്ള ABC എന്ന 2 ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാമെന്നും കാണാം. ഇതിനെ സന്ദിഗ്ധസംഗതി (Ambiguous Case) എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടു





ത്രികോണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അധികകോണത്രികോണവും മറേറതു ന്യൂനകോണ

ത്രികോണവും ആയിരിക്കും. അധികകോൺ അതിന്റെ സമശകോണിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കും.

4. BC , AB ക്ക് സമമാകമ്പോൾ ABC എന്ന ഒരു ത്രികോണം മാത്രം നിർമ്മിക്കാമെന്നും അതു ഒരു ദ്വിഭുജമുള്ള ത്രികോണമാണെന്നും കാണാം.

5. BC , AB യേക്കാൾ വലിയതാകമ്പോൾ നിശ്ചിത അളവുകളുള്ള ABC എന്ന ഒരു ത്രികോണം മാത്രം നിർമ്മിക്കാമെന്നു കാണാം.



അദ്ധ്യായം 18.

A ഒരു സമകോണം താഴെ പറയുന്ന അളവുകൾ ഉള്ളതും ആയ ABC എന്ന ത്രികോണങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക.

1. $AB = 3.1''$. $AC = 2.7''$. വിപുല രേഖയുടെ നീളം അളക്കുക. നീളം (അംഗുലത്തിന്റെ ദശാംശാവരെ കൃത്യമായി) ഗണിച്ചു അളന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

2. $AB = 7.5$ സെ.മീ. $B = 37^\circ$. ശേഷമുള്ള ഭുജങ്ങളെ അളക്കുക.

3. $AC = 6.2$ സെ.മീ. $B = 62^\circ$. ശേഷമുള്ള ഭുജങ്ങളെ അളക്കുക.

4. $AB = 2.8''$. $BC = 3.2''$. ശേഷമുള്ള അംഗങ്ങളെ അളക്കുക.

AC യുടെ നീളം (അംഗുലത്തിന്റെ ഭഗംശംവരെ കൃത്യമായി) ഗണിച്ചു അളന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

5. $a = 2.5''$. $b = 2.2''$. c യുടെ നീളം (അംഗുലത്തിന്റെ ഭഗംശംവരെ കൃത്യമായി) ഗണിക്കുക. അളന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരവുമായി ഒത്തു നോക്കുക.

6. $b = 4.8$ സെ. മീ. $C = 36^\circ$. ശേഷമുള്ള ഭുജങ്ങളെ അളക്കുക.

7. $b = 2.3''$. $B = 47^\circ$. ശേഷമുള്ള ഭുജങ്ങളെ അളക്കുക.

8. $b = 6.3$ സെ. മീ. $c = 7.5$ സെ. മീ. a യുടെ നീളം അളന്നും ഗണിച്ചും കാണുക. ശേഷമുള്ള കോണുകളെ അളക്കുക.

9. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ 2 ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക 270° ആണെങ്കിൽ അതു ഒരു സമകോണത്രികോണമാണെന്നു തെളിയിക്കുക.

10. BC ആധാരമായി ABC എന്നൊരു സമഭുജത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക. $AD = BA$ ആകത്തക്കവണ്ണം BA യെ D യിലേക്കു നീട്ടുക. DC ചേർക്കുക. BCD എന്ന കോണിന്റെ വലിപ്പമെത്രയാണ്? കാരണം പറയുക. ഈ നിർമ്മാണം ഉപയോഗിച്ച് AB എന്നൊരു സരളരേഖയെ B യിൽ കൂടി ഒരു ലംബരേഖ വരയ്ക്കുക.

11. തടിച്ച കടലാസ്സിൽ ഒരു ദ്വിസമഭുജത്രികോണം വരയ്ക്കുക. അതിനെ മുറിച്ചു അതിന്നു തുല്യമായ ഒരു സമകോണചതുരം ഉണ്ടാക്കുക.

12. A ഒരു സമകോണായ ABC എന്നൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ വിപുലരേഖയുടെ മദ്ധ്യബിന്ദുവിനെ സമകോണിന്റെ ശീർഷത്തോടു ചേർക്കുക. ഈ സരളരേഖ വിപുലരേഖയുടെ ഏതൊരംശമാണ്? നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം ഒരു വാക്യത്തിലെഴുതുക.

13. ഒരു ദ്വിസമഭുജ സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ സമഭുജങ്ങളുടെ നീളം $= 2.2''$. വിപുലരേഖയുടെ നീളം കഴിയുന്നത്ര കൃത്യമായി അളക്കുക. ഗണിച്ചു കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തോടു ഒത്തു നോക്കുക.

14. ഒരു ദ്വിസമഭുജ സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ വിപുലരേഖ $= 8$ സെ. മീ. ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക. ഭുജങ്ങളുടെ നീളം അളക്കുക. ഗണിച്ചു കിട്ടിയ ഉത്തരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക.

15. നിങ്ങളുടെ ഒരു ചതുരമട്ടം ഒരു ദ്വിസമഭുജ സമകോണത്രികോണമാകുന്നു. അതിന്റെ ഭുജങ്ങൾ അളക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ച സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് അളന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

16. നിങ്ങളുടെ ഒരു ചതുരമട്ടത്തിന്റെ കോണുകൾ 90° , 60° , 30° ആകുന്നു. 15-ാം ചോദ്യത്തിൽ ചെയ്ത പരീക്ഷണം ഈ ചതുരമട്ടത്തേയും സംബന്ധിച്ചു ചെയ്യുക.

17. ഒരു സമകോണ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോൺ = 30° . വിപുല രേഖ = 7 സെ. മീ. മറ്റു ഭുജങ്ങളുടെ നീളം അളക്കുക. ഗണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. ഇതേ കോണുകളുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിൽ 60° വലിപ്പമുള്ള കോണിനെതിരായ ഭുജത്തിന്റെ നീളം 4 സെ. മീ. ആണ്. ത്രികോണം നിർമ്മിച്ച ശേഷമുള്ള ഭുജങ്ങളെ അളക്കുക. അവയുടെ നീളം ഗണിക്കുക. ഉത്തരങ്ങൾ 1 മീ. മീ. വരെ കൃത്യമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

18. ABC , DEF എന്ന 2 സമകോണ ത്രികോണങ്ങൾ സപ്പാംഗതൂല്യമായിരിക്കേണമെങ്കിൽ അവയുടെ ഏതെല്ലാം അംഗങ്ങൾ തൂല്യമായിരിക്കേണം? ഉത്തരം വ്യക്തമായി എഴുതുക.

2 സമകോണ ത്രികോണങ്ങൾ സപ്പാംഗതൂല്യമായിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഉപാധികൾ ഇതിൽനിന്നു അനുമാനിച്ചെഴുതുക.

19. $A = 35^\circ$. $AB = 4$ സെ. മീ. BC യുടെ നീളം

a) 3 സെ. മീ. b) 4 സെ. മീ. c) 5 സെ. മീ.

d) 2.3 സെ. മീ. e) 2 സെ. മീ. ആകുമ്പോൾ ABC എന്ന ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക. BC ക്ക് വിവിധ നീളങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവ ഏതുതരം ത്രികോണങ്ങളാണെന്നും എഴുതുക. എപ്പോഴാണ് സന്ദിഗ്ദ്ധസംഗതി ഉണ്ടാവുന്നത്?

20. താഴെ കാണുന്ന അളവുകളുള്ള ABC എന്ന ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക.

a) $B = 120^\circ$. $AB = 2''$. $AC = 2.5''$.

b) $C = 70^\circ$. $AC = 5$ സെ. മീ. $AB = 4.9$ സെ. മീ.


2 ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമോ? നിർമ്മിക്കാമെങ്കിൽ അവ ഏതു തരമാണ്? അവയുടെ കേന്ദ്രകൾ തമ്മിൽ വല്ല സംബന്ധവും കാണുന്നുണ്ടോ?

അദ്ധ്യായം 10.

a. തോതനുസരിച്ചു വരക്കൽ (Drawing to scale).

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തോതടിനീതങ്ങളപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. (ഒന്നാം പുസ്തകം 28 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക.) രാജ്യങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ തോതനുസരിച്ചു വരക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ത്രികോണോല്പത്തിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ചില അളവുകൾ അറിഞ്ഞാൽ തോതനുസരിച്ചു പടം വരച്ച ശേഷമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അളവുകൾ കണ്ടു പിടിക്കാം.

ഉദ്ധാരണമായി ഒരു മുക്കോൺതൂരത്തി (delta)ന്റെ രണ്ടു ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 1000ഉം 1200ഉം വാരയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോൺ 60° യും ആണെങ്കിൽ തൂരത്തിന്റെ ഒരു പടം സൗകര്യമുള്ള ഒരു തോതിൽ വരക്കാം. ഈ പടത്തിൽനിന്നു തൂരത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ ഭുജത്തിന്റെ നീളവും അതു മറ്റു 2 ഭുജങ്ങളോടു എത്ര ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. 1സെ. മീ. = 200വാ. എന്നതു സൗകര്യമുള്ള ഒരു തോതായിരിക്കും. $AB = 5$ സെ മീ., $AC = 6$ സെ. മീ., $A = 60^\circ$ ആയ ABC എന്നൊരു ത്രികോണം തൂരത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ (plan) ആയിരിക്കും. BC യെ അളക്കുക. സുമാർ 5.6 സെ. മീ. ആണെന്നു കാണാം.



$$\therefore \text{മൂന്നാമത്തെ ഭുജത്തിന്റെ സുമാർ നീളം} = 5.6 \times 200 \text{വാ.} \\ = 1120 \text{വാ.}$$

ഇത്ര പ്രകാരം B, C എന്ന കോണുകളെ അളക്കുന്നതിനാൽ മൂന്നാമത്തെ ഭുജം മറ്റു രണ്ടു ഭുജങ്ങളോടു എത്ര ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും കാണാം.

പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു ചോദ്യത്തിൽ നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവുകൾ ആസ്പദമാക്കി ഒരു കരടുപടം വരക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

അ ഭൂ ധ ണ ൧ 9.

1. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വയലിന്റെ 2 ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 1320ഉം 1280ഉം അടിയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോൺ 39° യും ആകുന്നു. വയലിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ വരക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഭുജത്തിന്റെ നീളവും അതു മറ്റു 2 ഭുജങ്ങളോടു എത്ര ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും കാണുക.

2. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാഡ്ബോഡ് കക്ഷണത്തിന്റെ വക്കുകളുടെ നീളം $1' 6''$, $2' 6''$, $2'$ ആകുന്നു. ഏറ്റവും നീളമുള്ള വക്കിലേക്കു എതിർ മൂലയിൽനിന്നുള്ള ദൂരം കാണുക.

3. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭുജത്തിന്റെ നീളം 75 വാരയാണ്. ഈ ഭുജം മറ്റു 2 ഭുജങ്ങളോടു 47° ഉം 68° ഉം ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ഭുജത്തിന്റെ നീളവും അതിൽനിന്നു അതിനെതിരായ ശീർഷത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും കാണുക.

4. 2 നേർ നിരത്തുകൾ പരസ്പരം A യിൽ ലംബമായി ചേരുക. ഈ നിരത്തുകളിന്മേലുള്ള B, C എന്ന രണ്ടു കമ്പിത്തൂണുകളുടെ അടികൾ തമ്മി

ലുള്ള ദൂരം 460 വാരയും A യിൽനിന്നു B യിലേക്കുള്ള ദൂരം 260 വാരയും ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു AC യുടെ നീളം കാണുക. ഗണിച്ചു ഈ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

5. P, Q, R മൂന്നു വീടുകളാകുന്നു. P യിൽനിന്നു Q യിലേക്കും R ലേക്കുള്ള ദൂരം യഥാക്രമം 750 ഉം 1100 ഉം വാരയും Q യിൽനിന്നു R ലേക്കുള്ള ദൂരം 1350 വാരയും ആണെങ്കിൽ P യിൽനിന്നു QR എന്ന പാതയിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണുക.

6. ഒരു ഗ്രാമം ഒരു ലിസമളജ സമകോണ ത്രികോണമാകുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭൂജത്തിന്റെ നീളം 1320 അടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു മറ്റു ഭൂജങ്ങളുടെ നീളം കാണുക. ഗണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

7. ABC എന്നൊരു ത്രികോണ വയലിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ വരക്കുവാൻ ഒരു സർവ്വേക്കാരൻ (Surveyor) താഴെ പറയുന്ന അളവുകൾ എടുത്തു.

$AB = 500$ കണ്ണി. $B = 55^\circ$. $AC = 460$ കണ്ണി. ഈ അളവുകൾ മതിയോ? മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കാരണമെഴുതുക.


b. ദിശകൾ (Directions).

ഒരു സമുദ്രദിശിക (Mariner's compass) യുടെ മുഖത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.

വടക്കു, കിഴക്കു, തെക്കു, പടിഞ്ഞാറു ഇവ നാലും മുഖ്യ ദിശകൾ (Cardinal Directions) ആണ്. ഇവക്കിടയിലുള്ള കോണുകൾ കാരോന്നും ഒരു സമകോണാകുന്നു. വടക്കിന്നും കിഴക്കിന്നും മദ്ധ്യേയുള്ള, അതായതു വടക്കിൽനിന്നും കിഴക്കിൽനിന്നും 45° ചരിഞ്ഞുള്ള ദിശക്കു വടക്കുകിഴക്കു എന്നു പേർ പറയുന്നു. ഇതേപ്രകാരം നാലു മുഖ്യ ദിശകൾക്കു മദ്ധ്യേയുള്ള ദിശകളെ തെക്കുകിഴക്കു, തെക്കുപടിഞ്ഞാറു, വടക്കുപടിഞ്ഞാറു എന്നു പറയുന്നു.

വടക്കിന്നും വടക്കുകിഴക്കിന്നും മദ്ധ്യേയുള്ള, അതായതു ഈ രണ്ടു ദിശകളിൽനിന്നും $22\frac{1}{2}^\circ$ ചരിഞ്ഞുള്ള ദിശക്കു വടക്കു വടക്കുകിഴക്കു (വ. വ. കി.) എന്നു പേർ പറയുന്നു. കിഴക്കിന്നും വടക്കുകിഴക്കിന്നും മദ്ധ്യേയുള്ള ദിശക്കു കിഴക്കു വടക്കുകിഴക്കു (കി. വ. കി.) എന്നു പേർ പറയുന്നു. ചിത്രം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക.



ന്നതായാൽ ഓരോ ദിശയുടേയും പേർ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി എഴുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.



ഇവകൂടാതെയുള്ള ദിശകൾക്കു മുഖ്യദിശകളിൽനിന്നുള്ള ചരിവനുസരിച്ചു പേരിടുന്നു. ഉദാഹരണമായി പടിഞ്ഞാറിൽനിന്നു 30° തെക്കോട്ടു ചരിഞ്ഞു ദിശക്കു പടിഞ്ഞാറു 30° തെക്കു (പ. 30° തെ.) എന്നു പേർ പറയുന്നു. ചിത്രം നോക്കുക.

ഈ ദിശ തെക്കിൽനിന്നു 60° പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചരിഞ്ഞതായതുകൊണ്ടു ഇതിനെ തെക്കു 60° പടിഞ്ഞാറു (തെ. 60° പ.) എന്നു പറയാം.

O എന്നൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നു അതേ സ്ഥലത്തിലുള്ള P എന്നൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ദിശ്ശാസനം (Bearing) നിശ്ചയിക്കാം.



ഉദാഹരണമായി O ഇൽനിന്നു തെക്കു 35° കിഴക്കു (തെ. 35° കി.) ണ് P കിടക്കുന്നത്.

അഭ്യാസം 20.

[ഭൂരങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീളത്തിന്റെ 1 ലക്ഷാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക.]

1. താഴെ കാണുന്ന ഭിശകളെ വെച്ചേറെ പടങ്ങൾ വരച്ചു അവയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

വ. പ.: കി. തെ. കി.; തെ. തെ. കി.; വ. വ. പ.; പ. വ. പ.; കി. 40° വ.; വ. 40° കി.; തെ. 25° പ.; പ. 65° തെ.

2. പടം വരച്ചു താഴെ പറയുന്ന ഓരോ ജോടി ഭിശകൾക്കിടയിലുള്ള കോണിന്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുക.

(1) കി.; തെ. പ. (2) വ. പ.; വ. കി. (3) പ.; തെ. തെ. കി.

(4) തെ. കി.; പ. വ. പ. (5) തെ. തെ. പ.; വ. വ. കി. (6) പ. 20° വ.;

വ. 20° പ. (7) തെ. 81° പ.; കി. 15° തെ.

(8) വ. കി.; കി. 40° വ.

3. B എന്ന പട്ടണം A എന്ന പട്ടണത്തിന്നു വ. തെ. പ. ആണ്, എന്നാൽ B യിൽനിന്നു A യുടെ ലിഗ്സ്ഥാനം കാണുക.

4. ഒരു തോണി ഒരു ലീപസ്സുഭത്തിന്റെ വ. 20° കി. ആണ്. തോണിയിൽനിന്നു നോക്കുന്ന ഒരാൾ ലീപസ്സുഭത്തെ എത്ര ലിശയിലാണ് കാണുക?

5. ഒരാൾ വ. കിഴക്കായി 3 നാഴിക നടന്നശേഷം വ. പടിഞ്ഞാറായി 6 നാഴിക കൂടി നടന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നു എത്ര നാഴിക ദൂരത്താണ്?

6. രണ്ടാളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. ഒരാൾ മണിക്കൂറിൽ 4 നാഴികവീതം തെക്കോട്ടും മററയാൾ 3 നാഴികവീതം തെ. കിഴക്കോട്ടും നടക്കുന്നു. 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഒടുവിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരമെത്ര?

7. കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു നിരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീടു തെക്കുകിഴക്കായിക്കണ്ടു. നിരത്തിന്മേൽ കൂടി 450 വാര നടന്നപ്പോൾ ആ വീടു തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി കണ്ടു. എന്നാൽ നിരത്തിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണുക.

8. ഒരാൾ ഒരു ഗോപുരം കി. 10° വടക്കായി കണ്ടു. തെ. കിഴക്കായി 500 വാര നടന്നശേഷം ഗോപുരം വ. കിഴക്കായി കണ്ടു. എന്നാൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഗോപുരത്തിൽനിന്നു എത്ര ദൂരത്താണ്?

9. ഒരാൾ രണ്ടു കോട്ടകൾ നേരെ തെക്കായി കണ്ടു. പടിഞ്ഞാറോട്ടു 6 നാഴിക നടന്നശേഷം ഒരു കോട്ട കി. 50° തെക്കും, മററതു കി 55° തെക്കു

മായി കണ്ടു. എന്നാൽ ഓരോ അവസരത്തിലും അയാൾ കോട്ടകളിൽനിന്നു എത്ര ദൂരത്തായിരുന്നു?

10. A, B, C മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങളാണ്. A, B യിൽനിന്നു 7 നാഴിക വ. കിഴക്കും B, C യിൽനിന്നു $11\frac{1}{4}$ നാഴിക വ. പടിഞ്ഞാറും ആണെങ്കിൽ C യിൽ നിന്നു A യുടെ ദൂരവും ദിശ്ശാസ്ഥാനവും കാണുക.

11. ഒരു കപ്പൽ A എന്നൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ വ. 60° കിഴക്കായി B എന്നൊരു ഭീപസ്തംഭവും തെ. കിഴക്കായി C എന്ന വേരൊരു ഭീപസ്തംഭവും കണ്ടു. 10 നാഴിക കിഴക്കോട്ടു പോയ ശേഷം ഇവയെ യഥാക്രമം വ. 50° പടിഞ്ഞാറായും തെ. 60° പടിഞ്ഞാറായും കണ്ടു. എന്നാൽ ഭീപസ്തംഭങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കാണുക.



12. തെ. വടക്കായി കഴുകുന്ന ഒരു പുഴയുടെ ഒരു കരയിൽ 5000 അടി അകലെയായി രണ്ടു വീടുകളുണ്ട്. മറുകരയിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷം ഈ വീടുകളിൽ നിന്നു പ. 57° വടക്കും, പ. 43° തെക്കും ആണെങ്കിൽ പുഴയുടെ വീതി കാണുക. (പുഴയുടെ കരകൾ സമാന്തരരേഖകളാണെന്നു കരുതുക.)

13. A എന്നൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു വൃക്ഷം തെക്കു $33\frac{3}{4}^\circ$ കിഴക്കായി കണ്ടു. അയാൾ പ. $33\frac{3}{4}^\circ$ തെക്കായി 1000 വാരനടന്നശേഷം വൃക്ഷം നേരെ കിഴക്കു കണ്ടു. എന്നാൽ A യിൽനിന്നു വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണുക.

14. കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു കടൽക്കരയിൽ A, B എന്ന രണ്ടു ഭീപസ്തംഭങ്ങൾ ഉണ്ടു. ഒരു കപ്പൽ A ക്കു നേരെ തെക്കും B ക്കു തെ. പടിഞ്ഞാറുമാണ്. കപ്പൽ 10 നാഴിക കി. വ. കിഴക്കായി പോയശേഷം B ക്കു നേരെ തെക്കാണെങ്കിൽ ഭീപസ്തംഭങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കാണുക.

15. A എന്നൊരു കപ്പൽ ഒരു തുറമുഖത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു മണിക്കൂറിൽ 8 നാഴിക വീതം തെ. കിഴക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു. A തുറമുഖം വിട്ടപ്പോൾ B എന്നൊരു കപ്പൽ തുറമുഖത്തുനിന്നു തെ. പടിഞ്ഞാറു 10 നാഴിക അകലെ യായിരുന്നു. B 2 മണിക്കൂറിൽ A യിനോടൊപ്പം എത്തുമെങ്കിൽ B ഏതു ദിശയിലേക്കാണ് യാത്രചെയ്യതു?

c. മേൽനോട്ടക്കോണം കീഴ്നോട്ടക്കോണം
(Angles of Elevation and Depression).



O ഒരാളുടെ കണ്ണിനേയും OA ഒരു അനുപ്രസ്ഥ രേഖയേയും B അയാളുടെ കണ്ണിനെക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. O, A, B എന്നിവ ഒരേ ലംബതലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. B എന്ന വസ്തുവിനെ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ OB അയാളുടെ ദൃഷ്ടിപഥ (Line of sight)വും $\angle AOB, B$ എന്ന വസ്തുവിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോണം (Angle of Elevation) ആണ്.


ഒരാൾ തന്റെ കണ്ണിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണിൽകൂടിയുള്ള ഒരു അനുപ്രസ്ഥരേഖക്കും (Horizontal line) ദൃഷ്ടിപഥത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ ആ വസ്തുവിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോണെന്നു നിവ്വചിക്കാം.

B എന്ന വസ്തു അയാളുടെ കണ്ണിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ $\angle AOB$ അതിന്റെ കീഴ്നോട്ടക്കോൺ (Angle of Depression) ആകുന്നു.

ഒരാൾ തന്റെ കണ്ണിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണിൽകൂടിയുള്ള ഒരു അനുപ്രസ്ഥരേഖക്കും ദൃഷ്ടിപഥത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ ആ വസ്തുവിന്റെ കീഴ്നോട്ടക്കോണെന്നു നിവ്വചിക്കാം.

പർവ്വതശിഖരങ്ങളുടേയും മറ്റും ഉയരം കണക്കാക്കുന്നതു അവയുടെ മേൽനോട്ടക്കോൺ കാണുന്നതിനാലാണ്.

AB യും CD യും രണ്ടു അനുപ്രസ്ഥരേഖകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ സമാന്തരങ്ങളും ABC , DCB എന്ന കോണുകൾ സമവും ആണ്.




C യിൽനിന്നു നോക്കുന്നതായാൽ B യുടെ മേൽ നോട്ടക്കോൺ = $\angle DCB$.

B യിൽനിന്നു നോക്കുന്നതായാൽ C യുടെ കീഴ്നോട്ടക്കോൺ = $\angle ABC$.

$\therefore C$ യിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ B യുടെ മേൽനോട്ടക്കോൺ = B യിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ C യുടെ കീഴ്നോട്ടക്കോൺ.

d. കോണമാനി (The Clinometer).

വസ്തു കളുടെമേൽ നോട്ടക്കോൺ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടു പിടിപ്പാൻ വളരെ ലഘുവായ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട്. അതു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ഒരു ലംബസ്രൂതം തൂക്കിടുള്ള ഒരു കോണമാപകമാകുന്നു. കോണമാപകത്തിന്റെ നേർവക്കു അനുപ്രസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ ലംബസ്രൂതത്തിന്റെ ചരടു O എന്നു അടയാള



ത്തിന്മേലായിരിക്കും. വസ്തുവിനെ വൃക്കുമായി കാണാൻ നേർവക്കിനോടു ഒരു കഴൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വസ്തുവിനെ കാണാൻ കഴലിനെ തിരിക്കുമ്പോഴും ചരടു ലംബ

മായിതന്നെ ഇരിക്കുന്നതാകയാൽ അനുപ്രസ്ഥത്തിൽനിന്നു കഴലിന്റെ ചരിവു കോണമാപകത്തിന്മേൽ ലംബസൂത്രത്തിന്റെ ചരടിന്റെ നേർക്കുള്ള അംശാങ്കനത്തിൽ (graduation) നിന്നു നേരിട്ടു വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ കോൺ മേൽനോട്ടക്കോണിന്നു സമമായിരിക്കുമെന്നു 2-ാം ചിത്രത്തിൽനിന്നു അനുമാനിക്കാം. കീഴ്നോട്ടക്കോണുകളും കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം എന്നു ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.

ഇതിനെ കോണമാനി എന്നതുമുള്ള Clinometer എന്നു പറയുന്നു. ഈ പദം inclinometer എന്നതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം മാത്രമാണ്.

തടിച്ച കടലാസ്സുകൊണ്ടു 1 അടി വ്യാസമുള്ള ഒരു കോണമാപകം ഉണ്ടാക്കുക. അതിന്റെ നേർവക്കിന്മേൽ ഒരു കടലാസ്സുകുപ്പൽ പിടിപ്പിക്കുക. കുത്തനെയുള്ള ഒരു മരക്കാലിന്മേൽ (wooden stand) ഒരു ആണി തറച്ചു അതിൽനിന്നു കോണമാപകവും ലംബസൂത്രവും തൂക്കുക. ഇതിനെ ഒരു കോണമാനിയായി ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെയും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടക്കോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക.

മൂന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വീതം ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു സൗകര്യമായിരിക്കും.

കോണമാനിയിൽനിന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ അടിയിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം കഴിയുന്നത്ര കൃത്യമായി അളക്കുക. തോതനുസരിച്ചു പടം വരച്ചു ഉയരം കാണുക. ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളുടെ ശരാശരി ഉയരമായി സ്വീകരിക്കുക.

അദ്ധ്യായം 21.

1. ഒരാൾ ഒരു ഗോപുരത്തിൽനിന്നു 300 അടി ദൂരനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ അഗ്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ 30° യാണെന്നു കണ്ടു. എന്നാൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ഉയരം കാണുക.

2. ഒരാൾ 20 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു തൂണിന്റെ അഗ്രം നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ 43° ആയിക്കണ്ടു. അയാളുടെ കണ്ണു നിലത്തു നിന്നു 5 അടി ഉയരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ദൂരത്തുനിന്നായിരുന്നു അയാൾ നോക്കിയിരുന്നതു? തൂണിന്റെ അടുക്കലേക്കു 6 അടി നടന്നശേഷം അതിന്റെ അഗ്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയായി കാണും?

3. സൂര്യന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ 23° ആകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പിക്കാലിന്റെ നിഴലിന്റെ നീളം 50 അടി ആണെങ്കിൽ കമ്പിക്കാലിന്റെ ഉയരം കാണുക.

4. 120 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു ലീപസ്തംഭത്തിന്മേൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തോണിയുടെ കീഴ്നോട്ടക്കോൺ 20° യാണെന്നു കാണുന്നു. എന്നാൽ സ്തംഭത്തിൽനിന്നു തോണിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണുക.

5. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുന്നിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ 35° യെന്നു കണ്ടു. കുന്നിന്റെ അടുക്കലേക്കു 150 അടി നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ 40° യെന്നും കണ്ടു. എന്നാൽ കുന്നിന്റെ ഉയരം കാണുക.

6. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നേരെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ മേൽനോട്ടക്കോൺ 37° ഉം 43° ഉം ഡിഗ്രിയായിക്കണ്ടു. രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 200 അടിയാണെങ്കിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയരം കാണുക.

7. കടലിൽനിന്നു 200 അടി ഉയരത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആകാശകപ്പലിൽനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ പടിഞ്ഞാറായിക്കിടന്നിരുന്ന രണ്ടു തോണികളുടെ കീഴ്നോട്ടക്കോണുകൾ 37° ഉം 52° ഉം ഡിഗ്രിയായിക്കണ്ടു. എന്നാൽ തോണികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണു്?

8. ഒരു ഗോപുരത്തിൽനിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്നു നേരെ തെക്കുള്ള രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളുടെ കീഴ്നോട്ടക്കോണുകൾ 54° ഉം 33° ഉം ഡിഗ്രിയായിക്കണ്ടു. രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 100 അടിയാണെങ്കിൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ഉയരം കാണുക.

9. ഒരുകാശവിമാനം 500 അടി ഉയരത്തിലുള്ളപ്പോൾ അതിൽനിന്നു ഒരുകൾ ഒരു നാഴികക്കല്ലിന്റെ കീഴ്നോട്ടക്കോൺ 41° ആണെന്നു കണ്ടു. കറെ ദൂരം നേരെ മേൽപ്പോട്ടു പോയശേഷം അതേ നാഴികക്കല്ലിന്റെ കീഴ്നോട്ടക്കോൺ 62° ആണെന്നും കണ്ടു. എന്നാൽ അതു 500 അടിയിൽനിന്നു എത്ര ഉയർന്നിരിക്കണം?

10. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയരം അതിന്മേൽ കയറാതെ എങ്ങിനെ നിണ്ണയിക്കാമെന്നു ഒരു പടം വരച്ചു കാണിക്കുക. Clinometer ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾപഠനവിലെ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഉയരം കാണുക.

11. Clinometer ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം കാണുക. ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 3 വീതമുള്ള വിഭാഗങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളുടെ ശരാശരി കാണുക. സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ദ്വാനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഉയരം നിങ്ങളുടെ ശരാശരിയിൽനിന്നു എത്ര വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണുക.

അദ്ധ്യായം 11.

ചില ചതുർഭുജങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ക്ഷേത്രഫലവും
(Some Quadrilaterals: their Construction and areas).

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സൈദ്ധാന്തിക ക്ഷേത്രഗണിത പാഠത്തിൽ വിവിധതരം ചതുർഭുജങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പ്രമേയങ്ങൾ മൂലം അവയുടെ ചില ഗുണങ്ങളേയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. (ഒന്നാം പുസ്തകം 218 മുതൽ 227 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക.)

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തരം ചതുർഭുജങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുവാനും അവയുടെ ക്ഷേത്രഫലം കണ്ടു പിടിക്കുവാനും പഠിക്കാം. പ്രായോഗികമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ മൂലം അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കാം.

- (1) സമാന്തരചതുർശ്ശോണം (Parallelogram).
- (2) സമകോണചതുരം (Rectangle).
- (3) സമചതുരം (Square).
- (4) സമചതുർഭുജം (Rhombus).

1. സമാന്തരചതുർശ്ശോണം.

നിർമ്മാണം: എതിർഭുജങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളായ ചതുർഭുജ ക്ഷേത്രത്തിന്നു സമാന്തരചതുർശ്ശോണം എന്നു പേര്.



രണ്ടു സമാന്തര രേഖകളെ വരക്കുക. ഇവയെ മേദീകൃത്തകുവണ്ണം വേറെ രണ്ടു സമാന്തര രേഖകളേയും വരക്കുക. ഇവയാൽ നിർമ്മിതമായ ചതുർഭുജക്ഷേത്രത്തിന്റെ എതിർഭുജങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളായതുകൊണ്ടു ഇതു ഒരു സമാന്തരചതുർശ്ശോണമാകുന്നു.

1. അതിന്റെ എതിർഭുജങ്ങളേയും എതിർകോണുകളേയും അളക്കുക.

2. കണ്ണങ്ങളെ വരച്ചു അവ തമ്മിൽ ചേർക്കുന്നതിനാലുണ്ടാവുന്ന അംശങ്ങളെ അളക്കുക.

3. ഒരു കണ്ണം സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തെ അംശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ മുറിച്ചെടുത്തു അവയിൽ ഒന്നിനെ മറോ അംശത്തിന്മേൽ വെക്കുക.

ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വേറെയും 2 സമാന്തരചതുഷ്കോണങ്ങളെ മേല്പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ വരച്ചു ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും ഒരു സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തിന്നു താഴെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു അനുമാനിക്കാം:—

1. എതിർഭുജങ്ങൾ സമമാണ്.


2. എതിർകോണകൾ സമമാണ്.

3. ഓരോ കണ്ണവും മറോ കണ്ണത്തെ രണ്ടു സമാംശങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു.

4. ഓരോ കണ്ണവും സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തെ രണ്ടു സമ്വാംഗതലയുണ്ടായ ത്രികോണങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു.

ഉദാ:—1. $ABCD$ എന്നൊരു സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിൽ $AB = 6$ സെ.മീ. $BC = 3$ സെ.മീ. $B = 120^\circ$. ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക.

നിർമ്മണം:—6 സെ.മീ. നീളത്തിൽ AB വരയ്ക്കുക. AB യ്ക്കു 120° ചരിഞ്ഞു 3 സെ.മീ. നീളത്തിൽ BC വരയ്ക്കുക. D യുടെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? $AD = BC$. $\therefore D$, A യിൽനിന്നു 3 സെ.മീ. അകലെയുമാണ്. ഇതേ പ്രകാരം D , C യിൽനിന്നു 6 സെ.മീ. അകലെയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനാൽ A യും C യും കേന്ദ്രങ്ങളും 3 ഉം 6 ഉം സെ.മീ. യഥാക്രമം വ്യാസാർദ്ധങ്ങളായി തമ്മിൽ D യിൽ ചേർക്കുന്നതായാണ് 2 ചാപരേഖകൾ വരയ്ക്കുക. AD , DC ചേർക്കുക. എന്നാൽ $ABCD$ ആവശ്യപ്പെട്ട സമാന്തര ചതുഷ്കോണമായിരിക്കും. കോണുകളുടെ വലിപ്പം അനുമാനിക്കുക. അളന്നു നിങ്ങളുടെ അനുമാനം



ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. കണ്ണങ്ങൾ അളക്കുക. നിങ്ങൾ വരച്ച സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിനു ഒരു സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. വേറേയും കൂട്ടം അളവുകൾ തന്നിരുന്നാൽ സമാന്തര ചതുഷ്കോണങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതു അത്യാസങ്ങളായി താഴേ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സൂചന: ഓരോ അത്യാസത്തിലേയും നിട്ടികുടങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി ഒരു കരടപടം വരക്കുക. സമാന്തര ചതുഷ്കോണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളിൽനിന്നു നിർമ്മാണരീതി അനുമാനിക്കുക.

2. സമകോണചതുരം.

നിവൃച്ഛനം: ഒരു കോൺ സമകോണായ സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിനു സമകോണചതുരം എന്നു പേർ.

ഒരു സമകോണചതുരം ഒരു സമാന്തരചതുഷ്കോണവും ആയതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഒരു സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവയ്ക്കു പുറമെ താഴേ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി അനുമാനിക്കാം:—

1. എല്ലാ കോണുകളും സമകോണുകളാണ്.

2. കണ്ണങ്ങൾ സമമാണ്.

ഉദാ:—2. ഒരു സമകോണചതുരത്തിന്റെ നീളം 7 സെ. മീ. വീതി 4 സെ. മീ. ചതുരം നിർമ്മിക്കുക.

നിർമ്മാണം:—7 സെ.മീ. നീളത്തിൽ AB വരക്കുക. AB ക്ക് ലംബമായി (എന്തുകൊണ്ടു?) 4 സെ.മീ. നീളത്തിൽ BC വരക്കുക. A യും C യും കേന്ദ്രങ്ങളും വ്യാസാർദ്ധങ്ങൾ യഥാക്രമം 4ഉം 7ഉം സെ. മീ.ഉം ആയി തമ്മിൽ D യിൽ ഘേദിക്കത്തക്കവണ്ണം 2 ചുവരേ



ഖകൾ വരക്കുക. ഇങ്ങിനെ വരക്കുവാൻ കാരണമെന്തു? AD , DC ചേർക്കുക. എന്നാൽ $ABCD$ ആവശ്യപ്പെട്ട സമകോണചതുരമായിരിക്കും. ഇതിന്നു ഒരു സമകോണ

ചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

ഈ നിർമ്മാണം ഏതൊരു സംഗതിയിൽ മാത്രം സമാന്തര ചതുഷ്കോണ നിർമ്മാണത്തിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

കെട്ടിടങ്ങൾ, മുറികൾ, തോട്ടങ്ങൾ, വയലുകൾ എന്നിവ സമകോണ ചതുരങ്ങളായതുകൊണ്ടു തോതനുസരിച്ചു അവയുടെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതു ഒരു മുഖ്യമായ അഭ്യാസമാകുന്നു.

3. സമചതുരം.

നിർവ്വചനം: രണ്ടു സമീപഭുജങ്ങൾ സമമായ സമകോണ ചതുരത്തിന്നു സമചതുരം എന്നു പേർ.


ഒരു സമചതുരം ഒരു സമകോണ ചതുരവും ആയതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഒരു സമകോണ ചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ താഴെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി അനുമാനിക്കാം:—

1. ഭുജങ്ങൾ സമമാണ്.

2. കണ്ണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബമാണ്.

3. ഓരോ കണ്ണവും സമചതുരത്തിന്റെ കോണുകളെ രണ്ടു സമഭാഗമാക്കുന്നു.

ഉദാ:—3. ടി. സെ. മീ. നീളമുള്ള $ABCD$ എന്നൊരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കുക. ഈ നിർമ്മാണം ഒരു സമകോണചതുരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽനിന്നു ഏതൊരു സംഗതിയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സമചതുരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അതിനെ പല വിധത്തിൽ നിർമ്മിക്കാമെന്നു കാണാം. വിദ്യാർത്ഥികഴിയുന്നത്ര വിധത്തിൽ സമചതുരത്തെ നിർമ്മിക്കണം. ഓരോ നിർമ്മാണത്തിലുമുള്ള ക്രിയകളും അവയുടെ ന്യായവും എഴുതുക. കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം അളന്നും ഗണിച്ചും കാണുക. $d = a\sqrt{2}$ എന്ന സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുക.



നിങ്ങൾ വരച്ച ഒരു സമചതുരത്തിന്നു സമചതുരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

4. സമചതുർദ്വജം.

നിർവ്വചനം:—എല്ലാ ഭുജങ്ങളും സമമായ ചതുർദ്വജക്ഷേത്രത്തിന്നു സമചതുർദ്വജം എന്നു പേർ. ഇതിന്റെ കോണുകൾ

സമചതുർത്തുകൊണ്ടു ഇതിന്നു സമചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല.

1. കണ്ണങ്ങൾ സമമല്ല.
2. എതിർ കോണുകൾ മാത്രം സമമാണ്.

ഉദാ:—4. ഒരു സമചതുർജത്തിന്റെ ഭുജത്തിന്റെ നീളം = $1.8''$. ഒരു കോൺ = 110° . സമചതുർജം നിർമ്മിക്കുക. ഈ നിർമ്മാണം ഒരു സമാന്തര ചതുർശ്ശോണത്തിന്റേയും ഒരു സമചതുരത്തിന്റേയും നിർമ്മാണത്തിൽനിന്നു ഏതൊരു സംഗതിയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ടു? നിങ്ങൾ വരച്ച സമചതുർജത്തിന്നു ഒരു സമചതുർജത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണത്തിന്റെ നീളം അളന്നു മറ്റോ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം ഗണിക്കുക. ഇങ്ങിനെ ഗണിക്കുവാൻ ഏതൊരു പ്രമേയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും? ഒരു സമചതുർജത്തിന്റെ ഏതൊരു ഗുണങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഗണിക്കുന്നതെന്നു എഴുതുക.

അഭ്യാസം 22.

1. സൈ. മീ. നീളമുള്ള ഒരു സമചതുരം വരച്ചു അതിന്റെ കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം അളക്കുക. നീളം ഗണിച്ചും കാണുക. സമചതുരത്തിന്റെ 4 ശീർഷങ്ങളിലും കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരക്കുക.

2. ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം = 10 സൈ. മീ. സമചതുരം വരച്ചു അതിന്റെ ഭുജം അളക്കുക. നീളം ഗണിക്കുക.

3. $2''$ വ്യാസാർദ്ധമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധിയിന്മേൽ ശീർഷങ്ങൾ കിടക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു സമചതുരം വരക്കുക. അതിന്റെ നീളം അളന്നും ഗണിച്ചും കാണുക.

4. 7.2 സൈ. മീ. നീളവും 6.5 സൈ. മീ. വീതിയുമുള്ള ഒരു സമകോണചതുരം വരച്ചു അതിന്റെ കണ്ണങ്ങൾ അളക്കുക. നീളം ഗണിച്ചു അളന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക. സമകോണചതുരത്തിന്റെ ശീർഷങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന വൃത്തം വരക്കുക.

5. ഒരു സമകോണചതുരത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണത്തിന്റേയും ഒരു ഭുജത്തിന്റേയും നീളം 8.9 ഉം 3.9 ഉം സൈ. മീ. ആണ്. സമകോണചതുരം വരച്ച ശേഷമുള്ള ഭുജത്തിന്റെ നീളം അളന്നും ഗണിച്ചും കാണുക.

6. ഒരു സമകോണചതുരത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണത്തിന്റെ നീളം = 10 സെ. മീ. കണ്ണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ = 40° . സമകോണചതുരം വരച്ച അതിന്റെ ഭുജത്തെ അളക്കുക.

7. ഒരു സമചതുഭുജത്തിന്റെ ഒരു ഭുജം = 2"; ഒരു കോൺ = 30° . ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച അതിന്റെ കണ്ണങ്ങളേയും ശേഷമുള്ള കോണുകളേയും അളക്കുക. കണ്ണങ്ങളുടെ അളന്നുകിട്ടിയ നീളത്തിൽനിന്നു ഭുജത്തിന്റെ നീളം ഗണിക്കുക. യഥാർത്ഥ നീളവുമായി ഒത്തുനോക്കുക. കോണുകളുടെ വലിപ്പം അനുമാനിച്ച അളന്നു കിട്ടിയ വലിപ്പവുമായി ഒത്തുനോക്കുക.

8. ഒരു സമചതുഭുജത്തിന്റെ കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം 6 ഉം 6.3 ഉം സെ. മീ. ആണ്. ക്ഷേത്രം വരച്ച അതിന്റെ ഭുജവും കോണുകളും അളക്കുക.

9. ഒരു സമചതുഭുജത്തിന്റെ ഒരു കോൺ = 60° . ആ കോണിന്റെ ശീർഷത്തിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുന്ന കണ്ണത്തിന്റെ നീളം = 9 സെ. മീ. സമചതുഭുജം നിർമ്മിച്ച അതിന്റെ ഭുജത്തിന്റേയും മറ്റേ കണ്ണത്തിന്റേയും നീളം അളക്കുക.

10. $ABCD$ എന്നൊരു സമാന്തര ചതുഷ്കോണത്തിൽ $AB = 4.2$ സെ. മീ. $AD = 8.2$ സെ. മീ. $A = 53^\circ$. സമാന്തരചതുഷ്കോണം വരച്ച കണ്ണങ്ങളെ അളക്കുക. കോണുകളുടെ വലിപ്പം അനുമാനിക്കുക. അളന്നുകിട്ടിയ ഉത്തരവുമായി ഒത്തുനോക്കുക.

11. ഒരു സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 2" ഉം 2.5" ആണ്. ഒരു കണ്ണം = 1". സമാന്തരചതുഷ്കോണം വരച്ച കോണുകളേയും മറ്റേ കണ്ണത്തേയും അളക്കുക.

12. $ABCD$ എന്നൊരു സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തിൽ $AB = 5$ സെ. മീ., $AD = 7.5$ സെ. മീ., $AC = 8.5$ സെ. മീ. സമാന്തരചതുഷ്കോണം വരച്ച കോണുകളെ അളക്കുക.

13. ഒരു സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തിന്റെ കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം 9 സെ. മീ. ഉം 7.6 സെ. മീ. ഉം അവയ്ക്കിടയിലുള്ള കോൺ 108° ഉം ആണ്. സമാന്തരചതുഷ്കോണം വരച്ച അതിന്റെ ഭുജങ്ങളെ അളക്കുക.


14. ഒരു സമാന്തരചതുഷ്കോണത്തിന്റെ ഒരു കോൺ = 60° , ഒരു ഭുജം = 7 സെ. മീ. അതിന്നു സമാന്തരമായ ഭുജം അതിൽനിന്നു 4 സെ. മീ. അകലെയാണ്. സമാന്തരചതുഷ്കോണം നിർമ്മിക്കുക. 7 സെ. മീ. അല്ലാത്ത ഭുജം അളക്കുക.

15. സമകോണചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിന്നു 100 അടി നീളവും 75 അടി വീതിയുമുണ്ട്. തോട്ടത്തിന്നു ചുറ്റും 5 അടി വീതിയിൽ ഒരു പാതയുണ്ട്. പാതയുടെ ഒരു പടം വരക്കുക.

16. ഒരു കളത്തിന്റെ നീളം 80 വാര്യം വീതി 40 വാര്യമാണ്. അതിന്റെ നേരെ നട്ടവിൽ സമചതുരമായ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്. മണ്ഡപത്തിന്റെ നീളം 10 വാര്യമാണെങ്കിൽ കളത്തിൽ മണ്ഡപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്രം വരയ്ക്കുക.

ക്ഷേത്രഫലം (Areas).

തടിച്ച കടലാസ്സിൽ $ABCD$ എന്നൊരു സമാന്തരചതുരശ്ചോണം വരയ്ക്കുക. AB ക്ക് ലംബമായി CD യെ M ഇൽ



മേദിക്കത്തക്കവണ്ണം BM വരയ്ക്കുക. AB സമാന്തരകത്തിന്റെ ആധാരവും BM അതിന്റെ ഉന്നതി (Altitude) യും ആണ്.

$\triangle BMC$ ന്റെ മുറിച്ചെടുത്ത വലത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്നപ്രകാരം $\triangle AND$ ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു വെക്കാം. അപ്പോൾ $ABMN$ ഒരു സമകോണചതുരമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ആധാരവും ഉന്നതിയും യഥാക്രമം $ABCD$ എന്ന സമാന്തരചതുരശ്ചോണത്തിന്റെ ആധാരത്തിനും, ഉന്നതിക്കും സമമായിരിക്കും.

$ABMN$ എന്ന സമകോണചതുരത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം $= AB \times BM$.


$=$ സമാന്തരചതുരശ്ചോണത്തിന്റെ അധാരം $\times$ ഉന്നതി.

$\therefore$ ഒരു സമാന്തരചതുരശ്ചോണത്തിന്റെ ആധാരം b യും ഉന്നതി h ഉം ആണെങ്കിൽ,

അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം, $A = bh$.

ഏതെങ്കിലും ഭൂമി ആധാരവും അതിന്റെ ലംബരേഖ ഉന്നതിയുമായി കരുതാം.

ഒരു സമാന്തരചതുർശ്ശാണ് അതിന്റെ കണ്ണും അതിനെ രണ്ടു സമത്രികോണങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, $\triangle ABC = \triangle DCB$ എന്ന സമാന്തരചതുർശ്ശിന്റെ




$$\text{ന്റെ } \frac{1}{2} = \frac{AB \times CM}{2}$$

$$= \frac{\triangle ABC \text{ ന്റെ ആധാരം} \times \text{ഉന്നതി}}{2}$$

$\therefore A = \frac{1}{2}bh$. ഈ സൂത്രത്തിൽ $A =$ ത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം, $b =$ ആധാരം, $h =$ ഉന്നതി.

ഈ സൂത്രം വേറൊരുവിധത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരു




സമകോണചതുരത്തിന്റെ കണ്ണും അതിനെ രണ്ടു സമകോണത്രികോണങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും സമമായതുകൊണ്ട് ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം

$$= \frac{\text{സമകോണിന്റെ ഭൂമിയിന്റെ ഗുണനഫലം}}{2}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{AB \times BC}{2}$$

$\triangle ABC$ ന്റെ C എന്ന ശീർഷത്തിൽനിന്നു AB എന്ന ആധാരത്തിലേക്കു CM എന്ന ലംബരേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു $\triangle AMC$ യും $\triangle BMC$ യും സമകോണത്രികോണങ്ങളാകുന്നു.




$$\triangle ABC = \triangle AMC + \triangle BMC$$

$$= \frac{1}{2} AM \times CM + \frac{1}{2} BM \times CM$$

$$= \frac{1}{2} (AM + BM) CM = \frac{1}{2} AB \times CM.$$

$$= \frac{1}{2} \text{ ആധാരം} \times \text{ഉന്നതി}$$

$$\therefore A = \frac{1}{2}bh.$$



ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 10ഉം 7ഉം 5ഉം സെ.മീ. ആണ്. ത്രികോണം വരച്ച അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭുജത്തെ ആധാരമായി കരുതാവുന്നതുകൊണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലത്തെ 3 വിധത്തിൽ കാണാം.

$$AB \text{ ആധാരമാകുമ്പോൾ ഉന്നതി} = CP$$

$$\therefore \text{ക്ഷേത്രഫലം} = \frac{1}{2} \times 10 \times 3.24 \text{ ച. സെ.മീ.}$$

$$= 16.2 \text{ ച. സെ. മീ.}$$

AC, BC ആധാരങ്ങളാകുമ്പോൾ BQ, AR എന്നിവ യഥാക്രമം ഉന്നതി കളായിരിക്കും.

$$\text{ക്ഷേത്രഫലം} = \frac{1}{2} AC \times BQ = \frac{1}{2} BC \times AR$$

ഇവ സമമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ 3 ഭുജങ്ങളുടേയും നീളം അറിയുന്നതായാൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണാനുള്ള സൂത്രം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$A = \text{ത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം}$$

$$2s = \text{ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ്.}$$

$$a, b, c \text{ ഭുജങ്ങളുടെ നീളം.}$$

$$\text{നാം വരച്ച ത്രികോണത്തിൽ } 2s = (10 + 7 + 5) \text{ സെ.മീ.}$$

$$\therefore A = \sqrt{11(11-10)(11-7)(11-5)} \text{ ച. സെ.മീ.}$$

$$= \sqrt{264} \text{ ച. സെ.മീ.} = 16.2 \text{ ച. സെ.മീ. (1 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി)}$$

അ ദ്വ ങ്ങ 23.

1. താഴെ പറയുന്ന സമാന്തരചതുർക്കോണങ്ങൾ വരച്ച അവയുടെ ക്ഷേത്ര ഫലം കാണുക.

(a) രണ്ടു ഭുജങ്ങളുടെ നീളം $3''$ ഉം, $2.5''$ ഉം, ഒരു കോൺ 50° യും ആണ്.

(b) രണ്ടു ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 8 സെ. മീ. ഉം 13 സെ. മീ. ഉം; ഒരു കണ്ണും = 9 സെ. മീ.

2. ഒരു സമചതുർഭുജത്തിന്റെ ഒരു ഭുജം = 6 സെ. മീ. ഒരു കോൺ = 60° . ക്ഷേത്രം വരച്ച അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. ഒരു കോൺ 30° യാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രഫലം എത്രയായിരിക്കും?

3. ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ഭുജം = 7 സെ. മീ. ത്രികോണം വരച്ച ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

4. ഒരു ദ്വിസമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ സമഭുജങ്ങൾ $3''$ ഉം, മൂന്നാമത്തെ ഭുജം $2''$ ഉം ആണ്. ത്രികോണം വരച്ച ക്ഷേ. ഫ. കാണുക. സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു നോക്കുക.

5. താഴെ പറയുന്ന അളവുകളുള്ള $\triangle ABC$ വരച്ച ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

(1) $a = 3''$, $b = 2.5''$, $c = 2''$.

(2) $a = 3.6''$, $B = 67^\circ$, $c = 72^\circ$.

(3) $b = 2.1''$, $c = 1.8''$, $A = 122^\circ$.

6. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വയലിന്റെ രണ്ടതിരുകളുടെ നീളം 150 ഉം 250 ഉം വാരയാകുന്നു. അവക്കിടയിലുള്ള കോൺ = 70° . വയലിന്റെ ഒരു പടം വരച്ച ക്ഷേ. ഫ. കാണുക.

7. ഒരു സമകോണത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേ. ഫ. = 30. ച. സെ. മീ. സമകോണിന്റെ ഒരു ഭുജം 12 സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ മററു രണ്ടു ഭുജങ്ങളുടെ നീളം കാണുക. വിചലരേഖയിലേക്കു എതിർ ശീർഷത്തിൽനിന്നുള്ള ലംബരേഖയുടെ നീളം കാണുക.

8. ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ കണ്ണത്തിന്റെ നീളം d സെ. മീ. സമചതുരത്തിന്റെ ക്ഷേ. ഫ. $\frac{1}{2}d^2$ ച. സെ. മീ. ആണെന്നു തെളിയിക്കുക.

9. 7 ഉം 8 ഉം 9 ഉം സെ. മീ. നീളമുള്ള ഭുജങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ത്രികോണം വരക്കുക. ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഭുജത്തെ ആധാരമായി കരുതി ത്രികോണത്തിന്റെ ക്ഷേ. ഫ. കാണുക. ഈ ഉത്തരത്തിൽനിന്നു ശേഷം ഭുജങ്ങളിലേക്കു അവക്കെതിരായ ശീർഷങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ലംബരേഖകളുടെ നീളം ഗണിക്കുക.

സൂത്രം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ക്ഷേ. ഫ. കാണുക. ശേഷം ഉത്തരങ്ങളും ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

10. ഒരു സമാന്തരചതുർശ്വജ്ഞാണത്തിന്റെ ക്ഷേ. ഫ. 48 ച. സെ. മീ.ഉം ഒരു കോൺ 30° യും ആണ്. ആധാരം 9.6 സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ സമാന്തരചതുർശ്വജ്ഞാണം വരച്ച ആധാരത്തിനടുത്തുള്ള ഭുജത്തിന്റെ നീളം കാണുക.

11. ഒരു സമചതുർഭുജം വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം d_1 ഉം d_2 ഉം സെ. മീ. ആണെന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം $\frac{1}{2}d_1 d_2$ ച. സെ. മീ. ആണെന്നു തെളിയിക്കുക. ഒരു സമചതുർഭുജത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ക്ഷേത്രഫലം ഗണിച്ചതു?

ഇതിൽനിന്നു ഒരു സമചതുർഭുജത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം, $A = \frac{1}{2}d_1 d_2$, (d_1, d_2 : കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം) ആണെന്നു പഠിക്കാം.

12. ഒരു സമചതുർഭുജത്തിന്റെ ഭുജം $2.4''$. ഒരു കോൺ $= 60^\circ$. സമചതുർഭുജം നിർമ്മിക്കുക. കണ്ണങ്ങളെ അളന്നു ക്ഷേത്രഫലം ഗണിക്കുക. ഒരു സമാന്തരചതുർശ്വജ്ഞാണത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുന്ന മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ചു ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. ഈ രണ്ടുത്തരങ്ങളും സമമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

13. രണ്ടു തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ വീതി 5 അടിയും 3 അടി 4 അംഗുലവും ആണ്. പാതകൾ തമ്മിൽ ചേരുകയെന്ന സ്ഥലത്തു അവക്കിടയിലുള്ള കോൺ 45° യാണ്. എന്നാൽ പാതകൾക്കിടയിലുള്ള നിലത്തിന്റെ ഒരു പടം കൃത്യമായി വരയ്ക്കുക.

(a) ഈ നിലത്തിന്റെ അതിരുകളുടെ നീളം കാണുക. (b) നിലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം ച. അടിവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (1936)

അദ്ധ്യായം 12.

ഏകകാലികസമവാക്യങ്ങൾ

(Simultaneous Equations).

$$x+4=15 \quad (1)$$

$$x+y=7 \quad (2)$$

ഈ രണ്ടു സമവാക്യങ്ങളേയും പരിശോധിക്കുക. 1-ാം സമവാക്യത്തിൽ $x=11$ ആണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. 2-ാം സമവാക്യത്തിൽ x ന്നു് ഏതു വില കല്പിക്കുന്നതായാലും അ

തിന് യോജിച്ച ഒരു വില y ക്കും കാണാവുന്നതാണ്. ഉദാ ഹരണമായി $x=5$ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ $y=2$. ഇങ്ങിനെ x നും y ക്കും എത്രയോ ജോടി വിലകൾ നിശ്ചയിക്കാം. കറേ ജോടി വിലകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

x	0	2	$3\frac{1}{2}$	5	-1	10
y	7	5	$3\frac{1}{2}$	2	8	-3
$x+y$	7	7	7	7	7	7

$$x-y=3 \quad (3)$$

ഈ സമത്വത്തിന്റെ ഉപാധി അനുസരിച്ച് അനേകം ജോടി വിലകൾ x നും y ക്കും ഉണ്ടാകാമെന്ന് നാം കണ്ടു വല്ലോ.

കറേ ജോടി വിലകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

x	3	5	0	$1\frac{1}{2}$	-1	-3
y	0	2	-3	$-1\frac{1}{2}$	-4	-6
$x-y$	3	3	3	3	3	3

മേൽ കാണുന്ന രണ്ടു പട്ടികകളേയും പരിശോധിക്കുന്ന തായാൽ രണ്ടു സമത്വങ്ങളിലേയും ഉപാധിക്കനുസരിച്ച് തായ ഒരു ജോടി വില മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അത് $x=5$, $y=2$ എന്ന ജോടിയാകുന്നു. എല്ലാ ജോടി വിലകളേയും നമുക്കു ഇവിടെ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും രണ്ടു സമത്വങ്ങൾക്കും യോജിച്ച ഒരു ജോടി വില മാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂവെന്ന് പിന്നീട് തെളിവാകും.

$$x+y=7 \quad (1)$$

$$3x+3y=21 \quad (2)$$

രണ്ടാം സമത്വം 1-ാം സമത്വത്തിന്റെ പദങ്ങളെ 3കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ട് 2-ാം സമത്വത്തെ 1-ാം സമത്വത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപന്നസമത്വം (Derived equation) ആയി മാത്രം കരുതാം. അതു നിമിത്തം ഈ രണ്ടു സമത്വങ്ങളിൽനിന്ന് x ന്റെയും y യുടെയും വില നിശ്ചയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

$$x+y=7. \quad x+2y=10.$$

ഈ രണ്ടു സമത്വങ്ങളിൽ ഒന്ന് മറെറാന്നിൽനിന്ന് ഉൽപന്നമായതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവയെ സ്വതന്ത്രസമത്വങ്ങൾ (Independent equations) എന്നു പറയുന്നു.

രണ്ടു സ്വതന്ത്രസമത്വങ്ങളുടെ ഉപാധികൾക്കു യോജിച്ച ഒരു ജോടിയില എപ്പോഴും കണ്ടു പിടിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒന്നിലധികം അജ്ഞാതരാശികൾ (Unknown quantities) അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമത്വങ്ങളെ ഏകകാലികസമത്വങ്ങൾ (Simultaneous Equations) എന്നു പറയുന്നു. രണ്ടു അജ്ഞാതരാശികൾ മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമത്വങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം.

$$x+3y=19 \quad (1)$$

$$2x+y=13 \quad (2)$$

$$1-ാം സമത്വപ്രകാരം $x=19-3y$.$$

x ന്റെ വില 2-ാം സമത്വത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ

$$2(19-3y)+y=13$$

$$38-6y+y=13$$

$$-5y=-25$$

$$\therefore y=5.$$

ഈ വില ഒന്നാം സമതത്തിൽ ചേർക്കുക.

$$x + 15 = 19$$

$$\therefore x = 4.$$

$\therefore x = 4; y = 5$. ഈ രണ്ടു വിലയും കണ്ടാൽ മാത്രമേ നാം സമതങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടൂ.

ജ്ഞാത വില കാണുന്നതിന്നു പകരം y യുടെ വില കണ്ടും ഫലം നിണ്ണയിക്കാം. ജ്ഞാത വിലയെ 2-ാം സമതത്തിൽ ചേർത്തപ്പോൾ y അജ്ഞാതരാശിയായ ഒരു ഏകഘാത സമതം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് y ക്കു ഒരു വില മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നു തെളിയുന്നു. y യുടെ ഈ വില ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സമതത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ x അജ്ഞാത രാശിയായ ഒരു ഏകഘാതസമതം കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് x ന്നും ഒരു വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

അതായത് രണ്ടു അജ്ഞാത രാശികൾക്കും ഓരോ വില മാത്രമേയുള്ളൂ.

നാം ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ക്രിയകളെ അവലോകനം ചെയ്യുക.

- (1) ഒരു സമതത്തിൽനിന്ന് ഒരു രാശിയുടെ വിലയെ മറ്റേ രാശി ഉപയോഗിച്ചു വ്യക്തമാക്കുക.
- (2) ആ വിലയെ രണ്ടാം സമതത്തിൽ ചേർത്തു അതിനെ ഒരു ഏകഘാത സമതമായെഴുതുക.
- (3) ഈ ഏകഘാത സമതത്തിന്റെ ഫലം നിണ്ണയിക്കുക.
- (4) ഫലം നിണ്ണയിച്ചു കിട്ടിയ വിലയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമതത്തിൽ ചേർത്തു രണ്ടാമത്തെ രാശിയുടെ വിലയും കാണുക.

ഇങ്ങനെ സമതങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിന് പ്രതിസ്ഥാസമാഗ്നം (Method of substitution) എന്നു പറയുന്നു.

$$(1) \text{നെ 3കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ } 12x + 21y = 87 \quad (3)$$

$$(2) \text{നെ 2കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ } 12x + 10y = 54 \quad (4)$$

$$(3) \text{ൽനിന്നു } (4) \text{ കിഴിച്ചാൽ } 11y = 33$$

$$\therefore y = 3$$

$$4x + 21 = 29$$

$$\therefore 4x = 29 - 21$$

$$\therefore x = 2$$

$$\therefore x = 2; y = 3.$$

ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാശിയെ വിലോപിപ്പിക്കുക(eliminate)ണമെന്നാണ്.

ഇതിനായി നാം ആ രാശിയുടെ ഗുണകങ്ങളെ രണ്ടു സമതങ്ങളിലും സമമാക്കുന്നു. ഒരു രാശിയെ വിലോപിപ്പിച്ചശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമതം ഒരു ഏകഘാതസമതമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ ഒരു രാശിയെ വിലോപിപ്പിച്ച ഏകകാലികസമതങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിന്നു വിലോപനമാർഗ്ഗം (Method of elimination) എന്നു പറയുന്നു.

വിലോപനമാർഗ്ഗത്തെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുവാൻ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾകൂടി താഴെ ചേർക്കുന്നു.

$$1. \quad 5x + 7y = 26. \quad (1)$$

$$5x + 2y = 11. \quad (2)$$

ഒന്നാം സമതത്തിൽനിന്നു മറേറ്റിനെ കിഴിക്കുന്നതിനാൽ x നെ വിലോപിപ്പിക്കാം. കിഴിച്ചു കിട്ടുന്ന സമതം y അജ്ഞാതരാശിയായ ഒരു ഏകഘാതസമതമായിരിക്കും.

$$2. \quad 3x - 17y = -25. \quad (1)$$

$$8x + 17y = 58. \quad (2)$$

ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ y യുടെ ഗുണകങ്ങളുടെ സംഖ്യവില സമവും ചിഹ്നങ്ങൾ വിപരീതവും ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടു സമതങ്ങളേയും കൂട്ടുന്നതിനാൽ x മാത്രം ശേഷിക്കും. കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന സമതം x അജ്ഞാതരാശിയായ ഒരു ഏകഘാതസമതമായിരിക്കും.

ഈ രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥി അഭ്യാസങ്ങളായി കരുതണം.
ഉദാ: —

$$x-5=y+4 \quad (1)$$

$$\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = \frac{x}{6} \quad (2)$$

ഈ രണ്ടു സമവാക്യങ്ങളും അവയിലുള്ള രാശികളെ വിപ്ലോഹിപ്പിക്കുവാൻ സൗകര്യമായ ഒരു രൂപത്തിലല്ല ഉള്ളത്.

(1) x, y എന്ന അജ്ഞാതരാശികൾ അടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഇടതുവക്കത്തും ശേഷമുള്ള രാശികൾ വലതുവക്കത്തുമായി എഴുതുന്നതു സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ എഴുതുന്നതായാൽ 1-ാം സമവാക്യം $x-y=9$ എന്ന രൂപത്തിലാകും.

(2) ഭിന്നിതങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായാൽ ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതു എളുപ്പമായിരിക്കും. 2-ാം സമവാക്യത്തിലെ പദങ്ങളെ അവയുടെ ഹേദകങ്ങളുടെ അ.സാ. ഗുണിതമായ 30കൊണ്ട് പെരുക്കുന്നതായാൽ,

$$6x-10y=5x. \quad (1)$$

$$\therefore x-10y=0. \quad (2)$$

സമവാക്യം ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും.

$$x-y=9 \quad (1)$$

$$x-10y=0 \quad (2)$$

(1)ൽനിന്നു (2) കിഴിച്ചാൽ $9y=9$

$$\therefore y=1$$

ഈ വിലയെ ഒന്നാം സമവാക്യത്തിൽ ചേർക്കുക.

$$x-1=9$$

$$\therefore x=10$$

സത്യാപനം:

2-ാം സമവാക്യത്തിൽ ഈ രണ്ടു വിലകളേയും ചേർക്കുക.

$$10-10 \times 1=0.$$

x, y എന്ന രാശികളുടെ ഗുണകങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ചില കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

$$\text{ഉദാ: } -1 \quad 13x+46y=112. \quad (1)$$

$$46x+13y=-53. \quad (2)$$

$$(1) \text{ നോട്ട് } (2) \text{ കൂട്ടിയാൽ } 59x+59y=59. \quad (3)$$

$$(3) \text{ നെ } 59 \text{ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ } x+y=1 \quad (4)$$

$$(1) \text{ ൽനിന്ന് } (2) \text{ കിഴിച്ചാൽ } -33x+33y=165 \quad (5)$$

$$(5) \text{ നെ } 33 \text{ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ } -x+y=5. \quad (6)$$

(4) നോട് (6) കൂട്ടിയാൽ $2y = 6.$

$\therefore y = 3.$

$\therefore x = -2$

സത്യാവനം ചെയ്യുക.

ഉദാ: - 2. ഫലം നിർണ്ണയിക്കുക.

$$\frac{1}{3} (5 - 2x) - y = \frac{-3y + 4}{5}. \quad (1)$$

$$\frac{3 - 4x}{2} + 3x = \frac{y - 5}{7}. \quad (2)$$

(a) ആവരണ ചിഹ്നങ്ങളെ നീക്കുക.

(b) ഓരോ സമതന്ത്രത്തിലുമുള്ള ഫോമുകളുടെ അ. സാ. ഗുണിതംകൊണ്ട് അവയെ പെരുക്കി ഗുണകങ്ങളെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളാക്കുക.

ഇപ്പോൾ സമതന്ത്രങ്ങൾ ഫലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സൗകര്യമായ രൂപത്തിലാണ്.

ഉദാ: - 3. $\frac{y-4}{2} = \frac{2x+y}{8} = \frac{x+10}{5}$

ഇവയിൽനിന്ന് 3 സ്വതന്ത്ര സമതന്ത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാം.

$$\frac{y-4}{2} = \frac{2x+y}{8} \quad (1)$$

$$\frac{y-4}{2} = \frac{x+10}{5} \quad (2)$$

$$\frac{2x+y}{8} = \frac{x+10}{5} \quad (3)$$

ഏതെങ്കിലും രണ്ടു സമതന്ത്രങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച അവയുടെ ഫലം നിർണ്ണയിച്ചാൽ മതി.

അദ്ധ്യായം 25.

ഫലം നിർണ്ണയിക്കുക. 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം സത്യാവനം ചെയ്യുക.

1. $5x + 7y = 69; 5x + 3y = 41.$

2. $x + y = 37; x - y = 49.$

3. $2x - 17y = 32; 17x + 17y = -51.$

4. $14x - 23y = 76; 18y - 14x = -61.$

5. $9x + y = 8; 7x - 8y = 15.$

6. $11y + 3x = 59$; $13y - 9x = 283$.
7. $4x - 9y = 46$; $16x - y = 9$.
8. $14x - 25y = -9\frac{1}{2}$; $21x - 20y = -12\frac{1}{2}$.
9. $33x + 8y = 24$; $22x + 7y = 21$.
10. $35y - 6x = 29$; $21y + 2x = 23$.
11. $3x + 2y = 12$; $5x - 3y = 1$.
12. $13x + 7y = 93$; $6x + 11y = 74$.
13. $2y + 1 = 5x$; $4x - y - 4 = 5x - 2y$.
14. $5x = 2y$; $3(x - 3) = y - 8$.
15. $35 - (2 - y) = 7x$; $12y - (x + 10) = 9$.
16. $20 - 4(7 + x) = 5(y - 2x)$; $18 - 3(5y - 7) = 4x - 3$.
17. $5(3x + 2) + 173 = 3(2y - 3)$; $15y - 4(3y - 2) = -121$.
18. $\frac{3x}{2} = \frac{y+3}{4}$; $\frac{7x-4}{5} = \frac{y+3}{6}$.
19. $\frac{x}{2} + \frac{2}{3}(y+1) = x + y - 2$; $7x = 2y + 4$.
20. $\frac{3x+2}{10} = \frac{y+2}{4}$; $\frac{4}{7}(x+1) = \frac{2y}{3}$.
21. $\frac{7y-3x}{4} = \frac{3y+2x}{5} = 3$.
22. $\frac{5x+2y}{7} = 5 - \frac{y-2x}{3}$; $3x - y = y - 13x$.
23. $\frac{1}{2}(3x - 2y) = \frac{1}{4}(2x - y) + 3$; $\frac{1}{2}(5x - 4y) = \frac{1}{3}(4x - 3y) + 3$.
24. $\frac{1}{4}(a - b) + \frac{1}{3}(a + b) = 15$; $\frac{1}{3}(a - b) + \frac{1}{4}(a + b) = 13$.
25. $\frac{x+3y-4}{x-3y} = 7$; $\frac{2x+3y-6}{x+3y} = 8$.

(വിലങ്ങനെ പെരുക്കി സമീകാരങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക.)

26. $\cdot 3x + y = \cdot 9$; $\cdot 06x - \cdot 1y = \cdot 09$.
27. $x + \cdot 2y = \cdot 6$; $10\cdot 2x - \cdot 06y = \cdot 03$.
28. $13x - 5\cdot 8y = 20\cdot 2$; $\cdot 43x + \cdot 34y = 1\cdot 2$.
29. $47x + 61y = 56\frac{1}{3}$; $61x + 47y = 51\frac{2}{3}$.
30. $93x + 15y = 123$; $15x + 93y = 201$.
31. $49x - 57y = 172$; $57x - 49y = 252$.
32. $118y - 48x = -63\frac{1}{3}$; $118x - 48y = 75$.

$$33. \quad 3y - 7x - 37 = \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 0.$$

$$34. \quad 5y + 4 - 3x = \frac{y}{14} - \frac{x}{26} = 0.$$

$$35. \quad 3y - 5 = \frac{x - y}{4} = \frac{x + 1}{5}.$$

$$36. \quad 1\frac{1}{2}(x + y) = 8 - y = \frac{4(x + 3)}{5}.$$

$$37. \quad 1\frac{1}{2}x - \left\{ \frac{2y + x}{10} + y \right\} = \frac{x + 2}{3}; \quad 2x + 5 - \frac{15 - y}{4} \\ = 4y - \frac{7y + 11}{16}.$$

$$38. \quad \frac{x + 3}{4} - \frac{3y - 4x}{5} = 2y - 7; \quad \frac{x + 6}{2} + \frac{y - 8}{3} \\ = 29\frac{1}{2} - 5x.$$

$$39. \quad \frac{3 \cdot 3x - 1 \cdot 5(y - 1)}{4 \cdot 4} - \frac{y - x}{2 \cdot 5} = 2 \cdot 8 - 9y; \\ 10y - 8 = \frac{2(y - 2x)}{6}.$$

$$40. \quad (x - 7)(y - 3) = xy + 79; \quad x - y = 4.$$

$$41. \quad (x - 4)(y - 3) = xy - 84; \quad 6x - 5y - 27 = 0.$$

$$42. \quad (2x - 3)(3y - 2) = 6xy - 1; \quad (3x - 1)(5y + 2) \\ = 15xy - 10.$$

ചിലപ്പോൾ സമവാക്യങ്ങളുടെ ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ സഹായകരമായിരിക്കും.

$$\text{ഉദാ:—} \quad 5(3x + 1) - 2(2y - 1) = -16 \quad (1)$$

$$3(3x + 1) + 5(2y - 1) = 9 \quad (2)$$

$$3x + 1 = a, \quad 2y - 1 = b \quad \text{എന്നു വിചാരിക്കുക.}$$

$$\therefore 5a - 2b = -16 \quad (3)$$

$$3a + 5b = 9. \quad (4)$$

ഫലം നിർണ്ണയിച്ചാൽ $a = -2$, $b = 3$ എന്ന് കിട്ടും.

$$\therefore 3x + 1 = -2 \quad \therefore x = -1$$

$$\therefore 2y - 1 = 3 \quad \therefore y = 2.$$

അഞ്ചാതരാശി ഭിന്നിതങ്ങളുടെ ചേരുകമാകുമ്പോഴാണ് പ്രതികൃതം വളരെ ഉപകരിക്കുന്നത്.

$\frac{1}{x}$ നെ x ന്റെ വ്യുൽക്രമം (reciprocal) എന്നു പറയുന്നു.

$$\therefore y \text{ യുടെ വ്യുൽക്രമം} = \frac{1}{y}.$$

$\frac{2}{3}, \frac{1}{5}, 1, 7$ എന്നിവ $\frac{3}{2}, 5, 1, \frac{1}{7}$ എന്നിവയുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളാകുന്നു.

ഉദാ: — $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 5; \quad \frac{3}{x} + \frac{1}{y} = 5.$

$$\frac{1}{x} = a, \frac{1}{y} = b \text{ എന്നു വിചാരിക്കുക.}$$

a, b എന്ന രാശികളടങ്ങിയ സമവാക്യങ്ങളുടെ ഫലം നിർണ്ണയിക്കുക.

$$\text{അപ്പോൾ } x = \frac{1}{a}; \quad y = \frac{1}{b}.$$

ഈ സമവാക്യങ്ങളിൽ a, b എന്നിവയെ പ്രതികൃതപ്പെടുത്തി എഴുതുമ്പോൾ

$$a + 2b = 5$$

$$3a + b = 5.$$

ഫലം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ $a=1, b=2$

$$\therefore x=1, y=\frac{1}{2} \text{ എന്നു കിട്ടും.}$$

ആദ്യത്തെ സമവാക്യങ്ങളിൽ ഈ വിലകൾ ചേർത്തു സത്യം വന്നു ചെയ്യുക.

$$43. \quad 4(2x-3) - 3(y+2) = 29;$$

$$6(2x-3) + 4(y+2) = 18.$$

$$44. \quad 29(3x+1) + 17(2y+3) = 201;$$

$$17(3x+1) + 29(2y+3) = 213.$$

$$45. \quad \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1}{3}(y+3) = \frac{1}{4}; \quad \frac{2}{3}(x+1) - \frac{1}{5}(y+3) = \frac{1}{8}.$$

$$46. \quad \frac{10}{x} + \frac{6}{y} = 7; \quad \frac{8}{x} - \frac{9}{y} = 1.$$

$$47. \quad \frac{5}{x} + \frac{16}{y} = 79; \quad \frac{16}{x} - \frac{1}{y} = 44.$$

$$48. \quad 3x + \frac{5}{y} = \frac{1}{2}; \quad 5x - \frac{3}{y} = 6\frac{1}{2}.$$

$$49. \quad \frac{1}{x} + 4y = \frac{7}{4}; \quad \frac{1}{2x} - \frac{3}{4}y = 3$$

$$50. \frac{4}{x-1} + \frac{5}{y+3} = 2; \quad \frac{25}{y+3} - \frac{16}{x-1} = 1.$$

$$51. \frac{2}{3(5x+3)} - \frac{3}{4(2y-7)} = \frac{1}{36};$$

$$\frac{4}{5(5x+3)} + \frac{9}{10(2y-7)} = -\frac{1}{6}.$$

$$52. \frac{8}{21(x-1)} + \frac{2}{7(y+1)} = \frac{1}{3}; \quad \frac{4}{5(x-1)} + \frac{1}{5(y+1)} = \frac{1}{2}.$$

$$53. 4x+y=3xy; \quad 2x+3y=4xy.$$

xy യുടെ ഗുണകങ്ങൾ സമമാക്കിക്കിട്ടുന്ന സമതപങ്ങൾ തമ്മിൽ x ഉം y ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടു പ്രതിപ്രസിദ്ധിക്കുക.

$$54. 8x+9y=5xy; \quad 12y-4x=3xy.$$

അക്ഷരഗുണകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമതപങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

$$55. x+y=2a; \quad x-y=2b.$$

$$56. 2x+y=5a+b; \quad 3x+4y=10a-b.$$

$$57. ax+by=c; \quad x-y=d.$$

$$58. mx+y=ma; \quad x+my=a$$

$$59. ax+by=x+y=c.$$

$$60. x+ay=b; \quad ax-by=c$$

അദ്ധ്യായം 13.

ഏകകാലികസമതപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു
ചെയ്യാവുന്ന കണക്കുകൾ.

(Problems leading to Simultaneous equations).

അങ്കഗണിതത്തിലെ ചില കണക്കുകളെ ഏകഘാത സമതപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗം നാം പഠിച്ചുവല്ലോ. കാരണമെന്ന രാശികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഏകകാലികസമതപങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. ഏകകാലികസമതപങ്ങളെ ഉപയോഗി-

ഗിച്ചുകണക്കു ചെയ്യുന്ന മാറ്റം താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ചിലതിനെ ഏകഘാതസമത്വങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്യാമെങ്കിലും ഏകകാലികസമത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധികം സൗകര്യവും എളുപ്പവും ആയിരിക്കും.

ഉദാ:— 1. രണ്ടു സംഖ്യകളിൽ ഒന്നിന്റെ 5 ഇരട്ടിയിൽനിന്ന് മറേറതിന്റെ 6 ഇരട്ടി കിഴിച്ചാൽ 9 കിട്ടും. ഒന്നാമത്തേതിന്റെ $\frac{2}{3}$ മറേറതിന്റെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടിയേക്കാൾ 10 കുറവാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ കാണുക. ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ x എന്നും മറേറതു y എന്നും വിചാരിക്കുക.

$$\therefore 5x - 6y = 9 \quad (1)$$

$$\frac{2}{3}x + 10 = 1\frac{1}{2}y \quad (2)$$

ഈ രണ്ടു സമത്വങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിച്ചാൽ,

$$x = 21, y = 16 \text{ എന്നു കിട്ടും.}$$

$$\therefore \text{ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ} = 21. \text{ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ} = 16.$$

കണക്കിൽ അടങ്ങിയ രണ്ട് ഉപാധികളും ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നു വിദ്യാർത്ഥി പരിശോധിക്കണം.

2. 9 റാത്തൽ ചായക്കും 11 റാത്തൽ കാപ്പിക്കും കൂടി 16 രൂ. 2 റൂ. 3 പ. വില. 14 റാത്തൽ ചായക്ക് 12 റാത്തൽ കാപ്പിയെക്കാൾ 1 രൂ. അധികം വിലയായാൽ കാരോന്നിന്നും റാത്തലൊന്നിന് വിലയെന്തു?

ഒരു റാത്തൽ ചായക്ക് x രൂ.യും ഒരു റാത്തൽ കാപ്പിക്ക് y രൂ.യും വിലയുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക.

$$\therefore 9x + 11y = 258\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$14x - 12y = 16 \quad (2)$$

ഈ രണ്ടു സമത്വങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിച്ചാൽ,

$$x = 12\frac{1}{2}, y = 13\frac{1}{4}.$$

$$\therefore 1 \text{ റാത്തൽ ചായയുടെ വില} = 12 \text{ രൂ. 6 പ.}$$

$$\therefore 1 \text{ ,, കാപ്പിയുടെ ,,} = 13 \text{ രൂ. 3 പ.}$$

ഈ ഉത്തരം ശരിയോ എന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പരിശോധിക്കണം.

3. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു സ്കൂളിലേക്ക് സൈക്കിളിന്മേൽ സവാരി ചെയ്യുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 2 നാഴിക വീതം അധികം പോകുന്നതായാൽ 6 മിനുട്ടു മുമ്പ് എത്തും. മണിക്കൂറിൽ 2 നാഴിക വീതം കുറച്ചുപോകുന്ന

തായാൽ 10 മിനുട്ടു വൈകി എത്തും. എന്നാൽ അവന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു സ്ത്രീ ലേക്കുള്ള ദൂരം കാണുക.

മണിക്കൂറിൽ x നാഴിക പോകുമ്പോൾ y മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും എന്നു വിചാരിക്കുക.

$\therefore$ മണിക്കൂറിൽ 2 നാഴികവീതം അധികം പോകുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന സമയം $= (y - \frac{1}{6})$ മണിക്കൂർ.

മണിക്കൂറിൽ 2 നാഴിക വീതം കുറച്ചുപോകുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന സമയം $= (y + \frac{1}{6})$ മണിക്കൂർ. അതുകൊണ്ടു ദൂരത്തെ മൂന്നുവിധത്തിൽ കണക്കാക്കാം.

$$\text{ദൂരം} = xy \text{ നാഴിക} = (x+2)(y - \frac{1}{6}) \text{ നാഴിക} = (x-2)(y + \frac{1}{6}) \text{ നാഴിക.}$$

ആദ്യത്തെ രണ്ടു വ്യഞ്ജകങ്ങളെ ചുരുക്കിക്കിട്ടുന്ന സമതപം,

$$xy = xy + 2y - \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}$$

$$\therefore 2y - \frac{1}{6}x = \frac{1}{6}$$

$$10 \text{ കൊണ്ടു് പെരയ്ക്കുമ്പോൾ } 20y - x = 2. \quad (1)$$

ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വ്യഞ്ജകങ്ങളെ ചുരുക്കുമ്പോൾ,

$$xy = xy - 2y + \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{6}x - 2y = \frac{1}{6}$$

6 കൊണ്ടു് പെരയ്ക്കുമ്പോൾ,

$$x - 12y = 2. \quad (2)$$

ഒന്നും രണ്ടും സമതപങ്ങളുടെ ഫലം നിണ്ണയിക്കുമ്പോൾ $y = \frac{1}{2}, x = 8$ എന്നും കിട്ടും.

$\therefore$ ദൂരം = 4 നാഴിക.

ഈ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക.

അ ഭൂ ധ സ ൦ 26.

1. ഒരു സംഖ്യയിൽനിന്നു് വേറൊരു സംഖ്യയുടെ 3 ഇരട്ടി കിഴിച്ചാൽ 2 ബാക്കി കിട്ടും. വലിയ സംഖ്യയുടെ 3 ഇരട്ടിയോടു് ചെറിയ സംഖ്യയുടെ 4 ഇരട്ടി കൂട്ടിയാൽ 230 കിട്ടും. എന്നാൽ സംഖ്യകൾ കാണുക.

2. 3 സംഖ്യകളുടെ തുക 100. ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽനിന്നു് മൂന്നാമത്തേതു് കിഴിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടും. ഒന്നാമത്തേതിൽനിന്നു് രണ്ടാമത്തേതു് കിഴിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തേതിന്റെ 7 ഇരട്ടി കിട്ടും. എന്നാൽ സംഖ്യകൾ കാണുക.

3. രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം അവയുടെ തുകയുടെ $\frac{4}{11}$ ആണു്. ഒന്നിന്റെ $\frac{2}{3}$ നോടു് 5 കൂട്ടിയാൽ മററതിന്റെ $\frac{1}{6}$ കിട്ടും. എന്നാൽ സംഖ്യകൾ കാണുക.

4. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയോട് 10 കൂട്ടി 8 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അവയുടെ വ്യത്യാസത്തേക്കാൾ 1 കുറവാണ്. വലിയ സംഖ്യയുടെ പകുതിയും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ കാലംഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 6 ആണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ കാണുക.

5. 5 സ്ത്രീകൾക്കും 8 പുരുഷന്മാർക്കും കൂടി 3 ദിവസത്തിൽ 20 ക. 10 ണ. കൂലികിട്ടുന്നു. 11 സ്ത്രീകൾക്കും 10 പുരുഷന്മാർക്കുംകൂടി 1 ദിവസത്തിൽ 10 ക. 6 ണ. കൂലികിട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര കൂലി കിട്ടും?

6. 1 അണക്ക് 3 വീതം കുറേ മാങ്ങയും ഡജൻ 5 ണ. വീതം കുറേ നാരങ്ങയും വാങ്ങിയതിന് 4 ക. 6 ണ. വിലയായി. മാങ്ങക്ക് നാരങ്ങയുടെ വിലയും നാരങ്ങക്ക് മാങ്ങയുടെ വിലയും കൊടുക്കുന്നതായാൽ ആകെ 6 പൈ വില കുറവുണ്ടാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വാങ്ങിയ മാങ്ങയെത്ര? നാരങ്ങയെത്ര?

7. 3 പുരുഷന്മാരും 2 കുട്ടികളും കൂടി 1 പണി 4 ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്യും. അതേ പണി 2 പുരുഷന്മാരും 3 കുട്ടികളുംകൂടി 5 ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ 7 പുരുഷന്മാരും 13 കുട്ടികളുംകൂടി ആ പണി എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്യും?

8. ഒരു വ്യോപാരി 8 പശുക്കളേയും 5 ആടുകളേയും വാങ്ങി, അവയെ വിറ്ററപ്പോൾ അയാൾക്ക് 65 ക. ലാഭം കിട്ടി. 4 പശുക്കളേയും 15 ആടുകളേയും അതേപ്രകാരം വാങ്ങി വിറ്ററിനെന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 70 ക. ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ കാലിയുടെ വിലയിന്മേലും അയാൾക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടി?

(ഒരു പശുവിന്റെ വിലയിന്മേൽ ൪ ക.യും ഒരു ആട്ടിന്റെ വിലയിന്മേൽ ൮ ക.യും ലാഭം കിട്ടിയെന്ന വിചാരിക്കുക.)

9. ഒരു കാലിക്കച്ചവടക്കാരൻ 8 പശുക്കളേയും 5 ആടുകളേയും ഒരു ചന്തയിൽനിന്നു വാങ്ങി വിറ്ററപ്പോൾ അയാൾക്ക് 35 ക. ലാഭം കിട്ടി. 12 പശുക്കളേയും 15 ആടുകളേയും അതേപ്രകാരം വാങ്ങി വില്ക്കുന്നതായാൽ 30 ക. ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ കാലിയുടെ വിലയിന്മേലും ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര? (ഒരു പശുവിന്റെ വിലയിന്മേൽ ലാഭം ൪ ക. എന്നും ഒരു ആട്ടിന്റെ വിലയിന്മേൽ ലാഭം ൮ ക. എന്നും വിചാരിക്കുക. ഉത്തരം പൂണ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്).

10. വീയുടെ ഓഹരി ഏയുടെ ഓഹരിയുടെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടിയേക്കാൾ 5 ക. കുറഞ്ഞും ഏയുടെ ഓഹരി സീയുടെ ഓഹരിയുടെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ 30 ക. കവിഞ്ഞും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം 370 ക. അവർക്കു മൂന്നുപേർക്കും ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുക.

11. ഏഷ് വീയേക്കാൾ സീയുടെ കാഹരിയുടെ പകുതി അധികവും വീഷ് ഏയുടെ കാഹരിയുടെ പകുതിയും സീയുടെ കാഹരിയുടെ $\frac{1}{5}$ ഉം കൂടിയത്രയും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം 825ക. അവർക്കു മുമ്പേക്കും ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുക.

12. അന്ന, കാലന്ന, പൈ കൂടി ഒരു സഞ്ചിയിൽ ആകെ 78 നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടു്. കാലന്നനാണയങ്ങളുടെ വില അന്നനാണയങ്ങളുടെ വിലയേക്കാൾ 1ന്ന. അധികമാണു്. സഞ്ചിയിൽ ആകെ 1ക. 2ന്ന. 3പ. ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരോ തരം നാണയങ്ങളെത്ര?

13. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് ഏ, ബി എന്നിവരുടെ വയസ്സ് 2:5 എന്ന സംബന്ധത്തിലായിരുന്നു. 12 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വയസ്സ് 5:7 എന്ന സംബന്ധത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ വയസ്സ് കാണുക.

14. ഒരാൾക്കു് അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും വയസ്സ് കൂടിയത്ര വയസ്സുണ്ടു്. 10 കൊല്ലം മുമ്പു് അയാൾക്കു് ഭാര്യയുടെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടി വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മക്കു മകന്റെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടി വയസ്സുണ്ടാകും. എന്നാൽ കാരോരുത്തരുടേയും വയസ്സ് കാണുക.

15. രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുകകൊണ്ടു് സംഖ്യയെ ഹരിക്കുന്നതായാൽ ഹരിതഫലം 6. അക്കങ്ങളെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ സംഖ്യയുടെ വില 9 കറയും. എന്നാൽ സംഖ്യ കാണുക.

16. ഒരു സംഖ്യ 10നും 100നും ഇടയിലാണു്. സംഖ്യയും അതിന്റെ അക്കങ്ങളെ തിരിച്ചെഴുതിയാലുണ്ടാകുന്ന സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ 121. സംഖ്യ കൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 27. എന്നാൽ സംഖ്യ കാണുക.

17. 3 സ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 18. ഒന്നിന്റെയും പത്തിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അക്കങ്ങളെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ സംഖ്യയുടെ വില 45 കറയും. പത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അക്കങ്ങളെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ വില 90 അധികമാകും. എന്നാൽ സംഖ്യ കാണുക.

18. 3 സ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിലെ അക്കം മറ്റു രണ്ടു അക്കങ്ങളുടെ തുകയോടു് സമമാകുന്നു. സംഖ്യ അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ 44 ഇരട്ടിയാണു്. ഒന്നിന്റെയും നൂറിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിലെ അക്കങ്ങളെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ സംഖ്യയുടെ വില 495 കറയും. എന്നാൽ സംഖ്യ കാണുക.

19. ഒരു ഭിന്നിതത്തിന്റെ അംശത്തിനോടും ഛേദകത്തിനോടും 5 വീതം കൂട്ടിയാൽ അതു $\frac{1}{5}$ നോടു് സമമായിരിക്കും. രണ്ടിൽനിന്നും 4 വീതം കിഴിക്കുന്നതായാൽ ഭിന്നിതം $\frac{1}{5}$ യോടു് സമമാകും. എന്നാൽ ഭിന്നിതം കാണുക.

20. ഒരു ഭിന്നിതത്തിന്റെ മേദകം അംശത്തിന്റെ 3 ഇരട്ടിയേക്കാൾ 2 അധികമാണ്; അതിന്റെ മേദകത്തിന്റെയും അംശത്തിന്റെയും തുകയും വ്യത്യാസവും യഥാക്രമം മേദകവും അംശവും ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നിതം $\frac{15}{16}$ നോട്ട സമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭിന്നിതം കാണുക.

21. ഒരു ഭിന്നിതത്തിന്റെ അംശത്തിനോടു $\frac{1}{2}$ കൂട്ടിയാൽ ഭിന്നിതത്തിന്റെ വില $\frac{1}{2}$ യോടു സമാകും. മേദകത്തിനോടു $\frac{1}{2}$ കൂട്ടിയാൽ ഭിന്നിതത്തിന്റെ വില $\frac{4}{9}$ നോടു സമാകും. എന്നാൽ ഭിന്നിതം കാണുക.

22. ഒരു ഭിന്നിതത്തിന്റെ അംശം 11 ആണ്. അംശത്തിനോടും മേദകത്തിനോടും ഒരേ സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഭിന്നിതത്തിന്റെ വില $\frac{7}{5}$ ആയിത്തീർന്നു. അതേ സംഖ്യ അംശത്തിൽനിന്നും മേദകത്തിൽനിന്നും കിഴിക്കുന്നതായാൽ മേദകം അംശത്തിന്റെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടിയാകും. എന്നാൽ ഭിന്നിതത്തിന്റെ മേദകം കാണുക.

23. ഒരു മുറിയുടെ നീളം 2 അടി കുറയുകയും വീതി 3 അടി അധികമാകുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം 31 ച.അടി അധികമാകും. നീളം 3 അടി അധികമാകുകയും വീതി 2 അടി കുറയുകയും ചെയ്താൽ ക്ഷേത്രഫലം 6 ച.അടി അധികമാകും. എന്നാൽ മുറിയുടെ നീളവും വീതിയും കാണുക.

24. 120 വാര ചുറ്റളവുള്ള ഒരു മുറിയുടെ നീളം 4 വാര അധികമാകുകയും വീതി 4 വാര കുറയുകയും ചെയ്താൽ മുറിയുടെ ക്ഷേത്രഫലം 64 ച.വാര കുറയും. എന്നാൽ മുറിയുടെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

25. ഒരു പായയുടെ നീളത്തോടു 5 അംഗുലം കൂട്ടുകയും വീതിയിൽനിന്നു 4 അംഗുലം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ വീതി നീളത്തിന്റെ $\frac{7}{8}$ ആകും; എങ്കിലും ക്ഷേത്രഫലം വ്യത്യാസപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ പായയുടെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക.

26. ഒരാൾക്ക് കണ്ണൂരിൽനിന്നു തലശ്ശേരിയിലേക്ക് ബസ്സിലും തലശ്ശേരിയിൽനിന്ന് മയ്യഴിയിലേക്ക് തീവണ്ടിയിലും യാത്രചെയ്താൻ 1 മണിക്കൂർ 10 മിനുട്ട് വേണ്ടിവരുന്നു. തിരിച്ചു തലശ്ശേരിയിലേക്ക് ബസ്സിലും അവിടെനിന്നു തീവണ്ടിയിലും യാത്ര ചെയ്താൽ കണ്ണൂരിലെത്തുവാൻ 1 മണിക്കൂർ 3 മിനുട്ട് വേണ്ടിവരും. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ബസ്സ് 15 നാഴികയും തീവണ്ടി 20 നാഴികയും പോകുമെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിൽനിന്നു മറ്റു രണ്ടു പട്ടണങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണുക.

27. ഒരാൾക്ക് 7 നാഴിക കൽനടയായും 8 നാഴിക കതിരവണ്ടിയിലും യാത്ര ചെയ്താൻ ആകെ 3 മണിക്കൂർ 8 മിനുട്ട് വേണ്ടിവന്നു. 7 നാഴിക കതിരവണ്ടിയിലും 8 നാഴിക നടന്നും പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ 14 മിനുട്ട് അധി

കാ വേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മണിക്കൂറിൽ അയാൾ എത്ര നാഴിക നടന്നു?

28. ഒരാൾ കറേ ടൂറം നടന്നു. മണിക്കൂറിൽ $\frac{1}{2}$ നാഴിക അധികം നടക്കുന്നതായാൽ സാധാരണ വേണ്ടുന്ന സമയത്തിന്റെ $\frac{4}{5}$ ഭാഗമായിരുന്നു. മണിക്കൂറിൽ $\frac{1}{2}$ നാഴിക കറച്ചു നടക്കുന്നതായാൽ $2\frac{1}{2}$ മണിക്കൂർ അധികം സമയം വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ അയാൾ നടന്ന ടൂറം എത്ര?

29. ഏയിൽനിന്ന് ബീയിലേക്കു കാട്ടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന് കേട്ടു പററുകയാൽ അതിന്റെ ഗതിവേഗം മണിക്കൂറിൽ 5 നാഴിക വീതം കുറയുകയും തന്നിമിത്തം അതു ബീയിൽ $1\frac{3}{4}$ മണിക്കൂർ വൈകി എത്തുകയും ചെയ്തു. സാധാരണമായി ഇതിനേക്കാൾ മണിക്കൂറിൽ 10 നാഴിക അധികം കാട്ടുന്ന ഒരു മെയിൽവണ്ടിക്ക് ഏയിൽനിന്നു ബീയിലേക്കു പോകുവാൻ 2 മണിക്കൂർ കുറച്ചുവരിയെങ്കിൽ ഏയിൽനിന്നു ബീയിലേക്കുള്ള ടൂറം കാണുക.

30. ഏ, ബീ എന്ന രണ്ടുപേർ സീയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 55 നാഴിക ദൂരെയുള്ള ഡി എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കു് സൈക്കിളിന്മേൽ സവാരി ചെയ്തു. ഏ, ബീയേക്കാൾ 30 മിനുട്ട് മുമ്പ് ഡിയിൽ എത്തി. തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ബീ, ഡിയിൽനിന്ന് 4 നാഴിക ദൂരെത്തന്നെയുള്ള സമയത്തു് ഏ പുറപ്പെടുകയും ബീ എത്തുന്നതിന് 6 മിനുട്ട് മുമ്പ് സീയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കാരോ ആളും മണിക്കൂറിൽ സവാരി ചെയ്ത ടൂറം എത്ര?

31. തമ്മിൽ 12 നാഴിക ദൂരമുള്ള രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് രണ്ടു പേർ ഒരേ സമയത്തു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. രണ്ടു പേരും ഒരേ വശത്തേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നതായാൽ 6 മണിക്കൂർകൊണ്ടു് അവർ ഒരുമിച്ചെത്തും. എതിരായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതായാൽ 1 മണിക്കൂർ 20 മിനുട്ടിൽ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും. എന്നാൽ കാരോ ആളും മണിക്കൂറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ടൂറം എത്ര?

32. തമ്മിൽ 1 നാഴിക ദൂരമുള്ള രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരേ സമയത്തു് രണ്ടു പേർ ഒരേവശത്തേക്കു് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 40 മിനുട്ടുകൊണ്ടും എതിരായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 8 മിനുട്ടുകൊണ്ടും ഒന്നായിച്ചേരുന്നവെങ്കിൽ അവരോരോരുത്തരും 1 മണിക്കൂറിൽ പോകുന്ന ടൂറം കാണുക.

33. ഏയിൽനിന്ന് ബീ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത കറേ ടൂറം കയററവും ബാക്കി ഇറക്കവും ആയിട്ടുള്ള നിലത്തിൽ കൂടിയാണ് പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. കയററത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 10 നാഴികയും ഇറക്കത്തിൽ 12 നാഴികയും വീതം കാട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏയിൽനിന്നു ബീയിലേക്കു പോകുവാൻ 39 മിനുട്ടും തിരിച്ചു ഏയിലേക്കു പോകുവാൻ 38 മിനുട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഏയിൽനിന്നു ബീയിലേക്കുള്ള ടൂറം എത്ര?

34. ഏ, ബീ എന്ന രണ്ടു പട്ടണങ്ങൾ 40 നാഴിക അകലെയാണ്. ഏയിൽനിന്ന് ബീയിലേക്കുള്ള നിരന്തു് കറേ ളും സമനിരപ്പും കറേ ളും കയററവും ബാക്കി ഇറക്കവും ആകുന്നു. സമനിരപ്പന്തു് മണിക്കൂറിൽ 20 നാഴികയും കയററത്തിൽ 15 നാഴികയും ഇറക്കത്തിൽ 24 നാഴികയും ഓടുന്ന ഒരു മോട്ടോർ കാറിന് ഏയിൽനിന്നു ബീയിലേക്ക് പോകുവാൻ 2 മണിക്കൂർ 1 മിനുട്ടും ബീയിൽനിന്ന് ഏയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുവാൻ 2 മണിക്കൂർ 4 മിനുട്ടും വേണ്ടിവരുന്നെങ്കിൽ ഏയിൽനിന്ന് ബീയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര നാഴിക കയററമുണ്ടു്? എത്ര നാഴിക ഇറക്കമുണ്ടു്?

35. ഒരു സ്ത്രീയിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ മരയാപടം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് കറെ കട്ടികൾകൂടി പണം വരിയിട്ടെടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. 16 പേക്കു പണം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ബാക്കി ഓരോ കട്ടിയും $\frac{1}{2}$ ണ. വീതം അധികം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. 48 കട്ടികൾകൂടി പണം കൊടുക്കുന്നതായാൽ ഓരോ കട്ടിയും $\frac{1}{3}$ ണ. കുറച്ചുകൊടുത്താൽ മതിയാകും. എന്നാൽ എത്ര വിലക്കുള്ള പടമാണ് വാങ്ങുവാൻ നിശ്ചയിച്ചതു്?

36. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കറെ ചാക്ക് അരിവാങ്ങി. 5 ചാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ബാക്കി ചാക്കിന് 8 ണ. വീതം വില കയററിയപ്പോൾ അയാളുടെ മുതൽ കിട്ടി. 16 ചാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വരാതിരിപ്പാൻ ചാക്കൊന്നിന് 1 ക. 14 ണ. വില കയററി വില്പിക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അരിയ്ക്കു ആകെ എന്തു മുതലുണ്ടായിരുന്നു?

37. ഒരു കതിരയേയും വണ്ടിയേയും 815 ക.ക്ക് വിററപ്പോൾ കതിരയുടെ മുതലിന്മേൽ 25%വും വണ്ടിയുടെ മുതലിന്മേൽ 10%വും ലാഭം കിട്ടി. കതിരയുടെ വിലയിന്മേൽ 10%വും വണ്ടിയുടെ വിലയിന്മേൽ 25%വും ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടിനേയും കൂടി 830 ക.ക്ക് വില്ക്കണം. എന്നാൽ ഓരോന്നിന്മേലുമുള്ള മുതൽ കാണുക.

38. ഒരു കാളയെ $6\frac{1}{2}\%$ ലാഭത്തിനും ഒരു പശുവിനെ $12\frac{1}{2}\%$ നഷ്ടത്തിനും വിററപ്പോൾ എനിക്കു 2 ക. 10 ണ. നഷ്ടം വന്നു. രണ്ടിനേയും കൂടി $8\frac{1}{3}\%$ ലാഭത്തിന് വിററിയെന്നെങ്കിൽ ആകെ 104 ക. വില കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോന്നിന്റെയും വില എത്ര?

39. ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ആപ്പീസിൻനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഞ്ചിന് കേടുപററുകയാൽ 42 മിനുട്ടു് വഴിയിൽ നില്ക്കേണ്ടിവന്നു. അതിന്നു ശേഷം മണിക്കൂറിൽ 5 നാഴിക കുറച്ച ഓടിയതിനാൽ വണ്ടി എന്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തു് $1\frac{1}{2}$ മണിക്കൂർ വൈകിച്ചെത്തു. വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേടു പററുകയും വഴിയിൽ $1\frac{1}{2}$ മണിക്കൂർ നിന്ന് ബാക്കി ളും 6 നാഴിക

വീതം കുറച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മുന്തിലത്തെ അത്ര തന്നെ വൈകി ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വണ്ടി ആകെ കെട്ടിയ ദൂരം എത്ര?

സുൽഫൈനൽ പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ.

40. ഏ, ബി എന്ന രണ്ടു പേർ കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എ 20 ക. നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ബിയുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ $\frac{1}{3}$ ആയിരുന്നു. പിന്നെ എ നഷ്ടപ്പെട്ട 20 ഉറപ്പികൾ പുറമെ ബിയിൽനിന്ന് 50 ക.യും കൂടി നേടി. അപ്പോൾ അയാളുടെ വശം ഉണ്ടായിരുന്ന സംഖ്യ ബിയുടെ വശം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ $1\frac{1}{2}$ ഇരട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വശം ആദ്യം എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? (1947)

41. പുരുഷന് 5 റൂ. 6 പ. വീതവും കുട്ടിക്ക് 3 റൂ. 6 പ. വീതവും കറേ ടിക്കറ്റാക്ക് കൊടുപ്പാൻ 12 ക. 10 റൂ. വേണ്ടിവരും. പുരുഷന് 6 പ. കുറച്ചും കുട്ടിക്ക് 6 പ. അധികവും കൊടുക്കുന്നതായാൽ 2 റൂ. ബാക്കിയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ടിക്കറ്റുണ്ടായെങ്കിലും എണ്ണം കാണുക. (1919)

42. ഒരാൾ നാഴികക്ക് തീവണ്ടിക്രൂലി 3 പ.യും തോണിക്രൂലി 6 പ.യും വീതം കൊടുത്തു കറേ ദൂരം യാത്രചെയ്തതിന്ന് ആകെ ക്രൂലി 3 ക. 12 റൂ. യായി. തീവണ്ടിക്രൂലി നാഴികക്ക് $\frac{1}{2}$ പ. കുറവും തോണിക്രൂലി 1 പ. അധികവും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ ക്രൂലി 5 റൂ. അധികമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ തീവണ്ടിയിലും തോണിയിലും യാത്രചെയ്ത ദൂരം വെച്ചേറെ കാണുക. (1927)

43. 78 പുരുഷന്മാർക്ക് 25 സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി ലിവസത്തിൽ 116 ക. 4 റൂ. ക്രൂലി കിട്ടുന്നു. 5 പുരുഷന്മാർക്ക് 7 സ്ത്രീകളെക്കാൾ 1 ക. അധികം ക്രൂലി കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ലിവസക്രൂലി വെച്ചേറെ കാണുക. (1931)

44. ഒരാൾ ഒരു വീട്ടും തോട്ടവും വാങ്ങി. വീട്ട് 12% ലാഭത്തിനും തോട്ടം 16% നഷ്ടത്തിനും വിറ്റപ്പോൾ ആകെ 380 ക. ലാഭം കിട്ടി. വീട്ട് 14% ലാഭത്തിനും തോട്ടം 20% നഷ്ടത്തിനും വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആകെ 30 ക. അധികം ലാഭം കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടിന്റെയും തോട്ടത്തിന്റെയും മുതൽ വെച്ചേറെ കാണുക. (1932)

45. ഏയിൽനിന്ന് ബീയിലേക്കുള്ള വഴി കയറവും ബീയിൽനിന്ന് സീയിലേക്ക് സമനിരപ്പും സീയിൽനിന്ന് ഡീയിലേക്ക് ഇറക്കുവുമാണ്. ഒരാൾ ഏയിൽനിന്ന് ഡീയിലേക്ക് കയററത്തിൽ 2 നാഴികയും സമനിരപ്പിൽ 3 നാഴികയും ഇറക്കത്തിൽ 4 നാഴികയും വീതം യാത്ര

ചെയ്യുപോൾ ആകെ m മണിക്കൂറും തിരിച്ച് ഏയിലേക്ക് പോവാൻ n മണിക്കൂറും വേണ്ടിവന്നു. സമനിരപ്പായ വഴി ഏയിൽനിന്നു ബീയിലേക്കുള്ള കയററത്തിന്റെ ഇരട്ടി ദൂരമാണെങ്കിൽ സമനിരപ്പായ ദൂരം കാണുക.

(1933)

അദ്ധ്യായം 14.

സരളരേഖാലേഖാചിത്രങ്ങൾ (Straight Line Graphs).


ഒ എന്ന മൂലബിന്ദുവിൽകൂടി ഒരു സരളരേഖ വരക്കുക. ഈ സരളരേഖമേലുള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ പ്രഥമനിയാമകം വലിക്കുന്നതോടുകൂടി അവയുടെ ദ്വിതീയ നിയാമകവും അതേ തോതിൽ വലിക്കുമെന്നതു സ്പഷ്ടമാണ്. അതായത് ഒരു സരളരേഖയായ ഒരു ലേഖാചിത്രത്തിലുള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ പ്രഥമനിയാമകം ദ്വിതീയ നിയാമകത്തിന്നു ക്രമാനുപാതമായിരിക്കും. ഇതുനിമിത്തം പരസ്പരം ക്രമാനുപാതമായ രാശികളുടെ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ലേഖാചിത്രം ഒരു സരളരേഖയായിരിക്കും. ഇതിനാൽ നിദ്ദിഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഒരു സരളരേഖ വരക്കുന്നതിനാൽ പരസ്പരം ക്രമാനുപാതമായ പരിമാണങ്ങളെ ഗണിക്കുവാനും ഒരുതരം അളവുകൾക്കു സമമായ അളവുകളുടെ വലിപ്പം കാണുവാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഇത്തരം സരളരേഖാലേഖാചിത്രങ്ങളെ Conversion Graphs എന്നു പറയുന്നു.

ഉദാ:-1. 14 പുസ്തകത്തിന്നു 35 ക. വില. എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ എണ്ണവും വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖാചിത്രം വരച്ചു അതിൽനിന്നു (1) 20 പുസ്തകത്തിന്റെ വിലയും (2) 20 ക.ക്കു എത്ര പുസ്തകം കിട്ടുമെന്നും കാണുക.

(1) പുസ്തകത്തിന്റെ വില എണ്ണത്തിന്നു ക്രമാനുപാതമായതുകൊണ്ടു ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ലേഖാചിത്രം ഒരു സരളരേഖയായിരിക്കും.

അതുകൊണ്ട് ലേഖാചിത്രത്തിന്മേലുള്ള രണ്ടു ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചാൽ ലേഖാചിത്രം വരക്കാം.

(2) മൂലബിന്ദു ലേഖാചിത്രത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണെന്നു സ്വീകരിക്കാം.



14 പുസ്തകങ്ങളേയും 35 കേരളയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബിന്ദുവും ലേഖാചിത്രത്തിന്മേലായിരിക്കും.

ഈ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സരളരേഖയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ട ലേഖാചിത്രം.

(3) തോത്:

x അക്ഷത്തിൽ $1'' = 10$ പുസ്തകം.

y അക്ഷത്തിൽ $1'' = 25$ ക.

(4) ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചപ്രകാരം അക്ഷങ്ങൾക്കു ലംബരേഖകൾ വരച്ചു ഉത്തരം കാണുക.

(5) ഒരു സരളരേഖ നിശ്ചയിപ്പാൻ 2 ബിന്ദുക്കൾ മതിയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവും കൂടി കറിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. കാരണം രണ്ടു ബിന്ദുക്കൾ കറിക്കുന്നതിൽ വല്ല തെറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബിന്ദു കറിക്കുന്നതിനാൽ ആ തെറ്റു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

അദ്വൈതം 27.

1. 60 നാഴിക യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തീവണ്ടിക്രമി 1ക. 9ണ.യാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൂരവും തീവണ്ടിക്രമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖചിത്രം വരയ്ക്കുക.

അതിൽനിന്നു (a) 84 നാഴിക (b) 36 നാഴിക യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള തീവണ്ടിക്രമിയും (c) 2ക. 8ണ. (d) 1ക. 14ണ. ക്രമികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൂരവും കാണുക.

2. 20 ഡോളർ = 95ക.യാണെങ്കിൽ ഒരു ലേഖചിത്രം വരച്ചു താഴെ പറയുന്നവ കാണുക.

(a) 15 ഡോളർ (b) 55 ഡോളർ എത്ര ഉറപ്പികൾ സമമാണ്?

(c) 150ക. (d) 70ക. എത്ര ഡോളറിന്നു സമമാണ്?

3. 15 സെ.മീ. = 5.9" എന്നു കരുതി ഈ നീളങ്ങളെക്കുറിച്ച് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖചിത്രം വരയ്ക്കുക. ലേഖചിത്രത്തിൽനിന്നു 4 സെ.മീ., 10 സെ.മീ. എന്നിവ എത്ര അംഗുലമാണെന്നു (അംഗുലത്തിന്റെ ദശാംശംവരെ കൃത്യമായി) കാണുക. 2.8", 4.5" എന്നിവ എത്ര സെ.മീ. ആണെന്നു (മി.മീ.വരെ കൃത്യമായി) കാണുക.

4. 10.കിലോഗ്രാം = 22 റാത്തൽ. കി.ഗ്രാമും റാത്തലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖചിത്രം വരയ്ക്കുക. ചിത്രത്തിൽനിന്നു 2.7 കി.ഗ്രാം എത്ര റാത്തലാണെന്നു (ദശാംശം വരെ കൃത്യമായി) കാണുക. 8.4 റാത്തൽ എത്ര കി.ഗ്രാം ആണെന്നു (ദശാംശംവരെ കൃത്യമായി) കാണുക. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയോയെന്നു ഗണിച്ചുനോക്കുക. (1936)

5. 1 മണിക്കൂറിൽ 30 നാഴിക ഗതിവേഗം, സെക്കണ്ടിൽ 44' ആണെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ 40, 28, 15, 9 നാഴിക യഥാക്രമം സെക്കണ്ടിൽ എത്ര അടി യാണെന്നു ഒരു ലേഖചിത്രം വരച്ചു കാണുക. സെക്കണ്ടിൽ 15, 26, 36, 50 അടി മണിക്കൂറിൽ എത്ര നാഴികകൾ സമമാണെന്നും ചിത്രത്തിൽനിന്നു കാണുക.

6. 1 ഡജൻ നാരങ്ങകൾ 7ണ.യും 20 മാങ്ങകൾ 9ണ.യും വിലയുണ്ട്. ഒരേ കടപ്പാടിൽ രണ്ടു ലേഖചിത്രങ്ങളും വരച്ചു ഈ പഴങ്ങൾ 1ക.യ്ക്കു എത്ര വീതം കിട്ടുമെന്നു കാണുക. 10 നാരങ്ങകൾ അത്രയും മാങ്ങയേക്കാൾ എത്ര അധികം വിലയുണ്ട്? 10ണ.യ്ക്കു നാരങ്ങയേക്കാൾ എത്ര അധികം മാങ്ങ കിട്ടും?

7. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പരിധി വ്യാസത്തിന്റെ $3\frac{1}{2}$ ഇരട്ടിയാണ്. വ്യാസവും പരിധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു ലേഖചിത്രം മൂലം കാണിക്കുക. വൃത്തങ്ങളുടെ പരിധി 50, 33, 47 അംഗുലമാണെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യാസവും,

വ്യാസം 8, 13, 18 അംഗുലമാണെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങളുടെ പരിധിയും അംഗുലത്തിന്റെ ദശാംശംവരെ കൃത്യമായി ചിത്രത്തിൽനിന്നു കാണുക.

8. 50 നാഴിക ദൂരം പോകാൻ ഒരു മോട്ടോർകാറിനു ഗാലനു 1 ക. 4 ണ. വിലയുള്ള $2\frac{1}{2}$ ഗാലൻ പെട്രോൾ വേണം. കാർ പോകുന്ന ദൂരവും അതിനുള്ള ചിലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക.

ചിത്രത്തിൽനിന്നു (1) 24 നാഴിക പോകാനുള്ള ചിലവും (2) 2 ക. 4 ണ. വിലയുള്ള പെട്രോൾകൊണ്ടു എത്ര ദൂരം പോകാമെന്നും കാണുക. (1937)

9. 1 പവൻ = 15 ക. യാണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഇത്ര ഉറപ്പിക ശമ്പളം കൊല്ലത്തിൽ ഇത്ര പവനാണെന്നു കണക്കാക്കുവാൻ ഒരു ലിപിക വരയ്ക്കുക. അതിൽനിന്നു മാസത്തിൽ 40 ക. കൊല്ലത്തിൽ എത്ര പവനും, കൊല്ലത്തിൽ 60 പവൻ മാസത്തിൽ എത്ര ഉറപ്പികക്കും സമമാണെന്നും കാണുക. (1913)

10. 1000 ഫ. സെ. മീ. = 33.8 ദ്രാവക ഔൺസ് എന്നു കരുതി ഈ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക.

അതിൽനിന്നു 1700 ഫ. സെ. മീ. എത്ര ദ്രാവക ഔൺസിനു സമമാണെന്നും 25 ദ്രാവക ഔൺസ് എത്ര ഫ. സെ. മീ.നു സമമാണെന്നും കഴിയുന്നത്ര കൃത്യമായി കാണുക.

11. 6.25 ഗാലൻ = 1728 ഫനാംഗുലം. ഒരു ലേഖാചിത്രം വരച്ചു താഴെ പറയുന്നവ കാണുക.

(1) 500 ഫ. അം. (2) 2400 ഫ. അം. എത്ര ഗാലനു സമമാണ്?

(3) 3.5 ഗാലൻ (4) 5.4 ഗാലൻ എത്ര ഫനാംഗുലത്തിനു സമമാണ്?

അദ്ധ്യായം 15.

പരീക്ഷാടലാസ്സുകൾ (Test papers).

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശീശ്രുതയും സൂക്ഷ്മതയും പരിശോധിപ്പാൻ ചില പരീക്ഷാചോദ്യങ്ങൾ താഴെ ചേർന്നു. കടലാസ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതായാൽ എത്ര മാർക്കു കിട്ടുമെന്നു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കേണം. ഓരോ വിഷയവും ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചശേഷം ഇത്തരം വേറെയും ചോദ്യകടലാസ്സുകൾ ഗുരുനാഥൻ കൊടുക്കുകയും അവയിൽ കിട്ടിയ മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥി കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പുരോഗതി

നിയുധിക്കാം. കാരോ ചോദ്യത്തിന്റെയും മാർക്കു ആവരണചിഹ്നങ്ങളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

മാർക്സ് : 30.

1. സ്വലഗണനം.

സമയം : 25മി.

1. 1949ൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ട ചില ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പരിമാണം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അവയെ 4 ഗണ്യ അക്കങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചെഴുതുക. കാരോണിലും നിങ്ങളുടെ മാത്രയെന്നാണെന്നും എഴുതുക.

Petroleum	1,18,15,720 ഗാലൻ.
Coal	4,05,325 ടൺ.
Limestone	7,26,167 „
Rocksalt	2,56,041 „ (4)

2. ഇന്ത്യയിൽ 1947—48 എന്ന കൊല്ലത്തിൽ പലതരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ആകെ (a) വിദ്യാർത്ഥികളുടെ (b) വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ (c) ഒട്ടാകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ലക്ഷം വരെ കൃത്യമായി കാണുക.

	വിദ്യാർത്ഥികൾ	വിദ്യാർത്ഥിനികൾ
High Schools	15,76,166	2,49,813
Middle „	9,65,475	2,29,144
Primary „	80,69,508	29,98,765 (6)

3. വെളിച്ചം ഒരു സെക്കണ്ടിൽ 186330 നാഴിക സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൂര്യനിൽനിന്ന ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം 9900000 നാഴികയാണെങ്കിൽ സൂര്യനിൽനിന്ന ഭൂമിയിലേക്കു വെളിച്ചം എത്രുവാൻ എത്ര സെക്കണ്ട് വേണ്ടിവരും? (സെക്കണ്ട് വരെ കൃത്യമായി കാണുക). (8)

4. ഐക്യരാഷ്ട്രത്തിൽനിന്നു കഴിച്ചെടുത്ത കല്ലറിയുടെ തുകവിവരം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം	കല്ലറി (ടൺ)	കഴിച്ചെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം
1929	64,872,965	903,914
1930	54,061,222	849,344

(1) കാരോ കൊല്ലത്തിലും ഒരാൾ ശരാശരി കഴിച്ചെടുക്കുന്ന കല്ലറി.

(2) രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ശരാശരി കഴിച്ചെടുക്കുന്നതിലുണ്ടായ കുറവിന്റെ ശതമാനം (ഒരു ലശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക). (12)

(March 1948)

മാർക്സ്: 30. 2. ചില അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സമയം: 25മി.

1. $10.51 \text{ സെ. മീ.} = 4.14 \text{ അംഗുലം}$. എന്നാൽ 1 മീറ്റർ എത്ര അംഗുലത്തിന്നു സമമാണ്? 2 ലശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (6)

2. 1 മീറ്റർ = 3.2809 അടി . എന്നാൽ 1 ച. മീറ്ററിൽ എത്ര ച. അടി ഉണ്ടെന്നു 2 ലശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (8)

3. 1 ഗാലൻ = $277.274 \text{ ച. അംഗുലം}$. 1 ച. അടി എത്ര ഗാലനു സമമാണെന്നു 3 ലശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (8)

4. 1 ച. സെ. മീ. വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം = 1 ഗ്രാം. 1 ഗാലൻ വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം = 10 റാത്തൽ. എന്നാൽ 1 ഗാലൻ എത്ര ച. സെ. മീ. ആണെന്നു പൂർണ്ണസംഖ്യവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (8)

മാർക്സ്: 25. 3. ധനസംബന്ധമായ ചില ഇടപാടുകൾ. സമയം: 25മി.

1. $2\frac{1}{2}\%$ ഞാളുകൾ 108 $\frac{3}{4}$ വിലയുള്ളപ്പോൾ 3200 ക.യുടെ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റുകിട്ടിയ പണത്തിൽ പകുതികൊണ്ടു 87 വിലയുള്ള $2\frac{1}{4}\%$ ഞാളും ബാക്കികൊണ്ടു 116 വിലയുള്ള 4% ഞാളും ഞാൻ വാങ്ങുന്നതായാൽ എന്റെ ആദായം എത്ര വലിപ്പം? (7)

2. 7900 ക. വിലയുള്ള തന്റെ മോട്ടോർകാർ $1\frac{1}{4}\%$ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു ഒരാൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തു. കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ വിലയും പുറമെ അടച്ച കമ്മീഷനും തിരിച്ചുകിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയാൾ എത്രയ്ക്കു കാർ ഇൻഷുർ ചെയ്യേണം? (6)

3. 540 ക. ശമ്പളമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാസത്തോറും തന്റെ ശമ്പളത്തിന്മേൽ 1 ക. 1 ണ. പ്രകാരം Provident Fund ലേക്കും ശമ്പളത്തിന്റെ $3\frac{3}{4}\%$ Life insurance വരിയായും പണം അടക്കുന്നു. ഈ സംഖ്യകൾ ആദായനികുതിയിൽനിന്നു ഒഴിവാക്കി. അയാൾ മാസത്തോറും 35 ക. 7 ണ. ആദായനികുതിയായി അടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നികുതിയുടെ നിരക്കു കാണുക. (6)

4. 7200 ക. വിലയുള്ള ഒരു ടീവെളി തന്റെ കടക്കാർക്കു ഉറപ്പി കക്കു 11 ണ. 3 പ. കൊടുക്കാമെന്നു കണക്കാക്കി. ഒരു പുതിയ കടവുംകൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഉറപ്പികൾ 10 ണ. വീതം മാത്രം കൊടുപ്പാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ പുതിയ കടം എത്രയാണ്? (6)

മാഷ്: 30.

4. കൂട്ടപലിശ.

സമയം: 30മി.

1. അരക്കൊല്ലത്തോളം പലിശ മുതലിനോടു കൂട്ടുന്നതായാൽ 400 ക. 1 കൊല്ലത്തേക്കു 4% പ്രകാരമുള്ള പലിശ പൈവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (7)

2. 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ബേങ്കിൽനിന്നു കടമായി വാങ്ങിയ 325 ക. ക്കു ഓരോ കൊല്ലാവസാനത്തിലും പലിശകൊടുത്തതിനാൽ ആകെ 26 ക. പലിശ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഒന്നാംകൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പലിശകൊടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര അധികം പലിശ അടക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു? പൈവരെ കൃത്യമായി ഗണിക്കുക. (7)

3. ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിൽനിന്നു 7200 ക. ഒരു കാർ വാങ്ങി. വിലയിൽ കൊല്ലത്തോളം 15% കുറവു കണക്കാക്കി അതു തിരികെ വാങ്ങുവാൻ അവർ ഏർപ്പെട്ടു. 2 കൊല്ലത്തിനുശേഷം ഈ കാർ കൊടുക്കുന്നതിനു പുറമെ എത്ര ഉദ്ദേശിക കൊടുത്താൽ അവർ 10000 ക.യുടെ ഒരു പുതിയ കാർ എനിക്കു തരും? (7)

4. 1,13,000 ജനങ്ങളുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ 10 കൊല്ലത്തിൽ 12% വീതം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമെ 10 കൊല്ലത്തിൽ ജനസംഖ്യയിൽ 1000 നു 75 വീതം അഭയാർത്ഥികളും വന്നു ചേരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ 20 കൊല്ലത്തിനുശേഷം പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാവുന്ന വർദ്ധനവു (പുണ്ണസംഖ്യയായി മാത്രം) കാണുക. (9)

മാഷ്: 30.

5. വക്രമൂലം.

സമയം: 30മി.

1. താഴെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഏവയെല്ലാം കൃത്യവക്രമായിരിക്കയില്ലെന്നു നോക്കിപ്പറയുക: —

1000, 38416, 12321, 1293.4, .00625, 15089. (3)

2. $\sqrt{5} = 2.646$; $\sqrt{5} = 2.236$ ഈ വിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് 28, 45, 343, 500, $\frac{7}{25}$ എന്നിവയുടെ വക്രമൂലം 2 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. നേരിട്ട വക്രമൂലം കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സത്യാപനം ചെയ്യുക. (10)

3. $1\frac{1}{11}$, $1\frac{6}{8}$ എന്നിവയുടെ വക്രമൂലം 3 ദശാംശസ്ഥാനംവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (6)

4. 490 വാര നീളമുള്ള ഒരു വയലിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 78,400 ച. വാരയാണ്. ഈ വയലിന്റേയും അതിനു സമമായ ഒരു സമചതുര വയലിന്റേയും ചുറ്റുമുള്ള വേലികളുടെ നീളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വാരമാണ്? (6)

5. കുറെ കുട്ടികൾ ഒരു അദ്ധ്യയന യാത്രചെലവിലേക്കു 68ക. 1൩൩. കൊടുത്തു. ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത സംഖ്യയിലുള്ള അണയുടെ എണ്ണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്നു സമമാണെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത സംഖ്യ കാണുക. (5)

മാർക്സ്: 20 6. പൈത്താഗോറസ്സിന്റെ പ്രമേയം. സമയം: 30മി.

1. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോൺ ഒരു സമകോണാണോ എന്നു കോണുകളെ അളക്കാതെ നിശ്ചയിക്കാമോ? എങ്ങിനെ? (2)

2. ക്ഷേത്രഗണിതം വഴിയായി 23ന്റെ വക്രമൂലം 1 ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി കാണുക. ഗണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. (6)

3. 5 ച. അംഗുലം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കുക. അതിന്റെ ഭുജം അളക്കുക. ഗണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. (6)

4. ഒരു ലിസമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ സമഭുജങ്ങളുടെ നീളം 6സെ.മീ. ഉം ശേഷമുള്ള ഭുജത്തിന്റെ നീളം 5സെ. മീ.ഉം ആണെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉച്ചരം ഗണിക്കുക. ത്രികോണം വരച്ചു കിട്ടുന്ന അളവിനോടു ഒത്തു നോക്കുക. (6)

മാർക്സ്: 30 7. വൃത്തം. സമയം: 25മി.

1. സമനീളമുള്ള രണ്ടു കമ്പികൾ എടുത്തു ഒന്നിനെ ഒരു വൃത്തമായും മറേറതിനെ ഒരു സമചതുരമായും വളച്ചാൽ വ്യാസത്തിന്റേയും സമചതുരത്തിന്റെ ഭുജത്തിന്റേയും നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം π ഉപയോഗിച്ചെഴുതുക. (3)

2. ഒരു സമചതുരത്തിൽ വരക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തം സമചതുരത്തിന്റെ ഏതൊരംശമായിരിക്കും? π ഉപയോഗിച്ചു ഉത്തരമെഴുതുക. (3)

3. ഒരു വൃത്തം വരക്കുക. അതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൃത്തം നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ വരക്കും? വഴി വ്യക്തമായി എഴുതുക. (5)

4. ഒരു കളത്തിന്റെ വ്യാസം 35 അടിയാകുന്നു. അതിന്നു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നടയുടെ ക്ഷേത്രഫലം $423\frac{1}{2}$ ച. അടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വീതി കാണുക.

5. $41''$ വ്യാസമുള്ള ഒരു കാഡ്ബോഡ് കക്ഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു കട്ടി 80° വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോൺ വരച്ചു കിട്ടിയ വൃത്തകോണാംശത്തെ

മുറിച്ചെടുത്താൽ ബാക്കിയാകുന്ന കക്ഷണത്തിന്റെ ചുറ്റളവും ക്ഷേത്രഫലവും കാണുക.

6. $OP=10$ സെ. മീ. O കേന്ദ്രവും 4 സെ. മീ. വ്യാസാർദ്ധവും ആയ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക. P യിൽനിന്നു ഈ വൃത്തത്തിലേക്കു 2 സ്പർശരേഖകൾ വരയ്ക്കുക. അവയുടെ നീളം അളന്നും ഗണിച്ചും (മി. മീറ്റർ വരെ കൃത്യമായി) കാണുക.

മാർക്സ്: 30. 8. ക്ഷേത്രഗണിതം. സമയം: 40 മി.

1. ABC എന്നൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുവാൻ താഴെ പറയുന്ന അളവുകൾ മതിയോ? അല്ലെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടു അവ മതിയാകുന്നില്ല? $c=2.5''$ $b=3''$, $C=40^\circ$. ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുക. (6)

2. ഒരു Clinometer ഉപയോഗിച്ചു ഒരു സ്തൂലിലെ ഒരു കൊടിമരത്തിന്റെ ഉയരം കാണാൻ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുത്ത അളവുകൾ താഴെ ചേർന്നു: — കൊടിമരത്തിൽനിന്നുള്ള ദൂരം. മേൽനോട്ടക്കോൺ

77 അടി

35°

37 "

55°

Clinometer ഉപയോഗിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കണ്ണു നിലത്തിന്നു 5 അടി ഉയരത്തിലാണെന്നു കരുതുക. തോതനസരിച്ചു ഒരു പടം വരയ്ക്കുക. അതിൽ നിന്നു ഉയരം കാണുക. (6)

3. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വയലിന്റെ 2 ഭുജങ്ങളുടെ നീളം 125 ഉം 90 ഉം വാരയും അവക്കിടയിലുള്ള കോൺ 43° യും ആണ്. ഒരു പടം വരച്ചു വയലിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം ച. വാരവരെ കൃത്യമായി കാണുക. (7)

4. $ABCD$ എന്നൊരു സമാന്തര ചതുരശ്ശിയിൽ $AB=4.4$ സെ. മീ., $BC=5.3$ സെ. മീ., $BD=7.3$ സെ. മീ. $ABCD$ നിർമ്മിച്ച അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം കാണുക. (6)

5. ഒരു സമചതുർഭുജത്തിന്റെ കണ്ണങ്ങളുടെ നീളം, d_1 ഉം d_2 ഉം അംഗുലമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ഷേത്രഫലം $= \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$ ച. അംഗുലമാണെന്നു തെളിയിക്കുക. (5)

മാർക്സ്: 40. 9. ഏകകാലിക സമവാക്യങ്ങൾ. സമയം: 50 മി.

1. നോക്കി x നേറയും y യുടേയും ചില എഴുതുക.

a) $x+3y=11$; $x+2y=9$.

b) $x-y=1$; $x+y=13$.

c) $2x-3y=9$; $x+3y=9$.

(6)

2. സമവാക്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക.

$$a) \quad 52x + 27y = 44$$

$$27x + 52y = 48\frac{1}{2}$$

$$b) \quad 3 - (2 - x) = \frac{5y + 2}{4}$$

$$2 - (y + 1) = -\frac{5x + 3}{4} \quad (12)$$

3. 8 വീശം കാപ്പിക്കും 45 വീശം പഞ്ചസാരക്കും കൂടി 13 വീശം കാപ്പിക്കും 15 വീശം പഞ്ചസാരക്കും കൂടിയുള്ളത്ര വിലയുണ്ട്. 15 വീശം കാപ്പിക്കും 16 വീശം പഞ്ചസാരക്കും കൂടി 86ക. 2ണ. വിലയുണ്ടെങ്കിൽ 1 വീശം കാപ്പിയുടേയും 1 വീശം പഞ്ചസാരയുടേയും വില വെച്ചേറെ കാണുക. (10)

(1946)

4. നെയ്യും കടലെണ്ണയും കൂടിയ 2 കൂട്ടം മിശ്രങ്ങളിൽ ഇവ യഥാക്രമം 1:3 എന്നും 3:5 എന്നും ഉള്ള സംബന്ധത്തിലുണ്ട്. 50 പലം നെയ്യും 90 പലം കടലെണ്ണയും ഉള്ള ഒരു പുതിയ മിശ്രം ഉണ്ടാക്കുവാൻ രണ്ടിനുള്ള മിശ്രങ്ങൾ ഓരോന്നിൽനിന്നും എത്ര വീതം ചേർക്കണം? (12)

(April 1947)

സാങ്കേതികപദങ്ങൾ.

ഒന്നാം പൂസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്കു പുറമെ ഈ പൂസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Ambiguous	സന്നിശ്ച
„ Case	സന്നിശ്ചസംഗതി
Approximately	സുമാറായി, സമുലമായി
Approximate value	സുമാർ വില
Approximation	സമുലഗണനം
Bearing	ദിഗ്സമാനം
Broker	ഭല്ലാളി
Brokerage	ഭല്ലാൾകമ്മീഷൻ
Cardinal points (of the Compass)	ദിഗ്ബിന്ദുക്കൾ
Circumscribe a circle	പരിവൃത്തം വരക്കുക.
Commission	കമ്മീഷൻ
Contact	സ്पर्ശം
„ point of	സ്पर्ശബിന്ദു
Contracted addition	ചുരുക്കക്കൂട്ടൽ
„ division	„ ഹരിക്കൽ
„ multiplication	„ ഖണ്ഡനം
„ subtraction	„ കിഴിക്കൽ
Discount	വട്ടക്കിഴിവ്
Equation — simultaneous	ഏകകാലികസമത്വം
Figure — significant	ഗണ്യമായ അങ്കം
Form — standard	പ്രമാണരൂപം
Gross income	കുട്ടാകെ വരവ്
Inscribe	അന്തർലേഖനം ചെയ്യുക
Instalment	ഗഡു, തവണ
Insurance	ഇൻഷുറൻസ്
Kilogram	കിലോഗ്രാം
Metric system	മെറ്റ്രിക് പദ്ധതി

Number — irrational	കരണീയരസംഖ്യ
Par — value	തുല്യമില
Plan	പ്ലാൻ
Plumb line	ലംബസൂത്രം
Premium	ഇൻഷുറൻസ് വരി
Property	ഗുണം
Reciprocal	വ്യുൽക്രമം
Root	മൂലം
Root — square	വക്രമൂലം
Significant	ഗണ്യം
Simultaneous	ഏകകാലിക
Square	വക്രം; സമചതുരം
Stocks and shares	സ്റ്റോക്കും ഓഹരിയും
Substitution	പകരം ചേർക്കൽ
Surd	കരണീ
Survey	സരവ്വ
Tangent	സ്പർശരേഖ

ഉത്തരങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം 1.

1. 46; 810; 1500; 70101, ആയിരം.
2. (a) 93142. (b) 931. (c) 93. (d) 9.
3. (i) (a) 21ക. 13ണ. 7പ. (b) 21ക. 14ണ. (c) 22ക.
 (ii) (a) 9ണ. 4പ. (b) 9ണ. (c) 1ക.
 (iii) (a) 7ണ. 8പ. (b) 8ണ. (c) 0ക.
 (iv) (a) 12പ. (b) 1ണ. (c) 0ക.
4. (i) (a) 23. (b) 23.0. (c) 23.05.
 (ii) (a) 170. (b) 169.7. (c) 169.74.
 (iii) (a) 1. (b) 0.8. (c) 0.82.
 (iv) (a) 0. (b) 0.4. (c) 0.44.
5. (a) 352.84മി. (b) 35.3കോടി.
6. (a) .15, .57, .56. (b) .154, .571, .556.
7. 601; 7.55; 0.0440; 0.00733; 3.78; 12.3; 0.0667; 3.12.
8. 12.85, .86, .87, .88, .89, .90, .91, .92, .93, .94.
9. 1.724; 1.715ക.
10. 12മ. 7മി. 29സെ.; 12മ. 6മി. 30സെ.
11. 3ക. 11ണ. 9പ.; 3ക. 11ണ. 7പ.
12. (i) 200; 1000ക. (ii) 232; .0001ഗ്രാം.
 (iii) 924; .001അം. (iv) 438; .1അടി.
13. (a) 10.295, 10.285. (b) .40355, .40345
 (c) 7.0015, 7.0005. (d) 625050, 624950
14. 4.

അദ്ധ്യായം 2.

1. (i) (a) 45 (b) 44.53 (c) 44.529.
 (ii) (a) 30 (b) 29.96 (c) 29.956.
 (iii) (a) 11 (b) 10.58 (c) 10.577.
2. (i) (a) 3 (b) 3.0 (c) 2.95.
 (ii) (a) 7 (b) 7.3 (c) 7.32.
 (iii) (a) 2 (b) 2.2 (c) 2.21.

3. 5.382; 16.147; 21.530.
4. (i) 221.26 (ii) 1.83 (iii) 438.23 (iv) 1.00.
5. (i) 1.30 (ii) 0.00039 (iii) 464 ആയിരം. (vi) 203 ലക്ഷം.
(v) 10.75188 (vi) 0.00567 (vii) 0.0000499.
6. 2430; 24.8; .00100. 7. 25.2
8. (i) 1.1902 (ii) 38.95 (iii) 155.1 (iv) 8.71963.
(v) 0.007. (vi) (a) 149.0. (b) 14.47. (c) 0.8086.
(d) 59.61.
9. 0.312163. 10. (a) 2.601. (b) 0.626.
11. (a) 902. (b) 1122. 12. +35.1; -7.0; +355.5;
+38.7; +17.3; 698667; 683348; -2.2.
13. 7കി. 6പെ.; 8കി. 1പെ.; 42.
14. 17040ക.; 24538ക. 44.0.
15. (a) +2.7, +2.2, -1.4. (b) +9.

അഭ്യൂഹം 3.

1. 3840 മീ. 2. 6.45; 16.393. ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ; 4.
4. 29. 5. 24975.0. 6. 1550; 10.76; 1.196.
7. 247. 8. 44. 9. 528. 10. 3035.
11. 6200. 6.8ക്ക. 12. 51.

അഭ്യൂഹം 4.

1. 1721ക. 4ണ.; 51ക.; $2\frac{260}{7}\%$. 2. 4108ക. 12ണ.;
4103ക. 5ണ. 6പ.
3. 3300ക.
4. ഒന്നാം. $4\frac{4}{9}$, $4\frac{1}{8}$, $4\frac{2}{7}$. 5. $102\frac{1}{2}$.
6. 71; 621ക. 4ണ.; $8\frac{4}{7}$. 7. 7ക. 8ണ.
8. 2400ക. 9. 65ക. 10. 106ക.
11. 1840ക. 2ണ. 12. $77\frac{5}{8}$.

അഭ്യൂഹം 5.

1. a. 106ക. 1ണ. b. 96ക. 7ണ. c. 258ക. 12ണ.
d. 1902ക. 8ണ. 2. 361ക. 9ണ. 3. $\frac{3}{4}$.
4. 38550ക. 5. 18405ക. 6. 5251ക. 8ണ.
7. 1425ക. 2ണ.; 42424ക., 14ണ. 8. 75000ക.

അക്രൂറസം 6.

1. 105ക. 14ണ. 2. 10000ക. 3. 16.
4. 650ക. 5. 4കു. 26 $\frac{1}{4}$ ക.
6. a. 177ക. 5ണ. 6പ. b. (1) 20. (2) 8.
7. 15ക. 10ണ. 8. 14ക. 1ണ.

അക്രൂറസം 7.

1. 386ക. 11ണ. 6പ. 2. 91ക. 3ണ. 6പ.
3. 375ക. 4. 423ക. 5. 340ക.
6. 412ക. 8ണ. 7. 1ണ. 3പ.

അക്രൂറസം 8.

1. 41627ക. 9ണ. 8പ. 2. 6ണ. 8പ. 3. 205728ക.;
729ക. 2ണ. 8പ. 4. 5ണ. 6പ. 5. 10ണ. 2 $\frac{17}{2}$ പ.
6. 2240ക. 7. 350ക.; 11ണ. 8പ. 8. 10ണ.
9. 2880ക. 10. 4640ക.

അക്രൂറസം 9.

1. a. 964ക. 11ണ. b. 270ക. 15ണ.
c. 126ക. 12ണ. d. 183ക. 13ണ. 9പ.
e. 1339ക. 6പ.
2. a. $\frac{441}{400}$; 1025ക. b. $\frac{289}{256}$; 1289ക. 1ണ.
c. $\frac{676}{625}$; 816ക. d. $\frac{10609}{10000}$; 609ക.
e. $\frac{6889}{400}$; 764ക. 1ണ.
3. 21ക. 4ണ. 4. a. 12ക. 9ണ. 8പ.
b. 390ക. 10ണ. 1പ. c. 10ക. 7ണ. 11പ.
d. 87ക. 5ണ. 2പ.
5. a. 5ണ. 9പ. b. 8ണ. 1പ. e. 1ക. 2ണ. 1പ.
6. a. 19ക. 11ണ. 11പ.; 3ണ. 2പ.
b. 21ക. 8ണ. 7പ.; 2ണ. 7പ.
c. 3ക. 9ണ. 8പ.; 4പ.
d. 6ക. 10ണ. 2പ.; 11പ.
7. 139393. 8. 461982000.

9. 17326ക. 1൩.; 9873ക. 10൩.;
629ക. 9൩.; 537ക. 7൩.
10. 2861ക. 4൩. 11. 354578ക. 12൩.
12. 10.25; 6.09; 5.0625; 3.0225.
13. a. 1. 427ക. 10൩. 2പ. 2. 198ക. 3൩. 11പ.
3. 39ക. 5൩. 7പ. b. 1. 8ക. 12൩. 3പ.
2. 7ക. 14൩. 6പ. c. 1. 9ക. 1൩. 2. 4ക. 10൩. 11പ.
14. 1. 608ക. 6൩. 3പ. 2. 414ക. 4൩.

അക്രൂസം 10.

1. 33; 44; 48; 231; 252; 385; 693; 756; 825; 940.
2. $\frac{1}{21}$; $\frac{2}{28}$; $\frac{5}{11}$; $\frac{27}{32}$; $1\frac{1}{3}$; $1\frac{3}{7}$; $1\frac{11}{15}$; $2\frac{32}{39}$; $10\frac{4}{15}$; $4\frac{9}{42}$.
3. 2, 5, 11, 3, 5, 6.

അക്രൂസം 11 A.

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| 1. 37 | 2. 56 | 3. 82 |
| 4. 99 | 5. 103 | 6. 195 |
| 7. 118 | 8. 309 | 9. 328 |
| 10. 459 | 11. 481 | 12. 708 |
| 13. 1079 | 14. 1679 | 15. 1235 |
| 16. 3702 | 17. 6401 | 18. 8002 |
| 19. 9451 | 20. 16105 | 21. 4321 |
| 22. 15215 | 23. 57834 | 24. 811071 |
| 25. 100372 | 26. 99997 | |

B.

- | | | | |
|------------|------------|------------|--------|
| 1. 8.6 | 2. 3.28 | 3. 1.95 | 4. .99 |
| 5. .431 | 6. 5.05 | 7. 10.043 | |
| 8. 64.005 | 9. .0101 | 10. .01849 | |
| 11. 6.0483 | 12. .0374 | 13. 52.004 | |
| 14. .0451 | 15. .59049 | 16. .00405 | |

C.

- | | | |
|----------|-------------|----------|
| 1. 462൩. | 2. 1. 1.732 | 2. 2.236 |
| 3. 3.162 | 4. 17.029 | 5. 1.804 |

4. $78^{\circ}5'$, $55^{\circ}5'$. 5. 77° ച. അം. 6. 28° ക. 4° ന. 7° പ.
7. $14''$. 8. 350° ച. വാര. 9. $16^{\circ}6'$.
10. 154° ച. അം.; 98° ച. അം. 11. വൃത്തം
12. 5° സെ. മീ.; $2; 20\frac{5}{7}$ ച. സെ. മീ. 13. $10\frac{1}{2}$ ച. അം.
14. $56\frac{4}{7}$ ച. സെ. മീ.; $39\frac{2}{7}$ ച. സെ. മീ. 15. 27335° ക.
16. (a) $3:4$. (b) $9:16$. 17. $2; 1:\sqrt{2}$.
19. $\sqrt{5}$ അം. 21. 160° അ. 23. $12\sqrt{3}$ ച. അം.
24. 3π ച. സെ. മീ.

അഭ്യൂഹനം 15.

1. (a) $4\frac{2}{3}$ സെ. മീ.; $7\frac{7}{10}$ ച. സെ. മീ.; (b) $5\frac{1}{2}$ അം.; $24\frac{3}{4}$ ച. അം.
- (c) $17\frac{1}{3}$ അടി; $34\frac{2}{3}$ ച. അടി.
2. $100; 34.65$ ച. സെ. മീ. 3. $19\frac{1}{11}$ അം. 4. 1467 നാ.
6. $198, 86, 76$. 7. $6\frac{1}{4}$ ച. സെ. മീ. 8. 31 അം.
9. $1039\frac{1}{2}$ ച. അടി; $1193\frac{1}{2}$ ച. അടി. 10. $2964\frac{1}{2}$ ച. അടി.
11. (a) $149.6; 4.4$ (b) $140; 14$. (c) $123.9; 30.1$ ച. സെ. മീ.

അഭ്യൂഹനം 16.

1. 2.4 സെ. മീ.; 3.46 സെ. മീ. 2. $3.46''; 2.65''$. 3. 4.61 സെ. മീ.

അഭ്യൂഹനം 17.

3. 80° 4. 48 ച. അം. 5. 12 സെ. മീ.
6. $\sqrt{d^2 - r^2}$ സെ. മീ.; 7.42 സെ. മീ.; 5.75 സെ. മീ.
7. $2.9''$. 8. 13.42 സെ. മീ. 12. 8.50 ച. സെ. മീ.
13. 2.24 സെ. മീ. 14. $29.35'$.

അഭ്യൂഹനം 18.

1. $4.1''$. 2. $AC = 5.7$ സെ. മീ.; $BC = 9.4$ സെ. മീ.
3. 3.2 സെ. മീ.; 7 സെ. മീ. 4. $AC = 1.5''; B = 28^{\circ}; C = 62^{\circ}$.
5. $1.2''$. 6. $a = 5.9$ സെ. മീ.; $c = 3.5$ സെ. മീ.
7. $a = 3.1''; c = 2.1''$. 8. $a = 9.8$ സെ. മീ. $B = 40^{\circ}; C = 50^{\circ}$.
13. $3.1''$. 14. 5.7 സെ. മീ. 17. 6.1 സെ. മീ.; 3.5 സെ. മീ.
- 4.6 സെ. മീ.; 2.3 സെ. മീ.
19. a) 2 ; സന്ദിഗ്ദ്ധസംഗതി. b) $\frac{1}{2}$ സമഭജം. c) 1 .
- d) സമകോണം. e) 0 .

20. a) 1 b) 2; അധികകോണത്രികോണവും ന്യൂനകോണത്രികോണവും; രണ്ടു കോണുകൾ പരിപൂരകങ്ങളാണ്.

അഭ്യാസം 19.

1. 869 അടി; 68° ; 73° . 2. $14.4''$.
3. 61 വാര; 70 വാര. 4. 380 വാര.
5. 611 വാ. 6. 933 അ. 7. മതിയാകയില്ല. 2 ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കും.

അഭ്യാസം 20.

2. (1) 135° (2) 90° (3) $112\frac{1}{2}^\circ$ (4) $157\frac{1}{2}^\circ$ (5) 180°
(6) 50° (7) 155° (8) $7\frac{1}{2}^\circ$ 3. കി.വ.കി. 4. തെ. 20° പ.
5. 6.7. 6. 5.6 നാ. 7. 225 വാ. 8. 714 വാ.
9. 7.1 നാ., 8.6 നാ., 9.3 നാ., 10.4 നാ. 10. $13\frac{1}{4}$ നാ., വ. 13° പ.
11. 7.6 നാ. 12. 2022 അടി. 13. 662.8 വാര
14. 9.2 നാ. 15. കി. 13° തെ.

അഭ്യാസം 21.

1. 173 അടി. 2. 16 അടി; 56. 3. 21.2 അടി.
4. 329.7 അടി. 5. 635 അടി. 6. 87.3 അടി.
7. 109 അടി. 8. 123 അടി. 9. 681 അടി.

അഭ്യാസം 22.

1. 8.5 സെ.മീ. 2. 7.07 സെ.മീ. 3. $2.83''$.
4. 9.7 സെ.മീ. 5. 8 സെ.മീ. 6. 9.4 സെ.മീ.; 3.4 സെ.മീ.
7. $3.86''$; $1.03''$; 150° , 150° , 30° . 8. 4.35 സെ.മീ.; 44° ; 136° .
9. 5.2 സെ.മീ.; 5.2 സെ.മീ. 10. 11.3 സെ.മീ., 6.5 സെ.മീ.;
 127° , 127° , 53° . 11. 131° , 49° ; $3.25''$. 12. 97° , 83° .
13. 4.9 സെ.മീ.; 6.8 സെ.മീ. 14. 4.62 സെ.മീ.

അഭ്യാസം 23.

1. (a) 5.745 ച.അം. (b) 70.99 ച. സെ.മീ.
2. 31.176 ച. സെ.മീ.; 18 ച. സെ.മീ. 3. 21.217 ച. സെ.മീ.
4. 2.828 ച. അം. 5. (1) 2.475 ച.അ. (2) 1.704 ച. അം.

- (3) 1.603 ம. அம். 6. 17625 ம. அம். 7. 5 செ. மீ.;
13 செ. மீ.; 4.62 செ. மீ. 9. 7.67 செ. மீ.; 6.71 செ. மீ.
10. 5 செ. மீ. 12. 4.99 ம. அம். 13. 7.07', 4.71'; 24 ம. அம்.

அக்டோனம் 24.

1. 7, 1. 2. 5, 3. 3. 9, 11. 4. 6, -8.
5. -1, 2.

அக்டோனம் 25.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. 4, 7. | 2. 43, -6. | 3. -1, -2. |
| 4. $\frac{1}{2}$, -3. | 2. 1, -1. | 6. -17, 10. |
| 7. $\frac{1}{4}$, -5. | 8. $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$. | 9. 0, 3. |
| 10. 1, 1. | 11. 2, 3. | 12. 5, 4. |
| 13. 3, 7. | 14. 2, 5. | 15. 5, 2. |
| 16. 3, 2. | 17. -30, -43. | 18. 2, 9. |
| 19. 2, 5. | 20. 6, 6. | 21. 3, 3. |
| 22. 1, 8. | 23. 6, 4. | 24. 24, 12. |
| 25. $-\frac{38}{45}$, $-\frac{2}{45}$. | 26. 2, 3. | 27. 0.02, 2.9. |
| 28. 2, 1. | 29. $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$. | 30. 1, 2. |
| 31. 7, 3. | 32. $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$. | 33. -4, 3. |
| 34. 13, 7. | 35. 19, 3. | 36. 12, -4. |
| 37. 4, 3. | 38. 5, 5. | 39. 2, 1. |
| 40. -3, -7. | 41. $15\frac{1}{3}$, $12\frac{2}{3}$. | 42. $-\frac{1}{2}$, 1. |
| 43. 4, -5. | 44. 1, 1. | 45. $-\frac{1}{10}$, $-2\frac{7}{10}$. |
| 46. 2, 3. | 47. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$. | 48. 1, -2. |
| 49. $\frac{44}{213}$, $-\frac{17}{22}$. | 50. 5, 2. | 51. -3, -1. |
| 52. 3, 1. | 53. 1, 2. | 54. 3, 4. |
| 55. $a+b$, $a-b$. | 56. $2a+b$, $a-b$. | |
| 57. $\frac{c+bd}{a+b}$, $\frac{c-ad}{a+b}$. | 58. a , 0. | |
| 59. $\frac{c-bc}{a-b}$, $\frac{c-ac}{b-a}$. | 60. $\frac{ac+b^2}{a^2+b}$, $\frac{ab-c}{a^2+b}$. | |


അഭ്യാസം 26.


1. 66, 8. 2. 65, 30, 5. 3. 75, 35.
4. 18, 12. 5. 6൩. 6. 90൧൦. 96൩൦.
7. $1\frac{1}{2}$ ഭി. 8. ലാഭം. പശു: $6\frac{1}{4}$ ക.; ആടു: 3ക.
9. പശു. ലാഭം $6\frac{1}{4}$ ക.; ആടു നഷ്ടം 3ക.
10. എ. 130ക.; ബി. 190ക.; സി. 50ക.
11. എ. 350ക.; ബി. 225ക.; സി. 250ക.
12. 7൩.; 32 കാല൩.; 39 പൈ.
13. 18, 30. 14. 40, 30, 10. 15. 54.
16. 74. 17. 783. 18. 792.
19. $\frac{7}{18}$. 20. $\frac{7}{23}$. 21. $\frac{6}{13}$.
22. 15. 23. 27൩., 22൩. 24. 864 പ. വാ.
25. 1120പ. ൩. 26. 13൩., 6൩. 27. 3൩.
28. 15൩. 29. 175൩. 30. 11൩., 10൩.
31. $5\frac{1}{2}$ ൩., $3\frac{1}{2}$ ൩. 32. $4\frac{1}{2}$ ൩., 3൩. 33. 7൩.
34. 4, 6. 35. 18ക. 36. 600ക.
37. 300ക., 400ക. 38. 50ക., 46. 39. 150൩.
40. 70ക., 130ക. 41. 24പ.; 20ക. 42. 60൩.; 90൩.
43. 1ക. 4൩.; 12൩. 44. 6500ക.; 2500ക.
45. $\frac{2}{17}(2m-n)$ ൩.


പരീക്ഷകടലാസ്സുകൾ.

1. 1. 1182-പതിനായിരം ഗാല൩൩. 4053-രൂറുട൩൩.
7262-രൂറുട൩൩. 2560-രൂറുട൩൩.
2. a. 106. b. 35. c. 141.
3. 499സെ. 4. 71·8; 63·7; 11·3.
2. 1. 39·29. 2. 10·76. 3. 6·232. 4. 4536.
3. 1. 25ക. 2. 8000ക. 3. 1൩. 2പ. 4. 1280ക.
4. 1. 16ക. 2൩. 7പ. 2. 8൩. 4പ. 3. 4798ക. 4. 48367.
5. 1. 1000, 1293·1, ·00625.
2. 5·29; 6·71; 18·52; 22·36; ·53.
3. ·426; ·679. 4. 180.
6. 2. 4·8. 3. 2·2". 4. 5·5സെ. മീ.

7. 1. വൃത്തം: ഭജം = $4 : \pi$. 2. $\frac{\pi}{4}$.
4. $3\frac{1}{2}'$. 5. $15\frac{1}{2}''$, $12\frac{3}{8}$ ച. അം. 6. $9 \cdot 2$ സെ.മീ.
8. 1. സന്നിധൗസംഗതി. 2. $60'$. 3. 3836 ച. വം.
4. $23 \cdot 04$ ച. സെ.മീ.
9. 1. a) $x=5$; $y=2$. b) $x=7$; $y=6$. c) $x=6$; $y=1$.
2. a) $x=\frac{1}{2}$; $y=\frac{1}{3}$. b) $x=-3$; $y=-2$.
3. 4ക 14ണ; 13ണ. 4. 20ച.; 120ച.







GENERAL MATHEMATICS

BOOK II FOR FORM V

(According to the Syllabus issued in July 1950)

Approved as a Text-Book by the Madras Text-Book Committee
Vide Fort St. George Gazette, Part I-B, page 69
dated May 19, 1954.

J. Pavamani, B. A., L. T.

Headmaster, B. E. M. High and Training School, Tellicherry.

സാമാന്യഗണിതശാസ്ത്രം

രണ്ടാം പ്ലസ്കം - 5-ാം ഫോറത്തിനു.

(1950 ജൂലായിമാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പാഠ
പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചെഴുതിയത്).

37/70
510
PAV/S

PUBLISHED BY THE
SESSION BOOK DEPOT
MANGALORE
1954

Price: Re. 1 As. 8]

[വില: 1 രൂ. 8 അ.