





ജനുപോകം

1684

കോന്നിയാർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥ്

(ബി. എസ്.സി. ബി. എൽ.)

38757

പ്രസാധകർ :

പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്



വിതരണക്കാർ :

ട്രിങ്ക് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, കോഴിക്കോട്.

വില : 2 - 00

കോന്നിയൂർ ആർ. നരേന്ദ്രനാഥിന്റെ കൃതികൾ

590.

നമ്മുടെ ഭരണഘടന

വിശദീകരണം

പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ

വളരുന്ന ചക്രവാളം

അഞ്ചു - കുടുംബത്തിൽ

പുതുമതിലേക്ക്

ജന്തുലോകം

കടപ്പാടുകൾ

മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ

ആത്മചിത്രം

ചക്രവാളത്തിനപ്പുറം

വിവാഹത്തിനുശേഷം

തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങുന്നു

മനുഷ്യരാശിക്കുവേണ്ടി

വെളിച്ചത്തിലേക്ക്

മുഖവുര

1962 ഡിസംബറിൽ കറെ ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഞാൻ “പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ” എന്ന ഒരു പുസ്തകം (കറൻറ് ബുക്ക്സ്, തൃശൂർ) പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ് സംതൃപ്തിയുള്ള ചാക്കിയ സ്വാഗതമാണ് ആ കൃതിക്ക് കേരളീയരിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അതിന്റെ മുഖവുരയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ, വായനക്കാരുടെ സന്മനോഭാവമാണ്, ഈ പുതിയ ലേഖനസമാഹാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം തരുന്നത്. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിൽ വളർന്നുവരുന്ന ഈ താല്പര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

പുതിയ ചക്രവാളത്തിൽനിന്ന് ഭിന്നമായ ലേഖനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സുപരിചിതങ്ങളായ ചില ജീവികളുടെ കഥ അനാവരണം ചെയ്യുവാനാണ് ഇവിടെ എന്റെ ശ്രമം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെക്കാൾ വളരെ പ്രായംകൂടിയ ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളാണിവയെല്ലാം. പരിണാമകഥയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ജന്തുജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാനാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ജീവികളെ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ കാണാൻ കളിമൊരുക്കുകമാത്രം

മാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വായനക്കാർ മറു ആധികാരികഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്യന്തം രസമുള്ള ഈ കർത്തവ്യത്തിന്, ഏതെങ്കിലും വായനക്കാരന് എന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രചോദനമായിത്തീരുമെങ്കിൽ, എന്റെ വേല വെറുതെയൊക്കുകയില്ല.

ജന്തുശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ബാലികാബാലന്മാരെ ആകർഷിക്കുവാൻ ഉതകണമെന്ന താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ലേഖനങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ലളിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വേലയുടെ വില നിണ്ണയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്.

കോഴിക്കോട്,
25-3-1966.

} കോന്നിയൂർ നരേന്ദ്രനാഥ്

ജനുലോകം

ഉള്ളടക്കം.

- 1) പാററ
- 2) ചിതൽ
- 3) മിന്നാമ്മിനുണ്ണ്
- 4) ചിലന്തികൾ
- 5) തവളകൾ
- 6) വാവൽ
- 7) പുച്ച
- 8) കരകൻ
- 9) ബീവർ

6 4 0 12 9 00 92

10000 (1)

10000 (2)

10000 (3)

10000 (4)

10000 (5)

10000 (6)

10000 (7)

10000 (8)

10000 (9)

പാററു-എററുവം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഷഡ്‌പദവർഗ്ഗം

നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഷഡ്‌പദമാണ് പാററു. അതിനെ കാണാൻ കിട്ടാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടോയെന്നു സംശയമാണ്. മനുഷ്യവാസമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതു കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നാടുകളിലും അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യാം. ഭിന്നങ്ങളായ കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും നിലവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവേ കാണാവുന്ന ഇത്തരം ജീവികൾ അധികമില്ല. വെയിലും മഴയും കൂടുതലുള്ള മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലും തണുത്തു മരവിച്ചുകിടക്കുന്ന ധ്രുവമേഖലകളിലും അതീവ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ജീവിയുടെ ഈ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് അതുളതം തോന്നാതെ തരമില്ല. പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നതിൽ ഈ ജീവിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നു പരക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട്. ക്ഷയം, കോളറ, സന്നിപാതജ്വരം, കുഷ്മം തുടങ്ങിയവ പകർത്തുന്നതിൽ ഇതിന് ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന് ഉപകാരമുള്ള ജന്തുക്കളിലും രോഗങ്ങൾ പരത്തുവാൻ ഇത് ഉത്തരവാദിയായി തീർന്നുണ്ടത്രെ. ഉപകാരത്തേക്കാളധികം ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കു

ന്ന ഈ ജീവിയെ കടുത്ത ചെറുപ്പോടെ നാം നോക്കുന്ന കിൽ അത് കുറവുമല്ല.

കിടജന്തുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്നു ഇന്നു നിരവധി രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പല പേരുകളിൽ അത്തരം മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ സുലഭമാണ്. ഇവയെ ഉപയോഗിച്ച് പാറയെ നശിപ്പിക്കുവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ നിരന്തരമായി അവ പ്രയോഗിക്കുന്നതായാൽ ആ മരുന്നുകളെ ചെറുത്തു ജീവിക്കാൻ ഉള്ള ശക്തിവിശേഷം സമ്പാദിക്കാൻ ജീവിക്ക് സാധിക്കുമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈച്ച തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ കയ്യിലും ഇതുതന്നെ. കിടനാശകമരുന്നുകളേറ്റാൽ മരണം സംഭവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ പിൻതലമുറക്കാർ ആദ്യത്തേതിൽ മുന്തൂറമടങ്ങ് മരുന്നുകൾ ഏറ്ററാലെന്നശിക്ഷകയുള്ള എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഈ ജീവിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനസമയമെന്നു നമുക്കറിയാം. പകലൊക്കെ മാളങ്ങളിലും സംഭരണശാലകളിലും വെളിച്ചം കയറാത്ത കോണുകളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ ജീവി ഇരുട്ടു വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പതുക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. അടുക്കളയിൽ അടുമിടും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കാൻ അതിന്നു

നമുക്കു

വമ്പിച്ച കഴിവുണ്ട്. പഴങ്ങളും ചില പച്ചക്കറികളും അത് ആനന്ദത്തോടെ ആഹരിക്കും. ശരിയായി അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നടന്നുകയറി വേണ്ടതുപോലെ ശാപ്പിടാൻ അതു പ്രത്യേകിച്ചു് കൌതുകം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മലിനപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന്റെ ശരീരത്തു പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന അണുജീവികളെ ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ അതു കലർത്തുന്നത്. അതു പോലെ അതിന്റെ ഉമിനീരും ആപത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നമുക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പാറായുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അധികം ആപത്തു വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം.

അതിവേഗത്തിൽ പെരുകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാറാ. ജമ്മൻപാറായെന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ വസ്ത്രം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഈ വസ്ത്രത്തിലെ പെൺ പാറാ ആണ്ടിൽ 400,000 സന്തതികൾക്ക് ജന്മം നല്കുന്നുണ്ടത്രെ! ഏതാണ്ട് ഇത്തരക്കാരികൾതന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവയും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇണചേർന്നാൽ പിന്നെ അത് ഒരു വഷം മുഴുവൻ മുട്ടയിട്ടുകൊള്ളും. മിക്കവാറും അവ പിന്നെ ഇണചേരാൻ കൂട്ടാക്കുകയുമില്ല. അതിനാൽ ആൺവസ്ത്രത്തിന് പുതിയ കാമിനിമാരെ പ്രാപിക്കാതെ കഴിയുകയുമില്ല. ബഹുഭാര്യത്വത്തിലാണ് അവ

ന താല്പര്യം. പുതിയ പെണ്ണിനെക്കണ്ടാൽ അവളുമായി സല്ലപിക്കാൻ കടുത്ത രസം കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആരും അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല. ചില വസ്ത്രം പാററകൾ മുട്ടയിടാറില്ല, അത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് പതിവ്. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തു വരൂ. ഒരുതരം പ്രസവംതന്നെയെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങളും മുട്ട ഇടുകയാണ് പതിവ്. നമുക്കു സുപരിചിതമായ പാററ പെട്ടികളിൽ, ഒന്നിച്ച് കുറെ മുട്ട ഒരുക്കി, ആപത്തില്ലാത്തതിടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പതിവ്. അത് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ഥികസമാനമായ പുറത്തോടു വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുക പതിവാണ്. പുറത്തോട് നിഷ്കാസനംചെയ്യാൻ സാധാരണ തള്ള സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായിക്കഴിയുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളും കുറവല്ല. അവയെ ഒന്നിച്ച് പോറി പുലത്താനും മാതാവ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഏററവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കാത്തുങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ടത്രെ. ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളംവരെ വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവമാകയാൽ ആരും അവയെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കാണാറില്ല. വെളിച്ചവും വെയിലും കടക്കുന്നിടങ്ങൾ കരുതലോടെ

അവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായി ശരീരത്തിലെ ജലാംശം അധികം വേഗം, അങ്ങിനെയുള്ള ഇടങ്ങളിലെത്തിയാൽ, നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. ശരീരം വരണ്ടുപോയാൽ മരണം നിശ്ചയമാണ്. പാററായെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറവും ശക്തിമത്തായ മരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നതും അതുതന്നെ. അത്തരം മരുന്നുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ ജലാംശം പെട്ടെന്നു നഷ്ടമാകും. മരണം തീച്ചയാകുകയും ചെയ്യും.

എറുമ്പുകളെപ്പോലെ സാമൂഹമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവ മണ്ണിൽ മാളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. കടന്നൽ കൂടുകളുടെ താഴത്തെ അറകളിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിതം നയിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്. കടന്നലുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്ന ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ആത്തിയോടെ ആഹരിച്ചാണ് അവ പുലരുന്നത്. ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ എറുമ്പുകളോടൊന്നിച്ച് കഴിയുന്നതായിട്ടറിയാം. മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിൽ, ജലാശങ്ങളുടെ തീരത്ത് കുടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, പാററകളും കാണപ്പെടുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവശങ്കയുണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി ജലാശയത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള നീച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ഒളിക്കുന്നത് അവയുടെ സ്വഭാവമാണ്— തവളകളെപ്പോലെ! ചില വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വലിപ്പം ചുണ്ടലിയുടെ അത്ര തന്നെ വരുകയും ചെയ്യും. തിളങ്ങുന്ന പുറത്തോടോടുകൂടി

യവയാണ് കട്ടമുക്കുലും പാറകൾ. എന്നാൽ രോമവൃ
തമെന്നു തോന്നുന്ന പുറന്തോടോടുകൂടിയവയും ഇല്ലാതി
ല്ല. നിറത്തിന്റെ കയ്യാത്തിലും വൈവിധ്യം വളരെയു
ണ്ട്. പച്ചനിറമുള്ള പാറകൾ അത്യന്തം ആകർഷക
ങ്ങൾതന്നെ.

ചിതലിനെപ്പോലെ തടിയും മറും കരണ്ടുതിന്നു
ന്ന പാറാവാർഗ്ഗങ്ങളും കുറവല്ല. ഇവയുടെ ആമാശയ
ത്തിൽ സെല്ലുലൂസ് ഫോസ്പിക്കുന്നതിന്നുതന്നെ ഒരുതരം
അണുജീവിയെ കാണുന്നുണ്ട്. മധുരപദാർത്ഥങ്ങളോട്
പൊതുവെ പാറാർക്കു വലിയ പ്രതിപത്തിയാണ് - പ്ര
ത്യേകിച്ചു ലഘുവായ ലഹരിയുള്ളവ. ബീയറിൽ കുതി
യ്ക്കുന്ന റൊട്ടിക്കുഷണങ്ങൾ ആണ് അവയെ ഏറ്റവും അ
ധികം ആകർഷിക്കാറുള്ളത്. അത്തരം റൊട്ടിക്കുഷണ
ങ്ങൾ വീടുകളിൽ പാറാരയുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കു
ന്നതിനായി അവിടവിടെ വെച്ചുനോക്കുന്ന പതിവു
ണ്ട്. പാറാ തിന്നാത്ത സാധനങ്ങൾ കുറവാണ്. പ
ന്നുകുത്താളുകൾ, തോൽസാധനങ്ങൾ, തുണി, പട്ടവസ്തു
ങ്ങൾ എന്നിങ്ങിനെ പലതും രുചിച്ചുനോക്കുക അവയു
ടെ പതിവാണ്. ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെപ്പോലും അ
ങ്ങിനെ രുചിച്ചുനോക്കാൻ അവ കൈതുകം കാണിക്കുന്ന
തു് അസാധാരണമല്ല. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിരലിലെ
നഖവും മറും അതു് കരണ്ടു നോക്കും. പാറാരയുടെ

ആക്രമണത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും, അവയുടെ ഉപദ്രവം അധികമുള്ള കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർ, കയ്യറകൾ അണിയുന്നതു് പതിവാണ്.

പാററായെ ശത്രുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതു് പ്രധാനമായി അവയുടെ ഭൃഗ്ഗന്ധമാണ്. ഇതു് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതുമാണല്ലോ. പാററാ അധികമുള്ള അറകളിലും പത്തായങ്ങളിലും കയറിനോക്കിയാൽ ഇതു് നേരിട്ടു് അനുഭവപ്പെടുന്നതുമാണ്. പാററയെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഒരു തരം ദ്രാവകം അതു വിസർജ്ജിക്കും. പല കീടജീവികളെയും പേക്ഷിച്ച് ഇവക്ക് പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ശത്രുക്കൾ കുറവാണ്. പരോപജീവികളായ ഒരുതരം കടന്നൽവൃഗ്ഗം മുട്ട നിക്ഷേപിക്കാറുള്ളതു് പാററാപ്പെട്ടികളിലാണ്. അതോടെ ആ പാററാമുട്ടകൾ നാശമടയുകയും ചെയ്യും. ഒരുതരം തവളകൾക്ക് പാററാഇറച്ചി ബഹുപ്രിയമാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കടന്നലുകളെയും തവളകളെയും പാററായുടെ വലുതവ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുചെന്നുവിടാറുണ്ട്. തവളവർഗ്ഗം പെരുകുമ്പോൾ പാററായുടെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായി കുറയുക പതിവാണ്. ഒരുതരം അട്ടകൾ പാററായുടെ മുട്ട തിന്നു തീക്കും. എന്നാൽ കഷ്ടമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ അട്ടകളെ പാററായും തിന്നുമുടിക്കുകയാണ് പതിവ്. നമുക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്ന മുട്ടകളെ മുടിക്കാൻ പാററാക്ക് കഴിവു

ണ്ട്. പാറാ ധാരാളമുള്ള വീടുകളിൽ മുട്ട പെരുകാറില്ല. പാറായുടെ ശതകളിൽ ഏറവും പ്രധാനി മനുഷ്യൻതന്നെ.

മദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലാണ് പാറാവറ്റ്ങ്ങൾ ഏറവും അധികമായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഇന്ന് അവ ചെന്നുചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കുറവുതന്നെ. മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണതാനും അവ ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോരോ പ്രത്യേകപ്രദേശങ്ങളിലെ വറ്റ്ങ്ങൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിയേറിയാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ അവിടുത്തുകാരായിത്തീരുകയാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽതന്നെ വിദേശികളായ അനവധിവറ്റ്ങ്ങൾ കണ്ടെന്നു വരാം. നല്ലതുപോലെ പറക്കുന്ന വലിയ പാറാ അമേരിക്കക്കാരനാണ്. (Periplaneta America) ആദ്യം അമേരിക്കയിൽനിന്ന് കപ്പൽ വഴി യൂറോപ്പിലും പിന്നെ അവിടെനിന്ന് കപ്പൽ വ്യാപാരചുരക്കുകളുടെ കൂടെ ഇവിടെയും വന്നുചേർന്നതാണ്. ഇന്ന് അതിന്റെ മട്ടും ജീവിതരീതിയും കണ്ടാൽ വിദേശിയാണെന്നു തോന്നുമോ? യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ആന്ത്രോപിയയിൽനിന്നും ഏഷ്യയിൽനിന്നും ചെന്നുചേർന്ന്, അവിടുത്തുകാരായി കഴിയുന്ന പല വറ്റ്ങ്ങളും കാണാനുണ്ട്. മനുഷ്യനെപ്പോലെ, ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാറായും. കുടിയേറുന്ന നാടുകളെ സ്വന്തം നാടുപേര്

ലെ സ്വീകരിക്കാൻ അതിനുള്ള കഴിവു അതുതകരമായിട്ടുള്ളതുതന്നെ. ആകെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറിൽപരം പാറാവഗ്ഗങ്ങളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവരിച്ചു.

ചിറകുള്ള ഷഡ്‌പദവഗ്ഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒന്നാണ് പാറാവർഗ്ഗം. ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം പ്രാചീന വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽഖാതങ്ങൾ (Fossils) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഇരുനൂറോളം മില്യൻ സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പാറാവഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉൽഖാതങ്ങൾ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആ പ്രാചീനകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു ഷഡ്‌പദവിഭാഗമാണ് അവ. പാലയോസോയിക് കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം അവയുടെ പ്രതാപം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയതായി പറയാം. പാറായുടെ സുവർണ്ണദശ അതിനുമുമ്പായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭവത്തിന് പിന്നെയും എത്രയോലക്ഷം വത്സരങ്ങൾ വേണ്ടിയിരുന്നു. നാശോന്മുഖമായ ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്കുമാണ് ഇന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന പാറകൾ. എങ്കിലും അടുത്തകാലത്തെപ്പോലെയോ അവ അന്യംനിന്നുപോകുമെന്നു പ്രവചിക്കുകയും പ്രയാസംതന്നെ. ഇവയുടെ ഇന്നത്തെ പെരുപ്പംതന്നെ അതിന്നു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞപോയ പ്രതാപം അവയ്ക്കു വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയാനും പാടില്ല.

ചിതൽ

സുസംഘടിതമായ സാമൂഹ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ അധികമില്ല. എറമ്പ്, തേനീച്ച, കടന്നൽ, ചിതൽ ഇവയാണ് മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത്തരം ജീവിതത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സാമൂഹ്യ ജീവി ചിതലാണ്. മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിതം നയിച്ചതുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മില്യൻ സംവത്സരങ്ങളോളമേ ആയിട്ടുള്ള എറമ്പ്, തേനീച്ച, കടന്നൽ തുടങ്ങിയവക്ക് ഏതാണ്ട് എഴുപത് മില്യൻ കൊല്ലത്തോളം പഴക്കം വരും. എന്നാൽ ചിതലിന്റെ സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിന് ഇരുനൂറു മില്യൻ സംവത്സരത്തോളം പ്രാചീനതയുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അനുമാനം. സ്റ്റേഡർ എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആകെ 1929 ജാതി ചിതലുകളുണ്ടെന്നും അതിൽ ൪8 ഉത്ഭവതവഗ്ഗങ്ങൾ നീക്കിയാൽ ഇന്ന് 1861 ജാതികളെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണെന്നും ആകുന്നു. ഏതാണ്ട് എഴുപതു മില്യൻ സംവത്സരത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഉ

ത്ഖാതങ്ങളിൽ, ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചിതങ്ങളായ ചിത
 ലുകളിൽനിന്ന് അധികം വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാത്ത, ചിതലുകളുടെ
 തെളിവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
 അത്തരം ഉത്ഖാതങ്ങളധികവും പറക്കുന്ന ചിതലുകളുടെ
 (ഈയലുകളുടെ) യാണ്. ആ കാലത്തു് ഇവ ഇന്നത്തേ
 കളേറെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന അനുമാനത്തെ
 സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണുള്ളതു്. ചിതലുകളി
 ലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഉത്ഖാതങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ
 പഴക്കം കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽനിന്നു മാത്രമേ ശാസ്ത്ര
 ജ്ഞന്മാർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കാലഘട്ടത്തെ പ്ലീസ്റ്റോ
 സിൻ (Pleistocene) കാലഘട്ടമെന്നാണ് പറയുക. എ
 ന്നാൽ സാലൈസ്സി എന്ന റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ യൂറാൾ
 പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള സിൽവാ നദീതട
 ത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ഇയോസിൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു
 ഉത്ഖാതത്തിൽ ചിതലുകളുടെ തെളിവുകൾ കാണാൻ
 സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവക്ക് അതിപ്രാചീനകാലത്തെ
 പാറാവർഗ്ഗത്തോടു് സാദൃശ്യവും ബന്ധവും കണ്ടെപ്പിട
 ന്നു. പാറാവർഗ്ഗം ഏറവും പ്രാചീനമായ ഷാട് പദവ
 ഗ്ഗമാണ്. അവയുടെ ഉത്ഖാതങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ടു് മൂ
 ന്നര മില്യൻ സംവത്സരങ്ങളോളം പഴക്കം പറയുന്ന
 ണ്ടു്. അവയോടു് പഴക്കത്തിൽ സാദൃശ്യം ചിതലിനും
 പറയാവുന്നതാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മതം.
 എങ്ങിനെയായാലും ഭൂഘടലത്തിൽ പുഷ്പരഹിതസസ്യ

ങ്ങൾ പ്രതാപം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ചിത്രശലഭങ്ങളോ, പക്ഷിവൃന്ദങ്ങളോ സസ്തനിവർഗ്ഗങ്ങളോ ആവിർഭവിക്കുന്നതിന്നു് എത്രയോ മുമ്പു് ഭീമാകാരങ്ങളായ കൂർമ്മവർഗ്ഗജീവികൾ വാണിരുന്ന കാലത്തു്, ഇന്നേക്കു് ഏതാണ്ടു് ഇരുന്നൂറു മില്യൻ സംവത്സരത്തിനുമുമ്പു് ചിതലുകൾ പ്രതാപം പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നു് റഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഉത്ഖാതങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ചിതൽ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രായവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഇന്നലെയുണ്ടായ ഒരു ശിശു മാത്രമാണു്. ഇത്ര ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിൽ അവ പരിണാമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതരീതി, മറോതിനേയുമാകാർ പാന്നാർഹമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതിന്നു് സംശയമില്ല. ചിതൽജാതികൾ മിക്കവാറുമെല്ലാംതന്നെ കാണപ്പെടുന്നതു് മധ്യരേഖയോടു സമീപിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലുമാണതാനും. അഗണ്യങ്ങളായ അപൂർവ്വം ചില ജാതികൾ യൂറോപ്പിലെ മധ്യധരണ്യം ഹി പ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യരേഖയോടു സമീപിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും കടന്നു കയറിയിട്ടുമുണ്ടു്. ഏറ്റവും മധ്യം ജാതികളെ കാണാവുന്നതു് ആഫ്രിക്കയിലാണു്; സഹാറാ മരുഭൂമിക്കു തെക്കുള്ള ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽതന്നെ റിഫ് ജാതികളോളം ചിതലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടത്രേ.

ഐസോപ്റ്ററീറാ എന്നു ഒരു ഗോത്രത്തെ അർത്ഥം വംശങ്ങളായി തരം തിരിച്ചാണ് കീടശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിതലിനെ പൊതുവേ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു വംശത്തിൽ 223 ജാതികളുണ്ട്. അവയെല്ലാംതന്നെ ചതുരപ്പിടിച്ച തടികളിൽ സമൃദ്ധങ്ങളായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. 147 ജാതികളുള്ള മറ്റൊരു വംശത്തിലെ അംഗങ്ങളധികവും ഭൂഗർഭത്തിലാണ് താമസം. അവയിൽ പെട്ടെന്നു ചിലജാതികൾ കെട്ടിടങ്ങളിലുപയോഗിക്കാവുന്ന തടി നശിപ്പിക്കുന്നവയാകയാൽ സാമ്പത്തികപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്. ഏറ്റവും വിപുലമായ ഒരു വംശത്തിൽ 1,323 ജാതികളോളം ഉണ്ട്. ഇതിൽ മനുഷ്യനു ഏറ്റവും അനികം ധനനഷ്ടം വരുത്തുന്ന ജാതികളുൾപ്പെടുന്നു.

നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതങ്ങളാണ് ചിതൽപ്പുറകൾ. അതിനുള്ളിലെ ജീവിതസംവിധാനം അത്യധികം രസകരമായ വിധത്തിലാണ്. നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചിതലിന്റെ സമൃദ്ധജീവിതമാണ് ഏറ്റവും അധികം പഴക്കമുള്ളതു്. ചിതൽപ്പുററിന്റെ പുറത്തു്, അകത്തു് നടക്കുന്ന സജീവപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു മൺകൂമ്പാ എന്നതിൽകവിഞ്ഞു് അതിനെക്കുറിച്ച് ബാഹ്യനി

രീക്ഷകന് ഒന്നും തോന്നുകയില്ല. അതിനുള്ളിൽ സമ്പുഷ്ടമായ അന്ധകാരമാണെന്നു പറയാം. ബാഹ്യലോകവുമായി സമ്പർക്കമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് ചിതൽ തയ്യാറാകുന്നത്, അവയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ കുറവുകൊണ്ടും ജന്മനായുള്ള കഴിവുകേടുകൊണ്ടുമാണ്. ചിതലിന് പ്രകൃതിയിൽ നിരവധി ജന്മശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അന്ധരും ചലനവേഗതയില്ലാത്തവരും, മുറ്റുമുറത്തോടുകൂടിയവരായ ചിതലുകളുടെ ശത്രുക്കൾ അധികവും, പോരിൽ വിജയിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ സങ്കേതത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുജീവിക്കുക മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.

ചിതൽപ്പുറിലെ ജീവികളിൽ തൊണ്ണൂററിഞ്ഞു ശതമാനവും തൊഴിലാളികളാണ്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത ആണം പെണ്ണും ആണിവി. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതങ്ങളാകയാൽ ശിശുശാഗങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സന്താനോൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ശേഷി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സന്താനനിയന്ത്രണം സംധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള ആണിനും പെണ്ണിനുമെല്ലാം സന്താനോൽപാദനശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

ന്നാൽ, കിട്ടുന്ന ആഹാരം എല്ലാവർക്കും തികയാതെ പോകാനിടയുണ്ട്. അതുപോലെ സ്വന്തം കുടുംബമെന്നും സന്താനമെന്നുമുള്ള പ്രത്യേകമനോഭാവം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉളവായിത്തുടങ്ങിയാൽ സമൂഹത്തിൽ മത്സരവും പരസ്പരവിദ്വേഷവും സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങളും വളരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഇവയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇത്തരം പ്രാകൃതസമൂഹങ്ങളിലെല്ലാംതന്നെ പ്രത്യുൽപാദന പ്രവർത്തനം, അപൂർവ്വം കുറെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.

തൊഴിലാളിയുടെ ശരീരം, വെറും കണ്ണിൽ, നല്ല മിനുസമുള്ളതായി തോന്നാമെങ്കിലും അതിൽ നിരവധി ചെറുരോമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. അവയാണ് അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള സ്പർന്നംഗങ്ങൾ. തൊഴിലാളികൾക്ക് കണ്ണിലുതാനും. അതിനാൽ സ്പർന്നംഗങ്ങളേയും പ്രാണശേഷിയേയും ആശ്രയിച്ചാണ് അവ സ്വകർത്തവൃങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, രാത്രിയും ചിതൽപ്പറ്റിനുള്ളിൽ അവക്കൊരുപോലെയാണ്. മുപ്പതു നൂഴ്ചികയും അവർ കർമ്മക്ഷമരാണെന്നും. സ്വന്തം വടന ഭാഗങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളികൾ ജോലി എല്ലാം ചെയ്യുക. ആഹാരസമ്പാദനത്തിനും, സ്വരക്ഷക്കും, കൂട്ടിലെ പുതിയ പണികൾ നടത്തുന്നതിനും, കൂട്ടുകാരേയും മറ്റുള്ളവരേയും വിനോദിപ്പിക്കുന്നതിനും,

മുട്ടകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, എന്നുവേണ്ടാ സമൂഹത്തിലെ പ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാംതന്നെ നിറവേറ്റുന്നതിന് അതിന്റെ ഫനക്കളാണ്. വസ്തുക്കളുടെ തീഷ്ണത ഭേദങ്ങൾ കറേയൊക്കെ അറിയുന്നതിന് അവക്ക് കരുത്തുണ്ട്. ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നതിനതകുന്ന ശ്രവണശ്രീയങ്ങൾ അവയ്ക്കുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മണ്ണിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന കമ്പനങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ മറ്റു ഷഡ് പദങ്ങളിലേപ്പോലെ, അവയുടേയും കാലിൽ ഉണ്ട്.

സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷക്ക് നിയുക്തരായിട്ടുള്ള പടയാളികൾ ചിതലിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആകെയുള്ള അംഗങ്ങളിൽ ഇവർ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം വരും. ഇവരുടെ തലയുടെ വലിപ്പവും ആകൃതിയും ഫനക്കളുടെ പ്രത്യേകതകളുംകൊണ്ട്, അവരെ തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. തൊഴിലാളികളേപ്പോലെ ഇവയും ജനനേന്ദ്രീയങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത ജീവികളാണ്. തലയുടെ വലിപ്പംകൊണ്ട് ഇവർ ബുദ്ധിമാന്മാരായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവം നേരെ മറിച്ചാണ്. തിന്നാൻകൂടി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത തിരുമായന്മാരാണ് ഇവർ. രാജാവിനേയും രാജ്ഞിയേയുംപോലെ ഇക്കൂട്ടരേയും ഉദ്ദിഷ്ടോദനത്ത് തൊഴിലാളികൾതന്നെ. സമൂ

ഹത്തിൽ ഇവരെ ഊട്ടിപ്പോരുന്നതു് അമിതമായ നഷ്ടക്കൂച്ചവടമാകയാൽ അത്യാവശ്യത്തിനു് വേണ്ടവരെ മാത്രമേ പുലർത്താറുള്ളൂ. ഇവയുടെ പെരുമ്പലയിലെ തലച്ചോറു് വേണ്ടവണ്ണം വളച്ചു പ്രാപിച്ചനിലയിലുള്ളതല്ല. അതു് വളരെ ചെറുതുമാണു്. തലയിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ താരതമ്യേന വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥികൊണ്ടാണു് നിറച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിന്റെ സ്രോതസ്സു് ഹനക്കുളിലേക്കു് തുറന്നിരിക്കുന്നു. ശത്രുവിനെ കടിക്കുമ്പോൾ ആ സ്രോതസ്സുവഴി നിറമില്ലാത്ത ഒരു ദ്രാവകം പുറത്തേക്കു് വരും. ഇതു് ശത്രുവിനു് അത്യധികം ആപൽകരമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ പടയാളികളുടെ സമരത്തെ ഒരു രാസയുദ്ധമാണെന്നുംകൂടി പറയാം. ഈ രാസയുദ്ധം അത്യധികം പുണ്യതയിലെത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചിതൽജാതികൾ കുറവല്ല. ഒരു ജാതിയിലെ പടയാളികൾക്കു് കൊമ്പുപോലെയുള്ള ഹനപ്രദേശങ്ങൾക്കുപകരം അവിടം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രോതസുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന മോന്തയാണുള്ളതു്. അതുവഴി മാരകമായ ദ്രാവകം, പീച്ചാങ്കുഴലിൽകൂടി വെള്ളം ചീറുന്നമാതിരി, ശത്രുവിന്റെ മേൽ പതിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുഭയമുണ്ടായാൽ ഈ പടയാളികൾ മോന്തയും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് പ്രതിരോധത്തിനു് തെയ്യാറെടുത്തു് നടന്നുതുടങ്ങും. ഏതുജാതിയിൽ പെട്ടതായാലും പടയാളികൾ സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ

തൃജിക്കുന്നതിന് സദാപി സന്നദ്ധതയുള്ള കൂട്ടരതന്നെ. അക്കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു മടിയുമില്ല. യുദ്ധത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഇക്കൂട്ടരെക്കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല. തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെകൂടെ ഇവർ പോകുക പതിവാണ്. ആഹാരസമ്പാദനത്തിലോ കൂട്ടനിർമാണത്തിലോ ഇവർ പങ്കില്ല. എന്നാൽ പണിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം ജീവനേപ്പോലും ബലികഴിക്കും. ഇവർക്ക് കർത്തവ്യനിമിത്തമെന്നതിന് ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെനിന്നു എന്നോ എങ്ങിനെയാണെന്നോ നമുക്കറിവില്ല. അവയുടെ അച്ചടക്കബോധവും കാര്യക്ഷമതയും ആരിലും അതുതമുളവാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതുതന്നെ. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം അത്യന്തം മോശമായ നിലയിലുള്ളതാണ്. പടയാളികൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളാണെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. കൂട്ടിലെ ക്ഷത്രുക്കൾക്കും രാണിക്കും രാജാവിനും തൊഴിലാളിക്കും ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തമാഹാരങ്ങൾ ഇവർ കിട്ടുകപതിച്ചില്ല. വിശന്നുപലയുന്ന പടയാളി ആഹാരത്തിന്നുവേണ്ടി തൊഴിലാളിയെ സമീപിച്ചാൽ തൊഴിലാളി തിരിഞ്ഞുനിന്ന് പൂച്ചുഭാഗം കാണിച്ചുകൊടുക്കും. അതിന്റെ ഗുടത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്നത് ഭക്ഷിച്ച് പടയാളി തൃപ്തനായിക്കൊള്ളണം, തൃപ്തനായിക്കൊള്ളും.

സന്താനവൽനവിന" ഉത്തരവാദി സമൂഹത്തിലെ
 രാജ്ഞിയാണു്. അവളുടെ കുത്തവും മുട്ടയിടുകമാത്രമാ
 ണു്. മുട്ടയുടെ എണ്ണം രാണിയുടെ വയസ്സ് അനുസരി
 ച്ചിരിക്കും. വേലക്കാരിയെപ്പോലെ അവൾ അന്ധയല്ല.
 രണ്ടു് കീണ്ണാക്ഷികളും രണ്ടു ലഘുപാക്ഷികളും അവൾക്കു്
 ഉണ്ടു്. അന്ധകാരമയമായ ചിതൽപ്പുറിൽ അവരെ
 ണു് വലിയ പ്രയോജനമെന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. ഒരു
 വയസ്സുള്ള രാണി ഏതാണു് കാലിഞ്ചോളം വലിപ്പമു
 ള്ളതാണെങ്കിൽ, പതിനഞ്ചുകൊല്ലത്തിനുശേഷം അതി
 ന്റെ ഉദരത്തിന്റെ വികാസത്താൽ മുക്കാലിഞ്ചോളമാ
 യിത്തീരും. ഒരു രാണി സാധാരണ ഇരുപതു സംവത്
 സരത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കും. അതു് ഇടുന്ന പറങ്കി
 യുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മുട്ടകൾ വേലക്കാർ എടുത്തുകൊ
 ണ്ടുപോയി സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കും.
 വേലക്കാരുടെ പരിചരണത്തിനു് വിധേയമാകാത്ത മുട്ട
 കൾ വിരിയാറില്ല. രാണി മുട്ടയിടുകയല്ലാതെ അതിൽ
 ഒരു താൽപര്യവും കാണാറില്ല. ആവശ്യത്തിനു് മുട്ടകൾ
 ആയിക്കഴിഞ്ഞെന്നു് ബോദ്ധ്യമായാൽ വേലക്കാർ രാ
 ണിയെ ഉരട്ടുന്നതിന്റെ തോതു് കുറക്കും. അതു മുട്ടയി
 ടുന്നതും കുറച്ചുകൊള്ളും. ആഹാരസാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ
 ക്ഷാമമായാൽ രാണിക്കൊന്നും കിട്ടുകയില്ല. അതു് മുട്ട
 യിടൽ നിറുത്തുകയും ചെയ്യും. ക്ഷാമകാലത്തു് വേല
 കാർ മുട്ടകളേയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും തിന്നുന്നതും അപൂർവ്വം.

ല്ല. പ്രതികൂലകാലങ്ങളിൽ അവർ രാണിയെ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാമില്ല. രാണിയുടെ പ്രത്യുൽപാദനശേഷി ക്ഷയിക്കുകയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവളുടെ സ്വന്തം സന്തതികളായ സമൂഹത്തിലെ ഇളമുറക്കാർ അവളെ കൊന്നുകളയുന്നു. വേലക്കാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവളെ വാസ്തുവത്തിൽ നക്കി നക്കി കൊല്ലുകയാണ് പതിവ്. ഈ കഥം നടക്കുമ്പോൾ രാണി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. തന്റെ വിധിയെ, നിസ്സഹായതയോടെ അവൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ രാണി ഇപ്രകാരം ഇല്ലാതായാൽ സമൂഹത്തിന്റെ കഥ കഴിയുന്നില്ല. അവളുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാമതൊരു രാണി ഏറ്റെടുക്കും. ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കത്തക്ക ശേഷിയുള്ള അംഗങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. രാജാവ് മിക്കപ്പോഴും രാണിയുടെ അടുത്തുകഴിയുന്ന ഒരു സാധുജീവിയാണ്. ശത്രുശങ്കയുണ്ടായാൽ അതു രാണിയുടെ വലിയ വയറിനിടയിൽ ഒളിച്ചുകൊള്ളും. രാണിക്കു മക്കാൽ ഇഞ്ചു വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിനു കഷ്ടിച്ചു കാൽ ഇഞ്ചോളമേ വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കൂ.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവരെകൂടാതെ ഒരു ചിതൽപ്പററിനുള്ളിൽ മറവില അംഗങ്ങളെക്കൂടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. ഈ കൂട്ടരുടെ പുറത്തു് നാലു കൊച്ചുപിറകുകളും തലയിൽ നാലു കണ്ണുകളും കാണാനുണ്ട്. രാജാവി

നേയും റാണിയേയും ഒഴിവാക്കിയാൽ സമൂഹത്തിൽ ക
ണ്ടുള്ള കൂട്ടർ ഇവർക്കുതന്നെ. പ്രത്യുൽപാദനാവയ
വങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം വളർന്നു പുഷ്ടിപ്രാപിക്കുന്നതിന്
അനുവദിക്കത്തക്ക ആഹാരമാണ് ഇവക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
റാണിയുടേയും രാജാവിന്റേയും സ്ഥാനം ഭാവിയിൽ ഏ
റെറടക്കുന്നതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടരാണിവർ.
ആണ്ടിലൊരിക്കലുള്ള കാമകേളിക്ക് കാലമാകുമ്പോൾ
ഇവയെല്ലാം ചിറക് പൂണ്ണമായി വളന്ന് ഊയലുകളായി
രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. കൊച്ചുചിറകുകൾ പൂണ്ണവലിപ്പ
ത്തിലെത്തുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാലോളം മണിക്കൂറുകൾ
മാത്രം മതിയാകും. ആ സുദിനംവരെ അവ ചിറകു ക
ററികളുള്ള ജീവികളായി ചിതൽപ്പുററിനുള്ളിൽ ഏതാ
ണ്ടൊരതരം തടങ്കൽ അനുഭവിച്ച് കഴിയുകയേ ഉള്ളൂ.
ആണിയേയും പെണ്ണിയേയും കണ്ടാൽ ഒരുപോലെയിരി
ക്കും. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉദരഭാഗത്തിന്റെ
അടിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. പുരുഷ പെ
യ്ക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകസമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള
ചിതൽപ്പുററുകളൊക്കെ പൊട്ടി ഊയൽ അത്യുൽസാഹ
ത്തോടെ പറന്നുപൊങ്ങുന്നു. എല്ലാ പുററുകളിലും ഒ
ന്നിച്ച് ഒരേസമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നതിന്റെ കാര
ണം അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യലോകവുമായി യാ
തൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ പുററിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന
ഈ ജീവികൾ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒന്നിച്ചറി

ഞാൻ ഇതിനു തയ്യാറാകുന്നത് അത്യന്തം അത്ഭുതമുള്ള വാ-
ക്കുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ.

വായുവിൽ പറന്നുപോകുന്ന പല പല ചിതൽ-
പ്പാറകളിലെ ഈയലുകൾ പരസ്പരം സന്ധിച്ച്, ഇണ-
പേരുന്നതിന് ഇത് അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുറകു-
തൂണുകൊടുക്കുന്നത് അതിലെ വേലക്കാർ ആണ്. ഇ-
ങ്ങിനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചിറകു മുളച്ച ഏല്പാ പേ-
രേയും പുറത്തു വിടുന്നില്ല. അവരിൽ കുറേപ്പേരെ മനു-
ഷ്യവും പറക്കാനനുവദിക്കാതെ പുററിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന-
തിന് വേലക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടിവന്നാൽ ബ-
ലപ്രയോഗംചോലും ഇതിന് അവർ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.
ആദ്യത്തെ പുറപൊട്ടലിനുശേഷം പറന്നുയരുന്ന ഈയ-
ലുകൾക്കെല്ലാം നാശമടയാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ, കലം
അന്യംനിന്നുപോകരുതെന്നു കരുതിയാണ് ഇവ ഇങ്ങി-
നെ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു പൊട്ടലു-
കൂടി പിന്നൊരിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ അവസര-
ത്തിലാണ് ശേഷിച്ചവരെ പുറത്തുവിടുന്നത്.

പറന്നുയർന്നു പുറത്തു പോകുന്നവയുടെ ഗതിയെ-
ന്തെന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം. ഒട്ടുമിക്കാലും അന്യജന്തു-
ക്കളുടെ ഇരയായിത്തീരുകയാണ് പതിവ്. പുറപൊ-
ട്ടി ഈയൽപോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, സന്ധ്യാവേള-
യാണെങ്കിൽകൂടി അവയെ വേട്ടയാടാൻ തയ്യാറായി

എത്തുന്ന പക്ഷികളും വൗലുകളും തവളകളും മറ്റും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ. ഇവയുടെ വായിൽപെടാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഈയലുകൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെട്ടു തറയിൽ പതിയ്ക്കുന്ന ഈയൽ കീറച്ച സമയം സൗകര്യമുള്ള സങ്കേതങ്ങളിൽ പററിപ്പിടിച്ചിരുന്ന സ്വന്തം ചിറകുകൾ കടഞ്ഞ് പൊഴിയ്ക്കും. അതെന്ന ചിറകുകൾ കടഞ്ഞുകളയുന്നത് കണാൻ രസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം പെണ്ണിയൽ മണൽത്തരിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുവിലോ പിടിച്ചിരുന്ന ഉദരഭാഗം ഉയർത്തി ഒരുതരം ഗന്ധം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് മണത്തറിയാൻ സാധിയ്ക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ചിറകു പൊഴിച്ച ഒരു ആൺ ഈയൽ ഈ മണം പിടിച്ചു അതിന്റെ അടുത്തെത്തും. ആണ് അതിന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ പെണ്ണ് സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു. പുറകേ ആണും യാത്രയാകും. പെണ്ണിന്റെ പുറകേ മണം പിടിച്ചു ഒരു വാലുപോലെ അതു പോകുന്നത് ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയായി നമുക്കു തോന്നാം. പെണ്ണിന്റെ പിന്നത്തെ ശുദ്ധ സാമാന്യം സൗകര്യമുള്ള ഒരു സങ്കേതം കണ്ടെത്തുകയാണ്. അതു കണ്ടെത്തിയാൽ മണ്ണു തുരന്ന് കൊച്ചുമാളമുണ്ടാക്കി ആ നവദമ്പതികൾ അവിടെ താമസമുറപ്പിയ്ക്കുന്നു.

അവിടെ ഒരു പുതിയ സമൂഹം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതാണ് പെരുങ്കും. ഇങ്ങിനെയാണ് പുതിയ ചിതൽപ്പുറുകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നത്. റാണിയും രാജാവുമായിട്ടെല്ലെ ദമ്പതിമാർ.

ഒരു ചിതൽപ്പുററിനുള്ളിലെ അംഗങ്ങളെ തൊഴി
ലാളികൾ പട്ടാളക്കാർ; ആദ്യത്തെ റാണിയും രാജാവും;
പ്രത്യുല്പാദനശേഷിയുള്ള രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും
കൂട്ടർ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ജാതികളായി തരംതിരിയ്ക്കാ
വുന്നതാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഈ ജാതിവ്യത്യാസം എങ്ങി
നെയെന്ന് കൈവരുത്തുന്നത്? ഇതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ
ക്കുറിച്ച് പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി പ്ര
തിപാദിയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലപരിമിതി അനുവദിയ്ക്കുന്നില്ല.

ഈ സമൂഹത്തിലെ യഥാർത്ഥ അധികാരകേന്ദ്രം എ
വിടെയാണ്? ആരാണ് നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായ നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത്? അതിലെ തൊഴിൽവിഭജ
നം നിർണ്ണയിക്കുന്നതാരാണ്? നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതാരാണ്? യാ
തൊരുവിധമായ എതിർപ്പും പ്രകടമാക്കാതെ അതിലെ
ജീവികൾ ജാതീയമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കുവാൻ
തയ്യാറാകുന്നത് എന്തു കാരണത്താലാണ്? ഇതൊക്കെ
ആരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും
ഇന്നും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താത്ത പ്രശ്നങ്ങളാ
യി അവശേഷിയ്ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മാറിസ് മേയ്റാർലിക്,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ The life of the white ant- ലും
യുജിൻമാറേയ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ Story of the
white ant-ലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മിന്നാമിനുങ്ങു്

ഞാനൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനോടു ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു്. അത്താഴവും കഴിഞ്ഞു് മുററത്തു് ചാരകസേരയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ. അങ്ങമിങ്ങും പറ്റന്നു നടക്കുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങുകളാണു് എന്നെ ആകർഷിച്ചതു്. മിക്കവാറും എല്ലാ രാത്രികളിലും ഞാൻ കാണാറുള്ള കാഴ്ചയാണതു്. പലരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടു് ഈ ജീവി എങ്ങിനെയാണു മിന്നുന്നതെന്നു്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനും കഥകൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതെങ്ങുളുടെ ആശ്രിതൻ കീവഹിതിനോടും ചോദിച്ചു. അയാളു പറഞ്ഞു: “ദൈവത്തിന്റെ കളിയാ കുഞ്ഞു്” എന്നു്. പക്ഷേ എനിക്കിതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിവന്നില്ല. ഒരു രാത്രിയിൽ അമ്മയോടും ചോദിച്ചു. കരീൽ പക്ഷി കൂടുണ്ടാക്കി, രാത്രിയിൽ അവിടെ വെളിച്ചം കാണാൻ, മിന്നാമിനുങ്ങിനെ അതിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കഥയായിരുന്നു എനിക്കു കിട്ടിയ മറുപടി. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സമാധാനം തോന്നാതെയാണു് ഞാനച്ഛനെ സമീപിച്ചതു്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: “അതാ! മുകളിലേ

ക്കു നോക്കൂ. നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതു കണ്ടോ? അതെങ്ങിനെയാ മിന്നുന്നത്? അതുപോലെ ഇതും മിന്നുന്നു. എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതം!” ഏതാണ്ട് ഏഴു വയസ്സിൽ കേട്ട ആ വാക്കുകൾ മിന്നാമിങ്ങുകളെ കാണുമ്പോൾ ഇന്നും എൻറമനസ്സിൽ പ്രതിധ്വനിക്കാറുണ്ട്. ശാസ്ത്രം അതിനുശേഷം വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയ്ക്കു തോന്നിയ പ്രശ്നം ഇന്നും വ്യക്തമായ മറുപടികിട്ടാതെ നില്ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ചില അഭിപ്രായങ്ങളും നിഗമനങ്ങളുമിന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നു നോക്കാം. കുമാരനാശാന്റെ ഭാഷയിൽ “ഇരുട്ടു കീറുന്ന ഈ വജ്രസൂചി”യെക്കുറിച്ച് ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്താണ് പറയുന്നത്?

സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പൂരാതനകാലംതൊട്ട് മനുഷ്യൻ ബോധ്യമുണ്ട്. ഇത്തരം ജീവവസ്തുക്കളുടെ കഥയും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന കൂണവറ്റുങ്ങൾ നോക്ടൂലൂക്ക (Noctuluck) തുടങ്ങിയ സമുദ്രജീവികൾ, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന സ്പഞ്ചുകൾ, തുടങ്ങിയവ പണ്ടേ പലരേയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ജലജീവികളധികവും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലുള്ളവയാണ്. ശുദ്ധജലജീവികൾ വളരെ കുറവുതന്നെ. കരയിൽ ധാരാളമുണ്ടുതാനും. ചില ജീവികൾ സ്വയം പ്ര

കാശശേഷിയുള്ള അണുജീവികളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ട് പ്രകാശിതങ്ങളായതീരാം. ഫോട്ടോബ്ലീഫറോൺ, അനോമ, ലോപ്, എന്നീ മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. ഇവയുടെ കണ്ണിനു താഴെ ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട്. ഇവയിൽ അണുജീവികൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇടതടവിലൂടെ പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും മത്സ്യത്തിന് ഇഷ്ടാനുസരണം അതു നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിവില്ലാതില്ല.

സസ്യവർഗ്ഗത്തിലും സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവ ഉണ്ടെന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവയിലധികവും മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലെ ഘോരവിപിനങ്ങളിലാണ് സാധാരണമായി കാണുക. ചില ഗുഹകളിൽ വളരുന്ന കമിരവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഈ ഇനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

ഭൂതലിൽ, കീടജീവികളിലാണ് ഈ അത്യുത പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. മിന്നുന്ന കീടജീവികളെ ലോകത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്കഭാഗവും പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായവിധത്തിലാണ് വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയങ്ങളുടെ സംവിധാനം. കീടജീവികളുടെ ജീവചക്രത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം പഴുവായി കഴിയുന്നതാണല്ലോ. ഈ ദശയിൽ ചില ജീവികൾക്ക്

പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് സാധിക്കുന്നത്, മുകളിൽ പറഞ്ഞമാതിരി മിക്കപ്പോഴും സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന അണുജീവികളുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്ന പൂക്കൾ, അവരെ പ്രകാശിപ്പിച്ച അണുക്കളുടെ ഇരയായിത്തീരുകയുമാണ് പതിവ്. ചുരുക്കത്തിൽ 'പ്രകാശരോഗം' ബാധിച്ചാൽ മരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത!

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള മിന്നാമിനുക്കുകളെ കാണാറുണ്ട്. താരാവെന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിലത്തു പടൻ കിടക്കുന്ന ഒരു തരം ചെടിയിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട്. കണ്ടാൽ കുന്നിക്കുരുപോലെ തോന്നും. ആകൃതിയും വലിപ്പവും അത്രമാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ ജീവിയുടെ പുഷ്പഭാഗത്തോടടുത്ത് അല്പം മുമ്പിൽ അടിവയറിൽ ആണ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കേന്ദ്രം. ഇതിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു തരം മിന്നാമിനുക്കിനെ കൂടി സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. അതിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ചെറിയ വണ്ടാണെന്നു തോന്നും. അല്പം ഇരുണ്ട നിറമാണ് അതിനുള്ളത്. കാലിങ്ങോളം നീളംവരും. പകൽ കണ്ടാൽ അത് മിന്നാമിനുക്കാണെന്നു തോന്നുകയില്ല. രാത്രിയിലാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനമധികവും.

ഏറ്റവും അധികം വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിന്നാമിനുക്ക് പൈറോഫോറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.



യപ്പെടുന്ന ജീവിയാണു്. വെസ്റ്റിൻഡീസിലാണു് ഇതിനെ കാണുന്നതു്. നെഞ്ചിന്റെ അറ്റത്തു് രണ്ടു കണ്ണു പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണു് പ്രകാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. മഞ്ഞ കലൻ വെളിച്ചമാണുണ്ടാകുന്നതു് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ. കൂടാതെ ഓറഞ്ചുനിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം പൊരിയുന്ന ഒരു ഭാഗം വയറ്റിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടു്. ഈ നാടുകളിൽ ആദ്യകാലത്തു് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാർ ഈ ജന്തുവിനെക്കുറിച്ച് പല വിവരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൂടിലുകളിൽ വെളിച്ചത്തിനുവേണ്ടി ഈ മിന്നാമിനുക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നത്രേ! അലങ്കാരഭൂമുള്ള അന്നാട്ടിലെ മങ്കമാർ മുടികെട്ടി അതിൽ ഇവയെ ചൂടാറുണ്ടായിരുന്നുപോൽ! രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തുകാർ പാടങ്ങളിൽ ഇതിനെ കെട്ടിവെച്ച് വഴി തെളിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പൈറോഫോറസ് വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു് മിന്നിയും മഞ്ഞിയും ഒരു സ്തനനുകൂലത്തിലാണു്. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രകാശം പൊലിയുകയും ചെയ്യും. മദ്ധ്യധരണ്യാഴി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണാവുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങു് യൂസിഡോള എന്ന ജീവിയാണു്. ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം അതു് മിന്നുന്നതാണു്. ചിലപ്പോൾ ദീപ്തനേരം ഇടവിട്ടു് പ്രകാശിച്ചെന്നും വരും. ബർമ്മയിലും സയാമിലും മറ്റും കാണാവുന്ന മിന്നാമിനുക്കുകൾ വള

രെ അതുതം ഉളവാക്കുന്നവതന്നെ. പത്തുമായിരവും കണക്കിന് ജീവികൾ ഒന്നിച്ചു് മരത്തിന്റെ ഇലപ്പുടപ്പുകളിൽ സമ്മേളിക്കും. എന്നിട്ടു് ഒന്നിച്ചു് അവ മിന്നിത്തുടങ്ങും. വളരെ മണിക്കൂർ നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പതിവില്ല. ആഴ്ചകളല്ല ചിലപ്പോൾ പലവാസങ്ങൾ തുടച്ചുയായി ഇങ്ങനെ പ്രകാശോത്സവത്തിനു് അവ സമ്മേളിക്കാറുണ്ട്. ആ കാഴ്ച ആരേയും അതുതാധീനനാക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാണുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ പേർ ലാംബെറസ് എന്നാണ്.

ഈ ജീവികൾ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുകൊണ്ടെന്തു നേട്ടമാണുള്ളതു്? ഈ ചോദ്യത്തിന് അരം പറയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മടിയൊണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചു് പലക്കും പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണുള്ളതു്. അതിൽ ചിലതു് മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. ചില ജീവികളുടെ ജീവചക്രത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം ശാകാലത്തു്—അതായതു് പുഴുവായി കഴിയുന്ന കാലത്തു്—അതു് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു് ഇതയെ ആകർഷിക്കുവാനാണ്. എന്നാൽ മിന്നാമിനുങ്ങുകളിൽ ഒട്ടുമിക്കതും ഇതയെക്കാൾ ഇണയെ ആകർഷിക്കുവാനാണ് വെളിച്ചം കാണിക്കുന്നതു്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പുഴു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ പെൺവർഗ്ഗത്തിനുള്ളത്ര പ്രകാശം ആൺവർഗ്ഗത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിനില്ല. പെണ്ണു കാണിക്കുന്ന

ഈ വിളക്കു കണ്ടാണു് ചിറകുള്ള ആണു് അവളുടെ ക്ഷണം മനസ്സിലാക്കുന്നതും. മറ്റൊരു വസ്തുത്തിന്റെ രീതി ഇതിലും രസകരമാണു്. ഫോട്ടിനസ് പ്പെറാലിസ് എന്നാണിതിന്റെ പേർ. ആണു് കാണിച്ച പ്രകാശം പൊലിഞ്ഞശേഷം രണ്ടുസെക്കണ്ടു കഴിഞ്ഞു് പെണ്ണു് അടയാളദീപം കാണിച്ചാൽ ആണു് അവളുടെ അരികത്തേക്കു് യാത്രതിരിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആപത്തുകൾ പിണഞ്ഞെന്നു വരും. ആണിന്റെ വെളിച്ചംകാട്ടലിനെ തുടന്നു് മുമ്പു പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രകാശിച്ചാലും അവൻ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ അകലെ കണ്ടു വെളിച്ചം ആണിന്റെതാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന്നൊപ്പിച്ചു് സ്നേഹനൂതനത്തിൽ അവളും പ്രകാശം കാണിച്ചു തുടങ്ങും.

ഇനി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു നോക്കാം. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളതു്. എങ്കിലും അവയിൽ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നു്, ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഈ പ്രാണികളുടെ പ്രകാശശൃംഗികൾക്കു് ഫോസ്ഫറസിന്റെ പ്രകാശത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ഈ പ്രാണികൾ സ്വയം ഫോസ്ഫറസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു് കരുതി വന്നിരുന്നു. ഇന്നു് ഈ അഭിപ്രായത്തിന്നു് അംഗീകാരമില്ല. ഈ ജീ

വികളുടെ പ്രകാശം പ്രസരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളിൽ (സെല്ലുകളിൽ) രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്; ലൂസിഫെറിൻ എന്നതും ലൂസിഫെറോസ് എന്ന എൻസൈമും. ഇവ തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് ചില പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിത്തീരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിലെ അതുഭൂതലോകത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന നിരവധി ജീവികൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ചിലന്തികൾ

ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം വളരെയധികം വെറുക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ചിലന്തി. കണ്ടാലുടനെ അടിച്ചുകൊല്ലുവാനാണ് അധികംപേരും അതിനോടടുക്കാറ്. നിരീക്ഷണം ചെയ്താൽ ഇത്രകെരുതുകളുള്ള ഒരു ജീവിയെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ വിഷമമാണ്. മനുഷ്യനെ പലതരത്തിൽ ഈ ജന്തു സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. രോഗം പകർത്തുന്നതും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നതും കായ്കനികൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആയ നിരവധി ജീവികളെ ഇത് തിന്നൊടുക്കുന്നു എന്ന സംഗതി ഓർമ്മിച്ചാൽ ചിലന്തിയോടു കാണിക്കുന്ന വൈരാഗ്യം കുറച്ചൊന്നു കുറയും.

ഏട്ടുകാലികൾ ഭൂമിയിൽ കുടിപാർപ്പു തുടങ്ങിയിട്ട് മുന്തറുകോടി വർഷങ്ങളിലധികമായിട്ടുണ്ട്. പുരാതന കാലം മുതൽതന്നെ ഇവ മനുഷ്യജീവിതവുമായി പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. ഏട്ടുകാലികളേയും അവയുടെ വലയേയും വൈദ്യവൃത്തിയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു.

നും. പനി, വൃണങ്ങൾ, പ്ലേഗ്, ഹുറോം, മസൂരി മുതലായി പല രോഗങ്ങൾക്കും ചിലന്തിയെ സിദ്ധശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്രെ. ഉള്ളിൽ കഴിക്കുക, മുറിവിൽവെച്ചുകെട്ടുക, തൊലിപ്പൊമെ ഉരയ്ക്കുക ആദിയായവയായിരുന്നു ആദിയിലെ ചികിത്സാവിധികൾ. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പോഷകാംശം പെരുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയായും ഇവയെ സന്ധാരാജ്യത്തു് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും യൂറോപ്പിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലയിടങ്ങളിലും ചിലന്തിവല മുറിയിൽ വെച്ചുകെട്ടി രക്തപ്രവാഹം തടയുന്ന പതിവുണ്ടു്.

ചിലന്തിവലയുടെ കാര്യമാണല്ലോ പാത്തനീർത്തിയതു്. ജീവിക്കുന്നതിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുലർത്തുന്നതിന്നും ആഹാരത്തിന്നാവശ്യമായ ജീവികളെ കുട്ടക്കിലാക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്നും മറ്റുമായി ചിലന്തികൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ള നടപടികൾ അതുതകരങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. പെൺജാതിയിൽ പെട്ടവക്കാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത കഴിവുള്ളതു്. അവയ്ക്കെല്ലാംതന്നെ വലയുണ്ടാക്കുന്നതിന്നാവശ്യമായ ദ്രാവകം വിസർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥികളിൽനിന്നുമാണു് പശുപോലുള്ള ദ്രാവകം വിസർജ്ജിക്കുന്നതു്. നാലോ അതിൽകൂടുതലോ സൂക്ഷ്മ സൂഷിരങ്ങളിൽകൂടി പുറത്തേക്കുവരുന്ന ഈ ദ്രാവകം വായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ കട്ടിപിടിച്ചു് നല്ലലോലമായ പട്ടായി രൂപം പ്രാപിക്കും. ഒരു

പട്ടിഴയുടെ കനം 1/33000 ഇഞ്ചാണ്. ഈ ഇഴകൾ അതേവലിപ്പത്തിലും ഘടത്തിലുമുള്ള ഉരുക്കുകമ്പികളേക്കാൾ ബലമേറിയതാണ്. അത്തരം നൂറിഴകളോളം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മാത്രമേ തലമുടിനാരിന്റെ ഘനത്തിലുള്ള ഒരിഴയാകൂ.

പല വർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള ചിലന്തികൾ പലതരത്തിലാണ് ഈ നൂല് സപന്തം ആവശ്യപ്പെടുകയോ സഹിക്കുന്നത്. അധികവും വലയുണ്ടാക്കി ആഹാരം തേടുന്നു. ചിലത് കടക്കു കൂടകൾക്കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ജന്തുക്കളെ അതിൽ കടക്കും. മുട്ടകൾ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആവരണം, ചിലന്തിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കൂടകൾ, ഈയെ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നുണ്ടനെ പലതും. ചിലത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു നൂൽ പാകികൊണ്ടാണ് ചോകാറുപതിവ്. ഒരു എട്ടുകാലിക്ക് കുറഞ്ഞത് 12000 അടി നൂൽവരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ചിലന്തിവല നിർമ്മിക്കുന്നതിനു ഒരുമണിക്കൂർ നേരമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. മിക്കവാറും എല്ലാവർഗ്ഗങ്ങളിലേയും കുഞ്ഞു ചിലന്തികൾ ബലൂണിനെപ്പോലെയോ പാരച്യൂട്ടിനെപ്പോലെയോ നൂൽനിവർത്തുകയുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് വെറും കളിയല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വിദ്യയാണ്. മാതാവിൽനിന്നു അകന്നുമാറാനുള്ള പ്രായമായാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൂൽ നിവർത്തത് ഉ

ധർമ്മസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നുപറും. ചെടിയുടേയൊ
 വൃക്ഷത്തിന്റേയൊ താഴത്തെ നിലകളിൽനിന്ന് മുക്തി
 ലേക്കു പോകാനുള്ള ഒരു വിദ്യയായിട്ട് ഇതിനെ കണ
 കക്കാക്കും. നൂറുകണക്കിനു നാഴികക്കൂരത്തിൽ ഇങ്ങിനെ
 കുട്ടിച്ചിലന്തികൾ എത്തുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നി
 രീക്ഷണം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം
 ചെന്നെത്തുന്ന സങ്കേതത്തിൽ അതു താവളമുറപ്പിക്കും ഇ
 ങ്ങിനെയാണു് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുന്ന
 ത്ത്. ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തും അവ ചെന്നെത്താ
 തിരുന്നിട്ടില്ലതാനും. എട്ടുകാലിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടയിൽ
 നിന്നു വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കാലംതൊട്ട് തന്നത്താണെജീ
 വിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നു. കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അ
 വയ്ക്കുമാരും കൂട്ടത്തിലുള്ള ബലഹീനരായ സഹോദരന്മാ
 ളാണു്. ശക്തന്മാർ അശക്തന്മാരെ തിന്നാണു ജീവിക്കു
 ക. അല്പം വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടംവിട്ട്
 അവ പുറത്തുമാറിക്കഴിയും. ചിന്നെ കൊറയ്ക്കാണ് വള
 രുന്നതും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും. മുട്ടയിൽനിന്നു വി
 റിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കാലത്തു് ഒട്ടുമിക്കാലും വസ്ത്രങ്ങളുടെ ക
 ണ്ഠങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ഹേനേന്ദ്രിയം ഇല്ലാത്തവയായി
 രിക്കും. ഇക്കാലത്തു് അവയ്ക്കു് ആവശ്യമായ അംശങ്ങൾ
 അവയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണും. ചില വസ്ത്രങ്ങൾ മുട്ട
 യിൽനിന്നു വിരിഞ്ഞു താനെ ജീവിക്കുന്ന ശേഷിത്തേടുന്ന
 തവരെ തള്ളയുടെ മുതുകിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. മുട്ട
 കൂട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന്നു തള്ളയ്ക്കു് ഒരു വി
 ഷമവുമില്ല. വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൂടുണ്ടാക്കി മുക്തിയിൽ



നിന്നു വായു കുമളകളാക്കി അതിൽ കൊണ്ടുപെന്ന് സംഭരിച്ച് അവിടെ മുട്ടിടുന്ന അമ്മമാരെയും കാണുന്നുണ്ട്.

ചിലന്തിയുടെ പെൺവഴുത്തും ആണിനേക്കാൾ വളരെ വലിപ്പമുള്ളവയാണ്. അവ രണ്ടിനേയും അടുത്തു നിർത്തിനോക്കിയാൽ ആണ് ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞാണെന്നു തോന്നും. ആണം പെണ്ണും തമ്മിൽ കടുത്ത ശത്രുതയിലുമാണ് കഴിയുന്നത്. സംയോഗവേളക്കുമുമ്പ് ആണ് പെണ്ണിൽനിന്നു വളരെ അകന്നുനിന്ന് നൃത്തം ചവിട്ടുന്നതുപോലെ കാണാം. പെണ്ണിനെ ഭയന്നു സമീപിച്ച് സമീപിച്ച് സംയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണനും കൊണ്ടു രക്ഷപ്പെടാൻ അതു പരക്കുംപായും. മിക്കപ്പോഴും പെണ്ണു ആണിനെ പിടികൂടി ഭക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. പെണ്ണിന്റെ തീറ്റിയിലായി തീരാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആണ് അപൂർവ്വമായിട്ടേയുള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുലർത്തുന്ന കാര്യത്തിലോ അവയുടെ ക്ഷേമമന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ ആണിന് ഒരു പങ്കുമില്ല. ആണങ്ങൾ അപൂർവ്വമായിട്ടേ വല കെട്ടാറുള്ളൂ. കെട്ടിയാൽത്തന്നെ അതു തീരെ ചെറുതായിരിക്കും. നിരന്തരവാദിവായി, അലഞ്ഞുതിരിയാൻ മടികാണിക്കാത്ത, ആണിനെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ കൊന്നുതിന്നുന്നതിന്നു പെണ്ണു തീടുകയും കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതു കുറ്റമാണോ?

വാസ്തവത്തിൽ ചിലന്തിക്കു് ഹനിക്കളില്ല. ചിലന്തി ആഹാരം അധികവും അത് ഉള്ളിലേക്കു വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. വായുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ടു വിഷപ്പുചികകളുണ്ട്. അവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നതും ശക്തനായ ജന്തുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആഹാരമാക്കുന്നതും. അവയ്ക്കു് രണ്ടോ മൂന്നോ നിരകളിലായി എട്ടു കണ്ണുകളാണ് സാധാരണ കാണുക. എന്നാലും അവയുടെ കാഴ്ച അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതല്ല. മിക്കവയ്ക്കും വളരെ അടുത്ത വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അവ സ്വർണേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളധികവും നിവ്വഹിക്കുന്നതു്. കാലിലും ശരീരത്തിലുമുള്ള രോമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉതകുന്നതും. തലയിൽനിന്നു വളർന്നിട്ടുള്ള 'സ്വർണപാദങ്ങളും' ഇതിന്നു സഹായകമാണ്. ഈ കാലുകൾ നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കൊമ്പു കൊണ്ടും ഇവകൊണ്ടുമാണ് പ്രാണികളെ അതു പിടിച്ചു വെക്കുന്നതു്. എട്ടു കാലുകളിലായി അവത്തിന്റേ സന്ധികളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുപ്രവർത്തിച്ചു സഹകരിച്ചുകിൽ മാത്രമേ ചിലന്തിക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

ചിലന്തി ഒരു സമൂഹജീവിയല്ലെന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. തികഞ്ഞ വ്യക്തിസ്വതന്ത്ര്യക്കാരനു് അവയെല്ലാംതന്നെ. വിഷമുള്ളവ വളരെയുണ്ടു്.

മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ മാരകമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞുകൂടാ. ചിലന്തിവിഷമേറാൽ പിന്നീട് പല ആപത്തുകളും അതിന്റെ പ്രത്യം ഘാതമെന്നനിലയിൽ അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രവിശാരദന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ആയുർവ്വേദവിധി പ്രകാരം നല്ല ചികിത്സകൾ ചിലന്തിവിഷത്തിനുണ്ട്. എല്ലാ ജാതി ചിലന്തികളും വലവെച്ചു ജന്തുക്കളെ പിടികൂടുന്നവയല്ല. ചിലത് ഇരയെ ഓടിച്ചുപിടിച്ചാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്.

എട്ടുകാലി വല ഉപയോഗിച്ച് കാലുകൾ മറയ്ക്കുന്നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യിലാക്കിയ ഒരു കൂട്ടം മിടക്കന്മാർ, പരീക്ഷണാർത്ഥം ഘ്രാൻസിൽ ഒരു ചിലന്തിവളർത്തൽ കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇവയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷത്താൽ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെടുപോയി. കാരണം കേന്ദ്രത്തിൽ വളർത്തിയ ഓരോന്നും പരസ്പരം തിന്നു തുടങ്ങി. ഒന്നു മററാന്നിനെ ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് നിവൃത്തിമാറ്റം?

തവളകൾ

ബാലനായിരിക്കുന്ന കാലംതൊട്ട് തവളകളെ എനിക്കു വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അന്നത്തെ എന്റെ കൈതുകും വളത്താൻ ഉപകരിച്ച ഒരു പാറം ഇന്നും എനിക്കു ഓർമ്മയുണ്ട്. രണ്ടാംക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പൂസ്തകത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ചത്. “കുട്ടികളേ! നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയാതിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ കഥ പറയാം”—എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ പാഠത്തിൽ തവള അതിന്റെ ജീവചരിത്രം രസകരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ചതിനുശേഷം അവയെ ഞാൻ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. തോടിന്റെ കരയ്ക്കും കുളത്തിന്റെ വക്കിലും ഭീഷ്നേരം ചെന്നുനിന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തലയിൽ മുഴച്ച് ഉന്തിനില്ക്കുന്ന വട്ടക്കണ്ണുകൾ കാണുമ്പോൾ ആ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അത് എന്നോടു പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും. അത് വീണ്ടും അതിന്റെ കഥ എന്നോടു പറയുകയാണെന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കും. (ആയിടയ്ക്ക് ഒരിയ്ക്കൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരിലൊരാൾ അ

കൂൻകോവിലാറിയിലെ ഒരു കൊച്ചുകയത്തിൽപ്പെട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു,—മനുഷ്യൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്! എന്റെ കൂട്ടുകാരന് ഒരു കൊച്ചുതവളയ്ക്കുപോലും ഉള്ള കഴിവില്ലല്ലോ എന്ന്! കരയിൽതന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണെന്ന്! എന്റെ പിഞ്ചുമനസ്സിൽ അന്ന് ഈ ജീവിയോടു തോന്നിയ സ്നേഹം ഇന്നും മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. തവളയെ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചുറ്റുപാടിൽ കാണാൻ ഇടയായാൽ അതിനെ നോക്കി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും വിഷമമില്ലാതെ ചിലവാക്കാറുണ്ടാകും. വാസ്തവത്തിൽ നിരീക്ഷണം ചെയ്താൽ, വേണ്ടവിനോദം നല്ലൊരു ശേഷിയുള്ള ഒരു ജീവിയല്ലേ ഇത്?)

ഉഭയജീവികളുടെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മൂന്നു ശ്രേണികളിലൊന്നിലാണ് തവളകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 'റാണാ' എന്ന ഗണത്തിൽ (Genus) പെടുന്ന തവളകളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുനൂറ് ജാതികൾ (Species) ഉണ്ട്. ഇതിൽ ചില ജാതികൾ പൂർണ്ണമായി ജലവാസികളാണ്. അവ ജലപാദികളാണ്. മറ്റുള്ളവ മിഥുനകാലത്തിലൊഴിച്ചു മറ്റൊല്ലാ സമയത്തും കരയ്ക്കു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കുറെ ജാതികൾക്ക് കരയ്ക്കു മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ സൗകര്യം നൽകുന്ന വിരലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ അക്കൂർത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരലുകളുടെ അറ്റം

ചില പ്രത്യേകതരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ മരം കയറുന്നതിന് കഴിവുള്ള ജാതികളും അപൂർവ്വം.

(സസ്തനിവിഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യനു സംഭവിച്ച പരിണാമത്തോടു് സാമ്യത വഹിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഉഭയജീവികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ തവളകൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിണാമമെന്നു പറയാം. രണ്ടു കൂട്ടക്കും അവരുടെ വൃത്തികെട്ട വാലുകൾ നഷ്ടമായി. പിൻകാലുകൾ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ളതും വളച്ചുയള്ളതുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. തലകൾ താരതമ്യേന വലിപ്പമേറിയതുമാണ്. എന്നാൽ തവളകളുടെ തലച്ചോറ് മനുഷ്യന്റെ മാതിരി വളച്ചു പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കൈകൾ പ്രയോജനപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയും അതിന് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുറുകെ പിടിക്കാനും, ചില ജാതികളിൽ മരം കയറാനും അതിന്റെ കൈകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന സംഗതി ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിൽക്കവിഞ്ഞൊന്നും അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ ഉപകാരമില്ല എന്നേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ.)

തവളകളിൽ ചില ജാതികൾക്കു് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ 'കാളമാക്രി' (Bullfrog) 8 ഇഞ്ചോളം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. സോളമൻ ദ്വീപുക

ളിലെ ഒരു ജാതി എട്ടര ഇഞ്ചോളവും തെക്കേകാമരൂൺ
 'സിലെ ഒരു ജാതി പത്തു ഇഞ്ചുവരെയും വളരുന്നൂട്. ത
 'വളവംശത്തിലെ മറ്റുഗണങ്ങളിൽ പെടുന്ന ജാതിയി
 ലുള്ള പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ തവളകളിൽ ചിലതിന് ചില
 പ്രത്യേകതകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഇ
 രുവശങ്ങളും പിൻകാലുകളും മുട്ടരോമങ്ങളാൽ പൊതി
 ണ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ രോമമുള്ള തവളകളെന്നു
 വിളിക്കാറുണ്ട്. (*Tricho batrachus robustus*) ഇതി
 ന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ മറ്റൊരു ജാതിയുടെ അംഗുലീ
 നളകൾ മുച്ചയുള്ളവയെങ്കിലും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കു
 ന്നതായി കാണുന്നു. കിഴക്കെ ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെട
 ന്ന ഒരു വംശത്തിലെ ഗണത്തിൽ വൃക്ഷവാസികളായി
 ട്ടുള്ള തവളകളാണുള്ളത്. ക്ഷിണ അമേരിക്കൻ വന
 ങ്ങളിലുള്ള പല തവളകളും അവയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ
 വൃക്ഷങ്ങളിൽ കഴിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അവ മുട്ടയിടുന്നതു്
 തടിക്കും ഇലപ്പോളയ്ക്കും ഇടയിൽ ജലം കെട്ടി നില്ക്കുന്ന
 അവസരങ്ങളിലായിരിക്കും. ജാവയിലുള്ള ഇത്തരം മര
 ണ്തവളയിൽ ചിലതിന്റെ കാലിലെ പടം അവയ്ക്കു പര
 ക്കുവാൻ ഉപകരിക്കത്തക്കവണ്ണം വലുതാണെന്നു പറയ
 ു്പ്പെടുന്നു. ആ പടം 'പാരച്യുട്ട്' മാതിരിയാണത്രേ അ
 തിന്നു പ്രയോജനമാകുന്നതു്. ഭൂമദ്ധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളി
 ലുള്ള നിരവധി തവളകൾ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂടു
 കെട്ടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കൂടങ്ങളോ

ക്കുന്നത് മിക്കവാറും ജലാശയങ്ങളുടെ മുകളിലായിരിക്കും. ഇതിലാണ് മുട്ടയിടുക. മുട്ടകൾ വിരിയുമ്പോൾ കാണ്തുങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ പതിക്കും.

മുട്ടയിടുന്നതും കണ്തുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച് രസകരങ്ങളായ ചില വിവരങ്ങളുണ്ട്. മിഥുന കാലങ്ങളിൽ നിത്യമെന്നോണം മഴയുള്ള നാടുകളിൽ ചില ജാതി തവളകൾ കരയ്ക്കുതന്നെ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ജാതിയുടെ കാര്യം നേരമ്പോക്കുള്ളതാണ്. ജലാശയത്തിനു സമീപം അവ തുരപ്പുണ്ടാക്കി അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് തുറന്നു പോകും. തുരങ്കത്തിൽ മുട്ട നിക്ഷേപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവിടം മുതൽ വെള്ളത്തിലെത്തുന്നതുവരെ തുരക്കും. ഏന്നിട്ട് ജലാശയത്തിൽക്കൂടി അതു പുറത്തേക്കു പോരും. മുട്ട വിരിയുമ്പോൾ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കന്മാരെ പിന്തുടന്നുകൊള്ളും. കരയിൽ മുട്ടയിടുന്ന വസ്തുക്കൾ മുട്ടയിടുകഴിഞ്ഞാൽ അവയെ പൊതിയുന്നതിന് പതയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പെൺതവളയിടുന്ന മുട്ടാലകളെ ആൺതവള പുറങ്കാലിൽ ചുറ്റി വിരിയാറാകുന്ന കാലംവരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ജാതി തവളകൾ ഫ്രാൻസിൽ കണ്ടുവരുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഒരു വർഗ്ഗം, ശിശുക്കളെ വായിക്കുന്നതായിട്ടറിയാം. വെള്ളമില്ലാത്ത ഈപ്പമുള്ള പച്ചതലവൃത്തങ്ങളിൽ അവയ്ക്കു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ളതിന്നു.

സാധിക്കുന്നു. ഇടുന്ന മുട്ടകളെ തള്ളയുടെ പുറത്തൊലിയിലുള്ള കൊച്ചുസഞ്ചികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഏപ്പാട് ഒരു ജാതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽവെച്ചു മുട്ടവിരിഞ്ഞു പുറത്തുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഹാരാംശങ്ങൾ വേണ്ടപോലെ സ്വീകരിച്ചു വളരും; സസ്തനികളുടെ ഇടയിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൂഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതുപോലെതന്നെയാണു് എന്നു പറയാം. 'സുറിനാം' എന്നു പേരുള്ള മാത്രികളിൽ പെണ്ണിന്റെ പുറത്തൊലിയിലുള്ള കൊച്ചുസഞ്ചികളിൽ മുട്ടകൾ ഞെക്കി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്നു് ആണുങ്ങൾ സഹായിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കീഴയ്ക്കു് ഒരു കൊച്ചു അടപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. കറേക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കീഴുകളിൽനിന്നു് പൂണ്ണരൂപത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള കൊച്ചുമാത്രികൾ പുറത്തു ചാടും. അതുവരെ അമ്മയ്ക്കു് ആ ഭാരം താങ്ങാതെ വഴിയില്ല. - സുറിനാംമാത്രി പൂണ്ണമായി ജലത്തിൽക്കഴിയുന്ന ജാതിയുമാണു്. ഇതിനെക്കാളൊക്കെ രസമുള്ള രീതിയാണു് ചിലിയിൽക്കാണുന്ന ഒരു തവള സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പെൺവറ്റും മുട്ടയിടുന്നതു ഈപ്പമുള്ള തരയിലാണു്. അധികം താമസിയാതെ മുട്ടയുടെ ചുറ്റും ആണുങ്ങൾ കൂടിത്തുടങ്ങും. ഏതാണ്ടു് രണ്ടുഴയോളം അവർ മുട്ടയെക്കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. തവളക്കുഞ്ഞു് ഇഴഞ്ഞു് പുറത്തേക്കു് വരുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ അവയെ കാരോന്നായി വായിലാക്കി വിഴുങ്ങിത്തുടങ്ങും. എന്നാൽ

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ വയറിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. കഴുത്തിന്മേൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സഞ്ചികളിലേക്കാണ്. ഈ സഞ്ചികളിൽ കാര്യ കയറി വീഴ്ത്തിയിട്ടാണ് തവള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാരറിനു പകരം തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറയ്ക്കാനാണ് ആണുങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു ശ്രമിക്കുന്നത്. അവ വളരെയധികം വിഷകര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്രവം (Secretion) പാലുപോലെ കുട്ടികളുടെ ആഹാരമായി പ്രയോജനപ്പെടും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കാലു വളർന്നുകഴിയുന്നതുവരെ അമ്മ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ആണിന്റെ 'ശബ്ദസഞ്ചി'യിലാണ്. ഇക്കാലമത്രയും ആണിനു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് പരയേണ്ടല്ലോ. ഒടുവിൽ വളരെ വിമ്മിഷ്ടങ്ങൾ സമിച്ചായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പുറത്തേക്കു ചാടിക്കൊണ്ടു. ഇങ്ങനെ സഞ്ചികളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിന്റെതന്നെ കുട്ടികൾ ആയിരിക്കണമെന്നും ഇല്ല. തവളകളുടെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൊണ്ടുകയെന്നത് അതൃപ്തകരമായിട്ടേ വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അവ ആണാണെന്നറിയുന്നത് അതിൽക്കൂടുതൽ അൽഭുതമുളവാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. കുട്ടികളുടെ തന്ത്ര അതല്ലെന്നുകൂടി വരുമ്പോൾ അത്യൽഭുതകരമായിരിക്കുകയില്ലെന്നു തോന്നുന്നത്?

വാ വ ത്

ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലൊഴിച്ചു ലോകത്തിന്റെ മ
 റൊല്ലാഭാഗങ്ങളിലും വാവലുകളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭിന്ന
 കാലാവസ്ഥകളിലും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലും അവ
 യ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനുള്ള കഴിവിനെ കുറിച്ച് കൂടു
 തൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. ആകപ്പാടെ രണ്ടാ
 യിരത്തോളം വാവൽ ജാതികളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെ
 ത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശീതമേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്നവ
 മിക്കവാറും ഉർജ്ജസ്വലരാകുന്നത് വേനൽക്കാലമാക
 ന്നപ്പോഴാണ്. ശൈത്യകാലത്ത് മിക്കവയ്ക്കും ഉഷ്ണമുള്ള
 പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. ചിലവ
 ള്കൾ ശൈത്യകാലമത്രയും നീണ്ട നിദ്രയിലാണു് കാ
 ലം കഴിക്കുവാനാണു് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അ
 മേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ആരും യൂറേഷ്യയിൽ എട്ടും
 വാവൽ വംശങ്ങളാണുള്ളത്. വാവലിൽ രണ്ടു ജാതികൾ
 ആദ്യം നില്ക്കാരായനിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ
 ഒന്ന് ന്യൂസിലാണ്ടിലുള്ളതും മറേറ്റു് മെഡഗാസ്കറിലുള്ള
 തുമാണ്. മദ്ധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ
 ലഭോജികളായ വാവൽവയ്ക്കൾ കർഷകനെ കഠിനമായ

ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാണ്. പഴത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് അവ വലിയ നഷ്ടം വരുത്തിവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽതന്നെ കീടജീവികളെ തിന്നുജീവിക്കുന്ന വാവലുകളും ധാരാളമുണ്ട്. ഇവർ മനുഷ്യക്കുടവേണ്ടി നിശ്ശബ്ദസേവനം നിവൃത്തിക്കുന്നു. വാവലുകളെ അവയുടെ ആഹാരരീതികളെ ആസ്പദമാക്കി മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു താനും തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൃഷിക്കുവിനയുണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യനെ മറുവിധത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വഗ്ഗങ്ങൾ തുലോം വിരളമാണ്. മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിലെ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ളത് ഫലമൂലാദികൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരാണ്. കീടജീവികളെ തിന്നു ജീവിക്കുന്നവയുടെ ശരീരം താരതമ്യേന ചെറുതായിരിക്കും.

വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാവൽ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച വ്യത്യാസം ദർശിക്കാനുണ്ട്. ചിറകുവിരിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചടിയോളമുള്ളവ മുതൽ (Flying Foxes) ഒന്നാന്നരയിഞ്ചു വലിപ്പം മാത്രം വരുന്നവവരെ (Little Bamboo-bat)യുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വാവലിനെ (Pteropus) ഏഷ്യയിലെ ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങൾ, കിഴക്കെ ആസ്ത്രേലിയ, മധ്യഗാന്ധർ, ഭക്ഷിണശാന്തസമുദ്രമേഖലയിലെ ചിലഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. ഈ തടിയൻ വാവലുകൾക്ക് വാലില്ല. ഇതിന്റെ മുഖത്തിന് ഉള്ളന്റെ മുഖത്തോടുള്ള സാദൃശ്യത്താലായിരിക്കണം 'പറക്കുന്ന ഉള്ള'നെ

ന്നു ഇതിന്നു പേരു കിട്ടിയതു! ഇരുണ്ട ചാരനിറമോ
 കറുപ്പോ ആയിരിക്കും നിറം. കൂട്ടംകൂടി മരങ്ങളുടെ ഉന്ന
 തൾവരങ്ങളിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും പകൽ സ
 മയത്തു പതിവു്. എന്നാൽ വെയിൽ അടങ്ങിയാൽ
 അവ ഒരേരേന്നും ആഹാരം തേടി ഓരോ വഴിക്കു പറന്നു
 പോയിത്തുടങ്ങും. കൂട്ടംകൂടി പറന്നുപോകുമെങ്കിലും ഒറ്റ
 കൂട്ടം ഇരനേടാനാണ് അവ താല്പര്യം കാണിക്കുക. ഓരോ
 രുത്തരം അവനവന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്നനുസരിച്ചു പ്രവ
 ത്തിക്കുന്നു. താവളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ആ
 ഭ്യമാഭ്യം വന്നുചേരുന്നവർ ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള
 സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കും. പലപ്പോഴും സ്ഥാന
 ങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വഴക്കും നടക്കാറുണ്ടു്. ഇവ താവളമടി
 ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ അടുത്തു് കഴിഞ്ഞകൂടാൻ ഇടവന്നിട്ടു
 ള്ളവർക്കറിയാം, അവയുണ്ടാക്കുന്ന ബഹളത്തിന്റെ തോ
 തു്! കായ്ക്കുന്നിറക്കൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിയടയാത്ത ഈ തടി
 യന്മാർ ചിലപ്പോൾ മത്സ്യം പിടിച്ചതിന്നാറുണ്ടു്. വെ
 ള്ളപ്പുരപ്പിന്നമുകളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാവൽ
 മുകൾപ്പുരപ്പിൽ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെപ്പിടിക്കു
 ന്നതിന്നു കഴിവുള്ളവനാണ്. മത്സ്യം പിടിക്കാൻ സാ
 മന്യമുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുത്തിന്റെ കാര്യവും ഇവിടെ
 സൂചിപ്പിക്കാം. മത്സ്യബന്ധന വിദഗ്ദ്ധനായ ഇതിന്റെ
 പേര് പിസോനികു (Pizonyx) വെള്ളപ്പുരപ്പിന്ന മുക
 ളിൽ ഇതു പറന്നു നില്ക്കുമ്പോൾ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന മത്സ്യ

ങ്ങൾ വായുവിലേക്കു കതിച്ചുപാടാൻ താല്പര്യം കാട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പാടുന്നവയെ വായിലാക്കാൻ ഈ വരവലിന്നുള്ള കഴിവു് ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്.

ഏറ്റവും ചെറിയ വാവലിനെക്കുറിച്ചു മുമ്പു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. ഇതു കാണപ്പെടുന്നത് തെക്കുകിഴക്കെ ഏഷ്യയിലാണ്. മിക്കവാറും അതിന്റെ ജീവിതം മുളകാടുകളിലായിരിക്കും. തലയോടു് പരന്നതും കയാൽ മുളയുടെ വിടവുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ മിനുസമുള്ള പരപ്പുകളിൽ പിടികിട്ടുന്നതിനു് ഗൗളിക്കും മറ്റുമുള്ള മാതിരി സംയോജനമണ്ഡലങ്ങൾ അതിന്റെ കൈകാലുകളിൽ കാണുന്നുമുണ്ട്. ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പോലെ ചിറകുകളിൽ നിരവധി മനോഹരങ്ങളായ നിറപ്പകിട്ടുകളുള്ള ഞെരുകിലിന്റെ കാര്യവും ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.

വാവലുകൾ സ്വന്തമായി കൂടുകൾ കെട്ടാറില്ല. ശത്രുമുണ്ടാകാത്ത മരക്കൊമ്പുകൾ, ഗുഹകൾ, ജനവാസമില്ലാത്ത വീടുകൾ തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇവ താവളമടിക്കുക എന്നു നമുക്കറിവുണ്ടല്ലോ. അമേരിക്കയിലെ മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരുവർഗ്ഗം വാവലുകൾ ചിലതരം പനകളുടെ കൊലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൂടാരംപോലുള്ള ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ടറിയാം. തല കീഴായി തുങ്ങിക്കിടന്നാണ് അവ നിദ്ര നിറവേറുന്നതും. നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ വാവ

ലീന കാഴ്ചയില്ലെന്നുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസം അത്ര ശരിയല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ വാവലുകൾക്കും വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ കാഴ്ച കഴപ്പമൊന്നുമില്ല.

വാവലുകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി രസകരങ്ങളായ നാടോടിക്കഥകളുണ്ട്. ചില പ്രാചീന ജനതകൾ വാവൽ ഒരു കാലത്തു പക്ഷികളായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ പക്ഷികളായി തുടരുവാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അതു വിശുദ്ധ സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു— തങ്ങളെ മനുഷ്യരായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി. എന്നാൽ അവയുടെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ട ദൈവങ്ങൾ ഭാഗികമായി മാത്രമേ ആ നിവേദനം സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. മുഖം ഏതാണ്ടു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ആക്കിക്കൊടുത്തു. ബാക്കിലാഗങ്ങൾ പഴയപടി തുടന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ രൂപം. ഈ ജീവികൾക്ക് സിദ്ധിച്ചതു എന്നാണ് ഒരു കഥ. എന്നാൽ ഈ പരിവർത്തനത്തിനുശേഷം പക്ഷികളെ നേരിടുവാൻ ലജ്ജകാരണം വാവലിനു കഴിയാതെ വന്നു. അക്കാരണത്താൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയിലുമാക്കി. എന്നാൽ ഇന്നും വാവൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും മറ്റു വിശുദ്ധകേന്ദ്രങ്ങളിലും പകൽ സമയത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണത്രേ. മനുഷ്യരായിത്തീരാനല്ല, അവരുടെ പഴയ പക്ഷിരൂപം തിരിച്ചുകിടുവാൻ!

ഫിന്നീഷ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇതിലും രസമുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങിക്കിട

കടമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവ് ചിക്കപ്പോഴും വാവലിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളാറുണ്ടെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണത്രെ പകൽ സമയത്ത് വാവലിനെ കാണാത്തത്. കരാളുടെ തലക്കുകുളിയിൽക്കൂടി വാവൽ പറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിയപ്പെട്ട ആരുടേയോ ആത്മാവായിരിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. പരമ്പരയായുള്ള വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, മരണസമയത്തു മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപം പുണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പറന്നുയരും. എന്നാൽ ഭർമ്മരണമായാൽ ആത്മാവു വാവലിന്റെ ആകൃതി സ്വീകരിച്ച് ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നത്രയും കാലംകൂടി ഭൂമിയിൽ കഴിയാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായി തീരുന്നു!

മദ്ധ്യയമേരിക്കൻപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന പുരാതനമായ വറ്റ്കാർ ഒരു വാവൽക്കൈവത്തെ ആരാധിച്ചുപോന്നു. അത് അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള ഒരു മുത്തിയായിട്ടാണ് അവർ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വാവൽ വളരെ പ്രാചീനമായ ഒരു ജന്തുവർഗ്ഗമാണ്. വളരെ പ്രാകൃതരായ ജീവികൾ കരയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അതിപ്രാചീനകാലത്ത് വാവലുകൾ ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെപ്പോലെ പുരോഗതി നേടിയിരുന്നതായി അനുമാനിക്കുവാൻ തക്ക തെളിവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ പറക്കുൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കുറവു.

വാൺ. മറ്റു സസ്തനികളേയും വാവലുകളേയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണി ഇന്ന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

സസ്തനികളിൽ യഥാർത്ഥചിറകുകളുള്ള ജീവി വാവൽ മാത്രമാണ്. ചില വറ്റുങ്ങുകൾ എലിയുടെ മാതിരിയുള്ള വാലും ഉണ്ട്. പ്രകൃതിദത്തമായ റാഡർ (Radar) ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും വറ്റുങ്ങുകൾ സമുദ്രമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുക. എന്നാൽ കൂട്ടംചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഒരു സംഗതി കാണാവുന്നതാണ്. ആണം പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്നു താമസം. ഈ പൊതുതത്വത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമായ കൂട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ മിക്കവാറും വാവലുകൾ ഇണചേരുകയുള്ളൂ. മറ്റു ജീവികളിൽ കാണുന്നപോലെ ഇണയോടൊത്ത ജീവിതം ഇവയ്ക്കില്ല. ഏകദാർശ്യപ്രതമോ ഏകഭർത്തൃപ്രതമോ ഇവയ്ക്കില്ലതാനും. സ്വതന്ത്രമായ ഇണചേരലാണ്, സാധാരണ നിയമം. ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞാണുണ്ടാവുക പതിവ്. ചില കൂട്ടർ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നാലോ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാറുണ്ട്. വാവൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഗ്നരും അന്ധരും ആണെങ്കിലും പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിച്ചവയായിരിക്കും. കണ്ണു തുറക്കുന്നതിന് ചിറന്നശേഷം അഞ്ചുമുതൽ ഒൻപതു ദിവസംവരെ പ്രായമാകണം. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിറകു പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ളതിനാൽ അതിനു പറക്കുന്നതിനു കടുത്ത മോഹമാണ്. പത്തു പതിനഞ്ചു


ദിവസങ്ങളോളം കഞ്ഞിനെ അമ്മ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പതിവ്. മറ്റു സസ്തനികളിൽ കാണുന്നത്ര അശ്രദ്ധമായ സന്താനസ്നേഹം വാവലിലും കാണാവുന്നതാണ്. സന്താനസ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥങ്ങളായ നിരവധി കഥകളുണ്ടുതാനും.

മാംസഭോജികളും രക്തപാനകതുകികളുമായ വാവലുകളുമുണ്ട്. മാംസപ്രിയരായ ചില വർഗ്ഗങ്ങളെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഇവയിൽ ചിലത് മറ്റു വാവലുകളേയും തവള, മത്സ്യം തുടങ്ങിയവയേയും ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടർ ആണം പെണ്ണും ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിക്കുക പതിവ്. ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഭക്ഷിണവൈനയിലും ഉള്ള ഒരുവർഗ്ഗം (Lyrate Faise vampire) ചില പക്ഷികളെയും തന്നെക്കൂടെ ചെറിയ വാവലുകളേയും കൊന്നുതിന്നുക പതിവുണ്ട്. രക്തപാനകതുകികളായ വാവലുകളെ (Vampire) കുറിച്ചു നിരവധി കഥകളുണ്ട്. ഇവർ ധമനികളിൽ നിന്നുറന്നു ചുട്ടുപോരുകുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പുറത്തൊലി കുടിച്ചു മുറിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണവയ്ക്കുള്ളത്. രക്തം ഓമിപ്പിക്കുന്നതിന്നു അനുകൂലമായവിധത്തിലാണ് ആമാശയത്തിന്റെ സ്രഷ്ടി, ഒരു കൂട്ടർ (Desmodes) രക്തമല്ലാതെ മറ്റൊന്നെങ്കിലും ആഹരിക്കാറുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇതു കുടിച്ചാൽ വേദന അറിയുകയില്ല. ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണരുന്ന ശീലമുള്ള ആളുപോലും ഉണരാത്ത വിധത്തിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിയുണ്ടാക്കുവാൻ

ഈ വാമ്പയർ വാവലിന്നു കഴിവുണ്ട്. ഇതു മുറിവുണ്ടാക്കി രക്തം ഉറങ്ങിക്കൊടുക്കുകയല്ല, മുറിവിൽനിന്നൊഴുകുന്ന രക്തം നശിക്കുകയെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരയ്ക്കു ഇതുകൊണ്ട് ഒരുസുഖവും തോന്നുകയില്ല. മുറിവു വളരെ വേഗം ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ രോഗാണുക്കളെ പകർത്താൻ ഇവയ്ക്കു കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ ആപത്തു്. ഇത്തരം വാവൽവംശം വളരെ വലുതല്ല. ഭരതിൽ ആകെ മൂന്നു ജാതികൾ മാത്രമാണുള്ളതു്.

കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ വാവൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കുകയുണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപക്ഷെ അധികമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ 'വാവലുകളുടെ പാവേർപ്പട' സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആഗോളബോമ്പുകൾ ശത്രുരാജ്യത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസായമേഖലകളിൽകൊണ്ടുചെന്നിടുന്നതിന്നു ഈ വാവലുകളെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പരിപാടി അത്യന്തം രഹസ്യമായിട്ടാണുതാനും നടത്തിയതു്. ഇതിലേക്കു ഉപയോഗിച്ച വാവലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ടൈ ബോംബ് കൂട്ടിക്കെട്ടിവിടുകയെന്നതായിരുന്നു പരിപാടി. മുട്ടകൾ പാക്കുചെയ്തയക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടുമാതിരിയുള്ള ഒന്നിൽ ബോംബുകൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള വാവലുകളെ ബന്തവസ്സുചെയ്തു നാല്പതു ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള ഒരു കൃത്രിമ അരിക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഇത്തരം ചട്ടക്കൂടുകൾ വി

മാനത്തിൽകൊണ്ടുപോയി പാരച്യുട്ടുവഴി താഴത്തേക്കിടം. ഏതാണ്ട് തറയിൽനിന്നു് ആയിരം അടി ഉയരമാകുമ്പോൾ ചട്ടക്കൂട്ടിന്റെ വാതിലുകൾ സ്വയം തുറക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണമാണു് സംവിധാനം ചെയ്യുക. ഈ അവസരത്തിൽ ബോംബുകൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള വാവലുകൾ ചട്ടക്കൂട്ടിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു് നാനാവഴിക്കും പരന്നു പോകും. രക്ഷപ്പെട്ട വാവൽ മിക്കവാറും ആർപ്പാപ്പിളാത്ത വല്ല കെട്ടിടത്തിലും അഭയം പ്രാപിച്ച ശരീരത്തോടു ചേർന്നു് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബോംബു് കടിച്ചഴിക്കാനായിരിക്കും തുനിയുക. അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടന്ന ബോംബുകൾ ക്ലിപ്തസമയത്തു് ചൊട്ടിത്തെറിച്ച് പരിസരത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും അഗ്നിക്കിരയാകും. പ്രാഥമിക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഈ 'വാവൽ ചാവേർപ്പടക്കൻ' ചട്ട ചാമ്പലാക്കുകയുണ്ടായി. അന്നുബോംബുനിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാനദശയിലാണു് ഈ പദ്ധതി വേണ്ടുന്നവെച്ചതു്. ഇതിന്നു വേണ്ടി രണ്ടു മില്യൻ ഡോളറുകളായിരുന്നു അന്നു നീക്കിവെച്ചിരുന്നതു്!



പുച്ച

മനുഷ്യനും പുച്ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബന്ധം മറ്റു ജന്തുക്കളുമായി മനുഷ്യൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും സംശയമാണ്. പരമാത്മം ഇങ്ങനെയൊന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പുച്ച മനുഷ്യരോട് പരിപൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ ആരും തയ്യാറാകുകയില്ല. ഈ സത്യം ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറച്ചുവെക്കുന്നതില്ല. എന്നിരുന്നാലും വുഡ്ബറിറാൻഡ് (Wood Bury Rand) എന്ന വക്കീൽ വിൽപ്പനം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ സമ്പാദ്യത്തിൽ 100,000 ഡോളർ തന്റെ ഓമനപ്പുച്ചയ്ക്ക് നീക്കിവെച്ചു. മനുഷ്യർ ഇന്നും മാജ്ജാരമിത്രത്തെ എത്രമാത്രം ആത്മാത്മതയോടെയാണ് കരുതുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന നൂറായിരം കായ്ക്കങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണിപ്പറഞ്ഞത്. ഓമനിച്ചു വളർത്താറുള്ള ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാംപന്തി ഇന്നും മനുഷ്യർ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പുച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ കായ്കവുമല്ലെന്ന് ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള മമതാബന്ധത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യം

തിരക്കിത്തുടങ്ങിയാൽ മനുഷ്യാവിഭാവചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭാധ്യായങ്ങളിലായിരിയ്ക്കും നാം ചെന്നുചേരുക. അവിടെനിന്നു അധികം തെളിവുകൾ ശേഖരിയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നും വരുകയില്ല. ആ മമതാബന്ധത്തിന് ആരംഭം എങ്ങും സ്തംഭമായി ആരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുമില്ല.

അതിപുരാതനകാലത്ത് ഹുജിപ്തുക്കാർ പൂച്ചയെ പൂജിച്ചുവന്നതായി ചരിത്രരേഖകളുണ്ട്. പൂച്ചയുമായി സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവയെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടരായിരുന്നു താനും ഹുജിപ്തുക്കാർ. അവരുടെ ബാസ്റ്റ്നേജ് വെള്ളം പൂച്ചയെ കടുത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു. ആ ദേവതയുടെ ശിരസ്സുതന്നെ പൂച്ചയുടേതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രാചീനചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അത്യന്തം സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളോടെ മാജ്ജാരസമൂഹത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റി വന്നു. പൂച്ചയെക്കൊല്ലുന്നത് മനുഷ്യാഹത്യയെക്കാൾ ഹീനമായി അന്നത്തെ ഹുജിപ്തുക്കാർ കരുതി. മരണശേഷം പൂച്ചയുടെ ജഡം മരുന്നപുരട്ടി മമ്മികളാക്കി പ്രത്യേകം അറകളിൽ അടക്കം ചെയ്തു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. പൂച്ചകളെ സംസ്കരിയ്ക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം ശുശ്രൂഷകളും അവർ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മാജ്ജാരാധനക്കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന ബുബാസ്റ്റിസ് (Bubastis) തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇ

ത്തരം ശുശ്രൂണങ്ങൾ പേരുകേട്ടവയാണ്. ആധുനികകാലത്ത് ചില ധീരസാഹസികന്മാർ ഇത്തരം ചില സങ്കേതങ്ങൾ നൈൽനദീതീരത്തു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കേതത്തിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 180,000 പുച്ചുകളുടെ മമ്മികൾ 1885-ൽ കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പുച്ചുമമ്മികളെ വളത്തിനുവേണ്ടി ലേലം ചെയ്തതായിട്ടാണറിവ്.

ഈജിപ്തുകാരുടെ പുച്ചുപ്രേമത്തെ ഉദാഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു കഥ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ മേലാം. പേഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന കാംബൈസസ് (Cambyses) രണ്ടാമൻ ബി. സി. 525-ൽ ഈജിപ്ത് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ നടന്ന സംഭാവമാണ്. മെംഫീസ് (Memphis) എന്ന നഗരം അദ്ദേഹം ഉപരോധത്തിനു വിധേയമാക്കി. എന്നാൽ വളരെ നാളത്തെ കഠിനയുദ്ധത്തിനു ശേഷവും ഈജിപ്തുകാർ കീഴടങ്ങുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കാംബൈസസിന്റെ സേനാനായകന്മാർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയററി നോക്കി. ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിതോന്നി. കിട്ടാവുന്ന പുച്ചുകളെയെല്ലാം അയാൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. ഈജിപ്ത് ഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഓരോന്നായി വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി. സ്നേഹമൂർത്തികളായ ഈജിപ്തുകാർക്ക് ഈ മഹാപാപം കണ്ടു സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതു തടയുന്നതിന്ന് അവർ യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ചു. സമരമില്ലെങ്കിൽ പുച്ചുകളെ പേഷ്യക്കാർ ഞാ

ഹിക്കുകയില്ലല്ലോ! അങ്ങിനെ കംബൈസസ് പൂച്ചയെ ആയുധമാക്കിയപ്പോൾ ഈജിപ്തുക്കാർ അടിയറ പറഞ്ഞു. മെംഫീസ് കീഴടങ്ങി!

ഒരു പൂച്ച ചത്താൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ചില കമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അന്നത്തെ ഈജിപ്തുക്കാർ അനുശാസിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ഉടമസ്ഥൻ തന്റെ പുരികക്കൊടികൾ വടിച്ചുകളയുന്ന പതിവാണ്. മരിച്ച പൂച്ചയുടെ ആത്മാവ് ആവേശിക്കാതിരിക്കാനാണത്രെ ഇതു ചെയ്തുവരുന്നത്. പുരാതനകാലംതൊട്ട് ഈജിപ്തുക്കാരെ ഇങ്ങിനെ അടിമപ്പെടുത്തിയ പൂച്ചയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നും ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു തത്വം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയമാണ്. മനുഷ്യനോടു സഹകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ ആദ്യത്തെ മാജ്ജാരവർഗ്ഗം എങ്ങനെ, എന്നു ഉത്ഭവിച്ചുവെന്ന് നിശ്ചയമായി പറയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. വളരെ സഹസ്രം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പരിണാമപരമായ എന്തോ വികല്പം കാരണം ഇന്നത്തെ പൂശകരുടെ പൂവ്വികന്മാർ ആവിർഭവിച്ചു എന്നാണ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം ഇതുണ്ടായത്. പൂച്ചയുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറേബ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ ഇവിടെ സംഗതമായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ രക്ഷനേടിയ എലിയുടെ എ

ണ്ണം പെരുകി. നോഹയ്ക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായ തരത്തിൽ അവ കസ്യതിത്തരങ്ങൾ അടിക്കടി ചെയ്തു തുടങ്ങി. കടുക്കുവെച്ച് കുറെ എണ്ണത്തിനെ പിടിക്കുകയും ഉപദ്രവം കുറയ്ക്കാമെന്നു കരുതി അദ്ദേഹം അതിന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കി. എന്നാൽ ഫലം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായത ഒരു സിംഹം മനസ്സിലാക്കി. എലിയെ പിടിക്കുകയെന്ന നിത്യ ചൂലവൃത്തിക്ക് വന്ദരാജാവായ സിംഹം എങ്ങനെ ഏർപ്പെടും? എന്നതെന്നെയല്ല സിംഹത്തെപ്പോലും എലികൾ കൂട്ടാക്കാത്ത നിലയിലെത്തിയിരിക്കുകയുമാണ്. അവ ഒരു ദിവസം സിംഹത്തിന്റെ പുറംതിരക്കിക്കൂടി. കസ്യതിത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. സഹികെട്ട് സിംഹം കഠിനമായ കോപത്തോടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ തുമ്മി. അതാ! കിടക്കുന്നു—ഒരു പുച്ഛ അത് എലിയെ നിലയ്ക്കുനിർത്താനും തുടങ്ങി. ഇതാണ് മാജ്ജാരോത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ! വാസ്തവം എങ്ങനെയായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇത്തരം കഥകൾ ആവശ്യമായ കരുക്കൾ കൊടുക്കാറില്ല.

ഭൂപരിവൃത്തപരമായി പറയുന്നതായാൽ ഇയോസിൻ (Eocene) കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് 60 മില്യൻ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പു തുടങ്ങി 45 മില്യൻ കൊല്ലം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യശൃംഗയിലാണ് പുച്ഛയുടെ ഏറ്റവും പഴയ പൂർവ്വികരെ കാണുന്നത്.

ന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ആ വർഗ്ഗം രണ്ടുശാഖയായി പെരുകി. ഒളിഗോസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ (അതായത് ഏതാണ്ട് 35,000,000 സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ്) ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ശാഖകൾ ആവിർഭവിച്ചത്. അതിൽ ഒന്ന് കാരപോലെ കോമ്പലുള്ള ഒരു വർഗ്ഗമായിരുന്നു. ഈ ശാഖ പ്ലീയോസീൻ കാലം കഴിഞ്ഞു, (അതായത് 1,000,000 സംവത്സരം മുമ്പ്) ആധുനികയുഗം പിറന്നപ്പോഴുണ്ടായ പരിവർത്തനരംഗങ്ങളിൽപെട്ട് അന്യംനിന്നുപോയി. എന്നാൽ മറ്റൊരു ശാഖക്ക് അങ്ങനെ ഒരുതാപത്ത് സംഭവിച്ചില്ല. ഈ ശാഖയുടെ പുരോഗതിയിൽ ആണ് പുതിയ പൂശക വർഗ്ഗങ്ങൾ പരിണാമപ്പെട്ടു പെരുകിയത്. ഈ പരമ്പരയിലെ പിൻതുടർച്ചക്കാരെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും കാണുകയും ചെയ്യാം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ശാഖയ്ക്ക് പിന്നെയും രണ്ടു പ്രധാനഉപശാഖകളുണ്ടായി: ഒന്ന് 'ഫെലിസ്' വിഭാഗം (Felis group) രണ്ട്: സൈനൈലൂറസ് (Cynailurus group). ഇതിൽ ഫെലിസ് വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് പരിണാമപ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗമായിരിക്കണം മനുഷ്യനോടു് ആദ്യമായി അടുത്തത്. ഇതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിഗമനങ്ങൾ.

മനുഷ്യനുമായി സഹകരിച്ചും പൂച്ച ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് അയ്യായിരത്തിലധികം സംവത്സരങ്ങളായിക്കാണാം. മനുഷ്യനുമായുള്ള ഈ ബന്ധംകൊണ്ട്, മറ്റു പല ജീവികൾക്കുമെന്നപോലെ, പൂച്ചക്കു-

ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ മനഃപ്പൂർവ്വമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് താനും ഇതു സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ 'നോട്ട്' പുച്ചുകളധികവും ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇവയെ 'നോട്ട്' കാരെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പാറമോ എന്നും സംശയമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന മറ്റേതൊരു ജന്തുവിനെയും അപേക്ഷിച്ച് പുച്ചക്ക് അതിന്റെ പഴയ കാട്ടുജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കൂടുതൽ കഴിവുണ്ട്. ഇന്നും അത് പൂർണ്ണമായി ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലതാനും. ചില കാരണങ്ങളാൽ ഉടമസ്ഥൻ വീടുവിട്ടു പോകുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ള വേളകളിൽ, പുച്ചതന്റെ സംരക്ഷകനെ പിൻതുടരുന്നതിനു പകരം, കാടുകയറുകയാണ് പതിവ്. ഇതിന്നു എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാം. ശാന്തസമുദ്രത്തിലുള്ള ടാഹിറ്റി (Tahiti) ദ്വീപസമൂഹങ്ങളിൽപെട്ട ഒരു ദ്വീപിൽ 1862-ൽ ഒരു കപ്പൽ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കരേട്ടുചീകന്മാർ കടന്നുകൂടി പ്രകൃതിദൈവമായ ശത്രുക്കളുടെ അഭാവം കാരണം അവ അവിടെ അതിവേഗം പെററുപെരുകി ഒരു വല്ലാത്ത വിനയായിത്തീർന്നു. അവിടത്തെ താമസക്കാർക്കു ഗതിമുട്ടി. ഒരു ഫ്റഞ്ചു കച്ചവടക്കാരൻ നല്ല വിലവാങ്ങി അവിടുത്തുകാർക്ക് 500 പുച്ചുകളെ വിറ്റു ദ്വീപവാസികൾ എലിയുടെ ശല്യത്തിൽനിന്നു മോചിതരായി എന്നു വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ ക്രമ

അതുകൊണ്ടവസാനിച്ചില്ല. പത്തുപതിനേഴുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലിയെതിന്നതീക്കാൻ അവിടെ കൊണ്ടിറക്കിയ പൂച്ചയുടെ സന്തതികൾ നാട്ടുകാരെ കണക്കിലേറെ ഉപദ്രവിച്ചുതുടങ്ങി. മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയും വന്നു. ഒടുവിൽ പൂച്ചകൾക്ക് നാട്ടുവിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യർ പിൻവാങ്ങി. ഇണങ്ങിയ പൂച്ചകൾ കാടന്മാരായി തീരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഉദാഹരിക്കാൻ ഈ ഒരു സംഭവം മതിയാകുമെന്നു തോന്നുന്നു.

പൂച്ചയെ കേന്ദ്രമാക്കി നെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ലാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ലോകത്തിലെ വിടയെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്നു സംശയമാണ്. പൂച്ചയുറപ്പിലെ കഷ്ടതകൾ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് കരിമ്പൂച്ചക്ക് ഏഴു വയസ്സ് തികഞ്ഞാൽ അത് അമൃതകൊലയായി മാറുമെന്നാണ്. ഒരു പൂച്ച ഏഴുപേരുടെ കീഴിൽ കഴിയാൻ ഇടവന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ആളിനെ അത് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്നു തീച്ചയാണത്രെ! 1662-ൽ സ്കോട്ട് ലണ്ടിലെ ഒരു ഭർത്താവുദിനി സത്യംചെയ്തു പറയുകയുണ്ടായത്രെ അവളും സഹോദരിയും ആരെങ്കിലും അടിപെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചയുടെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന്. സത്യം എന്തായാലും അതിനനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കു ആ നാട്ടിലെ പൂച്ചകൾക്ക് അടിയും ഏറും ഏല്ക്കേണ്ട വിധിയാണ് വന്നുകൂടിയത്.

മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളിൽ പുച്ഛയെ ബലി
യ്പിക്കുന്ന രീതിയും ചില ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ
കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ദർദ്ദ്രപതകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പു
ച്ഛയെ ജീവനോടെ പൊരിക്കുന്നവരും ചുരുക്കമല്ല. നമ്മു
ടെ ഇടയിലും എന്തൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്
പുച്ഛയെക്കുറിച്ചുള്ളതെന്ന് കണക്കാക്കിനോക്കുക.

എല്ലുകൾ കടിച്ചുകയ്ക്കുന്നതിന് പട്ടിയ്ക്കുള്ള മാതിരി
അണപ്പല്ലുകൾ പുച്ഛയ്ക്കില്ല. നാക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേക
കൗതുകങ്ങൾക്ക് കരുത്തുള്ള തരത്തിലാണ് സൃഷ്ടിയ്ക്കു
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നഖങ്ങളുടെ മൂപ്പും മനയും പ്രത്യേ
കിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. പുച്ഛവംശങ്ങളിൽ ചീറാ
പ്പലിയെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാത്തിനും നഖം ഉള്ളി
ലേക്കു പിൻവലിച്ചുവയ്ക്കുവാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. പ്രാണേ
ന്ദ്രിയത്തിന്റേയും ശുവണേന്ദ്രിയത്തിന്റേയും അത്യു
തകരമായ കഴിവുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതുതന്നെ.
ചെവിക്കുള്ളിലെ രോമങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അ
തി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ കമ്പനങ്ങളെപ്പോലും അറിയുന്നതിന്നു
കരുത്തുണ്ട്. മൂക്കിനടുത്തുള്ള കൊമ്പൻരോമങ്ങൾ കടു
ത്ത സ്पर्ശനശേഷിയുള്ളവയാണ്. രാത്രിയിലെ സഞ്ചാര
ത്തിന് ഇവ അത്യധികം ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാത്രിയിൽ പുച്ഛയുടെ കണ്ണുകൾ കനൽക്കട്ടമാതി
രി ജ്വലിക്കുന്നത് നാം ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്
സംഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. പുച്ഛ

ടെ ദൃഷ്ടിയുടെ പിൻഭാഗം “ഗുവാനിൻ” (Guanin) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ കണങ്ങൾകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശരശ്മികൾ ഭാവിയിലെ പതിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ തുതീയപടലത്തിലെ (Retina) മറയയെ പെരുപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, കാഴ്ച കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതാക്കിത്തീർക്കും. ഏറ്റവും ശക്തികറഞ്ഞ രശ്മിയെപ്പോലും “ഗുവാനിൻ” പൊലിപ്പിച്ചുകാണിക്കും. ടോർച്ചിന്റേയോ മറ്റു പ്രകാശത്തിന്റേയോ രശ്മികൾ പുച്ചയുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അത് പതിനടങ്ങായി നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും. ഇങ്ങനെയാണ് പുച്ചയുടെ കണ്ണ് നിലാവെളിച്ചത്തിലും മറ്റും ജ്വലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്.

പുച്ചവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരെല്ലാം മാംസഭോജികളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ പൊതുവായ ധാരണ. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല. കിഴക്കെ ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടർ (Felis, planiceps) ചാറുള്ള പഴങ്ങൾ ഭുജിക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തോട് പുച്ചവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്നവക്കൊക്കെ വിരോധമാണ് പൊതുവിൽ. എന്നാൽ ഇതിനും വ്യത്യസ്തതകൾ ഇല്ലാതില്ല. മീൻപിടുത്തത്തിൽ മിടുക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. മലയായുടെ കിഴക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും. (Felis viverina)

• സിംഹം, കടുവാ തുടങ്ങിയ വീരന്മാരെല്ലാം പുച്ഛ വസ്ത്രത്തിൽതന്നെയുള്ള കൂട്ടരാണെന്നു എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടു്. അവരെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല.

• ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പുച്ഛയെ വാത്സല്യത്തോടെ വളർത്തുന്നവരുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ടു്. പുച്ഛയെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്നു് ഈ സംഘടനക്കാർ ചില നിബന്ധനകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നീണ്ട രോമത്തോടുകൂടിയ ഏഴു തരങ്ങളേയും കുറുകിയ രോമമുള്ള പത്തു തരങ്ങളേയും അവർ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സംഘടനയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രാദേശിക സംഘടനകളും അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർത്താറുള്ളതു് ബ്ലൂ പേഷ്യനും സയാമീസും പുച്ഛകളെയാണു്.

കുറുക്കൻ

കുറുക്കനെക്കുറിച്ചുള്ളതുപോലെ കഥകൾ മറ്റേതെങ്കിലും ജന്തുവിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നു സംശയമാണ്. ഏതു നാട്ടിലും ഏതു ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഇത്തരം കഥകൾ കേൾക്കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും അഭിമാനിക്കത്തക്ക കാര്യങ്ങളായിരിക്കുകയില്ല കുറുക്കന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത്. കുടിലതക്കും വഞ്ചനക്കും കൂട്ടനിലുക്കയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനഃസാക്ഷിയില്ലാത്ത ജന്തുവെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ കുറുക്കനെക്കുറിച്ച് ധാരണവളർത്തുവാൻ ഇത്തരം കഥകൾ അങ്ങേയറ്റം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഞ്ചുപ്രായം മുതൽ ഇത്തരം കഥകളാണ് കേൾക്കാനിടവരുന്നത്. ഈ കഥകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമുള്ളപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ ചില പരമാർത്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ മനുഷ്യർ മടികാണിച്ചെന്നു വരും. കുറുക്കനെക്കൊണ്ടു ഉപദ്രവമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഉപയോഗമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും നെററി ചുളിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനായ ഒരാളിനോടു് ഇതിനെക്കുറി

ച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കുക. അയാൾ കോഴിക്കുപ്പച്ചിക്കാരനാണെങ്കിൽ കുറുക്കന്റെ പേരിൽ കുറെ ഗൗരവമേറിയ പരാതികൾ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും തീച്ച!

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണാറുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് കുറുക്കൻ. വനപ്രദേശങ്ങളോട് വളരെ മമതയൊന്നും ഇതിനില്ല. വനാന്തരങ്ങളിൽ ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും സാധാരണമല്ല. കുററിക്കാടുകളിലും കുട്ടിവനങ്ങളിലും ജീവിക്കുകൊണ്ടു നാട്ടിൻപുറങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുവാനാണ് ഇതിനു കൂടുതൽ താല്പര്യം. ജനനിബിഡങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതിനു കുറുക്കനു നല്ല കഴിവുണ്ട്. ഭാരത തലസ്ഥാനമായ പുതുദില്ലിയിൽ ഉള്ളന്റെ കാലിയിൽ പ്രതിലോപനിക്കുന്നത് അപൂർവ്വമല്ല. മദിരാശി പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്കു താമസിക്കുന്ന ഒരാളിനു് കുറുക്കന്റെ കഴൽ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൻപുറത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരത്തു സാധാരണസവാരിക്കായി വാട്ടർവർക്ക്സിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ആൾ സന്ധ്യയാകുന്നതുവരെ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാനിടവന്നാൽ നാലഞ്ചുകുറുക്കന്മാരെ കാണാതെ മടങ്ങുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല! കാട്ടിനടുത്തുള്ള കുഗ്രാമങ്ങളിലും ജനബഹുലമായ പട്ടണങ്ങളിലും ചൈതന്യമില്ലാതെ കഴിയുന്നതിനു് സാധിക്കത്തവിധം ജീവിതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജന്തുവിന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തെപ്പ

ററി അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നതോ
 നന്നില്ല. സിംഹത്തിനു തീറ്റി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന
 കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് കുറുക്കനെ ആഗ്രിക്കയിലെ ജന-
 ങ്ങളിൽ ചില വിഭാഗക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത്. സിംഹം
 തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെ പിന്തുടരുന്ന ശീലം ഇവയ്ക്കുണ്ട്.
 എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യലക്ഷ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാ-
 ണിത ചെയ്യുന്നത്. സിംഹത്തിനെയും മറ്റും സഹാ-
 യിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനുമല്ല. മിക്കപ്പോഴും വേട്ടയാ-
 ടുന്ന ജീവികളെമുഴുവൻ സിംഹം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. ആവ-
 ശ്യം കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു
 പോകുകയാണ് പതിവ്. സിംഹം പിൻവാങ്ങിയാൽ
 മേലാവിന്റെ ഉഹരിപ്പും ആഹരിച്ച് കുറുക്കൻ തൃപ്തിയ-
 ടത്തുകൊള്ളും. അധികം പണിചെയ്യാതെ പിഴക്കാൻ
 ഇതൊരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണല്ലോ. മുതശരീരങ്ങൾ നീക്കം
 ചെയ്യുന്ന കായ്ത്തിൽ കുറുക്കൻ വളരെയധികം സഹാ-
 യിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത്തരം കായ്ങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാ-
 ണ്. പെരുച്ചാഴിയേയും എലികളേയും വേട്ടയാടുന്ന
 തിൽ അവൻ വിദഗ്ദ്ധനാണ്. വിളസ്ഥലങ്ങളിൽ വ-
 നപേരുവാൻ അതാണ് വഴിതെളിക്കുന്നതും. അങ്ങി-
 നെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരന്റെ കോഴിയെ
 കണ്ടാൽ അതിനെയും അവൻ തട്ടും. മിക്കപ്പോഴും കോ-
 ഴി അവന്റെ വായിൽ ചെന്നുപാടുകയാണ് പതിവ്.
 പിന്നെ ആദായമുള്ള മേഖലയാണെന്ന് അവനു ബോ-
 ദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ കാത്തിരുന്നു കോഴിമോഷണം നടത്താനും.

. അവൻ തയ്യാറായെന്നു വരും. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരന്റെ മിത്രമാണ് കുറുക്കൻ. ആഹാരകാര്യത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളൊന്നും പുലർത്തുന്ന ആളല്ല അവൻ. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജീവികളെയൊക്കെ ആഹരിക്കും. എലിയും തവളയും കോഴിയും കീടജീവികളും മാത്രമല്ല മാങ്ങയും മുന്തിരിങ്ങയും കരിമ്പും കാപ്പിക്കുരുവുമാക്കെ അവന്റെ ആമാശയത്തിന്നു കൂലംതന്നെ.

ഒരു പരമാത്മം ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ്തരിക്കാവുന്നതല്ല. കുറുക്കന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു രഹസ്യത്തിന്റെ മുദ്രപടമുണ്ട്. ആർത്തരിക്ഷകളായിട്ടുള്ളിലായാലും തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിലായാലും കുറുക്കനെ ആളുകൾ അത്രപെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയെന്നു വരുന്നതല്ല. ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും ആണ് അത് ജീവിക്കുക. രാത്രികാലത്താണ് അധികവും സഞ്ചാരം. സകടംബമായിരിക്കും അത് നടത്തുന്നതും. ഓട്ടത്തിന്നു കുറുക്കൻ അതിസമർത്ഥനാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ല. മണിക്കൂറിൽ മുപ്പതു നാഴികവരെ വേഗത്തിൽ അത് ഓടിക്കളയും. ഓട്ടവും ഒളിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയും ആണ് അതിനെ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നവാർത്തയിടങ്ങളിൽ അത് ഒളിക്കുന്നത് അറിയുമ്പോൾ ആരും അതുതപ്പെടും.

ഭാരതത്തിലുള്ള ഒരുതരം മലവസ്ത്രക്കാർ കുറുക്കന്റെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവിന് കൊമ്പുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കുറുക്കന്റെ കൊമ്പ് കിട്ടുന്നവന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഭാഗ്യം കൈവരുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ ആരാധിച്ചുവന്ന മരണമൂർത്തിയ്ക്ക് (Anubis) കുറുക്കന്റെ തലയാണുള്ളത്. കുറുക്കന്റെ ആരാധകന്മാരും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാതില്ല.

ഇണപേർനിട്ടുണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയാണ് പതിവ്. സാധാരണയായി നാലു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും. ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ. അപൂർവ്വമായി ഒൻപതുവരെ ഉണ്ടാകാം. അച്ഛനമ്മമാർ ഒന്നിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് തീറ്റ തേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കാലങ്ങളിലാണ് കുറുക്കൻ കുടുംബജീവിതകേന്ദ്രമായി കാണാറുള്ളത്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റതിരിഞ്ഞെന്നു വരും. ഇരതേടാൻ കൂടുതൽ സൈരകളും കൂട്ടുകൂടിയോലുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാൻ വൈമനസ്യം കാണിക്കുകയില്ല. കഴപ്പത്തിൽപെട്ട് കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അച്ഛനമ്മമാർ ശ്രമിച്ചെന്നുവരില്ല. രീയ്ക്കൽ വയറവള്ളിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കുറുക്കൻകുഞ്ഞിനെ എനിയ്ക്കു കിട്ടി. അതിനെ കൂട്ടിലിട്ട് കുറെദിവസം വളർത്തിനോക്കി. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കൂട്ടു കൊണ്ടുവെച്ച് ശുദ്ധയോടെ

കാത്തിരുന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ അതിന്റെ സ്ഥിരമായ വരുമാനം എന്നറിയാൻ. കൂട്ടിയുടെ വീളികൊണ്ട് അതിന്റെ മുഖരിതമായ പല രാത്രികളുമുണ്ട്. പക്ഷെ, അടുത്തെയും അന്യകുറുക്കന്മാരുടെ ശബ്ദംപോലും കേൾക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. 'പോയതു പോയി' എന്ന മനഃസ്ഥിതിക്കാരാണ് അവരെന്ന് പറയാം. കൂട്ടിലിട്ട വളത്തിൽ കുറുക്കൻ ഇണങ്ങുന്നതും സാധാരണയല്ല.

കുറുക്കന്മാർ പല തരക്കാരുണ്ട്. മഞ്ഞക്കുറുക്കൻ (Gray or Yellow Jackal i.e, thos aureus) കാഴ്ചക്ക് ചെന്നായയപ്പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ശരീരം ചെറുതും വണ്ണം കുറഞ്ഞതുമാണ്. ചെവി വലുതും കൂർത്തുമായിരിക്കും. ഈ വർഗ്ഗത്തെ പൂച്ചയുറോപ്പ്, ഉത്തരാഫ്രിക്ക മുതൽ ബർമ്മ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഇന്ത്യ, സിലോൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താം. തായ്‌ലണ്ട്, ബർമ്മ തുടങ്ങിയ നാടുകളിലെ പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമാലയൻ കുറുക്കനെ കാണാവുന്നതാണ്.

മഞ്ഞ മുടി മരവിച്ചുകിടക്കുന്ന ധ്രുവമേഖലകളിൽ ശിശിരകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ കഴിവുള്ള അപൂർവ്വ ജീവികളിലൊന്നാണ് ധ്രുവമേഖലകളിലെ ഉള്ളൻ (Arctic Fox). കാരീബോയും ചെന്നായും മറ്റു ജീവികളും സഹിക്കാനാവാത്ത തണുപ്പുകൊണ്ട് വിറച്ചുവിറച്ചു നാടുവിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളൻ ജനിച്ചവളാണ് മണ്ണിൽനിന്ന്

കഴിഞ്ഞുപോകുവാൻ ഒരു താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല. അപൂർവ്വമായി കണ്ടേക്കാവുന്ന ധ്രുവദേശങ്ങളിലെ അണ്ണാനേയും ചെറുജീവികളെയും ആഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഉഴുളൻ അവിടെത്തന്നെ ജീവിക്കും. ആഹാരവസ്തുക്കൾ ആവശ്യത്തിലധികം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അധികമുള്ളത് ശീതികരണിയിൽ വച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന മാതിരി അതു മഞ്ഞുകട്ടിയിൽ പ്രത്യേകസങ്കേതങ്ങളിൽ വെച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. അതുപോലെ അപൂർവ്വമായി കടൽക്കരയിൽ അടിച്ചുകയറിയേക്കാവുന്ന തിമിംഗലങ്ങളുടെ ഇറച്ചിയും ഉഴുളന്മാർക്ക് ഉപകരിക്കാറുണ്ട്. ഒരുതിമിംഗലത്തെ അങ്ങിനെ കിട്ടാനിടവന്നാൽ കരയിരും കുറുക്കന്മാർക്ക് കശാലായി ശിശിരകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള വകയായിത്തീരും! ധ്രുവദേശങ്ങളിലെ കരടിയുടെ പിറകെ നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് കരടിയുടെ ഉച്ഛ്വീഷ്ടം ഉണ്ടു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മനുഷ്യരോട് അധികം ഭയമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ജീവിയാണിത്. വേനൽക്കാലത്ത് ചാരനിറമുള്ള രോമങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇതിനെ കാണപ്പെടുക. എന്നാൽ ശിശിരമാകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളരോമങ്ങൾ ശരീരമാകെ വളന്റും മുടിക്കൊള്ളും. അതിനാൽ മഞ്ഞിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കടുത്ത വിഷമമുണ്ട്. ആ വെളുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നത് മുക്കിന്റെ കറുത്ത അറവും കറുത്ത കണ്ണുകളും മാത്രം

മായിരിക്കും. ഫെബ്രുവരിയോടുകൂടി ഊളന്റെ ശരീരം വരണം മാറിത്തുടങ്ങും. ചാരരോമങ്ങൾ ക്രമേണ കിളിച്ചു വളൻ വസന്തം മദ്ധ്യമാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ ചാരനിറത്തോടുകൂടിയതാകും. ഇങ്ങനെ കാലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ചു രോമവും മാറുന്നു. വസന്തത്തിലാണ് ഇണപോൽ നടക്കുക. പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനമായ സമരം ആണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഒരു പെണ്ണിൽ ഒരുത്തന് ആശയുണ്ടായാൻ അങ്ങേയറ്റം സമരം ചെയ്തും അവൻ കാര്യം നേടുന്നതിനു ശ്രമിക്കും. പെണ്ണിനെ കൂട്ടിനു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തമായ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചുതുടങ്ങും.

ഗ്രൂവമേഖലയിലെ ഊളന്മാർക്ക് അവരവർക്കുമാത്രം അവകാശമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരാളുടെ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരാളുത്തൻ കാൽ കുത്തിക്കൂടാ. ആരെങ്കിലും അവിടെ കടക്കാനിടയായാൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നവനെ ഉടമസ്ഥൻ ആക്രമിച്ചു ബഹിഷ്കരിക്കും. ഇതു പലപ്പോഴും കഠിനമായ യുദ്ധത്തിനിടവരുത്തുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ ആർക്കും അവകാശമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾതേടി പുറപ്പെടുന്നു. ഈ പരിശ്രമത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും ഒരു നല്ലവിഭാഗം നശിച്ചെന്നുവരും.

മഞ്ഞിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായിത്തീരുന്ന സാഹചര്യമാണ് മിക്കവാറും കാലങ്ങളിൽ ഗ്രൂവമേഖലകളിലുള്ളതെന്നു പറയേണ്ടല്ലോ. ഇക്കാര്യത്തിൽ

അതിനു പകരിക്കുന്നത് പ്രതിദിനത്തെയും കാര്യങ്ങളാണു്. അന്തരീക്ഷം മൈനസ് അറുപതു ഡിഗ്രിക്കും എഴുപതു ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ എത്തുന്ന വേളകളിൽ പോലും ചുരുണ്ടുകിടന്നു നിറുചെയ്യുവാൻ അതിനു സാധിക്കും.

ഉത്തരാൽഗോളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു ജന്തുവാണ് ചെമ്പന്തുളൻ. (Red fox) അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ളവേട്ട ഒരു ചലിയവിനോദമായി കണക്കാക്കിവരുന്ന വേട്ടപ്പട്ടികൾ പിന്തുടരുന്നവരും ഇത്തരക്കാർ നാല്പത്തഞ്ചുനാഴിക വരെ ഓടിയെന്നിരിക്കും. ഓട്ടം മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഒളിക്കുവാനും കൌശലങ്ങൾ കാട്ടുവാനും അതിനുള്ള കഴിവ് അക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചെമ്പന്തുളനെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ, ക്യൂനഡാ, അലാസ്ക, യൂറേഷ്യ, ഉത്തരാഫ്രിക്ക എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ റെഡ് വുഡ് യൂറേഷ്യയിൽ അഞ്ചും ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ നാലും വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് പത്തുകൊല്ലമാണ് സാധാരണ ഇവയുടെ ആയുസ്സ്.

ചാരനിറത്തോടുകൂടിയ ഒരു വർഗ്ഗം ഉള്ളത് മരം കേറിയാണ്. മരക്കൊമ്പുകൾ വളരെ ഉയരത്തിലല്ലെങ്കിൽ കുതിച്ചെത്തുവാനാണ് അതു ശ്രമിക്കാറ്. ചൊല്ലൊത്തതും ഉയരമുള്ളതുമാണ് മരമെങ്കിൽ കൈനഖങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ട് തടിയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുകളിലേക്കു

കയറിക്കൊള്ളും. ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷനേടുവാനാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവമൊന്നുമുണ്ടാകാതെ സുഖമായൊന്നുറങ്ങണമെന്നു തോന്നിയാലും മരത്തിൽ കയറിയെന്നിരിക്കും. മരങ്ങളിൽ കയറിനടക്കുമ്പോൾ പക്ഷിക്കൂട്ടുകളിൽനിന്നു വല്ലതും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു കൊറിക്കു വകയുമായി. മറ്റു വസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ചാരനിറത്തോടുകൂടിയ ഈ ഉളൻ വലിയ ഓട്ടവിദഗ്ദ്ധനല്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മരംകേൾ അഭ്യസിച്ചത്. അതിന്റെ പ്രാണശേഷി അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമാണ്. അതുപോലെതന്നെ കാഴ്ചയുടെ കാര്യവും. മരങ്ങളില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ ഇതിനെ കണ്ടെന്നുവരില്ല.

മരുഭൂമികളും കുറുക്കനില്ലാത്തിടങ്ങളല്ല. അമേരിക്കയിലുള്ള മരുഭൂമിവാസിയായ ഒരു കൊച്ചുകുറുക്കനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഇത് മുഷികാഹാരക്കാരനാണ്. ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഓട്ടമാണ് അതു സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി. സഹാരാമരുപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു വസ്തുത്തിന്റെ ചെവി താരതമ്യേന വളരെ വലുതാണ്. ഈ ചെവിയൻകുറുക്കൻ (Fennecus) മൂക്കു മുതൽ വാലിന്റെ അറ്റംവരെ പതിനാറിഞ്ചോളം നീളമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന്റെ ചെവിക്ക് നാലിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നീളം വരും. എത്യോപ്യക്കാരനായ ഒരു കൊച്ചുകുറുക്കൻ വെട്ടുകിളിയുടെ ശത്രുവാണ്. ഇത് (Simenia)

വെട്ടുകിളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ ജനുവിൽ ഊളന്റെയും ചെന്നായയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ കാണാൻ കഴിയും. ബ്രസീൽ, പരഗ്വേ തുടങ്ങിയ നാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജനുവിന്റെ തല വണ്ണം കുറഞ്ഞതും കഴുത്തു നീണ്ടതുമാണ്. ഇതിന്റെ കാലുകൾക്ക് വളരെ നീളമുള്ളതിനാൽ അത് പൊയ്ക്കാലിയിൽ നടക്കുകയാണെന്നു തോന്നൂ. നീളൻ പുല്ലുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ പൊയ്ക്കാലുപോലുള്ള കാലുകൾ അതിനൊരനുഗ്രഹം തന്നെ.

ബീവർ

മനുഷ്യൻ തോടും നൂറും ചിറകെട്ടി സ്വന്തം ആ
വശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിത്തുടങ്ങുന്നതിന്നു വളരെ മുമ്പ്
ആ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയുണ്ട്. ഏതാ
ണ്ട് മൂന്നു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യൂറേഷ്യയിൽനി
ന്നു മിക്കവാറും അപ്രത്യക്ഷമായെങ്കിലും ഇന്നും അമേരി
ക്കൻ വൻകരയിൽ ജീവിക്കുന്നു. തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിയായാണ
ത്. അവിടെ അതു സംരക്ഷണത്തിന്നു വിധേയമായിട്ടാ
ണ് ഇന്നു ജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യരൂപമില്ലാ
ത്ത ചെറുമാറ്റങ്ങളിൽനിന്നു അങ്ങനെ മോചനം കിട്ടി
യതുകൊണ്ട് വലിയ നാശം സംഭവിക്കാതെ അവ അവി
ടെ ചെറുചെറുക്കുന്നുമുണ്ട്. ബീവർ എന്നാണ് ആ
ജന്തുവിന്റെ പേര്. അവ നക്തഞ്ചരമാണ്. മനുഷ്യൻ
ധാരാളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽതന്നെ മൂന്നുനാലു നാഴിക പ
ലനുകഴിഞ്ഞാൽ അവയെ പുറത്തേക്കും കടന്നാൽ കിട്ട
ുകയില്ല അമേരിക്കയിൽ അലാസ്കാ മുതൽ റിയോ ഗ്രാൻറി
വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ്
അവയെ അധികവും കണ്ടെത്താവുന്നത്. യൂറേഷ്യയിൽ
ബീവർ (Castor fiber) അവിടങ്ങളിലെ വനങ്ങളിൽ

ജീവിച്ചുവന്നതാണ്. ഇന്ന് അപൂർവ്വമായി ആ വസ്തുക്കളെ പുതുയുരോപ്പിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ കണ്ടെക്കും—സ്കാൻ ഡിനേവിയായിലെ ജനവാസമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലും ഫിൻലണ്ട്, മംഗോളിയാ തുടങ്ങിയ നാടുകളിലും.

വ്യാപാരപ്രിയരായ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ബീവറിനെ വിലമതിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിലകിട്ടുന്ന രോമത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. അതു മുഷികവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ആ ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ അവയുടെ ചാച്ചുക്കാരാണ്. ബീവറിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ജന്തു ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളത് തെക്കെ അമേരിക്കയിലാണുതാനും. അതിന്റെ പേർ കാപിബാര (Capy bara) എന്നാണ്. പൂണ്ണവളച്ച് പ്രാപിച്ച ഒരു സാധാരണ ബീവറിന് മപ്പുതു മുതൽ അമ്പതു റാത്തൽവരെ ഭാരം വരും. അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ളതിന് ഒരു നൂറു റാത്തലും. മൂക്കുമുതൽ വാലുവരെ മൂന്നുമുതൽ നാലടിവരെ നീളമുണ്ടായിരിക്കും.

മരങ്ങളാണ് ബീവറിന്റെ ജീവനെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പോപ്പാർ മരപ്പട്ടയാണ് അതിനു പ്രിയപ്പെട്ട ആഹാരം. എന്നാൽ ഉറച്ച തടിയോടുകൂടിയ ഏതു മരവും അതിനിഷ്ടംതന്നെ. മരപ്പട്ടകൂടാതെ ചില പുൽജാതികളും അതിന്റെ ആഹാരമായി തീരാറുണ്ട്. മരപ്പട്ടയാണ് ബീവറിന്റെ തീറ്റയിൽ പ്രധാനമെന്നു

പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ പട്ടതന്നെ മരങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള ശിഖരങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതിന്നാണ് അതു ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലാണ് അവർ കൂടുതൽ സ്വാഭാദായം തോന്നിക്കുന്നതും. ഇതു ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബീവർ ചെയ്യുന്നത് മരം മുറിച്ചു പതിപ്പിക്കുകയാണ്. ബീവർ സാധാരണയായി മരം കോറില്ല. അവൻ മരക്കോറിയാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നത പ്രകടമാണ്. അത്യാവശ്യത്തിനു വേണ്ടി വന്നാൽ ബീവർ മരംകോറും മടികാണിക്കുകയില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നതാണുത്തമമെന്നു തോന്നുന്നു. നല്ല ഉളിപോലെ മുച്ചുയുള്ള പല്ലുകൊണ്ട് കരണ്ടുകരണ്ടു കാര്യം സാധിക്കുന്ന ജീവിയാണത്രേ. നാലഞ്ചിഞ്ചു കട്ടിയുള്ള ഒരു തടി മുറിച്ചുതള്ളുന്നതിനു ബീവറിനു പത്തുപതിനഞ്ചു മിനിറ്റു സമയം മതി. അഞ്ചടി വ്യാസവും നൂറടി യോളം ഉയരവുമുള്ള പലിയ മരങ്ങൾ കരണ്ടുകരണ്ടു മുറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ളതിന്നു ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

മരം മുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏല്പെടുന്നത് മിക്കവാറും പ്രായമായ കൂട്ടരായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അവരെ സഹായിക്കാൻ പ്രായമായ സന്താനങ്ങളും കൂട്ടുപേരാറുണ്ട്. കൂട്ടുകൂട്ടമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ വേല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ വേലചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇ

ങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്നവർ മടിപിടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ ശത്രുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പാഠ്യവുകാരായി കഴിയുകയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു വേലചെയ്യുന്ന ഈ ജീവികൾ വേല ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ മനുഷ്യനെ ലജ്ജിപ്പിക്കും. മരം മുറിഞ്ഞുവീഴാറാകുമ്പോൾ വേലക്കാർ പണി നിർത്തി ഒളിച്ചിരിക്കും. മരം വീണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെന്നു പണി തുടരും; ചാഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓടി ഒളിക്കും. ഒളിക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള ആറ്റിലോ മറ്റു ജലാശയത്തിലോ ആണ്. മരം നിലംപതിച്ചു കഴിഞ്ഞെ അവ പുറത്തു വരും. മരം വീഴുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോലാഹലംകൊണ്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നിശ്ചയംവരുത്തിയശേഷം അവയെല്ലാം ചേന്ന് ആവശ്യമുള്ള മരപ്പട്ടകളും ശിഖരങ്ങളും ശേഖരിച്ചുതുടങ്ങും. മരംമുറിഞ്ഞു മറ്റു മരങ്ങളിൽ ചാഞ്ഞുനില്ക്കാൻ ഇടയായാൽ ബീവറിന്റെ വേലയൊക്കെ വൃഥാവിലായി! അപ്പൂവും അവസരങ്ങളിലേ മരം വീണു ഇവ കൊല്ലപ്പെടാറുള്ളു.

ബീവർ മരം മുറിക്കുന്നതിനു വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ അതിനേക്കാളേറെ വിരുതാണ് അവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ നീന്താനും വേല ചെയ്യാനും. ജലാന്തർഭാഗത്ത് അവയ്ക്കുള്ള സഞ്ചാരവേഗത അതുതകരമാണ്. ഒരു കാൽനാഴികയൊക്കെ കാൽമണിക്കൂ

റിൽ ഉള്ളിയിട്ടുപോകുവാൻ അതിന് ഒരു വിഷമവുമില്ല. ആ സമയമത്രയും മുകളിൽ പൊങ്ങി വരാതെ വെള്ളത്തിന്നടിയിൽ കഴിയാനും അതിനു സാധിക്കും. അത്രയ്ക്കുണ്ട് അതിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശേഷി. വെള്ളപ്പുറപ്പിലും അതിനുള്ള സഞ്ചാരശേഷി അതുതകരതന്നെ. മണിക്കൂറിൽ 2 നാഴികവേഗത്തിൽ അവ നീന്തും. വിരലുകൾ പടംകൊണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജലപാദാജീവിയാണിത്. അതുകൊണ്ടു നീന്താനുള്ള സൈങ്ക്യം വളരെയാണ്. ചെറുമ്പലുള്ള പരന്ന വാൽ ചുക്കാനായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.

മരപ്പട്ട മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചുതീർന്നാലും വീഴ്ത്തിയ മരംകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം തീരുന്നില്ല. ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ ബീവർ കൂടുണ്ടാക്കാനോ ചിറകെട്ടാനോ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. മരത്തിന്റെ കൊച്ചുകമ്പുകൾ കടിച്ചുമറിച്ച് കൂടു നിർമ്മിക്കാനുള്ളിടത്ത് കൊണ്ടുപോകും. വെള്ളത്തിന്നടിയിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് അത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അലസത ഒട്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുമില്ല. വെള്ളത്തിന്നടിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നുവെക്കുന്ന കമ്പുകളുടെ പുറത്ത് കല്ലും കട്ടയും ചളിയും വേണ്ടപോലെ വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. അട്ടിയട്ടിയായി വെച്ചുവെച്ച് അത് ചിറയും നിർമ്മിക്കും. ചിറകൾക്ക് നല്ല ബലവും ഉറപ്പും വരുത്തുന്നതിന് ആ ബീവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിറ വെള്ളപ്പുറപ്പിനു മുകളിലേയ്ക്കും ഉയരുന്നതുവരെ അത് ഇങ്ങനെ വേലചെയ്യും. ചിറകൾ പല

വലിപ്പത്തിലുണ്ട്. വളരെ സംവത്സരാക്കാലം ചിറ കേടുകൂടാതെ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. നൂറുകണക്കിന് കണ്ടി സാധനസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും മുന്തറടി നീളമുള്ളതുമായ ബീവർ അണകൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ബീവർ അണയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 2140 അടിയോളം നീളം വരും! ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ളതിനു പന്ത്രണ്ടടിയും. അതിന്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് (base) പതിനഞ്ചുമുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ടു വണ്ണം കാണാം! അസാധാരണങ്ങളായ ചിറകളുടെ കാര്യമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. സാധാരണയുള്ള ചിറകൾക്ക് നാലഞ്ചടിയേ പൊക്കം വരുവെങ്കിലും നൂറുകണക്കിനടി നീളം ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. വലിയ അണകൾ പല തലമുറക്കാരുടെ കൂട്ടുപണിയുടെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു കരുതിയാൽമതി.

പണിചെയ്യുന്നതിന് ബീവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അവയുടെ പല്ലുകളാണ്; പിന്നെ മുൻകാലുകളും. മുൻവരിയിലെ ഈ പല്ലുകൾ ഉളിപോലെ മുച്ചുയേറിയവയാണെന്നു മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. പല്ലുകൾക്ക് ഒന്നരമുതൽ രണ്ടിഞ്ചുവരെ നീളം കാണാം. കൈ, ചിൻകാലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതാണ്. കാലിലെ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ രണ്ടായി കീറിയിരിക്കും. അതിനാൽ അത് ഒരുതരം ചീപ്പായി ബീവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നനഞ്ഞ രോമങ്ങളിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന വെള്ളം വാൻകളയാനുള്ള ചീപ്പ്. പലതവണ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങേ


ണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട് രോമം മിക്കവാറും നനഞ്ഞായിരിയ്ക്കും ഇരിക്കുക. വെള്ളം സ്വന്തമായോ ഉൾപ്പെറ്റായി ഉണ്ടാകാൻ കാത്തിരുന്നാൽ വളരെ സമയം നനഞ്ഞുതന്നെ കഴിയാതെ പാറുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചീപ്പുവീരൽ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വാൻകഴിഞ്ഞാൽ സമയം വളരെ ലാഭിക്കാനാകും. ജലാന്തർഗതത്തേക്ക് ഉൾച്ചിയിട്ടുപോകുമ്പോൾ ചെവിയും മൂക്കും വേണ്ടപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നുതക്ക ചർമ്മവിശേഷങ്ങൾ ബീവറിനുണ്ട്. കമ്പം തടിയും കടിച്ചുപിടിച്ച് വെള്ളത്തിനടിയിൽക്കൂടി പോകുമ്പോൾ വായ് തുറന്നിരിക്കാതെ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ വായിൽക്കൂടി വെള്ളം കയറി ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ട പ്രത്യേക ഏർപ്പാടുകൾ പ്രകൃതി ഈ ജീവിക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യത്തിലധികം വലിപ്പമുള്ളതാണ് ബീവറിന്റെ ശ്വാസകോശവും കരളും. വളരെയധികം പ്രാണവായു സഞ്ചയിച്ചു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് അവസരം നല്കുന്നു! ഇതുകൊണ്ടാണ് ബീവറിന് സാധാരണയിൽകൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചിലവഴിക്കുവാൻ ശക്തി കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ജലജീവിതത്തിനു വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകസൗകര്യങ്ങളെക്കെ ഈ ജീവിയിൽ നമുക്കു കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

അണകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ബീവറിന്റെ അതുഭൂതപ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അടുത്തപടി തോട്ടുകൾ തുരക്കുകയാണ്. ചിറകെടുത്തതിനേക്കാൾ അതുഭൂതകരമായി ഇതു നിർവഹിക്ക

കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബീവറിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ ഗതാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഉതകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തോടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. മരക്കഷണങ്ങളും മറ്റും കരക്കുകൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തക്കശേഷി ഈ കൊച്ചുജന്തുക്കൾക്കില്ല. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോകുവാൻ : ഇതു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുതന്നെയാണ് ബീവർ ആയിരക്കണക്കിന്നടി ദൈർഘ്യമുള്ള തോടുകൾ തുരക്കുന്നതും. തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തുരക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല തോടുകൾ വേണ്ടവണ്ണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ ജന്തു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. രണ്ടുമുതൽ മൂന്നടി വരെ വീതിയുള്ള ഇത്തരം തോടുകളിൽ കുറഞ്ഞത് പത്തു പതിനെട്ടിഞ്ച് ആഴത്തിൽ വെള്ളം മിക്കവാറും കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും !

ബീവർ കാസ്റ്റോറിഡേ (castoridae) എന്നറിയപ്പെടുന്ന വംശത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഈ ജന്തു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആണം പെണ്ണും അത്യുപത്തുമൂലം ആകെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുന്നതുവരെ ഒന്നിച്ചുതന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് പതിവ്. ഇണചേർന്നു കഴിഞ്ഞു നാലു മാസമാകുമ്പോൾ രണ്ടുമുതൽ ആറുകുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ പെ

ണ് പ്രസവിക്കും. പീഠവിധിയിൽതന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ധാരാളം രോമവും കാണും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളച്ചു താരതമ്യേന സാവകാശത്തിലാണ്. ഒരു മാസത്തോളം പ്രായമായാൽ അത് നീന്താൻ പഠിച്ചുതുടങ്ങും. ആറുമാസം തികയുന്നതോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ മുലകുടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമ്മ നടപടികളെടുക്കും. എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിട്ടുപോകുകയില്ല. അവരെ വേലകൾശീലിപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾതന്നെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് തികയാറായാൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ സന്താനോല്പാദനത്തിന്നു തയ്യാറാകും. പുതിയ കൂട്ടർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്നുമുമ്പ് പഴയവർ വീടുവിട്ടു മാറിക്കൊള്ളും. അമ്മയുടെ നിർബ്ബന്ധമോ, ശാസനയോ, കുട്ടികളുടെ തടുക്കാനാവാത്ത സഞ്ചാരവാസനയോ ഏതാണ് വീടു വിട്ടുവാൻ പ്രേരകമായി തീരുന്നതെന്നു നിശ്ചയമില്ല. പ്രസവത്തിനുമുമ്പ് കുറച്ചുനാൾ പിതാവുപോലും വീടുവിട്ടു താമസിച്ചേ പാറ. ഏകാകിനിയായി തീരുന്ന മാതാവ് പുതിയ അംഗങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്തുകൊള്ളും.



**JAWAHAR BALBHAWAN & CHILDREN'S LIBRARY
KOTTAYAM**

(A PROJECT OF KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY)

Cl. No. 590

Acc. No. 1684

This book should be returned on or before the
date last stamped below.

22 FEB 1994
8 NOV 1994
5 DEC 1994

590

നാഥ മേന്മ
ഇതേ ലോകം



1684

