



മിഡ്‌വൈഫ്



1091



ശ്രീ,


ഞാൻ. കൃഷ്ണൻ

സാറാർ 8888!

മിഡ്‌വൈഫ്

പ്രൊഫ. അരുൺ

ജെ. എസ്. എസ്.
7-4-73



i: പൗരാണികമായ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മെഴുകുശില്പം.

സമർപ്പണം

മാതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന,

അമ്മവാ—

നവജാതശിശുവിനെ മാറോടണച്ചു ഏതവസ്ഥയിലും

ആ മൃദുഭാരത്തിൽ നിർവൃതികൊള്ളുന്ന

കുടുംബിനിക്കു°.

മിഡ്‌വൈഫ്

(പ്രസൂതിശാസ്ത്രം)



ഗ്രന്ഥകർത്താ

ഡാ. ജോസഫ് മംഗലം

ശാന്തിനികേതൻ മെഡിക്കൽമിഷൻ, കോട്ടയം-1.

വില 15 രൂപ

MALAYALAM

MIDWIFE

MIDWIFERY

BY DR. JOSEPH MANGALAM

SANTHINIKETHAN MEDICAL MISSION

KOTTAYAM, KERALA.

FIRST PUBLISHED

NOVEMBER 1969

PRINTED AT

K. P. PRESS, KOTTAYAM.

COPY RIGHT:

DR. JOSEPH MANGALAM.

PUBLISHED BY THE AUTHOR.


PRICE RS. 15.




M

618.2

JOS-M



ii: പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ



iii: സ്ത്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

PREFACE

I have great pleasure in writing an introduction to this excellent book in our mother tongue on a difficult and specialized subject of modern medicine. I congratulate Dr. Joseph Mangalam on his excellent presentation of the subject in simple language. The large number of accurate and expressive illustrations in each section help the reader to understand even intricate matters dealt with in the text in a clear manner. Including the English terms and not attempting literal translation is a special commendable feature of this book.

Since the attainment of Independence, education in the regional languages in the schools and even at collegiate level has taken place. This has led to the teaching of even scientific subjects in the regional languages. People have also become anxious to acquire greater knowledge in technical subjects including Medicine. The great impediment to this has been the lack of good and authoritative text books in the regional languages. This book will be a great boon for the people of Kerala who wish to acquire a correct knowledge of the subject of Obstetrics but do not have sufficient proficiency in English. For the students of the Auxiliary Nurse-Midwife Course, this will be a very useful text book. To the medical student and those engaged in the practice of Midwifery, this will be a good reference book. Thus Dr. Joseph Mangalam has made a very significant contribution to the Scientific section of Malayalam literature.

This book is a compilation from various text books and journals in English, and not a translation. It must have been a stupendous task and the author must have spent a great deal of time with patience and diligence in producing it.

I am sure this book will be welcomed by the enlightened public. I wish Dr. Joseph Mangalam all success and I have great pleasure in commending the beautifully got up and profusely illustrated book- 'Midwife,' which he has offered to our country.

R. KESAVAN NAIR,

F. R. C. S. (Eng.)

[Retd. Principal, Kottayam Medical College.]

Udyogamandal,
1-11-1969.

അവതാരിക

ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഗഹനവും, സവിശേഷവുമായ ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് മാതൃഭാഷയിൽ വിരചിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരവതാരിക എഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ—അഭിജാതമായ രീതിയിൽ—ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചു ഡോ. ജോസഫ് മംഗലം തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിൽ, നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ പ്രകാശനക്ഷമങ്ങളും പുണ്യകൃത്യങ്ങളുമാണ്. വിഷയാന്തർഗ്ഗതമായ അതിസങ്കീർണ്ണവസ്തുതകൾപോലും ഗ്രഹിക്കാൻ ആ ചിത്രങ്ങൾ അനുവാചകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സാങ്കേതികപദങ്ങൾ അനുപദം വിവർത്തനം ചെയ്യാതെ, സന്ദർഭാനുസാരം അതേരൂപത്തിൽത്തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സൂത്രീകരമായ ലക്ഷണമത്രേ.

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ സ്തുഭ്ധകളിലും, കോളേജുകളിൽപോലും നിലവിൽവന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാദേശികഭാഷകളിലൂടെയുള്ള അദ്ധ്യാപനമാണല്ലോ. ഈ മാറ്റം ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾപേലും പ്രാദേശികഭാഷകളിൽ പഠിപ്പിക്കുക, എന്നിടത്തോളം നമ്മെ നയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ; വൈദ്യശാസ്ത്രമുൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിഷയങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ജനങ്ങളും ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ്. എന്നാൽ, ഈ കാര്യത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഭീമമായ പ്രതിബന്ധം പ്രാമാണികങ്ങളും, ഉത്തമങ്ങളുമായ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ പ്രാദേശികഭാഷകളിൽ വിരളങ്ങളാകുന്നു, എന്നതാണ്. പ്രസ്തുതി ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി സമ്യക്ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ അഭി

ലക്ഷിക്കുന്നവരും, എന്നാൽ പര്യാപ്തമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപരിചയം ഇല്ലാത്തവരുമായ കേരളീയർക്കു് ഈ ഗ്രന്ഥം മഹത്തായ ഒരനുഗ്രഹമാകുന്നു. നഴ്സിംഗിനും, മിഡ്വൈഫറിക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കു് ഇതു സർവ്വമാ പ്രയോജനപൂർണ്ണമായ പാഠ്യപുസ്തകമായിരിക്കും. എന്നല്ല; മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്—മിഡ്വൈഫറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കു്—ഇതു നല്ലൊരു 'റഫറൻസ്' ഗ്രന്ഥംകൂടിയാണ്. അങ്ങനെ ഡോ. ജോസഫ് മംഗലം മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ശാസ്ത്രകുഷ്യയിലേയ്ക്കു് സവിശേഷാങ്കിതമായ ഒരു സംഭാവന നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു വിവർത്തനമല്ല. വിവിധങ്ങളായ വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള 'നിബന്ധ'ങ്ങളിൽനിന്നും സമാഹൃതമാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഗരീയസ്സായ കൃഷ്ണൻ തമുണ്ടു്. ക്ഷമാപുരസ്കൃതമായ ജാഗരൂകതയോടൊത്ത ദീർഘകാലതപസ്സു് ഡോ. മംഗലം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നു് എനിക്കു ഉറപ്പുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരനാൽ കേരളത്തിനുവേണ്ടി സംഭാവിതവും, സുന്ദരമാംവിധം സംഗ്രഹീതവും ബഹുചിത്ര ചിത്രീതവുമായ ഈ ഗ്രന്ഥം—മിഡ്വൈഫ്—അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അതീവസന്തുഷ്ടനാണ്. ഗ്രന്ഥകാരനായ ഡോ. ജോസഫ് മംഗലത്തിനു് സമസ്തവിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഡാ. ആർ. കേശവൻ നായർ,

എഫ്. ആർ. സി. എസ്സ്. (Eng)

ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ,

1-11-1969.

ആമുഖം

വൈദ്യശാസ്ത്രസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ കുറവാണു്. അതിന്റെ നാനിയെന്നോ വിഷ്കംഭമെന്നോ പറയാവുന്നപട്ടമേ ആയിട്ടുള്ളു. ഇതിനു് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു്: കേരളീയ വൈദ്യവിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്കൃതത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാണു് പഠിക്കുന്നതു്. രണ്ടു്: വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി നിഗമനങ്ങളും നിർദ്ധാരണങ്ങളും സ്വഭാഷയിൽ എഴുതിവെക്കുന്നില്ല.

മാതൃഭാഷയിലൂടെ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയാതെവരുന്നതും അടിസ്ഥാനപരമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുന്നതും സാംസ്കാരികമായ നമ്മുടെ വളച്ചയുടെല്ല, തളച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണു്. എന്നും പരാനഭോജനം നടത്തുന്നവർക്കു് സ്വതന്ത്രരാണു് തങ്ങളെന്നവകാശപ്പെടുവാനാവില്ലല്ലോ.

നമ്മുടെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യശാഖ സമ്പുഷ്ടമാക്കുവാൻ ബഹുമുഖമായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണു്. അന്യ ഭാഷകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവർത്തനംചെയ്തും, പഠിച്ചവർ സ്വാന്തര്യങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന അറിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയും നിസ്സംഗ്രഹമായ യത്നം ആരംഭിക്കണം.

മൂന്നാമതൊരു മാഗ്നകൂടി സ്വീകാര്യമാണു്. ഒരേ വിഷയത്തെ ഉപജീവിപ്പിച്ച് വിജ്ഞാനമേഖലക

ളിലെ അതികായന്മാർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചുപസ്ഥിതിവരുത്തി സമാദരണീയമായ സങ്കലനസ്വഭാവത്തിൽ പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.

മൂന്നാമത്തെ മാഗ്ഗ്മാണ്, ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ മെന്ന് തോന്നിയതും പ്രകൃതകൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും.

ഗഹനശാസ്ത്രവിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും മലികകൃതികൾ രചിക്കുവാനും മലയാളഭാഷ അപര്യാപ്തമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുകയാണ്, പല കാര്യങ്ങളിലും നാം. രാമായണത്തിൽ ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രമുണ്ട്: ഹനമാൻ. സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ തികഞ്ഞ അജ്ഞതയാണുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി ആരാധിക്കുന്നതിലാണ് സുഖം! ഈ നാടിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം!

വലിയ ക്ലേശംകൂടാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കു കുറവാണ്. ആത്മവിശ്വാസംകൊണ്ട് എന്തുചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ, ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടമായി നടത്തിവരുന്ന എളിയ ശ്രമങ്ങളുടെ നേക്ക് സവിനയം വിരൽചൂണ്ടുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ശരീര-രോഗ-ചികിത്സാസംബന്ധമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മിക്ക വിഷയങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്കുകൂടി സുഗ്രാഹ്യമായ മലയാളഭാഷയിൽ നാതിവിസ്തൃതപാഠങ്ങളായി എഴുതിയുണ്ടാക്കി 'ശാന്തിനികേതൻ മെഡിക്കൽ മിഷന്റെ' ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തപാൽമാർഗ്ഗേണ നൂറു

കണക്കിന് വൈദ്യശാസ്ത്രജിജ്ഞാസുക്കളെ പഠിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലുടനീളവും അന്യരാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ഈ ലേഖകന്റെ കന്നി ഗ്രന്ഥമായ 'കമ്പൗണ്ടർ' ആണ്.

മേല്പറഞ്ഞ പാഠങ്ങളും ഗ്രന്ഥവും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധികളാണ്. തികച്ചും വൈജ്ഞാനികമായ വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിഷയഗ്രഹണം അപൂർണ്ണമെന്നോ ക്ലിഷ്ടമെന്നോ ബന്ധപ്പെട്ടവരിലാക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. മറ്റൊരു സവിശേഷഗുണംകൂടി എടുത്തുപറയുവാനുണ്ട്. അന്യഭാഷാസ്വാധീനം കുറഞ്ഞവർക്കും തീരെ ഇല്ലാത്തവർക്കും മലയാളത്തിലുള്ള വിശദീകരണം കൊണ്ട് വിഷയാവബോധം സുകരമായി.

ഈ നാടിന് ശാശ്വതവും സമഗ്രവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനിയും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അടിമത്വം അവസാനിച്ചാലും 'മഴന്നിന്നാലും മരംപെയ്യുന്നതു'പോലെ സാംസ്കാരികരംഗത്തെ അസ്വാതന്ത്ര്യം തുടരും എന്നതിന് ഭാരതീയ ജീവിതത്തേക്കാൾ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം ലോകചരിത്രത്തിൽ വേറെ കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ സർവ്വതോമുഖമായ വികാസപ്രവണത ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു മലയാളഭാഷ കൊള്ളേണ്ടതുകൊള്ളുവാൻ ശക്തമാണെന്ന് ഈ ലേഖകൻ സ്വാഭാവങ്ങളിലുറച്ചുനിന്ന് ശക്തിയായി വാദിക്കും. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ അംബരചുംബികളായ കംഭഗോപുരങ്ങളും ധൂന്തടിച്ചുള്ള ആർഭാടങ്ങളുമല്ല പ്രധാനം. ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള വിഷയബോധനശ്രമം നമ്മേ ആശാവഹമായ

ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്നോളമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിന് അലോപ്പതി ഭിഷഗ്വരന്മാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖ വളർത്തുന്നകാര്യത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമായ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഭൂസ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൂടി കാരണമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ചികിത്സാരംഗത്തു നിലനിന്നുപോരുന്ന അർത്ഥശൂന്യമായ അഭിജാതചിന്തയും കപടതന്ത്രങ്ങളും നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥമോഹമാണിതിനതടസ്സം.

തൊഴിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒളിച്ചും മറച്ചും വെക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രത ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ക്യാപ്പിറ്റലിസത്തിന്റേയും കൂടെപ്പിറവിയാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രംപോലുള്ള ധനസമ്പാദനക്ഷമമായ വിദ്യകൾ സാധാരണജനങ്ങൾക്കു സുഗ്രാഹ്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ തങ്ങളുടെനില സുരക്ഷിതമായിരിക്കയില്ലെന്നു പലരും കരുതുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. സാംസ്കാരികരംഗത്തെ ഈ കുത്തക തകർന്നു തീരൂ, വിശേഷിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃകയിലുള്ളൊരുസാമൂഹികക്രമത്തിൽ. കുത്തകകളുടെകോട്ടതകർക്കുവാനുള്ള ഭാഗികമായ ശ്രമമാണ്, ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ നടത്തുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ ധന്യോസ്സുഹം!


വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ എന്റെ എളിയ ശ്രമങ്ങളെ അറിഞ്ഞാദരിക്കയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുപോരുന്ന കേരളത്തിലെ ഏകവൈദ്യശാസ്ത്രപണ്ഡിതനാണ്, പ്രൊഫോജ്ജലമായൊരുവതാരികയാൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തേയും എന്നെയും ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാ. ആർ. കേശവൻനായർ, എഫ്. ആർ. സി. എസ്സ്. വൈദ്യശാസ്ത്രകലകൂടസ്ഥനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരോദാരമായ മനീഷ്ശക്തിയിൽ എന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

ബേളാക്കുകൾ:- സങ്കേതജടിലമായ ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വരയ്ക്കുകയും ബേളാക്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ആർട്ട്സ് ബ്യൂറോ പ്രവർത്തകരോട്--വിശിഷ്ട ശ്രീ. സുരേന്ദ്രനോട് എന്നിങ്ങുള്ള കടപ്പാട് നന്ദിപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു; വിജയാശംസകൾ!

കവർ:- എൻറൗൺമെന്റൽ സർവ്വീസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ കവർചിത്രം വരച്ചതന്ന ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് നന്ദി; കലാകാരന് ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും!

അച്ചടി:- അതൊരു യജ്ഞംതന്നെയായിരുന്നു. ശ്രമകരമായ ആ ജോലി സ്തുത്യർഹമായി നിറവേറ്റിയ കെ. പി. പ്രസ്സ് മാനേജരോടും പ്രവർത്തകരോടും എന്നിങ്ങുള്ള കടപ്പാട് വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. ഹൃദയപൂർവ്വമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും.

സ്നേഹപൂർവ്വം,



ഡാ. ജോസഫ് മംഗലം.

ശാന്തിനികേതൻ,
കോട്ടയം, 1-11-1969

വിഷയവിവരം

	പേജ്
പ്രസ്തുതിവിജ്ഞാനീയം	i-iv
അദ്ധ്യായം	
ഒന്ന്: പുനരുത്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ	1-9
രണ്ട്: സ്രീജനേന്ദ്രിയങ്ങൾ	10-30
മൂന്ന്: ആത്മവം	31-36
നാല്: ഗർഭധാരണം	37-62
അഞ്ച്: ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ	63-75
ആറ്: ഗർഭകാലസംരക്ഷണം	76-83
ഏഴ്: മരൂപിള്ള	84-90
എട്ട്: ഉപസ്ഥാശയം	91-107
ഒൻപത്: പ്രസവം	108-119
പത്ത്: ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ	
ശയനനിലയും ജനനമുഖവും	120-142
പതിനൊന്ന്: പ്രസവപരിചരണം	143-178
പന്ത്രണ്ട്: പ്രസവാനന്തരഘട്ടവും പരിചരണവും	179-188
പതിമൂന്ന്: ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ	189-205
പതിനാല്: ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖങ്ങൾ	206-241
പതിനഞ്ച്: ഉപസ്ഥാശയവൈരൂപ്യം	242-254
പതിനാറ്: പ്രസവത്തിനുമുമ്പുള്ള രക്തസ്രാവം	255-265
പതിനേഴ്: പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവം	266-280
പതിനെട്ട്: പ്രസവാനന്തരരോഗങ്ങൾ	281-293
പത്തൊൻപത്: നവജാതശിശു	294-308
ഇരുപത്: കൃത്രിമാഹാരങ്ങൾ	309-314
ഇരുപത്തൊന്ന്: ശിശുരോഗങ്ങൾ	315-332

ഇരുപത്തിരണ്ടു്: അകാലപ്രസവവും	
ശിശുപരിചരണവും	333-336
ഇരുപത്തിമൂന്നു്: ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ	337-343
ഇരുപത്തിനാലു്: ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ (തുടർച്ച)	344-354
ഇരുപത്തഞ്ചു്: ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ (തുടർച്ച)	355-362
ഇരുപത്താറു്: ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ (തുടർച്ച)	363-375
ഇരുപത്തേഴു്: പ്രസവസംബന്ധമായ	
ശസ്ത്രക്രിയകൾ	376-387
ഇരുപത്തെട്ടു്:	" (തുടർച്ച) 388-397
ഇരുപത്തൊമ്പതു്:	" (തുടർച്ച) 398-406
മുപ്പതു്	" (തുടർച്ച) 407-425
മുപ്പത്തൊന്നു്: വിസർജ്ജനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥ	426-430
മുപ്പത്തിരണ്ടു്: ഗർഭകാലമൂത്രാശയരോഗങ്ങൾ	431-444
മുപ്പത്തിമൂന്നു്: പാനീയങ്ങൾ-പരിചരണങ്ങൾ	445-449
മുപ്പത്തിനാലു്: കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ	450-462
ലോഷൻസ്	463
എനിമാ	464-466
നേത്രബിന്ദു	467
അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും	463-469
അനുബന്ധം	473-491
അനുക്രമണിക	493-505
ഇൻഡക്സ്	506-515

ചിത്രങ്ങൾ

പേജ്

i	പൗരാണികമായ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മെഴുകുശിപ്പം	I
ii	പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ	VII
iii	സ്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ	VIII
1	പുരുഷന്റെ ഉല്പാദനാവയവം	
2	പുരുഷന്റെയും സ്രീയുടേയും ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ	9
3	ജനനേന്ദ്രിയ ബാഹ്യഭാഗം	11
4	സ്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയഭാഗങ്ങൾ	17
5	ഗർഭാശയഭാഗങ്ങൾ	22
6	സ്രീ പുരുഷ ബീജങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം	28
7	അണ്ഡനിഗ്മനം	38
8	കോശങ്ങൾ	41
9	വണ്ണരാത്തുകൾ	43
10	പുരുഷബീജങ്ങൾ	45
11	സ്രീബീജാണു	46
12	സ്രീ പുരുഷ ബീജാണുസംയോഗം	47
13	ഗർഭസ്ഥിരീകരണം	48
14	ലിംഗഭേദ നിണ്ണയപ്രക്രിയ	51
15	ലിംഗഭേദനിണ്ണയം	52
16	ഭൂണവളച്ച്	54
17	ഭൂണവളച്ച്	56
18	പൂണ്ണവളച്ചതെത്തിയ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ സ്ഥിതി	61
19	ഗർഭകോത്തു സ്തനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം	64
20	ഗർഭിണിയുടെ ഉദരഭാഗത്തും മറ്റും കാണുന്ന സമാന്തര വണ്ണരേഖകൾ	66

21	ഗർഭാശയത്തിനുണ്ടാകുന്നഉന്നതി, ദൈർഘ്യമാനം	68
22	36-ാമത്തേയും 40-ാമത്തേയും ആഴ്ചകളിലെ ഉദരം	69
23	ഗർഭാഭാസം	75
24	മറുപിള്ളയുടെ ഉൾവശം	85
25	അനുബന്ധിത മറുപിള്ള	87
26	രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുള്ള മറുപിള്ള	88
27	ഉപസ്ഥാശയം	92
28	ഉപസ്ഥാശയ ബഹിർഗമനമാഗ്ഗം	92
29	ഉപസ്ഥാശയം	93
30-31	പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം	95
32-33	ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പുറത്തെ അളവ്	100
34	സൂചേഴ്സും ഉച്ചിയും	103
35	ശിശുശിരസ്സ്	104
36	ശിശുവിന്റെ തലയോട്ട്	105
37	ശിശുവിന്റെ തലയോട്ട്	106
38	പ്രസവഘട്ടങ്ങൾ	109
39	പ്രസവഘട്ടങ്ങൾ	118
40-43	ശിശുവിന്റെശയനനില-വിവിധഘട്ടങ്ങൾ	120
44	ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വിലങ്ങനെയുള്ളകിടപ്പ്	121
45	ബാഹ്യപരിശോധന	125
46	പൊക്കിളിനു് ഇരുവശവുമുള്ള പരിശോധന	127
47-48	ജനനമുഖം നിണ്ണയിക്കുന്ന രീതി	128-129
49	ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയശബ്ദശ്രവണരീതി	130
50	ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്पर्ശനം	
	ശ്രവിക്കാൻകഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ	131
51	ഗേഭാരമാഗ്നേയുള്ള പരിശോധനാക്രമം	134
52	ശിശുശിരസ്സിന്റെ ഒന്നാംനില	136
53	ഒന്നാംനില-ഉച്ചിഭാഗം	137

54	ശിശുശിരസ്സിന്റെ രണ്ടാംനില	137
55	രണ്ടാംനില-ഉച്ചിഭാഗം	138
56	ശിരസ്സിന്റെ മൂന്നാംനില	139
57	ശിരസ്സിന്റെ മൂന്നാംനില-ഉച്ചിഭാഗം	138
58	ശിശുശിരസ്സിന്റെ നാലാംനില	139
59	നാലാംനില-ഉച്ചിഭാഗം	140
60	ഗുഹ്യഭാഗത്തെ രോമംവടിക്കുന്നരീതി	148
61	കുളിപ്പിക്കുന്ന രീതി	148
62	പ്രസവസമയത്തു് ഗർഭിണി കിടക്കേണ്ടരീതി	151
63	പ്രസവാരംഭം	152
64	പ്രസവം--രണ്ടാംഘട്ടം	152
65	ശിശുശിരസ്സിന്റെ ജനനഘട്ടങ്ങൾ	153
66	ശിരോഭാഗ ജനനം	153-154
67	ശിശുശിരസ്സ് വെളിയിൽവരുത്താനുള്ളമാർഗ്ഗം	156
68-69	പെരിനിയം സംരക്ഷിക്കുന്നവിധം	157
70	പെരിനിയത്തെ താങ്ങി കുട്ടിയുടെ തോൾ എടുക്കുന്നവിധം	158
71	ഗർഭസ്ഥശിശു ചരിഞ്ഞുവരുമ്പോൾ	159
72	ഉച്ചി യോനീകവാടത്തിൽ	159
73	മുഖം യോനീകവാടത്തിൽ	160
74	ശിശുവിന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പൊക്കിയുകൊടി	161
75	നവജാതശിശുവിനെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നരീതി	163
76	ജനനമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് ശിശുവിനെ എടുക്കുന്നവിധം	164
77	പ്രസവംകഴിഞ്ഞു് ശിശുവിന്റെ കിടപ്പു്	164
78	നവജാതശിശുവിന്റെകണ്ണിൽ മരുന്നിറിക്കുന്ന്	165
79	നവജാതശിശു മിഡ് വൈഫിന്റെ കയ്യിൽ	166

80	പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ ക്ലാസുപിടിപ്പിക്കുന്നരീതി	167
81	പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുന്നവിധം	167
82-84	മറുപിള്ള-പ്രസവം	170-171
85	മറുപിള്ളയെ എടുക്കുന്നവിധം	172
86	മറുപിള്ള വിട്ടുപോരുന്നു	173
87	മറുപിള്ളയുടെ അകവശം	174
88	മറുപിള്ള-പരിശോധന	175
89	മറുപിള്ള പിറക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഗർഭാശയസ്ഥിതി	176
90	മൂത്രദാറത്തിൽ കതീറാർകടത്തുന്നവിധം	186
91	ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ്	187
92	ബൈനോവുലർ ഇരട്ടകൾ	190
93	യൂനീഓവുലർ ഇരട്ടകൾ	192
94	ഇരട്ടകൾ-നെടുകെയുള്ള കിടപ്പ്	194
95	ഇരട്ടകൾ-വിലങ്ങനെയുള്ള കിടപ്പ്	194
96	ഇരട്ടകൾ	195
97	ഇരട്ടകൾ	107
98	ഇരട്ടകൾ-ശിരോദയത്തിലും പൃഷ്ഠോദയത്തിലും	198
99	ഇരട്ടകൾ ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായി	199
100	ഇരട്ടകൾ-തടസ്സമാകുന്നു	200
101	ഇരട്ടകൾ-തടസ്സമാകുന്നു	202
102	ഇരട്ടകൾ-താടിപ്പൂട്ട്	203
103-105	മുഖം-ജനനമുഖം	209-210
106	മുഖത്തിന്റെ ഒന്നാംനില	212
107	മുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംനില	213
108	മുഖത്തിന്റെ മൂന്നാംനില	213
109	മുഖത്തിന്റെ നാലാംനില	214

	പേജ്
110 നെററി—ജനനമുഖം	215
111 പൂഷം—ജനനമുഖം	217-218
112 പൂഷോദയം	219
113-116 പൂഷോദയത്തിന്റെ നിലകൾ	222-223
117 ശിശുവിന്റെ തല പുറത്തെടുക്കുന്നവിധം	232
118-119 കുട്ടിയുടെ പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ— വിലങ്ങനെയുള്ള കിടപ്പ്	234-235
120 കയ്യ് യോനിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിയുള്ളകിടപ്പ്	236
121 പൊക്കിൾക്കൊടി—ജനനമുഖം	238
122 ഗർഭിണിയെ കിടത്തേണ്ടവിധം	239
123 പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം	242
124 ചെറിയ ഉപസ്ഥാശയം	243
125 പുറമേകാണുന്ന രക്തസ്രാവം	256
126-127 പ്ലാസൻറാപ്രീവിയായ	260
128 സി.സു വജയിനൽ സ്പെക്കുലം	264
129 പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവം തടയുന്നരീതി	271
130 ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൂലകൊടുക്കുന്ന രീതി	304
131 മൂലക്കുപ്പി	310
132 കുടലിറക്കം	327
133 മാംസംതികയാത്തശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവിധം	335
134 ഗുഹ്യഭാഗത്തെരക്തസിരകൾതടിച്ചിരിക്കുന്നത്	342
135 വീക്കത്തിനവിയേയമായ ഗുഹ്യഭാഗം	346
136 ബാൻഡേജ് അഴിച്ചെടുക്കുന്നവിധം	357
137 ബാൻഡേജ് മടക്കുന്നവിധം	358
138-139 ഗർഭാശയം തുറക്കുന്നു	358
140 വെസികുലർ മോൾ	360
141 പ്രസവഘട്ടങ്ങൾ	375
142 ഫോഴ്സെപ്സ് ഡെലിവറി	381

143-148 ഫോഴ്സ് സെപ്പ്-പ്രയോഗക്രമങ്ങൾ	383-387
149 വാക്യം എക്സ്ക്ലാമേറ്ററി	389
150-153 ക്രോണിയോട്ടമി	394-396
154-155 ഡീക്യാപ്പിറേഷൻ	398-399
156 ബാഹ്യമായ കെഫാലിക് വെർഷൻ	401
157 ബൈപോളാർ വെർഷൻ	402
158 ബൈപോളാർ വെർഷൻ രണ്ടാംഘട്ടം	403
159-160 ഇൻടേർണൽ വെർഷൻ	404-405
161 ഉദരഭിത്തിയിലുള്ള കീറൽ	409
162-165 ലോവർസെഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റേറിയൻ	410-412
166 കീറിയ ഗർഭാശയം തുണന്നരീതി	413
167 ലോവർസെഗ്മെന്റ് സിസ്റ്റേറിയൻ	414
168 ഉദരഭിത്തിയിലുള്ള സിസ്റ്റേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ	416
169 ഗർഭാശയഭിത്തി പിളർപ്പ് ശിശുവിനെ എടുക്കുന്നരീതി	417
170 ക്ലൈഡോട്ടമി	418
171 എംബ്രിയോട്ടമി	419
172 സ്റ്റോൺഡൈലോട്ടമി	419
173-174 വജൈനൽ ശസ്ത്രക്രിയ	420
175 പ്യൂബിയോട്ടമി	421
176-180 ശസ്ത്രക്രിയോപകരണങ്ങൾ	420-423
181 വൃക്കകളും അനുബന്ധിതാവയവങ്ങളും	427
182 മൂത്രക്കുരു	434
183 ഗ്ലിസറിൻസിറിഞ്ച് എന്നിമാസിറിഞ്ച്	442
184-185 മരുന്ന് സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നവിധം	452
186 സബ്ക്ടേനിയസ് ഇൻജക്ടർ കൊടുക്കുന്ന രീതി	453
187 ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇൻജക്ടർ രീതി	455
188 ഇൻജക്ടറുള്ള ഞരമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവിധം	456
189 ഇൻജക്ടർ കൊടുക്കുന്നവിധം	458
190-197 പലവിധ ചിത്രങ്ങൾ	470-472
198 ചിത്രം	492

പ്രസൂതിവിജ്ഞാനീയം

ഉപോദ്ഘാതം:

മാതൃത്വം മഹനീയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മാനവസമുദായത്തിൽ മാത്രമാണ്. പ്രകൃതി അതിന് വേണ്ടുവോളം പരിരക്ഷയും പ്രാധാന്യവും കല്പിക്കുന്നു. മനുഷികസങ്കല്പത്തിൽ മാതൃത്വം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും പിതൃത്വം ഒരു വിശ്വാസവുമാണ്! മൃഗേതരമായൊരു സങ്കല്പം വളർന്നു മനുഷ്യനിൽ മാതൃത്വം ദൈവികമായൊരു പ്രതിഭാസമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

മാതൃസംബന്ധിയായ മൗലിക കർമ്മം പ്രസവമാണല്ലോ. പ്രസവസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുടെ നേർക്കുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ സമീപനത്തെയാണ് ഇവിടെ പ്രസൂതിവിജ്ഞാനീയം അഥവാ പ്രസൂതിശാസ്ത്രം എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

പ്രസൂതികർമ്മ വിഷയകമായ ശാസ്ത്രീയ ചർച്ചകളിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തത്സംബന്ധമായ പൂർവ്വകാല

ധാരണകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഊഹാപോഹങ്ങളെയും പ്രാകൃത നരവംശശാസ്ത്രത്തെയും ഉപജീവിച്ച് പ്രസൂതികർമ്മവിദ്യയുടെ പ്രാകൃതരൂപങ്ങളിലേയ്ക്കു കടക്കാം.

വംശവർദ്ധനവിനുവേണ്ടി ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, വിശേഷിച്ച് സൂന്യാപജീവികൾക്കിടയിൽ സഹജപ്രേരണയാൽ സംഭവിക്കുന്നെന്നാണ് ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും. പ്രാകൃതികപ്രചോദനത്താൽത്തന്നെ പ്രസവശുശ്രൂഷയും സ്വയം ചെയ്യുകയാണ്; മനുഷ്യരൊഴിച്ചുള്ള ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം. ജന്തുക്കളെപ്പോലെതന്നെ അതിപുരാതനകാലത്തു് മനുഷ്യസ്രീകളും പ്രസവശുശ്രൂഷ സ്വയം ചെയ്തുപോന്നിരുന്നു. സ്വയം പ്രസവശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്ന സ്രീകൾ, പിළാലത്തു് മറ്റുസ്രീകളുടെ പ്രസവഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നിരിക്കണം.

കൂട്ടായി ജീവിക്കുകയും ഇരതേടുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പൗരാണികയുഗത്തിൽ ഏറെ പ്രസവിക്കുകയും സ്വയം പ്രസവശുശ്രൂഷകൾ നടത്തി അനുഭവസമ്പത്തു നേടുകയും, മറ്റു് അനേകം സ്രീകളുടെ പ്രസവസമയത്തു് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മുതുമുത്തശ്ശിയായിരുന്നിരിക്കണം ആദ്യത്തെ മിഡ് വൈഫ്.

ആദ്യകാലങ്ങളിലെ സൂതികർമ്മിണികൾക്കു് സ്വയം പ്രസവിച്ചുള്ള പരിചയവും മറ്റു സ്രീകളെ പ്രസവസമയങ്ങളിൽ സഹായിച്ചുണ്ടായ അനുഭവജ്ഞാനവും മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതൽ.

ഇത്തരം സ്രീകൾ പ്രസവശുശ്രൂഷ ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രസൂതികർമ്മവിദ്യ (മിഡ് വൈഫറി-Midwifery) യും ഉടലെടുത്തു എന്നു പറയാം. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം വരെയും പ്രസവശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുപോന്നിരുന്നതു് അജ്ഞാതമായ നാടൻ പതിച്ചി (വയററാട്ടി) മാരായിരുന്നു. ലോക

ത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നും ഇക്കൂട്ടർ 'പേരെടുക്കുന്നു'ണ്ട്.

കണ്ടുപരിചയവും, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, തെറ്റായ മുൻ ധാരണകളുമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പതിച്ചിമാരുടേയും കൈമുതലെന്നു് വേദപുസ്തകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഗർബ്ബേശിശുവിന്റെ തല കീഴോട്ടിറങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി, പ്രസവവേദനകൊണ്ടു പുളയുന്ന ഗർഭിണിയുടെ കാലുകൾ അകറ്റി പൊക്കിക്കെട്ടുക, വയറുപിടിച്ച് കശക്കിത്തിരുമ്മുക; ജനനേന്ദ്രിയമാഗ്ഗത്തിനു് അയവുകിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഭഗദാരത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക തുടങ്ങി ക്രൂരവും അശാസ്ത്രീയവും അപകടപൂർണ്ണവുമായ ഒട്ടനേകം 'വിദഗ്ദ്ധന്മാർ' ഇക്കൂട്ടർ അനുവർത്തിച്ചുപോരുന്നു. ഗോശയമാഗ്ഗത്തിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കൈതളളിക്കയറ്റി വിസ്താരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരമായ ഏർപ്പാട് ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നു. പൊക്കിക്കൊടി മുറിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തുരുമ്പുപിടിപ്പിച്ചുകിടക്കുന്ന അരിവാരം, കറിക്കഞ്ഞി, ബ്ലെയിഡ് തുടങ്ങിയ മാരകായുധങ്ങളാണു് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നാടൻ വയറ്റാട്ടിമാർ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതു്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും അപകടകരമായ ഈ പ്രസവശുശ്രൂഷ നിലനില്പുവാണെന്നാണു കാരണം? മിഡ്വൈഫറി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച മിഡ്വൈഫ്മാരെ പ്രസവപരിചരണങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ? ഇന്നു് ഏതു പഞ്ചായത്തിലും 'വിദഗ്ദ്ധ സുതീകമ്മിണി'കളുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടും നാടൻ പതിച്ചിമാരെ സാധാരണജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാൻ കാരണമെന്തു്? സാമൂഹ്യക്ഷേമതല്പരരും മിഡ്വൈഫ്മാരും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണു്. കുറും മുഴുവൻ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു തടിതപ്പുന്നതു് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാഗ്ഗമല്ല.

പ്രസവശുശ്രൂഷകഴിഞ്ഞാലുടനെ, കൈകൾ കഴുകി, ഫീസുംവാങ്ങി തിരിച്ചുപോകുന്നവരാണു് കുട്ടിമദാമ്മമാ

രായ മിഡ്‌വൈഫുമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. പ്രസവ ശേഷം അവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾക്കു വീണ്ടും നാടൻ വയറാട്ടിമാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇന്നും നിലവിലുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ടാണ്, തങ്ങളുടെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും അശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥയോടെ നിറവേറ്റി, കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങി തിരിച്ചുപോവുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാടൻ പതിച്ചിമാരെ ഇന്നും ബഹുജനങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രസൂതികർമ്മവിദ്യയോളം സേവനം ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു കർമ്മവും വൈദ്യശാസ്ത്രലോകത്തിലില്ല. പ്രസൂതിശാസ്ത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ അതു സമർത്ഥമായി കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ആയില്ല, വിനയവും സഹാനുഭൂതിയും സർപ്പാപരി ആത്മാർത്ഥമായ സേവനമനോഭാവവും ഈ തൊഴിലിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. സേവനമനോഭാവം കൂടാതെയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രവിജ്ഞാനംകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നന്മയുമുണ്ടാകയില്ല; എന്നതന്നെ യല്ല സേവനം എന്ന മൗലികഘടകംകൂടി ഉൾച്ചേർന്നാലേ വൈദ്യശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയമാവുകയുള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം 1

പുനരത്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

പ്രസൂതിശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനാരംഭിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണവിദ്യാർത്ഥി,

അനാട്ടമി (Anatomy), ഫിസിയോളജി (Physiology), പതോളജി (Pathology), ഗൈനക്കോളജി (Gynaecology), ബ്ലാസ്റ്റോളജിക്സ് (Obstetrics)

എന്നു തുടങ്ങിയ ചില വൈദ്യശാസ്ത്രസംജ്ഞകളും അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില സാമാന്യവിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അനാട്ടമി (ANATOMY)

അനാട്ടമി എന്ന ഗ്രീക്കു പദത്തിന് തുല്യാർത്ഥകളായി, രചനാത്മകശരീരം, അംഗവിശകലനശാസ്ത്രം, ശരീരനിർമ്മാണസൂത്രം, ശരീരവ്യവഹാരശാസ്ത്രം എന്നീ നാലു വാക്കുകൾ അർത്ഥശങ്ക കൂടാതെ മലയാളത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം.

അനാട്ടമി അഥവാ രചനാത്മകശരീരം എന്നാൽ ശരീരം എപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതിനെപ്പറ്റി യുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.

അനാട്ടമിയിൽ, അവയവങ്ങളുടെ ഘടന, ആകൃതി, വലിപ്പം, സ്ഥാനം, റെറുക്കും കൂട്ടുചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാംസപേശികൾ, രക്തവാഹികൾ, എല്ലകൾ എന്നുവേണ്ടെ എല്ലാറ്റിനേയുംപറ്റിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അറിവാണത്—അംഗപ്രത്യംഗം കീറിമുറിച്ച്, നഖ ശിഖാന്തമുള്ള ശരീരനിർമ്മാണസൂത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അതി സൂക്ഷ്മമായ പഠനമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ഫിസിയോളജി (PHYSIOLOGY)

ശരീരത്തിന്റെ ജീവധർമ്മപരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയുംപറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിന് ഫിസിയോളജി അഥവാ ശരീരശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നു. ഫിസിയോളജി എന്ന പദത്തിന് തുല്യാർത്ഥകങ്ങളായി മലയാളത്തിൽ ക്രിയാത്മകശാരീരം, ശരീരശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാരീരം എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

പതോളജി (PATHOLOGY)

രോഗബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്ഥിതിഗതികളെയും അതിനു കാരണമായിത്തീർന്ന ആദിഹേതുക്കളെയും മറ്റും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് രോഗനിദാനശാസ്ത്രം അഥവാ പതോളജി (Pathology) എന്നു പറയുന്നു.

ഗൈനക്കോളജി (GYNAECOLOGY)

ഗൈനക്കോളജി എന്ന ഗ്രീക്കു ശബ്ദത്തിന് വിപുലമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയാണുള്ളത്. സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീരോഗശാസ്ത്രം എന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ഗൈനക്കോളജി, ഗർഭിണികളുടേയും സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗകാരണങ്ങളെയും അവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സകളെയും രോഗപ്രതിരോധത്തെയും വിശേഷിച്ച് അവരുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും മറ്റും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖയാകുന്നു.

ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് (OBSTETRICS)

ഗൈനക്കോളജി എന്ന സ്രീരോഗവിജ്ഞാനശാഖയിൽ തന്നെ പെടുന്നതും, ഗർഭധാരണത്തോടുകൂടി സ്രീശരീരത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചു ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വളർച്ച, പ്രസവം, പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷാകാലം, പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകാവുന്ന തകരാറുകൾക്കു മുൻകൂട്ടിയുള്ള കരുതൽനടപടികൾ, പ്രസവശേഷം മാതാവിന്റെയും നവജാതജിശുവിന്റെയും സംരക്ഷണപരിചരണങ്ങൾ, ചികിത്സ തുടങ്ങി ഗർഭാരംഭം മുതൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു അവർ പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന സകല സംഭവവികാസങ്ങളെയും ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ശാഖയ്ക്കാണ് ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് അഥവാ പ്രസൂതികർമ്മവിദ്യ എന്നു പറയുന്നത്.

പുനരത്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ (REPRODUCTORY ORGANS)

പുരുഷജനനേന്ദ്രിയം (MALE GENITAL ORGAN)

പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രധാനമായി വൃഷണങ്ങളും (ടെസ്റ്റിസ്—Testes), ലിംഗവും (പെനിസ്—Penis) ആകുന്നു.

പുരുഷലിംഗം (പെനിസ്—PENIS)


മാംസപേശീനിർമ്മിതവും ചുവടു്, തണ്ടു്, അഗ്രം എന്നു് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുള്ളതും തൈക്കിയാൽ സ്പോഞ്ച (Sponge) പോലെ ഇരിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണു് പുരുഷ ലിംഗം. ലിംഗത്തിന്റെ ചുവടു് നാഭിയിലെ മാംസപേശികളോടും അസ്ഥിയോടും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിംഗാഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പിളർപ്പു് മൂത്രക്കുഴൽ വന്നുവസാനിക്കുന്ന ദ്വാരമാണു്. ലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിനു് മകുടം (കൊറോണ—Corona) എന്നു പറയും. മകുടത്തിന്റെ കീഴറ്റം ഒരു മോതിരംപോലെ പൊന്തിനില്ക്കുന്നു. ഈ മോതിരവളയത്തിലും അതിനു പുറകിലുമായി തൈല പിണ്ഡങ്ങളുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത ഭാഗം സ്നിഗ്ദ്ധമായായിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം ദിവസേന വൃത്തിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൊരിച്ചിലും കടിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ലിംഗതണ്ടിനെ ആവരണംചെയ്തിരിക്കുന്ന തൊലി മകുടത്തേയും മൂടിയിരിക്കുന്നു. മകുടത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന തൊലിക്കു് അഗ്രചർമ്മം (പ്രിപ്യൂസ്—Prepuce) എന്നു പേർ. ലിംഗാഗ്രചർമ്മം ഇരട്ടപ്പാളിത്തൊലിയാണു്. ലിംഗത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും മാറത്തക്ക

വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഘടന. ലിംഗത്തിലുള്ള രക്തസഞ്ചയനഭാഗത്തു് (ബ്ലഡ് സ്പെയിസ്—Blood space) രക്തം വന്നു് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുമ്പോഴാണ് ലിംഗം നിവർന്നിരിക്കുന്നതു്. നിദ്രാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ലിംഗത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാണ്ടു് അഞ്ചിരട്ടി രക്തം ലിംഗത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് സ്പെയിസിൽ വന്നുകൂടുമ്പോഴാണ് ലിംഗം ബലവത്തായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നതു്. സംഭോഗപ്രേരണയുണ്ടാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രേരണയാൽ ഏകദേശം എട്ടു് ഓൺസ് രക്തം ലിംഗത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് സ്പെയിസിൽ വന്നു് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

സാധാരണനിലയിൽ പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ ശരാശരി നീളം 3—4 ഇഞ്ചു് (7—10 സെ: മീ:) മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭോഗപ്രേരണയോടുകൂടി എഴുന്നിട്ടുവോൾ അതിന്റെ നീളം ഏകദേശം 5—7 ഇഞ്ചു് (12—18 സെ: മീ:) വരെ ആകുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ കണക്കു മാത്രമാണ്. ഇതിൽ കുറെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കൂടിയതുകൊണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചു ദോഷമൊന്നുമില്ല.

വൃഷണങ്ങൾ (ടെസ്റ്റീസ്—TESTES)

പുരുഷബീജോല്പാദനം നടക്കുന്നതു് ലിംഗത്തിന്റെ ചുവടിന്നുതാഴെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സഞ്ചിയിലുള്ള വൃഷണങ്ങളിലാണ്. ഈ സഞ്ചിക്ക് വൃഷണകോശം അഥവാ മുഷ്കസഞ്ചി (സ്ക്രോട്ടം—Scrotum) എന്നു പറയുന്നു. തണുപ്പുകൊണ്ടു ചുരുങ്ങുകയും ചൂടുകൊണ്ടു് വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഘടന. തണുപ്പുകാലത്തു് ഇതു ചുരുങ്ങിപ്പറ്റിയിരിക്കും. വേനലുകാലത്തു് അയഞ്ഞു തൂങ്ങിക്കിടക്കും. ജനനേന്ദ്രിയഭാഗത്തെ ചൂടു ക്രമപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വിദ്യമാത്രമാണിതു്. വൃഷണങ്ങളിൽ ഇടത്തേതു് താരതമ്യേന അല്പം വലുതായിരിക്കും. ഇവ അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ളവയും ബലിഷ്ഠങ്ങളാകുന്നു. ഇവയിൽ അസംഖ്യ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ കഴലുകൾ അല്പികൾപോലെ അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.




ചിത്രം 1

1. മൂത്രസഞ്ചി (യൂറിനറി ബ്ലാഡർ-Urinary bladder)
2. ശുക്ലകോശം (സെമിനൽ വെസിക്കിൾ-Seminal vesicle)
3. ബീജവാഹിനികഴൽ (വാസഡിഫറൻസ്-Vasdeferens)
4. വൃഷണം (ടെസ്റ്റിക്കിൾ-Testicle)
5. ഉദ്ധരണകല (ഇറക്ടൈൽ റിഷ്യൂ-Erectile tissue)
6. മൂത്രനിഗ്ഗമനനാളി (യൂറിത്രാ-Urethra)
7. മകുടം (കൊറോണാ-Corona)

പുരുഷബീജം (സ്പെർമ-*Sperm*) ഈ കഴലുകളിലാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ലൈംഗികകോശങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗോണാഡ് (*Gonad*) എന്ന വൃഷണഗ്രന്ഥി അഥവാ ബീജഗ്രന്ഥിയും ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ (*Hormone*) ധാതുവാൺ പൗരുഷലക്ഷണങ്ങളുടേയും ഓജസ്സിന്റെയും ഉറവിടം.

വൃഷണങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഗ്ലേഷ്ചർ (മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ-*Mucus membrane*) ത്തിൽനിന്നും ബീജം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ബീജം വളരുംതോറും മാറിമാറി ബീജസൂത്രം (എപ്പിഡിഡൈമിസ്-*Epididymis*) ത്തിൽ വന്നു വിശ്രമിക്കുന്നു. ബീജസൂത്രം വൃഷണങ്ങളോടുചേർന്നുള്ളതും ഇരുപത്താറടിയോളം നീളമുള്ളതും ചുരുണ്ടു വളഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ ചെറുകഴലാണ്. അവിടെനിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ബീജവാഹിനികൾ (*Vas-deferens*) ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പൊക്കിരനിരപ്പുവരെ എത്തിയതിനുശേഷം താഴോട്ടും പുറകോട്ടും വളഞ്ഞു മുത്രാശയപാശ്ചത്തിൽക്കൂടി അതിനടിയിൽവന്നുചേരുന്നു. ഈ ബീജവാഹിനികൾക്കുവേണ്ടി അവസാനഭാഗം തന്നെ വിസ്കാരംകൂടി ഒരു സഞ്ചിപോലെയായിരിക്കും. ബീജവാഹിനികൾക്കുവേണ്ടി സഞ്ചിപോലെയുള്ള അവസാനഭാഗത്തെയാണ് ശുക്ലകോശം അഥവാ ബീജസഞ്ചി (*Seminal vesicle*) എന്നു പറയുന്നത്. ബീജസഞ്ചിയിൽനിന്നു ശുക്ലവാഹിനികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ബീജവാഹിനിയും ശുക്ലവാഹിനിയുമായി യോജിച്ചു സ്ഖലനനാളം (ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റ്-*Ejaculatory duct*) എന്ന കഴലായിത്തീരുന്നു. ഈ സ്ഖലനനാളം പൗരുഷഗ്രന്ഥി (പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്-*Prostate gland*) യിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പൗരുഷഗ്രന്ഥിയിലെ ചില സ്രവങ്ങളുമായി, സ്ഖലനനാളംവഴിവരുന്ന ബീജശുക്ലങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നു. പൗരുഷഗ്രന്ഥി, പുരുഷശരീരത്തിൽ മുത്രസഞ്ചിയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും മുത്രനിർഗ്ഗമനമാർഗ്ഗത്തെ (*Urethra*) ആവരണംചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്.

പരൂഷഗ്രന്ഥി (Prostate gland) പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. പരൂഷഗ്രന്ഥിയിൽവെച്ചു സ്പെർമിനാളും മൂത്രനിർഗ്ഗമനമാർഗ്ഗം (യൂറിത്രാ) വുമായി ചേരുന്നു. ലിംഗം തടിച്ച് ഉണരുമ്പോൾ പരൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ അമർത്തലുണ്ടാകുന്നതിനാൽ മൂത്രനിർഗ്ഗമനമാർഗ്ഗത്തിന്റെ മേലറ്റം അടയുന്നു. മൂത്രം വരാതെ തടയപ്പെടുന്നു. മൂത്രനിർഗ്ഗമനമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു ബീജശുക്ലം സ്പെർമിനാളുകൾ, ശുക്ലകോശം (Seminal vesicle), ബീജവാഹിനി (Vas deferens), പരൂഷഗ്രന്ഥി (Prostate gland) എന്നിവയുടെ സങ്കോചം (മസ്കുലേർ കൺട്രാക്ഷൻ—Muscular contraction) മൂലമാണ്. മൂത്രനിർഗ്ഗമനമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു ബീജശുക്ലം പ്രവേശിച്ചാൽ ലിംഗാഗ്രത്തിലെ പിളപ്പിൽ (Fissure) കൂടി അതു പുറത്തുവരുന്നു. ശുക്ലകോശം, ബീജവാഹിനി തുടങ്ങിയവയ്ക്കു സങ്കോചവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൽനിന്നുമുള്ള പ്രേരണ കശ്യേരനാഡി (സ്പൈനൽ കോർഡ്—Spinal cord) വഴി ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പടർന്നുകിടക്കുന്ന സിരാനാളുകളിൽ എത്തി ഉദ്ദീപനം വരുത്തുന്നതുമൂലമാണ്.



ചിത്രം 2

- സ്രീ: i) അണ്ഡവാഹിനികളിൽ (Fallopian tube or Oviduct)
 ii) അണ്ഡകോശം (Ovary)
 iii) ഗർഭാശയം (Uterus)
 iv) യോനി (Vagina)
- പുരുഷൻ: i) വൃഷണം (Testicle)
 ii) വൃഷണസഞ്ചി (Scrotum)
 iii) ലിംഗം (Penis)

അദ്ധ്യായം 2


സ്ത്രീജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

(THE FEMALE GENITALIA)

സൈന്ധവനായ എല്ലാ ഗുണഭോഷങ്ങളോടും വിശിഷ്ട സ്ത്രീജനനേന്ദ്രിയങ്ങളോടും അവിഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖയാണ് പ്രസൂതിശാസ്ത്രം.

സ്ത്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യമെന്നും ആന്തരികമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.

സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികാവയവത്തിന്റെ പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് ഉപസ്ഥം (വരമ്പാ—Vulva) എന്നു പേരാകുന്നു. ഈ ബാഹ്യവശം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ പല ഭാഗങ്ങളുള്ളതായി കാണാം.



ചിത്രം 3

ജനനേന്ദ്രിയ ബാഹ്യഭാഗം (EXTERNAL GENITALIA)

1. ഗുദാസ്ഥി (Coccyx)
2. മൂലസേതു (Perinium)
3. യോനീസന്ധി (Posterior vaginal commisure)
4. യോനീവക്ത്രം (Orifice of bartholin's duct)
5. യോനീദ്വാരം (Vaginal entrance)
6. ലഘുഗോധരങ്ങൾ (Labium minus)
7. നാഭി (Pubis or Mons veneris)
8. ഭഗശിക്ലിക (Clitoris)
9. ബൃഹത്തഗോധരങ്ങൾ (Labium majus)
10. മൂത്രദ്വാരം (External urethral orifice)
11. കന്യാചക്രം (Hymen)
12. മലദ്വാരം (Anus)

ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയുടെ ലഘുവിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഒന്ന് (ചി 3:7-മൂന്നാംനമ്പർ ചിത്രത്തിൽ 7 എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കുക)

നാഭി (പ്യൂബിസ്-PUBIS)

അടിവയറിന്റെ കീഴ്ഭാഗമായും ഗുഹ്യഭാഗത്തിന്റെ മേൽഭാഗമായും കാണുന്ന ഉയർന്ന തട്ടാണിത്. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി രോമം മുളച്ചുതുടങ്ങുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ തൊലിക്കടിയിൽ കൊഴുപ്പു ധാരാളമുള്ളതിനാൽ ഇവിടം മാംസളവും മുഴുവുമായിരിക്കും. ആലങ്കാരികമായി ഈ ഭാഗത്തെ മോൺസ് വീനറീസ് (Mons veneris or Mountain of venus) എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം വീനസ്സിന്റെ വിഹാരരംഗം എന്നാണ്. വീനസ്സ് ഗ്രീക്കുകാരുടെ രതീദേവിയാകുന്നു.

രണ്ടു് (ചി 3:9)

ബൃഹത്ഭഗാധരങ്ങൾ

(ലബിയമെജോറാ-LABIA MAJORA-OR OUTER LIPS)

യോനിയിൽ മേലുകീഴായിക്കാണുന്ന പിളപ്പിന്റെ ഇരുവശത്തും രണ്ടു്കൂടി മാംസപേശികൾ അകത്തും പുറത്തുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പുറമെ കാണുന്ന വലിയ മാംസപേശികളെയാണ് ബൃഹത്ഭഗാധരങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ബൃഹത്ഭഗാധരങ്ങൾ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുകയും അവയുടെ ബാഹ്യഭാഗം രോമാവൃതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മൂന്ന് (ചി 3:6)

ലഘുഭഗാധരങ്ങൾ

(ലബിയാമൈനോറ-LABIA MINORA OR INNER LIPS)

ബൃഹത്ഭഗാധരങ്ങൾക്കുള്ളിലായി രണ്ടു് ഇരളുകൾ പോലെ ലഘുഭഗാധരങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവ

യാൺ ഭഗദാരമാർഗ്ഗത്തെ മൂടി സുരക്ഷിതമാക്കിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുതരം സ്ലിഷ്യദ്രാവകം പുറപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവയിൽ സ്ലിഷ്യകലകളുണ്ട്. ഈ ദ്രാവകം അവയവങ്ങൾക്കു മാർദ്ദവവും സുഖവും നൽകുന്നു.

നാലു (ചി 3:8)

ഭഗശിശ്നിക (ക്ലൈറ്റോറിസ്-CLITORIS)

ഭഗാധരങ്ങളാൽ ആവരണംചെയ്തുകൊണ്ട് യോനിയുടെ മുകളറ്റത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു അവയവമാണ് ഭഗശിശ്നിക. ക്ലൈറ്റോറിസിനു ഏതാണ്ടു പുരുഷലിംഗത്തോടു സാദൃശ്യമുണ്ട്. സീമാതീതമായ കാമോദ്ദീപനശക്തിയുള്ള ഈ അവയവത്തിനു, പുരുഷലിംഗത്തിനുള്ളതുപോലെതന്നെ ഒരുഗ്രഹമുണ്ട്. പുരുഷലിംഗത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ദ്രവവിശേഷം ക്ലൈറ്റോറിസിൽനിന്നും ആവിർഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെ ഊർജ്ജമാണ് ഭഗാശയമുഖത്തു് അസാധാരണമായ ഒരു ദുർഗ്ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഗൃഹ്യഭാഗം കഴുകി സൂക്ഷിക്കാത്തപക്ഷം, ഈ ദ്രാവകസമ്പർക്കംമൂലം അമിതമായ കാമവികാരങ്ങൾക്കും രോഗാണുബാധകൾക്കും ഇടയായിത്തീരുന്നതാണ്. ഭഗാധരങ്ങൾ പിടിച്ചുകുറ്റിയാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഭഗശിശ്നികയും, അതിനതാഴെയായി മൂത്രദ്വാരവും അതിനതാഴെയായി ഭഗദ്വാരവും കാണാം.

അഞ്ചു (ചി 3:10)

മൂത്രദ്വാരം (എക്സ്‌തേർണർ യൂറിത്രൽ ഓറിഫിസ്-EXTERNAL URETHRAL ORIFICE)

ഭഗശിശ്നികയിൽനിന്നും ഏതാണ്ടു് രണ്ടു സെ:മീറ്റർ താഴെയാണ് മൂത്രദ്വാരം. അവിടെ വൃത്തപേശികൾ

(Sphincter muscle) ഉള്ളതിനാൽ മൂത്രഭാരം സമനിരപ്പിൽനിന്നു അല്പം ഉയർന്നിരിക്കും.

ആറു° (ചി 3.5)

ഭഗഭാരം അഥവാ യോനീഭാരം

(വജ്രയിനൽ എൻട്രൻസ്—VAGINAL ENTRANCE)

മൂത്രഭാരത്തിനതാഴെനിന്നും ഗർഭാശയമുഖം വരെ അകത്തേയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് ഭഗഭാരം അല്ലെങ്കിൽ യോനീഭാരം എന്നു പറയുന്നത്. രണ്ടുറവും ഒതുങ്ങി മദ്ധ്യഭാഗം വണ്ണം കൂടിയ കഴലിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഭഗഭാരത്തിനുള്ളത്.

ഏഴു° (ചി 3:11)

കന്യാചമം (ഹൈമൻ—HYMEN)

കന്യകയിൽ ഭഗഭാരമാഗ്തം കന്യാചമം എന്ന പാടയാൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പാടയിൽ ആത്മവരക്കുബഹിഷ്കരണത്തിനുവേണ്ടി ഒന്നോ അതിലധികമോ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില പെൺകുട്ടികളുടെ കന്യാചമത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ ശരിയല്ലാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മവരക്കുബഹിഷ്കരണം സാധ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും ആത്മവം (മെൻസസ്) കാണാത്തപക്ഷം ലഘുവായൊരു ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം കന്യാചമം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കന്യാചമം, ഭഗഭാരമുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാലാണ് കന്യകകളായ സ്ത്രീകളിൽ പലരുടേയും ഭഗഭാരമാഗ്തത്തിലേയ്ക്കു കൈവിരൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അകത്തേയ്ക്കു കടക്കാതിരിക്കുന്നത്. കന്യാചമം പൂർണ്ണമായും പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പ്രഥമസംഭോഗാവസരത്തിലാണ്. എന്നാൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിലേപ്പെടാത്ത

കന്യകമാരിലും ചിലപ്പോൾ കന്യാപത്നം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളതായിക്കാണാം. അമിതമായി അദ്ധ്വാനിക്കുക, വളരെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്വയം പൊക്കിയെടുക്കുക, ഗൃഹഭാഗങ്ങളിൽ ചൊരിച്ചിലോമരോറ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിരൽ അകത്തുകടത്തി ചൊരിയുക, പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലും കന്യാപത്നം പൊട്ടിപ്പോകാവുന്നതാണ്.

ഏഴ് (ചി 3:2)

മൂലസേതു (പെരിനിയം-PERINIUM)


ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും മലദ്വാരത്തിനും മദ്ധ്യേയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് പെരിനിയം. അല്ലെങ്കിൽ മൂലസേതു എന്നു പറയുന്നതു്.

സ്രീജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ- അന്തർഭാഗത്തുള്ളവ

ഒന്ന്,

യോനി (വജയിനം-VAGINA)

കന്യാചർമ്മത്തിന് താഴെനിന്നും ഗർഭാശയമുഖം വരെ ഏഴു മുതൽ പത്തു സെ: മീ: നീളത്തിലുള്ള മാഗ്ഗ്ത്തിനാണ് ഭഗഭാരം അല്ലെങ്കിൽ യോനീഭാരം എന്നു പറയുന്നത്. ഇത് അരക്കെട്ടിനുള്ളിൽ മലാശയത്തിനും മൂത്രാശയത്തിനും ഇടയിലായി മുകളിലോട്ടു ചാഞ്ഞു പുറകോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. യോനീഭിത്തികൾ മാംസപേശികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയും അതിനുള്ളിലെ ആവരണികയായ ശ്ലേഷ്മപർമ്മം (Mucus membrane) പല ചുളിവുകളോടു കൂടിയതുമാകുന്നു. ഭഗഭാരമാഗ്ഗ്ത്തിന്റെ മേലറ്റവും കീഴറ്റവും ഇടുങ്ങിയും മദ്ധ്യഭാഗം വിസ്താരംകൂടിയും ഇരിക്കുന്നു. ഭഗഭാരമാഗ്ഗ്ത്തിലൂടെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് പുറത്തേയ്ക്കു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗഭാരമാഗ്ഗ്ത്തിന് അസാധാരണമായ സങ്കോചവികാസശക്തിയുണ്ട്. ഭഗഭാരമാഗ്ഗ്തേണ വിരൽകടത്തിപ്പരിശോധിച്ചാൽ ഗർഭാശയകണ്ഠം സ്പർശിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗഭാരമാഗ്ഗ്ത്തിന് അയവും മാർദ്ദവവും ലഭിക്കുമാറു് ദ്രാവകം ഉറവിടത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്രന്ഥികളും ഭഗാശയത്തേികളിലുണ്ട്.



ചിത്രം 4

സ്രീജനനേന്ദ്രിയഭാഗങ്ങൾ (ആന്തരികം)

- i, അണ്ഡനാളം
- ii, ഗർഭാശയം
- iii, അണ്ഡകോശം
- iv, യോനി

രണ്ട്:

ഗർഭാശയം (യൂട്ടറസ്-UTERUS)

സ്രീയുടെ ആന്തര ലൈംഗികാവയവങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഗർഭാശയം അഥവാ യൂട്ടറസ്സ്. ബലവത്തായ മാംസപേശികളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഈ അവയവത്തിന് അസാധാരണമായ ഉറപ്പും ബലവും മാർദ്ദവവുമുണ്ട്. പുനരുത്പാദന പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് ഈ അവയവത്തിലാണ്.

വത്തിലാകുന്നു ഗർഭധാരണത്തിന്റെ പ്രഥമ പടിയായ ബീജാണുസംയോഗം മുതൽ, സംയുക്താണുത്തിന്റെ സ്ഥാനസ്ഥിരീകരണം, വളച്ച്, അവയവരൂപവത്കരണം തുടങ്ങിയ അനവധി ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന്, പൂർണ്ണ വളച്ചയെത്തിയ ഗർഭസ്ഥശിശുവായി പരിണമിച്ച് ജനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടമത്രയും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംരക്ഷണവും പോഷണവും നൽകുന്നത് ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽവെച്ചാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഗർഭധാരണം നടന്നാൽ ഗർഭാശയത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാനാതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതുതാദരജനകങ്ങളാണ്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വലിപ്പവർദ്ധനവിനനുസരണമായി അതിനു സുഖമായി ശയിക്കുവാൻതക്കവണ്ണം ഗർഭാശയത്തിന്റെയും വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതിക്കനുസരണമായി ഇത്രകണ്ടു ചുരുങ്ങുവാനും വികസിക്കുവാനും കഴിവുള്ള മറ്റൊരവയവവും മനുഷ്യശരീരത്തിലില്ല. ഗർഭാശയത്തിന്റെ വലിപ്പം, ആഭ്യന്തരഘടന, പ്രവർത്തനക്ഷമത, സങ്കോചവികാസശക്തി, എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും നിദാനം, അതാതു സമയങ്ങളിൽ ശരീരത്തിലുള്ള വിഭിന്ന ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അന്തഃസ്രവണങ്ങളുടെ (ഹോർമോൺ-Hormones) സ്വാധീനമാകുന്നു.

ആകൃതി (ഷെയ്പ്പ്-SHAPE)

മേൽഭാഗത്തിന് അഥവാ ഉപരിധ്വജത്തിന് (Upper pole) കീഴ്ഭാഗത്തേക്കാൾ അഥവാ കീഴ്ധ്വജത്തെ (Lower pole) കാൾ വീതിയും ഘനവും കൂടുതലുണ്ട്. അതിനാൽ മുൻവശത്തുനിന്നും വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽനിന്നും താഴേയ്ക്കു വരുംതോറും ക്രമേണ വീതികുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കീഴറ്റം ഒരു ഇടുങ്ങിയഭാഗമായി പരിണമിച്ച് ഏതാണ്ട് ശംഖിന്റെ ആകൃതി (Pyri form) യിലുള്ള ഒരു സഞ്ചിപോലെയാകി കാണപ്പെടുന്നു. പരന്നിരിക്കുന്ന മുൻഭിത്തിയെന്നെയാണ് ഇരുവശങ്ങളുടേയും മാർജിനിൽവരുന്നവോൾ ഉള്ളിലേയ്ക്കു ഉരുണ്ടു മടങ്ങി പിൻ

ഭിത്തിയായി പരിണമിക്കുന്നത്. ഇതിനാലാണ് ഇടതും വലതും മാർജിനുകളും ഒരു കഴലിന്റെ ഭിത്തിപോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തെ ഭിത്തിതന്നെ മുകളറ്റത്തേയ്ക്കുവശസ്ഥായ ഒരു ആർച്ചിന്റെ (ക്രമം രൂപത്തിൽ പുറകോട്ടുവളഞ്ഞ്) പുറകുവശത്തെ ഭിത്തിയായിത്തീരുന്നു.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉപരിധി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥി സ്ഥിതിക്കൂടി കടന്നുപോകത്തക്കവണ്ണവും, ഇടതും വലതും വശങ്ങളിൽ രണ്ടു തുല്യ ഖണ്ഡങ്ങൾ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണവും മുകളിൽനിന്നും താഴോട്ടു മുറിച്ചാൽ ഗർഭാശയത്തെ രണ്ടായി പിളർക്കാം. സമാനങ്ങളായ ഈ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ മുറിവാടിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ ബലവത്തായ പേശികളാൽനിന്നുതന്നെ പിൽഭിത്തിയും മേൽക്കൂരയുടെ ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപരിധി വർദ്ധഭാഗവും അതിന്റെ തുടച്ചായിത്തീരുന്ന മുൻഭിത്തിയും വ്യക്തമായിക്കാണാം. ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നതും വളരെ ചെറുതായ ഒരു ഓരാണ് ഗർഭാശയ അറ (യൂട്ടിറൈൻ ക്യാവിറ്റി-Uterine cavity). ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഖണ്ഡത്തിലെ (Section) മുറിവാടിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം അണ്ഡാകൃതിയിലായിരിക്കുകയുംചെയ്യും.

എന്നാൽ ഉപരിധി വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെയും, ഗർഭാശയക്കഴലുകളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകത്തക്കവണ്ണവും മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി വേർതിരിയത്തക്കവണ്ണവും ഗർഭാശയത്തെ മുകളിൽനിന്നും താഴേയ്ക്കു മുറിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാം. അപ്പോഴും മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് അണ്ഡാകൃതിയാണ് ഗർഭാശയസഞ്ചികളെങ്കിലും. മുൻപിൻ ഭിത്തികൾ ഇരുവശങ്ങളിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി കൂടുതൽ പരന്നു വീതികൂടിയും കാണപ്പെടുന്നു.

വലിപ്പം (സൈസ്-SIZE)

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിന് 8 മുതൽ 9 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും ഏകദേശം 5

സെ: മീ: വീതിയും ശരാശരി 50 ഗ്രാം തൂക്കവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗർഭാശയഭിത്തിക്ക് 2-3 സെ: മീ: ചേനവുമുണ്ട്.

ഗർഭാശയഭാഗങ്ങൾ (PARTS OF UTERUS)

i, ഗർഭാശയഗളം (സെർവിക്സ്—CERVIX):—

ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ കീഴ്ഭാഗത്തിനാണ് ഗർഭാശയഗളം (Cervix uteri) എന്നു പറയുന്നത്. ഏതാണ്ടൊരു കഴലിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഈ ഭാഗത്തിനുള്ളത്. ഈ ഭാഗം യോനിയിലേയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുനില്ക്കുന്നതിനാലാണ് ഭഗദാരമാറ്റേണ വിരൽകടത്തിപ്പരിശോധിച്ചാൽ സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഗർഭാശയം സ്വസ്ഥമാകുന്നത് നിവർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭാശയഗളം അല്പം പിന്നോട്ടും താഴോട്ടുമായി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഗർഭാശയഗളത്തിലെ ദ്വാരം യോനിയുടെ പിൻ അഗ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സെർവിക്സിലെ ഈ ദ്വാരമാണ് യോനിയിൽനിന്നും ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്കുള്ള ബാഹ്യകവാടമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യോനിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെർവിക്സിലെ ഈ സുഷിരത്തിനാണ് ഗർഭാശയ ബാഹ്യകവാടം (External os uteri) എന്നു പറയുന്നത്. പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീകളുടെ ഈ ബാഹ്യകവാടം (എക്സ്ടേർണൽ ഓസ്) വൃത്താകൃതിയിലും, പ്രസവിച്ചവരുടേത് അല്പംതന്നെ ഒരു കണ്ണിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു വിള്ളൽപോലെയോ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിലോ ആയും കാണപ്പെടുന്നു. സെർവിക്സിന്റെ ബാഹ്യകവാടത്തിന്റെ തുടച്ചുവായി ഗർഭാശയ മധ്യത്തിലൂടെ ഒരു ചാൽ ഉണ്ട്. ഈ ചാലിന് സെർവൈക്കൽ കനാൽ (Cervical cannal) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ചാലിന്റെ ആന്തരികകവാടത്തിന് ഗർഭാശയാന്തരികകവാടം (Internal os uteri) എന്നു പറയുന്നു.

(5-ാം നമ്പർ ചിത്രം നോക്കി ബാഹ്യകവാടവും E. os, ആന്തരികകവാടവും I. os മനസ്സിലാക്കുക)


ii, ഗർഭാശയ ഉടൽ (BODY OF THE UTERUS)

ഗർഭാശയഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഉടൽഭാഗമാകുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുകയും ലൈംഗികപക്വതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉടൽഭാഗം, അതിന്റെ ആകെ നീളത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗമായിരിക്കും. ഗർഭാശയകണ്ഠം (സെർവിക്സ്) ആകെ നീളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നോളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ലൈംഗികവളർച്ച പൂർണ്ണമാകാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ സ്ഥിതി നേരെമറിച്ചാകുന്നു. ഗർഭാശയകണ്ഠത്തിനായിരിക്കും ഉടലിനെക്കാൾ നീളക്കൂടുതൽ.

ഉദരത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായും ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തായും ആയിരിക്കും ഗർഭാശയ ഉടലിന്റെ സ്ഥാനം.

iii, ഗർഭാശയമൂലം (ഫണ്ടസ്സ്-FUNDUS)

അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴലുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സങ്കല്പരേഖയുടെ നിരപ്പിനു മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഗർഭാശയമൂലഭാഗം അഥവാ ഫണ്ടസ്സ് (Fundus uteri) എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു വളഞ്ഞ മേൽക്കൂരയുടെ ആകൃതി (Dome shaped) യാണ് ഫണ്ടസ്സിനുള്ളത്. നിവർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉപരിയ്കവമായ ഈ ഭാഗം, ഗർഭാശയകണ്ഠഭാഗത്തിന്റെ (Cervix) വിപരീതാഗ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാലാണ് ഈ ഭാഗത്തെ മൂലഭാഗം എന്നു പറയുന്നത്. ഫണ്ടസ്സ് ഭാഗത്തെപ്പറ്റി മിഡ്‌വൈഫിനു വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമായതിനാൽ താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കി പ്രസ്തുത ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.



ചിത്രം 5

ഗർഭാശയഭാഗങ്ങൾ

ഫണ്ടസ്, മറുഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക.

iv, അണ്ഡവാഹിനികൾ (FALLOPIAN TUBES or OVIDUCTS)


ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇടതുവലതുവശങ്ങളിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ കഴലുകൾ ഗർഭാശയമൂലം (Body of the uterus) ഗർഭാശയമൂലഭാഗവും (Fundus uteri) തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലോട്ടുമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്നതും, ഉപസ്ഥാശയ അറയുടെ (പെൽവിക്സ് ക്യാവിറ്റി-Pelvic cavity) ഇടതും വലതും പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ വരെ ചെന്നെത്തുന്നതുമായ കഴലുകളാകുന്നു. ഓരോ കഴലിനും ശരാശരി 10 മുതൽ 12 സെ:

മീറർ വരെ നീളമുണ്ടായിരിക്കും. കഴലുകളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോർപ്പ് കമഴ്ന്നിട്ടായിരിക്കുന്ന ആകൃതിയാണുള്ളത്. ചോർപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലിരിക്കുന്ന ഈ അവസാനഭാഗം നമ്മുടെ കൈവിരലുകൾക്ക് സമാനങ്ങളായ അനേകം തൊണ്ടുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തൊണ്ടുകളെ ഫിംബ്രിയേ (Fimbriae-ബഹുവചനം, Fimbria-ഏകവചനം) എന്നു പറയും. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽനിന്നുമായി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ അണ്ഡവാഹിനികൾക്കു, ഉദര അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇടതും വലതുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അണ്ഡാശയങ്ങളിലേയ്ക്ക് (ഓവറീസ്-Ovaries) പോകുന്നു. അണ്ഡനാളങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലും, മധ്യഭാഗം അല്പം വിസ്താരം കൂടി സഞ്ചിപോലെയും അവസാനഭാഗം ചോർപ്പിന്റെ ആകൃതിയിൽ തൊണ്ടുകൾ പോലെയുമാണ്. അണ്ഡാശയങ്ങളിൽനിന്നും പക്ഷമായി പുറത്തുവരുന്ന അണ്ഡ (ഓവം-Ovum) ഞ്ഞ അണ്ഡവാഹിനികൾക്കുവേണ്ടി അവസാനഭാഗമായ തൊണ്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അണ്ഡത്തെ ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതിന് അണ്ഡവാഹിനികൾക്കുളള ഉള്ളിൽ ലോമസദൃശമായ അനേകം ചില്ലികൾ (സീലിയാ-Cilia) ഉണ്ടു്. അണ്ഡവാഹിനികൾക്കുളളിലുള്ള സീലിയാ എന്ന ഈ ലോമസദൃശങ്ങളായ ചില്ലികൾ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വശത്തേയ്ക്കു മാത്രം തിരിഞ്ഞു് പലിക്കുന്നവയാണ്. അണ്ഡവാഹിനികൾക്കുളളിലെ ചാലുപോലെയുള്ള പൊള്ളയായ നേരിയ ഭാഗം ഗർഭാശയ അറയുടെ തുടച്ചുമാകുന്നു.

V, ഗർഭാശയകന്ദം (യൂട്ടെറിൻ ക്യാവിറ്റി-UTERINE CAVITY)

ഗർഭാശയഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന പൊള്ളയായ ഭാഗത്തെ അഥവാ അറയേയാണ് ഗർഭാശയകന്ദം-യൂട്ടെറിൻ ക്യാവിറ്റി എന്നു പറയുന്നതു്. ഗർഭാശയഭിത്തികൾ

ക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ അറയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ത്രികോണാകൃതിയാണുള്ളത്. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഗർഭാശയ അറയുടെ കീഴ്ക്കോണു ഗർഭാശയ അറയും ഗർഭാശയകണ്ഡവും തമ്മിൽ സന്ധിക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെക്കുറിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ആധാരം മുകളിലും ശീർഷകോൺ അടിയിലും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആകൃതിയാണിതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ കീഴ്ഭാഗത്തായി വരുന്ന ശീർഷകോണിന്റെ അഗ്രം ഗർഭാശയാന്തരകവാടത്തെയും, മുകൾഭാഗത്തു കാണുന്ന ആധാരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കോണുകൾ ഗർഭാശയമൂലഭാഗത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽനിന്നും അണ്ഡവാഹിനിക്കഴുകളിലേയ്ക്കു പോകുന്ന ചാലുകളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തേയും കുറിക്കുന്നു.



vi. ഗർഭാശയഭിത്തികൾ

ഗർഭാശയഭിത്തിക്ക് മൂന്നുകക്കളാണുള്ളത്. ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭിത്തി ശ്ലേഷ്മച്ഛം (Mucus membrane) കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഒരു നിര കോശങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ധാരാളം ഗ്രന്ഥികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ ഈ ശ്ലേഷ്മച്ഛത്തെ ഗർഭാശയ ഉരഭിത്തി (എൻഡോമെട്രിയം—Endometrium) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ തൊട്ടുപിന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും മൂലപേശികളാൽ നിർമ്മിതവുമായ ഭിത്തിയെ ഗർഭാശയമദ്ധ്യഭിത്തി (മയോമെട്രിയം—Myometrium) എന്നു പറയുന്നു; മൂലപേശികളാൽ നിർമ്മിതമെങ്കിലും അസാമാന്യമായ ബലവും സങ്കോചവികാസശക്തിയും ഉള്ളതാണിത്. ഈ പേശീഭിത്തി ഗർഭാശയഭിത്തിയുടെ മൂന്നുകക്കളിൽ മദ്ധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഗർഭാശയമദ്ധ്യഭിത്തിയെ (മയോമെട്രിയം) പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ അടുക്ക് ബാഹ്യചർമ്മത്തിന് പെരിമെട്രിയം (Perimetrium) എന്നു പറയുന്നു.

ആന്ത്രവേഷ്യനം (പെരിട്ടോണിയം—Peritoneum) എന്ന മൂടലചമ്ബിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പെരിമെട്രിയം എന്ന ഗർഭാശയത്തിന്റെ ബാഹ്യഭിത്തി അഥവാ ബാഹ്യാവരണിക. ഉദരഭാഗത്തും ഉപസ്ഥാശയഭാഗത്തുമുള്ള ആന്തരാവയവങ്ങളെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന മൂടലചമ്ബിശേഷമാണ് ആന്ത്രവേഷ്യനം അഥവാ പെരിട്ടോണിയം. ഇത് മൂത്രാശയത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തെ പൊതിഞ്ഞു വ്യാപിച്ച ശേഷം പിന്നോട്ടും അല്പംതാഴോട്ടുംവന്ന് ഗർഭാശയഭിത്തിയുടെ മുൻവശത്തു ഏതാണ്ടു മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു്, ഗർഭാശയഭിത്തിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തിന്റെ ആകൃതിക്കനുസരണമായി പിന്നോക്കം വളഞ്ഞു് താഴേയ്ക്കിറങ്ങി പിൻഭിത്തിയേയും മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ ശേഷം തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള വൻകടലിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ മൂടിപ്പൊതിയുന്നതിനുവേണ്ടി മേലോട്ടുയരുന്നു.

130435

ഇപ്രകാരം പെരിട്ടോണിയം ഗർഭാശയഭിത്തിയുടെ മുൻവശവും പിൻവശവും പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മേലോട്ടുയരുകയും താഴോട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്ത ശേഷം വൻകടലിന്റെ മുൻവശത്തേയ്ക്കു വീണ്ടും ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടു പോക്കറുകൾപോലെ യുള്ള ചെറിയ അറകൾ (Pouches) ഉണ്ടാകുന്നു. പെരിട്ടോണിയം എന്ന ഒരേ ചമ്ബത്തിന്റെ സഞ്ചാരഗതിയിൽ കുന്നിപ്പകൾപോലെയുള്ള ചില വളവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം അറകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നതിനാൽ ഈ അറകളുടെ മുൻഭിത്തിയും, പിൻഭിത്തിയും അടിവശവും ഒരേതുണികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സഞ്ചിപോലെ ഒരേ ചമ്ബത്താൽതന്നെ രൂപംകൊള്ളുന്നതാണ്. മൂത്രാശയത്തിനും ഗർഭാശയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അറയെ മൂത്ര-ഗർഭാശയ വിഭജനഅറ (വെസൈക്കോ യൂട്ടിറൈൻ പൗച്ച്—Vesico uterine Pouch) എന്നു പറയുന്നു. അതുപോലെ ഗർഭാശയത്തിനും വൻകടലിനും ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അറയെ ഗർഭാശയാന്ത്രവിഭജന അറ (റെക്ടോ യൂട്ടിറൈൻ പൗച്ച്—Recto uterine pouch) എന്നു പറയുന്നു.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇടതും വലതും വശങ്ങളിലുള്ള പെരിടോണിയത്തിന്റെ ഭാഗം ഗർഭാശയനാളത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞശേഷം ഗർഭാശയനാളത്തിന്റെ തൊട്ടുതാഴെവെച്ചു യോജിച്ച് ഓറച്ചുപുറമായി താഴോട്ടു തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇടതു വലതു വശങ്ങളിലായും ഗർഭാശയനാളികളുടെ കീഴ്ഭാഗത്തായും കാണപ്പെടുന്ന ഈ പരന്ന ചുരുങ്ങിയ ഗർഭാശയ പാർപ്പവിസ്തൃതചുരുക്കം (ബ്രോഡ് ലിഗമെൻറ് ഓഫ് യൂടേസ്—Broad ligament of uterus) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ചുരുങ്ങിയതിന്റെ ഇരുഭിത്തികൾ അതിന്റെ അടിവശത്തുവെച്ച് വീണ്ടും രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞുകുന്നതില്ല. ഇപ്രകാരം നില്ക്കുന്ന പെരിടോണിയത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കു് ബന്ധകലകൾകൊണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തെ മുഴുവനുംകൂടിയാണു് പാരാമെട്രിയം (Parametrium) എന്നുപറയുന്നതു്.


ഗർഭാശയഭിത്തിക്കു് മൂന്നുകൾക്കകം ഉള്ളതുപോലെ ഗർഭാശയനാളങ്ങൾക്കും മൂന്നു ഭിത്തികൾ വീതമുണ്ടു്. നാളങ്ങളുടെ ഉൾഭിത്തിയിലും ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിലും ലോമസദൃശങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ ഒരു നേക്കം പൊടിപ്പുകളോടുകൂടിയ കോശങ്ങളുണ്ടു്.

vii. അണ്ഡകോശങ്ങൾ (ഓവറീസ്—OVARIES)

പുരുഷന്റെ വൃഷണങ്ങളോടു സാദൃശ്യമുള്ളവയും അണ്ഡാകൃതിയിൽ നീണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ടു ഗ്രന്ഥികളാണു് അണ്ഡാശങ്ങൾ അഥവാ ഓവറീസ്. അനേകം ചെറിയ മുഴകൾ പുറത്തോട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്നരീതിയിലുള്ള ബാഹ്യാവരണത്തോടുകൂടിയ ഈ അവയവങ്ങളാണു് സ്രീയുടെ ബീജോല്പാദനഗ്രന്ഥികൾ. പ്രായപൂർത്തിയായ സ്രീയുടെ ഒരു അണ്ഡാശയത്തിനു് (ഓവറി—Ovary) ഏകദേശം നാലു സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഒന്നു് ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ആറു മുതൽ എട്ടു ഗ്രാം വരെ തൂക്കവുമുണ്ടായിരിക്കും..

ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴലുകൾക്കു താഴെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾ ഗർഭാശയവിസ്തൃതചർമ്മത്തിന് (Broad ligament of uterus) പിന്നിലായും ഉപസ്ഥാശയ (Pelvic cavity) ഭിത്തിയോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഓവറിയുടെ (അണ്ഡാശയം) ഒരു ഗ്രം., ഗർഭാശയവിസ്തൃതചർമ്മത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു് പരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന രണ്ടിതളുകളിൽ പിൻഭാഗത്തേതിനോടു് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം അണ്ഡകോശം ഈ ചർമ്മത്തിൽനിന്നും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയാണുകാണപ്പെടുന്നത്. ഓവറിയുടെ ഗർഭാശയഭാഗത്തോടഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും ഓരോരുത്ത ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഇടതും വലതും വശങ്ങളിലേയ്ക്കു വന്നുചേരുന്നു.

അണ്ഡാശയങ്ങളിലുള്ള അണ്ഡസഞ്ചികളിലാണ് (സ്ട്രീബീജാണഡം (ഓവം-Ovum) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ സംയോജക ധാതുനാദകൾകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാതയുണ്ടു്. ഈ പാതയിൽക്കൂടിയാണ് അണ്ഡസഞ്ചികൾ വെളിയിലേയ്ക്കുവരുന്നത്. സ്ത്രീകൾ ജന്മത്തിൽ കളായശേഷമാണു് സാധാരണയായി ഈ അണ്ഡസഞ്ചികൾ (ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ-Garfan follicles) പൂർണ്ണവളു് പ്രാപിക്കുന്നത്. ആദ്യവശേഷം പന്ത്രണ്ടോ ദിവസത്തോടുകൂടിയാണ് മേല്പറഞ്ഞ പാതയിൽക്കൂടി അണ്ഡസഞ്ചികൾ അണ്ഡാശയത്തിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നു് പൊട്ടുന്നത്. ഓരോ അണ്ഡസഞ്ചിയിലും ഓരോ അണ്ഡം വീതമാണുണ്ടായിരിക്കുക. അണ്ഡസഞ്ചി പൊട്ടുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽനിന്നും പുറത്തുവരുന്ന അണ്ഡത്തെ അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴലിന്റെ തൊണ്ടലുകൾ (Fimbria) പിടി ചെട്ടിക്കുകയും അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴൽവഴി ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.



ചിത്രം 6

സ്രീപുരുഷബീജങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം

viii. ഗർഭാശയസ്ഥാനം (POSITION OF UTERUS)

പെരിടോണിയം എന്ന മൃദലപാൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പലതരം ചരടുകൾ അഥവാ ഇഴകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഗർഭാശയത്തെ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു് പ്രത്യേകനിലയിൽ താങ്ങിനിറുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ പ്രത്യേകനിലയിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉടൽഭാഗം മുൻപോട്ടായും ഗർഭാശയഗളം പിന്നോട്ടും താഴോട്ടുമായി ഇരിക്കത്തക്കവിധമാണ് ഗർഭാശയസ്ഥാനീകരണം. ഈ നിലയിൽ ഗർഭാശയ ഉടലും, ഗർഭാശയ ഗളവും തമ്മിൽ മുൻഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ (കോൺ) 90 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക നിലയെ അഥവാ സ്ഥാനീകരണത്തെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചായ്പ് (ആന്റിവെർഷൻ-ഫ്ളക്ഷൻ- Anteversion-flexion)

ഈ നിലയിൽ ഗർഭാശയത്തിന് സ്വസ്ഥമാനത്തുനിന്നും ഇളക്കംതട്ടാവുന്നതും, പരിശോധനാസമയത്ത് സ്പർശനം ഏല്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ പരിശോധന നിറുത്തുമ്പോൾ അതായത് സ്പർശന വിമുക്തമാകുമ്പോൾ പഴയസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് വരികയും ചെയ്യും.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചർമ്മനിമിത്തമായ ഇഴകൾ അഥവാ ചരടുകൾ ഉപസ്ഥാശയഭിത്തിയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലായി വന്നു ചേർന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഗർഭാശയ സ്ഥാനീകരണത്തിനു വ്യതിയാനം വരാത്തവിധം ഈ ചരടുകൾക്ക് ഗർഭാശയത്തെ ഉറപ്പിച്ചുനിറുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ചുവടുഭാഗം അഥവാ കീഴ്ത്തട്ട് ബലവത്തായ പേശികളെക്കൊണ്ട് നിമിച്ഛിരിക്കുന്നതിനാൽ അതും ഗർഭാശയത്തിന് സ്ഥാനഭ്രംശം വരാത്തവിധം താങ്ങായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ചുവടുഭാഗത്തുള്ള മസ്തിലുകൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദുർബ്ബലമായിപ്പോയാൽ, ഗർഭാശയത്തിനും മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കും സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നതും വെളിയിലേയ്ക്കുതള്ളിവരുന്നതുമാണ്.

മേൽ വിവരിച്ചനിലയ്ക്ക് വിപരീതമായി ഗർഭാശയത്തിന് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിച്ചാൽ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഗർഭാശയ പിന്നോക്കചായ്വ് (റിട്രോവെർഷൻ-Retro version) എന്നു പറയുന്നു.

ix, രക്തവിതരണം (ബ്ലൂഡ് സപ്ലൈ-BLOOD SUPPLY)

പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ധമനി (Artery) കളും അവയുടെ അനേകം ശാഖാപശാഖകളുംകൂടിയാണ്, ഗർഭാശയത്തിനും അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ലൈംഗികാവയവ ഭാഗങ്ങൾക്കും രക്തവിതരണം നടത്തുന്നത്. ധമനികളോടൊപ്പം സിരകളും (വെയ്ൻസ്-Veins) സഞ്ചരിക്ക

ന്നുണ്ട്. ഈ രക്തക്കുഴലുകളുടെ എല്ലാം ശാഖോപശാഖകൾ ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽവെച്ച് അന്യോന്യം ചേർന്ന് ഒരു വലുപ്പം വലുപ്പം വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗർഭകാലത്തിൽ ഈ ശാഖോപശാഖകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതും അങ്ങനെ രക്തവിതരണത്തിന്റെ അളവു കൂടുന്നതുമാണ്.

x, നാഡികൾ (നെർവ്വ്—NERVE)

ഗർഭാശയത്തിനും അനുബന്ധിത ലൈംഗികാവയവങ്ങൾക്കും അതാതുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കും, പ്രവർത്തനരീതിക്കും ഉതകത്തക്കവിധം സുഷുമ്നാ ഞരമ്പുകളും (സ്പൈനൽ നെർവ്വ്—Spinal nerve) അനൈച്ഛിക ഞരമ്പുകളും (സിംപതറ്റിക് നെർവ്വ്—Sympathetic nerve) കൂടിച്ചേർന്നുള്ള നാഡീവ്യവസ്ഥതന്നെയാണുള്ളത്. ഗർഭാശയഭാഗങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഡീവിതരണമുള്ള ഭാഗം ഗർഭാശയാന്തരകവാട (Internal os)മാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 3.

ആർത്തവം

(മെൻസ്ട്രുവേഷൻ - MENSTRUATION)

ആർത്തവം (മെൻസസ്ട്രൂ-*Mensus*) യൗവനാരംഭത്തിന്റെ അടയാളമാകുന്നു. കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞു യൗവനാരംഭമായി എന്ന പ്രകൃതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പാണിത്. ഇതോടുകൂടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആകാരത്തിലും അവയവഘടനയിലും സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. തൂക്കവും വണ്ണവും വർദ്ധിക്കുകയും സ്തനങ്ങൾ വളർന്ന് ദൃഢപ്പെടുകയും മുമ്പിലാതിരുന്ന അഴകും ആരോഗ്യവും ശാലീനതയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശൈശവം, കൗമാരപ്രായത്തിൽ പൈനിയൽ (Pineal body) എന്ന ഗ്രന്ഥിയും, തൈമസ്സ് (Thymus) എന്ന ഗ്രന്ഥിയുമാണ് ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലും, തൈമസ്സ് ഗ്രന്ഥി ഏതാണ്ട് പതിന്നാലാമത്തെ വയസ്സിലും ശുഷ്കിച്ചുപോകുന്നു. പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി (Pineal gland) ശിരസ്സിലും, തൈമസ്സ് ഗ്രന്ഥി (Thymus gland) കഴുത്തിനു താഴെ നെഞ്ചറയിലുമാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇവയുടെ

നിയന്ത്രണം നില്ക്കുന്നതോടെ ഓജഗ്രന്ഥി (പിറാ"യൂയിററ റി ഗ്ലാൻഡ്—Pituitary gland) പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അന്തഃസ്രവണങ്ങളുടെ (ഹോർമോൺ—Hormone) ശക്തി ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അധോഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഓജഗ്രന്ഥിയിൽനിന്നുമുള്ള അന്തഃസ്രവണങ്ങളുടെ (Pituitary hormones) സമ്പർക്കം സ്ത്രീയുടെ അണ്ഡാശയത്തിൽ (Ovaries) ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രീബീജാണു (Ovum) പക്വമായിത്തീരുന്നതും, പുരുഷന്റെ വൃഷണങ്ങൾ (Testes) കണ്ടാകുമ്പോൾ അവയുടെ പുരുഷബീജങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നതുമാണ്.

ആത്മവകാലത്തോടടുത്തു് അണ്ഡാശയങ്ങളിലെ അണ്ഡസഞ്ചികൾ (ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ—(Graafian follicle) ഈസ്ട്രജൻ (Oestrogen) എന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു് ആത്മവങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ദിവസത്തെ പന്ത്രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി കണക്കിലെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ അണ്ഡസഞ്ചികൾ പൂർണ്ണതപ്രാപിക്കുകയും അവയിൽനിന്നു് മേല്പറഞ്ഞ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോൺ* ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഹോർമോൺ മൂലമാണു് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി രക്തസമ്പന്നമാകുന്നതും കട്ടിയുള്ളതായിത്തീരുന്നതും. ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ടു ദിവസങ്ങളുടെ അവസാനം അണ്ഡസഞ്ചി പൊട്ടി സ്ത്രീബീജാണു (ഓവം—Ovum) പുറത്തുവരുന്നു. പൊട്ടുന്ന അണ്ഡസഞ്ചി ഒരു പുതിയ പിണ്ഡം (കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം—Corpus luteum) മായിത്തീരുകയും, ഈ പുതിയ പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോർപ്പസ്

* ഹോർമോൺ—Hormone=ഒരു പ്രാണിയുടേയോ, സസ്യത്തിന്റെയോ ഗ്രന്ഥികളിൽനിന്നു സ്രവിക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ശാരീരികധർമ്മമോ (Physiological function) പ്രക്രിയയോ നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമായ രാസവസ്തു. ഇതിനു് ഓജോവിശേഷം, അന്തർഗ്രന്ഥീസ്രാവം എന്നൊക്കെ പറയാം.

ലൂട്ടിയം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹോർമോണിന് പ്രോജസ്റ്റേറോൺ (Progesteron) എന്നു പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ടു ദിവസക്കാലത്തു് പ്രോജസ്റ്റേറോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. സ്ട്രീബീജവും (Ovum), പുരുഷ ബീജവും (Sperm) തമ്മിൽ യോജിച്ച് ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംയുക്താണുത്തെ (ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം - Fertilized ovum) ഗർഭാശയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചുവളർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളാണു് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആയ പ്രോജസ്റ്റേറോൺ ഉളവാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്. എന്നാൽ മേൽവിവരിച്ചപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയപാടയിൽ പ്രോജസ്റ്റേറോൺ വരുത്തിയ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിത്തീരുന്നു. പൊട്ടിയ അണ്ഡസഞ്ചി (ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ) ഒരു പുതിയ പിണ്ഡമായി (കോപ്പ്സ് ലൂട്ടിയം) തീരുന്നുവെന്നു് പ്രസ്ഥാവിച്ചുവല്ലോ. ആ പിണ്ഡവും ആവശ്യമില്ലാത്തതായിത്തീരുന്നു. തന്മൂലം അതുടഞ്ഞുപോകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾപ്പാടയിലുള്ള അസംഖ്യം രക്തധമനികൾ പൊട്ടി, ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും രക്തം സ്രവിക്കപ്പെടുന്നതു്. ഇതിനെയാണു് ആത്തവം, തീണ്ടാരി, മാസമുറ എന്നെല്ലാം പറയുന്നതു്. മറിച്ച് ഗർഭം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ആത്തവത്തിനു് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിത്തീരുന്നുവെന്നും മേൽവിവരിച്ചതിൽനിന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ.

ഗർഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ മാസംതോറുമുണ്ടാകുന്ന മെൻസസ് (ആത്തവം) എന്ന സ്ത്രീസഹജമായ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി ഇങ്ങനെ പറയാം. സ്ത്രീ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി അവൾ പുരുഷനുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേപ്പെടുന്നപക്ഷം ഒരു ശിശുജനിക്കുന്നതിനു സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. സ്ത്രീപുരുഷസംയോഗ ഫലമായി ഒരു ശിശു ഉരുവായിത്തീരുന്നപക്ഷം അതിനെ സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിനു്

ആവശ്യമായ പല ഒരുക്കങ്ങളും പ്രകൃത്യാതന്നെ ഓരോ ചാരുമാസത്തിലും സ്രീയുടെ ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ചു ഗർഭാശയത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അനാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക ശരീരത്തിന്റെ സഹജവാസനയാണ്. അനാവശ്യമായിത്തീർന്ന ഗർഭാശയത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങളെയെല്ലാം പുറംതള്ളുന്നതിനെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മെൻസ്ട്രസ് എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു സ്രീ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തി മുതൽ ആത്മവസമാപ്തിവരെയുള്ള എല്ലാ ചാരുമാസങ്ങളിലും ഈ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

ആത്മവരക്തപ്രവാഹം സാധാരണയായി മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ദിവസത്തേയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. അപൂർവ്വമായി ചില സ്രീകളിൽ എട്ടുദിവസം വരെയും ഇതു കണ്ടുവരുന്നു. ഒരു ആത്മവവും മറ്റൊരു ആത്മവവും തമ്മിൽ 25 മുതൽ 33 വരെ ദിവസത്തെ ഇടയുണ്ടാകാറുണ്ട്. ആത്മവ ദിവസങ്ങളിൽ ശാരീരികപഥ്യാചരണം ആവശ്യമാകുന്നു. അതിയായ ആയാസം, മൈഥുനം (Sexual intercourse) വളരെ ചൂടുള്ളതോ, തണുത്തതോ ആയ പാനീയങ്ങൾ, ശീതജലസ്നാനം, മാനസികക്ഷോഭങ്ങൾ എന്നിവ വഴ്ജ്യങ്ങളാണ്.

ആത്മവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയൊന്നുംകൂടാതിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, പെട്ടെന്നു് ആദ്യമായി ആത്മവരക്തം കാണുന്നത് ഭയപ്പാടോടുകൂടിയാണ്. ലജ്ജയും, ഭയവും അവരെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മാതാവും മറ്റു് ബന്ധപ്പെട്ട സ്രീകളും പഠിച്ച മിഡ്വൈഫും ആത്മവം എന്നാൽ എന്താണെന്നും ആത്മവകാലങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചര്യകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പ്രായപൂർത്തിയായിവരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആത്മവദിവസങ്ങളിൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗം ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു് ദിവസവും രണ്ടു പ്രാവശ്യം മെകിലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ

ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും കൈ ചൂടുവെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ചു വൃത്തിയായി കഴുകണം. ആർത്തവദിവസങ്ങളിൽ കളിക്കാതിരിക്കുകയാണല്ലത്. കുരുമുളക്, കടക്, മസാല തുടങ്ങിയ രുക്ഷവസ്തുക്കൾ ആർത്തവദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മലശ്ശോധന ഇല്ലാതെ വരുന്നെങ്കിൽ ആഹാരക്രമീകരണം കൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. സാധിക്കാത്തപക്ഷം എനിമാവച്ച് ശോധനയുണ്ടാക്കണം. ആർത്തവദിവസങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധശക്തിക്ക് ഊനം തട്ടുന്നതാകയാൽ ഇക്കാലത്തു് രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ മറോതെങ്കിലും തരത്തിൽ രോഗാണുബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുകൂടാ. ആർത്തവദിവസങ്ങളിൽ മതിയായ കരുതലോടുകൂടി സാധാരണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അമിതമായി പഠിക്കുകയോ ഉറക്കമില്ലായ്മയോ ചെയ്യുകൂടാ.

ഏതു പ്രായത്തിലാണ് ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്. ശാരീരിക വളർച്ച ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു ഇതു് പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെടുകാണുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിൽ ആർത്തവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവരുന്നു.

ആർത്ഥസംബന്ധമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ താഴെപ്പേർക്കുന്നു.

ഉഷ്ണമേഖല

ആർത്ഥപ്രായം

ഇൻഡ്യാ	13-15
സിറിയ	10-14
ഇറാൻ	10-14
പലസ്തീൻ	10
ടർക്കി	10

ശീതമേഖല

ലാപ് ലാൻറു്	18
ഹ്രാൻസ്	16
ഡൻമാർക്ക്	16
ഇംഗ്ലണ്ട്	15
ജർമ്മനി	15
ജപ്പാൻ	14

ആർത്ഥസമാപ്തി (മെനോപ്പോസ്-MENOPAUSE)

നാല്പത്തഞ്ചു വയസ്സിനുമേൽ അമ്പതു വയസ്സിനടിസ്തുള്ള കാലത്തു് സ്ത്രീയുടെ ആർത്ഥം നിലയ്ക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഏകദേശം മൂപ്പത്തിഅഞ്ചു വർഷങ്ങളോളം മെൻസസ്സു് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആർത്ഥം നിലയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി സ്ത്രീയുടെ ഗർഭധാരണശേഷിയും ഇല്ലാതാകുന്നു. ആർത്ഥസമാപ്തിക്കാലത്തോടടുത്തു് ശാരീരികവും, മാനസികവുമായ ചില വ്യതിയാനങ്ങളും, അസ്വസ്ഥതകളും ഉടലെടുക്കാറുണ്ടു്. ആർത്ഥസമാപ്തിക്കു ശേഷം ഗർഭധാരണശേഷി നശിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾക്കു് കാര്യമായ തകരാറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല.

ഗർഭധാരണം


(പ്രഗ്നതൻസി-PREGNANCY)

സ്രീപുരുഷസംയോഗം (സുരതക്രിയ) ഗർഭധാരണ സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നപക്ഷം സ്രീശരീരം നിണ്ണായകങ്ങളായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്നു.

ഓരോ സുരതക്രിയാവേളയിലും പുരുഷലിംഗം ഭഗ്വാദാശയത്തിൽ വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 3-5 മില്ലി ലിറ്റർ ശുക്ലം വീതമാണ്. ശുക്ലം (സെമൻ-Semen) വെളുത്തത്, കൊഴുത്ത ഒരു ദ്രവവിശേഷമാകുന്നു. ഓരോ സംഭോഗാവസരത്തിലും വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷശുക്ലത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്നു കോടിയോളം പുരുഷബീജങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷശുക്ലത്തിൽ പുരുഷബീജങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടാകുമെങ്കിലും, സ്രീബീജാഭ്യം ഓരോ ചാന്ദ്രമാസത്തിലും ഒന്നു വീതമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ അഭ്യം വീതമേ പക്ഷമായി അഭ്യാശയത്തിൽനിന്നും പുറത്തുവന്ന് അഭ്യവരഹിനിക്കൽവഴി ഗർഭാശയത്തിലെത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷമായ ഒരു അഭ്യം ആന്തരവചക്രക്രമമനുസ

രിച്ച് ഓരോ മാസവും പുറത്തുവന്ന് അണ്ഡനാളം വഴി ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതും ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാസത്തോറും ആവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് അണ്ഡസക്തം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡനിഗ്തം മനം (ഓവുലേഷൻ-Ovulation) എന്നു പറയുന്നത്. അണ്ഡനിഗ്തം (ഓവുലേഷൻ) മിക്കവാറും ഒരാൽത്തവത്തിനും



Ovulation, the rupture of the ripe follicle in the ovary and the release of the ovum. (From M. E. Davis: Natural Child Spacing, published by Doubleday and Company.)

അണ്ഡാശയത്തിൽ പക്വമായ അണ്ഡസഞ്ചി പൊട്ടുകയും അണ്ഡസക്തം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിത്രം 7: അണ്ഡനിഗ്തം (OVULATION)

മരൊരാൽത്തവദർശനത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മദ്ധ്യഭിനത്തിലായിരിക്കും. അതായത് ഒന്നാംതീയതി ആൽത്തവമാരംഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഓവുലേഷൻ (അണ്ഡനിഗ്തം) പതിനാലാം തീയതി ആയിരിക്കുമെന്ന് സാരം. ഓരോ സ്ത്രീയുടേയും

ആത്മവചക്രമമനുസരിച്ച് മദ്ധ്യദിവസം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ. ഓവുലേഷനോടുള്ള നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സംഭോഗം നടത്തിയാലേ സ്ത്രീ ഗർഭംധരിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം, അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന പക്ഷമായ ഒരു സ്ത്രീബീജാണു് നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറിൽക്കൂടുതൽ പുരുഷബീജസംയോഗം കൂടാതെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പുരുഷബീജത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറിനുശേഷം അണ്ഡം മൃതിപ്പെടുപോകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഭോഗശയത്തിൽ വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷശുക്ലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുരുഷബീജങ്ങൾക്കും നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറിൽക്കൂടുതൽ ആയുസ്സില്ല. അതായത് ഒരു സുരതക്രിയയെത്തുടർന്നുള്ള നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുരുഷബീജത്തിനു് സ്ത്രീബീജത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും മൃതിപ്പെടുപോകുന്നു.

സന്താനോല്പാദനം സാധിക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ആത്മവചക്രകാലത്തിന്റെ മദ്ധ്യദിനത്തിനു് തൊട്ടടുത്ത് മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള മൂന്നു നാലുദിവസങ്ങളിൽ തുടച്ചയായി സുരതക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആത്മവദർശനദിവസം തൊട്ടു 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളായിരിക്കും സന്താനോല്പാദനത്തിനു് പാറിയ ദിവസങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലെ സംഭോഗം മൂലം ഗർഭധാരണം നടക്കാനിടയില്ല.

ജനനനിയന്ത്രണത്തിന്റേതായ ഈ യുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭർത്തൃമതികൾക്കും അറിയേണ്ടതു് സന്താനോല്പാദനദിവസങ്ങളല്ല; മറിച്ച് സുരക്ഷിതദിനങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്. അതിനാൽ സന്താനോല്പാദനദിനങ്ങളും സുരക്ഷിതദിനങ്ങളും ഏകദേശം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു് ഒരു മിഡ്‌വൈഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. സുരക്ഷിതദിനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സാമാന്യനിയമത്തിനു് അപവാദങ്ങളുണ്ടു്. ഇതൊന്നും നൂറു ശതമാനം ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.

ജനനവും ശരീരനിർമ്മിതിയും


കോശങ്ങൾ (സെൽസ്-CELLS)

ഗർഭധാരണം, ഭ്രൂണവളച്ച്, അതിന്റെ ശരീര നിർമ്മിതി എന്നീ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യ ശരീരനിർമ്മിതിക്ക് ആധാരമായിത്തീർന്ന അടിസ്ഥാനഘടകമായ കോശങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റും സാമാന്യജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

അനേകകോടി കോശങ്ങൾ (Cells) കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കല്ലും, മരവും, കമ്പിയും, സിമന്റും മറ്റും യഥാക്രമം സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പ്ലോനാമൊരു വീടു പണിയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെയാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കോശങ്ങളാകുന്ന അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളുപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കയ്യും, കാലും, കണ്ണും, മൂക്കും, നഖവും, രോമവും, ഹൃദയവും, ശ്വാസകോശങ്ങളും, കരളും, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും, എന്നുവേണ്ടാ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും വൈവിധ്യമാർന്നതാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം കോശങ്ങൾകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു സാരം.

നിയന്ത്രമായ ഘടനാവിശേഷത്തോടുകൂടിയ എല്ലാ ജൈവകോശത്തെയും (Living cells) ആവരണംചെയ്യു


കൊണ്ട് ഒരു തന്തുരമുണ്ട്. കോശത്തിന്റെ ഈ ബാഹ്യവരണികൾ സെൽ മെംബ്രെയിൻ (Cell membrane) എന്നു പറയും.



ചിത്രം 8

ഇതിനുള്ളിൽ അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവുണ്ട്. ഈ ദ്രവവസ്തുവിനെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം (Protoplasm) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ഗ്രീക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആഭ്യമുണ്ടായത് എന്നാണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലാണ് കോശത്തിലെ ജീവധർമ്മപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് കോശമദ്ധ്യത്തിൽ ഗോളാകൃതി

യിൽ കാണുന്ന കോശമണ്ഡലം (ന്യൂക്ലിയസ്സ് - Nucleus) ആണ് കോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം. കോശമണ്ഡലത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരിയൊരാവരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന് മെമ്പ്രേൻ എന്നു പറയുന്നു. ന്യൂക്ലിയസ്സിന് ഉള്ളിലുള്ള ദ്രവം അതായത് മെമ്പ്രേൻ, വളരെ നേർത്തതായതും വളഞ്ഞ് പല ആകൃതിയിലുള്ളതായതുമായ ഒട്ടനവധി ചെറുചരടുകൾ കോശത്തിനുള്ളിലായി വലക്കണ്ണികൾ പോലെയാണിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോശം വിഭജിച്ചാണ് (Binary fission) മറ്റൊരു കോശമുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കോശവിഭജനം മൂലമാണ് കോശവർദ്ധനവും ശരീരനിർമ്മിതിയും സാധിക്കുന്നത്. കോശങ്ങൾക്കു വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ മെമ്പ്രേൻ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും മുൻപറഞ്ഞ ചെറുചരടുകൾ വേർപിരിഞ്ഞുകാണുകയും ചെയ്യും. ശരീരകോശങ്ങളും അവയിലെ ചെറുചരടുകളും മറ്റും കാണണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകതരം ചായം പകർന്നിറം കൊടുക്കുകയും വളരെ ശക്തിയേറിയ ഭൂതക്കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയും വേണം. കോശമണ്ഡലത്തിലുള്ള പ്രസ്തുത ചരടുകൾക്ക് കൂടുതൽ നിറം ആഗിരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരടുകളെ ക്രോമോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതത്തക്കം എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നത്. ക്രോമോസോംസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിറംപിടിപ്പിച്ച ചരടുകൾ എന്നാകുന്നു.



പിതൃ. 9: വസ്തുതയ്ക്കൽ (CHROMOSOMES)


സൂര്യപുഷ്പ ബീജങ്ങളൊഴിച്ചുള്ള ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും 46 ക്രോമോസോമുകൾ അഥവാ വസ്തുതയ്ക്കൽ വീതമുണ്ട്. മനുഷ്യനെന്നപോലെതന്നെ ഓരോ ഇനം ജന്തുക്കൾക്കും ചെടികൾക്കുമെല്ലാം കൃത്യമായ വസ്തുതയ്ക്കലുകളുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കു ഓരോ അവയവത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനധർമ്മസമ്പന്നത്വം ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വൈജാത്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങളിലേയും വസ്തുതയ്ക്കൽ പ്രഥമകോശത്തിലുള്ളതിന്റെ തനിപ്പകർപ്പായിരിക്കും. അതിസങ്കീർണ്ണമായ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളേയും, ആന്തരികപ്രവണതകളേയും നിയന്ത്രിച്ചു ഭരിക്കുന്ന ശിഥിലശാലകളാണ് വസ്തുതയ്ക്കൽ. ഒരു

വന്റെ ആകാരം, സ്വഭാവം തുടങ്ങി ഒരു പൂർണ്ണമനുഷ്യനെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ശിശുവിനുള്ള ഈ വർണ്ണതന്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മെ അപ്പാടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല്പത്താറു വർണ്ണതന്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെയാണ് ജീൻസ് (Genes) എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഓരോ വർണ്ണതന്തുവിലും ശരാശരി ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റിനുമേൽ ജീൻസ് വീതമുണ്ടെന്നും കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഓരോ കോശത്തിലും 46 വർണ്ണതന്തുക്കൾ വീതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ 46-ൽ 23 എണ്ണം അച്ഛന്റെ സംഭാവനയും 23 എണ്ണം അമ്മയുടെ സംഭാവനയുമാണ്. മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഥമികവും, പരമപ്രധാനവുമായ സംഭാവന, പാരമ്പര്യവാഹികളായ ജീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ വർണ്ണതന്തുക്കളാണ്.

പിതാവിന്റെ ഒരു ബീജവും (Sperm) മാതാവിന്റെ ഒരു ഓവുവും (ഓവം—Ovum) തമ്മിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യശിശു രൂപംകൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യസൃഷ്ടിക്കാധാരമായിത്തീർന്ന പുരുഷബീജം നഗ്നനായനങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല. ഇതിന് തല, ഉടൽ, വാൽ എന്നീ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം.

പുരുഷബീജം




ചിത്രം 10: പുരുഷബീജങ്ങൾ (SPERMATOZON)


പുരുഷബീജത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചു മൈക്രോൺ, ഉടലിന് ആറു മൈക്രോൺ വാലിന് 50 മൈക്രോൺ വീതം നീളമുണ്ട്. ഒരു മൈക്രോൺ എന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ആയിരത്തിലൊരംശമാണ്. പുരുഷബീജത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി ഏതാണ്ടൊരുപം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരുദാഹരണം പറയാം. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള 350 കോടി മനുഷ്യരുടേയും സൃഷ്ടിക്കു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള അത്രയും പുരുഷബീജങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തുവെച്ചാൽ പോലും ഒരു ആസ്പിരിൻ ഗുളികയുടെ അത്ര വലിപ്പമേകാണുകയുള്ളൂ. ഇത്ര ചെറുതായ പുരുഷബീജത്തിന് സ്ത്രീബീജാണുത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്നമൗലിക ധർമ്മം നിറവേറ്റപ്പെടണമെങ്കിൽ കടുത്ത മത്സരത്തെ അതിജീവിക്കുകയും അതിസാഹസികമായ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുകയും വേണം. പുരുഷബീജങ്ങളുടെ ഭോഗശയമാഗ്നേയുള്ള സഞ്ചാരദൂരം ഏകദേശം 16 സെന്റിമീറ്ററാണ്. പുരുഷബീജത്തിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ ശരീരഘടനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യോനീമാഗ്നേയുള്ള ഈ ദൂരം ഏകദേശം 800 കിലോ മീറ്ററിനു തുല്യമാണ്.

സ്രീബീജാണാം പുരുഷബീജത്തേക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് വലുതാണെങ്കിലും നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്കിതും ഗോചര മല്ല. സ്രീയുടെ ആത്മവചക്രമമനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരണ്യാശയത്തിൽനിന്നും പക്ഷമായ ഒരണ്യം പുറത്തുവന്ന് അണ്യവാഹിനിക്കഴലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

സ്രീബീജാണാം




ചിത്രം 11: ബീജാണാം (OVUM)



Fertilization. The ovum and spermatozoon meet in the fallopian tube and conception occurs. (From M. E. Davis: Natural Child Spacing, published by Doubleday and Company.)

അണ്ഡവാഹിനികഴലിൽവെച്ച് സ്ത്രീപുരുഷ ബീജങ്ങൾ സംയോജിക്കുകയും ഗർഭധാരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിത്രം 12: സ്ത്രീപുരുഷ ബീജാണുസംയോഗം
(FERTILIZATION)



ഗർഭധാരണത്തിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ഏട്ടാമത്തെ ദിവസത്തോടുകൂടി സംയുക്താബ്ധം ഗർഭാശയ Endometrium, ത്തിൽ സ്വയംബന്ധിക്കുകയും അവിടെക്കിടന്നുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ വളരാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിത്രം 13: ഗർഭസ്ഥിരീകരണം—പ്രതിഷ്ഠാപനം
(IMPLANTATION)

അണ്ഡത്തിന്റെ മർദ്ദത്തിൽ അമ്മ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം അതിലെ 23 വണ്ണത്തുള്ളിലെ ജീനുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യതകൃത്യാവേളയിൽ സ്രീയോനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലത്തിലെ പുരുഷബീജാണുക്കൾ നീന്തിച്ചുപിച്ച് അണ്ഡവാഹിനിക്കഴലിൽ വെച്ച് സ്രീബീജാണുത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്രീബീജാണു സംയോഗം (Fertiligation) നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നാം ഉരുവായിത്തീരുന്നു; മാതാവ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. പുരുഷബീജവും സ്രീബീജാണുവും സംയോജിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ബീജത്തിന്റേയും അണ്ഡത്തിന്റേയും മർദ്ദസ്തരങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും അച്ചന്റേയും അമ്മയുടേയും സംഭാവനകളുടെ—പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മടിശ്ശീല തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്മയുടെ 23 ഉം അച്ചന്റെ 23 ഉം വണ്ണത്തുള്ള കൂടിച്ചേർന്ന് 46 വണ്ണത്തുള്ള ഒരു കോശം രൂപംകൊള്ളുന്നു. ഈ കോശം വിഭജിച്ചു വിഭജിച്ചു പുതിയ പുതിയ കോശങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഓരോ പുതിയ കോശത്തിലും പുരുഷബീജത്തിലെ 23 ഉം അണ്ഡത്തിലെ 23 ഉം കൂടിച്ചേർന്നുള്ള വണ്ണത്തുള്ളതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ ?

ഓരോ കോശത്തിലുമുള്ള 46 വണ്ണത്തുള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം മറ്റുള്ളവയിൽനിന്നും ആകൃതിയിലും, പ്രകൃതിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഈ രണ്ടു വണ്ണത്തുള്ളിയാണ് ലിംഗഭേദം നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയാമകഘടകം. പുരുഷനിലെ ലിംഗനിർണ്ണായകവണ്ണത്തുള്ളി സദൃശ്യങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയെ x എന്നും y എന്നും രണ്ടക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ സ്ത്രീയിലെ ലിംഗനിർണ്ണായകവണ്ണത്തുള്ളി സദൃശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെ xx എന്നും രേഖപ്പെടുത്താം. ഇതിൽനിന്നും പുരുഷനിലെ ഒരു ലിംഗനിർണ്ണായക വണ്ണത്തുള്ളി സ്ത്രീയിലെ ലിംഗനിർണ്ണായക വണ്ണത്തുള്ളികളോട് തുല്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. പുരുഷനിലെ y വണ്ണത്തുള്ളി ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്ത്രീപുരുഷ ബീജാണുക്കളുടെ ഉല്പാദനം നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ കാണുന്ന 46 വണ്ണത്തുള്ളി വിഭജിക്കുകയും, വിവിധ രീതിയിൽ സങ്കലനം നടന്ന് 23 വീതം ഓരോ അണുക്കളിലും, ഓരോ ബീജത്തിലും പ്രവേശിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ത്രീയുടെ xx വണ്ണത്തുള്ളികളും വിഭജിക്കപ്പെട്ട് ഓരോ അണുക്കളിലും ഓരോ വണ്ണത്തുള്ളി വീതം പ്രവേശിക്കുന്നു. പുരുഷനിൽ ബീജോല്പാദനം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ xy വണ്ണത്തുള്ളി വിഭജിച്ച് പകുതി ബീജങ്ങളിൽ x വണ്ണത്തുള്ളികളും, പകുതി ബീജങ്ങളിൽ y വണ്ണത്തുള്ളികളും പ്രവേശിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഓരോ ഇനം അതായത് x വണ്ണത്തുള്ളി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അണുക്കൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുരുഷനിൽ y വണ്ണത്തുള്ളികളും x വണ്ണത്തുള്ളികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടിനം പുരുഷബീജങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു x വണ്ണ


THE MIRACLE OF REPRODUCTION




Each mature egg possesses an X chromosome.



Half of all sperm cells possess an X chromosome; half possess a Y chromosome.




After fertilization of the egg by a sperm cell having an X chromosome, the zygote will possess two X chromosomes and the child will be a girl.



After fertilization of the egg by a sperm cell having a Y chromosome, the zygote will possess one X and one Y chromosome and the child will be a boy.

A diagrammatic illustration of how 'sex' is determined (Courtesy of Edith L. Potter, Fundamentals of Human Reproduction.)

തത്തു വഹിക്കുന്ന പുരുഷബീജവും ഒരണ്ഡവുമായി ചേരുമ്പോൾ കുട്ടി എന്തായിരിക്കും? പെൺകുട്ടി. ഒരു y വണ്ണ തത്തുവൾക്കുള്ളുന്ന ബീജവും അണ്ഡവുമായി ചേരുമ്പോഴോ? കുട്ടി ആണായിരിക്കും. xx സ്ത്രീയും xy പുരുഷനും ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ.




xx പെൺകുട്ടി xy ആൺകുട്ടി

ചിത്രം 15: ലിംഗഭേദനിർണ്ണയം.

പതിനാറുകാരന്റെ ബീജവും എൺപതുകാരന്റെ ബീജവും ഒരുപോലെ സന്താനോല്പാദനശേഷിയുള്ളതാണ്. പുരുഷനിൽ പ്രായപൂർത്തിയായാലേ ബീജോല്പാദനം വൃഷണങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അവളുടെ അണ്ഡകോശങ്ങളിൽ അഞ്ചുലക്ഷത്തോളം സ്രീബീജാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിടക്കോഴിയുടെ വയറിൽ കാണുന്ന കുരുനുമട്ടുകൾ പോലെ. പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ അണ്ഡം പക്വമായി പുറത്തുവരുന്നുള്ളൂ എന്നു മാത്രം. ഒരു സ്രീ 250 മുതൽ 400 വരെ അണ്ഡം അവളുടെ ജീവിതകാലത്തു് ഇടുന്നുണ്ടെന്നു് വേണമെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായി പറയാം.

ഭ്രൂണവളർച്ച (DEVELOPMENT OF THE EMBRYO)




ചിത്രം 16: ഭ്രൂണവളർച്ച (DEVELOPMENT OF THE EMBRYO)

1. മണിതത് (ആമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ്)-Amniotic fluid)
- 2, മണിർക്കടന്തോലിന്റെ ഉരചർമ്മം (ആമ്നിയോൺ-Amnion)
- 3, മണിർക്കടന്തോലിന്റെ ബാഹ്യചർമ്മം-ഗർഭകോശം (കോറിയോൺ-Chorion)
- 4, 5, ഭ്രൂണം (എംബ്രിയോ-Embryo)
- 6, 7, പൊക്കിയക്കൊടിയിൽ രൂപംപ്രാപിക്കേണ്ട രക്തവാഹികൾ (Future blood vessels of the umbilical cord)
- 8, രൂപപ്പെട്ടുവരുന്ന പൊക്കിയക്കൊടി (Umbilical cord being formed)

സ്രീപുരുഷ ബീജാണുസംയോഗം (Fertilization) നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുരുഷബീജത്തിനും സ്രീബീജത്തിനും ആസ്ഥിയില്ല. സാധാരണയായി ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴലിൽ വെച്ചായിരിക്കും. സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ സന്തതൃല്ലാദക സെല്ലുകൾ (സ്രീബീജാണുവും പുരുഷബീജവും) തമ്മിൽ ചേർന്ന് സംയുക്താണുസമായിത്തീരുന്ന അതേ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ കോശവർദ്ധന ആരംഭിക്കുന്നു. കോശവിഭജനം നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴലിൽക്കൂടി സംയുക്താണുസം സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു നാലു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെ അതുതജനകമായ ഒരു പരിണാമം ഭൂണത്തിന് (Embryo) സംഭവിച്ചിരിക്കും.

മനുഷ്യശിശുവിന്റെ അവയവഘടനാസംവിധാനം ദികൾക്ക് രൂപംകൊടുക്കുന്ന രണ്ടിനം കോശങ്ങൾ രൂപംകൊള്ളുന്നു. ഈ കോശങ്ങളിൽ ഒന്ന് പുറമേയുള്ളതും പരന്നതും അതിവേഗത്തിൽ വിഭജനംനടന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നതും, മറ്റൊന്ന് അകമേയുള്ളതും തടിച്ചുരുണ്ടതും സാവധാനത്തിൽ വിഭജനംനടക്കുന്നതുമാണ്. ഒരാഴ്ചയാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇതിന് ഒരു മൊട്ടുസൂചിയുടെ മൊട്ടിനോളം വലിപ്പംവെച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഗർഭബീന്ദു ഗർഭാശയദ്രാവകത്തിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ചാരുമാസത്തിലും ഗർഭാശയത്തിലെ അതിമുദുലങ്ങളായ പേശികൾ രക്തധമനികളാൽ ആവരണംചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവ പട്ടുപോലെ മാർദ്ദവമുള്ളതും ഘനമുള്ളതുമായിത്തീരുന്നു. ഏഴാംദിവസമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഗർഭാശയദ്രാവകത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗർഭബീന്ദു ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം വളരുന്ന ബഹുശതം കോശസമാനങ്ങളായ മുദുലോമങ്ങളെ (Villi) മുളപ്പിക്കുന്നു. ചെടികളുടെ നാരുവരകൾപോലെയുള്ള ഈ മുദുലോമങ്ങൾവഴിയായി ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലുള്ള രക്താശയ



ചിത്രം 17: ഭ്രൂണവളവ്

1. കോശവർദ്ധന—ആദ്യമാസത്തിൽത്തന്നെ ഇതിന് പതിനായിരം ഇരട്ടിയായി തുക വർദ്ധിക്കുന്നു.
2. അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച—ഭ്രൂണത്തിന് ഇപ്പോൾ $\frac{1}{4}$ ഇഞ്ച് നീളവും തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, കരൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ അങ്കുരങ്ങളുണ്ട്.
3. ഒൻപതാമത്തെ ആഴ്ച—ആന്തര ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ വളരാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന് ഇപ്പോൾ ചലിക്കാനുള്ള

വിള്ളലുകളിൽനിന്നും പ്രാണവായു, അന്നാംശം, ധാതുലവണങ്ങൾ, കൊഴുപ്പുകൾ, മാംസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വലിച്ചെടുത്ത് അതിവേഗം വളർന്നുതുടങ്ങുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഗർഭിണി അറിയുന്നില്ല. മൂന്ന് ആഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയാതെ താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു സ്ത്രീക്കും കഴിയുകയില്ല. എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഗർഭലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഈ സമയത്തുണ്ടായിരിക്കുകയില്ലെന്നതും.

ആദ്യത്തെ കോശവിഭജനഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടിനം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതിൽ അകമേയുള്ള ഉരുണ്ട സെൽസമൂഹം പ്രത്യേകമായി പിരിയുകയും അവ പരസ്പരം പ്രവർത്തിച്ച് പുതുതായി ഒരടുക്കു സെല്ലുകളുടെ സൃഷ്ടിക്കു് കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ആകെക്കൂടി മൂന്നടുക്കു് സെല്ലുകൾ ഉള്ളതും സൂക്ഷ്മരസ്രൂപൂരിതവുമായ ഒരു വൃത്തപാളി (Disc) രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അടുത്ത രൂപാന്തരപരിണാമങ്ങൾക്കുള്ള കളമൊരുക്കലുകൾ ഇതോടെ നടന്നുകഴിഞ്ഞു.

മനുഷ്യശിശുവിന്റെ രൂപസംവിധാനഭംഗികൾക്കു് ആധാരമായിത്തീരേണ്ട പ്രത്യേകതരം ധാതുക്കളുടെ ഉത്ഭവ

കഴിവും മനുഷ്യശിശുവിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളും ഏറെക്കുറെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

4. പതിമൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച—ശ്വാസനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഹൃദയനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കരൾ, വൃക്കകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തനസന്നദ്ധമാകുന്നു.
5. ഇരുപത്തിആറാമത്തെ ആഴ്ച—മുടിയും, നഖങ്ങളും വളരാനാരംഭിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ തുറക്കാനും കഴിയും. ഈ പ്രായത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോഴാൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ്.
6. പൂർണ്ണവളർച്ച—ഏതാണ്ടു് മൂന്നു കിലോഗ്രാം തൂക്കവും 48 സെ, മീറ്റർ നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തല കീഴോട്ടാക്കി പിറവിയുംകാത്തു കഴിയുന്നു.

ത്തിന് മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നടക്കം സെല്ലുകളിൽ ഓരോത്തടക്കം ആസൂത്രിതവൈദ്യധൃത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നാഡീ വ്യൂഹം, മുടി, പല്ലുകളുടെ ഇനാമൽ, മൂക്കിലേയും തൊണ്ടയിലേയും മറ്റും ശ്ലേഷ്മാചർമ്മം, തൊടക്കം എന്നിവയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ഒന്നാമത്തെത്തടക്കം സെൽസമൂഹവും, രക്തം, രക്തധമനികൾ, വൃക്കകൾ, പല്ലുകൾ, അസ്ഥികൾ, മുട്ടലാസ്ഥികൾ, മാംസപേശികൾ എന്നിവയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ തടക്കം കോശങ്ങളും, ശ്വാസനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥ, ദഹനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉല്പത്തിക്ക് മൂന്നാമത്തെ തടക്കം സെല്ലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏകദേശം 20 ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഭ്രൂണമാകുന്ന ഡിസ്കിന്റെ നടു കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വക്കുകളോടുകൂടിയ ഒരു ചാലുപോലെയായിത്തീരുന്നു. വക്കുകൾ ഒരുഭാഗത്തു തമ്മിൽ ചേർന്ന് സംജാതമാകുവാൻപോകുന്ന ശിശുവിന്റെ തലയായിത്തീരുന്നു. ഡിസ്കിന്റെ വക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ ഒരു കഴൽ രൂപംപ്രാപിക്കുന്നു. ചന്ദ്രക്കലപോലെയായിത്തീർന്ന ഡിസ്കിന്റെ വളഞ്ഞ ബാഹ്യഭാഗം ശിശുവിന്റെ പുറം (Back) ആയിത്തീരും. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തലയുടെ ഭാഗത്തു തലച്ചോർ ഉത്ഭവിച്ചുതുടങ്ങുന്നതും, പുറത്തു നട്ടെല്ലിന്റെ സൂചനയും, കൈകാലുകളുടെ സ്ഥാനത്തു അവയുടെ അങ്കുരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിമഹത്തായ 21-ാംദിവസം മുലികമായ ഹൃദയാങ്കുരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും 31-ാംദിവസത്തോടുകൂടി ജീവന്റെ സ്പന്ദനം-ഹൃദയസ്പന്ദനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമാസത്തിൽതന്നെ ഭ്രൂണത്തിന് പതിനായിരം ഇരട്ടിയായി തൂക്കം വർദ്ധിക്കുകയും അതൊരു സഞ്ചികളുള്ളിലായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭ്രൂണത്തെ ആവരണംചെയ്തിരിക്കുന്ന സഞ്ചിയുമായി കോശനിർമ്മിതമായ ഒരു വള്ളികൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. 50-55 സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നീളമുള്ളതും മങ്ങിയ വെള്ളനിറത്തോടുകൂടിയതുമായ ഈ വള്ളികൊണ്ട് പൊക്കിറുകൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിറുവള്ളി (അംബ്ലിക്കൽ കോർഡ്—Aumbilical cord) എന്നു പറയുന്നത്. അർദ്ധചന്ദ്രാകൃതി

യിലുള്ള ഭൂണത്തെ ടിഷ്യൂനിമിതമായ രണ്ടു ആവരണികകൊണ്ടു വീണ്ടും പൊതിയുകയും അതിനെ അതിമുദലമായ ഗർഭാശയപേശികൾക്കുള്ളിൽ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആവരണികയ്ക്കുള്ളിലെ കോശങ്ങളിൽ ജലസമാനമായ ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ബാഹ്യമായ ആഘാതങ്ങളൊന്നുംതന്നെ അതിനേല്ക്കാറില്ല.

രണ്ടാംമാസാവസാനമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഭൂണത്തിനു നാലു സെന്റിമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും മൂക്കു്, വായു്, കണ്ണുകൾ, കണ്ണുങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അങ്കുരങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതുമാണു്.

മൂന്നാംമാസാവസാനത്തോടുകൂടി ഇതിന്റെ നീളം ഒൻപതു സെന്റിമീറ്ററായി വർദ്ധിക്കുന്നതും ഏകദേശം 30 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണു്. അടഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കണ്ണുകളും കൺപോളകളും രൂപംപ്രാപിക്കുകയുംചെയ്തതുടങ്ങുന്നു. മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്പം ദ്രവസമാനമായ സാധനത്തിൽനിന്നും അത്യന്ത സങ്കീർണ്ണമായ മനുഷ്യരൂപം കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നു പറയാം. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭൂണത്തിനു അംഗങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഈ ചലനം മാതാവറിയുന്നില്ല. മൂന്നുമാസം പ്രായമാകുന്നതുവരെ ഗർഭപിണ്ഡത്തെ ഭൂണം (Embryo) എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണു് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതു്. 3-ാംമാസത്തിനു ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഗർഭസ്ഥശിശു എന്നതുമുള്ള ഫീറ്റസ് (Foetus) എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ഭൂണത്തിന്റെ രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയും നാഡീ വ്യൂഹവുമൊക്കെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമാണു്. ഭൂണത്തിനു് മാതൃശരീരവുമായുള്ള ഏക ബന്ധം പൊക്കിൾവളളിമുല മുളളതു് മാത്രമാകുന്നു. മാതൃരക്തവും ഭൂണരക്തവും തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്നില്ല. ഇവ സാധനകൈമാറ്റം നടത്തുന്നതു് മറുകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറുപിള്ള അഥവാ മാച്ചു് (Placenta) എന്നു പേരുള്ള പുതിയ ഒരു അവയവംവഴിയാകുന്നു. ഭൂണവളളിയുടെ സുസ്ഥിതിക്കും സുരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്കും ആവശ്യമായ ആഹാരം, ജലം, പ്രാണവായു

മുതലായവ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രകൃതി പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണാത്മകപാധിയാണ് മറുപിള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറുക്ടി (പ്ലാസൻറാ-Placenta). പ്ലാസൻറാ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരന്നുകേൾക്കു എന്നാണ്. രക്തധമനികളെക്കൊണ്ടു് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു താല്പാലികഏപ്പാടാണ് മറുക്ടി. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വളച്ചുരുങ്ങാവശ്യമായ എല്ലാം മാതൃരക്തത്തിൽനിന്നും സംഭരിച്ചു് അതിനുവേണ്ടി ഭവനക്രിയയും, ശ്വാസനക്രിയയും തുടങ്ങി മരണവധി എണ്ണമറ്റ സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പിറവിയോടുകൂടി സ്വയം ബഹിഷ്കൃതമാവുകയാണ് മറുക്ടിയും പൊക്കിടവള്ളിയും. 4-ാം മാസാവസാനത്തോടുകൂടി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ചലനങ്ങൾ മാതാവിനു് അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനാണു്. അപ്പോഴേക്കും 16 സെന്റിമീറ്ററോളം ഇതിനു് നീളവുമുണ്ടായിരിക്കും.


5 മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കണ്ണികളും, പുകകൊടികളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നീളം 25 സെന്റിമീറ്ററും തൂക്കം 180 ഗ്രാമമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രായത്തിൽ ഹൃദയം മിനിറ്റിൽ 136 പ്രാവശ്യം സ്പന്ദിക്കുന്നതും അതു് ഹീറ്ററൽ സ്റ്റേതോസ്കോപ്പുവഴി ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമാണു്.

6-ാം മാസാവസാനത്തോടുകൂടി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തൂക്കം ഏകദേശം ഒരു കിലോഗ്രാമും നീളം 30 സെന്റിമീറ്ററുമായിരിക്കും. ഇതിനു് ഈ പ്രായത്തിൽ മുഖം ചലിപ്പിക്കുവാനും തൂങ്ങുവാനുമൊക്കെ കഴിയുന്നതുമാണു്.

7-ാം മാസാവസാനത്തോടുകൂടി ശിശുവിന്റെ തൂക്കം ഏതാണ്ടു് ഒന്നര കിലോഗ്രാമും നീളം 35 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും. കൺപോളകൾ തുറക്കുന്നതും ഈ സമയത്താണു്. ഏഴാം മാസത്തിൽ പ്രസവം നടന്നാലും മതിയായ വൈദ്യസംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നപക്ഷം കുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നെന്നു് കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശക്തിപ്രകടനഘട്ടമെന്നു് തോന്നുമാറു് അതു പുളയുകയും, നിവരുകയും കൈകാലുകളും തലയുമെല്ലാം ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവയവങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും

പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും സ്തന്യപാനചേഷ്ടകൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില ഗർഭസ്ഥശിശുക്കൾ വിരൽ കടിക്കാറുണ്ട്.

8-ാം മാസാവസാനത്തോടുകൂടി കൈവിരലുകളിലെ നഖങ്ങൾ വിരലിന്റെ അഗ്രംവരെ വളർന്നിരിക്കുന്നതാണ്.



ചിത്രം 18: പൂർണ്ണവളർച്ച എത്തിയ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ സ്ഥിതി.

1. ഡെസിഡുവാ (Decidua)
2. കോറിയോൺ (Chorion)
3. ആംനിയോൺ (Amnion)
4. ഗർഭസ്ഥശിശു (ഫീറ്റസ്)-Foetus)
5. മൂന്നീരം (Amniotic Fluid)
6. പൂക്കിരക്കൊടി (Umbilical Cord)
7. മറുപിള്ള (Placenta)
8. ഗർഭാശയഭിത്തി (Uterine Wall)

9-ാം മാസാവസാനത്തോടുകൂടി ഗർഭസ്ഥശിശു പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു. 252 ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്ന അവസരത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോഴാലും യാതൊരുപക്ഷവും ശിശുവിന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഈയവസരത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്നര കിലോഗ്രാം തൂക്കവും 45 സെന്റീമീറ്റർ നീളവും അതിനുണ്ടായിരിക്കും.

10-ാം മാസത്തിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് 50 സെന്റീമീറ്റർ നീളവും, രണ്ടര മുതൽ നാലു കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കവുമുണ്ടായിരിക്കും.

ഈയവസരത്തിൽ കാലുകൾ ഉദരഭാഗത്തേയ്ക്കും കൈകൾ മാറിടത്തിലേയ്ക്കും മടക്കി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലംമാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിലെന്നപോലെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്നു.


പൂർണ്ണവളർച്ച എത്തിയ ശിശുക്കളുടെ തൂക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണുക സാധാരണമാണ്. 5 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ശിശുക്കളേയും പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. മാസംതികഞ്ഞു പ്രസവിക്കുന്ന ശിശുവിന് $2\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാമിൽ കുറവാണ് തൂക്കമെങ്കിൽ അതിന് ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ച് മതിയായ പോഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കൾ ജീവിക്കുക വിരളമാണ്. എന്നാൽ പ്രസവത്തിൽ ഇരട്ട ശിശുക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ തൂക്കക്കുറവ് ദോഷകരമല്ല. 25-നും 35-നുമിടയ്ക്കുള്ള പ്രായത്തിൽ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾക്കാണ് തൂക്കക്കുടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. വളരെ പ്രായംകുറഞ്ഞ മാതാക്കൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നേ ചെറുതായിരിക്കും. സാധാരണയായി ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ തൂക്കക്കുടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക.

ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ

1. അനാത്തവം (അമനോറിയ-AMENORRHOEA).
പുരുഷസമ്പർക്കമുണ്ടാകുകയും പ്രതിമാസമുണ്ടാകാറുള്ള ആ
ത്തവം നിന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗർഭലക്ഷണങ്ങളെ
ളിൽ ആദ്യത്തേതായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എ
ന്നാൽ ക്ഷയം, പിത്തം, ആന്തപക്വമക്കേടുകൾ എന്നീ
രോഗബാധയുള്ളവരിൽ മാസമുറ ഇല്ലാതിരിക്കാവുന്ന
താണ്. മെൻസസ് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനു
മുമ്പും, ഒരു പ്രസവത്തിനുശേഷം ആന്തവമില്ലാതിരിക്കു
ന്ന കാലയളവിലും ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടുള്ളതായി ധാ
രാളം തെളിവുകളുണ്ട്. ചില സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളാ
യിരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് മാസമുറയുണ്ടാകാറുണ്ട്. മിക്ക
വാറും അത് ഗർഭമലസിപ്പോകുവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാ
യിരിക്കും.

2. സ്പന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ:- ഗർഭം
ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ മുല
കൾ വലുതാവുകയും അവയിലുള്ള രക്തസിരകൾ തടിച്ചു
വരികയും ചെയ്യും. മുലക്കണ്ണുകളും വലുതായി വരുന്നതും

അവയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പനിറം (Primary Arcola) അധികരിച്ചുവരുന്നതുമാണ്. മുലക്കണ്ണുകളുടെ ചുറ്റും തരിതരിയായി പൊന്തി (മോണ്ടഗോമറീസ്സ് ഫോളിക്കിൾ—Montgomery's Follicles) വരുന്നതുമാണ്. മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ മുലകൾ പിഴിഞ്ഞുനോക്കുന്നപക്ഷം ഒരുതരം ദ്രാവകം പുറപ്പെടുന്നതായിക്കാണാം. അഞ്ചാംമാസത്തോടുകൂടി മുലക്കണ്ണുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പിന്റെ പറ്റത്തു വളരെ ചെറിയതും ഉണ്ടെന്നുമായ ഒരുതരം പൊട്ടുകൾ (Secondary Arcola) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണ്.




ചിത്രം 19: ഗർഭകാലത്തു സ്തനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം.

3. ഗർഭകാലമർദ്ദി (മോർണിംഗ് സിക്ക്നസ്സ്—MORNING SICKNESS):— ഗർഭലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ മർദ്ദി സാധാരണയായി രാവിലെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യമായി ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ മർദ്ദി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഗർഭധാരണം നടന്നതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ ആഴ്ചയിലാണ് മർദ്ദി ആരംഭിക്കാറുള്ളത്. 16-ാമത്തെ ആഴ്ചയോടുകൂടി മിക്കവാറും ഈ മർദ്ദി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാവിലെയും, വൈകിട്ടും മർദ്ദിക്കുന്നവരും ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ മണം ഏറ്ററാൽ മർദ്ദിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല.

4. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ചലനം (ഫീറ്റൽ മൂവ് മെന്റ്—FOETAL MOVEMENT):— സാധാരണയായി നാലര, അഞ്ചുമാസമകുന്നതോടുകൂടി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ചലനം അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനാണു്. പ്രഥമഗർഭിണികൾക്കു് ഈ ചലനം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും.

5. വയറു വലുതായി വരിക (ENLARGEMENT OF THE ABDOMAN):— ഗർഭാശയം വലുതാകുന്നതോടുകൂടി ക്രമേണ വയറും വലുതായിവരുന്നു. ഗർഭിണിയുടെ വയററത്തു് കൈവച്ചുനോക്കിയാൽ വലുതായിത്തീന്ന ഗർഭാശയം സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണു്. വയറു വലുതാകുന്നതോടുകൂടി വയററത്തും, തുടകളിലും, മുലകളിലും ചില പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. 3.4 സെന്റീമീറ്റർ നീളത്തിലും ഒരു സെന്റീമീറ്റർ വീതിയിലുമായി ഈ പാടുകൾ സമാന്തരവണ്ണരേഖകൾ (Pregnancy scars) ആയി കാണപ്പെടുന്നു.




ചിത്രം 20

ഗർഭിണിയുടെ ഉദരാഗതതും മറ്റും കാണപ്പെടുന്ന സമാന്തരവർണ്ണ രേഖകൾ — പൂർവ്വഗർഭധാരണ ഫലമായുണ്ടായ സമാന്തരവർണ്ണ രേഖകൾ (Striae Gravidarum or Pregnancy Scars).


പൊക്കിളിന്റേയും നാഭിയെല്ലിന്റേയും മദ്ധ്യേ ഒരു കുത്ത വരയും ചിലരിൽ കാണാറുണ്ട്. യോനി വികസിക്കുകയും അതിന്റെ ചമം മാർദ്ദവപ്പെട്ട് ഏതാണ്ടോരു നീലനിറത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലർക്കു ഒരുതരം യോനിസ്രാവവും ജനനേന്ദ്രിയഭാഗങ്ങളിൽ കഠിനമായ ചൊരിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

6 ഗർഭാശയം (യൂടേഴ്സ്-UTERUS):- ഗർഭധാരണം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീശരീരത്തിന് പൊതുവെയും ഉല്ലാഭനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായും പല പരിവർത്തനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം അണ്ഡകോശങ്ങളിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകളാണ്. ഭൂതം ഗർഭാശയത്തിൽ ഉറച്ചു വളച്ചയാരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗർഭാശയവും ക്രമേണ വലുതായി വരുന്നു. ഗർഭാശയം വികസിച്ചുപലതാകുന്നതോടൊപ്പം അതു മേല്പോട്ടു മേല്പോട്ടു ഉയർന്നുവരുന്നു. ഉപസ്ഥാശയത്തിനുള്ളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗർഭാശയം, ഗർഭധാരണത്തിനു ശേഷം മൂന്നുമാസമാകുമ്പോഴേക്കും നാഭിയെല്ലിന്റെ വക്കുവരെയെത്തുന്നു. നാലാംമാസത്തിൽ നാഭിയെല്ലിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് അതിനെ സ്പർശിക്കാം. അഞ്ചാംമാസത്തിൽ നാഭിയെല്ലിന്റേയും പൊക്കിളിന്റേയും മദ്ധ്യഭാഗംവരെയെത്തുന്നു. ആറാംമാസത്തിൽ പൊക്കിളിനു സമംവരെ ഉയർന്നിരിക്കും. ഏഴാംമാസത്തിൽ പൊക്കിളിനു് ഒരിഞ്ചു മുകളിലും, എട്ടാംമാസത്തിൽ പൊക്കിളിന്റേയും നെഞ്ചിന്റെ കഴിയുടേയും മദ്ധ്യഭാഗംവരെയും എത്തുന്നു.



ചിത്രം 21

ഗർഭകാലത്തു വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ ഗർഭാശയത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഉന്നതി ദൈർഘ്യമാനം. താഴെനിന്നും മേലോട്ടുള്ള രേഖകൾ യഥാക്രമം 16, 20, 24, 28, 32, 40, 36 എന്നീ ആഴ്ചകളിലെ ഉയർച്ചാവ്യത്യാസത്തെ കാണിക്കുന്നു,



ചിത്രം 22

36-ാമത്തെയും 40-ാമത്തെയും ആഴ്ചകളിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഉന്നതി പർദ്ധനവിന്റെ സ്ഥാനക്രമങ്ങൾ. 40-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ആർച്ചിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉപരിധ്രുവം മുന്നോട്ടുനിൽക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. മേൽഭാഗം 36-ാമത്തെ ആഴ്ചയായും കീഴ്ഭാഗം 40-ാമത്തെ ആഴ്ചയായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

9-ാം മാസാവസാനത്തോടുകൂടി (പ്രസവം അടുക്കുമ്പോൾ) കുട്ടിയുടെ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥമാശയത്തിലേയ്ക്ക് താഴുകയും, ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗം പൊക്കിളി നേരായും നെഞ്ചിന്റെ കഴിയുടേയും മദ്ധ്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. 8-ാം മാസത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാൾ അല്പംകൂടി താഴെയായുമിരിക്കുമിതു്.

7. ഗർഭാശയകണ്ഠം (സെർവിക്സ്-CERVIX):- ഗർഭാരംഭം മുതൽതന്നെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തു് അഥവാ സെർവിക്സ് മാർദ്ദവപ്പെടുവരുന്നു. ഗർഭമില്ലാത്തപ്പോൾ യോനിയിൽ വിരലിട്ടുപരിശോധിച്ചാൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തു് മൂക്കിൽതൊടുന്നതുപോലെയിരിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടുമാസം ഗർഭമുള്ളപ്പോൾ പരിശോധിച്ചാൽ അധരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലുള്ള മാർദ്ദവം അനുഭവപ്പെടും. നാളഗർഭം (Tubular-Pregnancy), മുഴുകൾ (Tumors) മുതലായവകൊണ്ടും ഗർഭാശയകണ്ഠം മാർദ്ദവപ്പെടാവുന്നതാണു്.

8. മൂത്രാശയം (യൂറിനറി ബ്ലാഡർ-URINARY BLADDER):- ഉപസ്ഥമാശയത്തിൽത്തന്നെ ഗർഭാശയം വളന്നു വികസിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടുമൂന്നുമാസങ്ങളിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുമ്പിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൂത്രാശയത്തിനു് ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം അധികനേരം കെട്ടിനില്ക്കുന്നതിനു് പ്രയാസമുണ്ടാകും. ഇതിനാലാണു് ആദ്യത്തെ മൂന്നുമാസക്കാലത്തു് ഗർഭിണിക്ക് കൂടെക്കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്നു് തോന്നുന്നതു്, എന്നാൽ നാലുമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗർഭാശയം ഉപസ്ഥമാശയത്തിൽനിന്നും മേല്പോട്ടുയരുന്നതും ഈ പ്രയാസം ക്രമേണ കുറയുന്നതുമാകുന്നു. പ്രസവം അടുക്കാറാകുമ്പോഴും കൂടെക്കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന ഇതേ പ്രയാ

സം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനു കാരണം കുട്ടിയുടെ ജനന മുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങി മുത്രാശയത്തിന് ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കുന്നതിനാലാണ്.

9. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനം (ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്—FOETAL-HEART BEATS):—ആറുമാസമാകുമ്പോൾ മുതൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ശബ്ദം ഒരു വാച്ചിന്റെ ടിക്ക്, ടിക്ക് ശബ്ദം പോലെയായിരിക്കും. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനനിരക്ക് മിനിറ്റിൽ 120 മുതൽ 136 വരെയായിരിക്കും. ഗർഭിണിയുടെ ഹൃദയസ്സന്ദനനിരക്ക് 70 മുതൽ 80 വരെയായിരിക്കുന്നതും കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ ഇതു തമ്മിൽ തെറ്ററിദ്ധരിക്കാനിടയില്ല. ഗർഭിണിയുടെ വയറിനുമേൽ ചെവിവച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതു കേൾക്കാം. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനം കേൾക്കുന്ന ഭാഗം കുട്ടിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. ഹൃദയസ്സന്ദനം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മോതിരാകൃതിയിൽ (○) അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക.

10. ബാലോട്ട്മെന്റ് (BALLOTTEMENT):—നാലാം മാസം മുതൽ 7 മാസം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണിത്. പരിശോധകന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ തന്നിച്ചോ അതിനടുത്തുള്ള വിരലും കൂടിയോ ഗർഭിണിയുടെ യോനിമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി കടത്തി ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴറ്റത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗത്തെ മേലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്നു തള്ളുകയും മുകളിലേക്കുയരുന്ന ഭാഗം പൂർവ്വസ്ഥാനത്തുതന്നെ തൽക്ഷണം തിരിച്ചുവരുന്ന

തിനെ കരസ്ഥാശ്വാസം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ബലോട്ട്മെന്റ് എന്ന പറയുന്നത്. ബാഹ്യമായ മറ്റൊരുതരം ബലോട്ട്മെന്റ് സമ്പ്രദായംകൂടിയുണ്ട്.

ബാഹ്യമായ ബലോട്ട്മെന്റ് (EXTERNAL BALLOTMENT):— ഗർഭിണിയെ ഒരു മേശയുടേയോ, കട്ടിലിനോയോ അരികിൽ, ഗർഭാശയം പുറത്തു് തള്ളിനില്ക്കത്തക്കരീതിയിൽ ചരിച്ചുകിടത്തുക. ഒരു കൈ ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അടിയിലും മററു കൈ ഉദരത്തിന്റെ മുകളിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭാശയത്തെ മുകളിലേക്കു് തള്ളുകയും അതു് പൂർണ്ണമായതാക്കത്തന്നെ വീഴുന്ന രീതികളു് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണിതു്.

ബലോട്ട്മെന്റ് സമ്പ്രദായം കൂടെക്കൂടെ ആവർത്തിച്ചാൽ മറുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടുപോന്നിടയുള്ളതുകൊണ്ടു് ഇതു് വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കരുതലോടെയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിശോധനാസമ്പ്രദായമാകുന്നു.

11. ഫ്യൂണിക് സൂഫിൾ (FUNIC SOUFFLE):— ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പൊക്കിൾകൊടിക്കു മീതെ വരത്തക്കവിധം ഗർഭിണിയുടെ ഉദരഭാഗത്തു് ഫീറ്റൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പു് (Fœtal Stethoscope) വെച്ചു് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊല്ലൻ (കുരുവാൻ) ഉലയുന്നതുപോലെ കേൾക്കുന്നമാതിരി ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഗർഭാശയ രക്തധമനികളിൽകൂടി രക്തം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദമാണിതു്. ഗർഭലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണു് ഈ ഫ്യൂണിക് സൂഫിൾ എന്ന ശബ്ദമെങ്കിലും ഇതു കേൾക്കുക വിരളമാണു്. തന്നെത്തന്നെ നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡാക്ടർക്കും മിഡ്വൈഫിനും മാത്രമേ ഇതു് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയൂ.

12. എക്സ്റേ (X-RAY):-- 4-ാം മാസത്തിൽ എക്സ്റേ എടുത്താൽ സ്ട്രീ ഗർഭിണി ആണെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ എല്ലുകളുടെ ഫോട്ടോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൃത്യമായ ഒരു ഗർഭലക്ഷണമായി ഇതു കണക്കാക്കാം.

ഗർഭലക്ഷണങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി ഇങ്ങിനെ ക്രോഡീകരിക്കാം.

- (a) ആത്മവം ഇല്ലാത്തവക.
- (b) ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, രൂപി വ്യത്യാസം.
- (c) മുലക്കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പും, തരിപോലെയുള്ള പൊങ്ങലും.
- (d) സ്തനങ്ങളുടെ വീർപ്പും കഴുപ്പും.
- (e) മുലഞ്ഞു പിടിച്ചുഞെക്കിയാൽ കൊളോസ്റ്റ് (Colostrum) എന്ന ദ്രാവകം പുറപ്പെടുക.
- (f) ഭഗദാരമാഗ്നത്തിൽ നീലനിറം വ്യാപിക്കൽ.
- (g) ഗർഭാശയം വികസിച്ചുവരികയും ആകൃതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഗർഭധാരണത്തിനുമുമ്പ് ശംഖിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഗർഭാശയം. ഗർഭധാരണം നടന്നാൽ പ്രസ്തുത ആകൃതി മാറി ഉരുണ്ടു പന്തുപോലെയായി തീരുന്നതാണ്.

ഔജ്വരാസപരമായ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ.

1. ആഷിംസോണ്ടെക് ടെസ്റ്റ് (Aschheim-Zondek test):-- രണ്ടു മാസമാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു സ്ട്രീ ഗർഭിണി ആണോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതു വിദഗ്ദ്ധനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഗർഭാരംഭത്തിൽ

അതു കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു് താഴെപ്പറയുന്ന പരീക്ഷണമാണു് നടത്തേണ്ടതു്. ആത്മവംനിന്നു് ആരോഗ്യ ആശുപത്രി കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ മൂത്രം എടുത്തു് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലാത്ത പെൺഎലികളിൽ കുത്തിവയ്ക്കുക. സ്ത്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ അവളുടെ മൂത്രം കുത്തിവച്ച എലികളുടെ അണ്ഡാശയം തുടങ്ങിയ ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണവളം പ്രാപിക്കുന്നതാണു്. സ്ത്രീ ഗർഭിണി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മൂത്രം കുത്തിവച്ച എലികളുടെ ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഇതുപോലെതന്നെ തവളകളിലും ഈ പരീക്ഷണം നടത്താവുന്നതാണു്. ഇപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതു് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബറട്ടറിയിൽ മാത്രമാണു്.

2. സാധാരണ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിസിൽ ചെയ്തുവരുന്ന ഗർഭപരീക്ഷണസമ്പ്രദായം..

‘പ്രെഗ്നൻസിടെസ്റ്റ്’ (ഗർഭപരീക്ഷണം):-

ഡിസെക്രോൺ (Desecron) അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂഗ്നോൺ (Duogynon) എന്നീ ഇഞ്ചക്ഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു് വാങ്ങി രണ്ടുദിവസം തുടച്ചുവായി ഓരോ ആംപ്യൂൾവീതം ഇൻട്രാമസ്കുലറായി കുത്തിവയ്ക്കുക. ഇഞ്ചക്ഷനുശേഷം അഞ്ചുദിവസംകഴിഞ്ഞു് സ്ത്രീ മെൻസസാകുന്നപക്ഷം അവൾക്കു് ഗർഭമില്ലെന്നും മെൻസസാവാത്തപക്ഷം അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്നും ഏറെക്കുറെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. മറ്റു ഗർഭലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ഫലത്തെമാത്രം ആശ്രയിച്ചു് സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ പറയുന്നതു് വളരെ സൂക്ഷിച്ചുവേണം. ഗർഭാശയസംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങൾമൂലവും ആത്മവം പെട്ടെന്നു് നിന്നുപോകാവുന്നതാണു്.

സാങ്കല്പികഗർഭം (സ്യൂഡോപ്രഗ്നൻസി-Pseudo Pregnancy):- താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭിണിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും, വിശ്വസിക്കുകയുമാണ് ഈ അവസ്ഥാവിശേഷം ബാധിച്ച സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭം ധരിക്കുവാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ,



ചിത്രം 23: ഗർഭാഭാസം അഥവാ ഗുന്തൻ
(PSEUDOCYESIS OR PSEUDO PREGNANCY)

ഗർഭധാരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അത്യധികമായ ഭയപ്പാടുകൊണ്ടോ ആണ് ഈ ഗർഭാഭാസസ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടാകുന്നത്. വിവാഹിതയായിട്ട് ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും, യാദൃശ്ചികമായി ഒരു ഭർത്തൃലനിമിഷത്തിൽ പുരുഷസമ്പർക്കമേറ അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് ഈ കപടഗർഭാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മായാമുഴ (Phantom Tumour), കല്പിതഗർഭം (Spurious Pregnancy) എന്നു തുടങ്ങിയ പേരുകളും ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം 6

ഗർഭകാലസംരക്ഷണം

ഗർഭധാരണം മുതൽ പ്രസവംവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവളുടെ കായികവും മാനസ്സികവുമായ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും, ആരോഗ്യത്തിനും, നിലനില്പിനും സുഖപ്രസവത്തിനുമെന്തെന്നും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രസവാശുപത്രികളും, വിദഗ്ദ്ധഡാക്ടറന്മാരും വിരളമായ നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ബഹുലക്ഷം ഗർഭിണികളിൽ അപൂർവ്വം പേർ മാത്രമാണ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുന്നതും വിദഗ്ദ്ധ ഡാക്ടറന്മാരുടെ സേവനം തേടുന്നതും. മാതാവിന്റേയും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റേയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഗർഭിണി, ഗർഭാരംഭം മുതൽ ഒരു ഡാക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ഉപദേശത്തിലും ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓരോ ഗർഭിണിയേയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ ഒരു ഡാക്ടറെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ഒരു മിഡ് വൈഫിന്റേതാണ്. ഗർഭിണിയെ ഡാക്ടർ പരിശോധിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ

മിഡ്‌വൈഫ് കൂടെയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ഗർഭാവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡാക്ടറോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്.

മിഡ്‌വൈഫ് കൂടെയുള്ള ഗർഭിണിയെ സന്ദർശിക്കുകയും അവൾക്കുവേണ്ട എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും വേണം.

ഒരു ഗർഭിണിയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിഡ്‌വൈഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും, ഓർമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഡയറിയിൽ കുറിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

പ്രഥമ ഗർഭധാരണമല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഗർഭകാലത്തെ സ്ഥിതിഗതികളേയും പ്രസവസന്ദർഭങ്ങളെയും, പ്രസവിച്ചുകിടന്നിരുന്ന കാലത്തെയും, ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതാവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും വേണം.

ഗർഭം അലസിപ്പോകുകയോ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുകയോ ചാപിള്ളയെ (മരിച്ച കുട്ടിയെ) പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാക്ടറേ സമീപിച്ച് ആവശ്യമായ പരിശോധനകളും, ചികിത്സകളും ചെയ്തുവാൻ ഉപദേശിക്കുക.

വാതപ്പനി (Rheumatic Fever), വൃക്കരോഗങ്ങൾ (Kidney Disease), ശോണജ്വരം (Scarlet Fever), പാർക്കിപ്പണ്ണ (Syphilis), ആൽബുമിനൂറിയ (Albuminuria), നീർ (Oedema), രക്തസമ്മർദ്ദം, അപസ്മാരം, അഞ്ചാംപനി, കൊറിയ (Chorea-നിയന്ത്രണാധീനമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ക്രമരഹിതമായി തുള്ളി

പിടയ്ക്കുകയും കൈകാലുകളും മുഖവും ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പുരോഗമാണിത്) എന്നീ രോഗങ്ങൾ മുൻപ് ഗർഭിണിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും പ്രസവംവരെ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം.

മുൻപ്രസവത്തോടടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാദൃച്ഛിക രക്തസ്രാവമോ (Accidental Haemorrhage), ശിശുവിനുമുമ്പായി മറ്റു പിച്ചളയിരുന്നതിനാലുണ്ടായ രക്തസ്രാവമോ (Unavoidable Haemorrhage), ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള അർബുദംമൂലമുണ്ടായ രക്തസ്രാവമോ എന്നു അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. അമിതമായ ഹർട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് രക്തത്തിൽ വിഷാവസ്ഥ (ടോക്സീമിയ-Toxaemia) നിലനിന്നിരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും, ദേഹം മുഴുവൻ വിശേഷിച്ചു കൺപോളുകളിലും, കാലുകളിലും, ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിലും നീരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അപസ്മാരലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞാൽ അത് മൂത്രാശയരോഗങ്ങൾമൂലമായിരുന്നു എന്നും ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

മൂത്രം വളരെ കുറച്ചുമാത്രം പോകുക, ശക്തമായ തലവേദന, കാഴ്ചക്കുറവ്, മലബന്ധം, കൈകാലുകളിലും മുഖത്തും നീര് ഇവ ഗർഭാപസ്മാര (എക്ലാംപ്സിയ-Eclampsia) ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. അതിനാൽ ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുവാൻ ഉപദേശിക്കുക.

ഭഗ്യാരത്തിൽനിന്നും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള സ്രവണം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഗുണോറിയാ എന്ന രോഗം

ബാധ മൂലവും വെള്ളനിറത്തിലുള്ള സ്രവണമാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അത് ലൂക്കോറിയാ എന്ന രോഗംമൂലവും ആയിരുന്നിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.

പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ മുന്നീർക്കടം പൊട്ടിപ്പോകുക, കുട്ടിക്കുമുമ്പായി പൊക്കിൾകൊടി വരിക, കുട്ടിയുടെ കിടപ്പു ക്രമവിരുദ്ധമായിരിക്കുക, ശസ്ത്രപ്രയോഗത്താൽ കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ ഉടയാകുക തുടങ്ങിയവ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വൈരൂപ്യംമൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ചാപിള്ളയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുകാരണം ആരംഭത്തിലേയുണ്ടാകുന്നു. ശസ്ത്രപ്രയോഗം, പൂഷം ജനനമുഖമായി വരൽ, പ്രസവത്തിനുമുമ്പുതന്നെ കുട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽ മരിച്ചുകിടക്കൽ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് ചാപിള്ളയെ പ്രസവിക്കാനിടയാകുന്നത്. ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചുപോയതാണ് കുട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊലിക്ക് നീലനിറം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും അവിടവിടെയായി തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നതുമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നിരിക്കും.

പ്രസവത്തിനുശേഷം എത്രദിവസം കിടക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, മറുപിള്ളയുടെ വല്ല ഭാഗങ്ങളും പൊട്ടി ഇരുന്നിരുന്നോ എന്നും, പ്രസവശേഷം പനിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും, മുലകൾക്ക് നീരോ പഴുപ്പോ ഉണ്ടാകുകയും കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തിരുന്നോ എന്നും, മുൻപ്രസവത്തിലെ ശിശുവിന് പ്രസവിച്ചയുടെനെ എന്തു തുക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള സകല വിവരങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കുറിച്ചുവെണം.

കഴിഞ്ഞ കാലപ്രസവങ്ങളുടെ പുണ്യമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സകല വിവരങ്ങളും ചോദിച്ചറി

ഞ്ഞതിനുശേഷവും ഗർഭിണിക്കു് അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ലെന്നു് ബോധ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പ്രസവം അവരുടെ വീട്ടിൽവെച്ചുതന്നെ നടത്തുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നിരുന്നാലും വീട്ടിൽവെച്ചു് പ്രസവം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, പ്രസവശേഷവും അതിനു മുമ്പും ഒരു സമീകൃതാഹാരം ദിവസേന കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, നിത്യവൃത്തിക്കുവേണ്ടി കഠിനമായി അദ്ധ്വാനംചെയ്യേണ്ട പരിതസ്ഥിതി, മാനസികവൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകവാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചുവേണം പ്രസവം വീട്ടിൽവെച്ചു നടത്തുവാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതു്.

ആദ്യഗർഭമാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടു് എത്ര കാലമായെന്നും, വളരെ താമസിച്ചാണു് ഗർഭമുണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനു് വല്ല പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുമുണ്ടോ എന്നും മിഡ്ഓവെഫ് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതാണു്. ഇക്കാലത്തു് ഗർഭനിരോധനമാഗ്ഗങ്ങൾ ധാരാളം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഗർഭിണിയുടെ വസ്ത്രധാരണം:-

ഗർഭകാലത്തു് സ്നാനങ്ങൾക്കും, അരക്കെട്ടിനും മൂക്കും തട്ടാനിടയാകുന്ന വിധത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തുകൂടാ. വലിച്ചുമുറക്കി കെട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരിഷ്കൃത ബ്രേസിയറുകളും, അടിപ്പാവാടകളും വഴ്ജിക്കേണ്ടതാണു്.

ഭക്ഷണം:-

ഗർഭിണിയുടെ ഭക്ഷണം പോഷകാംശസമൃദ്ധവും സമീകൃതവുമായിരിക്കണം. ഗർഭകാലത്തു് സാധാരണയിൽകവിഞ്ഞു് അല്പംകൂടുതൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണു്. അധികം എരുവും മധുരവും ഉള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതു്. ഇറച്ചി, മുട്ട, മത്സ്യം എന്നിവയും മിതമായേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.

സ്നാനം:-

ദിവസേന ചെറുചുട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതാണ്.

വ്യായാമം:-

ഗർഭിണിക്കു ക്രമവും മിതവുമായ വ്യായാമം ആവശ്യമാണ്. ഏകിലും അധികം ആയാസം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ പാടില്ല. ദിവസേന കുറേദൂരം നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗർഭം അലസിപ്പോയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾ, തങ്ങൾക്ക് ഗർഭമില്ലാതിരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആത്മവമുണ്ടായിട്ടുള്ള തീയതികൾ ആകുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് അനങ്ങാതെ സ്വസ്ഥമായി കിടക്കണം.

സ്നാനപരിചരണം:

എട്ടാംമാസംമുതൽ മുലകൾ ദിവസേന സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും, ചെറിയതോതിൽ തിരുമ്മിക്കൊടുക്കുകയും വേണം. മുലക്കണ്ണുകൾ പിടിച്ച് മേലോട്ടുയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

പല്ലുകൾ:-

ദന്തസംരക്ഷണത്തിന് ഗർഭകാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ പല്ലിന് വേദനയോ ദ്വാരമോ ഇളക്കുമോ മറ്റൊന്നികിലും അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദന്തഡാക്ടറെ സമീപിച്ച് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മുത്രപരിശോധന:

മൂന്നാംമാസംവരെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും 9-ാംമാസത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും 10-ാംമാസത്തിൽ ആഴ്ച

യിൽ ഒരിക്കലും വീതം മുത്രം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. മുത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമാകുന്നു.

മലശോധന:

ഗർഭിണിക്കു് ക്രമമായ മലശോധന ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. പാലും പഴവസ്തുക്കളും പച്ചക്കറികളും ആഹാരത്തിൽ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നല്ല മലശോധന ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഗർഭത്തിന്റെ ആദ്യമാസങ്ങളിൽ രൂക്ഷതയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു് വയർ ഇളക്കാൻ പാടില്ല. മലബന്ധം കഠിനമാണെങ്കിൽപോലും സാകുറുടെ ഉപദേശപ്രകാരമല്ലാതെ യാതൊരു ഔഷധവും ഗർഭിണി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ.

വൈരൂപ്യങ്ങൾ:

ഗർഭിണിക്കു് പൊക്കം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക, കൂറുണ്ടായിരിക്കുക, മുട്ടത്തുണ്ടായിരിക്കുക എന്നിവയും ഗർഭത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടാഴ്ചകളാകുമ്പോഴേക്കും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു് താണുവരാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മീതെ ഉയർന്നുകിടക്കുക എന്നിവയും അപകടസാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടിയുടെ ക്രമവിരുദ്ധമായ ഈ ശയനനില ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വൈരൂപ്യംകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ മേൽപറഞ്ഞവിധത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈരൂപ്യങ്ങൾ ഗർഭിണിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡാക്ടറേ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗർഭിണിയുടെ ദേഹപരിശോധന

ഗർഭിണിയുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്നത് ഡാക്ടറാണ്. തൽസമയം മിഡ്വൈഫ് കൂടെയുണ്ടായിരി

ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ശിരസ്സുമുതൽ പാദം വരെ സമഗ്രമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. അവയവങ്ങളുടെ ഘടനയും ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിന് വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പരിശോധനമൂലം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഹൃദ്രോഗം, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ, ശ്വാസവിമിഷ്ടം, രക്തവിളർച്ച, ദന്തരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും രക്തം, രക്തസമ്മർദ്ദം, മൂത്രം എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗർഭിണിയുടെ സ്തനങ്ങൾ, ഉദരം, ഗേഭാരം, ഉപസ്ഥാശയം എന്നിവയുടെ പരിശോധനയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യോനീമാഗ്ഗമായുള്ള പരിശോധനയും അവശ്യമാകുന്നു.

ആദ്യതവണത്തെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാസത്തിൽ ഒരുതവണ വീതമെങ്കിലും ഡാക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഗർഭിണി വിധേയയാകേണ്ടതാണ്.


കഠിനമായ തലവേദന, മൂത്രംപോകുന്നതിൽ ക്രമക്കേട്, കാഴ്ചയ്ക്ക് തകരാറ്, ശരീരത്തിൽ എവിടെ എങ്കിലും നീര്, രക്തസ്രാവം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എപ്പോഴും കണ്ടാലും ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

മറപിള്ള (പ്ലാസൻറാ-PLACENTA)

മരകുട്ടിയും മുനീർക്കടത്തോലും

ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി:- വളരെ നേർത്തതും ചുരുക്കത്താലാണ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മ്യൂക്കസ്സ് മെംബ്രെയിൻ (Mucus Membrane) എന്ന ഈ പാളം (Endometrium) സ്ത്രീ, ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഘനവും, മൃദുത്വവും, നനവുമുള്ളതായി തീരുന്നു. ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നപക്ഷം അതിന്റെ സ്വീകരണത്തിനുവേണ്ടി ആത്മവചക്രത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തു് ഗർഭാശയഭിത്തി നേർത്ത പട്ടിനേക്കാളും നേർത്തതായി ഒരുതരം പാളംവിശേഷംകൊണ്ടാണ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ വായിലെ തൊലിയോടു് ഇതിനേ ഏറെക്കുറെ ഉപമിക്കാം. ഗർഭാശയഭിത്തിയിലെ ഈ ശ്ലേഷ്മപാളം (മ്യൂക്കസ്സ് മെംബ്രെയിൻ-Mucus Membrane) സ്ത്രീ ഗർഭവതിയാകുന്നതോടുകൂടി മെത്തപോലെ കൂടുതൽ ഘനവും മാർദ്ദവവും ഉള്ളതായി തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഗർഭകാലത്തു് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിലെ ഈ പാളംവിശേഷത്തിനു് ഡെസിഡുവാ (Decidua) എന്നു പറയുന്നു. ഈ പാളത്തിനുള്ളിൽ സംയുക്താണു. അഥവാ ഗർഭബീജം (Fertilized Ovum) വളരാനാരംഭിക്കുന്നു; മുളയുന്നതിനുവേണ്ടി കഴിച്ചിട്ട ഒരു വിത്തുപോലെ. ഗർഭധാരണം നടന്നു ഏതാണ്ടു് എട്ടാമത്തെ ദിവസത്തോടുകൂടി

യാണു് ഗർഭബീജത്തിനു് ഡെസിഡ് വാ എന്ന ഗർഭാശയചർമ്മത്തിൽ വാസമുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതു്. ഗർഭബീജം വളരുന്നതോടുകൂടി ഡെസിഡ് വായും വളരുകയും ഗർഭബീജത്തിനു് ആവശ്യമായ ആഹാരവും സംരക്ഷണവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗർഭധാരണം നടന്നു് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോടുകൂടിയാണു് ഡെസിഡ് വാ, പ്ലാസൻറാ (മറുപിള്ള) എന്ന രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതു്.




ചിത്രം 24: മറുപിള്ള അഥവാ മറുകുട്ടി (Placenta)
(മറുപിള്ളയുടെ ഉഭവശാ.)

മറുപിള്ളയ്ക്കു് വൃത്താകൃതി (Disk Like) യാണുള്ളതു്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വളച്ചുയുടെ അവസാനഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും മറുപിള്ളയ്ക്കു് ഏകദേശം 16×20 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പം വച്ചിരിക്കും. മറുപിള്ളയുടെ കേന്ദ്ര (Centre) ഭാഗത്തിനു് 3 സെന്റിമീറ്റർ ഘനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെ


കിലും അരികിലേക്കു മാറ്റംതോറും ഈ പലനം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. മറുപിള്ളയ്ക്ക് സാധാരണയായി 500 ഗ്രാം തൂക്കമാണുണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാൽ ശിശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന് ആനുപാതികമായി മറുപിള്ളയുടെ തൂക്കത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പൊക്കിരുകൊടി മറുപിള്ളയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തോടു് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറുപിള്ളയ്ക്ക് അകവും പുറവുമായി രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട്. അകവശം (Internal or Fetal Surface) ഗർഭസ്ഥശിശുവിനോടു് പൊക്കിരുകൊടിവഴിയായും, പുറവശം (External or Maternal Surface) ഗർഭാശയഭിത്തിയോടും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗർഭാശയഭിത്തിയോടു് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറുപിള്ളയുടെ പുറവശത്തുകൂടിയാണ് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വളച്ചുയ്ക്കാവശ്യമായ പോഷകമൂല്യങ്ങൾ മാതൃരക്തത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതും, അതിന്റെ വിസർജനകൃത്യം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതും. സംയുക്താഭാസം ഗർഭാശയത്തിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അകമേയം പുറമേയുമായി അതിനെ രണ്ടിനും ചർമ്മങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ഗർഭബീജത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന, പുറമേയുള്ള ചർമ്മത്തിന് കോറിയോൺ (Chorion) എന്നും അകമേയുള്ള ചർമ്മത്തിന് ആംനിയോൺ (Amnion) എന്നും പറയുന്നു. വളരെ മാർദ്ദവവും നനവുമുള്ള കോറിയോൺ എന്ന ചർമ്മം ഡെസിഡു വായോടു് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. കോറിയോണിൽ നാരുവേരുകൾക്കു സമാനമായ കോറിയോണിക് വില്ലൈ (Chorionic-villi) ധാരാളം വളരുന്നു. ഈ കോറിയോണിക് വില്ലൈ, ഡെസിഡു വായിൽക്കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന മാതൃരക്തത്തിൽനിന്ന് ഗർഭബീജത്തിന്റെ വളച്ചുയ്ക്കാവശ്യമായ പോഷകമൂല്യങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഗർഭബീജം തിരസ്സരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ മാതൃരക്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നുമാസക്കാലം ഗർഭബീജം മിക്കവാറും ഈ കോറിയോണിക് വില്ലൈ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ മൂന്നുമാസംകഴി

യുന്നതോടുകൂടി ഇവയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നശിക്കുകയും ഏതാനും ചില വില്ലെ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന കോറിയോണിക് വില്ലെ തഴച്ചു വളൻ മറുപിള്ളയുടെ രൂപം അവലംബിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂണ്ണരൂപത്തിലുള്ള മറുപിള്ള ഡെസീഡ് വായും കോറിയോണിക് വില്ലെയുംകൂടി ചേർന്നതായതാണെന്നു പറയാം. മറുപിള്ള ചിലപ്പോൾ വളരെ വലുതായോ വളരെ ചെറുതായോ ഇരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറുപിള്ളയോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു അനുബന്ധിത മറുപിള്ള (Placenta Succenturiata) കൂടി കണ്ടെന്നുവരും.



ചിത്രം 25: അനുബന്ധിത മറുപിള്ള
(Placenta Succenturiata)



ചിത്രം 26: രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുള്ള മറുപിള്ള
(Placenta Bipartite)

ഇതു് പൊട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരുന്നപോകാനിടയുണ്ടു്. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു് മിഡ്‌വൈഫു് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്. അനുബന്ധിത മറുപിള്ളയുണ്ടായിരുന്ന എന്തിൽ പ്ലാസൻറായുടെ വക്കത്തു നിന്നു് ഒരു രക്തധമനി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിയും മുന്നീർക്കുടത്തിൽ ഒരു ദ്വാരമുള്ളതായും കാണാം.

മുന്നീർക്കുടത്തോൽ

(ഫീറ്റൽ മെംബ്രെയിൻ—FOETAL MEMBRANE):—

ഗർഭത്തിൽ ശിശു മുന്നീർക്കുടത്തിലാണു് കിടക്കുന്നതെന്നു പറയാം. മറുപിള്ളയുടെ അകമേയുള്ള ചർമ്മത്തിനു് ആംനിയോൺ എന്നു പറയുമെന്ന് മേൽപ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു് ഹോമങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ

കാത്തസൂക്ഷിക്കുന്നത് ആംനിയോൺ എന്ന ചർമ്മാവരണവും അതിനുള്ളിലുള്ള ലൈക്കർ ആംനി (Liquor amnii) എന്ന മൂന്നിരം കൂടിയാണ്. വളർന്നുവരുന്ന ഗർഭബീജം വളരെ മൃദലമായതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം ക്ഷതമേല്ക്കാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ അത് മൂന്നിർ എന്ന ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് കിടക്കുന്നത്.

മൂന്നിർ (LIQUOR AMNII OR AMNIOTIC FLUID):—

മൂന്നിർ എന്ന ദ്രാവകത്തേയും അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംനിയോൺ എന്ന ചർമ്മത്തേയുംകൂടിയാണ് മലയാളത്തിൽ മൂന്നിർക്കടം എന്നു പറയുന്നത്. പ്രസവംവരെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് ക്ഷതമേല്ക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അതിന് ഗർഭാശയത്തിൽകിടന്ന് അനങ്ങുന്നതിനും പ്രസവാരംഭത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂന്നിർ സഹായിക്കുന്നു. മൂന്നിർ, മനുഷ്യനിമിത്തമായ ഏത് രോഗാണുനാശകരായ രോഗാണുക്കളും വിലപ്പെട്ട ഒരു ലോഷനാണ്. ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് പുറത്തേയ്ക്കുവരേണ്ട വഴി, ശുദ്ധമാക്കുക എന്ന ഒരു കർമ്മംകൂടി മൂന്നിരിനുണ്ട്. പ്രസവത്തിനുമുമ്പ് മൂന്നിർക്കടം പൊട്ടി മൂന്നിർ പുറത്തേയ്ക്കാഴുകുമ്പോൾ അത് യോനിമാഗ്ഗത്തെ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുകയും രോഗാണുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നിരിന്റെ സാധാരണ അളവ് ഒരു ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. ഒന്നര ലിറ്ററോ അതിലധികമോ മൂന്നിർ കാണപ്പെടുന്നപക്ഷം ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പോളി ഹൈഡ്രാമ്നിയോസിസ് (Poly hydramnios) എന്നും, ഒരു ലിറ്ററിൽ കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒലിഗോഹൈഡ്രാമ്നിയോസിസ് (Oligo hydramnios) എന്നും പറയുന്നു.

പൊക്കിൾക്കൊടി

(അംബ്ലിക്കൽ കോർഡ്—UMBILICAL CORD):—

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പൊക്കിളിൽനിന്നും ആരംഭിച്ചു മറുപിള്ളയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. പൊക്കിൾക്കൊടിക്ക് സാധാരണയായി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ നീളമാണുണ്ടായിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഇതു വളരെ വലുതായും കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന്റെ സാധാരണ നീളം 50 സെ: മീറ്ററും വ്യാസം 1.5 സെ: മീറ്ററുമാണ്. മാതാവിൽനിന്നും ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു പോഷണം എത്തിക്കുന്ന രക്തധമനികൾ ഇതിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ചെറുവീരലിന്റെ വണ്ണമുള്ള ഈ വള്ളി അല്പം പിരിഞ്ഞരീതിയിലുമാണിരിക്കുന്നത്.


ഉപസ്ഥാശയം

(പെൽവിസ്—PELVIS)

പ്രസവസന്ധിയിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് പുറത്തേക്കു കടന്നുവരുന്നള്ള മാർഗ്ഗത്തിലെ അസ്ഥിഭാജനത്തിനാണ് ഉപസ്ഥാശയം. അഥവാ പെൽവിസ് എന്നു പറയുന്നതു്. പെൽവിസ് എന്ന ലത്തീൻവാക്കിന് കോപ്പയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ദ്വാരം—ഗഹവരം (Cavity) എന്നുണർത്ഥം. പെൽവിസ് എന്ന വാക്കിന് മലയാളത്തിൽ ഉപസ്ഥാശയം, ത്രികാസ്ഥിഭാജനം, കൂപകം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടു്.

അരക്കെട്ടുഭാഗത്തിലെ വിവിധ എല്ലകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു് രൂപംപ്രാപിച്ച ഒരു വലിയ ദ്വാരമാണു് പെൽവിസ് എന്നു പറയാം.


പ്രസവാലട്ടത്തിലുണ്ടാകാറുള്ള മിക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കാരണം, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല കടന്നുപോരത്തക്ക വിസ്താരം പെൽവിസിന് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണു്. പെൽവിസിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തുള്ളതു് പെൽവിക്സ് ഇൻലെറ്റ് (Pelvic Inlet) എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതും ഒരു കഴലിനു സമാനമായതുമായ അതിന്റെ വക്ത്രത്തിൽക്കൂടി ഗർഭസ്ഥശിശു കടന്നു് പെൽവിക്സ് ഔട്ട് ലെറ്റ് (Pelvic Outlet) എന്ന അടിയിലുള്ള ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി കടന്നു് പുറത്തുവരികയാണു വേണ്ടതു്.



ചിത്രം 27: ഉപസ്ഥാശയം (PELVIS)


പ്രവേശനമാഗ്ഗം (PELVIC INLET)

നേടാകയുള്ള അളവ് (Longitudinal) 11 സെ: മീറ്റർ. വിലങ്ങനെ
യുള്ള അളവ് (Transverse) 13 സെ: മീറ്റർ. ചരിഞ്ഞ അളവ്
(Oblique) 12 സെ: മീറ്റർ.



ചിത്രം 28: ഉപസ്ഥാശയബഹിർഗമനമാഗ്ഗം
(PELVIC OUTLET)

പെൽവിസിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മുതുകെ
 പ്ലിന്റെയും തുടകളുടെയും മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതിചെയ്യു
 ന്നു പെൽവിസ് മുതുകെപ്പിന്നതായൊയിട്ടും, തുടയെല്ല
 കൾ പെൽവിസിനു താങ്ങായിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പെൽവിസ്
 പ്രധാനമായി നാല് എല്ലകൾ ചേർന്ന രൂപംപ്രാപിച്ചിട്ടു
 ഉള്ളതാണ്.



ചിത്രം 29: ഉപസ്ഥാശയം (PELVIS)

- 1 സേക്രൽ പ്രോമോണ്ടറി (Sacral promontory)
- 2 നട്ടെല്ലിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം.
- 3 സേക്രൽ ഇലിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം.
4. 12. ഇലിയം.
5. സേക്രം.
6. തുടയെ പ്ലിന്റെ മേൽ ഭാഗം.
7. തുടയെല്ല്
8. ഇസ്ക്വിം.
9. 9. നാഭി
10. കോക്സിക്സ്
12. ഉപസ്ഥാശയം.

അവ:- 1. കൈലുകൾ-2 (Os innominatum):-

ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഓരോവശത്തും പരന്ന ഓരോ എല്ലുകൾ വീതമുണ്ട്. ഇവയ്ക്കാണ് കൈലുകൾ അഥവാ ഇലിയം (Ileum) എന്നു പറയുന്നത്. മൂന്നു എല്ലുകൾ ചേർന്നാണ് ഇവയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കൈലു (ഇലിയം-Ileum), ആസനയെല്ലു (ഇസ്ക്വിയം-Ischium), നാഭിയെല്ലു (പ്യൂബിസ്-Pubis), എന്നിവയാണ് അവ. ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ രണ്ടു വശത്തുമായി ഓരോ കൈലുകളും പിൻഭാഗത്തായി പൂണെല്ലും (സേക്രം) അതിന്റെ കീഴിൽ ഗുദാസ്ഥിയും (കോക്സിക്സ്) കൈലിനു (ഇലിയം) മുമ്പിലായി നാഭിയെല്ലും (പ്യൂബിസ്), കീഴ്ഭാഗത്തായി ആസനയെല്ലും (ഇസ്ക്വിയം) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്നു അസ്ഥിഭാജനത്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെൽവിസ് എന്നു പറയുന്നത്.

ഇലിയം (ILEUM):-


കൈലു, ആസനയെല്ലു, നാഭിയെല്ലു, എന്നീ മൂന്നെല്ലുകൾ ബാല്യത്തിൽ വേർപെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇരുപതു, ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇവ മൂന്നും തമ്മിൽ ചേർന്നു ഒന്നായിത്തീരുന്നു.

പൂണെല്ലു (സേക്രം-SACRUM)


ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള എല്ലിനാണ് സേക്രം അല്ലെങ്കിൽ പൂണെല്ലു എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ മുൻഭാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും മേൽഭാഗം മുതുകെല്ലുമായി ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂണെല്ലും മുതുകെല്ലും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്തു മുമ്പോട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്ന മുഴയ്ക്കു സേക്രൽ പ്രമോണ്ടറി (Sacral promontory) എന്നു പറയുന്നു. ഈ മുഴയുടെ നില യോനീമാർഗ്ഗമായി പരിശോ

ധിച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ മുഴ യോനിയിലേക്കധികംതള്ളിനില്ക്കുന്നപക്ഷം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വാസ്ത് (Brim) വിസ്താരം കുറവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

ബാല്യകാലത്തു ശിശുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന റിക്കറ്റ് (Ricket) എന്ന രോഗബാധയാണു് ഈ വിസ്താരക്കുറവിനു കാരണമായിത്തീരുന്നതു്. റിക്കറ്റ് എന്ന രോഗത്തിനു്, മലയാളത്തിൽ പക്ഷിപീഡ, പിള്ളവാതം, കണ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടു്. വിസ്താരംകുറഞ്ഞ ഉപസ്ഥാശയത്തിനു് പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം (ഫ്ലാറ്ററു് പെൽവിസ്—Flat pelvis) എന്നാണു് പറയുന്നതു്.



ചിത്രം 30



ചിത്രം 31

പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം (FLAT PELVIS)
രണ്ടു മാതൃകകൾ

ഗുദാസ്ഥി (കോക്സിക്സ്—COCCYX):—

പുണെല്ലിനതാഴെ അതിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ എല്ലിനാണ് ഗുദാസ്ഥി എന്നു പറയുന്നത്. ഗുദഭാഗത്തിൽ പിന്നിൽ തടവിനോക്കിയാൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗത്തിന് നാടൻസൈലിയിൽ മൂലാതണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട്. പ്രസവസമയത്ത് ഗുദാസ്ഥിയുടെ ഈ അഗ്രഭാഗം ഒരു സെൻറീമീറ്ററിൽ കറയാതെ പിന്നോട്ടു വളഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനാൽ ശിശുവിന്റെ തല പുറത്തേയ്ക്കുവരുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം വലുതായിത്തീരുന്നു.

ആസനയെല്ല (ഇസ്ക്വിയം—ISCHIUM):—

ഗുഹ്യപ്രദേശത്തിൽ താഴെയായി ഇരുവശത്തും രണ്ടു മുഴക്കം കാണാം. ഇവ ആസനയെല്ലകളുടെ ഭാഗമാണ്. ഇവയാണ് നമുക്കു ഇരിക്കുവാൻ ആധാരമായിത്തീരുന്നത്. ഈ മുഴകളിൽനിന്നും പുണെല്ലിലേയ്ക്കു തടിച്ച ഞെമ്പുകൾ പോകുന്നു. പ്രസവസമയത്ത് കുട്ടിയുടെ തലയെ മുന്നോട്ടു തള്ളുന്നത് ഈ ഞെമ്പുകളുടെ സഹായത്താലാണ്.

നാഭിയെല്ല (പ്യൂബിസ്—PUBIS):—

ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുകളിലായി രോമാവൃതമായിക്കാണുന്ന ഉയർന്ന തട്ടിൽ അമർത്തി തടവിനോക്കിയാൽ കാണുന്ന എല്ലിനാണ് നാഭിയെല്ല എന്നു പറയുന്നത്.

ഉപസ്ഥാശയ എല്ലകളെപ്പറ്റി താഴെപ്പറയും പ്രകാരം സംക്ഷിപ്തമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു മിഡ്വൈഫ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇടുപ്പിന്റെ രണ്ടുവശത്തും പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളിനില്ക്കുന്ന എളി ഇലിയത്തിന്റെ മേൽവക്കുകുന്നു. ഈ വക്കിന്റെ പുറകിലും മുമ്പിലുമായി ഓരോ മുഴയുള്ളതായിക്കാണാം. ഗുഹ്യപ്രദേശത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും അമർത്തിനോക്കിയാൽ കാണുന്ന മുഴകൾ ഓരോ ഭാഗത്തേയും ഇസ്സിയമാണ്. വയറിന്റെ കീഴറ്റത്തു് രോമാവൃതമായിക്കാണുന്ന തട്ടു് അമർത്തിനോക്കിയാൽ കാണുന്നഭാഗമാണ് പ്യൂറിസ്. ഇലിയം സേക്രത്തിന്റെ രണ്ടുവശത്തും ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. മുതുകെല്ലു് സേക്രത്തിന്റെ മേൽഭാഗമാകുന്നു. സേക്രത്തിന്റെ പിൻവശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതുകെല്ലും സേക്രവും കൂടിച്ചേരുന്നഭാഗത്തു് മുമ്പോട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്ന മുഴയ്ക്കു് സേക്രൽപ്രമോണ്ടറി എന്നു പറയുന്നു. ഇതു് അധികം മുമ്പോട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്നപക്ഷം ഉപസ്ഥമാശയത്തിന്റെ വായ്ക്കു് വിസ്താരം കുറവാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കുകയുംചെയ്യണം.

ഉപസ്ഥമാശയം മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അതു് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഉപസ്ഥമാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം തടിച്ച ഒരു രേഖപോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഉപസ്ഥമാശയത്തിന്റെ വായ് (Brim of pelvis). ഈ രേഖയുടെ മീതെയുള്ള ഭാഗത്തിനു് മിഥ്യോപസ്ഥമാശയം (ഫാൾസ് പെൽവിസ്—False pelvis) എന്നും അതിനതാഴെയുള്ള ഭാഗത്തിനു് സാക്ഷാൽ ഉപസ്ഥമാശയം (ട്രൂ പെൽവിസ്സ്—True pelvis) എന്നും പറയുന്നു. ഫാൾസ് പെൽവിസ് പ്രസവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രസക്തവും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നിലും ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ട്രൂ പെൽവിസ്സിന്റെ അളവു തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതു്.

ഉപസ്ഥമാശയത്തിനു് (True-pelvis) മൂന്നുഭാഗങ്ങളാണുള്ളതു്.

(എ) വായു° (BRIM):— ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ അധാകൃതിയിലുള്ള പ്രവേശനകവാടത്തിനാണ് വായു° എന്നു പറയുന്നത്. വലത്തുനിന്നും ഇടത്തോട്ടാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ വിസ്താരമുള്ളത്. അത് ഏകദേശം $12\frac{1}{2}$ സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. മുൻഭാഗത്തുനിന്നും പിൻഭാഗത്തേയ്ക്കുള്ള വിസ്താരം താരതമ്യേന കുറവാണ്. അത് 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വരില്ല. ആദ്യഗർഭിണികളുടെ ഗർഭം ഒമ്പതു മാസം തികയുമ്പോഴേയ്ക്കും കുട്ടിയുടെ തല ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങുന്നതാണ്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് ഈ സമയത്തു് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുംകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ തല ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു യഥാസമയം ഇറങ്ങാതിരിക്കാവുന്നതാണ്.

- 1) ഉപസ്ഥാശയം ചെറുതായിരിക്കുക (കൺട്രാക്റ്റഡ് പെൽവിസ്—Contracted pelvis)
- 2) കുട്ടിയുടെ തല സാധാരണയിൽകവിഞ്ഞു വലുതായിരിക്കുക (ഹൈഡ്രോകെഫാലസ്—Hydrocephalus)
- 3) സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസവഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സാണ് ജനനമുഖമായി വരിക, അതിനു പകരം ശിശുവിന്റെ മറേറതെങ്കിലും ഭാഗം ജനനമുഖമായി വരിക.
- 4) ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വളച്ചുകൾ ഉണ്ടാകുക (ഉദാ: Fibroid, Ovarian tumour)
- 5) മൂന്നീട് വളരെക്കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക (Hydramnios)
- 6) ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് മുമ്പായി മറുപിള്ള ഇരിക്കുക (Placenta-*prævia*)
- 7) ഗർഭാശയം ചരിഞ്ഞിരിക്കുക (Obliquity of the uterus)

ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശിശുശിരസ്സ് യഥാസമയം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയും യോനീ മാഗ്നേണ സ്പർശിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തവിധത്തിൽ ഉയർന്നുകിടക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉടനെ മിഡ്‌വൈഫ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

(ബി) ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉള്ളടം:- മുൻഭാഗത്തു് നാഭിയെല്ലും പിൻഭാഗത്തു് പൂണെല്ലും ഇടത്തും വലത്തും ആസനയെല്ലുകളുമാണു് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് പുറമുള്ളതു്.


(സി) ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള ഭാഗം:-

ഈ ഭാഗത്തിന് ഇരുവശവുമായി ആസനയെല്ലുകളുടെ മുഴുക്കളും അവയേയും പൂണെല്ലിനേയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുമാണുള്ളതു്. പ്രസവാവസരത്തിൽ ഗുദാസ്ഥി പിന്നോട്ടു വളയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ കൂടിയ നീളം 12½ സെന്റീമീറ്ററായിരിക്കും. ഈ അളവു് മുൻഭാഗത്തുനിന്നും പിൻഭാഗത്തേയ്ക്കുള്ളതാണു്

ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വലിപ്പം

പുറമേയ്ക്കുള്ള അളവുകൾ:-

- I കൈല്ലുകളുടെ വക്കിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മുഴുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 25 സെന്റീമീറ്റർ (Inter spinous Diameter)
- II കൈല്ലുകളുടെ വക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ അകലം 27.5 സെന്റീമീറ്റർ (Inter-cristal Diameter)
- III നാഭിയെല്ലിന്റെ മേൽവക്കിൽനിന്നു് പൂണെല്ലും മുതുകെല്ലും ചേരുന്ന ഭാഗം വരെയുള്ള അകലം 19 സെന്റീമീറ്റർ (External conjugate diameter)



ചിത്രം 32
INTERSPINOUS DIAMETER



ചിത്രം 33: EXTERNAL CONJUGATE DIAMETER

ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

ഉപസ്ഥാശയം	മുൻവശത്തുനിന്നും പിൻവശത്തേയ്ക്കുള്ള അകലം	നേർമദ്ധ്യരേഖകളി- ടെ ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം	വലത്തുനിന്നും ഇടത്തേയ്ക്കുള്ള അകലം
വായു	10 സെന്റീമീറ്റർ	11.5 സെ: മീറ്റർ	12.5 സെ: മീറ്റർ
ഉള്ളി	11.5 സെ: മീറ്റർ	11.5 സെ: മീറ്റർ	11.5 സെ: മീറ്റർ
പുറത്തേയ്ക്കുള്ളഭാരം	12.5 സെ: മീറ്റർ	11.5 സെ: മീറ്റർ	10 സെ: മീറ്റർ



ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ്


പ്രസവഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്, ശിശുവിന്റെ തല കടന്നു പോരത്തക്ക വിസ്താരമില്ലായ്മയാണ്. അതിനാൽ പ്രസവശുശ്രൂഷ വിദഗ്ദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര പരമായ അറിവ് മിഡ്വൈഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ശിശുവിന്റെ തലയോട്ട്

ശിശുവിന്റെ തലയോട്ടി അഞ്ചെല്ലുകൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

1. നെററിയെല്ലുകൾ, - രണ്ടു് (ഫ്രോണ്ടൽബോൺസ് - Frontal Bones-2)
2. തലയുടെ ഇരുവശത്തുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഉച്ചിയെല്ലുകൾ - രണ്ടു് (പറൈറൽ ബോൺസ് - Parietal Bones-2)
3. പിൻഭാഗത്തുള്ള എല്ലു് - ഒന്നു് (ഓക്സിപ്പിറൽ ബോൺ - Occipital Bone-1)

നെററിത്തടത്തിലെ രണ്ടെല്ലുകളെ ഫ്രോണ്ടൽബോൺസ് എന്നും, ഉച്ചിയുടെ രണ്ടുവശത്തുമായി കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടെല്ലുകളെ പറൈറൽ ബോൺസ് എന്നും, നാം മലൻകിടക്കുമ്പോൾ കിടക്കയിൽ സ്വർശിക്കുന്ന എല്ലിന് ഓക്സിപ്പിറൽ ബോൺ എന്നും പറയുന്നു.




ചിത്രം 34: SUTURES and FONTANELLS of the CRANIAL VALUT—സുച്ചേഴ്സും ഉച്ചിയും.

മുകളിൽ കുറുകെയുള്ള വര ശിശുശിരസ്സിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിനെയും താഴെ കുറുകെയുള്ള വര ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിനെയും കാണിക്കുന്നു.

ശിശുവിന്റെ തലയിലെ ഈ അഞ്ചെല്ലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സുച്ചേഴ്സ് (Sutures) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലയിലെ എല്ലകൾ പ്രായപൂർത്തിയായ നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനുപകരം എല്ലകൾ തമ്മിൽ തൊടാതെ നേരിയ തൊലി (Membranes)യാൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ


വസമയത്തു് ഉപസ്ഥാശയത്തിൽക്കൂടി കടന്നുപോരേണ്ട ശിശുവിന്റെ തല, ഏതുവിധത്തിൽ ചുരുങ്ങിയാൽ സുഗമമായി പുറത്തേക്കു വരുവാൻ കഴിയുമോ ആ വിധത്തിൽ ചുരുങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു് ഇപ്രകാരം എല്ലുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്തുറപ്പിക്കാതെ പ്രകൃതി നിബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. നവജാതശിശുവിന്റെ തലയിലെ എല്ലുകളുടെ മദ്ധ്യേ പതുപതുപ്പായ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഉച്ചിയെന്നാണല്ലോ ആ ഭാഗത്തിനു് നാം പറയാറുള്ളതു് ഉച്ചി ഉറച്ചിട്ടില്ല എന്നു് സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുമുണ്ടല്ലോ. കുട്ടിയുടെ തലയുടെ മദ്ധ്യഭാഗങ്ങളിൽ മുമ്പിലും പുറകിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന പതുപതുപ്പായ കുഴികൾക്കു് അഥവാ ഉച്ചിക്ക് (ഫോൺടനലൈ-Fontanelle) എന്നു പറയുന്നു. ഇവയിൽ വലിയതു് ചതുഷ്കോണാകൃതിയിൽ തലയുടെ മുൻഭാഗത്തും (ആന്റീരിയർ ഫോൺടനലൈ-Anterior Fontanelle), മററതു് ത്രികോണാകൃതിയിൽ പിൻഭാഗത്തും (പോസ്റ്റീരിയർ ഫോൺടനലൈ-Posterior Fontanelle) ആകുന്നു. പ്രസവഘട്ടത്തിൽ യോനിമാറ്റേണ മിഡ് വൈഫ് നടത്തുന്ന സ്പർശനപരിശോധനയിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളും സഹായകമായിത്തീരുന്നു. മുൻഭാഗത്തുള്ള ഉച്ചി ശിശുവിനു് ഏകദേശം ഒന്നര വയസ്സാകുന്നതോടുകൂടിമാത്രമേ നികന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ

ചിത്രം 35
ശിശുശിരസ്സ്



പിൻഭാഗത്തുള്ള ഉച്ചിപ്രസവശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നികന്നു് അദൃശ്യമായിത്തീരുന്നതാണു്.


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലയുടെ ആകൃതി ഏതാണ്ടു് കോഴിമുട്ടയുടേതുപോലെയാണു്. താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും, ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെ അളവുകളും മനസ്സിലാക്കുക.



ചിത്രം 36: ശിശുവിന്റെ തലയോട്ടു്.

A: തലയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള എല്ലു് C: ചെന്തിഎല്ലു്
B: പിൻഭാഗത്തുള്ള എല്ലു് D: നെറ്റിഎല്ലു്

1 താടിയും കഴുത്തും ചേരുന്നഭാഗത്തുനിന്നു് ഉച്ചിയിലേയ്ക്കുള്ള അളവു്. 2. ഉച്ചിയിൽനിന്നു് താടിയുടെ അറ്റത്തേയ്ക്കുള്ള അളവു്. 3. പിടലിയിൽനിന്നു് നെറ്റികെയിലേയ്ക്കുള്ള അളവു്. 4. പിടലിയിൽനിന്നും നെറ്റിയുടെ മേൽഭാഗത്തേയ്ക്കുള്ള അളവു്. 5. കഴുത്താ താടിയും ചേരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നു് നെറ്റികെയിലേയ്ക്കുള്ള അളവു്. 6, തലയുടെ പിൻഭാഗത്തു് എല്ലിപ്പാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്നു് മൂക്കിന്റെ മേഖലാഗംവരെയുള്ള അളവു്. 7. നെറ്റികയിലുള്ള എല്ലിപ്പാത്ത ഭാഗം. 8. തലയുടെ പിൻഭാഗത്തു് എല്ലിപ്പാത്ത ഭാഗം.



ചിത്രം 37: CRANIUM OF THE NEW BORN (SIDE VIEW)

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Frontal Bone. | 2. Parietal Bone |
| 3. Temporal | 4. Occipital |

The lines shows the directions of:-

5. Greater oblique measurement.
6. Lesser oblique measurement.
7. Intermediate oblique measurement.
8. Longitudinal measurement.

കുട്ടിയുടെ തലയുടെ അളവുകൾ


- A. പുണ്ണുവളച്ചയെത്തിയ ഒരു ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലയ്ക്ക് ഏകദേശം 11 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 8 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 28 സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
- B. തലയുടെ മുൻഭാഗത്തെ ഉച്ചിയിൽനിന്നും താടിയുടെ അറ്റത്തേയ്ക്കുള്ള അളവ് (Vertico Mental Diameter), 14 സെന്റിമീറ്ററും, പിൻഭാഗത്തെ ഉച്ചിയിൽനിന്നും താടിയുടെ അറ്റത്തേയ്ക്കുള്ള അളവ് 17 സെന്റിമീറ്ററുമാകുന്നു.

- C. തലയുടെ പിൻഭാഗത്തെ ഉച്ചിയിൽനിന്നും മുകളിന്റെ മേൽഭാഗം വരെയുള്ള അളവ് (Occipito Frontal Diameter) ഏകദേശം 11 സെന്റീമീറ്റർ ആകുന്നു.
- D. തലയും പിടലി(പിരടി) യും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും നെറ്റിയുടെ മേൽഭാഗത്തേയ്ക്കുള്ള അളവ് (Suboccipito Frontal Diameter) ഏകദേശം 10 സെന്റീമീറ്ററും,
- E. പിടലിയിൽനിന്നും നെറുകയിലേയ്ക്കുള്ള അളവ് (Suboccipito Bregmatic Diameter) 10 സെന്റീമീറ്ററും,
- F. കഴുത്തും താടിയും ചേരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും നെറുകയിലേയ്ക്കുള്ള അളവ് (Submento Bregmatic Diameter) 9 സെന്റീമീറ്ററും,
- G. കഴുത്തും താടിയും ചേരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും ഉച്ചിയിലേയ്ക്കുള്ള അളവ് (Submento Vertical Diameter) 11 സെന്റീമീറ്ററും ആകുന്നു.

പ്രസവം

ഗർഭധാരണത്തിനുമുമ്പുണ്ടായ അവസാനത്തെ ആത്മ വാരംഭദിനം മുതൽ 280 ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്ന തോടുകൂടി പ്രസവലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നതാണ്. സ്ത്രീന്യാപജീവികളിൽ സഹജമായുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ യാണ് പ്രസവം. പ്രസവസന്ധിയിൽ ഗർഭാശയകണ്ഠം (സെർവിക്സ്), ഗേലാറമാറ്റം (വജയിനൽ കനാൽ-Vaginal Cannal), യോനിമുഖം എന്നീ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വികസിച്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു കഴൽപോലെയായിത്തീരുന്നു.

പ്രസവമുക്കുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ജനന മുഖം (ആദ്യം പിറകുന്ന ഭാഗം) ഉപസ്ഥാശയത്തിലേക്ക് താഴുന്നു. പ്രഥമ ഗർഭിണികളിൽ പ്രസവതീയതിക്കു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പുതന്നെ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള പ്രസവങ്ങളിൽ പ്രസവവേദന (ലേബർ പെയിൻ-Labour Pain) യുടെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമേ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗം കീഴോട്ടിരുന്നതായും, ഗർഭിണിക്കുണ്ടായിരുന്ന ശ്വാസവിമിഷ്ടം കുറഞ്ഞതായും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഗർഭാശയഭാഗം കീഴോട്ടിരുന്നു മുത്രാശയത്തിൽ അമച്വ വരുത്തുന്നതിനാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭിണിക്കു കൂടെക്കൂടെ മുത്രശങ്കയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാലുകളിൽ വീക്കവും വേദനയും, അപൂർവ്വമായി ചിലർക്ക് അർശ്ശസ്സിന്റെ (മൂലക്കുരു) ഉപദ്രവവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.



ചിത്രം 38: PHYSIOLOGY OF LABOUR

Note distention of Perineum with opening of anus, This being called "Crowning"; the head rises up on pubis; Chin drops over perineum, external restitution; light pressure down ward aids delivery of the anterior Shoulder; lifting head up allows posterior Shoulder to come out.

Follow action from above.

പ്രസവവേദന (LABOUR PAIN)

ഗർഭം പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുവാനും വികസിക്കുവാനും ആരംഭിക്കുന്നതും ഗർഭസ്ഥശിശുവിനെ പുറത്തേക്കു തള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗർഭാശയത്തിന്റെ ചുരുങ്ങൽ (കൺട്രാക്ഷൻ-**Contraction**) മൂലം ഉത്ഭവമാകുന്ന വേദനയ്ക്കാണ് ലേബർ പെയിൻ അഥവാ പ്രസവവേദന എന്നു പറയുന്നത്. പ്രസവവേദനയ്ക്ക് നോവ് എന്നും പ്രസവവേദന ആരംഭിച്ചതിന് നോവ് കെട്ടി എന്നും ഗ്രാമീണസ്ട്രീകൾ പറയാറുണ്ട്. ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തെ മാംസപേശികൾ സങ്കോചിക്കുകയും (ചുരുങ്ങുകയും) കീഴ്ഭാഗത്തെ മാംസപേശികൾ അയയുകയും (റിലാക്സേഷൻ-**Relaxation**) തന്മൂലം ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തിന് കട്ടികൂടുകയും കീഴ്ഭാഗമായത് കട്ടികുറഞ്ഞതും മാർദ്ദവമുള്ളതുമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസവവേദന നീണ്ടുനില്ക്കുന്നപക്ഷം, ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗവും കീഴ്ഭാഗവും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്തു് മോതിരാകൃതിയിൽ ഒരു വളയം സ്പർശിക്കാറാകുന്നു. സാധാരണ പ്രസവത്തിൽ ഈ വളയം നാഭിയെല്ലിന്റെ നിരപ്പിന് താഴെയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാറില്ല. വളരെനേരം അസഹനീയമായ നോവ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വളയം മേലോട്ടുയരുകയും നാഭിയെല്ലിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതു് അപകടകരമായ ഒരു സൂചനയായി മിഡ്വൈഫ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും കഴിയുന്നത്രവേഗം ഈ വിവരം ഡാക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു.

വ്യാജനോവ് (ഫാൾസ് പെയിൻ-FALSE PAIN)

ഏറെക്കുറെ പ്രസവവേദനപോലെതന്നെയുള്ള ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുമുണ്ടെന്നു. ഈ വേദന വയർ ആകമാനവും ഒരുതരം കടിപോലെയുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

മലശോധനയുണ്ടാക്കുന്നതിന് മരുന്നുകഴിക്കുകയോ, എന്നി മാവസ്സുകയോ ചെയ്താൽ ഈ കള്ളനോവ് ശമിക്കുന്നതായിരിക്കും.

യഥാർത്ഥ പ്രസവവേദന (ഘ്രൈവെയിൻ-TRUE PAIN)

ശരിയായ പ്രസവവേദന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതിനാലും അയയുന്നതിനാലുമാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രസവവേദന മുതുകിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നതും ക്രമേണ വേദന അധികരിച്ചും അസഹനീയമായും തീരുന്നതുമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രസവവേദന നിമിത്തമാണ് ഗർഭാശയം മാർദ്ദവരഹിതമായി തീരുന്നതും അതിന്റെ വായ് വികസിപ്പുവരുന്നതും, മുന്നീർക്കടം യോനിയിലേക്ക് തള്ളിവരുന്നതും.

പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾവായ് (ഇന്റേർണൽ ഓസ്-Internal Os) വികസിക്കുകയും ഗർഭാശയകണ്ഠത്തിന്റെ (സെർവിക്കസ്) നീളം കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു. (Obliteration of the Cervical Cannal).

പ്രസവവേദന അധികരിക്കുന്നപക്ഷം നാഡിമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം (ബ്ലഡ് പ്രഷർ-Blood Pressure) നിരക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു.

നോവ്, ഇടുപ്പിന്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ച് മുൻവശത്തുവന്ന് കാലുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായിൽ പററീയിരിക്കുന്ന മുന്നീർക്കടത്തോൽ അവിടെനിന്നും വേർപെടുന്നതിനാൽ രക്തവണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വാച്ചു് അടയാളം അഥവാ ഷോ (show) എന്നു പറയുന്നു. പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഥമ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണിത്.

പ്രസവഘട്ടങ്ങൾ

പ്രസവാൽ മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഗർഭിണിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ മിഡ് വൈഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതും ഡാക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ഒന്നാംഘട്ടം (FIRST STAGE)

ശരിയായ നോവ് (True pain) ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുന്നതുവരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് സാധാരണയായി ഒന്നാംഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ സമയം ആദ്യപ്രസവത്തിൽ ഏതാണ്ട് 12 മണിക്കൂർ മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെയും, പിന്നീടുള്ള പ്രസവങ്ങളിൽ ഏകദേശം 6 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെയും നീണ്ടുനില്ക്കും. ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിക്കുകയല്ലാതെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം അധികമായി കീഴോട്ടിറങ്ങുകയില്ല. കട്ടിയുടെ തല (സാധാരണ ജനനമുഖം) ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പതനത്തിന്റെ അവസാനസമയത്തോടുകൂടി ജനനമുഖം ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യഗർഭിണികളിൽ യോനീമാഗ്ഗമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് ഒരു നേരിയ വളയം പോലെ വിരലിൽ തടയുന്നതും അതിലൂടെ മുന്നീർക്കും ഒരു കുമിളപോലെ തള്ളിനില്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. വിരലുകൊണ്ട് അമർത്തിയാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

ഈ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പ്രസവവേദന (നോവ്) ലഘുവായിരിക്കുന്നതും ഏതാനും സെക്കൻറു മുതൽ ഒരു മിനിറ്റു വരെ മാത്രം നിലനില്ക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ക്രമേണ നോവ് വർദ്ധിച്ചു ഒന്നാംപതനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തോടടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നു മുതൽ പത്തു മിനിറ്റു വരെ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഛർദ്ദി ഉണ്ടായി എന്നുപരാം. ഛർദ്ദി ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായുടെ വികസനത്തിലും പ്രസവത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭിണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാൽ കുട്ടിയുടെ ജനനമുഖത്തിന്റെ ഘനംകൊണ്ട് ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ്കൊണ്ടായി വികസിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. പ്രസവത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് മലബന്ധവും മൂത്രതടസ്സവും പ്രതിബന്ധമാകയാൽ മലമൂത്രവിസർജ്ജനം ശരിയായി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിമ കൊടുത്ത് മലശ്ലോധനയുണ്ടാക്കേണ്ടതും കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മൂത്രം എടുത്തുകളയേണ്ടതുമാകുന്നു. ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചില കേസുകളിൽ മുന്നീക്കം പൊട്ടിപ്പോയെന്നു വരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുന്നതിന് പ്രയാസം നേരിടുന്നതും ഒന്നാംഘട്ടം ദീർഘിച്ചു പോകുന്നതുമാണ്.

മുന്നീക്കം നേരത്തെ പൊട്ടുന്നതു് അഭിലഷണീയമല്ലായെന്ന നിലവിലുള്ള അഭിപ്രായഗതിയിൽ ആധുനിക സുതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതു്. ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന സാധാരണ പ്രസവങ്ങൾക്ക് മുന്നീക്കം നേരത്തെ പൊട്ടുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളതു്. മുന്നീക്കം നേരത്തെ പൊട്ടുന്ന പല ഗർഭിണികളിലും പ്രസവം നേരത്തെ നടക്കുന്നതാ

യാൺ കണ്ടുവരുന്നത്. മുന്നീക്കടം പൊട്ടിക്കുന്നത്, പ്രസവത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപാധിയായി ഇന്നു സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ശിരോദയത്തിനുപകരം (തല ജനനമുഖമായിവരുന്ന അവസ്ഥ) അസാധാരണമായ ഉദയം (പ്രസരോദയം) ഉണ്ടാവുകയോ, പ്രസവത്തിനു വളരെ താമസം നേരിടുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനംവരെ മുന്നീക്കടം പൊട്ടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ഗർഭാശയത്തിലെ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾമൂലം മുന്നീക്കടം വളരെ നേരത്തെതന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ അപകടം സംഭവിച്ചേക്കാം. മുന്നീക്കടം വളരെ താമസിച്ച് പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ടും അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തു് ഒൻപതു സെന്റീമീറ്ററോളം വികസിച്ചിട്ടും, മുന്നീക്കടം പൊട്ടാതിരുന്നാൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിനെ ഗർഭപാത്രത്തിൽനിന്നും പുറത്തേയ്ക്കുതള്ളുവാനുള്ള സങ്കോചവികാസങ്ങൾ ക്ഷയോന്മുഖമായിത്തീരുന്നു. പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് മുന്നീക്കടം പൊട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നീക്കടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ആംനിയോൺ (Amnion) അതിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വേർപെട്ടെന്നോ വേർപെട്ടില്ലെന്നോ വരാവുന്നതാണ്. വേർപെട്ടാലും വേർപെട്ടില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ തല ആംനിയോൺ ചർമ്മസഞ്ചിയാൽ ആവരണംചെയ്യപ്പെട്ടനിലയിലാരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. മിഡ്വൈഫ് ഏറ്റവും വേഗം ശിശുശിരസ്സിലെ ഈ ആവരണം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ശിശു ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചുപോകുന്നതാണ്. ഗർഭാശയകണ്ഠം പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടും മുന്നീക്കടം പൊട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നോവില്ലാത്തസന്ദർഭം നോക്കി കരു ഉപയോഗിച്ച് അതു പൊട്ടിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നടപടി.

രണ്ടാംഘട്ടം (SECOND STAGE):-

ഗർഭാശയം പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചതിനുശേഷം, കുട്ടി പുറത്തേയ്ക്കുവരുന്നതുവരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് രണ്ടാംഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ജനനമുഖം ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും യോനീമാഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് മൂന്നിടം പൊട്ടുന്നതും മൂന്നീർ, യോനീമാഗ്ഗം—ജനനമാഗ്ഗം കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിക്കൊണ്ടു പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നതും. ഈ പതനത്തിലാണ് വേദന ശക്തമായിത്തീരുന്നതും, തുടരെത്തുടരെയുണ്ടാകുന്നതും. വേദന ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു മിനിറ്റുവരെ സമയം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതുമാണ്. ഗർഭിണി വേദന സഹിയാതെ നിലവിളിക്കുന്നതും ശക്തമായി മുക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗർഭിണിയെ കട്ടിലിൽനിന്നും മാറിക്കൂടാത്തതും, മലത്തിക്കിടത്തി കാലുകൾ മടക്കിക്കുത്തി അവരുടെ കൈകൾ കാണുതന്നെ കട്ടിലിലോ തുടകളിലോ അമർത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയുമാണ് കാണീയമായിട്ടുള്ളത്. ഈ അവസരത്തിൽ കാലുകളിലെ മസ്സിലുകൾ സങ്കോചിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നതിനാൽ ഉരുണ്ടു കയറും. (ക്രാമ്പ്—Cramps) ചിലർക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്.

ജനനമുഖം യോനീയിലേയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മലാശയത്തിന് അമച്ചുണ്ടാകുന്നതിനാൽ മലം വിസർജിക്കപ്പെടാനിടയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽതന്നെ എനിമാ കൊടുത്തു "മലാശയശുദ്ധിവരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രസവഘട്ടത്തിൽ മലവിസർജനം ഉണ്ടായാൽ ലോഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ട് മിഡ്‌വൈഫ് അതു പിന്നോക്കം

തുടച്ചുമാറേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഗർഭിണിക്ക് വിഷപ്പനി (Septic fever) ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ഗർഭസ്ഥശിശു യോനീവാതൽ കടക്കാറാകുമ്പോൾ ഗർഭിണിയെ ഇടതുവശത്തേയ്ക്ക് ചരിച്ചുകിടത്തുകയാണ് നല്ലത്. ഓരോ തവണ നോവുണ്ടാകുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ തല ക്രമേണ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങിവരുന്നു. കുട്ടി വരുന്ന മാഗ്നത്തിൽ കുറെനേരമിരുന്നുപോയാൽ ജനനമുഖം വീങ്ങിമുന്നോട്ടുതിവരുന്നതാണ്. കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സിൽ ഇപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന വീക്കത്തിന് അഥവാ മുഴയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റ് സക്ലീഡനം (Caput Succedaneum) എന്നു പറയുന്നു. പ്രസവശേഷം ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോ, ദിവസങ്ങളോ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സിലെ ഈ മുഴ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാംഘട്ടം ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി പ്രസവവും നടക്കുന്നു.

മൂന്നാംഘട്ടം (THIRD STAGE)

ശിശുജനനത്തിശേഷം മറുപിള്ള പൂണ്ണമായി പിറക്കുന്നതുവരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് മൂന്നാംഘട്ടം എന്നു പറയുന്നത്. പ്രസവം കഴിയുന്നതോടെ മാതാവിന്റെ വേദന പെട്ടെന്നു ശമിക്കുന്നതും, അവർ ആശ്വാസനിശ്വാസത്തോടെ കുറെസമയത്തേയ്ക്ക് അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നതുമാണ്. തുടന്ന് വീണ്ടും നോവാരംഭിക്കുന്നതും മറുപിള്ള പൂണ്ണമായി വെളിയിൽ വരുന്നതുവരെ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് നോവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ അടിവയറിൽ മെല്ലെ തടവിക്കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ആശ്വാസകരവും മറുപിള്ള വീഴാൻ സഹായകവുമാണ്. ഈ മൂന്നാംഘട്ടവും അരമണിക്കൂറിൽക്കൂടുതൽ നീണ്ടുനില്ക്കാറില്ല. മറുകിട്ടി പിറക്കുന്നതോടുകൂടി കുറെ രക്തവും

സ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഏതാനും ഔൺസിൾക്കുളതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

മറുപിള്ള ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽനിന്നും വേർപെട്ടു പോന്നതിനുശേഷം ഗർഭാശയം നല്ലതുപോലെ ചുരുങ്ങാത്തപക്ഷം രക്തസ്രാവം (ഹെമറേജ് - Haemorrhage) ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. മറുപിള്ള പോന്നശേഷം ഗർഭാശയം നന്നായി ചുരുങ്ങിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ മാത്രമേ രക്തം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ മറുകൂടി പിറന്നതിനുശേഷം വയറിനുമീതെ കൈവച്ച് ഗർഭാശയത്തെ സ്പർശിച്ചുനോക്കിയാൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്ര വലിപ്പത്തിലും, കട്ടിയുള്ള ഒരു പന്തിന്റെ ആകൃതിയിലും അത് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

സാധാരണ പ്രസവത്തിൽ ഏതാണ്ടു മൂന്നു മില്ലീലിറ്റർ (10 ഔൺസ്) രക്തത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പകുതി മറുപിള്ളയുടെ പിറവിക്കു മുമ്പും പകുതി അതിന്റെ പിറവിയോടുകൂടിയുമാണ് പോകുന്നത്.

പ്രഥമഗർഭിണികളിൽ—വിശേഷിച്ചു മുപ്പതു വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള പ്രഥമഗർഭിണികളിൽ പ്രസവത്തിനു 20 മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കാറുണ്ട്.

ഒന്നിലധികം പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്ത്രീകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രസവിക്കാറുണ്ട്.



ചിത്രം 39: THIRD STAGE OF LABOUR.

Delivery of the placenta. Cord laid straight up, gauze sponge in episiotomy wound: cord advancing, from loop showing that placenta has loosened and slipped down, placenta with blood behind it appears, note that traction is not made on cord; only membranes still attached, note how midwife places basin-not over anus; weight of placenta drags membranes off; aid last part of membranes with finger.

Follow action from above down ward.


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശയനനിലയും ജനനമുഖവും

(LIE AND PRESENTATION OF FOETUS)


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ കിടപ്പ് (ശയനനില) ഏതെല്ലാംവിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായും മിഡ്‌വൈഫ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശിശുവിന്റെ ശയനനിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജനനമുഖത്തിന്റെ അഥവാ ഉദയഭാഗത്തിന്റെ (പ്രസുറേറഷൻ) ആവിർഭാവം.

ശയനനില


I. നെടുങ്കൈയുള്ള കിടപ്പ് (LONGITUDINAL LIE):—കുട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽ മേലുകീഴായിക്കിടക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ തലയോ, പൂച്ചുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം താഴെയോ മുകളിലോ ആയി വരുന്നു. നെടുങ്കൈയുള്ള കിടപ്പിന്റെ വിവിധ മാതൃകകൾ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക.




ചിത്രം 40



ചിത്രം 41



ചിത്രം 42




ചിത്രം 43

നെടുകെത്തുളുശയന്നില - വിവിധമാതൃകകൾ

ഈ കീടപ്പിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല, നെറ്റി, മുഖം, പൂപ്പും എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ജനനമുഖം അഥവാ ഉദയഭാഗമായി വരുന്നത്.

II. വിലങ്ങനെയുള്ളകീടപ്പ് (TRANSEVERSE LIE):- കുട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽ കുറുകെയായി കിടക്കുന്ന ഈ ശയനനിലയിൽ അതിന്റെ തല ഒരു വശത്തും പൂപ്പും മറുവശത്തുമായിരിക്കും. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തോൾ, മുട്ടുകെ, കൈ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ആദ്യമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ കുട്ടിയുടെ ശയനനില വിലങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും.



ചിത്രം 44: ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ
വിലങ്ങനെയുള്ള കീടപ്പ്
(TRANSVERSE POSITION OF FETUS)

ജനനമുഖം (പ്രസന്റേഷൻ—PRESENTATION)

ഗർഭിണിയുടെ യോനിമാഗ്ഗത്തിലൂടെ വിരലുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശിശുവിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണോ വിരലുകൾ ആദ്യമായി സ്പർശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിന് ജനനമുഖം അഥവാ ഉദയഭാഗം എന്നു പറയുന്നു. പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ഉദയഭാഗമായി വരാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

- I) ശിരസ്സ് (VERTEX PRESENTATION):— കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സിൽ എല്ലില്ലാതെയുള്ള (Posterior Fontanelle) ഭാഗം (ഉച്ചി) ജനനമുഖമായി വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വെർട്ടക്സ് പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
- II മുഖം (FACE PRESENTATION):— മുഖം ആദ്യമായി വരുന്നതിന് അഥവാ മുഖം ഉദയഭാഗമായി വരുന്നതിന് ഫേയ്സ് പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
- III നെറ്റി (BROW PRESENTATION):— നെറ്റി ജനനമുഖമായി വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ബ്രോ പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
- IV പൂഷ്യം (BREECH PRESENTATION):— ശിശുവിന്റെ ആസനം ജനനമുഖമായി വരുന്നതിന് ബ്രീച്ച് പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
- V കാൽമുട്ട് (KNEE PRESENTATION):— ശിശുവിന്റെ കാൽമുട്ട് ജനനമുഖമായി വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് നീ പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
- VI പാദം (FOOT PRESENTATION):— കുട്ടിയുടെ ഒരു പാദം ആദ്യംവരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഫുട്ട് പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.
- VII തോൾ (SHOULDER PRESENTATION).— ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോൾ ഉദയഭാഗമായി വരുന്നതിന് ഷോൾഡർ പ്രസൻറേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.

VIII കൈമുട്ട് (ELBOW PRESENTATION):- കുട്ടി

യുടെ കൈമുട്ട് ജനനമുഖമായിവരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എൽബോ പ്രസന്റേഷൻ എന്നു പറയുന്നു.

IX കൈ (HAND PRESENTATION):- ശിശുവി

ന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കയ്യ് ജനനമുഖമായി വരുന്നതിന് ഹാൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ എന്നും പറയുന്നു.

മേൽപറയപ്പെട്ട പലവിധ ജനനമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ആകുന്നു. 96 ശതമാനം പ്രസവങ്ങളും ഈ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃത്യാലുള്ളതും അപകടരഹിതവുമായ ഉദയഭാഗം അഥവാ ജനനമുഖം.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ നില (POSITION)

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം, ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചാണ് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ നില നിണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. തലയാണ് കീഴോട്ടിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പിൻഭാഗം ഇടത്തോ വലത്തോ എന്നു നിണ്ണയിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മുഖമോ പൂഷ്യമോ ജനനമുഖമായി വരുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തോ പിൻഭാഗത്തോ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗം തലയായാലും പൂഷ്യമായാലും മാതാവിന്റെ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് ഇടതുവശം മാറിയിരുന്നാൽ അതിന്

ഒന്നാംനിലയെന്നും, വലതുവശം മാറിയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടാംനിലയെന്നും, കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗം മാതാവിന്റെ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് വലതുവശം ചേർന്നാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നാംനിലയെന്നും, ഇടതുവശം ചേർന്നാണെങ്കിൽ നാലാംനിലയെന്നും പറയുന്നു. കുട്ടി ഏതു നിലയിലായാലും ഏതു വിധത്തിൽ കിടന്നാലും സാധാരണയായി അതിന്റെ ശിരസ്സ് മുന്നോട്ടുകുനിഞ്ഞും ഉടൽ വളഞ്ഞും കൈകൾ മാറിടത്തിൽ ചേർത്തു മടക്കിയും താടി നെഞ്ചോടുചേർന്നും കാലുകൾ മടങ്ങിയും ആകെക്കൂടി വളരെക്കുറച്ചു മാത്രം സ്ഥലമുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് ഏതാണ്ടു് ചുരുങ്ങുകൂടിയമട്ടിലാണു് ഗർഭാശയത്തിൽ അതു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കിടപ്പു്, നില, ഉദയഭാഗം (ജനനമുഖം) എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.


1) വയറിനുമീതെയുള്ള പരിശോധന (അബ്ഡോമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ-Abdominal Examination) ഇതു് മൂന്നു വിധത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണു്.

a) വീക്ഷണം (INSPECTION):- ആദ്യമായി മിഡ് വൈഫു് ഗർഭിണിയുടെ സമീപത്തുനിന്നുകൊണ്ടു് വയറിന്റെ സ്ഥിതി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഗർഭിണിയുടെ വയറിന്റെ മേലുകീഴായുള്ള നീളം വീതിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശിശു മേലുകീഴായിട്ടാണു് കിടക്കുന്നതു് (Longitudinal lie) എന്നു് തീരുമാനിക്കാം. വയറിന്റെ വീതി, നീളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുട്ടി വിലങ്ങനെ (Transvers lie) യാണു് കിടക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. കുട്ടിയുടെ പുറം (Back side) ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തായാണു് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതു്. എന്നാൽ ശിശുവിന്റെ പുറം ഗർഭാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയുടെ വയറു് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞു് മുന്നോട്ടു തള്ളിയിരിക്കുന്നതായും കുട്ടിയുടെ കൈകാലുകളും മുട്ടുകളും കൂടെക്കൂടെ മുഴച്ചുവരുന്നതു പോലെയും കാണാവുന്നതാണു്.

ഗർഭം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പൊക്കിളിനച്ചുറുമുളള വയറിന്റെ അളവ് സാധാരണയായി നൂറു സെന്റീമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഈ അളവിൽ കൂടുതലായി തോന്നിക്കുന്നപക്ഷം അത് മൂന്നീർ ആധികം (Hydraminos) കൊണ്ടോ, ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ (Twins), കോശമുഴ (ട്യൂമർ-Tomour) വളരെ വലിപ്പംകൂടിയ കുട്ടി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുംകൊണ്ടോ ആയിരിക്കും.

b) സ്തർശ്വപരിശോധന (PALPATION):- സ്തർശ്വപരിശോധന നാലു വിധത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒന്ന്:- ഫണ്ടൽ ഗ്രിപ്പ് (FUNDAL GRIP)



ചിത്രം 45: ബാഹ്യപരിശോധന.

ഫണ്ടൽഗ്രിപ്പ് ഉയർച്ച നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി
(Fundal grip)


ഗർഭിണിയെ മലർത്തിക്കിടത്തി അവളുടെ കാലുകൾ അല്പം അകറ്റി മടക്കിക്കുത്തിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് മിഡ് വൈ ഫ് അവൾക്കഭിമുഖമായി വലതുവശത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ കമഴ്ത്തി ഉദരത്തിൽവെച്ച് കുട്ടിയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും ഫണ്ടസ്സിന്റെ ഉയച്ചയും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ സാവധാനത്തിൽ തലോടിനോക്കുക.

ഈ സ്പർശപരിശോധനയിൽ ആദ്യമായി ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് (Fundus) അമർത്തിനോക്കി അവിടെ കുട്ടിയുടെ ഏതു ഭാഗമാണു് കിടക്കുന്നതെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കണം. മേൽഭാഗത്തു് സ്പർശിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗം ഉരുണ്ടതും സാമാന്യം കഠിനമായും ആണു് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതു് കുട്ടിയുടെ തലയാണെന്നും മറിച്ച് വലിപ്പംകൂടിയും മാർദ്ദവപ്പെട്ടുമാണു് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതു് പൃഷ്ഠമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. കുട്ടിയുടെ തല ഉരുണ്ടും കുട്ടിയായരീതിയിലും അങ്ങോട്ടു മിങ്ങോട്ടും തള്ളിമാറാവുന്ന വിധത്തിലും, പൃഷ്ഠഭാഗം വലിപ്പംകൂടിയും പതുപതുപ്പായിട്ടും തള്ളിയാൽ ഇളകാത്ത രീതിയിലുമായിരിക്കുമെന്നു് സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് ശിരസ്സോ പൃഷ്ഠഭാഗമോ കാണാത്തപക്ഷം കുട്ടിയുടെ കിടപ്പു് വിലങ്ങനെയാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കണം.

രണ്ടു്:- അംബിലിക്കൽ ഗ്രിപ്പു് (UMBILICAL GRIP)


ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിനു് ഇരുവശത്തും മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരം അമർത്തിനോക്കിയാൽ കുട്ടിയുടെ പുറം പൊക്കിളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും കൈകാലുകൾ കഴയും മുഴയുമായി മറുവശത്തും കാണാം.



ചിത്രം 46: പൊക്കിളിൻ്റെ ഇരുവശവുമായുള്ള പരിശോധന
(Umbilical grip)

മൂന്നും:- പെൽവിക് ഗ്രിപ്പ് (FIRST PELVIC GRIP)

ഗർഭിണിയുടെ നാഭി അടക്കിപ്പിടിച്ചുനോക്കിയാൽ കുട്ടിയുടെ ഏതു ഭാഗമാണ് ജനനമുഖമായി വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രസവാരംഭത്തിൽ കുട്ടി ഉപസ്ഥമാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉദയഭാഗം, പൂച്ചും, നെററി, മുഖം, ഇതിലേതെങ്കിലുമോ ശിരസ്സിന്റെ നാലു




ചിത്രം 47. ഒരു കൈകൊണ്ട് നാഭി അടക്കിപ്പിടിച്ച് ജനനമുഖം നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി (First pelvic grip)

നിലകളിൽ മൂന്നാമത്തേതോ നാലാമത്തേതോ ആയിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കുകയോ, കുട്ടിക്കുമ്പായി മറുപിള്ള സ്ഥിതിചെയ്യുകയോ, കുട്ടിയുടെ തല വളരെ വലുതായിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുകയില്ല. നോവ് തുടങ്ങിയിട്ടും ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ക്രമവിരുദ്ധമായ നിലയിൽ പ്രസവം വളരെ ക്ലേശകരമാവാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

നാലും:-പെൽവിക് ഗ്രിപ്പ് (SECOND PELVIC GRIP)




ചിത്രം 48: ഇരുകരങ്ങളുമ്പയോഗിച്ച് നാഭി അടക്കിപ്പിടിച്ച് ജനനമുഖം നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി (Second pelvic grip)

മിഡ്‌വൈഫ്, ഗർഭിണിയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ട് നാഭിയുടെ ഇരുവശത്തും കൈകൾ കമഴ്ത്തിവെച്ച് അമർത്തിനോക്കുക. കുട്ടിയുടെ തല ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് താടിയുടേയും തലയുടേയും പിൻഭാഗത്തിന്റേയും നിലകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം.

മൂത്രാശയം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മുഴുപോലെ നാഭിയെല്ലിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് കാണുമെന്നുള്ളതിനാൽ മിഡ്‌വൈഫ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയാകരുത്.


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയശബ്ദശ്രവണം (AUSCULTATION OF FOETAL HEART)



ചിത്രം 49 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയശബ്ദശ്രവണരീതി

കരസ്സർശന പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം മിഡ്‌വൈഫ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പിന്റെ (Foetal Stethoscope or Obstetric Stethoscope) സഹായത്തോടെയോ, ഗർഭിണിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ ചെവിമുട്ടിച്ചുവെച്ചോ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്വരനന്ദനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കുട്ടിയുടെ ഹൃദയസ്വരനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം അതിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ കിടപ്പിന് അനുസരണമായിരിക്കും. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു നിസ്സുവാച്ചിന്റെ അടിപ്പോലെയായിരിക്കുന്നതും മിനിറ്റിൽ 120 പ്രാവശ്യം മിടിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പും ഗർഭാശയത്തിന്റെ സീല്ലാശബ്ദം (യൂട്ടറിൻ സൂഫിൾ—Uterine Souffle) വും ഏകകാലത്തു ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഗർഭാശയ സീല്ലാശബ്ദം ഗർഭിണിയുടെ ഹൃദയസ്വരനത്തിനനുസരണമായി മിനിറ്റിൽ 72 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

കുട്ടിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേഷനോപ്പോസ്റ്റ് അതിന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനം ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.



ചിത്രം 50

ശിരോദയത്തിലും (Vertex) പൃഷ്ഠാദയ (Breech) ത്തിലും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ. O ഈ അടയാളം നോക്കുക

ശിരസ്സ് ഒന്നാംനിലയിൽ:-

- 1) കുട്ടിയുടെ ഹൃദയസ്ഥാനം ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിത്താഴെ ഇടതുഭാഗത്തായി ശ്രവിക്കാം.

ശിരസ്സ് രണ്ടാംനിലയിൽ:-

- 2) കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിത്താഴെ വലതുഭാഗത്തായി ശ്രവിക്കാം.

ശിരസ്സ് മൂന്നാംനിലയിൽ:-

- 3) രണ്ടാംനിലയിൽ ഏയസ്സനം ശ്രവിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നും അല്പംകൂടി വലത്തോട്ടുമാറിയാണു് ഈ നിലയിൽ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്.

ശിരസ്സ് നാലാംനിലയിൽ:-

- 4) ഒന്നാംനിലയിൽ ഏയസ്സനം ശ്രവിച്ചസ്ഥാനത്തുനിന്നും അല്പം ഇടത്തോട്ടുമാറി ശ്രവിക്കാവുന്നതാണു്.
- 5) കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏയസ്സനം അതിന്റെ നെഞ്ചിൽ കൂടിയാണു് കേൾക്കുന്നതു്. സാധാരണയായി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഏയസ്സനം അതിന്റെ പുറകവശത്തുനിന്നുമായിരിക്കും ശ്രവിക്കുക.
- 6) മുഖത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും നിലകളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ അതിന്റെ ഏയമിടിപ്പ് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിന്റെയും ഒക്കെല്ലിന്റേയും (Crest of Ileum) മദ്ധ്യേകൂടിയിരിക്കും അപൂർവ്വമായെങ്കിലും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതു്. കേട്ടാൽതന്നെ വ്യക്തമായിരിക്കുമില്ല.
- 7) മുഖത്തിന്റെ മൂന്നാംനിലയിലും നാലാംനിലയിലും ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിന്റേയും ഒക്കെല്ലിന്റേയും മേൽവക്കിലുള്ള മുഴയുടെ മദ്ധ്യേ ഇടത്തോ വലത്തോ ഭാഗത്തായി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഏയമിടിപ്പ് ശ്രവിക്കാം.
- 8) നെറ്റി ജനനമുഖമായി വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന്റെ ഏയസ്സനം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.
- 9) പൃഷ്ഠം ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പുറം ഏതു ഭാഗത്തേയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞി

രിക്കുന്നുവോ ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്.


- 10) പൂച്ചു ഒന്നാംനിലയിലാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിന്റെ നിരപ്പിന് അല്പം ഇടത്തോട്ടോ, മേൽഭാഗംകണ്ട് അല്പം ഇടത്തോട്ടു മാറിയോ ആയിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പു കേൾക്കുക.
- 11) പൂച്ചുത്തിന്റെ രണ്ടാംനിലയിൽ മേൽപറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തുതന്നെ അല്പം വലത്തോട്ടുമാറിയായിരിക്കും ഹൃദയമിടിപ്പു കേൾക്കുന്നത്.
- 12) പൂച്ചുത്തിന്റെ മൂന്നാം നാലാം നിലകളിൽ ചില കേസുകളിൽ ഹൃദയസ്വന്ദനം കേൾക്കുവാനേ കഴിയുകയില്ല. കേൾക്കുന്ന കേസുകളിൽ അത് പൊക്കിളിന്റേയും വാരിയെല്ലിന്റേയും മദ്ധ്യേയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭഗവതാചാര്യരുടെ പരിശോധന

യോനീമാർഗ്ഗമായി ഗർഭപരിശോധന നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയുടെ ഗുഹ്യപ്രദേശം ശുദ്ധിയാക്കുക. അതിനുശേഷം ഗർഭിണിയെ മലർത്തിക്കിടത്തി കാലുകൾ അകറ്റി മടക്കിക്കുത്തിച്ചതിനുശേഷം പ്രഥമദശനത്തിൽ ഗുഹ്യപ്രദേശത്തു പ്രത്യേകതകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കണം. നോട്ടത്തിൽ യോനീവീക്കം, പഴുപ്പു പോലെയുള്ള വാച്ച്, വലുതായി വീർത്ത രക്തസിരകൾ, വൃണം എന്നിവ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. യോനീവീക്കമുണ്ടെങ്കിൽ വൃക്കരോഗവും, ചലംപോലെയുള്ള വാച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഉഷ്ണപ്പണ്ണം ഗർഭിണിക്കുണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് മിഡ്‌വൈഫ് മനസ്സിലാക്കണം.

അനന്തരം മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ കൈകൾ സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയതിനുശേഷം ലൈസോൾ (Lysol) ലോഷനിൽ മുക്കി

വച്ചതിനുശേഷം ഗർഭിണിയുടെ വലതുവശത്തുനിന്നുകൊണ്ടു് ഇടതുകൈവിരലുകൾകൊണ്ടു് യോനിദളങ്ങൾ അകറ്റി വലതുകയുടെ രണ്ടു വിരലുകൾ യോനിയിലേയ്ക്കു കടത്തി താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.



ചിത്രം 51: ഭഗദാരമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധനാക്രമം. യോനിയിലേയ്ക്കു് രണ്ടു വിരലുകൾ കടത്തുന്നു. ഉള്ളിലേയ്ക്കു് വിരലുകൾ കയറുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രത്യേകഗതി ശ്രദ്ധിക്കുക.

- 1 ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായു് എത്രത്തോളം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽനിന്നും പ്രസവം എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.
- 2 മുനീക്കടം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു് നോക്കുക.

- 3 കുട്ടിയുടെ ഏതു ഭാഗം ജനനമുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- 4 കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് വീക്കമുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും നിണ്ണയിക്കുക.
- 5 ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമോ അതിൽ മുഴുകലോ മറ്റോ ഉണ്ടോയെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക.
- 6 പൊക്കിൾക്കൊടി യോനിയിലേയ്ക്കുവീണിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കുക.
- 7 മൂത്രാശയം നിറഞ്ഞു യോനിയുടെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്ക് തള്ളിനില്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അത് വിരലിൽ തട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

പ്രസവവേദന അനുകൂലം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം മുന്നീക്കം സ്വയം പൊട്ടുന്നതുവരെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം. യോനീമാഗ്നമായുള്ള പരിശോധന കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുന്നീക്കം പൊട്ടാതിരിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ ഹൃദയസ്സന്ദനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരുവിധമായ പരിഭ്രമത്തിനും ധൃതികൂട്ടലിനും കാര്യമില്ല.

പ്രസവസമയത്ത് മിഡ്‌വൈഫ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:-

- a ഗർഭാശയഗുളം (സെർവിക്സ്) പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മുന്നീക്കം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- b സെർവിക്സ് പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചതിനുശേഷവും നോവിന് അനുസരണമായി ജനനമുഖം യോനിയിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോ തടസ്സമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

- c) കുട്ടിയുടെ കിടപ്പ് സാധാരണനിലയിലല്ലെങ്കിൽ മുന്നീർക്കടം, സെർവിക്സിനുള്ളിൽകൂടി കമ്പിളിന്റെ അറ്റംപോലെ കൂത്ത് പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളിവരും. ഇങ്ങനെ മുന്നീർക്കടം കൂത്തുള്ളി വരുന്നപക്ഷം എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക.


ഈ മൂന്നു സാഹചര്യത്തിലും ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രസവപുരോഗതി


തൊണ്ണൂറ്റിത്തൊള്ളായിരം പ്രസവങ്ങളിലും കുട്ടിയുടെ തലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമാണ് ജനനമുഖമായി വരുന്നത്. അതിൽതന്നെ ഭൂരിഭാഗവും വെർട്ക്സ് പ്രസന്റേഷൻ (ഉച്ചിയുടെ പിൻഭാഗം മുമ്പിൽവരുന്ന രീതി) ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉച്ചി ജനനമുഖമായി നാലു നിലകളിൽ വരാവുന്നതാണ്.

- 1 ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗം മുമ്പിലായി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഉള്ള നില. ഇതിന് എൽ. ഓ. ഏ. (Left Occipito Anterior L. O. A.) എന്നു പറയുന്നു.




ചിത്രം 52: ശിശു ശിരസ്സിന്റെ ഒന്നാംനില.
(Vertex Presentation—First Position—L. O. A.)




ചിത്രം 53: ഒന്നാംനില (ഉച്ചിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക)

- 2 ശിശുവിന്റെ തലയുടെ പിൻഭാഗം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലതു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള നില. ഇതിനു് ആർ.ഒ.ഏ. (Right Occipito Anterior—R. O. A.) എന്നു പറയുന്നു.




ചിത്രം 54: ശിശുശിരസ്സിന്റെ രണ്ടാംനില (Vertex Presentation—Second Position—R. O. A.)




ചിത്രം 55: രണ്ടാംനില (ഉച്ചിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക).

- 3 കട്ടിയുടെ ശിരസ്സിന്റെ പിൻഭാഗം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു വലതുവശത്തായിട്ടുള്ള നില. ഇതിനു ആർ. ഓ. പി. (Right Occipito Posterior-R. O. P.) എന്നു പറയുന്നു.




ചിത്രം 56: ശിരസ്സിന്റെ മൂന്നാംനില.
(Vertex Presentation—Third Position—R. O. P.)




ചിത്രം 57: മൂന്നാംനില (ഉച്ചിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക).

- 4 കട്ടിയുടെ ശിരസ്സിന്റെ പിൻഭാഗം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് ഇടതുവശത്തായിട്ടുള്ള നില. ഇതിനു് എൽ. ഓ. പി. എന്നു പറയുന്നു. (Left Occipito Posterior—L. O. P)



ചിത്രം 58: ശിശുശിരസ്സിന്റെ നാലാംനില (Vertex Presentation—Fourth Position—L. O. P.)



ചിത്രം 59: നാലാംനില (ഉച്ചിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക).

പ്രസ്തുത നാലു നിലകളിൽ ആദ്യത്തേതായ എൽ. ഓ. ഏ. ആണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി കിടക്കുന്ന സാധാരണപ്രസവത്തിന്റെ പുരോഗതി:-

പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലാണ് പ്രസവം നടക്കുന്നതെന്നും നേരെത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുപല്ലോ. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കുട്ടി കീഴോട്ടിറങ്ങുന്നത് ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങി അതിനെ പുറത്തേക്കു തള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് കീഴോട്ടിറങ്ങി പുറത്തുവരുന്നത് താഴെപ്പറയുന്ന ആറു വിധ ചലനങ്ങൾ മൂലമാകുന്നു.

1) ഇറക്കം (DESCENT)

ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതുമിമിത്തമാണ് ജനനമുഖം കീഴോട്ടിറങ്ങുന്നത്. ഈ ചുരുങ്ങൽ രണ്ടാംഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പ്രസവാവസാനംവരെ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2) മടങ്ങൽ (FLEXION)

ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തിൽ വേദന തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ കുട്ടിയുടെ തല മുന്നോട്ട് ക

നിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നിർക്കടം പൊട്ടിയതിനുശേഷം തലയുടെ കുന്നിപ്പ് അധികമാകുകയും അത് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കുന്നിപ്പമൂലം കുട്ടിയുടെ തല നെറ്റിയെക്കാൾ താഴെയായിരിക്കുകയും ആ ഭാഗം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ അസ്ഥിബന്ധനങ്ങൾക്കുള്ളിന്മേൽ ആദ്യം വന്നുതടയുകയും തന്മൂലം അത് മുന്നോട്ടുതിരിയുകയും ചെയ്യും.

3) ഉള്ളിലുള്ള തിരിച്ചിൽ (INTERNAL ROTATION)

ശിരസ്സ് കീഴോട്ടു താഴ്ന്നതോറും ഉച്ചിയുടെ പിൻഭാഗം നാഭിയെല്ലിന്റെ കീഴിലും, നെറ്റി, പുണെല്ലിന്റെ മുമ്പിലുമായി തിരിയുന്നു.

നിവരൽ (EXTENSION)

തലയുടെ പിൻഭാഗം കീഴ്പ്പോട്ടിറങ്ങുന്നതിന് നാഭിയെല്ല് തടസ്സമായി തീരുന്നതുകൊണ്ട്, താടി, നെഞ്ചത്തുനിന്നും അകലുകയും മുമ്പും യോനീഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. തുടൻ നെറ്റി, മുമ്പും, താടി എന്നിവ ക്രമേണ പുറത്തേയ്ക്ക് വരുന്നു.

5) പൂർവ്വസ്ഥിതിപ്രാപിക്കൽ (RESTITUTION)

ഉപസ്ഥാശയത്തിലൂടെ കീഴോട്ടിറങ്ങുന്ന ശിശുവിന്റെ തല മുൻവശത്തേക്ക് വന്നുകഴിയുമ്പോൾ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

6) പുറത്തുള്ള തിരിച്ചിൽ (EXTERNAL ROTATION)

ശിശുവിന്റെ തല മുഴുവനും വെളിയിൽ വന്നശേഷം ഒരു തോൾ നാഭിയെല്ലിനു കീഴിലും മറേറു തോൾ പുണെല്ലിന് മുമ്പിലും ആകുന്നവിധം തല തിരിയുന്നു. പിൻഭാഗത്തുള്ള തോൾ ആദ്യവും നാഭിയെല്ലിന്റെ കീഴിലുള്ള തോൾ പിന്നാലെയുമായി കുട്ടി പുറത്തേയ്ക്ക് വരുന്നു. ശിശു ജനനം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭാശയം പത്തു് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റു നേരത്തേയ്ക്ക് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു. തുടൻ വീണ്ടും ചുരുങ്ങൽ ആരംഭിക്കുകയും അതോടുകൂടി ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നിർക്കടത്തോൽ അല്ലാല്ല

മായി ഇളകി വേർപെട്ട് അവസാനം എല്ലാംകൂടി ഒന്നിച്ചു വെളിയിൽ വരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നീർക്കടത്തോൽ ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽനിന്നും പുണ്യമായി വേർപെട്ടാലും വെളിയിൽ വരാതിരിക്കുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗംകണ്ടു് വയറിൽ തിരുമ്മിയാൽ ആതു പുറത്തുപോരുന്നതാണു്. മിഡ്വൈഫ് തന്റെ കൈ ശുദ്ധിയാക്കിയശേഷം യോനിയിൽനിന്നും മറുകട്ടിയെ സാവധാനത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറുപിള്ളയുടേയോ മുന്നീർക്കടത്തോലിന്റേയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകാനിടയാകരുതു്. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊട്ടി അകത്തിരുന്നുപോയാൽ രക്തസ്രാവം നില്ക്കുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണു്.

തല രണ്ടാംനിലയിലാണെങ്കിൽ പ്രസവം, ഒന്നാം നിലയിലേതുപോലെ തന്നെയാണു്. പക്ഷെ, അവസാനം തലയുടെ പുറത്തുള്ള തിരിച്ചിലിൽ പുറകുവശം വലത്തോട്ടും മുഖം ഇടത്തോട്ടും തിരിയുമെന്ന മാത്രമേയുള്ളൂ. തല മൂന്നും നാലും നിലകളിൽ ആണെങ്കിൽ ഇറക്കംകഴിഞ്ഞു് ഉള്ളിലുള്ള തിരിച്ചിലിൽ തലയുടെ പുറകുവശം നാലിയെല്ലിന്റെ കീഴിലേയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞുവന്നു് സ്വാഭാവികരീതിയിൽതന്നെ പ്രസവം നടക്കുന്നു. എന്നാൽ തലയുടെ പിൻഭാഗം മുമ്പോട്ടുതിരിഞ്ഞുവരാതിരുന്നാൽ അതു് പൂണെല്ലിന്റെ ചുവട്ടിലേയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞു് അവിടെ തങ്ങി നിന്നുപോകുന്നു. ഈ പതനത്തിൽ (Unreduced Occipito Posterior) പ്രസവം വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഗുഹ്യപ്രദേശം കീറിപ്പോകുന്നതിനും കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നതിനും മാതാവിനു് ഗുരുതരമായ തളച്ചിയും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയാകുന്നു. അതിനാൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗുരുവം മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും വേഗം വിദഗ്ദ്ധവൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതു് ഒരു മിഡ്വൈഫിന്റെ ചുമതലയാകുന്നു.

പ്രസവ പരിചരണം

പ്രസവക്കേസ്സിനുവേണ്ടി പോകുന്ന മിഡ്‌വൈഫ് നല്ല വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കപ്പായ (ബ്‌ളൗസ്സ്) കയ്യിൽ മുട്ടിനമുക്കളിൽ നില്ക്കുന്നതുകവിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം. കയ്യിൽ മോതിരമോ, വളയോ, വാച്ചോ അണിയാൻ പാടില്ല. പ്രസവസമയത്ത് ഗർഭിണിയെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ മിഡ്‌വൈഫ് ഏപ്രൺ (Apron) ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രസവപരിചരണത്തിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന മിഡ്‌വൈഫ് ഗർഭിണിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസവാരംഭമോയോ എന്ന് നിണ്ണയിക്കലാണ്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രസവസമയത്തിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ മിഡ്‌വൈഫ് വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. കറേ മണിക്കൂറു സമയത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ മിഡ്‌വൈഫിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമില്ലെന്നും വരാം. എങ്കിലും ഗർഭിണിയെ വിട്ടുപോകുന്നത് ശരിയായിരിക്കയില്ല. പ്രസവക്കേസ്സിന് വിളിച്ചയക്കുന്ന ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും സാവകാശവും ലഭിക്കുന്നതും, അപകടകരമായ വല്ല ലക്ഷണങ്ങളും

കണ്ടാൽ അതിന് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.

ഗർഭിണിയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉപസ്ഥമാശയത്തിന് വല്ല വൈരൂപ്യവുമുണ്ടോ എന്നും, കുട്ടി ക്രമവിരുദ്ധമായാണോ കിടക്കുന്നതെന്നും, കുട്ടിക്കു മുമ്പായി പൊക്കിടുകൊടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും മറ്റും പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. വൃക്കരോഗങ്ങൾ, അപസ്താര ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ചില സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്രസവക്കേസ്സിനുവേണ്ടി ഒരാൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പോകാൻ ഒരു മിഡ്വൈഫിന് ധർമ്മമായ ചുമതലയുണ്ട്. ഈ ചുമതല നിറവേറ്റാതിരിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിഭവംകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര നീതിബോധത്തിന് നിരക്കാത്തതും കുറ്റകരവുമാകുന്നു.

പ്രസവ പരിചരണത്തിനുവേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പ്രസവശുശ്രൂഷക്കാരവശ്യമായ എല്ലാ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. മിഡ്വൈഫറി ബാഗ് (Midwifery bag) ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അതിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങളെങ്കിലും എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

- 1 തെർമോമീറ്റർ (Thermo-meter) പനിനോക്കുന്നതിനുള്ള ഉഷ്ണമാപിനി.
- 2 കതീറ്റർ (Catheter) മൂത്രമെടുക്കുവാനുള്ള കഴൽ (മൂത്രക്കുരു)
- 3 എനിമാകാൻ (Enema-can) മലാശയം ശുദ്ധിവരുത്താനുള്ള ഉപകരണം.
- 4 ഡൂഷിംഗ് സിറിഞ്ച് (Douching Syringe or Douch can and Nozzles) യോനി കഴുകാനുള്ള ഉപകരണം.

- 5 സോപ്പ് (Soap)
- 6 നെയ്ൽ ബ്രഷ് (Nail brush) നഖങ്ങളും മറ്റും തേച്ചുകഴുകാനുള്ള ബ്രഷ്.
- 7 പഞ്ഞി (Sterilized Cotton)
- 8 ബാൻഡേജ് (Bandage) വച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ളത്.
- 9 മാക്കിൻ ടോഷ് ഷീറ്റ് (Mackintosh sheet) റബ്ബർ ഷീറ്റ്.
- 10 കത്രിക (Scissors)
- 11 ഫോർസെപ്സ് (Forceps) കൊടിൽ.
- 12 കുത്തിക്കെട്ടാനുള്ള സൂചികൾ (Suture needles)
- 13 സൂചിപിടിക്കാനുള്ള ഹോൾഡർ (Needle holder)
- 14 ചരടുകൾ (Silk worm gut, Cat gut ect) പക്കിൾക്കൊടി കെട്ടുവാനുള്ളത്.
- 15 സിറിഞ്ച് (Hypodermic Syringe and Needle എന്നു തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും,

ദൗഷ്ഠ്യങ്ങൾ

- 1 രോഗാണുനാശിനികൾ (Antiseptics) ലൈസോൾ, ഡെറോൾ മുതലായവ.
- 2 മോർഫിയാ (Morphia), പെത്തിഡിൻ (Pethidine) ഇവ വേദന ഇല്ലാതാക്കാനും, ഉറക്കമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കുത്തി വയ്ക്കുന്നു.
- 3 എർഗോട്ട് (Ergot), പിറോസിൻ (Pitocin) പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതിനും വേദന ശമിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു.
- 4 ലോബെലിൻ (Lobelin) ശിശുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനോ മറ്റോ കോട്ടമുണ്ടായാൽ ഇത് കുത്തിവയ്ക്കുന്നു.

- 5 കൊറാമിൻ (Coramin) നാഡീക്ഷീണമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ മാതാവിനും ശിശുവിനും ഇതു കത്തിവയ്ക്കുന്നു.
- 6 റിങ്ക്ചർ അയോഡിൻ, ബെൻസോയിൻ, ബോറിക് പൗഡർ. (Tr. Iodine, Tr. Bensoinco, Boric acid) മുറിവുകൾക്കു പുറമേ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളതു്.
- 7 ക്ലോറൽ ബ്രോമയിഡ് മിക്സ്ചർ
(CHLORAL BROMIDE MIXTURE)

R

Chloral Hydrat 20 grs (1.5 gm.)

Pot Bromide 20 grs (1.5 gm)

Aqua Chloroform 2 ozs (60 Ml.)

നോവ് തീരെ ബലഹീനവും ഇടവിട്ടുമാത്രം വരുന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഈ മിക്സ്ചർ ഒന്നോ രണ്ടോ ഔൺസ് കൊടുക്കാം.

- 8 സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ (Silver nitrate Solution 1-2%)

പ്രസവമുറി (LABOUR ROOM)

നേരത്തെതന്നെ സന്ദർശിക്കാറുള്ള വീടാണു് ഗർഭിണിയുടേതെങ്കിൽ പ്രസവവേദന തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അവിടെ പോയി പ്രസവമുറി ക്രമപ്പെടുത്താൻ മിഡ് വൈഫ് ബാധ്യസ്ഥയാണു്.

ഗർഭിണിയുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായുവും, വെളിച്ചവും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ജനലുകളും മറുമുള്ളതും, വിസ്താരമുള്ളതുമായ മുറി വേണം പ്രസവത്തിനുവേണ്ടി ഒരു

കേണ്ടത്. പ്രസവമുറിയിൽ ഒരു കട്ടിൽ, ചെറിയ ഒരു മേശ, ഒരു സ്റ്റൂൾ, രണ്ടോ നാലോ ബേസിൻ എന്നിവ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ. മറ്റു സാധനങ്ങൾ മുറിയിൽ ഉള്ളപക്ഷം അവ മുറിയിൽനിന്നും നീക്കംചെയ്തതിനുശേഷം, മുറിയാകെ അടിച്ചുവారి തുടച്ചുവൃത്തിയാക്കിക്കണം. ചൂടുവെള്ളവും തണുത്തവെള്ളവും ആവശ്യംപോലെ ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഏർപ്പാടുചെയ്യുകയും വേണം. മുറിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തും ജനലിന്റേ എതിരായും, കട്ടിലിന്റെ രണ്ടു വശത്തും ആളുകൾക്ക് നില്ക്കത്തക്കവിധത്തിലും കട്ടിലിട്ട്, കിടക്കവിരിച്ച് അതിനുമുകളിൽ ഒരു മാക്കിൻ ടോപ്പ് ഷീറ്റ് (റബ്ബർ ഷീറ്റ്) വിരിച്ച്, സൗകര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

പ്രസവമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗർഭിണിക്ക് ശരിയായ പ്രസവവേദന തന്നെയാണോ എന്നും, ആദ്യപ്രസവമാണോ എന്നും, ആദ്യപ്രസവമല്ലെങ്കിൽ മുൻപ്രസവത്തിൽ പ്രസവത്തിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും, ചാപിള്ളയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും കട്ടി അനങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും, മലമുത്രവിസർജനം നടന്നിട്ട് എത്രസമയമായി എന്നും മറ്റുമാകുന്നു.

അനന്തരം ഗർഭിണിയുടെ ഗൃഹ്യപ്രദേശവും പ്രസവാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ശുദ്ധിയാക്കി രോഗാണുവിമുക്തമാക്കണം. തുടന്ന് പുറമേയുള്ള പരിശോധനകൊണ്ട് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കിടപ്പും നിലയും മനസ്സിലാക്കണം. കട്ടി ശരിയായ നിലയിലും കിടപ്പിലുമായിരിക്കുകയും ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈദ്രുപ്യമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം യോനീമാർഗ്ഗേണയുള്ള പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്തതാകുന്നു.

പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതു്:

പ്രസവവേദന ആരംഭിച്ചാലുടനെ എനിമകൊടുത്തു മലം കളയുക. അതിനുശേഷം ഗുഹ്യപ്രദേശത്തെ രോമം വടിച്ചു കളഞ്ഞതിനുശേഷം അവരെ കുളിപ്പിക്കുക. കുളി



ചിത്രം 60:

ഗുഹ്യഭാഗത്തെ രോമം വടിച്ചുകളയുന്ന രീതി.



ചിത്രം 61: കുളിപ്പിക്കുന്ന രീതി.

പ്പിക്കുമ്പോൾ ഗുഹ്യപ്രദേശം പ്രത്യേകമായി സോപ്പ് തേച്ച് കഴുകിക്കണം. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നപക്ഷം മിഡ്‌വൈഫ് ഗർഭിണിയെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണിമുക്കി പിഴിഞ്ഞു ശരീരം മുഴുവൻ തുടച്ച് ശുദ്ധിയാക്കണം. ഗുഹ്യപ്രദേശം സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് കഴുകി തുടച്ചതിനുശേഷം ഗർഭിണിയുടെ തലമുടി രണ്ടായി ഭാഗിച്ച് പിന്നിയിടുകയും അലക്കിയ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുവാൻ ഗർഭിണിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. മൂത്രം തനിയെ ഒഴിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാത്തപക്ഷം മൂത്രക്കുരു കടത്തി മൂത്രമെടുത്തു കളയുക. മൂത്രം കെട്ടിനിന്നാൽ പ്രസവത്തിനു തടസ്സമാകുന്നതാണ്. നോവ് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്നും എത്ര മിനിട്ട് ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നും, ഓരോ തവണയും എത്ര സമയത്തേക്ക് നോവ് നിലനില്ക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കണം.

കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് ഒന്നും രണ്ടും നിലകളിൽ (First and Second Vertex) ജനനമുഖമായി വരുന്നപക്ഷം ഗർഭിണിയെ മുറിക്കുകയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടത്തേണ്ടതാണ്. ഗർഭിണി നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഘനംകൊണ്ട് ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി തീരുന്നു. കൂടാതെ സേക്രൽ പ്രൊമോണ്ടറി പിന്നോക്കം ചായാനും തൽഫലമായി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വായ് വിസ്താരം അധികമാകുന്നതിനും സഹായകമാണ്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഗർഭിണിയെ മലർത്തിക്കിടത്തുകയും ചെയ്യണം. കാരണം, മലൻകിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മുന്നീക്കടം ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായയെ പൂർണ്ണമായും വികസിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ മുഖം, നെറ്റി, പുഷ്പം കയ്ക്ക് എന്നിവയിൽ ഏതെ

കിലുമോ, മൂന്നും നാലും നിലകളോ (Third and Fourth Vertex) ജനനമുഖമായി വരുന്നപക്ഷം ഗർഭിണിയെ നടക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. കാരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നടന്നാൽ മുന്നീക്കും എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ്. പ്രസവവേദന ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ മുന്നീക്കും പൊട്ടുന്നതുവരെ യോനീമാഗ്ഗമായുള്ള പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല. കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും എണ്ണിനോക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നാംപതനത്തിനുമുമ്പ് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിഡ്വൈഫ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

നോവു തുടങ്ങുമ്പോൾ സെർവിക്സ് (Cervix) ഒട്ടും തന്നെ വികസിച്ചിരിക്കുകയില്ല. കൗക്കഴിയുമ്പോൾ യോനീമാഗ്ഗേണ പരിശോധിച്ചാൽ സെർവിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിരൽ കടക്കത്തക്കവണ്ണവും, ഒന്നാംപതനം കഴിയാറാകുമ്പോഴേക്കും നാലുവിരൽ കടക്കത്തക്കവണ്ണവും (Cervix fully Dilated) ക്രമേണ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നാംപതനത്തിൽ ഗർഭിണിക്കു് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ആഹാരവും കുടിക്കുന്നതിനു് ചായ, കാപ്പി, ഓറഞ്ചുനീരു്, കഞ്ഞിവെള്ളം, മോരു് തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഗർഭിണിയെ രസകരമായ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ നോവുണ്ടാകുമ്പോൾ മുക്കുന്നതിൽനിന്നു അവളെ പിൻതിരിപ്പിക്കേണ്ടതും മുക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും അവളുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കലായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം.

പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്


മുന്നീക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ യോനിമാറ്റമായി പരിശോധിച്ച് കുട്ടിയുടെ തലയുടെ കിടപ്പും, പൊക്കിറക്കം ടിയോ, കാലോ, കയ്യോ മറ്റോ യോനിയിലേയ്ക്കു വീണിട്ടുണ്ടോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക.

മിഡ്‌വൈഫ് ഏറ്റവുമധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണിത്. മിഡ്‌വൈഫിന്റെ ലഘുവായ ഒരുശ്രദ്ധപോലും കുട്ടിക്ക് അപായവും മാതാവിന് വിഷമങ്ങളും വരുത്തിത്തീർക്കുന്നതിന് ഇടയാകുന്നു. 15 മിനിട്ട് ഇടവിട്ട് ശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് പരിശോധിക്കുകയും ജനനമുഖം ക്രമമായി യോനിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭിണിയെ മലർത്തിക്കിടത്തേണ്ടതും കാലുകൾ അല്പം അകറ്റി മുട്ടല്പം മടക്കിക്കുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.




ചിത്രം 62: പ്രസവസമയത്ത് ഗർഭിണി കിടക്കേണ്ട രീതി.




ചിത്രം 63: പ്രസവാരംഭം.

ശിശുശിരസ്സ് യോനീകവാടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ചീഡ് വെ ഫ് ശ്രദ്ധയോടെ സമീപത്തുനിൽക്കണം,




ചിത്രം 64 (a)




ചിത്രം 64 (b)

പ്രസവം-രണ്ടാംഘട്ടം.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തേയ്ക്ക് തള്ളിവരുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വികസേവർദ്ധനവ്.




ചിത്രം 65 (a)



ചിത്രം 65 (b)


ശിശുശിരസ്സിന്റെ ജനനഘട്ടങ്ങൾ.

(പെരിനിയത്തിന്റെ വലിച്ചിലും വിസ്കാരവർദ്ധനവും ശ്രദ്ധിക്കുക)



ചിത്രം 66 A: ശിരോഭാഗജനനം.

ശിരസ്സും കഴുത്തും പൂർണ്ണമായി നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന ഘട്ടം.



ചിത്രം 66 B: ശിരോഭാഗജനനം.

ബാഹ്യപശത്തേയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചിൽ.

നല്ല നോവുണ്ടായിരിക്കുകയും ക്രമേണ കുട്ടി കീഴോട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണി അധികമായി മുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശക്തിയായ നോവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അധികമായി മുക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രസവത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നതു തന്റനിമിത്തം യോനിയോ ഗുഹ്യപ്രദേശമോ ചീന്തിപ്പോകുന്നതിന് ഇടയായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

ഈ പതനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഗർഭിണിയെ ഇടത്തോട്ടു ചരിച്ചു കിടത്തണം, ഇടത്തോട്ടു ചരിച്ചു കിടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഗുദാസ്ഥി പിന്നോട്ടു വളയുന്നതും ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള ഭാരത്തിന് കൂടുതൽ വിസ്കാരമുണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ഗുഹ്യപ്രദേശവും തുടകളുടെ ഉഭയാഗ്രവും നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം ലൂഗോൾസ് അയോഡിൻ (Lugol's Iodine) പുരട്ടണം. ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ പാലോ സൂപ്പോ കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

വേദന വരുമ്പോൾ മിഡ്‌വൈഫ് ഗർഭിണിയുടെ പുറം മെല്ലെ അമർത്തിക്കൊടുത്താൽ അവൾക്കുശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മസ്തിൽ ഉരുണ്ടുകയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ നീട്ടിവെച്ച് പാദം മുന്നോട്ടുവെച്ചാൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പല തവണ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവളുടെ വയറു ഞാന്നു കിടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ബൈൻഡർ സാമാന്യം മുറുക്കിക്കെട്ടണം. അതിവേദന തുടരുന്ന പക്ഷം ബൈൻഡർ അല്പാല്പമായി മുറുക്കി, മുറുക്കിക്കെട്ടേണ്ടതും തുടയിൽ തടവിക്കൊടുക്കേണ്ടതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈസോൾ ലോഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ട് ഗുഹ്യ പ്രദേശം, മലദ്വാരം, ഗുദഭാഗം എന്നിവയെല്ലാം പുറകോട്ടു തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണ്. കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് യോനീദ്വാരത്തെ വികസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തലയിണ കാലിനടിയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കണം. പെരിനിയം (മലദ്വാരത്തിനും ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം) പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മിഡ്‌വൈഫ് വളരെ കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. പെരിനിയം പൊട്ടിയാൽ അവിടം പഴുക്കുന്നതും പ്രസവജ്വര (Puerperal Fever) ന്നിന് കാരണമായി തീരുന്നതുമാണ്. പ്രസവജ്വരബാധ ഗുരുതരമായ പല ആഘാതങ്ങളും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏല്പിക്കാൻ കാരണമായിത്തീരും. കൂടാതെ ഗർഭാശയം, മുത്രാശയം, മലാശയം എന്നിവ ക്രമേണ കീഴോട്ടിറങ്ങാൻ ഇടയാകുന്നതും മററനേകം ഉപദ്രവങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

പെരിനിയം പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മിഡ്‌വൈഫ് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കരുതലോടെ ചെയ്യുക.

ഗർഭിണിയെ ഇടത്തോട്ടു ചരിച്ചുകിടത്തി അവളുടെ വലത്തേകാൽ അല്പം ഉയർത്തിവയ്ക്കുക. വേദന വരുമ്പോൾ

കുട്ടിയുടെ തല പെട്ടെന്ന് പുറത്തേയ്ക്കു വരാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മിഡ്ഡ്ലെഫ്റ്റ് തന്റെ ഇടത്തെ കൈ ഗർഭിണിയുടെ തുടകൾക്കിടയിലൂടെ കടത്തി വിരലുകൾ കുറച്ചു മടക്കിവെച്ച് കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് താങ്ങുകയും, വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കീഴോട്ടുള്ള ഇറക്കത്തെ തടയുകയും തൽസമയം തന്നെ വലതു കൈകൊണ്ട് മലദ്വാരത്തിന്റെ ഇരുവശവും അമർത്തി താങ്ങി പെരിനിയം പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.




ചിത്രം 67:

പെരിനിയത്തിന്റെ അമിതമായ വികാസവർദ്ധനവ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശിശുശിരസ്സ് പൂർണ്ണമായും വെളിയിലേയ്ക്ക് വരുത്തുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം.




ചിത്രം 68:
പെരിനിയം സംരക്ഷിക്കുന്നവിധം.



ചിത്രം 69: LATERAL EPISIOTOMY

എപ്പിസിയിയോട്ടമി:— പെരിനിയം കൂടുതലായി കീറിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനും, പ്രസവവൈഷമ്യത്തെ ഭീകരിച്ച് പ്രസവം സുഗമമായി നടത്താനും വേണ്ടി യോനിയുടെ കീഴറ്റം മുതൽ അല്പമൊന്നു കീറാറുണ്ട്. ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് എപ്പിസിയിയോട്ടമി (Episiotomy) എന്നു പറയുന്നു.

കുട്ടിയുടെ ജനനമുഖത്തിന്റെ ഗതി, യോനിയുടെ മേൽപ്പകുതിഭാഗത്തുവെച്ച് മലദ്വാരത്തിന്റെ നേക്കായിരിക്കും. കീഴ്പ്പകുതിയിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗതി യോനീവാതിലിന്റെ നേക്കായിത്തീരുന്നു. കുട്ടി യോനീവാതിലിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കണം അവളെ ചരിച്ചു കിടത്തുന്നതും വലതു കാൽ അല്പം ഉയർത്തിവയ്ക്കുന്നതും, യോനിയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തു് ജനനമുഖം എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് മലദ്വാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ അമർത്തുകയും. അമർത്തിയാൽ കുട്ടിയുടെ തല വെളിയിൽ വരുന്നതിനു് തടസ്സമായിത്തീരും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മിഡ് വൈഫ് രണ്ടു കാഴ്ചക്കാരും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.



ചിത്രം 70

ഒരേസമയത്തു് പെരിനിയത്തെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ താഴത്തെ തോൽ എടുക്കുന്ന വിധം.



ചിത്രം 71

ഗർഭസ്ഥശിശു പരിണതുപരമ്പര ഒരു തോര നാഭിക്കി
ടയിലും അഭിമുഖമായും, മറ്റേ തോര പെരിനിയത്തിന്
മേലും അതിനഭിമുഖമായും ആയിരിക്കും.



ചിത്രം 72

ഉച്ചി യോനീകവാടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി
യുള്ള തിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് മിഡ്‌വൈ
ഫ് പെരിനിയം താങ്ങി സംരക്ഷിക്കുന്നു. തിരിച്ചിൽ
ഉണ്ടായാൽ പെരിനിയം കീറിപ്പോകാനിടയുണ്ട്.



ചിത്രം 73


മുഖം യോനീകവാടം കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെരിനിയത്തിൽനിന്നും അകാരിപ്പിടിക്കുന്നു.

1) കട്ടിയുടെ ശിരസ്സിന്റെ പുറകുവശം (Occiput) നാഭിയെല്ലിന്റെ കീഴിൽ കടക്കുന്നതുവരെ അതിന്റെ തല നിവരാൻ ഇടവരുത്തരുത്. ഈ പതനത്തിൽ തല നിവർന്നുപോയാൽ പെരിനിയം പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശിശുവിന്റെ തല പൊട്ടുന്നു നിവരാതിരിക്കുന്നതിനും താടി, നെഞ്ചിൽത്തന്നെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനും കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.

2) നോവില്ലാത്ത അവസരത്തിലായിരിക്കണം കട്ടിയെ വെളിയിലേക്കുടുക്കേണ്ടത്. നോവു വരുമ്പോൾ അധികം മുകളിയാൽ കട്ടി പെട്ടെന്നു വെളിയിൽ വരുന്നതും പെരിനിയം പൊട്ടിപ്പോകാനിടയാകുന്നതുമാകുന്നു.

തല മുഴുവനും പുറത്തുവന്നാൽ ആദ്യമായി നോക്കേണ്ടത് പൊക്കിൾക്കൊടി കട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽപ്പുററിയിട്ടു

ണ്ടോ എന്നാണ്. ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തലയിലൂടെ കീഴ്പ്പോട്ട് ഊരുകയോ, ചുമലിൽക്കൂടി പുറകോട്ടു തള്ളുകയോ ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന പൊക്കിരക്കൊടി മാറാൻ കഴിയാതെവന്നാൽ പൊക്കിരക്കൊടിയിൽ രണ്ടുഭാഗത്തു ചരടുകൾകൊണ്ട് മുറുക്കിക്കെട്ടിയശേഷം കെട്ടുകളുടെ ഇടയ്ക്കുവെച്ച് കത്രിക്കുകയാണ് മുറിച്ചുപിടണം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം പൊക്കിരക്കൊടി മറുകട്ടിയിൽനിന്നും



ചിത്രം 74

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പൊക്കിരക്കൊടി.


പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനും ഗുരുതരമായ രക്തവാച്ചയുണ്ടായി മാതാവിന്റെ മരണത്തിന് ഇടയായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

ശർസ്ഥശിശുവിന്റെ തല പുറത്തു വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെരിനിയം പൊട്ടുകയില്ല എന്നൊരു പൊതുധാരണയുണ്ട്. ഈ ധാരണ തികച്ചും ശരിയല്ല. കുട്ടിയുടെ ചുമൽഭാഗം പുറത്തേക്കു വരുമ്പോഴും പെരിനിയം പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചുമൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തു് പെരിനിയം പൊട്ടാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ തലയും കഴുത്തും പെരിനിയത്തിനു നേരെ പിന്നോക്കം പിടിച്ചാൽ മേൽഭാഗത്തുള്ള ചുമൽ ആദ്യം പുറത്തുവരും. തുടന്ന് തല, മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിനുനേരെ മുമ്പോട്ടുയർത്തിയാൽ ചുമലിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും പുറത്തുവരും.

കുട്ടിയുടെ തല പിറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേദനയോടുകൂടി കൈകൾ പിറക്കുകയാണ് പതിവു്. കൈകൾ ഓരോന്നായി പിറക്കുവാനേ അനുവദിക്കാവൂ. ഇരുകരങ്ങളും ഒന്നിച്ചുപിറന്നാൽ പെരിനിയം കീറിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. തല പിറന്നിട്ടും കരങ്ങൾ കീഴോട്ടിറങ്ങാതിരുന്നാൽ മാതാവിനോടു് മുകുവാൻ പറയണം. മുകിയിട്ടും കരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുകയും ശിശുവിന്റെ മുഖത്തിനു നീലനിറം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ശിശുവിന്റെ കൈകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ശർഭാഗയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് (Fundus) കൈകൊണ്ട് കീഴോട്ടുമാർത്തിയാൽ കൈകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഈ രീതികൊണ്ടും പെരിനിയം കീറാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ യോനിക്കുള്ളിലേയ്ക്കു് ഒരു വിരൽ കടത്തി ശിശുവിന്റെ കക്ഷത്തിനടിയിലിട്ടു് കൊളുത്തി താഴേക്ക് വലിച്ചു് ഈ ദർഘഘടന

ന്ധി തരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും ശിശുവിന്റെ കരങ്ങു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ തല പിടിച്ചുവലിച്ചു കൂടാത്തതാകുന്നു.


ശിശുവിന്റെ ബാക്കിഭാഗം വേഗത്തിൽ പ്രസവി ക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കുട്ടി പിറന്നു വീണാലുടനെ അതിന്റെ കണങ്കാലുകൾ പിടിച്ചു തല കീഴോട്ടാക്കി തൂക്കി പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ അതിന്റെ മൂക്കിലും



ചിത്രം 75


നവജാതശിശുവിനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന രീതി.

വായിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള കഫം (മ്യൂക്കസ്—Mucus) പുറത്തേക്കു പോരികയുള്ളു. പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാനും സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ കുട്ടി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നതാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറെ ഉണങ്ങിയ പഞ്ഞി കയ്യിലെടുത്തു അതുകൊണ്ടു കുട്ടിയുടെ പുറം അമർത്തി തിരുമ്മിയാൽ അതു കരഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.



ചിത്രം 76

കട്ടിയുടെ രണ്ടു കക്ഷത്തിലും പിടിച്ചു, ഉയർത്തി അതിന്റെ ഉടൽ ജനനമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും എടുക്കുന്നവിധം.



ചിത്രം 77

പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെയുള്ള ശിശുവിന്റെ കിടപ്പ്.

ശിശുവിന്റെ ഉടൽഭാഗം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയോ അതിന്റെ ചന്തിയിൽ അടിക്കുകയോ ചെയ്യാലും ശ്വാസോച്ഛവാസം ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു. തുടന്ന് കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ ബോറിങ് ലോഷൻ കൊണ്ട് കഴുകി രണ്ടു ശതമാനം സിൽവർനൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ണിൽ ഇറിക്കുക. കുട്ടി പുറത്തേക്കു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ണിൽ പറ്റിയിരിക്കാവുന്ന പഴുപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ശിശുവിന് കണ്ണുപഴുപ്പ് എന്ന രോഗം ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്.



ചിത്രം 78: നന്ദാതശിശുവിന്റെ കണ്ണിൽ മരുന്ന് ഇറക്കുന്നു.

പ്രസവശേഷം ഗോണോക്കോക്കസ്സ് അനുകൂല മുട്ടുമുട്ടാകാവുന്ന നഷ്ടരോഗ പ്രതിരോധനപടി.

ശിശു നന്നായി കരയുന്നതുവരെ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചുകൂടാ. ശിശുവിന്റെ പൊക്കിൾ മുതൽ ഏകദേശം 10 സെന്റീമീറ്റർ വരെയുള്ള പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ ഭാഗത്തു് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ മിടിപ്പ് കാണുകയുള്ളൂ. പൊക്കിൾ ഭാഗത്തു് സ്പന്ദനം തീരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.




ചിത്രം 79

നവജാതശിശു മിഡ് വൈഫിന്റെ കയ്യിൽ.

പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കേണ്ട വിധം.

പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ മിടിപ്പിനിന്നാൽ പൊക്കിളിൽനിന്നും 10 സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായി പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ ഒരു കെട്ടു കെട്ടുക. ഈ കെട്ടിൽനിന്നും അല്പം അകലെയായി രണ്ടാമതൊരു കെട്ടുകൂടി കെട്ടുക. ഈ രണ്ടു കെട്ടുകളുടേയും മദ്ധ്യഭാഗം കണ്ടു് പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുക. പൊക്കിൾക്കൊടി കെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചരടു് (Silk worm gut) വെള്ളത്തിൽ ഇടു് തിളപ്പിച്ചതോ, കെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുവരെ ആൻറിസെപ്റ്ററിക് ലോഷനിൽ ഇടുവച്ചിരുന്നതോ ആയിരിക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു വളഞ്ഞ കത്രിക (Curved Scissors) കൊണ്ടുവേണം പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുവാൻ.



ചിത്രം 80

പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാമ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അല്പം മാറി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാമ്പും പിടിപ്പിക്കണം. ക്ലാമ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കെട്ടിയാലും മതി.



ചിത്രം 81

ക്ലാമ്പുകളുടെയോ കെട്ടുകളുടെയോ ഇടയ്ക്കുപച്ച് രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയ കത്രികകൊണ്ട് പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുന്നു.

പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽനിന്നും രക്തം പോകുന്നില്ലെന്ന് തീച്ചയായാൽ പിന്നെ സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ശിശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുക. പൊക്കിൾ നന്നായി തുടച്ച് ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടതിനുശേഷം കമ്പിളി

കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചുകിടത്തണം. അതിനുശേഷം മാതാവിന് ക്ഷീണാധിക്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം. രക്തം ക്രമത്തിലധികം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയശേഷം ഗൃഹ്യഭാഗം ലോഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ട് തുടച്ച് അവിടെയോ, യോനിയിലോ, സെർവിക്സിലോ, മുറിവുകൾ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിള്ളലോ, കീറലോ മറ്റോ പെരിനിയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുന്നിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്:-

പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ, മിഡ് വൈഫോ, ഡാക്ടറോ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശിശു ജനനശേഷം സ്വാഭാവികമായ നിലയിൽ തന്നെ മൂന്നാംഘട്ടം അവസാനിച്ചുകൊള്ളും.

പ്രസവശേഷം അവളെ മലർത്തിക്കിടത്തി കാൽ കത്തിച്ചുവയ്ക്കണം. ഗർഭാശയം ശരിയായി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. ഗർഭാശയത്തിന്റെ സങ്കോചപിടക സന്ദർഭമുപേക്ഷിച്ച് അടിവയറിനുമീതെ സ്പർശിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഠിനമായും, മാർദ്ദവമായും അനുഭവപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് ഗർഭാശയത്തിന് മുകളിൽ ഉദരഭാഗത്തു് മിഡ് വൈഫ് മെല്ലെ തടവിക്കൊടുക്കുകയല്ലാതെ അമർത്തി ഉഴിയരുത്. അമർത്തിയാൽ മറുകട്ടി സമയത്തിനുമുമ്പായി ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെടാൻ ഇടയാകുന്നതും തൽഫലമായി അത് പൊട്ടിപ്പോകാനും അതിന്റെ അംശങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിൽ പററിയിരിക്കുവാനും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനും ഇടയാകുന്നു.

ഗർഭാശയം പെട്ടെന്നു് അയഞ്ഞു മാർദ്ദവപ്പെടുന്നതായി തോന്നിയാൽ അതിൽ രക്തം വന്നു നിറയാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മിഡ്‌വൈഫിനു് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണു്. ഇടത്തേ കയ്യുടെ തള്ളവിരൽ ഗർഭാശയത്തിനു മുകളിൽ മേൽഭാഗത്തു വയ്ക്കുകയും മററു വിരലുകൾ കീഴോട്ടു നീട്ടി ഭാഗാശയത്തെ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക.

സാധാരണഗതിയിൽ 3-ാം ഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതു് അരമണിക്കൂറിനകം മറുകട്ടിയും മുന്നീക്കടത്തോലും ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടു യോനിയിലേയ്ക്കു വീഴുന്നതുമാണു്.

മറുകട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു് യോനിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്നു് താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടു് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.


- 1 മറുകട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടു് യോനിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടങ്കിൽ, ഗർഭാശയം ഉരുണ്ടു കഠിനമായും കയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വലിപ്പത്തിലുമായിത്തീരുന്നു.
- 2 ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗം പൊക്കിൾ വരെ എത്തിയിരിക്കും.
- 3 വെളിയിൽ കണ്ടിരുന്ന പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ ഭാഗം കുറേക്കൂടി കീഴു് പ്പോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും മറുകട്ടി വേർപെട്ടുപോന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകൽ നിർത്തിയാലുടനെ പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ ഭാഗം വീണ്ടും മേലോട്ടുകയറുന്നതായി കാണാവുന്നതാണു്.



ചിത്രം 82

മിഡ്‌വൈഫ് രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ടും ഉദരപേശികൾ പൊക്കി മടക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു് മുക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുക. ഉദരാന്തർഭാഗത്തെ സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നതും മറുപിള്ളയുടെ പിറവിയെ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്.



ചിത്രം 83

മുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽകൈപ്പത്തി പരിച്ചുപിടിച്ച് നാലിക്രമീതെ അമർത്തുന്ന സമ്പ്രദായം. (ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊക്കിൾക്കൊടി തിരിച്ചുകയറി ചുരുണ്ടുകൂടിപ്പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്)




ചിത്രം 84

മുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടിട്ടും പിറക്കാതെ ഗോശയമാഗ്നത്തിൽ തടയപ്പെട്ടാൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ വിരലുകൾ പിടിച്ച് അമർത്തുക.

(Crede's Method)


ലക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് മറുക്ടി ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ട് യോനിയിൽതന്നെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ഇടതുകൈകൊണ്ട് ഗർഭാശയം പിടിച്ച് അത് ചുരുങ്ങുന്ന സന്ദർഭം നോക്കി വയററത്ത് മെല്ലെ കീഴോട്ടമന്തിയാൽ മറുക്ടി യോനിയിൽനിന്നും വെളിയിൽവരുന്നതാണ്. മുന്നീക്കടത്തോൽ അതിലോലമായ ഒരു ചർമ്മവിശേഷമായതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും മറുക്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ പൊക്കിയൊക്കെടിയിലോ പിടിച്ചു വലിക്കരുത്. വീഴുന്ന മറുക്ടിയെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച്, പിരിച്ചു, പിരിച്ച് വളരെ സാവധാനത്തിൽ എടുക്കുന്നപക്ഷം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.



ചിത്രം 85: മറുപിള്ളയെ എടുക്കുന്നവിധം.

മറുക്ടി സുഗമമായി പിറക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു സമ്പ്രദായംകൂടി പുതുതായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മിഡ്വൈഫിന്റെയോ, മറ്റൊരുവയെങ്കിലുമോ സഹായമാവശ്യമില്ല. ആരുമൊന്നും വേണ്ട. യഥാർത്ഥ സന്ദർഭത്തിൽ മിഡ്വൈഫ് ഒരു നിർദ്ദേശംകൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. മറുക്ടി യോനിയിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി

വെളിയിലിറങ്ങി എന്നു കാണുന്ന സമയത്തു് അവളുടെ ഉപസ്ഥാശയഭാഗംകണ്ടു് അല്പം മേല്പോട്ടുയർത്താൻപറയുക.



ചിത്രം 86

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അല്പം പൊങ്ങിയാൽ മറുകുട്ടിയുടെ ഭാരം കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാം വേർപെട്ടുപോകുന്നതാണു്.

അങ്ങിനെചെയ്താൽ മറുകുട്ടിയുടെ ഭാരംകൊണ്ടു് അതെല്ലാം പൂണ്ണമായും പുറത്തുവരുന്നതാണു്. പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നപക്ഷം മറുപിള്ളയുടെ പിന്നാലെ മുന്നീക്കടത്തോൽ വഴുതി പുറത്തേയ്ക്കുപോരുകയാണു് പതിവു്. മറുകുട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും യോനിയിലേയ്ക്കു വീഴുവാൻ താമസമുണ്ടായാൽ പൊക്കിറക്കൊടി പിടിച്ചു വലിക്കരുതു്. വലിച്ചാൽ പൊക്കിറക്കൊടി അററുപോകുന്നതും മറുകുട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടി ഗർഭാശയത്തിൽത്തന്നെ പറ്റിയിരിക്കുന്നപോകുന്നതും തന്മൂലം ഗുരുതരമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്നതും പ്രസവജ്വരത്തിനും മറ്റും കാരണമായിത്തീരുന്നതുമാണു്. ഗർഭാശയം തന്നെ അകം പുറമായി മറിയുന്നതിനുപോലും സാധ്യതയുണ്ടു്.

മറുകുട്ടിയും മുന്നീക്കടത്തോലും പൂണ്ണമായും വെളിയിൽവന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അവയെ നല്ലവണ്ണം പരിശോധി

ചൂനോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെതന്നെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. പ്രസവവേദനയാരംഭിച്ചതു മുതൽ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഗർഭിണിക്കു നല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചു മരുന്നുകളൊന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ വേദനയ്ക്കു ശമനമുണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി പെതിഡിൻ ഇൻജക്ഷനോ മറോറാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി എർഗട്ട് കടിക്കുവാൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എർഗട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രാം (Ext ergot Liq 1-2 dr. or 4-8 Ml) ഓൺസു വെള്ളത്തിൽ ചേർത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടതു്. മറുകുടിയും മുന്നീക്കടത്തോലും പൂർണ്ണമായി വീണുകഴിഞ്ഞാലെ എർഗട്ട് കൊടുക്കാവൂ എർഗോമെട്രിൻ (Ergo metrine), ഓക്സീടോസിൻ (Oxytocin = പോസ്റ്റീരിയർ പിറൂട്ടറി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് - Posterior Pituitary Extract) എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻട്രാമസ്കുലറായി കുത്തിവെക്കുക.

മറുകുടിയുടെ പരിശോധന:-

മറുകുടിയുടെയോ, മുന്നീക്കടത്തോലുകളുടെയോ വല്ല അംശവും പൊട്ടിയിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ മറുപിള്ളയെ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തു വെള്ളത്തിൽ



ചിത്രം 87

മറുപിള്ളയുടെ അകവശം. (Foetal side) മേശപ്പുറത്തും പുറകവശം (Maternal side) മുകളിലും വരത്തക്കവിധം വച്ച് മെംബ്രയിൻ മാറി പരിശോധിക്കുന്ന വിധം.

ന്നായി കഴുകിയതിനുശേഷം അതെടുത്ത് ഗർഭാശയഭിത്തിയോടു ചേർന്നിരുന്ന ഭാഗം മേലോട്ടു വരത്തക്കവിധം തിരിച്ചുപിടിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക. മറുകട്ടിയെ ഏകദേശം ഇരുപത് ചെറുതൂണുകളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചുളിവുകൾ അതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ തൂണുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ഇല്ലെന്നു വരുന്നപക്ഷം അത് ഗർഭാശയത്തിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു നിശ്ചയിക്കാം.

അനന്തരം മുന്നീക്കടത്തോലും വിടർത്തി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക. ശിശു കടന്നുപോന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമൊഴിച്ചാൽ അത് ഒരു സഞ്ചിപോലെയായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇടതുക്കൈകൊണ്ട് പൊക്കിൾപള്ളി പിടിച്ച് വലതുക്കൈ ശിശു കടന്നുപോന്ന ഭാഗത്തുകൂടി കടത്തി പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യ




ചിത്രം 88

പൊക്കിൾക്കൊടി ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് തുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കൈ ശിശു പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിടവിൽക്കൂടി അകത്തേയ്ക്കു കടത്തി മറുപിള്ളയുടെ രണ്ടു ചുരുക്കങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്ന രീതി.

പ്പെടുക. മറുകട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നപക്ഷം വിവരം ഉടനെ ഡാക്ടറെ

അറിയിക്കണം. കൈകൾകൊണ്ടോ ഉപകരണസഹായത്തോടെയോ അദ്ദേഹം അതു പുറത്തെടുത്തുകളയുന്നതാണ്. മറുപിള്ളയുടെ അംശം പൂർണ്ണമായും ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും നീക്കംചെയ്യപ്പെടുന്നതുവരെ രക്തസ്രാവം തുടരുന്നതായിരിക്കും.

മുന്നീക്കടത്തോൽ പൊട്ടി അകത്തിരുന്ന്പോയാലും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചു ഭോഷമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ചുരുങ്ങൽകൊണ്ട് മറു സ്രവണങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തേയ്ക്കു പോരുന്നതാണ്.



ചിത്രം 89

ശിശുജനനത്തിനു ശേഷം മറുപിള്ള പിറക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഘട്ടത്തിലെ (Placental stage) ഗർഭാശയത്തിന്റെനില.

- I ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പിറവിയ്ക്കു ശേഷം.
- II മറുപിള്ളയും അനുബന്ധിതഭാഗങ്ങളും വേർപെട്ടു ഭഗാശയത്തിൽ വീണതിനുശേഷം.
- III മറുപിള്ളയുടെ പൂർണ്ണമായ പിറവിക്കുശേഷം.

പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടവും ശുഭമായി പര്യവസാനിച്ചു എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി പെരിനിയവും, യോനിയുടെ കീഴ്ഭാഗവും പരിശോധിക്കുക. കീറലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, തുന്നിക്കെട്ടുകയോ യുക്തംപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അനന്തരം അഴുക്കുതുണികളെല്ലാം മാറി ഗുഹ്യപ്രദേശം, ലൈസോൾ ലോഷൻ കൊണ്ടോ, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലോഷൻകൊണ്ടോ നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് കെട്ടിഉടുപ്പിക്കുക (Diaper Andpad). വയറാത്തു് ഒരു ബയിൻഡർ സാമാന്യം മുറുക്കി ഇടണം. ബയിൻഡർ ഇടുന്നത് ഒക്കിന്റെ ഏകദേശം പത്തു സെന്റീമീറ്റർ താഴെയായിരിക്കണം. അതിനുശേഷം മാധാവിനെ നല്ല കിടക്കയിലേയ്ക്കു മാറി കൂടിക്കുന്നതിനു് ഓറഞ്ചുനീരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർഷിഷുമുള്ള ഏതെങ്കിലും പാമ്പിയമോ കൊടുത്തു് ആശ്വസിപ്പിച്ചതിനുശേഷം പുതുപ്പിച്ചുകിടത്തി ഉറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അനന്തരം നവജാതശിശുവിനെ പരിശോധിക്കുക. കുട്ടി നല്ലവണ്ണം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പൊക്കിൾക്കൊടിയിന്മേലുള്ള കെട്ടു മുറുകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും മിഡ്‌വൈഫ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം.

കൂടാതെ

ശിശുവിന്റെ കൈകാലുകൾക്കു് വൈരൂപ്യം,

അണ്ണാക്കിൽ വിള്ളൽ,

മുച്ചണ്ടു് (മുച്ചിറി)

തലയിലോ, മുതുകെല്ലിലോ മുഴ,

മല, മൂത്ര ദ്വാരങ്ങൾ,

നാക്കെട്ടു് (ടങ്ങ് ടൈ—Tounge tie) എന്നിവയുണ്ടോ എന്നു് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

മറുകുട്ടിയും പിറന്നു് രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയാതെ മിഡ്‌വൈഫ് പ്രസവമുറി വിട്ടുപോകരുത്. ഇടക്കിടക്കു് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു് പനി ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കുകയും, നാഡി മിനിറ്റിൽ 75-ൽ അധികം പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു് എണ്ണിനോക്കുകയും വേണം. നാഡീസ്പന്ദനനിരക്ക് മിനിറ്റിൽ നൂറിൽ അധികമായി കാണുന്നപക്ഷം അതു് രക്തസ്രാവത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കേണ്ടതും അവശ്യം വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു. രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ അതു് നിന്നതിനുശേഷമേ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയെ വിട്ടുപോകാവൂ എന്നതും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രസവാനന്തരഘട്ടവും പരിചരണവും

(PUERPERIUM AND THE CARE
OF THE PUERPERA)

മറുപിള്ളയുടെ പിറവി മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നര മാസംവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തേയാണ് പ്രസവാനന്തരഘട്ടം എന്ന് മലയാളത്തിലും പ്യൂയർപ്പേറിയം (Puerperium) എന്ന് സൂതിശാസ്ത്രത്തിലും പറയുന്നത്. പ്യൂയർപ്പേറിയം എന്ന ലത്തീൻവാക്കിന്റെ അർത്ഥം “പ്രസവശേഷം” എന്നാകുന്നു. ഗർഭാശയവും മറ്റും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രസവശുശ്രൂഷ കഴിയുന്നതോടുകൂടി മിഡ് വൈഫിന്റെ ചുമതല കഴിയുന്നില്ല. തുടന്ന് ദിവസേന ഒന്നോ, രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാതാവിനേയും ശിശുവിനേയും സന്ദർശിക്കേണ്ടതും അവരെ പരിശോധിച്ചു താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്രകാരമിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

A. ഗർഭാശയ പൂർവ്വസ്ഥിതി

(INVOLUTION OF THE UTERUS)

പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്താണ് ശിശു ജനനത്തിനുവേണ്ടി വികസിച്ചു വലുതായിത്തീർന്ന ഗർഭാശയം, യോനി തുടങ്ങിയ സ്ത്രീജനനേന്ദ്രിയഭാഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ഗർഭധാരണത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവയുടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങി പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു മാസം സമയം വേണം. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് മറുകട്ടിയും പിറന്നതിനുശേഷം ഗർഭാശയം നാഭിയെല്ലിൽനിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലായിരിക്കുന്നതും അതിന് ആസമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയം നാഭിയെല്ലിൽനിന്ന് എട്ടു സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലായിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ അപ്പോഴത്തെ തൂക്കം ഏകദേശം 400 ഗ്രാമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയം ക്രമാനുസരണം ചുരുങ്ങി വരുന്നതോ എന്നും മിഡ്വൈഫ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഗർഭാശയം ക്രമാനുസരണം ചുരുങ്ങാതെ വരുന്നത് താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും.

1. മറുകട്ടി, മുന്നീക്കടത്തോൽ എന്നിവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, രക്തക്കട്ടകൾ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം. ഇവ പുറത്തെടുത്തുകളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് രക്തസ്രാവത്തിനും ഇഹററപ്പനിക്കും കാരണമായിത്തീരും. പ്രസവജ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ഇഹററപ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാംദിവസമായിരിക്കും.

2. മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കാനിടയാകുന്ന പക്ഷം, മൂത്രാശയം ഗർഭാശയത്തെ മേല്പോട്ടു തള്ളുന്നതിനാൽ അതുവന്നു വികസിച്ചുനില്ക്കും.

3. കുട്ടിക്കു മുല കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ പ്രസവത്തിനുമുമ്പും, പ്രസവശേഷവും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴുകും ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഗർഭാശയം വലുതായിരിപ്പും.

4. ഗർഭാശയം പുറകോട്ടു ചരിഞ്ഞുകിടന്നാൽ അതു ക്രമത്തിലധികം ചെറുതാണെന്നു തോന്നിയേക്കാം.

B. യോനിവാച്ച് (ലോക്കിയ-LOCHIA)

പ്രസവശേഷം രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തോളം യോനിയിൽ നിന്നും ഒരുതരം വാച്ചുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതു ആരംഭത്തിൽ രക്തവും രക്തക്കുട്ടുകളും അടങ്ങിയതായിരിക്കും. നാലഞ്ചുദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ നിറം മാറിത്തുടങ്ങുന്നതും ഒൻപതാംദിവസം മുതൽ അതിനു നേരിയ പച്ചനിറം കാണുന്നതുമായിരിക്കും. ഗർഭാശയത്തിൽ മൂന്നിടത്തോലിന്റേയോ മറ്റു കട്ടിയുടേയോ വല്ല അംശങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കിയ എന്ന പ്രസവശേഷവാച്ച് ക്രമാനുസരണം കുറഞ്ഞുപരുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം മിഡ്‌വൈഫിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വാച്ചു് സാധാരണയായി യാതൊരു ദുർഗ്ഗന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ പ്രസവജ്വരമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാച്ചു് ദുർഗ്ഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടി മുല കുടിക്കുന്നതു് ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നതിനു് വളരെ സഹായകമാണ്. പരിഷ്കാരികളായ മാതാക്കൾ മുലയിൽ പാലില്ലെന്ന വ്യാജേന ശിശുവിനു് മുല കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടു്. മുല കുടിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് മുലകൾക്കു്, അവർ നിലനിൽത്താണു് വികസിക്കുന്ന ഭംഗിയും, ആകാരസൗഷ്ഠ്യവും നില

നിർത്താനാവില്ല. സ്രീയുടെ സൗന്ദര്യവും മാങ്കേതവും നില നിൽക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല മലകൾ. നവജാതശിശുവിനെ പാലുട്ടിവളർത്തുവാൻവേണ്ടി പ്രകൃതി വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാവനമായ അവയവ വിശേഷങ്ങളാണ് സ്തനങ്ങൾ.

C. ശരീരോഷ്മാവ് (TEMPERATURE)

ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് 99 ഡിഗ്രിയിൽ അധികമായിരിക്കരുത്. അതിൽ കൂടുതലായി ശരീരോഷ്മാവ് വർദ്ധിച്ചാൽ അത് രോഗലക്ഷണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 102 ഡിഗ്രിയിലധികം പനിയുണ്ടായിരിക്കുകയും അത് ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിൽ അധികം സമയം നിലനില്ക്കുകയും, നാഡിമിടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചുകാണുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, അവർക്ക് പ്രസവജ്വരത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും, അവളെ ഉടനെ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

D. നാഡി (പൾസ്)-PULSE

പ്രസവശേഷം സുഖസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ നാഡി സ്പന്ദനനിരക്ക് 72-നും 80-നും ഇടയിലായിരിക്കും. നാഡീസ്പന്ദനനിരക്ക് 80-ൽ അധികമായി വർദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷം എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രസവജ്വരാരംഭത്തിനുമുമ്പ് നാഡിമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

E. പ്രസവാന്തരവേദന

(ആഫ്റ്റർ പെയിൻ-AFTER PAIN)

പ്രസവത്തിനുശേഷം മൂന്നാലുദിവസത്തേക്ക് നോവുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീക

ളിലാണ് നോവ് അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത്. മുകളിൽ യുടേയോ മുന്നീക്കടത്തോലിന്റേയോ അംശങ്ങൾ ഗർഭശയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോവുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഈ നോവ് വളരെ കലശലാണെങ്കിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. പ്രസവാനന്തരവേദനയോടുകൂടി പനിയോ, അധികനാഡീസ്സന്ദനനിരക്കോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

F. സ്തൂതാനം (LACTATION)

ഗർഭകാലത്തും, പ്രസവശേഷം 48 മണിക്കൂർവരെയും മുലകളിൽ ജലസമാനമായ ഒരു ദ്രാവകവിശേഷമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതിന് കൊളോസ്ട്രം (Colostrum) എന്നു പറയുന്നു. മൂന്നാംദിവസം മുതൽ ശരിയായ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മുലപ്പാലിന് നേരിയ നീലനിറം കലർന്ന ശുദ്ധവസ്തുവുമാണുള്ളത്. മുലപ്പാലിന്റെ ആപേക്ഷികസാന്ദ്രത (Specific Gravity) 1024-1035 വരെയാണ്. ആദ്യം മുതൽതന്നെ ശിശുവിന് മാതാവിന്റെ സ്തനങ്ങളിൽ ഉള്ളതുമാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും.

പ്രസവകാലത്തെ പരിചരണക്രമങ്ങൾ.

ആഹാരം (ഡയറ്റ്-DIET):- പ്രസവശേഷം ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസം, പാല്, ചായ, കാപ്പി, റൊട്ടി, പൊടിയരിക്കഞ്ഞി തുടങ്ങിയ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. അതിനുശേഷം സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ആകാം. പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയർ ചാടുമെന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം.

പ്രസവംകഴിഞ്ഞു 8 മണിക്കൂറിനുശേഷം നിശ്ചയമായും മിഡ്‌വൈഫ് വീണ്ടും മാതാവിനേയും ശിശുവിനേയും സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്, പ്രസവാനന്തരം മിഡ്‌വൈഫ് ആദ്യമായി പോകുമ്പോഴും, തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും മാതാവിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനനിരക്കും, ടെമ്പറേച്ചറും എത്രവീതമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്, സമയവും, അതാതിന്റെ നിരക്കും ഡയറിയിൽ കുറിച്ചുവെക്കണം. രാവിലെ 6 മണിക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്കുമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സമയം. പത്തു ദിവസമെങ്കിലും മിഡ്‌വൈഫ് തുടച്ചയായി മാതാവിനേയും, ശിശുവിനേയും, രാവിലേയും വൈകിട്ടും സന്ദർശിക്കേണ്ടതും, ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നും, അമർത്തിനോക്കിയാൽ വേദനയുണ്ടോ എന്നും, മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, തറുടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുണിയിൽ എത്രത്തോളം വാച്ചുയുണ്ടെന്നും മറ്റും പരിശോധിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കണം.

മലവിസർജ്ജനം:- പ്രസവശേഷം മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. മൂന്നാംദിവസം കാലത്തു് ഒരൗൺസ് ആവണക്കണ്ണു കൊടുത്തു് വയറിളക്കണം. അതിനു പ്രയാസമാണെങ്കിൽ എനിമാകൊടുത്തു് മലശോധനയുണ്ടാക്കാം. ഓരോ തവണയും, മലശോധനയുണ്ടാകുമ്പോഴും മൂത്രവിസർജ്ജനം നടത്തുമ്പോഴും ഗുഹ്യപ്രദേശവും മറ്റും ചുടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും അതിനുശേഷം ലൈസോൾലോഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം.


മൂത്രവിസർജ്ജനം:- മൂത്രം പോകുന്നുണ്ടു് എന്നു് പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീ പറയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം മിഡ്‌വൈഫ് വിശ്വസിക്കരുതു്. മൂത്രം കെട്ടിനിന്നു് മൂത്രാശയം വീളു് വലുതായാൽപോലും പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന

സ്ട്രീക്ക് മുത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നാറില്ല. അതിനാൽ അവരുടെ കടവയറ് മിഡ്‌വൈഫ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതും മുത്രം കെട്ടിനില്ക്കുന്ന എന്ന് കണ്ടാൽ മുത്രമൊഴിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസവശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ മുത്രം കെട്ടിനില്ക്കാനിടയായാൽ അത് വളരെയേറെ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മിഡ്‌വൈഫ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മുത്രം ശരിക്കു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈകളുടേയും കാലുകളുടേയും മുട്ടുകൾ ഉണിനിന്നുകൊണ്ട് മുത്രമൊഴിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ബഡ്‌പാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കിടക്കയിൽ വെച്ചുതന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുക. അതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ അടിവയറിൽ ചൂടുവെള്ളയോ ബൈൻഡർ കുറച്ചുകൂടി മുറക്കിയിട്ട് ചൂടുവെള്ള (Hotwater bag) യോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടും മുത്രം പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറെ ചൂടുവെള്ളം ഗുഹ്യഭാഗത്ത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക, പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടായാൽ മുത്രമൊഴിക്കാത്ത സ്ട്രീക്കു വിരളമാണ്. ഈ ഉപചാരങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാകുന്നപക്ഷം കാർബക്കോൾ (Carbachol) എന്ന ഇൻജക്ഷൻ IM. ആയി കൊടുത്താൽ മുത്രവിസർജനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായാൽ മുത്രാശയത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു കത്തിററർ കടത്തി മുത്രം എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

കത്തിററർ ഉപയോഗിച്ചു മുത്രമെടുക്കേണ്ട വിധം:-

സ്ട്രീയെ മലർത്തിക്കിടത്തി അവളുടെ കാലുകൾ അല്പം അകറ്റി കുത്തനെ വെച്ച് ഗുഹ്യപ്രദേശം സോപ്പും ചൂടുവെ

ഉളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. അതിനുശേഷം മിഡ് വൈഫ് തന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധിയാക്കി യോനീഭാഗങ്ങൾ പിടിച്ചുകുറി ലൈസോൾ ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി കൊണ്ട് തുടച്ചതിനുശേഷം വലഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് കത്തീറ്റർ മെല്ലെ മുത്രഭാരത്തിലൂടെ അകത്തേയ്ക്കു കടത്തുക. കത്തീറ്റർ മുത്രാശയത്തിൽ കടന്നാലുടനെ കത്തീറ്റർ



ചിത്രം 90: മുത്രഭാരത്തിലേയ്ക്ക് കത്തീറ്റർ കടത്തുന്ന വിധം.


റിനുള്ളിലെ ദ്വാരം വഴി മുത്രം പുറത്തേയ്ക്കുവരുന്നതാണ്. കത്തീറ്റർ വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ചു റോഗാണവിമുക്തമാക്കിയശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. മുത്രമെടുത്തതിനുശേഷം കത്തീറ്റർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കീഴറ്റം വിരൽകൊണ്ടുമന്തിപ്പിടിക്കണം. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കഴലിനുള്ളിലുള്ള മുത്രം കിടക്കയിലേയ്ക്ക് ഇറുവീഴുന്നതിനിടയാകും.

കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു മുത്രം എടുക്കേണ്ട പരിതസ്ഥിതി സംജാതമായാൽ 8 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മുത്രമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മുത്രമെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പും മുത്രമെടുത്തതിനു ശേഷവും മുത്രക്കുരു (Catheter) വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഡെറോൾ ലോഷനി ലിട്ടു വച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ഉറക്കം:- പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി ബെൻഡർ ഇട്ട് തറുപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഒരുഗ്ലാസ്സ്

പാലും കൊടുത്ത് അവരെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം. പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാവിനും ശിശുവിനും നല്ല ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. പ്രസവശേഷം പത്തു ദിവസം സ്വസ്ഥമായിക്കിടക്കുകയാണുവേണ്ടത്. എന്നാൽ പിറേദിവസംതന്നെ അവയ്ക്കു എഴുന്നേറ്റിരിക്കാവുന്നതാണ്. യോനീമാർഗ്ഗേണുള്ള ലോക്കിയാവാച്ചു നല്ലവണ്ണം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ദിവസവും കുറേ സമയത്തേക്കു കിടപ്പും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. പത്തു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം എഴുന്നേറ്റുനില്ക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല.

സൂതങ്ങൾ:- കുട്ടിക്കു മുലകൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പും, മുലകൊടുത്തതിനു ശേഷവും മുലത്തെക്കുറേ ബോറിക് ലോഷൻകൊണ്ട് കഴുകുന്നതു നന്നായിരിക്കും. മുലപ്പനിയുണ്ടാകുകയോ, നീരും വേദനയും അനുഭവപ്പെടുകയോ, മുലപ്പാൽ സ്രവിക്കാതിരിക്കുകയോ, മുലത്തെട്ടു വിണ്ടുകീറിപ്പോകുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനെതന്നെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. മുലകൾ വീങ്ങി വേദനയുണ്ടായാൽ ഒരു ബാൻഡേജ് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതും ബ്രസ്റ്റ് പമ്പുപയോഗിച്ച് പാൽ പിടിഞ്ഞുകളയേണ്ടതുമാണ്.



ചിത്രം 91: BREAST PUMP AND NIPPLE SHIELD.

- 1) മുലപ്പാൽ പിടിഞ്ഞുകളയാനുള്ള ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ്.
- 2) മുലക്കണ്ണുകൾക്ക് വിള്ളലോ മറ്റോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് എന്ന ഈ ഉപകരണം പിടിപ്പിച്ചു വേണം. ശിശുവിനു മുലകൊടുക്കുവാൻ.

ശരീരശുശ്രൂഷ:-

പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കൈകാലുകളും, ദേഹവും കാലത്തും വൈകിട്ടും തുടച്ചുകൊടുക്കണം. ദിവസേന രണ്ടു നേരവും അവളുടെ തലമുടി ചികി രണ്ടായി ഭാഗിച്ച് പിന്നിയിടണം. ഗൃഹ്യഭാഗങ്ങൾ സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം രണ്ടു നേരം കഴുകി ലൈസോൾ ലോഷൻകൊണ്ടു തുടച്ച് ശുദ്ധിയാക്കണം. അതിനുശേഷം ശുദ്ധമായ തുണികൊണ്ട് തറുടുപ്പിക്കണം. ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം തുണി മാറ്റി തറുടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കിടക്കവിരി, മാറ്റ് അഴുക്കുവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കാലത്തും വൈകിട്ടും മാറുകയും ബൈൻഡർ മാറ്റിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യണം.

ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ


ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾ ജനിക്കാറുണ്ട്. അതിനു പ്ലൂറൽ ബർത്ത്സ് (Plural Births) എന്നു പറയുന്നു. 50-100 പ്രസവങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ (ട്വിൻസ് - Twins) ആയിരിക്കുമെന്നും, 7000-10000 പ്രസവങ്ങളിൽ ഒന്ന് മൂന്നു കുട്ടികൾ (ട്രിപ്പ്ലെറ്റ്സ് - Triplets) ആയിരിക്കുമെന്നും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ നാലും അഞ്ചും കുട്ടികൾ വീതമുണ്ടാകുന്നതും അപൂർവ്വമായിട്ടെങ്കിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ഓരോ അണ്ഡത്തിലും (Ovum) ഓരോ ബീജമാണുള്ളത്. ഒരു സ്ത്രീബീജവും ഒരു പുരുഷബീജവും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒറ്റ സാധാരണയായി ഒരു ശിശു ജനിക്കുന്നത്.

ഇരട്ടശിശുക്കളുടെ ജനനം

ഇരട്ടശിശുക്കളുടെ ജനനം രണ്ടുവിധത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.

1 ബൈനോവുലർ (BINOVULAR):- ഒരു സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് അണ്ഡാശയങ്ങൾ (ഓവറീസ്-Ovaries) ഉണ്ടെന്നും ആത്മവചക്രക്രമമനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു



ചിത്രം 92: ബൈനോവുലർ ഇരട്ടകൾ
(BINOVULAR TWINS)


അണ്ഡാശയത്തിൽനിന്നും ഒരണ്ഡം പാകമായി പുറത്തുവരുന്ന എന്നും പഠിച്ചതോട്കമല്ലോ, എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടു് അണ്ഡാശയങ്ങളിൽനിന്നും ഏകകാലത്തു് ഓരോ സ്രീബീജാണ്ഡം വീതം പുറത്തുവന്നു എന്നു വരാവുന്നതാണു്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം രണ്ടു സ്രീബീജാണ്ഡങ്ങൾക്കും പുരുഷബീജങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ. ഓരോ സംഭോഗാവസരത്തിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിനു് പുരുഷബീജങ്ങളാണല്ലോ ഭോഗശയമാഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതു്.

സ്രീയുടെ രണ്ടു് അണ്ഡാശയങ്ങളിൽനിന്നും ഏക കാലത്തു് ഓരോ സ്രീബീജാണ്ഡം വീതം പകപമായി പുറത്തുവന്നു് പുരുഷബീജസമ്പർക്കമേല്ക്കാനിടയാകുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരട്ടശിശുക്കൾക്കാണ് ബൈനോവുലർ ഇരട്ടകൾ എന്നു പറയുന്നതു്.

ബൈനോവുലർ ഇരട്ടകളിൽ ഓരോന്നിന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മറുപിള്ളകളും മൂന്നീർസഞ്ചികളുമുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മറുപിള്ളകൾ രണ്ടിന്റേയും അരികുകൾ യോജിച്ചു് ഒറ്റ മറുപിള്ള എന്നു് തോന്നുമാറു് ഇരിക്കുമെങ്കിലും അവയുടെ രക്തപര്യവസ്ഥ വെച്ചേറെ ആയിരിക്കുന്നതാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ രണ്ടുതന്നെയാകുന്നു. ബൈനോവുലർ ഇരട്ടകളിൽ കുട്ടികൾ രണ്ടും ആണോ രണ്ടും പെണ്ണോ ഒരാണം ഒരു പെണ്ണും ആയിട്ടോ വരാവുന്നതാണു്. ബൈനോവുലർ ഇരട്ടകൾ രണ്ടു് സ്രീബീജാണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നും ജനിക്കുന്നവയാകയാൽ ഒരേ ഹായയിൽ ആയിരിക്കുകയുമില്ല.

2. യൂനിഓവുലർ (UNIOVULAR):- ഒരേ സ്രീബീജാണ്ഡത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇരട്ടശിശുക്കളെ

ആണ് യൂനി ഓവുലർ ഇരട്ടകൾ (Uniovular Twins) എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു സ്ട്രീബീജാബ്ധം പുരുഷബീജവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആ സംയുക്താബ്ധം വിഭജിച്ചു വിഭജിച്ചാണ് വളരുന്നതെന്ന് മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്രകാരമുള്ള വിഭജനഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവ രണ്ടായി വേർതിരിഞ്ഞു രണ്ടുശിശുക്കളായി വളരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന യൂനി ഓവുലർ ഇരട്ടശിശുക്കൾ—ഒരേ സ്ട്രീബീജാബ്ധത്തിൽ




ചിത്രം 93: യൂനിഓവുലർ ഇരട്ടകൾ
(UNIOVULAR TWINS)

നിന്നും ഉണ്ടായ ഇരട്ടകൾ, ഒരേ ഹരായയിലും, രണ്ടും ആണോ, രണ്ടും പെണ്ണോ ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു. യൂനീ ഓവുലർ ഇരട്ടകളിൽ ഒരിക്കലും ഒരാണം ഒരു പെണ്ണായി കാണപ്പെടുകയില്ല. ഇത്തരം ഇരട്ടകളുടെ കായികവും, മാനസികവും വാസനാപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരേവിധത്തിലായിരിക്കും. യൂനീ ഓവുലർ ഇരട്ടശിശുക്കൾക്ക് രണ്ടിനും കൂടി ഒരു മറുപിള്ളയും, ഒരു കോറിയോണും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. എന്നാൽ മൂന്നീക്കും രണ്ടിനും, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ അപൂർവ്വമായി ഒരു ആംഗ്‌നിയോട്ടിക് സഞ്ചിയിലും (മൂന്നീക്കും) യൂനീ ഓവുലർ ഇരട്ടകൾ കണ്ടുപരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും പൊക്കിൾക്കൊടികൾ രണ്ടിനും രണ്ടായിരിക്കും.

യൂനീ ഓവുലർ ശിശുക്കളിൽ രക്തപര്യയനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ നിമിത്തം രണ്ടിന്റേയും വളച്ച ഒരു പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. മിക്കവാറും യൂനീ ഓവുലർ ഇരട്ടകൾ ഗർഭാശയത്തിൽ വച്ചുതന്നെ മൃതിപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ചില യൂനീ ഓവുലർ ഇരട്ടകളിൽ ഒന്ന് ഗർഭത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തുതന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നതും മറോ ശിശുവിന്റെ വളച്ച് പുത്തിയായി പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ മൃതിപ്പെട്ട ശിശു ഗർഭാശയത്തിൽ ഞെങ്ങിഞ്ഞെങ്ങി ഇരുന്നു പോകുന്നതുമാണ്. യൂനീ ഓവുലർ ഇരട്ടകളിൽ ഒന്ന് മൃതിപ്പെട്ട് ഗർഭാശയത്തിൽതന്നെ ഇതര ശിശുവിന്റെ ജനനം വരെ കിടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഫീറ്റസ് പപ്പിറേഷിയസ്സ് (Foetus Papyraceous) എന്നോ ഫീറ്റസ് കംപ്രസ്സ്സ് (Foetus Compressus) എന്നോ പറഞ്ഞുവരുന്നു.


ഒരു പ്രസവത്തിൽ മൂന്നു ശിശുക്കൾ (Triplets) ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്ട്രീബീജാഡെത്തിൽനിന്നോ, ഒന്നിലധികം സ്ട്രീബീജാഡെങ്ങളിൽനിന്നോ ആകാവുന്നതാണ്. നാലും അഞ്ചും ശിശുക്കൾ ഒരേ പ്രസവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ്.

ഇരട്ടശിശുക്കൾ; കണ്ടുചിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ:-




ചിത്രം 94: ഇരട്ടകൾ
നെടുകെയുള്ള
കിടപ്പ്.

ഒന്നിന്റെ പ്രാഴ്വര ജനന
മുഖമായും മററതിന്റെ
ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായും
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.



ചിത്രം 95:
ഇരട്ടകൾ.
രണ്ടും വിലങ്ങനെ
കിടക്കുന്നതു്.



ചിത്രം 96: ഇരട്ടകര.


രണ്ടിനോരും ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഗർഭത്തിൽ ഒന്നിലധികം ശിശുക്കളുള്ള ഗർഭിണികളുടെ വയർ സാധാരണയിൽകുറഞ്ഞു വലുതായിരിക്കുന്നതും, മാസം തികയാതെ പൊക്കിൾഭാഗത്തെ ചുറ്റളവ് നൂറു സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കുന്നതുമാണ്. വയറിന്റെ അസാധാരണമായ ഈ വലിപ്പം ഒന്നിലധികം ശിശുക്കൾ ഗർഭത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടോ, മൂന്നിരട്ടാധികം (ഹൈഡ്രാമിനിയം) കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ചില കേസുകളിൽ വയറിന്റെ വലിപ്പത്തിന് കാരണം മൂന്നിരട്ടാധികമാണോ, ഒന്നിലധികം ശിശുക്കളാണോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.

ഗർഭിണിയുടെ ഉദരം സ്പർശിച്ചുനോക്കിയാൽ രണ്ടു തലകൾ, രണ്ടു പുറങ്ങൾ, നാലിൽകൂടുതൽ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഗർഭത്തിൽ ഇരട്ടപ്രജകളാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താം. ഇരട്ട ശിശുക്കളാണു ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗർഭിണിയുടെ ഉദരത്തിലും യോനീഭാഗത്തും, കാലുകളിലും നീരുവന്നു വീങ്ങുന്നതും വൃക്കരോഗവും, ഛർദ്ദിയും കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നതുമാണു്. ശ്വാസംമുട്ടൽ, ഓക്സീമിയാ എന്നീ രോഗങ്ങൾ, ഗർഭത്തിൽ ഇരട്ടശിശുക്കളുള്ള ഗർഭിണികളെ വളരെക്കൂടുതലായി അലട്ടാറുണ്ടു്. ഉദരഭാഗത്തു ചെവി അടുപ്പിച്ചുവെച്ചോ, ഫീറ്റൽ സ്റ്റെത് ഉപയോഗിച്ചോ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടു സ്ഥലത്തു് ശിശുക്കളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പു് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ ഹൃദയമിടിപ്പു് ഒരു കുട്ടിയുടെ തന്നെയോ, രണ്ടു കുട്ടികളുടേതോ എന്നു് തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടു്. അതിനാൽ രണ്ടാൾ ഏകകാലത്തു് ഗർഭസ്ഥശിശുക്കളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പു് എണ്ണിനോക്കുന്നതായാൽ ഒരാൾ കൂടുതൽ എണ്ണുന്നതായിരിക്കും. ഇരട്ട ശിശുക്കളാണു് ഗർഭാശയത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടിന്റേയും ഹൃദയസ്സന്ദനങ്ങൾ തമ്മിൽ മിനിട്ടിൽ ഏകദേശം പത്തു് സ്സന്ദനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്.

ഗർഭത്തിലുള്ളതു് ഇരട്ട ശിശുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ നേരത്തെ പ്രസവം നടക്കാറുണ്ടു്. തന്നെയുമല്ല ശിശുക്കൾ നന്നേ ചെറുതാണെങ്കിൽ പ്രസവം വളരെ വേഗത്തിൽ കഴിയാറുണ്ടു്. എന്നാൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ആലസ്യംകൊണ്ടോ, ആദ്യശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം ക്രമവിരുദ്ധമായി വരുന്നതുകൊണ്ടോ ചില പ്രസവങ്ങൾക്കു് വളരെ സമയമെടുക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണു്.

എക്സ്പേ പരിശോധനകാണ്ട് ഇരട്ട ശിശുക്കളാ
 ണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
 എങ്കിലും ഗർഭാശയത്തിൽ മുനീർ വളരെക്കൂടുതൽ ഉണ്ടെ
 കിൽ എക്സ്പേ ഫോട്ടോ വ്യക്തമായിരിക്കയില്ല. ചില
 കേസുകളിൽ ഒരു കുട്ടി പിറന്നതിനു ശേഷമേ, രണ്ടാമത്
 ഒരു കുട്ടികൂടിയുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ
 സാധിക്കയുള്ളൂ. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉയർച്ച, കരസ്സർശ
 നം മുലമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിന്റെ പരിശോധന,




ചിത്രം 97: ഇരട്ടകൾ.

രണ്ടിന്റേയും ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന സ്ഥിതി
 (Both Vertex)

രണ്ടാമത്തൊരു ജനനമുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ, മറ്റൊരു മുന്നീക്കടം കാണൽ, എന്നുതുടങ്ങിയവയെല്ലാം മറ്റൊരു കുട്ടികൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളാണല്ലോ. ഇരട്ട ശിശുക്കളുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രസവവേദനയാരംഭിച്ചാൽ സമയത്തിനുമുമ്പ് മുന്നീക്കടം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ്. മിക്കവാറും രണ്ടു ശിശുക്കളുടേയും തലയായിരിക്കും ഇരട്ട പ്രസവത്തിൽ ജനനമുഖമായി വരുന്നത്.


ചില ഇരട്ട പ്രസവങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ തല ജനനമുഖമായും മറ്റൊന്നിന്റെ പൂപ്പും ജനനമുഖമായും വരുന്നതാണ്.



ചിത്രം 98: ഇരട്ടകൾ.

ഒന്ന് ശിരോദയത്തിലും, ഒന്ന് പൂപ്പോദയത്തിലും

(Vertex and Breech)




ചിത്രം 99: ഇരട്ടകൾ.

ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായി വിലങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന രീതി.

ചില കേസുകളിൽ രണ്ടിനേയും പൃഷ്ഠമായിരിക്കും ജനനമുഖമായി വരുന്നത്.

ഇരട്ട പ്രസവങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു് അത മണി കൂറ്റിനു ശേഷം മറോക്കട്ടി ജനിക്കുകയാണുപതിവു്. ഒരു വിൽ മറുകുട്ടിയും പിറക്കുന്നു. അപൂർവ്വമായി ചില കേസുകളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ തല മുന്നിലും മററതു് വിലങ്ങനെയും കിടക്കാറുണ്ടു്. അങ്ങിനെവന്നാൽ കുട്ടിയുടെ തല ഇറങ്ങുന്നതിനു്, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ തോൾ തടസ്സമായിത്തീരുന്നു.



ചിത്രം 100

ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിറങ്ങുന്നതിനു് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ തോൽ തടസ്സമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഇരട്ട പ്രസവവും അപകടസാധ്യതകളും:-

ഇരട്ട പ്രസവം താരതമ്യേന ആപല്ക്കരമാണു്.

ടോക്സിമിയാ, എക്സാംപ്സിയാ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്.

പ്രസവശേഷം കൂടുതൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുവാനിടയുണ്ടു്.


രോഗാണുസംക്രമണസാധ്യതയും കൂടുതലാണു്.

മുപ്പത്തഞ്ചു്, നാല്പതു് ശതമാനം ഇരട്ട പ്രസവങ്ങളിലും ശിശുക്കൾ മരിച്ചു പിറക്കുകയോ പ്രസവിച്ച ഉടനെ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

യൂനീക്കാവുലർ ഇരുട്ട ശിശുക്കൾ, ടോക്സിമിയാ കൊണ്ടോ, മറുപിള്ളയിൽക്കൂടിയുള്ള രക്തപര്യയനത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾകൊണ്ടോ ആണ് ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ചുതന്നെ മൃതിപ്പെടുന്നത്. ജനനമുഖം ക്രമവിരുദ്ധമായി വരിക, പൊക്കിൾക്കൊടി ക്രമവിരുദ്ധമായി ഇറങ്ങിവരിക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പ്രസവഘട്ടം അപായകരമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖംമൂലം, പ്രസവം ദീർഘിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിന്റെ ഇറക്കത്തെ തടയുന്നതും പ്രസവം ഭീഷ്കരമായിത്തീരുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ആലസ്യംകൊണ്ടും സമയത്തിനുമുമ്പ് മറുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നു വേർപെടുന്നതുകൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിന് ജീവഹാനി സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.

ഗർഭത്തിൽ ഒന്നിലധികം ശിശുക്കളുണ്ടെന്നു ബോധ്യമായാൽ മുന്നീക്ടം സമയത്തിനുമുമ്പ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുപേണ്ടി മിഡ്‌വൈഫ് ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരിക്കേണ്ടതും താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മയോടെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗർഭിണിയെ കട്ടിലിൽ കിടത്തുക. പ്രഥമഘട്ടം നിണ്ടുപാകുകയോ വേദന അസഹനീയമായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം പെത്തിഡിൻ (Pethedine) ഇൻജക്ഷനോ ഉറങ്ങുവാനുള്ള മറ്റു മരുന്നുകളോ കൊടുക്കുക. മുന്നീർ വളരെയധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം, മുന്നീക്ടം പൊട്ടിക്കുക. ശിശുക്കൾ താരതമ്യേന ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റേയും ജനനമുഖങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ജനനമുഖങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നപക്ഷം മേലേ സ്ഥിതി



ചിത്രം 101

ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ തല ഇറങ്ങുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി
യുടെ തല അടസ്സമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു
(Inter locking of twins)

ചെയ്യുന്ന ശിശുവിനെ ഉപസ്ഥാശയത്തിൽനിന്നും മുകളിലേയ്ക്കു മെല്ലെപ്പിടിച്ചു തള്ളിക്കൊണ്ട് മററതിനെ കീഴോട്ടിറങ്ങുവാൻ സഹായിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു



ചിത്രം 102

താടിതമ്മിൽ പുട്ടുവിണ് ജനനത്തിന് തടസ്സമായിത്തീരുന്നു.

ശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം ശിരസ്സും മറുതിന്റെത് പൂച്ച
വും ആണെങ്കിൽ ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായിട്ടുള്ളതിനെ കി
ഴോട്ടിറങ്ങുവാനാണ് സഹായിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യം
മിഡ്‌വൈഫ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനനത്തിനുശേഷം അതിന്റെ
പൊക്കിരക്കൊടിയെ മറുപിള്ളയോടു ചേരുന്നഭാഗത്തു

വെച്ചു കെട്ടുക. പൊക്കിൾക്കൊടി കെട്ടിയതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിന്റെ കിടപ്പു എപ്രകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗർഭാശയത്തിനുമീതെ കൈ വെച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിന്റെ ശയനനില വിലങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ മുന്നീക്കുടസഞ്ചി പൊട്ടുന്നതിനുമുമ്പ് പുറമേയുള്ള “എക്സ്ട്രേണൽ വെർഷൻ” മൂലം ശിശുവിന്റെ ശയനനില ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മിഡ്വൈഫിന് ഡാക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡാക്ടറെ വിളിപ്പിക്കണം. സാധാരണയായി പ്രഥമശിശുവിന്റെ ജനനം കഴിഞ്ഞു പത്തുപതിനഞ്ചു മിനിറ്റുനേരം മാതാവ് സ്വസ്ഥമായി കിടക്കുന്നതും ഗർഭാശയപ്രവർത്തനങ്ങൾ താല്പാലികമായി നിലയ്ക്കുന്നതുമാണ്. അതിനുശേഷം ഗർഭാശയസങ്കോചമാരംഭിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ശിശു കീഴോട്ടിറങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതുമാണ്.

രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചുകഴിയുന്നതുവരെ സാധാരണയായി മറുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെടുകയില്ല. എങ്കിലും ഇരട്ടപ്രസവങ്ങളിൽ ഓരോ ശിശുവിനോടും പിന്നാലെത്തുന്ന മറുപിള്ളയും മുന്നീക്കുടവും പോരാറുണ്ട്. വളരെ അപൂർവ്വമായി ആദ്യശിശുവിന്റെ ജനനത്തിനു ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്നത്. പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ ഇരക്കം മറുപിള്ള വേർപെട്ടതുമൂലമുള്ള രക്തസ്രാവം എന്നിവ മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ശിശു ഉടനെ പിറക്കുവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇരട്ടകളിൽ ഒന്നിന്റെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു അര മണിക്കൂറിനു ശേഷം പ്രസവവേദന വീണ്ടും ആരംഭിക്കാത്തപക്ഷം മുന്നീക്കുടം പൊട്ടിക്കുക. പ്രസവവേദന— ഗർഭാശയസങ്കോചപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവ

സരത്തിൽ ശക്തിപ്രയോഗിച്ചു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കാൻ മിഡ്‌വൈഫ് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ഇരട്ട പ്രസവങ്ങൾക്കു ശേഷം രക്തസ്രാവം അധികരിക്കാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് രക്തസ്രാവത്തെ തടയുന്നതിനുവേണ്ടി എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും മിഡ്‌വൈഫ് ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതുമുതൽ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഓരോ സങ്കോചത്തേയും മേലോട്ടു തിരുമ്മുവാനായി മിഡ്‌വൈഫിന്റെ ഒരു കൈ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗമായ ‘ഫണ്ടസ്സി’ൽ തന്നെ വച്ചുകൊള്ളണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറുകുട്ടിയെ ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും തള്ളാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അത് സ്വയം വേർപെടുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും വേണം. മറുപിള്ള പുറത്തുപോകുന്നതിനു ശേഷം എർഗോമെട്രിൻ (Ergometrine 0.5 mg I. M.) ഇൻ ട്രാമസ്കുലറായി കുത്തിവയ്ക്കണം. സാധാരണ പ്രസവങ്ങളിലും ഇരട്ട പ്രസവങ്ങളിലും ജനനമുഖങ്ങൾ അപകടകരമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ എടുക്കുകയോ, ഇരട്ടകളാണെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ക്രേനിയോട്ടമി (Craniotomy) നടത്തി നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വയറു കീറി—സിസ്റ്റേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയും കുട്ടികളെ എടുക്കാറുണ്ട്.

ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖങ്ങൾ

(ABNORMAL PRESENTATIONS)

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രസവങ്ങളേയാണ് ‘‘സാധാരണ പ്രസവങ്ങൾ’’ എന്നു പറയുന്നത്. ഭ്രൂപക്ഷം കേസ്സുകളിലും ഈ രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. സാധാരണ ‘‘സുഖ പ്രസവ’’മെന്നു വിവക്ഷിക്കാറുള്ളതു ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്നതുമായ എല്ലാ പ്രസവങ്ങളും പ്രയാസരഹിതമാണെന്നു കരുതരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രമവിരുദ്ധമായി ജനനമുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രസവങ്ങളും അപകടകരമാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖത്തോടുകൂടിയ അനേകം പ്രസവങ്ങൾ മാതാവിനും ശിശുവിനും യാതൊരപകടവും വരുത്തിവയ്ക്കാതെതന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു സാധാരണ പ്രസവങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആയാസകരവും ആപല്യരവും ആണെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാഭവമില്ല.

ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രസ്വങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞെന്നുവരികയില്ല. എങ്കിലും ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉൾവായിലേയ്ക്കുള്ള ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഇറക്കത്തിനു വിഘ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ കാരണങ്ങളാണു് ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖത്തിനു നിദാനമായിത്തീരുന്നതെന്നു് മൊത്തത്തിൽ പറയാം.

ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രസ്വത്തിന്റെ

പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:-

- 1 ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വൈരൂപ്യം, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലസാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞു് വലുതായിരിക്കുക, ഗർഭാശയത്തിന്റെ ചരിവു്, കുട്ടിക്കുമ്പായി മറുകുട്ടി വരിക, ഉപസ്ഥാശയത്തിലെ മുഴ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിനു് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാതെവരികയും, തന്നിമിത്തം മറേതെങ്കിലും ഭാഗം ജനനമുഖമായി ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുവാൻ ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
- 2 ഒന്നിലധികം ശിശുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നതിനു് മറേ കുട്ടി തടസ്സമായിത്തീരുന്നു.
- 3 ഗർഭത്തിൽ ശിശു മരിച്ചുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ജനനമുഖമായി വരാവുന്നതാണു്.
- 4 മുന്നീർ ആധിക്യം; ഇതുമൂലം കുട്ടിക്രമവിരുദ്ധമായ നിലയിലായിരിക്കും ഗർഭാശയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്.

5 വികൃതരൂപി (Monster) യാണ് ശിശുവെങ്കിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായിരിക്കും ജനനമുഖം.

ക്രമവിരുദ്ധമായ ചിലഘട്ടങ്ങളും പ്രതിവിധികളും:-

ശിരസ്സ് മുന്നും നാലും നിലകളിൽ ജനനമുഖമായിവരുന്ന പ്രസവം:- ഈ നിലകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രസവം മിക്കവാറും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെന്തെന്നുംകൂടാതെതന്നെ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് തിരിഞ്ഞ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു വരാത്തതുകൊണ്ടു പ്രസവത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്നതാണ് (Un reduced occipito posterior position) ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞ് നാഭിയെല്ലിന്റെ താഴെ വന്നു നില്ക്കുകയും തലയുടെ പിൻഭാഗം പുണെല്ലിന്റെ മുമ്പിലായി വന്നുനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസവവേദന വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രസവത്തിനു വളരെ സമയമെടുക്കുന്നതും പെരിനിയം വല്ലാതെ കീറിപ്പോകാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നതുമാണ്.


പ്രതിവിധി:- ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് മുന്നാമത്തെ നിലയിലാണോ നാലാമത്തെ നിലയിലാണോ എന്നു പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് വൈഫ് ഉടനെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാകുന്നു. കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന അതിന്റെ തോലു മുന്നോട്ടു തള്ളിനില്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു ചുരുള തുണി (പാഡ്-Pad) വച്ച് ബൈൻഡർ ഇടുക. അതിനുശേഷം പാഡ് വച്ചതിന്റെ എതിർഭാഗത്തേയ്ക്കു ചരിച്ചുകിടത്തുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പ്രസവം

വത്തിനു താമസം നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കുട്ടിയുടേയും, തളയുടേയും നാഡിമിഡിപ്പ് എത്രവീതമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

നർത്തശിശുവിന്റെ മുഖം


ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവം

മുഖം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസ്സുകൾ വളരെച്ചുരുക്കമാണ്. 300-ന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിനെ ഇപ്രകാരം കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ.




ചിത്രം 103

മുഖം. ജനനമുഖമായി വരുന്ന അവസരത്തിലെ മുഖജനനം.



ചിത്രം 104



ചിത്രം 105

മുഖം ജനനമുഖമായി വരുന്നത് കുമ്പിരുദ്ധമാണെങ്കിലും ചിലതു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുംകൂടാതെ സ്വാഭാവിക പ്രസവം പോലെതന്നെ നടക്കാറുണ്ട്.

താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ് മുഖം ജനനമുഖമായി വരുന്നത്.

- 1 മേൽപ്രസ്ഥാവിച്ചതുപോലെ പ്രസവാരംത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് മൂന്നാമത്തേയോ, നാലാമത്തേയോ നിലകളിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, മുഖം ജനനമുഖമായി ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നതിന് സൗകര്യമുണ്ടാകുന്നു.
- 2 ശർഭാശയത്തിന്റെ ചരിവുനിമിത്തം കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സ് കീഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വശത്തുള്ള എല്ലിനേരെ തിരിയുന്നതുകൊണ്ട് മുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കിറങ്ങാൻ തരപ്പെടുന്നു.
- 3 ഉപസ്ഥാശയം സാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞു പരന്നിരുന്നാൽ ശിശുശിരസ്സ് മുന്നോട്ടു കുന്നിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനപകരം പിന്നോട്ടു നിവർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ മുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നു.

ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രസവങ്ങളിൽ, പ്രസവാരംത്തിൽ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കാതെ ഉയർന്നുകിടക്കുന്നതായിക്കാണാം. ക്രമവിരുദ്ധമായ ഉടയങ്ങളുടെ മുഖ്യമായൊരടയാളമാണിത്. യോനീമാഗ്നമായി പരിശോധിച്ചാൽ മുന്നീക്കും കൂത്തു സഞ്ചിപോലെയും, കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾക്കുചുറ്റുമുള്ള എപ്പുകൾ, മൂക്കു, വായ് താടി എന്നിവയെല്ലാം സ്പർശിച്ചറിയിച്ചാൽ കഴിയുന്നു. മുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു നല്കുവണ്ണം ഇങ്ങനെയും മുന്നീക്കും പൊട്ടിയും കാണപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖം നീരുപന്നു വീങ്ങുന്നതാണെന്നും, അതിനാൽ മുഖം പൂഷ്ടമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയാകുന്നതാണെന്നുമുള്ള കാര്യം ഇത്തരങ്ങത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ഈ സംശയം തീർക്കുവാൻ വിരൽകടത്തി നോക്കിയാൽമതി. വിരൽ കുട്ടിയുടെ വാൽക്കത്തുകടക്കുന്നതാണ്. കുട്ടിയുടെ വാൽക്കളിലായ വിരൽ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഷി പുരണ്ടിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ മല

ഭാരത്തിനുള്ളിലാണ് വിരൽ കടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബലമായി പിടിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതും വിരൽ പുറത്തേയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഷി (Meconium) പുരണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം.

മുഖം-ജനനമുഖം


(ഫെയ്സ് പ്രസന്റേഷൻ—FACE PRESENTATION):—

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു നാലു നിലകളിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് മുന്നഭ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ മുഖം, ജനനമുഖമായി വരുമ്പോഴും നാലു നിലകളിലായിട്ടാണ് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നത്.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ താടി, ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തായി കിടക്കുന്നുവോ ആ ഭാഗത്തിന്റെ പേരനുസരിച്ചാണ് മുഖത്തിന്റെ ഓരോ നിലയ്ക്കും പേരുകളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

മുഖത്തിന്റെ ഒന്നാംനില (FIRST FACE):—


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ താടി പിൻഭാഗത്തു വലതുവശം ചേന്തം നെററി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു ഇടുവശം ചേന്തമിരിക്കും.



ചിത്രം 106: മുഖത്തിന്റെ ഒന്നാംനില.

മുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംനില (SECOND FACE):—


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ താടി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് ഇടതുവശം ചേന്നും, നെറ്റി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു വലതുവശം ചേന്നുചിരിക്കും.



ചിത്രം 107: മുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംനില.

മുഖത്തിന്റെ മൂന്നാംനില (THIRD FACE):—


കുട്ടിയുടെ താടി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് ഇടതുവശം ചേന്നും, നെറ്റി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് വലതുവശം ചേന്നുചിരിക്കും.



ചിത്രം 108: മുഖത്തിന്റെ മൂന്നാംനില.

മുഖത്തിന്റെ നാലാംനില (FOURTH FACE):—

ശിശുവിന്റെ താടി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് വലതുവശം ചേർന്നു, നെറ്റി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് ഇടത്തോട്ടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു.



ചിത്രം 109: മുഖത്തിന്റെ നാലാംനില.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ മുഖം ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്തോറും താടി തിരിഞ്ഞുവന്നു് നാഭിയെല്ലിന്റെ ചുവട്ടിലോ, മുതുകെല്ലിന്റെ മുമ്പിലോ ആയിട്ടാണു് വരുന്നതു്. മുഖം നാഭിയെല്ലിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്താണു് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രസവം അരിഷ്ടതകളൊന്നും കൂടാതെ നടക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ താടി തിരിഞ്ഞു് മുതുകെല്ലിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണു് വരുന്നതെങ്കിൽ (Unreduced mento posterior position) പ്രസവം ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡാക്ടറുടെ സഹായം കൂടാതെ നടക്കാൻ പ്രയാസമാണു്. താടി നാഭിയെല്ലിന്റെ ചുവട്ടിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നപക്ഷം വായു്, മൂക്കു്, കണ്ണു് എന്നീ ക്രമത്തിലാണു് പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നതു്. ഇങ്ങനെയെന്ന കേസുകളിൽ കുട്ടിയുടെ തലയുടെ ആകൃതി വ്യത്യാസപ്പെട്ടു് നീളം വർദ്ധിച്ച രീതിയിലും, കണ്ണും മൂക്കും മറ്റും വീങ്ങിയുമിരിക്കുന്നതാണു്.


പ്രതിവിധി:-

ഏതെങ്കിലും പ്രസവത്തിൽ മുഖമാണ് ജനനമുഖമായി വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലുടനെ മിഡ് വൈഫ് ഡാക്ടറുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. മുഖം, ജനനമുഖമായിട്ടുള്ള പ്രസവത്തിൽ ഗർഭിണിയെ നടത്തുകയോ, എനിമകൊടുത്ത് മലം കളയുകയോ, ഒന്നിലധികം തവണ യോനി പരിശോധനചെയ്യുകയോ, മുക്കാനനുവദിക്കുകയോ അരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുന്നീക്കം പൊട്ടിപ്പോകാനിടയാകുന്നതാണ്.

ജനനമുഖം-നെറ്റി

(ബ്രോ പ്രസൻറേഷൻ-BROW PRESENTATION)

മുഖം ജനനമുഖമായി വരുന്ന അതേ കാരണങ്ങൾക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് നെറ്റിയും ജനനമുഖമായി വരുന്നത്.



ചിത്രം 110: നെറ്റി ജനനമുഖമായി വരുന്നത്.

തല ജനനമുഖമായി വരുന്ന വിവിധ നിലകളെക്കുറിച്ച് മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനെക്കാളെല്ലാം വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളതാണ് നെറി ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവങ്ങൾ. പ്രസവത്തിനും വളരെ സമയമെടുക്കും.

നെറി ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തിൽ ജനനമുഖം വളരെ ഉയർന്നായിരിക്കും കിടക്കുക. അതിനാൽ യോനീമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധനയിൽ വിരൽകൊണ്ടു ജനനമുഖം സ്പർശിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.


പ്രതിവിധി:-

നെറി ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായം കൂടാതെ അപകടരഹിതമായി പ്രസവം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മിഡ്‌വൈഫ് ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.

ജനനമുഖം—പുഷ്പം

(ബ്രീച്ച് പ്രസന്റേഷൻ—(BREECH PRESENTATION):-

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്നത് രണ്ടു വിധത്തിലാകാം. ഒന്നാമത്തേതിൽ (Flexed breech) ശിശുവിന്റെ തുടകൾ അതിന്റെ വയറിനുമീതെ മടങ്ങിയും കൈകൾ മാറോട്ടു ചേർന്ന രീതിയിൽ ശിരസ്സ് കീഴോട്ടു കനിഞ്ഞും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന വിവിധ മാതൃകകൾ ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക.



ചിത്രം 111 (A): പുഷ്പാ ജനനമുഖമായിവരുന്ന
 രണ്ടു മാതൃകകൾ - BREECH PRESENTATION - L. S. A.
 ഇടത്തേ ആസനം, വലത്തേതിനേക്കാൾ സേക്രത്തിൽനി
 ന്നും കൂടുതൽ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു അടുത്തുകാണുന്ന അവസ്ഥ.




ചിത്രം 111 (B): BREECH PRESENTATION R. S P.

വലത്തേ ആസനം. ഇടത്തേതിനേക്കാൾ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു കൂടുതൽ അടുത്തുകാണുന്ന അവസ്ഥ.

നാല്പതു കേസുകളിൽ ഒന്നു വീതം പൂഷം ജനനമുഖമായി വാറുണ്ട്. അധികം പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകളിലാണ് സാധാരണയായി ഈ രീതി കണ്ടുവരുന്നതും. പൂഷം ജന

നമുവമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിധത്തിൽ (Extended breech) ശിശുവിന്റെ തുടകളും, കാലുകളും അതിന്റെ ഉദരത്തിനുമേൽഭാഗത്തേയ്ക്ക് നീണ്ടിരിക്കുകയാണുചെയ്യുന്നത്.



ചിത്രം 112

ഒരു കാൽ നീവർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൂഷ്പാദം.
(Breech presentation with one leg extended).

ആദ്യപ്രസവത്തിലാണ് ഇതു സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ:-

ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ പ്രകൃതി, ഉപസ്ഥാശയത്തിലെ വളർച്ചക്കു (മുഴക്കം), കുട്ടിക്കുമ്പായി മറുകുട്ടി വരിക (Placenta praevia), മൂന്നിർ ആധിക്യം, ഇരട്ട ശിശുക്കൾ, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വൈരൂപ്യം തുടങ്ങി കാരണങ്ങളാണു് പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്നതിനു് പരയാറുള്ളതു്. എന്നാൽ പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന 90 ശതമാനം കേസുകളിലും മേല്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണു് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്നതു് വെറും യാദൃശ്ചികമാണെന്നാണു്. എന്നാൽ മാസംതികയാത്ത പ്രസവങ്ങളിൽ ഗർഭസ്ഥശിശു വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ചലനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭിക്കുമല്ലോ. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഗർഭസ്ഥശിശു പുഷ്പോദയനിലായിലാണു് സ്ഥിതിചെയ്യാറുള്ളതെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുക.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ ഗർഭിണിയുടെ ഉദരഭാഗത്തു് (ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു്) സ്പർശിച്ചുനോക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള ഭാഗം സാമാന്യം വലുതും, ഉരുണ്ടതും മാർദ്ദവമില്ലാത്തതുമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണു്. കീഴ്ഭാഗത്താകട്ടെ ഉരുണ്ടതും, മാർദ്ദവമുള്ളതുമായ ഭാഗം സ്പർശിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന. കീഴ്ഭാഗത്തു് പുഷ്പമായതുകൊണ്ടാണു് ഉരുണ്ടു് മാർദ്ദവപ്പെട്ടു തോന്നുന്നതു്. മൂന്നിർക്കും പൊട്ടുന്നതിനുമുമ്പു് യോനി മാഗ്നമായി പരിശോധിച്ചാൽ, ജനനമുഖം ഉയർന്നുവരുന്നതുകൊണ്ടു് എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയില്ല, മൂന്നിർക്കും കൂത്തിരിക്കുന്നതായിമാത്രം അനുഭവപ്പെടും. മൂന്നിർക്കും

പൊട്ടിയതിനുശേഷം ശിശുവിന്റെ ഗുദാസ്ഥിയും മല
ഭാരവും മറ്റും വിരലിൽ തടയുന്നതാണ്. മുൻപ് സൂചി
പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പൂഷം മുഖമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരി
ക്കാൻ ഇടയാകരുത്. മുഖമാണോ, പൂഷമാണോ എന്നു
സംശയമുണ്ടായാൽ വിരലിന്റെ അറ്റം ഭാരമായി തോ
ന്നുന്ന ഭാഗത്തു കടത്തിയാൽ, മലഭാരമാണെങ്കിൽ വിര
ലിൽ പിടിക്കുന്നതുപോലെതോന്നുന്നതും വിരലിൽ മഷി
പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം (മെക്കോണിയം—Meco-
nium) പുറങ്ങിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മുഖമാണെങ്കിൽ
വിരലിന്റെ അറ്റം കടത്തിയാൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ
നാക്കും, തൊണ്ണയും വിരലിൽ തടയുന്നതും വിരലിൽ
കട്ടി കടിച്ചതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഗർഭസ്ഥശിശു
വിന്റെ മലഭാരത്തിലുള്ള മെക്കോണിയം എന്ന മഷി
പോലെയുള്ള വസ്തു വിരലിൽ പററുക എന്നുള്ളത് പൂഷം
ജനനമുഖമായി വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സ്പഷ്ടമായ തെളി
വാണ്.


പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടങ്ങൾ

ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തേക്കാൾ
അപകടകരമാണ് പൂഷം ജനനമുഖ (Breech present-
ation) മായി വരുന്നത്. പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുന്ന
കേസുകളിലെല്ലാംതന്നെ പല പ്രാവശ്യം യോനീമാഗ്ഗ്യാ
യി പരിശോധിക്കേണ്ടിവരുന്നതും ശസ്ത്രപ്രയോഗമൂലം
കട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടിവരുന്നതുമാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മാതാവിനും ശിശുവിനും അപകടങ്ങൾ വരുത്തിത്തീർക്കു
ന്നിടയുണ്ട്.

പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുന്ന 50 ശതമാനം കേസുകളി
ലേയും കട്ടികൾക്ക് പരുക്കേറുകയും, മരണാപ്ത
പോകുകയുമാണുചെയ്യുന്നത്.

പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുന്ന 50 ശതമാനം കേസുകളി
ലും, നാലു നിലകളിൽ പൂഷം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേ
യ്ക്കിറങ്ങുന്നു.


പുഷോദയം; ഒന്നാംനില (FIRST BREECH):-



ചിത്രം 113: പുഷോദയത്തിൽ: ഒന്നാംനില.

- 1 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് ഇടതുവശം ചേർന്നാണു് ഒന്നാംനിലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്.


പുഷോദയം; രണ്ടാംനില (SECOND BREECH):-



ചിത്രം 114: പുഷോദയത്തിൽ: രണ്ടാംനില.

- 2 ശിശുവിന്റെ പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻവശത്തു് വലതുഭാഗം ചേർന്നാണു് രണ്ടാംനിലയിൽ കാണുക.


പുഷ്പോദയം; മൂന്നാംനില (THIRD BREECH):-



ചിത്രം 115: പുഷ്പോദയത്തിൽ: മൂന്നാംനില.

3 കുട്ടിയുടെ പുറം ഉപസ്ഥമാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് വലതുവശം ചേർന്നാണു് കാണപ്പെടുന്നതു്.

പുഷ്പോദയം; നാലാംനില (FOURTH BREECH):-



ചിത്രം 116: പുഷ്പോദയത്തിൽ: നാലാംനില.

4 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പുറം ഉപസ്ഥമാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു് ഇടതുവശം ചേർന്നു് നാലാംനിലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസ്സുകളിലെ പ്രസവപുരോഗതി

ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് പൂഷ്പോദയത്തിലും, പുഷ്പം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നത്.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസ്സുകളിൽ അത് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ശിശുവിന്റെ ചന്തി (കണ്ടി) മറേറ ചന്തിയേക്കാൾ അല്പം കീഴോട്ടായി ഒരു മുഴപോലെ മുന്നോട്ടു തള്ളിനില്ക്കും. മുന്നോട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്ന ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ അടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതു തിരിഞ്ഞ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുന്നിലേയ്ക്കു വന്ന് നാഭിയെല്ലിന്റെ ചുവട്ടിൽ നില്ക്കുന്നു. പെരിനിയം ചീന്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാഭിയെല്ലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ആസനമുഴ ആദ്യം പുറത്തേക്കു വരും. പെരിനിയം കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്തി രണ്ടുംകൂടി ഒന്നിച്ചു പുറത്തേയ്ക്കു വരും. പുഷ്പഭാഗം ഇറങ്ങിയ അതേ രേഖയിലൂടെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ചുമലും ഇറങ്ങുകയും ഒരു ചുമൽ അല്പം മുന്നോട്ടു തള്ളി നില്ക്കുകയും ചെയ്യും. മുന്നോട്ടു തള്ളിനില്ക്കുന്ന ചുമൽ ആദ്യവും തുടന്ന് മറേറ ചുമലും പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നു. ശിശുവിന്റെ കൈകൾ അതിന്റെ മാറോടു ചേർന്ന് മടങ്ങിയ നിലയിലുമായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്.

പുഷ്പം ഇറങ്ങിയതിന്റെ നേരെപ്പുതിർ രേഖയിലൂടെയാണ് കുട്ടിയുടെ തല ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങുന്നത്. തല ഉപസ്ഥാശയത്തിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ താടി നെഞ്ചിലേയ്ക്കു കനിഞ്ഞ് അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. തല ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ അടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞ് നാഭിയെല്ലിന്റെ ചുവ

ട്ടിലും, മുഖം പൂണെല്ലിന്റെ മുമ്പിലുമായി വരും. ക്രമേണ താടി, മുഖം, നെറി, ശിരസ്സ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നു.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ ശിശുവിന്റെ പൂപ്പത്തിലും, ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും വീക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ ശിശുവിന് അപകടസാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ, ഇത്തരം പ്രസവങ്ങളുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും മിഡ്‌വൈഫിന് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ ശിശു മരണത്തിനും, മറ്റു പരുക്കുകൾക്കും ഇടയായിത്തീരാവുന്ന കാരണങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

- 1 പൊക്കിൾകൊടി തലയുടേയും ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റേയും മദ്ധ്യേ പെട്ട് ഞെരുങ്ങി അമൻ പോകുന്നതിനാൽ അതിൽക്കൂടിയുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിലച്ചുപോകുന്നു.
- 2 തല അവസാനം വരുന്നതിനാൽ ഗർഭാശയം അതിന്മേൽ ചുരുങ്ങുകയും തന്നിമിത്തം മറുകട്ടിക്ക് അമച്ച് പററുകയും അതിൽക്കൂടിയുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിലച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.
- 3 ശിശുവിന്റെ ഉടൽ പുറത്തേയ്ക്കു വന്നതിനുശേഷം കുറേ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ശിരസ്സ് പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തണുത്ത വായുസമ്പർക്കം മൂലം ശിശു ശ്വാസിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ശ്രമത്തിൽ മുന്നീർ, കഫം തുടങ്ങിയവ കട്ടിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേയ്ക്കു വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഫലം ശ്വാസബന്ധനവും മരണവുമായിരിക്കും.

- 4 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തോളും, കൈകളും പുറത്തേക്കു വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കാലുകളിൽ പിടിക്കുന്നതിനു പകരം ഉടലിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതിന് ഇടയായാൽ അതിന്റെ കരളിന് (Liver) കേടുപററാനിടയാകുന്നു.
- 5 ശിശുവിന്റെ കൈകൾ അതിന്റെ തലയ്ക്കുമീതെയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൈകൾ കീഴോട്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭ്രൂണാസ്ഥി ഒടിയാനിടയാകുന്നു.
- 6 മേൽപ്രസ്ഥാവിച്ചതുപോലെ കൈകൾ തലയ്ക്കുമീതെ നിന്ന് കീഴ്പോട്ടു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞരമ്പിന് പരുക്കു പററാനിടയാകുന്നതും ശിശുവിന്റെ കൈ തളൻപോകുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു.
- 7 താടിയിൽ പിടിച്ചുവലിച്ച് തല പുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ താടിയെല്ലു പൊട്ടിപ്പോയേക്കാം.
- 8 ശിശുവിന്റെ പുറമേയുള്ള ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നീരുണ്ടായി വീങ്ങി പഴുക്കാനിടയാകുന്നു.
- 9 ശസ്ത്രപ്രയോഗം മൂലമാണ് തല പുറത്തേയ്ക്കു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഖം കോടി പോകാനിടയുണ്ട്.

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വിഷമസന്ധികളും, അപകടങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല. പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവങ്ങളിൽ ഒരു ഡാക്ടറുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ലത്. വിശേഷിച്ച് ആദ്യപ്രസവത്തിൽ ഡാക്ടറും

മിഡ്‌വൈഫും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവങ്ങളിൽ മിഡ്‌വൈഫ് താഴെപ്പറയുന്ന മൻകരുതലുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മുന്നീക്കം പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗർഭിണിയെ കിടത്തുകയും, മുക്കരുതെന്നും മുക്കിയാൽ വരാവുന്ന അപകടങ്ങളും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം.

ബാഹ്യമായ പരിശോധന മൂലമോ യോനിമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധന മൂലമോ, പൂഷമാണ് ജനനമുഖമായി വരുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ മുന്നീക്കം പൊട്ടിയല്ലാതെ യോനിമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധന നടത്തരുത്. ആദ്യത്തെ യോനീപരിശോധനയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

പ്രഥമയോനീപരിശോധനയിൽ തന്നെ കുട്ടിക്കു മുമ്പായി പൊക്കിൾകൊടി ഇറങ്ങിപ്പോകുമോ എന്നു വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടിക്കു മുമ്പായി പൊക്കിൾകൊടി വന്നാൽ കുട്ടിക്ക് അപായം നേരിടാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്.

കുട്ടിക്കു മുമ്പായി മറുകുട്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശിശുപ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെ അതിനു കൃത്രിമ ശ്വാസോഛവാസം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി രണ്ടു പാത്രങ്ങളും, ധാരാളം ചൂടുവെള്ളവും, പച്ചവെള്ളവും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ മിഡ്‌വൈഫ് ചെയ്തിരിക്കണം.

ശിശുവിന്റെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗം പുറത്താകുന്നതുവരെ മേല്പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും മിഡ്‌വൈഫ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

കുട്ടിയുടെ ഉടൽ പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നാലുടനെ ആ ഭാഗം ശുദ്ധമായ ഒരു ടവുൽകൊണ്ട് പൊതിയുക. ഇങ്ങിനെ

ചെയ്താൽ കുട്ടിയുടെ ഉടലിൽ തണുത്ത കാററ്റ് ഏല്ക്കാതിരിക്കുന്നതും കുട്ടി ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. ശിരസ്സും പുറത്തുവന്നതിനുശേഷമല്ലാതെ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വരാവുന്ന അപകടത്തെപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് മിഡ്വൈഫ് ഓമ്മിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണിതു്.

പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെഭാഗംവരെ ശിശു പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കിൾക്കൊടി അല്പം പുറത്തേയ്ക്കു വലിച്ചു് അതിൽ സ്പന്ദനമുണ്ടോ എന്നു് പരിശോധിക്കുക. പൊക്കിൾക്കൊടിയിലെ മിടിപ്പു് വളരെ സാവധാനത്തു ലാണെങ്കിൽ പൊക്കിൾക്കൊടി ശിരസ്സിന്റേയും ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റേയും ഇടയിൽപ്പെട്ടു് അമൻപോയിരിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഉടനെതന്നെ പൊക്കിൾക്കൊടി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തേയ്ക്കു് മാറ്റിയിടുകയും വേണം.

പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ സ്പന്ദനം ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമലുകൾ പുറത്താകുന്നതുവരെ മിഡ്വൈഫ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെഭാഗംവരെ ശിശു പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നോ, രണ്ടോ വേദനയോടുകൂടി ബാക്കി ഭാഗവും പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നതാണു്.

പൊക്കിൾക്കൊടി ശരിയായ രീതിയിൽ മിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ വലിച്ചു പുറത്തേക്കെടുക്കുവാൻ മിഡ്വൈഫ് ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. താമസംതോന്നുന്നപക്ഷം മിഡ്വൈഫ് കുട്ടിയുടെ ഉടൽ നാഭിയെല്ലിന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്കൊക്കിപ്പിടിക്കുകയും മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ടു് ഗർഭാശയം അമർത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുകയും മുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രസവം വേഗം നടക്കും.

ശിശുവിന്റെ മുഖം യോനീദാരത്തിൽ കണ്ടാലുടനെ അതിന്റെ മൂക്കും, വായും തുടങ്ങുന്നപക്ഷം അത് ശ്വാസിച്ചാലും അപായം നേരിടുകയില്ല. കുട്ടിക്ക് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം.

പ്രസവശേഷം ശിശുപരിചരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും. പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിൽ രക്തവാച്ചയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പൂഷം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം പ്രസവംസ്വാഭാവികമായിരിക്കയില്ല. ജനനമുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം, അസാധാരണമായ പല ഭൂഘടങ്ങളും പ്രസവപുരോഗതിക്ക് സാരമായ വിഘ്നം വരുത്തുന്നതാണ്. പ്രസവപുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായിത്തീരുന്ന കാരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

1) പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽ

മുന്നിക്ഷം പൊട്ടുക:-

(PREMATURE RUPTURE OF THE MAMBRANE)

ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിക്കുന്നതിന് വളരെ താമസം നേരിടുന്നതും പൊക്കിൾക്കൊടി യോനിയിലേയ്ക്കു വീഴുന്നതും കുട്ടിക്ക് അപായം നേരിടുന്നതുമാണ്. പൂഷം എപ്പോഴും ശിരസ്സിനെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ പൂഷം കടന്നുപോകുവാനുള്ള വിസ്താരം ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെയും ശിരസ്സ് കടന്നുപോകുവാനുള്ള വികാസം അതിനുണ്ടാവുന്നതുവരെ താമസം നേരിടുകതന്നെ ചെയ്യും.

2) പൂഷം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുക:-

(IMPACTION OF BREECH)

കുട്ടിക്കു കൂടുതൽ വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കുകയോ ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വിസ്കാരം കറവായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂഷം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ തങ്ങിനിന്നു പോകുന്നു. (Impaction of Breech) വേദനനന്നായുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, യോനിപരിശോധനയിൽ ശിശുവിന്റെ പാദം മിഡ് വൈഫിന്റെ വിരലിൽ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പൂഷം കീഴോട്ടിറങ്ങാതെയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വിസ്കാരക്കുറവുകൊണ്ട് പൂഷം തങ്ങിനില്ക്കുന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ഡാക്ടറുടെ സഹായം ഉടൻ തേടുകയും വേണം..

3) കാലുകൾ നീവർന്നിരിക്കുക:-

(EXTENSION OF THE LEG)

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ കാലുകൾ മടിങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതിനു പകരം നീവർന്നിരിക്കുക (Extension of the Child's leg). മാസം തികയാത്ത പ്രസവങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഉപസ്ഥാശയം സാമാന്യത്തിലധികം വലുതായിരുന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലും പ്രസവം സ്വാഭാവികമായി നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കുട്ടി വളരെ വലുതായിരിക്കുകയോ ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വിസ്കാരമില്ലാതിരിക്കുകയോ പ്രഥമഗർഭമായിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് താമസം നേരിടുന്നതാണ്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പൂഷം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയും വേദനശക്തമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൂടി ജനനമുഖം ആനിലയിൽനിന്ന് കൂടുതലായി കീഴോട്ടിറങ്ങിവരാതിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ കുട്ടിയുടെ കാലു നീവർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു മന

സ്ത്രീലാക്കുകയും ഉടനെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുകയും വേണം. പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ ഭാഗംവരെ കുട്ടിപിറന്നതിനുശേഷമേ ചിലപ്പോൾ ഈ അപകടം കണ്ടുപടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊള്ളൂ എന്നുവരാം. ഈ സ്ഥിതിയിൽ കുട്ടിക്ക് അപകടം നേരിടുമെന്നു മിഡ്‌വൈഫിനു പൂണ്ണബോധ്യം വന്നാൽ ഗർഭാശയം നല്ലവണ്ണം അമർത്തിക്കൊണ്ടു കുട്ടിയുടെ മുട്ടുമടക്കി കീഴോട്ടുകാണ്ടു വരാൻ ശ്രമിക്കണം.

4) കൈകൾ തലയ്ക്കുമീതെ ഉയർന്നിരിക്കുക:—

(EXTENSION OF THE CHILD'S ARM)

കുട്ടിയുടെ കാലുപിടിച്ചുവലിച്ചു അതിനെ പുറത്തേക്കുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ കൈകൾ തലയ്ക്കുമീതേയുയർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കിൾ ഭാഗംവരെ പുറത്തേക്കുവന്നതിനുശേഷം മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നു. പൊക്കിൾഭാഗം വരെ പിറന്നതിനുശേഷം പിന്നീട് താമസം കാണുന്നപക്ഷം യോനിമാഗ്ഗമായി പരിശോധന നടത്തുക. കുട്ടിയുടെ കൈകൾ മാറോട്ടുചേർന്നു മടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായം ഉടനെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് അപകടം നേരിടുമെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, താഴെപറയും പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് മിഡ്‌വൈഫ് കുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ടു ഗർഭാശയം നല്ലപോലെ അമർത്തിക്കുകയും മിഡ്‌വൈഫ് കുട്ടിയുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉടൽ പെരിനിയം ഭാഗത്തേക്കും അതിനുശേഷം നാഭിയെല്ലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും വലിച്ചടുപ്പിക്കുക.

പിന്നീട് മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ ഇടതുകൈ യോനിയിൽ കടത്തി, ശിശുവിന്റെ പുറത്തുകൂടി മേല്പോട്ടു കൊണ്ടുപോയി ശിശുവിന്റെ കൈമുട്ടിന്റെ മടക്കിൽ പിടിച്ചു അമർത്തുക. തുടർന്ന് മുട്ടിനുതാഴെ പിടിച്ചു സാവധാനത്തിൽ വലിച്ചു ശിശുവിന്റെ നെഞ്ചത്തുകൂടി കൈപുറ

ത്താക്കണം. ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തായിരിക്കുന്ന കയ്യാണ് ആദ്യമായി പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. കുട്ടിയുടെ ഉടൽ പിടിച്ചു പെരിനിയത്തിന്റെഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചുപ്പിടിച്ചതിനുശേഷം മിഡ്‌വൈഫ് തന്നെ വലതുകൈ മുൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം യോനിയിലൂടെ കടത്തി ശിശുവിന്റെ മറോക്കയും വലിച്ചുപുറത്താക്കുക.

5) തലപുറത്തേയ്ക്കു വരുവാൻ താമസം നേരിടുക:- (DELAY IN THE AFTER COMING HEAD)

ഈ സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കുട്ടിക്കു അപകടം നേരിടാനാണ് സാധ്യത. ഡാക്ടർക്കുടയില്ലെങ്കിൽ മിഡ്‌വൈഫ് തലപുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിമരിച്ചുപോകും. അതിനാൽ താഴെ പറയുംപ്രകാരം ചെയ്യുകുട്ടിയുടെ തലപുറത്തെടുക്കണം. മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ ഇടതുകൈ യോനിയിലേക്കു കടത്തി രണ്ടു വിരലുകൾ ശിശുവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ യോനിക്കുള്ളിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്ന വിരലുകൾ പിൻകഴുത്തിന്റെ ഇരുവശവുമായി പിടിച്ചു ചുമലുകൾ കൊളുത്തിപി



ചിത്രം 117

പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തിൽ ശിശുവിന്റെ തലപുറത്തേയ്ക്കു കേണ്ടവിധം.

ടിക്കുക. അതിനുശേഷം തല ആദ്യം പെരിനിയം ഭാഗത്തിനുനേരേയും പിന്നീട് നാഭിയെല്ലിന്റെ നേരേയും വലിച്ചാൽ പുറത്തേയ്ക്കുപോകും. ഈ ക്രിയചെയ്യുമ്പോൾ ഗർഭാശയം കീഴോട്ടും പുറകോട്ടുമായി അമർത്തി തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിനാൽ മറൊരാളുടെ സഹായം തേടണം.

കാൽമുട്ടോ കാൽപാദമോ ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവം:-

കാൽമുട്ട്, പാദം എന്നിവ ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസുകൾക്കും വളരെ താമസമുണ്ടാകും. യോനീപരിശോധനയിൽ പാദവും, കാൽമുട്ടുകളും വേർതിരിച്ചറിയാനും പ്രയാസമില്ലല്ലോ. കാൽമുട്ടാണെങ്കിൽ മുട്ടുചിരട്ടകൾ ഇളക്കാൻ കഴിയുന്നതും പാദമാണെങ്കിൽ വിരലുകൾ ഒരേ നീളത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. പുഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഇതിനുമുണ്ട്. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ആലസ്യം (Sluggish uterus) മൂലവും പ്രസവത്തിന് താമസവും അതിനാലുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതുമായിരിക്കും.


ശിരസും കയ്യും ഒന്നിച്ചു് ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവം:-

ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ, കുട്ടിയുടെ വിലങ്ങനെയുള്ള കിടപ്പ്, കുട്ടി മരിച്ചുകിടക്കൽ, തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് കയ്യും, ശിരസ്സും ഒരുമിച്ചു് ജനനമുഖമായി വരുന്നതു്. മാസം തികയാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക പ്രസവംപോലെ പ്രയാസംകൂടാതെ പ്രസവം നടന്നുകൊള്ളും. യോനീപരിശോധനയിൽ കയ്യ്, പാദമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ വിരലുകൾ സ്പർശിച്ചു് അതു് കയ്യുടെയോ കാലിന്റേതോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

കൈവിരലുകൾ തുല്യനീളത്തിലായിരിക്കയില്ല. തള്ള വിരൽ മറ്റു വിരലുകളേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. പാദമാണെങ്കിൽ വിരലുകളെല്ലാം തുല്യനീളത്തിലായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം മിഡ്‌വൈഫ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. കയ്യും കാലും ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനിറങ്ങുവാൻ ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വിസ്താരമുണ്ടായിരിക്കയില്ല, ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടണം.

കുട്ടിയുടെ വിലങ്ങനെയുള്ള കിടപ്പ്

കുട്ടി വിലങ്ങനെയാകി കിടക്കുന്ന പ്രസവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ദീർഘമധ്യരേഖ, ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഹ്രസ്വമധ്യരേഖയിലായിട്ടായിരിക്കും.




ചിത്രം 118:

കുട്ടിയുടെ പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻവശത്തായി വിലങ്ങിയുള്ള കിടപ്പ്.

കുട്ടിയുടെ പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻവശത്തായി വിലങ്ങിരിക്കുന്നതും:

ഈ നിലയിലുള്ള പ്രസവത്തിൽ ശിശുവിന്റെ തോരഭാഗമോ, കൈമുട്ടോ, കൈതന്നെയോ യോനിയിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നു. ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യവും ചരിവുമാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നത്. ആദ്യപ്രസവത്തിൽ ഇങ്ങിനെ കാണാറില്ല. വളരെ അപൂർവ്വമായേ കുട്ടി വിലങ്ങനെ കിടക്കാറുള്ളൂ. അതും ഒന്നിലധികം പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽമാത്രം.

മറ്റൊരു രീതിയിലും കുട്ടി വിലങ്ങിരിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ തല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒക്കെല്ലിനോടു ചേർന്നും




ചിത്രം 119:

ശിശുവിന്റെ പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തേയ്ക്കായും, തലയും പൃഷ്ഠവും ഓരോ ഒക്കെല്ലിനോടു ചേർന്നുള്ള കിടപ്പ്

പുഷ്പം എതിർവശത്തുള്ള ഒക്കുപ്പിനോടു ചേർന്നു പുറംഭാഗം ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻപിലോ, പിൻപിലോ ആയിട്ടും ആയിരിക്കും ഈ രീതി.

ഈ സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നീക്കടം കൂർത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം ഉയർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ആദ്യം വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. യോനിയിലേക്ക് കൈ കടത്തിയാൽ, വാരിയെല്ലുകൾ, കഴുത്തിലെ അസ്ഥി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും കൈയിൽ തടയും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ളപ്പോൾ പ്രസവവേദനയുടെ ആ



ചിത്രം 120:

കയ്യ് യോനിയിലേക്കിറങ്ങി വിലങ്ങിരിക്കുന്നത്.

രംഭത്തിൽത്തന്നെ മുന്നീക്കും പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും, അതോടൊപ്പം ശിശുവിന്റെ ഒരു കയ്യും യോനിയിലേയ്ക്കും ഇറങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും. കയ്യും യോനിയിലേയ്ക്കും നീണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കിടപ്പും വിലങ്ങനെയാണെന്നും ഊഹിക്കാം. ശിശുവിന്റെ തോരം കവിളായിട്ടും കക്ഷം, കഴല (ഒടി) ഭാഗമായിട്ടും കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടായിട്ടും കയ്യും, കാലായിട്ടുമൊക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. വാരിയെല്ലുകൾ, കണ്ണാസ്ഥി എന്നിവയുടെ സാമീപ്യം മൂലം കവിളല്ലാ തോളാണെന്നും, മുട്ടുചിരട്ടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാൽമുട്ടല്ലാ കൈമുട്ടാണെന്നും, വിരലുകൾ തുല്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയ്യാണെന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രതിവിധി. ശിശുവിന്റെ കിടപ്പും വിലങ്ങനെയാണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാലുടനെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ശിശുവിന്റെ കയ്യും പുറത്തേയ്ക്കും നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രോഗാണുവിമുക്തമാക്കപ്പെട്ട നല്ല തുവാലായിൽ പൊതിഞ്ഞുവയ്ക്കണം. ഇത്തരം പ്രസവത്തിൽ മാതാവിന് അപകടം നേരിടാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രസവസമയം ദീർഘിച്ചാൽ ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോകാനുണ്ടാകാം.

പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി വരിക

(CORD PRESENTATION)


പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ജനനമുഖത്തിന് മുമ്പായി പൊക്കിൾക്കൊടി താഴോട്ടിറങ്ങാറുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഗുരുതരമായ ചില പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ മിഡ്‌വൈഫ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും ഡാക്ടറുടെ സഹായം ഉടനെ തേടേണ്ടതുമാണ്.



ചിത്രം 121: പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ അസാധാരണമായ കിടപ്പ്, മൂന്നിർത്ഥധികൃം, ഉപസ്ഥാശയവൈരൂപ്യം, ഗർഭാശയത്തിന്റെ ചരിവ് തുടങ്ങി ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രസവത്തിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശിഷ്ട്യാ പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ അസാധാരണമായ നീളവും, പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി ഇറങ്ങിവരുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരാറുണ്ട്. മൂന്നിർക്ടം പൊട്ടുന്നതിനുമുൻപ് പൊക്കിൾക്കൊടി കീഴോട്ടിറങ്ങുവാൻ കാരണം ശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ

അടഞ്ഞിരിക്കുകയും, ജനനമുഖത്തിനുമുമ്പായി പൊക്കിൾക്കൊടി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ്, പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി വരിക (Presentation of the Cord) എന്നു പറയുന്നത്. മുന്നീക്കും പൊട്ടി മുന്നീർ മുഴുവൻ പോയതിനുശേഷം പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖത്തിനടിയിലായി ഗർഭാശയകണ്ഠത്തി (Cervix) ലേയ്ക്കോ യോനിയിലേയ്ക്കുതന്നെയോ തള്ളിവരുന്ന രീതിയിലും പൊക്കിൾക്കൊടി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. (Prolapse of the Cord). ഇങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖത്തിന്റെയും, ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെയും ഇടയിൽപ്പെട്ട് അമൻ പോകുന്നതും അതിൽക്കൂടി ശിശുവിലേയ്ക്കുള്ള രക്തവിതരണം തടയപ്പെടുന്നതും തന്മൂലം ശിശു മരണപ്പെടാനിടയുള്ളതുമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യോനീ മാഗ്നായുള്ള പരിശോധനയിൽ പൊക്കിൾക്കൊടി വിരലിൽ തടയുന്നതാണ്. പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ സ്പന്ദനം (മിടിപ്പ്) അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തീരുമാനിക്കാം. ഏറ്റവും ചേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതും, ശിശുവിന്റെ ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ



ചിത്രം 122: പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി വരുമ്പോൾ ഗർഭിണിയെ കിടത്തേണ്ട രീതി.

മേൽഭാഗമായ ഫണ്ടസ് (Fundus) താഴെയും ഗർഭാശയ കണ്ഠം (Cervix) ഉയർന്നും വരത്തക്കവിധത്തിൽ ഗർഭിണിയെ കിടത്തണം. ഇങ്ങനെ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയ പൊക്കിരക്കൊടി അകത്തേയ്ക്കു വലിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗം താഴെയും, ഗർഭാശയ കണ്ഠം ഉയർന്നും വരത്തക്കവിധത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഗർഭിണിയെ കിടത്തുക. 15-20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഈ നിലയിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ചരിച്ചു കിടത്തുക. ജനനമുഖത്തിന്റെ ഏതുവശത്തുകൂടിയാണ് പൊക്കിരക്കൊടി വെളിയിലേയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മീതെ വരത്തക്കവിധമാണ് അവരെ ചരിച്ചുകിടത്തേണ്ടത്; (Sims Position). അപ്പോൾ പൊക്കിരക്കൊടിയിൽ ജനനമുഖം അമരാതിരിക്കുന്നതും, ശിശുവിന് പൊക്കിരക്കൊടിയിൽക്കൂടിയുള്ള രക്തപിതരണം സുഗമമായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

പൊക്കിരക്കൊടിയിൽ മിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്വരം കേൾക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം പ്രസവത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരണമായി മാത്രം മിഡ് വൈഫ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയാകും. പൊക്കിരക്കൊടിയിൽ മിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഗർഭിണിക്കു് ഉപദ്രവമൊന്നും തട്ടാത്തവിധത്തിൽ പ്രസവം വളരെവേഗം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ശിശുവിനേയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരും.

പൊക്കിരക്കൊടി യോനിയിലേയ്ക്കോ അവിടെനിന്നും വെളിയിലേയ്ക്കോ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ അക്രിഫ്ലാവിൻ സൊല്യൂഷനിൽ (1-1000 Acriflavine Solution) മുക്കിയ ഗോസ്സുതുണികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ

ശേഷം ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിന് മീതേക്കൂടി അകത്തേക്കു് തള്ളിയിടേണ്ടതാണു്. ഗർഭാശയകണ്ഠം വളരെ വികസിക്കുന്നതിനുമുൻപു് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുകയാണത്തമം.

തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ജലവീക്കം

(ഹൈഡ്രോസിഫാലസ്—HYDROCEPHALUS)

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്നു് തല വീർത്തുവലുതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിതു്. തലയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ തലയോട്ടിയുടെ ഘനം വളരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു. അതിനാൽ പുറമേയുള്ള പരിശോധനയിൽ തലയ്ക്കു് സ്വാഭാവികമായുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ദാർഢ്യം ഇല്ലാതെ മാർദ്ദവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതാണു്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പൂഷ്ടമായിരിക്കും ജനനമുഖമായി വരുന്നതു്. അപൂർവ്വമായി ശിരസ്സുതന്നെ ജനനമുഖമായി വരുന്നതും അങ്ങിനെ വരുന്നപക്ഷം അതു് ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ ഉറയ്ക്കാതെ പൊങ്ങിനല്ക്കുന്നതും തലയുടെ എല്ലില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ തള്ളിനില്ക്കുന്നതും അതു് മുന്നീക്കേടമാണെന്നു് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുള്ളതുമാകുന്നു. മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പു് കുട്ടി മരിച്ചുപോവുകയാണു സാധാരണ പതിവു്. അപൂർവ്വമായി മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പു് പ്രസവിക്കാറുമുണ്ടു്. പ്രസവവേദന ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും മിക്കവാറും ശിശുവിന്റെ തലയുടെ ജലവീക്കം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു്. മാസം തികഞ്ഞുള്ള പ്രസവമാണെങ്കിൽ ഈ അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രസവം നടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോകുന്നതായതുകൊണ്ടു് ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണു്.

അദ്ധ്യായം 15

ഉപസ്ഥാശയവൈരൂപ്യം

പലവിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും ഈ വൈരൂപ്യം മൂന്നു വിധത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

1) പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം (FLAT PELVIS):—




ചിത്രം 123: പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം.

ഉപസ്ഥാശയം സാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞു പരന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കുനിദാനമായിട്ടുള്ളതു കട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ബാലപീഡ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിപീഡ (Rickets) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രോഗമാകുന്നു. ഈ രോഗം മൂലം എല്ലകൾ മാർദ്ദവപ്പെടുന്നതിനാലാണു് ഉപസ്ഥാശയം പരന്നുപോകുന്നതു്. പരന്ന ഉപസ്ഥാശയത്തിനു് മുൻഭാഗത്തുനിന്നു പുറകോട്ടുള്ള അളവു കുറഞ്ഞിരിക്കും. മറ്റുള്ളവകൾ മിക്കവാറും സാധാരണയുള്ളതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപൂർവ്വമായി അല്പം വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ടെന്നു മാത്രം.

2) ചെറിയ ഉപസ്ഥാശയം:-

(GENERALLY CONTRACTED PELVIS)

ചെറിയ ഉപസ്ഥാശയം എന്നതുകാണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നതു് മൊത്തത്തിൽ ചെറുതായ ഉപസ്ഥാശയത്തെയാണു്. സാധാരണ ഉപസ്ഥാശയത്തേക്കാൾ ആകെപ്പാടെ ആകൃതിയിലും മറ്റൊല്ലാ അളവുകളിലും ഇതു് ചെറുതായിരിക്കും.



ചിത്രം 124: ചെറിയ ഉപസ്ഥാശയം.

3) പരന്നതും ചെറുതുമായ ഉപസ്ഥാശയം:-

(GENERALLY CONTRACTED AND FLAT PELVIS)

എല്ലുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാഠിന്യം നഷ്ടപ്പെടത്തക്കവിധത്തിൽ എല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗബാധയാണ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഈ വൈരൂപ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുഖ്യകാരണമെന്നു പറയാം. ഉപസ്ഥാശയ വൈരൂപ്യങ്ങൾ സാധാരണമായതിനാൽ തന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗർഭിണികളേയും നേരത്തേതന്നെ ഡാക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാൻ മിഡ് വൈഫിന് പ്രത്യേകബാധ്യതയുണ്ട്. ഉപസ്ഥാശയവൈരൂപ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പ്രസവസന്ധിയിലുള്ള അപകടങ്ങളുടെ ഗുരുലഘുത്വം. ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ അളവുകൾക്കും പുറമേ താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾകൂടി കണ്ടാൽ ഉപസ്ഥാശയം പരന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.

- 1 ആദ്യഗർഭിണിയുടെ വയർ തുങ്ങിക്കിടക്കുക.
- 2 ഗർഭാശയം ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു ചരിഞ്ഞിരിക്കുക.
- 3 പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ മുന്നീക്കടം പൊട്ടിപ്പോകുക.
- 4 പൊക്കിരക്കൊടി യോനിയിലേയ്ക്കിറങ്ങിയിരിക്കുക.

ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് മുൻ പ്രസവത്തിന്റെ ചരിത്രം ചോദിച്ചറിയുന്നതു് സഹായകമായിരിക്കും.

മുൻ പ്രസവത്തിന് വളരെ താമസം നേരിട്ടു എന്നും പ്രസവവേദന ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നു എന്നും, ചാപിള്ളയേയാണ് പ്രസവിച്ചു

തെന്നും, ശിരസ്സുതുരന്നാണ് കട്ടിയെ ഏടുത്തതെന്നും, മറ്റു മുളള അറിവ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

ഉപസ്ഥാശയം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ കട്ടിയുടെ തലയിലുള്ള വീക്കം വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും ഗർഭാശയമുഖം വീർത്തിരിക്കുകയും ഗുഹ്യപ്രദേശവും യോനിയും, നീരുവന്ന് വീങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഉയരക്കുറവ്, കുറുകാല് (കാലിന്റെ നീളം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക), കവകാല് (കവച്ചുനില്ക്കുമ്പോഴെത്തപ്പോലെയുള്ള കാല്), കൂന്, കൂർത്തനെഞ്ച്, ഉന്തിയവയറ്. എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഗർഭിണിയുടെ ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമുണ്ടായിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത.

നാലാം മാസത്തിൽ കൂടുകൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന തോന്നൽ (മൂത്രശങ്ക), മൂത്രതടസ്സം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഗർഭിണി പറയുന്നപക്ഷം അവളുടെ ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമുണ്ടെന്നു തീരുമാനിക്കാം.

പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ മുന്നീക്കം പൊട്ടിപ്പോകുകയും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശയനനിലക്രമവിരുദ്ധമായിരിക്കുകയും, ശിരസ്സു ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമുണ്ടെന്നു തീരുമാനിക്കാം. യോനീമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധനയിൽ ജനനമുഖം വിരൽകൊണ്ട് ഞെടുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം ഉയർന്നിടക്കുകയും, പൊക്കിറക്കൊടി കട്ടിക്കുമുമ്പായി യോനിയിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരൂപ്യമുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കാം.

പരന്ന ഉപസ്ഥാശയമാറ്റേണയുള്ള പ്രസവം:-

പരന്ന ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുഖവിസ്താരം കുറവായതുകൊണ്ട് ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിനു അതിലേയ്ക്കു നേരെ ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെവരുന്നു. അതിനാൽ ശിശുശിരസ്സ് ഒരു വശത്തേയ്ക്കു ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനോ, കുട്ടിയുടെ ശയനനിലത്തെ വിലങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നതിനോ ഇടയാകുന്നു. കുട്ടിയുടെ തല ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ നന്നായി അമർന്നിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന വിടവിൽ കൂടി മുന്നീക്കും. കൂർത്തുള്ളി പുറത്തേയ്ക്കുനില്ക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു. ജനനമുഖത്തിനുമുമ്പായി മുന്നീക്കും കൂർത്തുള്ളിനില്ക്കുന്നത് ഉപസ്ഥാശയവൈരൂപ്യത്തിന്റേയും, ശിശുവിന്റെ ക്രമവിരുദ്ധമായ ശയനനിലയുടേയും ഒരു ലക്ഷണമാകുന്നു. പരന്ന ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ കുട്ടിയുടെ തല നല്ലവണ്ണം അടഞ്ഞിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, കുട്ടിക്കുമുമ്പായി പൊക്കിടംകൊടി ഇറങ്ങാനിടയുണ്ട്. പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ മുന്നീക്കും പൊട്ടിപ്പോകാനും ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായുടെ വികാസത്തിന് താമസമുണ്ടാകാനും കുട്ടിക്ക് അപായം നേരിടാനും പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം കാരണമായിത്തീരുന്നു. പരന്ന ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വായ്ക്ക് വിസ്താരം കുറവായതിനാൽ കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് സുഗമമായി ഇറങ്ങുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നു മേൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ശിശുശിരസ്സിന്റെ ഇരുവശവുമുള്ള എല്ലുകളിൽ ഒന്നിന്റെ ഭാഗം ആദ്യമായി ഇറങ്ങും (Parietal bone presentation). ശിരസ്സ് ഉപസ്ഥാശയത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ പ്രസവം ക്ലേശംകൂടാതെ നടന്നു എന്നുവരാം. എന്നാൽ മിക്ക കേസുകളിലും തല തിരിഞ്ഞ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻവശത്തേയ്ക്കു (Unreduced occipito-Position) വരാത്തതിനാൽ പ്രസവം തടസ്സപ്പെടുന്നതും ഡാക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

മൊത്തത്തിൽ ചെറുതായ ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ (Generally contracted pelvis) വായും വളരെ ചെറുതായതിനാൽ ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിന് അതിലേയ്ക്കിറങ്ങു

വാനേ സാധിക്കാതെവരുന്നു. ഇത്തരം പ്രസവങ്ങളിൽ യഥാസമയം ഡാക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ ഏറ്റവും വേഗം പ്രസവം നടന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചുപോകുന്നതും ഗർഭാശയം പിളർന്നു മാതാവിന്റെ മരണത്തിനതന്നെ ഇടയാകുന്നതുമാണ്.

പ്രസവത്തിന്റെ ക്രമരാഹിത്യം:-

ഒരു പ്രസവത്തിന് സാധാരണ ആവശ്യമായ സമയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെയാണ് പ്രസവത്തിന്റെ ക്രമരാഹിത്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്നു പ്രസവിക്കുന്നതും വളരെ സമയംകൊണ്ട് പ്രസവം നടക്കുന്നതും ശരിയല്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ സംക്ഷിപ്തമായി താഴെ വിവരിക്കാം.

A. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രസവം (PRECIPITATE LABOUR):-

വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രസവം മാതാവിനും ശിശുവിനും അപകടം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ്. യാത്രചെയ്യുമ്പോഴോ, നീല്ക്കുന്നനിലയിൽതന്നെയോ, പെട്ടെന്നു പ്രസവിച്ചു എന്നു വരാവുന്നതാണ്. നീല്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു പ്രസവിച്ചുപോയാൽ കുട്ടിക്ക് അപകടം നേരിടാനും, പൊക്കിറുകൊടിയുടെ കീഴോട്ടുള്ള ശക്തിയായ ഫലിവുമൂലം ഗർഭാശയം അകം പുറമായി മറിഞ്ഞുപോകാനും വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ ശക്തിയായ വേദന പെട്ടെന്നുണ്ടായി പ്രസവിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യോനിയും പെരിനിയവും വല്ലാതെ കീറിപ്പോകുന്നതുമാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രസവശേഷം ഗുരുതരമായ രക്തവാച്ചയും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

പെട്ടെന്നുള്ള പ്രസവകാരണങ്ങൾ:-

- 1 കൂടുകൂടെയുള്ള ഗർഭാശയത്തിന്റെ സങ്കോചം (Contraction) മൂലവും,
- 2 പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ വേദനയുണ്ടാകാത്തതിനാൽ പ്രസവം ആരംഭിച്ച വിവരം മുന്നീക്കും പൊട്ടിയതിനുശേഷം മാത്രം മനസ്സി ലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും,
- 3 ശിശുവിന്റെ ജനനമുഖത്തെ താങ്ങിത്താങ്ങി കീഴോട്ടിറക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉപസ്ഥാശയമാഗ്ഗ്ത്തിനും ഭഗദാരമാഗ്ഗ്ത്തിനും ഇല്ലാതാവുന്നതുകൊണ്ടും ആണ് പ്രസവം പെട്ടെന്ന് നടക്കാനിടയാകുന്നത്.

പ്രതിവിധി:-

പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രസവങ്ങളിൽ താസെമയത്തു് മിഡ് വൈഫ് ഗർഭിണിയുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിയുടെ തല പെട്ടെന്നു പുറത്തേയ്ക്കുവരാതിരിക്കാൻവേണ്ടി വേദനയുണ്ടാകുന്നസമയത്തു ശിശുശിരസ്സു് അകത്തേയ്ക്കു തള്ളിപ്പിടിക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രസവംനടക്കുന്ന സ്ത്രീയാണെന്നു മുൻകൂട്ടി അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുന്നതായാൽ അല്പം ക്ലോറഫോം കൊടുത്തോ, മറ്റു യുക്തമായ മരുന്നു കത്തിവച്ചോ പ്രസവവേദനയുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുവാൻ ഡാക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.

B. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ശക്തമായ സങ്കോചം

(TONIC CONTRACTION OF UTERUS):-

പ്രസവത്തിന്റെ സുഗമമായപുരോഗതിക്കു് തടസ്സമുണ്ടായാൽ ഗർഭാശയം ശക്തിമത്തായി ചുരുങ്ങുന്നതും കട്ടിയെ

പുറംതള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ്. ശക്തമായുള്ള ഈ സങ്കോചം മൂലം ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗം തടിച്ചു ചെറുതായിത്തീരുന്നതും കീഴ്ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകത്തക്ക വിധം അയഞ്ഞു ലോലമായിത്തീരുന്നതുമാണ്. ചുരുങ്ങി തടിച്ചു ചെറുതായ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തിനും, അയഞ്ഞു ലോലമായിത്തീർന്ന കീഴ്ഭാഗത്തിനും മദ്ധ്യേ തടിച്ച ഒരു രേഖ ഈ സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകും. ഈ രേഖയ്ക്ക് ബാൻഡിൽസ് റിംഗ് (Bandil's ring) എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഠിനമായ ഈ സങ്കോചത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അവ താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

കാരണങ്ങൾ:-

- 1 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് വളരെ വലുതായിരിക്കുക.
- 2 ശിശുശിരസ്സിൽ വെള്ളംനിറഞ്ഞു വളരെ വലുതായിരിക്കുക.
- 3 ഉപസ്ഥാശയം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുക.
- 4 അണ്ഡാശയം, ഉപസ്ഥാശയം, ഭാഗാശയം, എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴയുണ്ടായിരിക്കുക.
- 5 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ നെറ്റി ജനനമുഖമായി വരിക.
- 6 ശിശു വിലങ്ങനെ കിടക്കുക.
- 7 മുഖം, ജനനമുഖമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ താടി തിരിഞ്ഞു ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുന്നിലേയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുക. എന്നിവയാണ് ഗർഭാശയം വളരെ ശക്തമായി ചുരുങ്ങുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ.

ഗർഭാശയം വളരെ ശക്തമായി ചുരുങ്ങുവാ
നിയുണ്ടോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കു
വാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ:-

- 1 ഗർഭിണിയുടെ നാഡീസ്സനം 115-ൽ കൂടുതലാ
യിരിക്കുകയും, അവൾക്ക് വളരെ അപശതയു
ണ്ടെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുക.
- 2 100 ഡിഗ്രിയിലധികം പനിയുണ്ടായിരിക്കുക.
- 3 മുഖത്തിനു വിളിച്ചും, ക്ഷീണവും ഭുജനവും
ഉണ്ടായിരിക്കുക.
- 4 ഗർഭിണി അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുന്നതും, അവ
ളുടെ നാക്കും ചിറിയും വരണ്ടിരിക്കുകയും ചെ
യ്യുക.
- 5 വയററത്തു് എപ്പോഴും വേദനയുണ്ടെന്നും തൊടാൻ
കൂടി പാടില്ലെന്നും പറയുക.
- 6 ഗർഭാശയം തടിച്ച് കഠിനമായും ചുരുങ്ങിയും
ഇരിക്കും. അതിനാൽ സ്പർശനപരിശോധനയിൽ
കുട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാ
തിരിക്കുക.
- 7 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ശ്രവിക്കാൻ
കഴിയാതെ വരിക.
- 8 യോനിമാർഗ്ഗമായുള്ള പരിശോധനയിൽ ശിശു
ശിരസ്സ് ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ തിങ്ങിയിരിക്കുന്ന
തായും യോനി വരണ്ട് ചുടുള്ളതായും വീക്കത്തോടു
കൂടിയും ഇരിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും
ഗുഹ്യഭാഗം മൊത്തത്തിൽ വീങ്ങിയിരിക്കുകയും
ചെയ്യുക.
- 9 ഗർഭാശയഗളം (Cervix) വീങ്ങിയിരിക്കുക.
- 10 ജനനമുഖം ഉറച്ചിരിക്കുന്നതായും വീങ്ങിയിരിക്കു
ന്നതായും കാണപ്പെടുക.

പ്രതിവിധി:-

മിഡ്‌വൈഫ് കഴിയുന്നത്ര ശാസ്ത്രീയമായ പരിചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.



C ഗർഭാശയമാന്ദ്യം (SLUGGISH UTERUS):-

പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന് സ്വാഭാവികമായുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സങ്കോചവികാസശക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാന്ദ്യത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ പദപ്രയോഗം കൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഗർഭാശയത്തിന്റെ സങ്കോചപരാഹ്വിത്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- 1 പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മുന്നീക്കടം പൊട്ടിപ്പോകുക.
- 2 ഗർഭിണിയുടെ വർദ്ധമാനമായ ഭയം.
- 3 കൂടുതൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ഗർഭാശയമാംസപേശികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകാവുന്ന ശക്തിക്ഷയം.
- 4 പ്രായംചെന്ന പ്രഥമഗർഭിണികളുടെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിക്കാതിരിക്കുക.
- 5 മുന്നീരിന്റെ ആധിക്യംകൊണ്ടോ, ഒന്നിലധികം കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ടോ ഗർഭാശയം വളരെ വലുതായിരിക്കുക.
- 6 പ്രസവാരംഭത്തിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുക.
- 7 മുത്രാശയം മുത്രംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്നിവയാണ് ഗർഭാശയത്തിന് ആലസ്യമുണ്ടാകുന്നതിനും ചുരുങ്ങുവാനുള്ള ശക്തി കുറയുന്നതിനും കാരണങ്ങൾ.

ഗർഭാശയമാന്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ:-

- 1 പ്രസവവേദന വളരെ സമയം ഇടവിട്ടു മാത്രം ഉണ്ടാവുക.
- 2 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിയുക.
- 3 പ്രസവവേദന ഇല്ലാത്ത സമയത്തും കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉദരസ്തംഭനപരിശോധനകൊണ്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക.
- 4 യോനീപരിശോധനയിൽ അസാധാരണമായോ, ക്രമവിരുദ്ധമായോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുക.

പ്രതിവിധി:-

മൂത്രാശയം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിപ്പിക്കുകയോ, കതീറാർ ഉപയോഗിച്ചു മൂത്രമെടുത്തു കളയുകയോ ചെയ്യുക. പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മൂന്നിട്കടം പൊട്ടുകയും ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഉടനെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക. ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടും രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം പ്രസവം നടക്കാത്ത പക്ഷം കുട്ടിക്കു് അപായം നേരിടാനിടയുള്ളതിനാൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രസവവേദന കുറേക്കൂടി ശക്തമായുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഗർഭിണിയെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ മൂന്നിട്കടം പൊട്ടുന്നതുപരെ ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു് അപകടമെന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

D. ഗർഭാശയത്തിന്റെ തളർച്ച:-

(EXHAUSTED UTERUS)

പ്രസവാരംഭത്തിൽ വേദന ക്രമാനുഗതമായി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ വേദന ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരികയും, അവസാനം തീരെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷത്തെയാണ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ തളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

പ്രസവഘട്ടങ്ങളിൽ അതാതു ഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരണമായി ഗർഭാശയസങ്കോചവും തജ്ജന്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസവവേദനയും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകേണ്ട ഈ വേദന തീരെ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്.

- 1 പ്രസവാരംഭത്തിൽതന്നെയുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം.
- 2 പ്രസവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ സംജാതമായ തടസ്സത്തെ നീക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗർഭാശയം ശക്തമായി സങ്കോചിച്ചതിനാലുണ്ടായ ക്ഷീണം.
- 3 ഗർഭാശയത്തിന്റെ അസാധാരണമായ വലിപ്പം.

ഗർഭാശയത്തിന്റെ ചുരുങ്ങൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട്, ക്ഷീണിച്ച് ആലസ്യവിധേയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയെ ഒരു മിഡ്‌വൈഫിനു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. അതിന് താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ മിഡ്‌വൈഫിനെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

- 1 വേദനയില്ലാത്തപ്പോൾ അവളുടെ നാഡീസ്പന്ദനം 100-ൽ കുറവായിരിക്കും.
- 2 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ അവയവഭാഗങ്ങൾ ഗർഭിണിയുടെ വയററുത്ത് കൈവച്ച പരിശോധിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കും.

- 3 വയാറത്തു കൈ വച്ചു് അമർത്തിയാൽ ഒട്ടും വേദനയില്ലാതിരിക്കുന്നു
- 4 വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നുന്നു എന്നു പറയുന്നു.
- 5 ശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനം ക്രമമായിരിക്കും.
- 6 യോനീമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധനയിൽ ക്രമരഹിതമായി ഒന്നുംതന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു.
- 7 ജനനമുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി:-

സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയിൽ പ്രസവത്തിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ ഗർഭിണിക്കു് ഉറക്കംവരുവാൻ മരുന്നുകൊടുക്കുക. പ്രസവശേഷം രക്തസ്രാവമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലാതില്ല.

E. മുക്കുവാൻ സാധിക്കായ്:-

(UNEFFICIENT ACTION OF THE AUXILIARY POWERS)

ശ്വാസംപിടിച്ചു മുക്കുവാൻ ഗർഭിണിക്കു് കഴിയാതെ വന്നാൽ പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പതിവിലേറെ താമസമുണ്ടാകും. താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ് ഗർഭിണിക്കു് ശ്വാസംപിടിച്ചു കീഴോട്ടു മുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതു്.

- 1 ശ്വാസകോശരോഗങ്ങളും ഹൃദ്രോഗവും.
- 2 മൂന്നീർ ആധിക്യംകൊണ്ടോ, ആന്തരികമായ മുഴക്കം കൊണ്ടോ വയർ, ക്രമത്തിലധികം വലുതായിരിക്കുക.
- 3 കൂടുതൽ തവണ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഉദരമാംസപേശികൾ ബലഹീനമായിരിക്കുക.

ഗുരുതരമായ ബലക്ഷയം തോന്നിക്കുകയും തീരെ മുക്കാൻ കഴിയാതെവരികയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുകയാണത്തമം.

പ്രസവത്തിനുമുമ്പുള്ള രക്തസ്രാവം

ഏഴാംമാസത്തിനുശേഷമോ, പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തവാച്ച് പ്രസവക്ലേശത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുരുതരമായ പല പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കാരണമായിത്തീരുന്നതുമാണ്. ഏഴാം മാസത്തിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.

A. യാദൃച്ഛിക രക്തസ്രാവം

(ACCIDENTAL HAEMORRHAGE)

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറുപിള്ള ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നതിനാലാണ് യാദൃച്ഛികമായ ഇത്തരം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതു്

B. അനിവാര്യമായ രക്തസ്രാവം

(UNAVOIDABLE HAEMORRHAGE)

ക്രമവിരുദ്ധമായി മറുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുകയും, അതു് അവിടെനിന്നു് ഇളകിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് രക്തസ്രാവം അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നതു്.


ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തായിട്ടാണ് മറുപിള്ള സ്ഥിതിചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസവത്തിന്റെ മുന്നാംഘട്ടത്തിലേ അത് ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽ നിന്നും വേർപെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്തവാച്ചയില്ലാതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി മറുപിള്ള ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം വികസിക്കുന്നതോടുകൂടി അതു വേർപെടാനും രക്തസ്രാവം അനിവാര്യമായിത്തീരാനും ഇടയാകുന്നു.

ഗർഭാശയഭിത്തിയിലുള്ള നേർത്തേറിയ പാടകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കം, മൂത്രപിണ്ഡരോഗങ്ങൾ, വയറിനുമീതേ ഏല്പാനിടയാകുന്ന വീഴ്ചയോ, മറ്റു ഹേമഭണ്ഡങ്ങളോ ആണ് യാദൃച്ഛിക രക്തസ്രാവത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നത്. യാദൃച്ഛികരക്തസ്രാവം രണ്ടുവിധത്തിലാണുള്ളത്.

I പുറമേ കാണുന്ന രക്തസ്രാവം.

(REVEALED HAEMORRHAGE OR ACCIDENTAL EXTERNAL HAEMORRHAGE)

മറുപിള്ളയുടെ ഒരു ഭാഗം ഗർഭാശയത്തിൽനിന്ന് ഇളകുന്നതുമൂലം സ്രവിക്കുന്ന രക്തം ഗർഭാശയഭിത്തിയിലുടേയും



ചിത്രം 125: പുറമേ കാണുന്ന രക്തസ്രാവം.

മുന്നീക്കടത്തിന്റേയും ഇടയിൽക്കൂടി ഒഴുകി ഗർഭാശയത്തിനു പുറത്തുവരുന്നു. ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും രക്തം പുറത്തേക്കു വരുന്നതിനാലാണ് നമുക്കിതു ദൃശ്യമാകുന്നത്.

പുറമേ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള രക്തസ്രാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

- 1 വയറിൽ വേദനയും, രക്തവാച്ചയും.
- 2 യോനിമാഗ്ഗമായുള്ള പരിശോധനയിൽ ജനന മുഖം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതായും മുന്നീക്കടം വിരലിൽ തടയുന്നതായും അനുഭവപ്പെടൽ.

പ്രതിവിധി. കുറഞ്ഞ തോതിലേ രക്തവാച്ചയുള്ളവെങ്കിൽ ഗർഭം അലസി പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതു പോലെയുള്ള പരിചരണങ്ങൾ ചെയ്യുക.

രക്തവാച്ച അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ലൈസോൾ ലോഷൻകൊണ്ട് ഡ്യൂഷ് ചെയ്തതിനുശേഷം “ബൈൻഡർ” ഉദരത്തിനുമീതേ ഇട്ട് ഒരുമാതിരി നല്ല വണ്ണം മുറുകിക്കെട്ടുക. എന്നിട്ടും രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കാത്തപക്ഷം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക. ഡാക്ടറുടെ സഹായം ലഭിക്കാൻ താമസം നേരിടുകയും, രക്തസ്രാവം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം യോനി തുറടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുറടയ്ക്കുക എന്നത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. രക്തസ്രാവം ഒരുവിധത്തിലും നില്യാതെയും, അധികമായും തുടരുന്നതായാൽ മാത്രമേ മിഡ്‌വൈഫ് തുറടയ്ക്കാവൂ. യോനി തുറടച്ചതിനുശേഷം പ്രസവവേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നും, രക്തം പോകുന്നുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. രക്തസ്രാവവും പ്രസവവേദനയും അധികരിച്ചുണ്ടാകുന്നപക്ഷം മിഡ്‌വൈഫ് തന്നെ മുന്നീക്കടം പൊട്ടിക്കുക.

കുട്ടി വിലങ്ങനെ കിടക്കുകയും, ഉപസ്ഥാശയത്തിനു വൈരൂപ്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നീക്കും പൊട്ടിച്ചുകൂടുന്ന കാര്യം മിഡ്‌വൈഫ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

II ഗർഭാശയത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന രക്തസ്രാവം (CONCEALED HAEMORRHAGE)

ഗേഭാരം വഴിയായി രക്തം പുറത്തേയ്ക്കു പോകാതെ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽതന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രക്തസ്രാവം കൂടുതൽ വിപൽക്കരമാണ്. രക്തം ഉള്ളിൽതന്നെ കെട്ടിനിന്ന് ഗർഭാശയത്തിന് കൂടുതൽ വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നതും താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നതുമാണ്.

- 1 അമിതമായ ക്ഷീണം, മനംമറിച്ചിൽ (മനംപുരട്ടൽ), ചെവിയിൽ മുളൽ, വിളച്ചു.
- 2 ശ്വാസവിമിഷ്ടം, ദാഹം, കണ്ണുകൾ, ചിരികൾ (ചുണ്ടു്) എന്നിവ വിളറുക.
- 3 കാഴ്ചക്കുറവ്, കണ്ണിനു മുകളിൽ മിന്നൽ, മിന്നൽ പിണർപോലെ തോന്നുക.
- 4 ദേഹം തണുത്തും, വിയരൂതുമിരിക്കുക, ശരീരം വളരെ അശ്വസിതമായിത്തീരുക.
- 5 വയറിൽ കഠിനമായ വേദന.
- 6 ഗർഭാശയം പെട്ടെന്നു വലുതാകുകയും, കഠിനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക.
- 7 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനം കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തവുക.
- 8 വയററത്തു് തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വേദന തോന്നുക.

9 നാഡീസ്പന്ദനം ക്ഷീണിച്ചുവരികയും, അത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക.

10 ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കുറയുകയും, മാനസികവിഭ്രാന്തിയും, അവസാനം മോഹാലസ്യവും ഉണ്ടാവുക.

പ്രതിവിധി. ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക. അതിനുമുമ്പായി യോനി തുറടക്കുകയും ഒരു ബൈൻഡർ സാമാന്യം മുറുക്കി ഇടുകയും ചെയ്യണം. രക്തസ്രവണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കാപ്പിയോ, അല്പം ബ്രാൻഡിയും വെള്ളവുംകൂടി ചേർത്തോ കൊടുക്കുക. കാൽ ഉയർത്തിവയ്ക്കുകയും, തലയിണ എടുത്തു മാറുകയും ചെയ്യണം. ഒരു പയിൻറ് (Pint) വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ (Teaspoon) ഉപ്പുചേർത്തു മലദ്വാരത്തിലൂടെ തുള്ളിതുള്ളിയായി കയറുകയും ചെയ്യുക.

അനിവാര്യമായ രക്തസ്രാവം


(UNAVOIDABLE HAEMORRHAGE)

ക്രമവിരുദ്ധമായി ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറുപിള്ള അവിടെനിന്നും കട്ടിക്കുമുമ്പായി വേർപെടുന്നതിനാലാണ് അനിവാര്യമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മേൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ശതമാനം കേസുകൾപോലും ഇപ്രകാരം കണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. ഒന്നിലധികം പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ മുകളിലൂടെ നില മൂന്നുതരത്തിലായിരിക്കാവുന്നതാണ്.


കുട്ടിക്കു മുമ്പായി മറുകുട്ടി

(പ്ലാസെന്റാ പ്രീവിയ-PLACENTA PRAEVIA)

സാധാരണയായി ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് എവിടെയെങ്കിലുമാണു് ഗർഭപിണ്ഡത്തോടൊപ്പം മറുപിള്ള പതിയുന്നതു്. എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു് എവിടെയെങ്കിലും ഗർഭപിണ്ഡം ഉറച്ചു വളരുന്നതാണു്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പ്രസവഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്കുമുമ്പായി മറുപിള്ള പോരേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു് ഗർഭമേകിൽ ഏഴു മാസമാകുമ്പോഴേക്കു് ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽമാഗം വളരുന്നതനുസരിച്ചു് കീഴ്മാഗത്തിനു വികസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതാകുകയും മറുകുട്ടിയുടെ കീഴ്ഭാഗം ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉപശതത്തിനും ഇളകാനും തന്മൂലം രക്തവാച്ചുണ്ടാകാനും ഇടയായിത്തീരുന്നതു്. ഇതിനെയാണു് അനിവാര്യമായ രക്തസ്രാവം എന്നതുകൊണ്ടു് അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. പ്ലാസെന്റാ പ്രീവിയ മൂന്നു വിധത്തിലുണ്ടു്. ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക.



ചിത്രം 126:



ചിത്രം 127:

- 1 നോർമൽ—Normal — മറുപിള്ളയുടെ സാധാരണ സ്ഥിതി.
- 2 മാർജിനൽ പ്ലാസെന്റാ പ്രീവിയ—Marginal Placenta Praevia — ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് ഒരുവശത്തായി ഉൾവായുടെ (Internal Os) വക്കുവരെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
- 3 പാർഷിയൽ പ്ലാസെന്റാ പ്രീവിയ—Partial or Lateral Placenta Previa — ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു് ഉൾവായുടെ ഏതാനും ഭാഗം അടയത്തക്കവിധം മറുപിള്ള സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
- 4 കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസെന്റാ പ്രീവിയ—Complete or Central Placenta Previa — ഗർഭാശയത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തു് ഉൾവായു് മുഴുവനായി അടയത്തക്കവിധം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

കുട്ടിക്കു മുമ്പായി മറുകുട്ടി ഇപ്രകാരം മൂന്നുവിധത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- 1 പ്രത്യേകകാരണമൊന്നുംകൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുക.
- 2 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശയനനില ക്രമവിരുദ്ധമായിരിക്കുക.
- 3 നാഭിയെല്ലിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് വീക്കംപോലെ കാണുക; അതു സ്പർശിച്ചുനോക്കിയാൽ പതുപതു പ്ലായിരിക്കുക.

- 4 വയററത്തു തടവിനോക്കിയാൽ കുട്ടിയുടെ തല ഉപ സ്ഥാശയത്തിലേക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുക.
- 5 യോനീമാറ്റേണയുള്ള പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ജനനമുഖം സ്തർശിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക. ഒരു വിരൽ കടത്തിനോക്കത്തക്കവിധത്തിലേക്കിലും ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിരൽ കടത്തിനോക്കിയാൽ മറുകുട്ടി വിരലിൽ തടയുക.

ഏഴാംമാസത്തിനുശേഷമുണ്ടാകുന്ന രക്തവാച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം കുട്ടിക്കുമുമ്പായി മറുകുട്ടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസവാരംഭത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായ് വികസിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയിരിക്കുന്ന മറുകുട്ടി വേർപെടുപോകുന്നതിനാലാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഇത്തരം പ്രസവങ്ങൾ അപകടപൂർണ്ണമാകുന്നു. അതിനാൽ പ്രസവത്തിനു മുമ്പായി രക്തസ്രാവം കാണുന്ന എല്ലാ കേസുകളിലും ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുകയാണ് മിഡ് വൈഫ് ചെയ്യേണ്ടത്.

മറുകുട്ടി കുട്ടിക്കുമുമ്പായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ കുട്ടിയുടെ ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗത്തിന് യഥാവസരം കീഴോട്ടിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമല്ലോ. അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടിയുടെ കിടപ്പ് ക്രമവിരുദ്ധമായി തീരാം. മിക്കവാറും കേസുകളിൽ പൂഷ്മോ, മുഖമോ ആയിരിക്കും ജനനമുഖമായി വരിക. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പൊക്കിൾക്കൊടി ആദ്യം ഇറങ്ങിവരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്. മറുകുട്ടി ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം മുഖ്യകാരണം.

പ്രസവത്തിനുമുമ്പുള്ള രക്തസ്രാവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിചരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും

ബാഹ്യമായ യാദൃശ്ചിക രക്തവാച്ച് താല്ക്കാലികവും അപകടരഹിതവും ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹാനിയൊന്നും സംഭവിപ്പിക്കാത്തതാണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വേദനം മിഡ്‌വൈഫ് പരിചരണങ്ങളും മറ്റുപ്രതിവിധികളും ചെയ്യേണ്ടതു്.

ഗർഭാശയത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രക്തസ്രാവമോ മറ്റു ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഗർഭിണിയെ കട്ടിലിൽ കിടത്തിയശേഷം ഒരു മോർഫിയാ ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുക. എനിമ കൊടുക്കുകയോ വയറിലുകാനുള്ള ഔഷധം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യരുതു്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ രക്തവാച്ച് നില്ക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ ചിലയവസരങ്ങളിൽ ബാഹ്യമായ യാദൃശ്ചിക രക്തവാച്ചതന്നെ അപകടകരമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിലേക്കു് നീങ്ങാറുണ്ടു്. അത്തരം പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ വേഗം പ്രസവം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മരിച്ചുപോകാനിടയുണ്ടു്. അതിനാൽ പ്രസവത്തെ ത്വരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നീവർത്തിയില്ല. വേഗത്തിൽ പ്രസവം നടന്നാലുള്ള അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി മേൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെ മാത്രമേ പ്രസവത്തെ ത്വരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളു. ബാഹ്യമായ രക്തസ്രാവം വളരെ മിതമായ തോതിൽ മാത്രമായിരിക്കുകയും ഗർഭാശയസങ്കോചം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം പിറോസിൻ (Pitocin) മൂന്നു ഐ. എം. ആയി കുത്തിവയ്ക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഇൻജക്ഷൻ ആവർത്തിക്കാവുന്നതുമാണു്. പിറോസിൻ കുത്തിവെച്ചിട്ടും രക്തസ്രാവം തുടരുന്നപക്ഷം മുന്നീക്കടം പൊട്ടിക്കുക

യും വയററത്തു് ബൈൻഡർ ഇട്ടു മുറുക്കിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യണം. ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം യോനി തുറടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഗർഭിണിയുടെ യോനീമാർഗ്ഗം തുറടയ്ക്കുന്ന വിധം:-

ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ഭഗഭാരം ഏകാകം ചെയ്യുന്നതിനു് ധാരാളം ഗോസുതൂണി ആവശ്യമുണ്ടു്. ഗോസുതൂണി ആറി ബുവീതിയിൽ കീറിയെടുത്തു് സ്റ്റേറിലൈസു് ചെയ്യുക. ഇങ്ങിനെ രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയ തൂണി ചുരുളായി തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം ഡെറ്റോൾക്രീം ലോഷനിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്തു വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഗർഭിണിയെ മുത്രമൊഴിപ്പിച്ചു് ഒരു വശത്തേക്കു് ചരിച്ചുകിടത്തുക. യോനി തുറടയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു് യോനീമുഖത്തിൽ ഡെറ്റോൾക്രീം (Dettol Cream) പുരട്ടേണ്ടതാണു്. ഒരു സിം.സ് വജയിനൽ സ്പെക്കുലം (Sims' Vaginal Speculam) കൊണ്ടു് പെരിനിയം അമർത്തിപ്പിടിച്ചതിനുശേഷം ഗോസു് തൂണികൊണ്ടു് യോനീഭാഗം നല്ലവണ്ണം നിറയ്ക്കുക. യോനീഭാഗം നിറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ മറൊരു തൂണികൊണ്ടു് അതിനെ T ആകൃതിയിൽ മുടി ബൈൻഡറോടുചേർത്തു് ഉടുപ്പിക്കുക. തുറടയ്ക്കൽ പൂർത്തിയാക



ചിത്രം 128: സിം.സ് വജയിനൽ സ്പെക്കുലം
(SIMS' VAGINAL SPECULAM)

ബോൾ കുട്ടിയുടെ തല കടന്നുപോയവാനുള്ളത്ര വിസ്കാരത്തിൽ യോനീഭാരം വികസിച്ചിരിക്കും. യോനീഭാരം നല്ലതുപോലെ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഗർഭിണിയെ ബോധരഹിതയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം പ്ലഗ് ചെൽക്കുതിനശേഷം എട്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗർഭാശയ സങ്കോചങ്ങൾ ആരംഭിക്കാത്തപക്ഷം സിസ്റ്റേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടതായി വരും. സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷനുമുമ്പ് രക്തവും സലൈനും (Blood and Saline-Transfusion) നൽകി, ഗർഭിണിയുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനാൽ അതെല്ലാം ഒരാശുപത്രിയിലെ സാധ്യമാകൂ.

ബാഹ്യമായ യാദൃശ്ചിക രക്തസ്രാവത്തിൽ, പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ മിഡ്‌വൈഫ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും പ്രസവം നടന്നാലുടനെ എർഗോമെട്രിൻ (Ergometrine) എന്ന ഇൻജക്ഷൻ I. M. ആയി കുത്തിവയ്ക്കുകയും വേണം.

പ്രസവത്തിനുമുമ്പുള്ള രക്തസ്രാവം ഏതുവിധത്തിലുള്ളതായാലും അത് അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാനിടയുള്ളതിനാൽ ഗർഭിണിയെ ഏറ്റവുംവേഗം ഒരാശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ മിഡ്‌വൈഫ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

അദ്ധ്യായം 17

പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവം

പ്രസവശേഷമുണ്ടാകുന്ന കൂടുതലായ രക്തവാർച്ചയെയാണ് പ്രസവാനന്തരരക്തസ്രാവം (പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഹെമറേജ്—Post partum haemorrhage) എന്നു പറയുന്നത്. പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവത്തെ രണ്ടു വിഭാഗമായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

- 1) പ്രാഥമികരക്തസ്രാവം
(PRIMARY POST PARTUM HAEMORRHAGE)
- 2) ദ്വീതീയ രക്തസ്രാവം
(SECONDARY POST PARTUM HAEMORRHAGE)

ഇതിൽ പ്രാഥമിക രക്തസ്രാവത്തെത്തന്നെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.

1) മറുപിള്ളസ്ഥിതിചെയ്യുന്നസ്ഥാനത്തു (Placental-site) നിന്നുമുള്ള രക്തവാർച്ച (എറോറണിക് ഹെമറേജ്—(Atonic Haemorrhage)

(2) പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ജനനേന്ദ്രീയമാഗ്ഗ്ത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിൽനിന്നുള്ള രക്തവാർച്ച (ട്രോമാറ്റിക് ഹെമറേജ്—Traumatic haemorrhage).

ഇതിൽ എറോറണിക് ഹെമറേജ് ആണ് സാധാരണപ്രസവങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നതും കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിത്തീരുന്നതും. മറുപിള്ളശ്ലേഷ്മത്തിൽനിന്നും വേർപെടുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെയുള്ള കുറെ രക്തധമനികൾ സ്വാഭാവികമായും പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രക്തവാർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് അപകടകാരിയല്ല. സാധാരണ വിഷമങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലാത്ത പ്രസവങ്ങളിൽ ഏതാണ്ടു് എട്ടു പത്തു് ഓൺസു് രക്തം പോകുന്നതാണ്. ഇതിലധികം രക്തം പോകുന്നപക്ഷം ക്ഷീണം നേരിടുന്നു. ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഇതിലല്ല കൂടുതൽ രക്തം പോയാലും തകരാറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ 20 ഓൺസോ അതിൽ കൂടുതലോ രക്തം പോകുന്നപക്ഷം സ്ഥിതിഗുരുതരമായിത്തീരുന്നതാണ്. പ്രസവത്തിനുമുമ്പു് ഗുരുതരമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടായ ഒരു സ്ത്രീക്കു് പ്രസവശേഷം അഞ്ചോ ആറോ ഓൺസു് രക്തം പോകുന്നതുപോലും ജീവഹാനിക്കിടവരുത്തുന്നതാണ്. രക്തനഷ്ടം എത്രകുറച്ചായിരുന്നാലും അതു് അവളുടെ നാഡീസ്പന്ദനത്തെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതിനാൽ മിഡ്‌വൈഫ് വളരെ കരുതലോടെ പെരുമാറണം. മറുപിള്ള പുറത്തുപോയതിനുശേഷം അമിതമായ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്നതിനു് താഴെപറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്.

- 1 പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയം നല്ലവണ്ണം ചുരുങ്ങാതിരിക്കുക.
- 2 ഇരട്ടശിശുക്കൾ മുലം ഗർഭാശയം വളരെ വലുതായിരിക്കുക.
- 3 മൂന്നീർ വളരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കുക.
- 4 ഉള്ളിൽ തങ്ങിനിന്നിരുന്ന യാദൃച്ഛികരക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക.
- 5 അധികപ്രസവങ്ങൾ നിമത്തം ഗർഭാശയമാംസപേശികൾ ദുർബ്ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക.
- 6 ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു് മറുപിള്ളസ്ഥിതിചെയ്യുക.
- 7 മയക്കമരുന്നുകൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുക.
- 8 ഗർഭാശയം അകം പുറമായി മറിയുക.
- 9 പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ഗർഭാശയഗളം, യോനി, പെരിനിയം എന്നീഭാഗങ്ങൾ കീറാൻ ഇടയാക്കുക.
- 10 മൂത്രപിണ്ഡരോഗം, വിളച്ച (Anaemia) എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടു്.
- 11 രക്തസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക.

രക്തസ്രാവം ഗുരുതരമായാൽ

ഉണ്ടാകുന്നലക്ഷണങ്ങൾ

- 1 മുഖം,വിളറിയും കണ്ണുകൾ അകത്തേക്കു് വലിഞ്ഞും അധരങ്ങൾക്കു് നീലനിറം വ്യാപിച്ചും കാണപ്പെടുന്നു.
- 2 ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
- 3 നാഡീസ്പന്ദനനിരക്കു് വളരെ കൂടുതലാകുന്നു.
- 4 കൈകാലുകളിടുതല്ലി അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
- 5 ശ്വാസംകിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നു.
- 6 അമിതമായ ദാഹവും, ചിലപ്പോൾ ഹർദ്ദിയുണ്ടാകുന്നു.
- 7 താല്പാലികമായി കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

പ്രതിവിധി:-

പ്രസവഘട്ടത്തിൽ മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം രക്തസ്രാവത്തെ ഫലപ്രദമായി തടയുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രസവത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിനു ആലസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണിയെ ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രസവവേദനയുടെ ശക്തികുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ കട്ടിയെപ്പറ്റുകയോണത്തമം. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രക്തസ്രാവത്തെ തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ഔഷധങ്ങൾ, ചൂടുവെള്ളം തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കണം. മറുപിള്ളയും പിറന്നുകഴിഞ്ഞാലുടനെതന്നെ പരിചരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കണം. മറുപിള്ള യഥാസമയം പിറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറുപിള്ളയെ പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. മറുപിള്ളയെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനുവേണ്ടി അവളെ മലത്തിക്കിടത്തി ഗർഭാശയത്തിന് ഭാർഡ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുപരെ അവളുടെ ഉദരഭാഗം മിഡ്‌വൈഫിന്റെ ഇടതുകരം കൊണ്ടുനന്നായിത്തീരുമുക. ഗർഭാശയം ഘനീഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മേൽഭാഗം പിടിച്ച് കീഴോട്ടഴിയുക ഗർഭാശയത്തെകീഴോട്ടഴിയുകയല്ലാതെ ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു തള്ളാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇതുകരങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ കീഴോട്ട് ഉഴിയേണ്ടതായിവരും. മറുപിള്ളയെ പുറത്താക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ ഉഴിച്ചിൽ സമ്പ്രദായത്തിന് (ക്രെഡെയിസ് മെത്തഡ്—Crede's Method) എന്നാണ് പേർ പറയുന്നത്.

ക്രെഡെയിസ് മെത്തഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടും മറുപിള്ള പിറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ ഗർഭാശയത്തിനകത്തു കടത്തി അത് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. മറു

പിള്ളയെന്നീക്കും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മിക്കവാറും രക്തവാർച്ചയും നിലയ്ക്കുന്നതാണ്. ഗർഭാശയത്തിന്റെ സങ്കോചനസ്വഭാവം മാറിത്തുളയ്ക്കുന്നത് ബോധ്യമാകുന്നതുവരെ കൈ ഗർഭാശയത്തിനകത്തുതന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഗർഭാശയത്തിൽ കൈകടത്തി മറുപിള്ളയെന്നീക്കും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ കരുതലോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൃത്യമാണ്. കൈവിരൽ ഗർഭാശയത്തിന് ക്ഷതമേല്പിക്കുവാനും മറുപിള്ളയാണെന്നു കരുതി ഗർഭാശയഭിത്തിയുടെ തന്നെ ഭാഗം പിടിച്ച് കീറാനും മറ്റും ഇടയാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മറുകട്ടി വീണുകഴിഞ്ഞാലുടനെ സാധാരണയായി രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നതാണ്. മറുകട്ടി പുറത്തു വന്നതിനുശേഷവും രക്തസ്രാവം തുടരുന്നപക്ഷം, ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങി ദൃഢമാകുന്നതുവരെ അത് പിടിച്ച് മന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും രക്തവാർച്ച നിലുനില്ക്കുകിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ഡ്യൂഷ് ചെയ്യുകയും 4 മി.ലി. എർഗട്ട് 30 മി. ലിററർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതുകൊണ്ടും പ്രയോജനം കാണാത്തപക്ഷം എർഗോമെട്രിൻ (Ergometrine-0.5 mg.) എന്ന ഇൻജക്ഷൻ ഇ:മസ്ക്കലാറായി കുത്തിവെക്കുക. ഈ പരിചരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കേസുകളിലേയും രക്തസ്രാവം നിലുനിൽക്കുകയും. എന്നാൽ അപ്പൂർവ്വം ചില കേസുകളിൽ ഇതൊന്നും ഫലിച്ചില്ലെന്നുവരാം. സാധാരണ ചികിത്സകളും, പരിചരണങ്ങളും ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടാൽ മിഡ് വൈഫ് തന്റെ ഇരുകരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ഗർഭാശയത്തെ അമർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

മിഡ് വൈഫിന്റെ കരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം വലതുകൈ യോനിയ്യിലേയ്ക്കു കടത്തി കൈവിരലുകൾ മടക്കി ഗർഭാശയഗുളത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു വെക്കുക.



ചിത്രം 129

പ്രസവാനന്തരരക്തസ്രാവം തടയുന്ന രീതി.

ഇടതുകരം ഉദരത്തിന് മീതെ വെച്ച് ഗർഭാശയം പിടിച്ച് അകത്തു മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിലേയ്ക്ക് അമർത്തുക. ഇതു ശരിയായി ചെയ്യുന്നപക്ഷം രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നതാണ്. രക്തസ്രാവം നിന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപകടഘട്ടം കഴിഞ്ഞതായി വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല.. രക്തസ്രാവവും, പ്രസവാരിഷ്ഠതകളും മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മരണംതന്നെ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. രക്തസ്രാവം മൂലം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമതകളെ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പ്ലാസ്മ (Plasma) കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മിഡ്‌വൈഫിന് ഇതിനുള്ള സാധ്യത വിരളമായിരിക്കുമല്ലോ. പ്ലാസ്മ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ 20 ഓൺസ് (Saline Solution) മലദ്വാരം വഴിയായി കൊടുക്കണം.

ഇതിന് റെക്ടൽഡ്യൂബ് ഉപയോഗിക്കയാണത്തമം. രക്തസ്രാവം നിന്നാൽ അവയെ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ കാലഭാഗം ഉയർത്തിവയ്ക്കുകയും തലയിണ എടുത്തു മാറുകയും ചെയ്യുക. ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ ക്ഷീണം തട്ടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവളെ സ്വസ്ഥമായി കിടത്തുകയും, തിരിയാനും മറിയാനും അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പികൾ ശരീരത്തോടു ചേർത്തു വച്ചും കമ്പളിപ്പുതപ്പുകൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചും കിടത്തണം. ചൂടുള്ള കാപ്പി കുറേക്കൂടി കുറേക്കൂടിയായി കൊടുക്കുകയും, ഒരു പയിൻറ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ഡ്രാം ഉപ്പു ചേർത്ത് സാവധാനത്തിൽ മലദ്വാരം വഴി കടത്തുകയും ചെയ്യുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈസലൈൻ മലദ്വാരത്തിൽകൂടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഹൃദയത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതും ക്ഷീണം മാറുന്നതുമായിരിക്കും.

2. ദ്വിതീയ രക്തസ്രാവം

(SECONDARY POST PARTUM HAEMORRHAGE)

പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനു ശേഷം ചിലരിൽ രക്തസ്രാവം ആരംഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം രക്തവാച്ചയെയാണ് സെക്കണ്ടറി പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഹെമറേജ് എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നത്. ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്ക് വല്ല മുഴുകളും (Fibroids) തള്ളിനില്ക്കാനിടയാകുന്നതിനാലും, മറുകട്ടിയുടെ അംശങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നതിനാലും മറ്റുമാണ് ദ്വിതീയ രക്തവാർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത്. മറുപിള്ളയുടെ കഷണങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിരലുകൾ ഗർഭാശയത്തിൽ കടത്തി അതെടുത്തു കളഞ്ഞാൽ രക്തവാച്ച നിലയ്ക്കുന്നതാണ്. പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ഗർഭാശയകണ്ഠത്തിന് സംഭവിച്ച മുറിവു മൂലവും, ക്രമ

വിരുദ്ധമായി ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു് മറ്റു പുള്ള സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നതിനാലും, പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവമുണ്ടാകാം. പ്രസവം കഴിഞ്ഞയുടനേ രക്തസ്രാവം ആരംഭിക്കുകയും ഗർഭാശയം ഏതാണ്ടു് പൂർണ്ണസ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടും അതു് നില്പാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതിന്റെ കാരണം ഗർഭാശയ ഗളത്തിനു സംഭവിച്ച ക്ഷതങ്ങൾ (ക്രീറലോ-മുറിവോ) തന്നെയാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. ജനനമാഗ്ഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം കൂടിയ നിലയിൽ കാണപ്പെടാറില്ലെങ്കിലും അതിനെ യഥാവസരം തടയേണ്ടതാണു്. ഏതുഭാഗത്തു് ക്ഷതമേറുന്നതിനാലാണു് രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്നതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ പോയൻറ് ബന്ധിക്കുകയും തുന്നിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യണം. തുണുവാൻ (Suture) നിർവാഹമില്ലാത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫോർസെപ്സ് (Sponge Forceps) കൊണ്ടു് ഗർഭാശയകണ്ഠത്തിന്റെ രണ്ടു് അധരങ്ങളും തമ്മിൽ അമർത്തി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിനു സാധ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു് ഡ്രഷ് ചെയ്തശേഷം ഗോസ്തുണികൊണ്ടു് യോനി ഘൃഗ്ഗ ചെയ്യുകയാണു് മിഡ് വൈഫ് ചെയ്യേണ്ടതു്. ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണു് മുറിവു പറ്റിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ യഥായോഗ്യം തുന്നിക്കെട്ടുകയോ മരുന്നു വച്ചുകെട്ടുകയോ ചെയ്യണം.

പ്രസവസംബന്ധമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ

പ്രസവഘട്ടത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മുറിവുകളും പരിക്കുകളും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് സംഭവിക്കാവുന്നതാണു്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെപ്പറ്റി താഴെപ്പറയുന്നു:

1. പെരിനിയം (മലദ്വാരത്തിനും യോനിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗുഹ്യഭാഗം) കീറിപ്പോകുക:- (LACERATION OF THE PERINEUM)

പെരിനിയം കീറിപ്പോകുന്നതിനും, ചിലപ്പോൾ പെരിനിയം കീറുന്നതോടുകൂടി മലക്കുടലും കീറിപ്പോകുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. ഇതിനു പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ ചേർക്കുന്നു:

- a) യോനീദ്വാരം തീരെ ചെറുതായിരിക്കുക.
- b) യോനീദ്വാരത്തിന് അയവില്ലാതിരിക്കുക.
- c) പ്രസവം പെട്ടെന്നു നടക്കുക.
- d) പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മൂന്നിടം പൊട്ടിപ്പോകുക.
- e) പൂഷ്പം ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസ്സുകളിൽ ശിശുവിന്റെ തല നിവന്ന് നിലയിൽ വരിക.
- f) ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിലോ, ദേഹത്തിലോ മുഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുക.
- g) പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മിഡ്‌വൈഫ് കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക.

പെരിനിയം കീറിപ്പോകുക എന്നുള്ളത് ഇക്കാലത്തു സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നു. പെരിനിയത്തിന്റെ ബാഹ്യവശം കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടു പിടിക്കാമെങ്കിലും അതിന്റെ ഉൾവശം എത്രത്തോളം കീറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മിഡ്‌വൈഫ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പെരിനിയം കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പഴുക്കുന്നതിനും പ്രസവജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. കീറിയ ഭാഗം വൃത്തിയായി തുന്നിക്കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ ഗർഭാശയവും, യോനിയും കീഴോട്ടിരുന്നു പോകാനിടയാകുന്നു.

പ്രതിവിധി:-

പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മിഡ് വൈഫ് വളരെ കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ശിരസ്സ് പരത്തേയ്ക്കു പോരുമ്പോൾ പെരിനിയം കീറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചുമലുകൾ പരത്തേക്കു വരുമ്പോൾ അനേകം കേസുകളിൽ പെരിനിയം കീറിപ്പോകുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. പെരിനിയം ഭാഗത്തു് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പൊട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും അതു് തുണേണ്ടതാണു്. തുണിയ ഭാഗം ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു് നന്നുവ തട്ടാതെ വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. തുണലുള്ളപ്പോൾ ആർദ്രവസത്തേക്കെങ്കിലും എഴുന്നേല്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുതു്. ഇപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ തുണൽ പൊട്ടാതിരിക്കുന്നതിന്നും നന്നായി ചേർന്നു പൂർണ്ണസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. തുണൽ വെട്ടിക്കളയുന്നതു് സാധാരണ എട്ടാംദിവസമാണു്. ഇക്കാലത്തു് കുട്ടിക്കു മുലകൊടുക്കുന്നതിന്നു് ഓരോ വശത്തേയ്ക്കു് ചരിച്ചുകിത്തിയാൽ മതിയാകും.

2. ഉപസ്ഥം കീറിപ്പോവുക:-

(LACERATION OF THE VALVA)

യോനീദ്വാരം തീരെ ചെറുതായിരുന്നാൽ ശിശു ശിരസ്സ് പരത്തേയ്ക്കു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉപസ്ഥപ്രദേശം കീറിപ്പോയി എന്നു വരാവുന്നതാണു്. ശസ്ത്രപ്രയോഗം മൂലം പ്രസവം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഗുഹ്യ പ്രദേശം ചീന്തിപ്പോയി എന്നു വരാവുന്നതാണു്. ഭഗശിശ്നിക (Clitoris) യുടെ ഭാഗമാണു് കീറിയതെങ്കിൽ ശക്തിയായ രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്നതാണു്.

പ്രതിവിധി:-

രക്തനഷ്ടം തടയുന്നതിനുവേണ്ടി കീറിയഭാഗം ഉടനെ തുന്നിക്കെട്ടുക. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറിലൈസ് ചെയ്ത ഗോസുതുണി ഘനത്തിൽ മടക്കിവെച്ച് ആ ഭാഗം അമർത്തിപ്പിടിക്കുകയും, ഉടനെ ഡാക്ടറെ വരുത്തി ആ ഭാഗം തുന്നിക്കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

3) യോനികീറിപ്പോവുക:-

(LACERATION OF THE VAGINA)

പ്രസവഘട്ടത്തിൽ യോനിയുടെ മേൽഭാഗവും കീഴ്ഭാഗവും കീറിപ്പോകാനിടയുണ്ട്. യോനിയുടെ മേൽഭാഗം കീറിപ്പോയാൽ മുത്രാശയം യോനീഭാരത്തിലേയ്ക്ക് തുറക്കാനിടയുള്ളതും അതുവഴിയായി മൂത്രവാച്ചുണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് വെസൈക്കോ വജയിനൽ ഫിസ്റ്റ്യുല (Vesico-Vaginal fistula) എന്നു പറയുന്നു. യോനിയുടെ കീഴ്ഭാഗം ചീന്തിപ്പോയാൽ മലാശയം യോനീഭാരത്തിലേയ്ക്ക് തുറക്കാനിടയാകുന്നതും, മലവും വായുവും യോനീഭാരത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നതിനിടയാകുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് റെക്ടോ വജയിനൽ ഫിസ്റ്റ്യുല (Recto-Vaginal fistula) എന്നു പറയുന്നു. ശസ്ത്രപ്രയോഗത്താൽ പ്രസവം നടത്തുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അപൂർവ്വമായി ഉപസ്ഥമാശയവൈദ്രവ്യം മൂലം ശിശുവിന്റെ രതല അധികനേരം ഉപസ്ഥമാശയത്തിൽ അമർന്നു പോകാനിടയായാൽ ആ ഭാഗത്തു വീക്കം തട്ടി പഴുക്കാനും വൃണപ്പെടാനും ഇടയായാലും ഫിസ്റ്റ്യുലാ ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം ഫിസ്റ്റ്യുലാ പ്രസവശേഷം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമെ ഉണ്ടാകൂ എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.

പ്രതിവിധി:-

ഡാക്ടറെ വരുത്തി കീറിപ്പോയഭാഗങ്ങൾ തുന്നിക്കെട്ടിക്കുക.

4) ഗർഭാശയഗുളം കീറിപ്പോവുക:-

(LACERATION OF THE CERVIX)

ശസ്ത്രപ്രയോഗം മൂലം പ്രസവമെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭാശയഗുളം കീറിപ്പോകാനിടയുണ്ട്. ശസ്ത്രപ്രയോഗമൊന്നും നടക്കാത്തപ്പോഴും ചില കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ മുന്നീക്കടം പൊട്ടിപ്പോകുകയോ, കുട്ടിയുടെ തല വളരെ വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കുകയോ ഗർഭാശയം കൂടുതൽ ശക്തിയായി ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്താലും ഗർഭാശയഗുളം കീറിപ്പോകാനിടയുണ്ട്. ഗർഭാശയഗുളത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഈ ക്ഷതം മൂലം പ്രസവശേഷം വളരെ അധികം രക്തം വാൻപോകുന്നു. ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങി കഠിനമായിത്തീർന്നിനുശേഷവും രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്നുണ്ടാൽ ഗർഭാശയഗുളം കീറിപ്പോയതായി അനുമാനിക്കാം.

പ്രതിവിധി:-

നല്ല ചൂടുള്ള ലൈസോൾ ലോഷൻകൊണ്ട് ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്തതിനുശേഷം യോനി നല്ലവണ്ണം പ്ലഗ് ചെയ്യണം. ഉടനെതന്നെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും.

5) ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോവുക:-

(RUPTURE OF THE UTERUS)

ഉപസ്ഥാശയം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുക, പ്രസവത്തിന് ശക്തിയായ തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കുക, കുട്ടി വിലങ്ങനെ കിടക്കുക, കുട്ടിയുടെ തല വെള്ളംകൊണ്ടുനിറഞ്ഞ് ക്രമത്തിലധികം വലുതായിരിക്കുക, നെറ്റി ജനന

മുഖമായി വരിക, മുഖം ജനനമുഖമായിവരുന്ന കേസ്സുകളിൽ താടിതിരിഞ്ഞു" ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു വരാതിരിക്കുക, അണ്ഡാശയം, ഗർഭാശയം, ഉപസ്ഥാശയം, യോനി എന്നീഭാഗങ്ങളിൽ മുഴയുണ്ടായിരിക്കുക, ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ മുതലായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായിത്തീരുന്നു. രക്തസ്രാവംമൂലമോ, ഗർഭാശയം പിളരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഷോക്കുകൊണ്ടോ ഗർഭിണി മരണപ്പെട്ടുപോകുന്നു.

ഗർഭാശയം പിളരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ:-

ഗർഭാശയം പിളരുന്നതിനുമുമ്പ് ഗർഭിണി വല്ലാതെ തളർന്നുപോകുന്നു എന്നു പറയുകയും, കഠിനമായ ക്ഷീണം തോന്നുന്നതും, നാഡീസ്പന്ദനം മിനിട്ടിൽ 120-ൽ കൂടതലായിത്തീരുകയുംചെയ്യുന്നു. പനി 101 ഡിഗ്രിയിൽ അധികമായിത്തീരുകയും ശരീരം ചൂടുപൊള്ളുന്ന രീതിയിലോ, തണുത്തും വിയന്തുരമോ ഇരിക്കും. നാവും ചിറിയും വരളുന്നതും എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതപ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. വയറ്റിന്റെ തെടുവാൻപോലും പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ വേദനയുണ്ടാകുന്നതും ഉദരസ്पर्ശനംമൂലം കട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ശിശുവിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനം ശ്രവിക്കുവാനും കഴിയാത്തവിധത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗർഭാശയം പിളരുന്നസമയത്തുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ:-

വളരെ ശക്തിയായി ഒരു വേദനയുണ്ടായി എന്നും ഉള്ളിൽ എന്തോ പൊട്ടിപ്പോയതുപോലെ തോന്നി എന്നും, തുടൻ വേദനയില്ലാതായി എന്നും ഗർഭിണി പറയുന്നു.

ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോയതിനുശേഷമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ:-

ഗർഭാശയത്തിന്റെ പിളർപ്പു വലുതാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അവയവഭാഗങ്ങൾ ആ പിളർപ്പിലൂടെ ഉദരഭിത്തിയിലേയ്ക്കു തള്ളിവരുന്നതും വയററത്തു കൈവച്ചുനോക്കിയാൽ ശിശുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നതും, ചുരുങ്ങിയ ഗർഭാശയം കുട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു് കഠിനമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും. യോനീമാഗ്ഗമായി പരിശോധിച്ചാൽ ജനനമുഖം ഉള്ളിലേയ്ക്കുപോയതായും മനസ്സിലാക്കാം.

പ്രതിവിധി:-

ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോയി എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഗർഭിണിയുടെ വയററത്തു് ബ്ലൈൻഡർ ഇടുകയും അവളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ വേദന ശക്തിയായി ഉണ്ടായിട്ടും ജനനമുഖം കീഴോട്ടിറങ്ങാതിരുന്നാൽ ഉടനെ ഡാക്ടറുടെ സഹായംതേടിയാൽ ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. സാധാരണ കേസുകളിൽ ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോകുന്നത് കൂടുതലും മിഡ്‌വൈഫിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ്. പ്രസവശുശ്രൂഷയിലെ അജ്ഞതയും, അശ്രദ്ധയുംമൂലം രണ്ടു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി മിഡ്‌വൈഫ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

6) ഗർഭാശയം അകം പുറമായി മറിയുക:-

(INVERSION OF THE UTERUS)

ഗർഭാശയം അകംപുറമായി മറിയുകയെന്നുള്ളതു് അപൂർവ്വമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മറുപിള്ളയെ എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പൊക്കിൾക്കൊടിപിടിച്ചു വലിക്കുക, ഗർഭിണി നില്ക്കുന്നനിലയിൽത്തന്നെ പ്രസവി

ചുപോകുക, പൊക്കിൾക്കൊടിക്ക് നീളം വളരെ കുറവായിരിക്കുക, വേദനയില്ലാത്തസമയത്തു് ഗർഭാശയത്തിൽ അമർത്തി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, പ്രസവശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മലമൂത്രവിസർജ്ജനത്തിനുവേണ്ടി എഴുന്നേൽക്ക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണു് ഗർഭാശയം അകംപുറമായി മറിഞ്ഞുപോകുന്നതു്.

ലക്ഷണങ്ങൾ:-

രക്തം കിനിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാംസപിണ്ഡം പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം യോനിയിൽ കാണുക, പ്രസവശേഷം കടവയർഭാഗത്തു് കാണേണ്ടതായ ഗർഭാശയം അവിടെ കാണാതിരിക്കുക, ശരീരത്തിനു തണുപ്പു്, വിയർപ്പു്, കിതപ്പു്, നാഡിതളച്ചു്, രക്തസ്രാവം, ഷോക്ക് (ധാതുക്ഷോഭം) എന്നിവയാണു് ഗർഭാശയം അകം പുറമായി മറിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.

പ്രതിവിധി:-

മുറപിള്ള പിറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കലശലായ രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരിക്കും. അതു് ശമിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ തുണി യോനിയിൽക്കാണുന്ന മാംസപിണ്ഡത്തിൽ വസ്തുക്കൾ ഡാക്ടറെ ഉടനെ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക മാത്രമാണു് മിഡ്വൈഫിനു ചെയ്യാനുള്ളതു്.

പ്രസവാനന്തരരോഗങ്ങൾ

പ്രസവജ്വരം—ഇറ്ററപ്പനി

(പ്യൂഎർപ്പറൽ—PUERPERAL FEVER)

പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്തു് പല കാരണങ്ങളാലും പനി ഉണ്ടാകാവുന്നതാണു്. എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും, അപകടസാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരുതരം വിഷപ്പനിക്കാണു് പ്രസവജ്വരം എന്നു പറയുന്നതു്. പ്രസവസമയത്തോ, പ്രസവശേഷമോ കുട്ടിയുടെ ജനനമാഗ്തിയുടെ വിഷബീജാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കാനിടയാകുന്നതിനാലാണു് വിഷജ്വരമുണ്ടാകുന്നതു്. ഭാരതത്തിൽ കൊല്ലത്തോറും അനേകായിരം സ്ത്രീകൾ പ്രസവജ്വരം ബാധിച്ചു് അകാലമൃത്യുവിന്നിരയായിത്തീരുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രസവങ്ങൾക്കും, മിഡ്വൈഫിന്റേയോ, നാടൻവയറാട്ടിയുടേയോ സേവനം മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഇറ്ററപ്പനിയുടെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും, അതു് ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനിടയാകുന്ന

എല്ലാ വായനക്കാർക്കും, വിശിഷ്ടാ മിഡ്‌വൈഫിനും അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നതിനാൽ അവ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

സ്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയമാഗ്ഗ്ത്തിലൂടെ പ്രസവസമയത്തോ, പ്രസവശേഷമോ, രോഗബീജാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു് പ്രധാനമായും മൂന്നുവിധത്തിലാകുന്നു.

1) യോനിയിൽത്തന്നെയുള്ള വിഷാണുക്കൾക്കു് ഗർഭാശയത്തിലേക്കു് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ അവസരം സഹായകമായി തീരുന്നതുകൊണ്ടും,

2) ഗുഹ്യഭാഗം രോഗാണുവിമുക്തമാക്കാതെ മിഡ്‌വൈഫ് യോനിയിൽ കൈ കടത്തി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, മിഡ്‌വൈഫിന്റെ കൈ വഴിയായി രോഗാണുക്കൾക്കു് അകത്തേക്കു കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടും,

3) മിഡ്‌വൈഫിന്റെ അടുക്കുള്ള കൈകളിൽനിന്നും ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്നും വിഷാണുക്കൾക്കു് സുഗമമായി ഉപസ്ഥാശയമാഗ്ഗ്ത്തിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടും ആണു് മാതാക്കൾക്കു് രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നതു്.

ഭിന്നലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ മൂന്നു തരം പ്രസവജ്വരങ്ങളാണു് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്.

1. സെപ്റ്റിസിമിയ (SEPTICAEMIA). രോഗബീജാണുക്കൾ രക്തപര്യയനത്തിൽ കടന്നുകൂടിയാണു് ഈ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്.

സെപ്റ്റിസിമിയാ എന്ന പ്രസവജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

പ്രസവശേഷം രണ്ടാംദിവസം മാതാവിനു പെട്ടെന്നു പനിയും വിറയലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പനി 103 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുകയും, നാഡിമിടിപ്പു് വർദ്ധി

ച്ച് 140-ഓളമായി ഉയരുന്നതുമാണ്. നാഡീസ്പന്ദനനിരക്ക് 140-ഓ അതിലധികമോ ആകുന്നത് ശുഭലക്ഷണമല്ല. യോനിയിലൂടെയുള്ള വാച്ചും മുലപ്പാൽസ്രവണവും നിന്നുപോകുന്നു. ഗർഭാശയത്തിനു വേദനയോ മററസുഖങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെന്നും, തനിക്ക് വളരെ സുഖമുണ്ടെന്നും ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ രോഗി പറയുന്നു എന്നതാണ് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നത്. ഇതു വരാൻപോകുന്ന വലിയ അപകടത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. തുടന്ന് വയറിൽ വേദന, വയർക്കുംഭം, ഹർദ്ദി, ഇടവിട്ടിടവിട്ട് മലബന്ധവും, ഒഴിച്ചിലും, മലത്തിന് ദുഗ്ന്ധം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സന്നി, വയറിളക്കം, മഞ്ഞപ്പിത്തലക്ഷണങ്ങൾ, എന്നിവ അവസാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും രോഗി മരണപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും.

2. സപ്രീമിയാ (SAPRAEMIA). വിഷാണക്കൾ ജനനമാഗ്നത്തിലൂടെ ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവിടെയുള്ള വളരെ ചെറിയ രക്തക്കുടകളിലും മറ്റു പിള്ളയുടേയും, മൂന്നീക്കടത്തോലിന്റേയും അവശിഷ്ടങ്ങളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് ജീവിച്ച് പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഡീസ്പന്ദനം അല്പം കൂടുതലായിരിക്കുമെങ്കിലും സെപ്റ്ററിസീമിയായിലുള്ളതുപോലെ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ആയിരിക്കയില്ല. കറേദിവസങ്ങൾ പനിച്ചതിനുശേഷം ക്രമേണ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നു. യോനിയിൽനിന്നുള്ള വാച്ച് അധികമായിരിക്കുകയും അതിന് ദുഗ്ന്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗർഭാശയം അല്പം വീർത്തു വലുതായിരിക്കുന്നതും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും.

3. പയീമിയ (PYAEMIA). ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ചെറിയ രക്തക്കുടകൾ, രക്തധമനികളിൽക്കൂടി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു സഞ്ചരിച്ച് ഓരോ

അവയവങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതു് അവിടെ ഒരു കരുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലക്ഷണങ്ങൾ.

വിറയലോടുകൂടി പനിക്കുക, പനി 105 ഡിഗ്രിവരെ ആയിത്തീരുക, വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ പനികുറഞ്ഞു് സാധാരണഗതിയിൽ ആയിത്തീരുക, വിറയലും പനിയും കൂടെക്കൂടെ ആവർത്തിക്കുക, കലശലായി വിയർക്കുക, ഏതാണ്ടു് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തു് ശക്തിയായ വേദന അനുഭവപ്പെടുക, തപക്ഷു്, ഏപ്പകൾ, കരൾ, ശ്വാസകോശങ്ങൾ, എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലും കരുക്കൾ ഉണ്ടായിത്തീരുക തുടങ്ങിയവയാണു് പശ്ചാത്തപ്യ എന്ന പ്രസവജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ രോഗം ജീവാപായം വരുത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൊണ്ടു് പലരും ഇക്കാലത്തു് സുഖപ്പെടാറുണ്ടു്. പ്രസവജ്വരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും, ഉണ്ടായാൽ രോഗിയെ എങ്ങിനെ പരിചരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായി മിഡ്ഡൈഫിനു് അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു്. അതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു വേണം പ്രസവമുറിയിൽ മിഡ്ഡൈഫ് പ്രവേശിക്കേണ്ടതു്.

പ്രതിവിധി

1) പ്രസവത്തിനുമുൻപും, പ്രസവസമയത്തും, പ്രസവശേഷവും, രോഗാണുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനു് വളരെ യേറെ സാധ്യതകളുള്ളതിനാൽ, മിഡ്ഡൈഫിന്റെ ശരീരവും വിശേഷിച്ചു് കൈകാലുകളും പ്രസവാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണം.

2) ഗൃഹഭാഗത്തുള്ള രോമം വടിച്ച് സോപ്പും ചൂടു വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു തേച്ചുകഴുകിയതിനുശേഷം ലൈസോൾ ട്രാവകം കൊണ്ട് തുടച്ച് രോഗാണുവിമുക്തമാക്കണം. മിഡ്‌വൈഫിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ഗർഭിണികളേയും ഗർഭകാലത്തു് ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാക്ടറെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച് ചികിത്സിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. യാതൊരു സുഖക്കേടുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗർഭകാലത്തു് ഒരിക്കലേങ്കിലും ഗർഭിണിയെ ഒരു ഡാക്ടറെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണു്.

3) ഒരു പ്രസവശിശുഷ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷവും, മറ്റൊരു പ്രസവക്കേസ്സിൽ ഇടപെടുന്നതിനുമുമ്പും മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ കൈകൾ സോപ്പുതേച്ച് ബ്രഷ് കൊണ്ടു് നല്ലപണ്ണം ഉറച്ചുകഴുകി ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടതാണു്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവശുശ്രൂഷാസമയത്തു് നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ പറ്റിയിരിക്കാനിടയുള്ള രക്തം, മൂന്നീർ, യോനീവാച്ചു് തുടങ്ങിയവ അവിടെയിരുന്ന് അഴുകുകയും, അതു് മറ്റൊരു പ്രസവക്കേസ്സിൽ രോഗാണുസംക്രമണത്തിനു് സാധ്യതയുളവാക്കുകയും, പ്രസവജ്വരത്തിനു് കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.

4) യോനീമാർഗ്ഗമായി പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുമുമ്പും മൂത്രമെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പും മറ്റും ഗൃഹഭാഗങ്ങളും തുടയുടെ ഉൾഭാഗവും സോപ്പുതേച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകിയതിനുശേഷം ലൈസോൾ ട്രാവകം കൊണ്ടു് ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടതാണു്.

5) പ്രസവജ്വരമുള്ള ഒരു രോഗിയെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും,

ഉപകരണങ്ങളും വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം വെയിലത്തുണക്കി, വീണ്ടും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിയതിനുശേഷമേ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മിഡ്‌വൈഫ് സോപ്പുതേച്ചു കുളിക്കുകയും, വീണ്ടും ഒരഞ്ചൻസ് ലൈസോൾ ഒഴിച്ചു വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രസവജ്വരം ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയെ പരിചരിച്ചതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തേയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രസവക്കേസ്സിന് മിഡ്‌വൈഫ് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പൊതുനിയമം.

6) പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെ എല്ലാ അഴുക്കുവസ്തുക്കളും, മറുപിള്ള, മറു മലിനവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രസവമുറിയിൽനിന്നും നീക്കംചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7) വായ്, മുക്ക്, ചെവി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ പഴുപ്പോ, വ്രണമോ മിഡ്‌വൈഫിനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവക്കേസ്സുകൾക്ക് പോകുവാൻ പാടില്ല.

8) മാതാവിനു പ്രസവശേഷം 100 ഡിഗ്രിയിലധികം പനി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, അതു 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും തുടരുന്നതായി കാണുകയും ചെയ്താലുടനെ ഡാക്ടറെ വരുത്തി ചികിത്സിപ്പിക്കുക.

9) പ്രസവസംബന്ധമായ മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ സന്ദർഭാനുസരണം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതും കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിചരണം

പ്രസവജ്വരമുള്ള രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ശരീരശക്തിയുണ്ടെങ്കിലേ രോഗഹരണം സാധ്യമാകൂ എന്ന് മിഡ്‌വൈഫ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് പോഷകഗുണസമ്പന്നമായ ആഹാരംമാത്രം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പേണം. രോഗിക്കു

കൊടുക്കേണ്ട ആഹാരക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഡാക്ടറോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അത്തരസരിച്ചുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. പ്രസവജ്വരരോഗിയുടെ വായും ചിറിയും എപ്പോഴും വരണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് ബോറിക്കു ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വായും, ചിറിയും വൃത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതും, ചിറി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോറാക്സ്, ഗ്ലിസറിനിൽ ചേർന്നു പുരട്ടിക്കൊടുക്കുകയും വേണം.

രോഗി കിടക്കുന്ന മുറി വൃത്തിയുള്ളതും, ധാരാളം വായു കടക്കത്തക്കവിധം ജനലുകളും വാതിലുകളും ഉള്ളതും, അതു് എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

പ്രസവജ്വരരോഗികൾ ഏറെനാൾ കിടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവരുടെ പുറവും മറും പൊട്ടി പരുക്കൾ (Bed Sores) ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും പല പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കിടത്തേണ്ടതും, കാലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മടക്കി കത്തിച്ചു നിർത്തേണ്ടതുമാണ്. കാൽ നീട്ടിവെച്ച നിലയിൽ വളരെ നേരം കിടന്നാൽ കാൽ വീണ്ടും മടക്കുന്നതിന് പ്രയാസം നേരിടുന്നതാണ്.

പ്രസവജ്വരരോഗാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വിറയൽ കണ്ടാലുടനെ ചൂടുവെള്ളം നിറച്ച സഞ്ചി കാലിന്റെ പാദത്തിൽ വയ്ക്കുകയും കമ്പിളികൊണ്ട് നന്നായി പുതപ്പിച്ച് രോഗിയെ കിടത്തുകയും വേണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരൗൺസ് ബ്രാണ്ടി ചൂടുപാലിലോ വെള്ളത്തിലോ ചേർന്നുകൊടുക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. വിറയൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, പുകച്ചിൽ തോന്നുകയും, വിയർക്കുകയും ചെയ്യും. ഉടനെ കമ്പിളിപ്പുതപ്പു മാറുകയും, ഹോട്ടുവാട്ടർ ബാഗ് എടുക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം വിയർത്തുനനഞ്ഞിരിക്കുന്ന

കിടക്കവിരി, വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ മാറുകയും ചെയ്യണം.

പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്തു് മറ്റു സാധാരണ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും പനി ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. ഏതുവിധമുള്ള പനി ആയാലും, പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്തു് പ്രത്യേകിച്ചു് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പനിയും, നിസ്സാരമായി കരുതുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. സാധാരണ പനികളെല്ലാം ആരംഭിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഒരു ദിവസംകൊണ്ടുതന്നെ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണു്.

പ്രസവസംബന്ധമായ ചിത്തഭ്രമം

(പ്യൂഎർപ്പറൽ ഇൻസാനിറ്റി—PUERPERAL INSANITY)

പ്രസവശേഷം ആദ്യവാരത്തിനുള്ളിലാണു് പ്രസവസംബന്ധിയായ ചിത്തഭ്രമം ആരംഭിച്ചു കാണുന്നതു്. പ്രസവജ്വരം, രക്തസ്രാവം, ആരോഗ്യഹാനി, വ്യസനം, കലശലായ പരിഭ്രമം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണു് ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ചിത്തഭ്രമലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനം ശക്തമായ തലവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ഭർത്താവിനോടും സന്താനങ്ങളോടും കടുത്ത വിരോധം, ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കൽ, ആത്മഹത്യാശ്രമം എന്നിവയാണു്. 80 ശതമാനം കേസുകളും രണ്ടു മൂന്നു മാസത്തിനകം സുഖപ്പെടുന്നതാണു്. ചിലർ ക്ഷീണിച്ചു മരിച്ചുപോകുകയും മറ്റു ചിലർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ചിത്തഭ്രമരോഗികളായിത്തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിവിധി. ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ചികിത്സയിലും വളരുന്നതായ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. സംസാരത്തിനു കഴപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയും ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ശിശുവിനെ അവരിൽനിന്നും മാറ്റണം. ചിത്തഭ്രമരോഗികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരോട് ദയാപൂർവ്വമായി പെരുമാറുകയും, അങ്ങിനെ പെരുമാറുവാൻ മറുജീവരോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മിഡ്‌വൈഫിന്റെ കടമയാകുന്നു.

മുലക്കണ്ണുകൾ പിൻവലിഞ്ഞിരിക്കുക (RETRACTED NIPPLES)

ഈ അവസ്ഥയിൽ ശിശുവിന് മുല ഉറിഞ്ചിക്കടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം മുലക്കണ്ണുകൾ മുലഞ്ഞിനുളളിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടി മുല വലിച്ചുകടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതോ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ മുലക്കണ്ണുകളിലെ തൊലി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. മുലക്കണ്ണുകൾ ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടാൽ ഗർഭകാലത്തുതന്നെ മുലഞ്ഞിനു ചുവട്ടിൽപിടിച്ച് സാവധാനത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കണം. ശിശുവിനു മുല വലിച്ചുകടിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമില്ലാതാകുന്നതുവരെ പാൽ പിഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം.

മുലഞ്ഞുകൾ വ്രണപ്പെടുക (SORE NIPPLES)

മുലക്കണ്ണുകൾ വ്രണപ്പെടുന്നതിനു പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത്.

മുല വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി ഉറങ്ങുക, കുട്ടിയുടെ നാക്കിൽ പൂപ്പൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക, വളരെ പ്രാവശ്യവും അധികനേരവും കുട്ടി മുല കുടിക്കുക, ആദ്യത്തെ മൂന്നുനാലു ദിവസങ്ങളിൽ മുലയിൽ ആവശ്യത്തിന് പാലില്ലാതിരിക്കുകയും, മുലക്കണ്ണുകൾ പിൻവലിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം മുല കുടിക്കുവാൻ കുട്ടി ശ്രമിക്കുക, മുതലായവയാണ് സാധാരണ കാരണങ്ങൾ.

മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ മാതാവു മുലഞ്ഞിനു താഴെ മെല്ലെ അമർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കൂടുതൽ പാൽ വായിൽ നിറയുന്നതും, ശിശുവിനു ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും. ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ കുട്ടി മുലഞ്ഞിൽനിന്നും വിട്ട് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് മുല കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, മുല കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പും മുല കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷവും മുലകൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റും മുലക്കണ്ണുകൾ വ്രണപ്പെടാനിടയാകുന്നതാണ്. മുലക്കണ്ണുകൾ വ്രണപ്പെട്ടാൽ വേദനനിമിത്തം മുല കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതും ചിലപ്പോൾ മാതാവിനു പനി ഉണ്ടാകുന്നതുമാകുന്നു. മുലക്കണ്ണുകളിലെ വ്രണത്തിൽക്കൂടി രോഗാണുക്കൾക്കു ഉള്ളിൽപ്രവേശിക്കുവാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് പരു ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്രണപ്പെട്ട മുലക്കണ്ണുകളിൽക്കൂടി, മുല കുടിക്കുമ്പോൾ രക്തംതന്നെ കുട്ടി വലിച്ചുകുടിച്ചുപോകാനുമിടയുണ്ട്. കുട്ടി രക്തം കുടിക്കാനിടയായാൽ അത് രക്തം ഫർട്ടിക്കുന്നതിനോ, ഒഴിയുന്നതിനോ ഇടയായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു.

പ്രതിവിധി. സാധാരണഗതിയിൽ ടിങ്ക്ചർ ബൻസോയിൻ (Tr. Benzoin Co) പുരട്ടുകയും കുട്ടിക്കു മുല കൊടുക്കുമ്പോൾ നിപ്പിൾഷീൽഡ് (Nipple Shield) ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകും. അല്ലെങ്കിൽ ബോറിക്കു ഓയിൻറ് മെൻറ് (Boric Ointment) പുരട്ടിയാലും മതിയാകും. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും ആശ്വാസം ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ഡാക്ടറെ കാണിക്കുക.

ഗർഭകാലത്തു മുലശുശ്രൂഷ ക്രമമായി ചെയ്യുകയും, പ്രസവിച്ചുകിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കു മുല കൊടുക്കേണ്ടതെ

ങ്ങിനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കി, അതുപോലെ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

സ്തനവീക്കം (ENGORGED BREASTS)

മുലകൾക്ക് വീക്കമുണ്ടാകുന്നത് പാൽ കെട്ടിനില്ക്കാ നിടയാകുന്നതുമൂലമാണ്. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ മുലയ്ക്ക് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതും അത് വലുതായിവീങ്ങി കല്ലുപോലെ ആയിത്തീരുന്നതും അതോടൊപ്പം കക്ഷങ്ങളിൽ കഴലയും പനിയും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

പ്രതിവിധി. പനിയും വേദനയും ശക്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാക്ടറെ കാണിക്കുക. കുട്ടിക്കു പാൽ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കുറെ പഞ്ഞികൊണ്ട് മുലകൾ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിവയ്ക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് ആവി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക. പാൽ പിഴിഞ്ഞുകളയുകയോ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു പാൽ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്യണം. മുല പിഴിയേണ്ടത് മുലയുടെ മേലറ്റത്തുനിന്നും മുലക്കണ്ണുകളുടെ നേക്ക് ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

സ്തനങ്ങളിൽ ചോര കെട്ടുക

(FLUSHED BREASTS)

പ്രസവാനന്തരം പത്തു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗം ബാധമൂലം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. സ്തനങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമായ വേദനയും, വളരെ ശക്തിയായ പനിയും കാണപ്പെടുന്നു. പനി 105 ഡിഗ്രിവരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ മുലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു് ത്രികോണാകൃതിയിൽ ചുവന്ന് മിനുസ്സുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി. ചടുവെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു കൂടെക്കൂടെ മുലയുടെ പുറത്തിടണം. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതു സ്വയം മാറുന്നതാണ്. അപൂർവ്വമായി ചില കേസുകളിൽ ചുവന്നുകണ്ട ഭാഗത്തു് ഒരു പരു ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

മുലപ്പരു (ABSCCESS OF THE BREAST)

മുലക്കണ്ണുകളിൽക്കൂടിയോ, മുലഞ്ഞിലുള്ള വിള്ളലുകളിൽക്കൂടിയോ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാലാണ് മുലയിൽ ഒരു (പരു) ഉണ്ടാകുന്നത്. വിറയലോടുകൂടിയുള്ള പനി, ശക്തമായ വേദന, മുല ചുവന്നു വീങ്ങി മിനുസപ്പെട്ടു ഇരിക്കുക, കക്ഷത്തിൽ കഴലുണ്ടാകുകയും കൈ അനക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക, തുടങ്ങിയവയാണ് മുലപ്പരുവിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

പ്രതിവിധി. പരുവുള്ള മുലയിൽ സ്വാഭാവികമായി പഴുപ്പുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതിനാൽ മുല കുടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതു്. ഡാക്ടറെ കാണിച്ച ചികിത്സിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.

കാൽവീക്കം (WHITE LEG)

കാലുകളിലുള്ള രക്തധമനികളിൽ രക്തക്കട്ടകൾ വന്നുകൂടി രക്തസഞ്ചാരം തടയപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രസവശേഷം ഏതാണ്ടു് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് കാൽവീക്കം കണ്ടുവരുന്നത്.

പനി, കാലുകളിലും തുടകളുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലും വേദന അതേത്തുടൻ വീക്കവും, തടിപ്പും ഉണ്ടാവുക എന്നിവയാണ് കാൽവീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന കാൽവീക്കംപോലെ പതുപതുപ്പായിട്ടല്ല പ്രസവശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഈ വീക്കം കണ്ടുവരുന്നത്.

കാലുകൾ വിളറിവെളുത്തും മിനുസപ്പെട്ടും ഇരിക്കും. വീക്കവും വേദനയും നിമിത്തം കാലനക്കാൻകൂടി കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഒന്നൊന്നരമാസംകൊണ്ടേ ഈ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു കാണുന്നുള്ളൂ.

പ്രതിവിധി. ഡാക്ടറെ കാണിച്ചു ചികിത്സിപ്പിക്കുകയും രോഗിയെ അനക്കാതെ കിടത്തുകയും മലമുത്രവിസർജ്ജനത്തിനു് ബഡ്‌പാൻ (Bedpan) വച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. കാലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചൂടുലഭിക്കുന്ന തിനുവേണ്ടി മണൽകിഴികൾ വയ്ക്കുകയോ ഡാക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാലുകളിൽ മരുന്ന്പുരട്ടി പണുതികൊണ്ടു് മൂടിക്കെട്ടി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. കാലിന്റെ വീക്കവും, വേദനയും മാറിയിട്ടല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും എഴുന്നേല്ക്കാൻ രോഗിയെ അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ കാൽ അനക്കുന്നത് അപകടകരവും, ജീവഹാനിക്കുതന്നെ കാരണമായേക്കാവുന്നതുമാണ്.

പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തു് കീറിപ്പോകുന്നതു കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പെൽവിക് സെല്യൂലൈറ്റിസ് (Pelvic cellulitis), ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നുതന്നെ രോഗാണുസംക്രമണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പെൽവിക് പെറിട്ടൊണൈറ്റിസ് (Pelvic peritonitis), ശ്വാസകോശ രക്തധമനികളിൽ രക്തക്കട്ടകൾ വന്നുകൂടി തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്നു ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടാകുകയും, മുഖത്തു് നീലനിറം വ്യാപിക്കുകയും മിക്കവാറും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായ പരമണറി എംബോളിസം (Pulmonary embolism) തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമോ, മാരകമോ ആയേക്കാവുന്ന ചില രോഗങ്ങളെക്കൂടി പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരു മാതാവിനുണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്തു് കാര്യമായിട്ടു് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണം കണ്ടാലുടനെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുവാൻ ഒരിക്കലും അമാന്തിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

നവജാത ശിശു

നവജാതശിശുവിന്റെ നിറം നേരിയ ചുവപ്പായിരിക്കും. ശിശുവിന്റെ നിറം, നീലനിറത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മഞ്ഞനിറം കാണപ്പെടുന്നപക്ഷം അത് സ്വയം മാറിക്കൊള്ളും. മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗചികിത്സ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി തടിച്ചു കൊഴുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. വളരെ മുഴുവായ തൊലിയും മുതുകിലും, തലയിലും പട്ടുപോലെ നേർമയുള്ള രോമവും ശരീരമാകെ ഒരുതരം കൊഴുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈ രോമം പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതും, തലയിൽ പുതിയ മുടി വളരുന്നതുമാകുന്നു.

മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾ വളരെ മെലിഞ്ഞും, സിഫിലിസ് എന്ന രോഗത്തോടു കൂടി ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കളുടെ കണ്ണുകൾ പഴുത്തും ശരീരം മെലിഞ്ഞു തൊലി ചുളുങ്ങി വാർദ്ധക്യസഹജമായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയും ആയിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്.

ടെമ്പറേച്ചർ (TEMPERATURE)

നവജാത ശിശുവിന്റെ ശരീരപ്പോഷ് 99.9 ഡിഗ്രി യായിരിക്കും. ക്രമേണ ഈ ചൂട് കുറയുന്നതും എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടയന്ത് 99 ഡിഗ്രി വരെ എത്തിച്ചേരുന്നതുമാകുന്നു. കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നേക്കേണ്ടത് തെമ്മോമീറ്റർ മലദാരുത്തിൽവെച്ചായിരിക്കണം.

പൾസ് (PULSE)

ജനനശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ടു മാസത്തേയ്ക്ക് ശിശുവിന്റെ നാഡീസ്സന്ദനനിരക്ക് മിനിറ്റിൽ 130 മുതൽ 140 വരെ ആയിരിക്കുന്നതും, മൂന്നാംമാസം മുതൽ ആറാംമാസം വരെ 130 നും 120 നും ഇടയ്ക്കും, ഏഴാം മാസം മുതൽ 115 നും 105 നും ഇടയ്ക്കും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

ശ്വാസോച്ഛ്വാസം (റെപ്പിറേഷൻ-RESPIRATION)

ജനിച്ചയുടനെ ശിശുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസനിരക്ക് മിനിറ്റിൽ 30-35 പ്രാവശ്യമായിരിക്കും. ക്ലോറോഫോം, മോർഫിയാ തുടങ്ങിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ പ്രസവഘട്ടത്തിൽ മാതാവിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസനിരക്ക് ഇതിലും കുറവായിരിക്കുന്നതാണ്.

മൂത്രം (യൂറിൻ-URINE)

ശിശു പിറന്നാൽ ഉടനെതന്നെയോ പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ, മൂത്രവിസർജനം നടക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടന്ന് രണ്ടു രണ്ടു മണിക്കൂറിടവിട്ട് ഏകദേശം ഒരുൺ സു വീതം മൂത്രവിസർജനമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

മലശോധന (മോഷൻ—MOTION)

ജനനശേഷം പത്രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം ആദ്യത്തെ മലശോധനയുണ്ടാകും. മലം അല്പം അയഞ്ഞും കറുപ്പുനിറത്തിലുമായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം ഏഴുപ്രാവശ്യം വീതം മലശോധനയുണ്ടാകുന്നു. നാലാം ദിവസത്തോടുകൂടി മലത്തിന്റെ കറുപ്പുനിറം മാറി മഞ്ഞ നിറമായിത്തീരുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ദിനംപ്രതി മൂന്നു നാലു പ്രാവശ്യവും, തുടർന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വീതവും മലശോധനയുണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കും.

ഉറക്കം

ശരാശരി ഒരു ദിവസം ഇരുപതു മണിക്കൂർ വീതം ശിശുവിന് ഉറക്കമാവശ്യമാണ്. രാത്രി 9-10 മണിക്ക് കുട്ടിയെ ഉണർത്തി പാൽ കൊടുത്ത് ഉറക്കുക. പിന്നീട് രാവിലെ ആറുമണിക്കു മാത്രമേ കുട്ടിയെ ഉണർത്തി പാൽ കൊടുക്കാവൂ. രാത്രിയിൽ പല പ്രാവശ്യം മുലകൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നല്ലതല്ല. ദാഹമുള്ളപ്പോഴും വയറിൽ വേദനയുള്ളപ്പോഴും മാത്രമേ ശിശു ഉറങ്ങാതിരിക്കൂ. കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ശിശുവിനെ മാതാവിന്റെ കിടക്കയിൽനിന്നും മാറി മറ്റൊരു കിടക്കയിൽ കിടത്തി വേണം ഉറക്കുവാൻ. മാതാവിന്റെകൂടെ കിടത്തി കുട്ടിയെ ഉറക്കുന്നതിനാൽ അനേകം കുട്ടികൾ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചുപോകാറുണ്ട്. കുട്ടികളെ തൊട്ടിലിൽ ആട്ടി ഉറക്കുന്നതും നല്ലതല്ല.

ശിശുസ്നാനം

പ്രസവശേഷം മാതാവിനു ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാലുടൻതന്നെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പി

ക്കണം. നവജാതശിശുവിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സോപ്പ്, എണ്ണ, ടവൽ, പൗഡർ ബോറിങ്ങ് ലോഷൻ, പൊക്കിൾക്കൊടി കെട്ടുവാൻള്ള സാധനങ്ങൾ, ബൈൻഡർ, ഉടുപ്പ് മുതലായവ തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കണം.

നവജാത ശിശുവിന്റെ കണ്ണ്, മൂക്കു, ചെവി എന്നിവ ബോറിങ്ങ് ലോഷനിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം. എണ്ണയിൽ മുക്കിയ ഒരു തുണിക്കുപ്പണംകൊണ്ട് ശിശുശരീരത്തിലുള്ള എച്ചിൽ തുടച്ചുകളഞ്ഞതിനുശേഷം സോപ്പുതേച്ച് കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കണം. കളിപ്പിച്ചു തുവർത്തിയതിനുശേഷം വീണ്ടും മാർദ്ദവമുള്ള ഒരുണങ്ങിയ തുണികൊണ്ട് ശരീരം മൊത്തത്തിലും വിശേഷിച്ച് കക്ഷം, കൈകാലുകളുടെ ഒടി എന്നീഭാഗങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് പൗഡർ ഇടണം. ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതുവരെ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം വീതം മാത്രമേ ശിശുക്കളെ കളിപ്പിക്കാവൂ.

പൊക്കിൾക്കൊടി

സാധാരണയായി അഞ്ചാറുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊക്കിൾക്കൊടി പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. പൊക്കിൾക്കൊടി നന്നവില്ലാതെവയ്ക്കുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പൊക്കിൾക്കൊടി നന്നഞ്ഞാൽ പഴുക്കുന്നതിനും, പഴുത്താൽ രോഗാണുബാധമൂലം ചിലപ്പോൾ ജീവാപായത്തിനും കാരണമായിത്തീരുന്നതാണ്.

പൊക്കിൾക്കൊടി സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

സ്റ്റേറിലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കപ്പണം ലിൻറ് (Lint) നെടുകെയും കുറുകെയും മടക്കി, മടക്കുകൾ തമ്മിൽച്ചേരു

ന്ന അഗ്രഭാഗം കത്രികകൊണ്ട് അല്പം വെട്ടി ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കുക, ആ ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി പൊക്കിയുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിയെടുത്തു ഡസ്സിംഗ് പൗഡറിട്ട് ലിൻറിന്റെ നാലരികളും മേലോട്ടു മടക്കി അതിന്റെമീതെ കുറു പഞ്ഞി കൂടെ വെച്ച് ഒരു ബയിൻറർ ഇടുക. ബയിൻറർ ഫ്ലാൻൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും, അഞ്ചിഞ്ചു വീതിയും, രണ്ടടിയിൽ കുറയാതെ നീളവും പലകഷണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത (Many tailed bandage) തരത്തിലുള്ളതുമായിരുന്നാൽകൊള്ളാം. ബൈൻഡർ വയററത്തിട്ട് അധികം മുറുക്കാതെ അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നൂലുകൊണ്ട് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കണം. പൊക്കിയുകൊണ്ടി വീണാലും കുറെ ദിവസത്തേക്കുകൂടി ഡസ്സിംഗ് പൗഡറിട്ട് കെട്ടിവയ്ക്കണം. പൊക്കിയെന്നായുണങ്ങിയാൽപ്പിന്നെ ബൈൻഡർ മാറ്റാവുന്നതാണ്.

കുട്ടി ഉടുപ്പ്

ശിശുവിനു തയ്യിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് നേർത്തുള്ള തുണികൊണ്ടുള്ളതും നല്ല അയവുള്ളതുമായിരിക്കണം. ഉടുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശിശുവിനു കൈകാലുകൾ ഇളക്കുന്നതിനും, സുഗമമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത്. ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കുന്ന ഏതു തുണി നന്നാത്താലും കുട്ടി ഉടന കരയുന്നതാണ്. അതിനാൽ പ്രത്യേക കാരണമൊന്നും കൂടാതെ കുട്ടി കരയുമ്പോൾ അത് മുത്രമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, തുണിയും ശരീരവും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി നനഞ്ഞ തുണികൾ മാറ്റുകയും ശരീരം തുടച്ച് ഉണക്കുകയും ചെയ്യണം.

കുട്ടിയുടെ തൂക്കം

പ്രസവിച്ചയുടനെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സാധാരണ ശിശുവിന്റെ ശരാശരി തൂക്കം 3-3½ കിലോഗ്രാമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് 120 മുതൽ 300 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം കുറയും. അതിനുശേഷം കുറഞ്ഞ തൂക്കം ക്രമേണ കൂടി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജനിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന തൂക്കത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ആദ്യത്തെ ആറുമാസങ്ങളിൽ ശിശുവിന് ആഴ്ചയിൽ 175 ഗ്രാം വീതം തൂക്കം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ്ടുമിരിക്കും. തൂക്കത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നപക്ഷം കുട്ടിയുടെ വളച്ചയുടെ സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

സൂന്യഭാനം

മാതാവിന്റേയും ശിശുവിന്റേയും ശാരീരികവും, മാനസ്സികവും, വൈകാരികവുമായ സുസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി മാതാവ് കുട്ടിക്കു് സ്വന്തം മുലപ്പാൽ നല്കി വളർത്തേണ്ടതാവശ്യമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പല യുവ മാതാക്കളും കുട്ടിക്കു മുല കൊടുക്കുന്നതിൽ വിമുഖരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മുലകുടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന ചോദിച്ചാൽ മുലയിൽ പാലില്ലെന്നു പറയും. മുലയിൽ പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാക്ടറെക്കണ്ടു വിവരം പറഞ്ഞ് അതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. കുട്ടിക്കു മുല കൊടുത്താൽ മുലയുടെ മുഴുപ്പും ഭംഗിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനു കുറവു പറുമെന്നും മറ്റുമുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളാണ് മാതാക്കളെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു് തീർത്തും പറയുവാൻ എനിക്കു കഴിയും.

കുട്ടിയുടെ ശാരീരികവും, മാനസ്സികവുമായ ഘടനയ്ക്കു് ഏറ്റവും യോജിച്ച ആഹാരം മുലപ്പാലാണ്.

ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകമൂല്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും മുലപ്പാലിൽ മാത്രമാകുന്നു. നവജാതശിശുവിന്റെ ഭവനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് മാതാവിന്റെ മുലപ്പാൽ ഭവിപ്പിച്ചാഗിരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവു മാത്രമേയുള്ളൂ. മറ്റു പാലോ, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ കൊടുക്കുന്നതുമൂലം, ഭവനത്തകരാറുകളും തജ്ജന്യമായ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ശിശുരോഗങ്ങൾക്കും, ശിശുമരണങ്ങൾക്കും മുഖ്യകാരണം ടിൻ പാലുകളും, ടോണിക്കുകളും, പശുവിൻപാലും മറ്റുമാകുന്നു.

മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികളേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കൃത്രിമാഹാരം കഴിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നതായി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഉഷ്ണാതിസാരം (സമ്മർഡയറിയ— Summer Diarrhoea) എന്ന രോഗംമൂലം മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും, മറ്റു പാലോ, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ കഴിച്ചു വളരുന്നവരാണ്. മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്കു് താരതമ്യേന രോഗബാധ വളരെ കുറവും, രോഗം പിടിപെട്ടാൽത്തന്നെ അതെളുപ്പത്തിൽ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

മുലപ്പാലിലെ ഘടകങ്ങൾ

മുലപ്പാലിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, ഓജസ്സിനും വളർച്ചയ്ക്കും അനുപേക്ഷണീയമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഭവിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്. മുലപ്പാലിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ മാംസ്യം, പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ്, ഉപ്പ്, ജീവകങ്ങൾ, വെള്ളം എന്നിവയാണ്. ഇതേ ഘടകങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പശുവിൻ പാലിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെ

കിലും, മുലപ്പാലിലുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി മാംസ്യം പശുവിൻ പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടിയുടെ ആമാശയത്തിന് അതു ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവില്ല.

മുലവെള്ളം (കൊളോസ്ട്രം-COLOSTRUM)

പ്രസവശേഷം പിലപ്പോൾ കറേദിവസത്തേയ്ക്ക് മുലയിൽ പാലിനു പകരം വെള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവകമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ദ്രാവവിശേഷത്തിന് മുലവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോസ്ട്രം എന്നു പറയുന്നു. അമൃലുങ്ങായ പോഷകഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ ഈ ദ്രാവകത്തിൽ കൊഴുപ്പും, പഞ്ചസാരയും, ഉപ്പും കാവാണെങ്കിലും മാംസ്യസമത്വമായിരിക്കും. ഈ മാംസ്യമാകട്ടെ ദഹനശ്രീയ കൂടാതെ തന്നെ രക്തത്തിലേയ്ക്കു സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലായതുകൊണ്ട് മറ്റു മാംസ്യങ്ങൾ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലം ഇതിനൊരിക്കലുമുണ്ടാകുകയില്ല.

പ്രസവിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുലയിൽ പാൽ കാണുന്നില്ലെന്നും വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും കുട്ടിക്ക് പശുവിൻ പാലോ മറ്റു ടിൻ പാലുകളോ കൊടുത്തു തുടങ്ങുകയും, മുല കടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുലപ്പാൽ സ്രവണം തന്നെ നിന്നുപോകാനിടയാകുന്നത്.

മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹനീയതയ്ക്കും, സന്താനങ്ങളുടെ മാതൃവാത്സല്യത്തിനും സ്തന്യദാനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഘടകമാകുന്നു. ശിശുവിന് പൊറമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാനുള്ള അവകാശവും, സ്വന്തം കുട്ടിയെ പാലുദാനമുള്ള ബാല്യത്വവും പ്രകൃതിസഹജമായ ഒരവകാശവും, ബാല്യത്വയുമാണ്. സ്തന്യോപജീവികളുടെ ഈ സഹജവാത്സന്യത്തെ പരിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ പേരിലായാലും, മറ്റൊരാളിന്റെ

പേരിലായാലും തടയുന്നത് കുറകരവും ശിക്ഷാർഹവുമാണെന്നാണ് എന്റെ സൂചിപ്പിതമായ അഭിപ്രായം.

സ്തന്യദാനംകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

- 1 മാതാവിന് ശിശുവിനോടും, ശിശുവിന് മാതാവിനോടും, ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിനും വൈകാരികമായ സത്ഭാവങ്ങൾക്കും സ്തന്യപാനമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല.
- 2 സ്തന്യദാനംകൊണ്ടു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങി പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളു.
- 3 സ്തന്യപാനംകൊണ്ടല്ലാതെ ശിശുവിന് യോഗ്യവും, മാതൃകാപരവുമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കയില്ല. കുപ്പിപ്പാലുകളും, പാട്ടപ്പൊടികളും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭുക്തയുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നല്ലാതെ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യോജിച്ചതല്ല.
- 4 കൃത്രിമാഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പവും, സന്തോഷകരവുമായ ഒരു പാവനകൃത്യമാണ് മുലപ്പാലുടുക എന്നത്.
- 5 സ്തന്യദാനംകൊണ്ടല്ലാതെ മാതൃത്വം എന്ന മഹനീയപദവിയിലേയ്ക്ക് യാതൊരു സ്ത്രീയും ഉയരുകയില്ല.

സ്തന്യദാനക്രമം

പ്രസവം കഴിഞ്ഞു മാതാവ് നല്ലവണ്ണമുറങ്ങിയശേഷമാണ് സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി മുലകൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രസവശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ആറു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മുലകൊടുക്കണം. ഈ

രണ്ടു ദിവസംകൊണ്ട് കുട്ടി മൂല വലിച്ചു കുടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും, മൂലയിൽ പാൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നതുമാണ്. ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ അധികം പ്രാവശ്യവും വളരെ നേരവും മൂല കൊടുക്കരുത്. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ മൂലക്കണ്ണുകൾ പൊട്ടുന്നതാണ്. ഒരൺസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നേരിയ ചൂടോടുകൂടി കുറേദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശിശുവിനു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചെറുചുട്ടുള്ള വെള്ളം കൊടുത്താൽ കുട്ടി വല്ലാതെ കറുത്തു് ബുദ്ധിമുട്ടുകയുമില്ല.

മൂലയിൽ പാൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ടായാൽ പിന്നെ അങ്ങോ, പത്തോ മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം മൂല കുടിപ്പിക്കരുത്. അധികനേരം മൂല കുടിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ ആമാശയത്തിൽ കൊള്ളാത്തത്ര പാൽ അകത്തു ചെല്ലുന്നതും കുട്ടി ഹർദ്ദിക്കുന്നതുമാണ്.

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശിശുവിനു് നാലുമണിക്കൂറിലൊരിക്കൽ മൂലകൊടുത്താൽ മതിയാകും. രാത്രി പത്തുമണിക്കു ശേഷം രാവിലെ ആറു മണിയാകുന്നതുവരെ മൂല കൊടുക്കുകയുമരുത്. ഒരിക്കൽ മൂല കൊടുത്തിട്ട് നാലുമണിക്കൂറോ കിലും ആകുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടി കറുത്താൽ കുട്ടിയെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന തൂണിയോ, ഷീറോ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്. നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാറി പകരം ഉണങ്ങിയതുപയോഗിക്കുക. തൂണി നനഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പു പാഞ്ഞതുപോലെ ഒരൺസ് ചെറുചുട്ടവെള്ളമാണ് കുട്ടിക്കു കൊടുക്കേണ്ടതു്. കുട്ടികൾ കരയുന്നതു് വിശന്നിട്ടാണെന്നും, മൂലകുടിക്കാണെന്നും മറ്റുമുള്ള ധാരണകൾ ശരിയല്ല. മൂലകൊടുക്കേണ്ടതു് ഇങ്ങനുകൊണ്ടായിരിക്കണം.



ചിത്രം 130

ഇരുനകൊണ്ട് മുലകൊടുക്കേണ്ട രീതി

ചിത്രത്തിൽ കണന്നതുപോലെ ഒരു കാൽ അല്പം പൊക്കിവച്ചുവേണം മുലകൊടുക്കുവാൻ. മുല കുടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസംമുട്ടാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുല വിരൽകൊണ്ട് അല്പം അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊടുക്കണം. മുല കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും മുലകൾ കഴുകി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം.

ശിശുവിന് നല്ല ഉറക്കമുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന്റെ രൂക്ഷം ക്രമമായി വർദ്ധിക്കുകയും ക്രമമായി മലശോധനയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം മുലകൊടുക്കുന്ന ക്രമം ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. മറിച്ചാണെങ്കിൽ നന്മെങ്കിൽ ആദ്യമായി മുലകൊടുക്കൽ ക്രമം ശരിപ്പെടുത്തുകയാണു വേണ്ടതു്.

ശിശു ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് മുല കുടിച്ചാൽ വയറുവദന നിമിത്തം എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ദഹിക്കാത്ത പാല്ല്യത്തോടുകൂടിയ മലമിളകിപ്പോകുന്നതും, ഛർദ്ദി ഉണ്ടാകുന്നതും തുക്കം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം തുക്കക്കുറവും, ക്ഷീണം, പച്ചനിറത്തിലുള്ള അതിസാരം, കുടിക്കുന്ന പാൽ ദഹിക്കാതെ തൈരുപോലുള്ള ഛർദ്ദി മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങും. മേൽ വിവരിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ മറ്റു പ്രത്യേകകാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി അത് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമതിയായ മിഡ്‌വൈഫിന്റേയും, മാതാവിന്റേയും ചുമതല.

ഇതുപോലെതന്നെ ആവശ്യത്തിനു പാൽ ലഭിക്കാതെ വന്നാലും ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ അതു സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനു പാൽ ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കുറയുന്നു. വയർ ഒട്ടുകയും, മലബന്ധം ഉണ്ടാകുകയും, മലം ഉറച്ചും ഉണങ്ങി വരണ്ട രീതിയിലും പോകുകയും ചെയ്യും. തുടന്ന് പച്ചനിറത്തിലുള്ള അതിസാരമുണ്ടാവുകയും തുക്കം കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നു.

മുലയിൽ പാൽ കുറവായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര പാൽ ലഭിക്കാതെ വരുന്നത്. മുലയിൽ പാൽ കുറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്.

മാതാവിനോ, ശിശുവിനോ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുക. പ്രത്യേതിച്ച് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും

മുലയിൽ പാൽ കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം മുല കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാതാവ് ഓരോ ഗ്ലാസ്സ് നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുക. രണ്ടു മുലകളും ചുടുവെള്ളംകൊണ്ടും, പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടും മാറി മാറി അയ്യഞ്ചു മിനിട്ടു നേരത്തേയ്ക്ക് ധാരകോരുക. ദിവസേന ഈ ധാര രണ്ടു പ്രാവശ്യം വീതം ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും മുലകളുടെ മേൽഭാഗത്തു നിന്നും മുലത്തെട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പത്തു മിനിട്ടു നേരം മെല്ലെ ഉഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓരോ പ്രാവശ്യം മുലകൊടുക്കുമ്പോഴും അയ്യഞ്ചു മിനിട്ടുനേരത്തേയ്ക്ക് രണ്ടു മുലകളും മാറി മാറി കുടിപ്പിക്കുക. മുലകൾക്കു ഇത്രയും സംരക്ഷണം നൽകുന്നപക്ഷം ധാരാളം പാൽ മുലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടാകാത്തപക്ഷം മാത്രം ഡാക്ടറെ കാണുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകും.

മുലകുടി മാറ്റൽ (വീനിംഗ്—WEANING)

പത്തുമാസം പ്രായമാകുന്നതോടുകൂടി മുലകുടി ക്രമേണ നിർത്തേണ്ടതാകുന്നു. മുലകൊടുക്കുന്നതിന്റെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു ക്രമേണ ഒന്നൊന്നര മാസംകൊണ്ടു മുലകുടി നിർത്താവൂ. പെട്ടെന്ന് മുലകുടി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും, ചെന്നിനായകം അരച്ചുപുരട്ടിപ്പോലും കുട്ടി മുലകുടിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നത്. കുട്ടി കരയുമ്പോഴൊക്കെ മുല വായിൽ വച്ചുകൊടുത്തു ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ മുലകുടി മാറ്റാനാണ് കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നേരത്തേരന്നെ മുല കൊടുക്കേണ്ട ക്രമം കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുള്ളവക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മുലകൊടി മാറ്റാനും പ്രയാസം നേ

രിടുന്നതല്ല. പെട്ടെന്നു മലകുടി നിർത്തിയാൽ മലകൾക്കു വീക്കവും, വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പെട്ടന്നു് ഒരു ദിവസം മലകൊടി പൂണ്ണമായും നിർത്തി കുട്ടിക്കു മറ്റു ഭക്ഷണം കൊടുത്തുതുടങ്ങിയാൽ അതിനു് ദഹനക്കേടും മറ്റസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ക്രമേണ മല കുടിപ്പിക്കുന്ന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുകയും, മലകൊടുക്കുവോൾ കുറേശ്ശെ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടു് ഇടസമയങ്ങളിൽ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു ശീലിപ്പിക്കുകയുമാണു് വേണ്ടതു്.

രണ്ടു തരം മാതാക്കളെയാണു് ഇക്കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നതു്. വിദ്യാഭ്യാസവും, പരിഷ്കാരവുമൊക്കെയുണ്ടെന്നഭിമാനിക്കുന്ന അഭ്യസ്ഥവിദ്യകളായ മാതാക്കൾ; ഇക്കൂട്ടർ മലകൊടുക്കാതിരിക്കുകയും, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഗ്രാമീണസ്ത്രീകൾ അഞ്ചുമാറും വയസ്സുവരെ മലകൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥാവിശേഷമാണിന്നുള്ളതു്. ഈ രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒരുപോലെ തെറ്റും, ശിക്ഷാർഹവുമാണു്. 10 മാസം വരെ മലകൊടുക്കുകയും. അതിനുശേഷം ഒരുവയസ്സാകുന്നതിനുള്ളിൽ മലകുടി നിശ്ശേഷം മാറുകയുമാണുവേണ്ടതു്. പരിഷ്കൃതരെന്നോ, അപരിഷ്കൃതരെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസംകൂടാതെ ഈ നിയമം കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണു്. പത്തു മാസം പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി മലപ്പാലിലെ പോഷക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുതുടങ്ങുന്നതാണു്. അതിനാൽ പിന്നീടു മലകുടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് മാതാവിനോ, ശിശുവിനോ പ്രത്യേകിച്ചു ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു തന്നെയല്ല തുടന്നുള്ള മലകുടിപ്പിക്കൽ മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കു ഹാനികരവുമാണു്.

സ്തന്യദാനം പാടില്ല

ചിത്തദ്രുമം, അപസ്താരം, ക്ഷയം, ഹൃദ്രോഗം, അർബുദം എന്നീ രോഗങ്ങൾ മാതാവിനുള്ളിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുത്തുകൂടാ. അപസ്താരം, ചിത്തദ്രുമം എന്നീ രോഗങ്ങളുള്ള മാതാക്കളുടെ സമീപത്തു് ശിശുവിനെ കിടത്താനും പാടില്ല. സിഫിലിസ് എന്ന രോഗബാധയുള്ളതിൽ അതു് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാകുന്നതുവരെ ശിശുവിനു് മുല കൊടുത്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

ഗർഭധാരണത്തിനുശേഷമുള്ള സ്തന്യദാനവും പാടില്ലാത്തതാണു്. ആത്മവദിവസങ്ങളിൽ മുലാകാടുകുന്നതു കൊണ്ടു് അപകടമെന്നുമുണ്ടാകുന്നതല്ല.

കൃത്രിമാഹാരങ്ങൾ


മാതാവിനുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകൊണ്ടോ, മുലയിൽ പാൽ തീരെ ഇല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടോ ശിശുവിന് മറ്റു തരം പാൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിവരും. മുലപ്പാലിനു പകരം ഒരു ശിശുവിനു കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പാൽ പശുവിൻപാൽ തന്നെയാണ്. അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി മാംസ്യം (Protein) പശുവിൻപാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പശുവിൻപാൽ അതേപടി ദഹിപ്പിക്കുവാൻ ശിശുവിന്റെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അതിൽ മൂന്നിരട്ടി തിളച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് അരിച്ചുവേണം കൊടുക്കുവാൻ.

ശിശുവിന്റെ ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും, ദഹനശക്തിക്കും കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യസമയങ്ങളിൽ മാത്രം പാൽ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. കുട്ടി കറയുമ്പോഴൊക്കെ മുലക്കുപ്പി പിടിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

ഒരു ശിശു പിറന്നാലുടനെ അതിന്റെ ആമാശയത്തിന് ഒരുൺസു കൊള്ളാനുള്ള വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. രണ്ടാഴ്ചകഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടൺസും, മൂന്നു മാസം പ്രായമായാൽ 5 ഓൺസും ആറാംമാസത്തിൽ 7 ഓൺസും ഒരു വയസ്സുകമ്പോഴേയ്ക്ക് 9 ഓൺസും കൊള്ളുന്നതിനുള്ള വലിപ്പമേ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. പ്രായാനുസരണം ശിശുവിന്റെ വയറിൽ കൊള്ളുന്നതിലപ്പുറം പാലോ മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടം എന്തായിരിക്കുമെന്നുഹിക്കാമല്ലോ.

മുലക്കുപ്പികൾ:-

പശുവിൻപാൽ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാലു കൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി രണ്ടുമുലക്കുപ്പികളും നിപ്പികളും ആവശ്യമാണ്. മുലക്കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചൂടുള്ള കാരവെള്ളത്തിൽ കഴുകണം.



ചിത്രം 131: മുലക്കുപ്പി

കുപ്പിയുടെ അകം അനുയോജ്യമായ ഒരു ബ്രഷുകൊണ്ട് ഉരസി കഴുകിയതിനുശേഷം വീണ്ടും പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോപ്രാവശ്യം പാൽ കൊടുത്തുകഴിയുമ്പോഴും മുലക്കുപ്പി നല്ലവണ്ണം കഴുകി

പച്ചവെള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കണം. കുപ്പികൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മുൻപാഞ്ഞ തുപോലെ കാരവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

നിപ്പിറ:-

പുതിയ നിപ്പിറ അല്പം ഉപ്പുതേച്ചു പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി, വീണ്ടും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായികഴുകി മൂടിവെച്ചുകൊള്ളണം. ഓരോപ്രാവശ്യം പാൽ കൊടുത്തുകഴിയുമ്പോഴും നിപ്പിറ ഊരി ഉപ്പുതേച്ചു കഴുകി മൂടിവെക്കേണ്ടതാണ്. ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതു് ചൂടുവെള്ളമൊഴിച്ചു് കഴുകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നിപ്പിളിന്റെ ദ്വാരത്തിനു് വലിപ്പം കുടിയായാൽ പാൽ കൂടുതലായി വന്നു് കുട്ടിക്കു് ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും, ദ്വാരത്തിനെ ചെറുതായിപ്പോയാൽ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ കുട്ടിക്കു് പ്രയാസം നേരിടുന്നതിനും ഇടയായിത്തീരുന്നതാണ്. ശിശുവിനു കൊടുക്കേണ്ട പാലിന്റെചൂടു് 100 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു തുള്ളി പാൽ പുറം കയ്യിൽ ഇറ്റിച്ചാൽ ചൂടനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിന്റെ ചൂടു് പാകമാണെന്നു തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽതിളപ്പിച്ചപാൽ വീണ്ടുംതിളപ്പിച്ചുകൂടാ. ചൂടു പോരെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പാൽ മുലക്കുപ്പിയിലാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുപ്പി അല്പനേരം വച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും.

പ്രായാസസരണം ശിശുവിനു് ഓരോപ്രാവശ്യവും കൊടുക്കേണ്ട പാലിന്റെയും മറ്റു ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെയും അളവുകളും സമയക്രമങ്ങളും

നോം.ടി.വസം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ശിശുക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം നൽകേണ്ട ഭക്ഷണവിവരപ്പട്ടിക

പ്രായം	ശിശുവിന്റെ തൂക്കം (കിലോഗ്രാം)	പശുവിൻപാൽ A (മില്ലി ലിറ്റർ)	പാലിൽ ചേർക്കേണ്ട തീളച്ച വെള്ളം (മില്ലി ലിറ്റർ)	പഞ്ചസാര (ഗ്രാം)	പ്രതിദിനം ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട തവണ	ഒരുതവണ കൊടുക്കേണ്ട അളവ്	പഴച്ചാറുകൾ B (മില്ലി ലിറ്റർ)	മീനണ്ണ (Shark liver oil) B (റീസ്പൂൺ)	പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും മാംസളഭാഗം (ഗ്രാം) D	ധാന്യപ്പൊടികൾ E (ഗ്രാം)
ടി.വസം 3-5	2-3	30 ML (1 ഓൺ)	90 ML (3 ഓൺ)		5	30 ML (1 ഓൺ)				
7-13		45 ML (1½ ഓൺ)	120 ML (4 ഓൺ)		5	30 ML (1 ഓൺ)				
14-20		60 ML (2 ഓൺ)	150 ML (5 ഓൺ)		5	45 ML (1½ ഓൺ)				
21-30		75 ML (2½ ഓൺ)	180 ML (6 ഓൺ)		6	60 ML (2 ഓൺ)				

മാസം 1	3.0	300 ML (10 ഓ)	150 ML (5 ഓ)	15 G ($\frac{1}{2}$ ഓ)	6	75 ML (2 $\frac{1}{2}$ ഓ)	30 ML (1 ഓ)	$\frac{1}{2}$ റീ സ്റ്റം		
2	3.5	360 ML (12 ഓ)	180 ML (6 ഓ)	15 G ($\frac{1}{2}$ ഓ)	6	90 ML (3 ഓ)	30 ML (1 ഓ)	$\frac{1}{2}$ റീ സ്റ്റം		
3	4.0	420 ML (14 ഓ)	210 ML (7 ഓ)	22 $\frac{1}{2}$ G ($\frac{3}{4}$ ഓ)	6	105 ML (3 $\frac{1}{2}$ ഓ)	30 ML (1 ഓ)	$\frac{1}{2}$ റീ സ്റ്റം		
4-5	4.5-5	480- 540 ML (16-18)	240 ML 8 ഓ)	30 G (1 ഓ)	5	120 ML (4 ഓ)	45 ML (1 $\frac{1}{2}$ ഓ)	$\frac{1}{2}$ റീ സ്റ്റം		
6-7	5.5-6	600- 660 ML (20-22)	240 ML (8 ഓ)	37 $\frac{1}{2}$ G (1 $\frac{1}{4}$ ഓ)	5	135 ML (4 $\frac{1}{2}$ ഓ)	60 ML (2 ഓ)	$\frac{3}{4}$ റീ സ്റ്റം	15 ഗ്രാം ($\frac{1}{2}$ ഓ)	
8-9	6.5-7	720 ML (24 ഓ)	240 ML (8 ഓ)	45 G ($\frac{1}{2}$ ഓ)	5	150 ML (5 ഓ)	60 ML (2 ഓ)	1 റീ സ്റ്റം	30 ഗ്രാം (1 ഓ)	15 ഗ്രാം ($\frac{1}{2}$ ഓ)
10-11	7.5-8	780 ML (26 ഓ)	240 ML (8 ഓ)	52 $\frac{1}{2}$ G (1 $\frac{3}{4}$ ഓ)	5	180 ML (6 ഓ)	90 ML (3 ഓ)	1 റീ സ്റ്റം	45 ഗ്രാം (1 $\frac{1}{2}$ ഓ)	30 ഗ്രാം (1 ഓ)
12	8.5	840 ML (28 ഓ)	240 ML (8 ഓ)	60 G (2 ഓ)	5	210 ML (7 ഓ)	90 ML (3 ഓ)	1 റീ സ്റ്റം	45 ഗ്രാം (1 $\frac{1}{2}$ ഓ)	45 ഗ്രാം (1 $\frac{1}{2}$ ഓ)

- A മുലകുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, പശുവിൻപാൽ രണ്ടോ മൂന്നോതവണയിൽക്കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത്. മുലപ്പാൽ ആവശ്യത്തിനല്ലെങ്കിൽ അതു മാത്രം മതിയാകും.
- B ഓറഞ്ച്, തക്കാളി എന്നിവയുടെ നീര് വിറ്റാമിൻ 'സി' ലഭിക്കുന്നതിനും നല്ലമലശ്ശോധനയുണ്ടാകാനും സഹായിക്കുന്നു.
- C മീനെയ്ക്കു വിറ്റാമിൻ 'എ' യും, 'ഡി' യും നൽകുന്നു.
- D നേത്രപ്പഴം, മാമ്പഴം, പപ്പായ (കർമൂസ്) എന്നിവയുടെ മാംസളഭാഗങ്ങളും, വേവിച്ച ഇളം പച്ചക്കറികളും ആരോഗ്യ മാസമാകുമ്പോൾ മുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം.
- E 8-ാം മാസം മുതൽ ധാന്യപ്പൊടികളും, റൊട്ടിയും, പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കുറുകിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പട്ടികപ്രകാരം ഓരോപ്രാവശ്യവും കൊടുക്കേണ്ട പാലിന്റെ അളവും പാലിൽ ചേർക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുക. പാലും വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുകയോ തിളച്ചവെള്ളത്തിൽ പാൽ ചേർക്കുകയോ ആവാം. പാലും വെള്ളവും ചേർത്തതിൽനിന്നാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൊടുക്കേണ്ട അളവ് എടുക്കേണ്ടത്. രാവിലെ 6 മണിക്കും 10 മണിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും രാത്രി 10 മണിക്കുമായി ഒരു ദിവസം അഞ്ചുപ്രാവശ്യം ശിശുക്കൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കണം. നാലാം മാസം മുതൽ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെയോ അഥവാ അല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പശുവിൻ പാലിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പാൽ തിളപ്പിക്കുന്നത്. പാലുകാച്ചുമ്പോൾ അതിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും വേഗം തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. തിളപ്പിച്ചപാൽ ചൂടുതട്ടാത്തസ്ഥലത്തുവേണം സൂക്ഷിക്കുവാൻ. പാലിന്റെ ചൂടാറാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അത് അടുപ്പിനുസമീപം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

ശിശുരോഗങ്ങൾ

കണ്ണു പഴുപ്പ് (OTHTHALMIA NEONATUS):-

പ്രസവസമയത്തു് ശിശുശിരസ്സു് യോനീമാഗ്ഗമായി കടന്നുവരുമ്പോൾ, മാതാവിനു് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗാണുബാധമൂലം യോനീസ്രാവമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത സ്രവണം ശിശുവിന്റെ കണ്ണിൽ പാറുന്നതിനാലാണു് ഈ രോഗമുണ്ടാകുന്നതു്. ഈ രോഗബാധമൂലം അനേകം ശിശുക്കളുടെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

ലക്ഷണങ്ങൾ:-

പ്രസവശേഷം 48 മണിക്കൂറിനു ശേഷം ശിശുവിന്റെ കൺപോളകൾ വീങ്ങിവരികയും കണ്ണിൽ പഴുപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൺപോളകളുടെ വീക്കം നിമിത്തം ശിശുവിനു് കണ്ണു തുറക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയും വരുന്നു.

പ്രതിവിധി:-

പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെ ശിശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ ബോറിക് ലോഷൻകൊണ്ടുകഴുകി സിൽവർ നൈട്രേറ്റു്

സൊല്യൂഷൻ (Silver Nitrate Solution 2 %) കണ്ണിൽ ഇറിച്ചാൽ ഈ രോഗത്തിൽനിന്നും ശിശുക്കളെ രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രസവശേഷം ശിശുവിന്റെ കണ്ണിന് ഈ രീതിയിലുള്ള പരിചരണം നല്കാൻ ഓരോ മിഡ് വൈഫും ബാധ്യസ്ഥയാണ്.

ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ബോറിക് ലോഷൻ കൊണ്ട് കണ്ണു കഴുകുകയും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി വീതം കണ്ണിൽ ഇറിക്കുകയും ചെയ്താൽ മിക്കവാറും ഈ രോഗം ഭേദമാകും. കണ്ണുപഴുപ്പ് ഗുരുതരമായി തോന്നുന്നപക്ഷം ഡാക്ടറു കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ രോഗം പകരുന്നതായതിനാൽ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾ കഴുകിയതിനു ശേഷം, മിഡ് വൈഫ് തന്റെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകി കുറെനേരത്തേയ്ക്ക് ബോറിക് ലോഷനിൽ മുക്കിവയ്ക്കണം. കുട്ടിയുടെ ഒരു കണ്ണിൽ മാത്രമേ പഴുപ്പു ബാധിച്ചിട്ടുള്ള എങ്കിൽ കുട്ടിയെ ആ വശത്തേയ്ക്ക് ചരിച്ചു കിടത്തണം. എന്നാൽ മറേക്കണ്ണിൽ പകരാതെ സൂക്ഷിക്കാം. രണ്ടു കണ്ണുകളും ബോറിക് ലോഷൻകൊണ്ട് കഴുകേണ്ടതും രോഗബാധയുള്ള കണ്ണിൽ മാത്രം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതുമാണ്.

ജന്മനാലുള്ള പാക്കിപ്പിണ് :-

(CONGENITAL SYPHILIS)

ജനിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പ്രകടമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയും, ഏതാണ്ട് ഒരുമാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മാത്രം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്ന രീതിയിലും ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ശിശു വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു മെലിഞ്ഞും, തൊലി ഞൊറിഞ്ഞു തുങ്ങിയ വിധത്തിലും ആയിരിക്കുക, കടവായ് പഴുത്തും, മലദ്വാരത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള തൊലി വിണ്ടു കീറിയവിധത്തിലുമിരിക്കുക, ചെമ്പു നിറത്തിലുള്ള ചിരണ്ടുകൾ ശരീരമാസകലം വ്യാപിക്കുക, കൈകാലുകളുടെ സന്ധികളിൽ നീരുണ്ടായിരിക്കുക, മഞ്ഞപ്പിത്തരോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കുക, കണ്ണിൽനിന്നും മൂക്കിൽനിന്നും വെള്ളമൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മുതലായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ജന്മനാലുള്ള സിഫിലിസ് രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകലക്ഷണങ്ങൾ.

പ്രതിവിധി:-

ഡാക്ടറെ കാണിച്ചു ഏറ്റവും വേഗം ചികിത്സയാരംഭിക്കുക. സിഫിലിസ് രോഗം പകരുന്ന ഒന്നായതിനാൽ മറ്റു സ്ത്രീകൾ രോഗബാധയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുല കൊടുക്കുകയോ, എടുത്തു താലോലിക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ. ശിശുവിനെ പരിചരിക്കുന്ന മിഡ്‌വൈഫിനു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വായ്പുണ്ണ് (THRUSH):-

ശിശുവിന്റെ നാക്കിലും വായിലും അണ്ണാക്കിലും വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ വെളുത്തും അരികു ചുവന്നും വ്രണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ. വായ്പുണ്ണിന്റെ വേദന നിമിത്തം ചിലപ്പോൾ മുല വലിച്ചു കുടിക്കുവാൻ കുട്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നതാണ്. അതിസാരവും കണ്ടെന്നു വരാം. മുല കുണ്ണുകൾ കഴുകാതെ മുല കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും, മുല കുപ്പിയിൽ പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിപ്പിൾ ശരിയായി വൃത്തിയാക്കാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ രോഗമുണ്ടാകുന്നത്.

പ്രതിവിധി:-

രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. അതിനു പാൽ കൊടുക്കേണ്ട ക്രമങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. ബോറക്സ് (Borax) ഗ്ലിസറിനിൽ ചേർത്തു പുരട്ടുക. ശമനം കാണാത്തപക്ഷം ഡാക്ടറെ കൺസൾട്ട് പ്രത്യേകചികിത്സ ചെയ്യണം.

പൊക്കിൾക്കൊടി പഴുക്കുക (UMBILICAL SEPSIS):-

ഉണങ്ങിയിരിക്കേണ്ട പൊക്കിൾക്കൊടിക്കു നനവുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിൽനിന്നും ദുഗ്ഗന്ധമുള്ള ഒരുതരം വാച്ചുയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടന്ന് പൊക്കിളിനു ചുറ്റും നീരുണ്ടാകുകയും പൊക്കിൾ പഴുക്കുകയും അതിൽനിന്നും രക്തം വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രസവശേഷം പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ അഴുക്കു പറ്റിയിരിക്കാനിടയാകുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രസവശേഷം പൊക്കിൾക്കൊടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയെന്നു ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി മിഡ്വൈഫ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് ഈ അപകടത്തിനു കാരണം. പൊക്കിൾക്കൊടി പഴുത്താലുടനെ ഡാക്ടറെക്കൊണ്ടു് ചികിത്സിപ്പിക്കുക.

പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽനിന്നും രക്തവാർച്ച:-

(UMBILICAL HAEMORRHAGE)

പൊക്കിൾക്കൊടി പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിനു മുമ്പോ അതിനു ശേഷമോ രക്തവാർച്ചയുണ്ടാകാവുന്നതാണ്.

പൊക്കിൾക്കൊടി പൊഴിയുന്നതിനു മുമ്പാണ് രക്തം പോകുന്നതെങ്കിൽ അതു വീണ്ടും കെട്ടേണ്ടതാണ്.

പൊഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് രക്തവാർച്ചയുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, ശിശുവിന് സിഫിലിസ്, രക്തദോഷരോഗങ്ങൾ, പഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതും അതിനാൽ ഉടനേതന്നെ ഡാക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്. പൊക്കിളിൽനിന്നു രക്തം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക, കഠിനമായ പിത്തരോഗലക്ഷണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക, ദേഹത്തിൽ അവിടവിടെയായി ചുവപ്പു നിറമുണ്ടായിരിക്കുക, കാൽ പാദങ്ങളിൽ നീരുണ്ടായിരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോധക്ഷയമുണ്ടാകുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കട്ടി മരിച്ചുപോകുന്നതുമാണ്.

ടെറ്റനസ് (TETANUS):—

വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണിതെങ്കിലും, ശിശുവിന്റെ ജീവൻതന്നെ അപകടപ്പെടുവാൻ ഇടയുള്ള ഒരു രോഗമാണിത്. പൊക്കിൾക്കൊടി വഴി ടെറ്റനസ് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതിനാലാണ് മാരകമായ ഈ രോഗമുണ്ടാകുന്നത്.

ശിശുവിന് പാലോ, വെള്ളമോ ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും തുടന്ന് അപസ്മാരലക്ഷണങ്ങളും (Fits), വായ് തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥ (Lock jaw) യും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടാലുടനെ ശിശുവിനെ അടുത്തൊരാൾപ്രതിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കയല്ലാതെ മിഡ്‌വൈഫിന് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല.

അതിസാരം (INFANTILE DIARRHOEA):-

പശുവിൻ പാൽ കൊടുത്തുവളർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ രോഗബാധ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. മാതാവിന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചുവളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. വേനല്ലാലത്താണ് ഈ ബാലാതിസാരം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. പാൽ ചീത്തയാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതു വേനല്ലാലത്താകയാലാണ് ഈ രോഗബാധയും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.

പച്ചനിറത്തിൽ കൂടുകൂടെ വയറിളക്കുക, വയറിൽ വേദനയും, ഛർദ്ദിയുമുണ്ടായിരിക്കുക, വിസർജ്ജനത്തിന് ദുഗ്ന്ധമുണ്ടായിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ. ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ ശിശുവിനു വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണവും മെലിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഉച്ചി (Fontanelle) താന്നു വരുന്നത് അപകടസൂചനയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മിക്കവാറും ശിശു മരിച്ചുപോകുന്നതുമാണ്.

പ്രതിവിധി:-

ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറെ കാണിക്കുക.

വയറിൽ വേദന (COLIC):-

വേദന നിമിത്തം കുട്ടി പുളഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പാൽ ദഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടും, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പാൽ കൂടുകൂടെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത്.

പ്രതിവിധി:-

ശിശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പാലിന്റെ അളവു കുറയ്ക്കുകയും പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഡാക്ടറെ കാണിച്ച ചികിത്സിപ്പിക്കുകയും വേണം.

മുദ്ദി (VOMITING):-

ശിശുവിന് പാൽ കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുദ്ദിക്കും കാരണമായിത്തീരുന്നത്. പാൽ അധികം കുടിച്ച് വയർ വീർന്നതുകൊണ്ടും പാൽ വളരെവേഗം വലിച്ചുകുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, പാലിൽ കൊഴുപ്പു കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുമാണ് ശിശുക്കൾ മുദ്ദിക്കാനിടയാകുന്നത്. പാൽ കൊടുക്കേണ്ട ക്രമം ശരിക്കും പാലിക്കുന്നപക്ഷം മുദ്ദിതാനേ മാറുന്നതാണ്. പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടും മുദ്ദി മാറാതെ തുടരുന്നപക്ഷം ഡാക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

മലബന്ധം (CONSTIPATION):-

മുലപ്പാൽ കുടിക്കാതെ മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ പാലോ കൊടുത്തുവളർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് മലബന്ധം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. മുല കുടിച്ചുവളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാകാറില്ല. കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം പോരാത്തതുകൊണ്ടാണ് മലബന്ധമുണ്ടാകുന്നത്. മുല കുടിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മലബന്ധമുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം മാതാവിന് മലബന്ധമുള്ളതാണ്. മാതാവ് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശിശുവിന്റെ മലബന്ധവും മാറിക്കൊള്ളും. കൃത്രിമമാഹാരം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് മലബന്ധമുണ്ടാകുന്നതെ

കിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുചേർക്കണം. ശിശുക്കളുടെ മലബന്ധം താല്പാലികമായി മാറുന്നതിനു് ഏതാനും തുള്ളി ശുദ്ധമായ ആവണക്കെണ്ണയോ, അര റീസ് പുൺ ഒലിവെണ്ണയോ (Olive oil) കൊടുത്താൽ മതിയാകും.

മലത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടൽ

(MELAENA NEONATUS):-

ശിശുവിന്റെ മലം കറുത്തതാണെങ്കിൽ അതിൽ രക്തം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുമാനിക്കാം. മാതാവിന്റെ മുലക്കണ്ണുകൾക്ക് പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി മുല കുടിക്കുമ്പോൾ രക്തം അതിന്റെ വയറിനിലേയ്ക്ക് ചെല്ലാനിടയാകുന്നതിനാലാണു് സാധാരണയായി ശിശുക്കളുടെ മലത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്നതു്. എന്നാൽ മാതാവിന്റെ മുലക്കണ്ണുകൾക്ക് പഴുപ്പില്ലാതിരിക്കയും കുട്ടി വിളിയും ക്ഷീണിച്ചും ഇരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തം അതിന്റെ കടലിൽനിന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. കടലിൽനിന്നുള്ള രക്തമാണെങ്കിൽ അതിനു മിക്കവാറും ചുവപ്പുനിറമുണ്ടായിരിക്കും. മാതാവിന്റെ മുലയ്ക്ക് പഴുപ്പില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മലത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്നതു് നല്ല ലക്ഷണമല്ല. അതിനാൽ ഉടനെ ഡാക്ടറെ കാണിച്ചു് ചികിത്സിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്.

മലദ്വാരത്തിനു ചുറ്റും തൊലി പോവുക

(SORE BUTTOCK):-

മലമുത്രവിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ ശിശു കരയുന്ന പക്ഷം മലദ്വാരം പരിശോധിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണു്. മലദ്വാരത്തിനു ചുറ്റും ചുവന്നിരിക്കുകയും അവിടം വ്രണപ്പെ

ട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതിനു ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്.

നനഞ്ഞതും അഴുക്കുള്ളതുമായ തുണികൾക്കുമീതെ ശിശുവിനെ കിടത്തുക, കാരവെള്ളത്തിൽ അലക്കിയ തുണികളുപയോഗിക്കുക, പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഒഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക, ജന്മനാ സിഫിലിസ് രോഗമുണ്ടായിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് മലദ്വാരത്തിനുചുറ്റും ചുവപ്പും വ്രണങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത്.

പ്രതിവിധി:— മലവിസർജ്ജനത്തിനുമുമ്പ് കഴിയുമെങ്കിൽ അല്പം വാസ്‌ലൈനോ ഒലിവെണ്ണയോ മലദ്വാരത്തിനുചുറ്റും പുരട്ടുക. മലശോധനയ്ക്കുശേഷം കഴുകിത്തുടച്ച് അല്പം ബോറിക്ക് ഓയിൻ്റ്‌മെന്റോ (Boric ointment), സിങ്ക് ഓയിൻ്റ്‌മെന്റോ (Zinc ointment) എടുത്ത് അല്പം ആവണക്കണ്ണയും ചേർത്ത് പുരട്ടുക. ജന്മനാ സിഫിലിസ് രോഗമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മറ്റു ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണ്.

മൂത്രതടസ്സം (RETENTION OF URINE):—

നവജാതശിശുക്കളിൽ ചിലതിനു മൂത്രദ്വാരമില്ലാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ലിംഗചർമ്മം ഇറുകി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, മൂത്രദ്വാരത്തിൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മൂത്രതടസ്സമുണ്ടാകാവുന്നതാണ്. മൂത്രം പോകാതെ വന്നാൽ കടവയർ ഭാഗത്തു വീക്കം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്.

പ്രതിവിധി:— മൂത്രദ്വാരമുണ്ടായിരിക്കുകയും, ലിംഗചർമ്മത്തിനു തകരാറൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം മൂത്രദ്വാരം തുടച്ചുവൃത്തിയാക്കി കടവയർ ഭാഗത്തു ചൂടുവയ്ക്കുക. എന്നിട്ടും മൂത്രം പോയില്ലെങ്കിൽ ശിശുവിനെ

നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെക്കുക. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഫലമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഡാക്ടറെ കാണിക്കുക.

മഞ്ഞപ്പിത്തം (JAUNDICE):-

പ്രസവശേഷം മൂന്നാലു ദിവസത്തിനകം മഞ്ഞപ്പിത്തലക്ഷണങ്ങൾ (Physiological Jaundice) ചില ശിശുക്കളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ഇതു ക്രമേണ കുറഞ്ഞു 8-10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിനു മഞ്ഞനിറമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നല്ലാതെ മൂത്രത്തിനു മഞ്ഞനിറമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മഞ്ഞപ്പിത്തം അപകടകാരിയാണ്. യഥാർത്ഥ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെങ്കിൽ ശിശുവിന്റെ മൂത്രത്തിനും കണ്ണിന്റെ വെള്ളഭാഗത്തിനും മഞ്ഞനിറമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും മലത്തിനു കളിമണ്ണിന്റെ നിറമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെങ്കിൽ ചികിത്സിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തിരിച്ചറിയുവാൻ മിഡ് വൈഫിനു കഴിയാതെ വരുന്ന പക്ഷം ഉടനെ ഡാക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ശിശുവിന്റെ മുലകൾക്കു വീക്കം:- (ENGORGED BREAST)

പ്രസവശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ശിശുവിന്റെ മുലകൾ വീങ്ങുകയും ചിലതിൽ അല്പാല്പമായി വെള്ളമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു സ്വയം മാറിക്കൊള്ളും. പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മുലയിൽ തൊടുകയോ അമർത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അങ്ങ

നെ ചെയ്താൽ അവ പഴുക്കുന്നതും പരുവായിത്തീരുന്നതുമാണ്.

യോനിയിൽനിന്നും രക്തംവരിക:-

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെതന്നെ പ്രസവശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ യോനിയിൽക്കൂടി അല്പം രക്തംസ്രവിച്ചേക്കാനിടയുണ്ട്. ഇതിനു പ്രത്യേക ചികിത്സയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയാൽമാത്രം മതിയാകും.

അപസ്സാരം (CONVULSION):-

മാതാവിനു് ഗർഭകാലത്തു് അപസ്സാരരോഗബാധയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടോ, ദഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതും അയോഗ്യവുമായ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ശിശുവിനു് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, മറ്റൊന്തെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി ശക്തിയായ പനി വരുന്നതുകൊണ്ടോ ആണ് കട്ടിക്ക് അപസ്സാരം (കോട്ടു്, ഇളക്കം) ഉണ്ടാകുന്നത്.

പ്രതിവിധി:- ഡാക്ടറുടെ സഹായം ഉടനെ നേടുക. അതിനിടയിൽ സാമാന്യം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുഴുത്തു വരെ കുട്ടിയെ താഴ്ത്തിക്കിടത്തിക്കൊണ്ടു്, നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ തുണി അല്പം പിഴിഞ്ഞു തലയിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുക.

ജന്മനാലുള്ള വൈരൂപ്യങ്ങൾ (CONGENITAL DEFORMITIES)

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശാരീരികഘടനയിലും വളർച്ചയിലും പലവിധത്തിലുള്ള വൈരൂപ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അവയിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന

ചില അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

1. മൂത്രദാരു ഇല്ലാതിരിക്കുക (Imperforate Urethra):— ജന്മനാ ചില കുട്ടികൾക്ക് മൂത്രദാരു രൂപം പ്രാപിക്കാതെയിരിക്കാറുണ്ട്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെ ശിശുവിന് മൂത്രദാരുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതും ഇല്ലെന്നുണ്ടാൽ ഡാക്ടറുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതുമാണ്.

2. ലിംഗചർമ്മം ഇറുകിയിരിക്കുക (Phimosis): ജന്മനാതന്നെ ചില ആൺകുട്ടികളുടെ ലിംഗചർമ്മം വളരെ ഇറുകിയിരിക്കുന്നതാണ്. ശക്തിയായി മുക്കിയാലെ ലിംഗചർമ്മം ഇറുകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൂത്രം പോകാറുള്ളൂ. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശക്തിയായി മുക്കിയാൽ കടലിറക്കം (Hernia) ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി:— കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലിംഗചർമ്മം മേലോട്ടു പിടിക്കണം. ലിംഗചർമ്മം മേലോട്ടു മാറാത്തപക്ഷം ഡാക്ടറെ കാണിച്ച് അതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്.

3. മലദാരു ഇല്ലാതിരിക്കുക (Imperforate Rectum):— ജന്മനാതന്നെ ചില ശിശുക്കൾക്ക് ദലദാരുമില്ലാതെയിരിക്കും. പ്രസവശേഷം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം മലവിസർജനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, മിഡ്വൈഫ് തന്റെ ചെറുവീരലിലെ നഖം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം വീരലിൽ അല്പം വാസ്ലൈൻ പുരട്ടി ശിശുവിന്റെ മലദാരുത്തിലേയ്ക്ക് സാവധാനം കടത്തണം. വീരൽ കടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്.

4. മൂലം പുറത്തേയ്ക്ക് തള്ളിനില്ക്കൽ (Prolapse of the Rectum):- മലദാരുത്തിലൂടെ മൂലം പുറത്തേയ്ക്ക് തള്ളിനില്ക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ അത് അകത്തേയ്ക്ക് തള്ളിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഡാക്ടറെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

5. കടലിറക്കം (Umbilical Hernia):- ശിശുവിന്റെ പൊക്കിരഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡാക്ടറെ കാണിച്ച് പ്രതിവിധി ചെയ്യിക്കണം.



ചിത്രം 132: കടലിറക്കം (Umbilical Hernia).

6. മുച്ചുണ്ടും അണ്ണാക്കുവിള്ളലും (Hare-Lip and Cleft Palate):- മേൽച്ചുണ്ടു് (ചിരി-കിറി) നടുവെ പിളന്നിരിക്കുകയും ചിലരിൽ ഈ വിള്ളൽ മൂക്കിലേയ്ക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അണ്ണാക്കിലും വിള്ളൽ കണ്ടുപരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കൾക്ക് മലകടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പാൽ കോരിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് ഓപ്പറേഷനല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല.

കൂടാതെ കുറുകാലു് (Club Foot), തലയിൽ മുഴക്ക (Meningocele), മുതുകെല്ലിൽ മുഴ (Spina Bifida), തലയിൽ വീക്കം (Caput Succednum), തലയിൽ രക്തം കെട്ടിനിന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന വീക്കം (Cephal Haematoma), മുഖത്തിനു വീക്കം, തലയോട്ടിക്കു് പരുക്കുകളോ മുറിവുകളോ, സന്ധിക്കളിൽ ഉളക്കു്, എല്ലക്കൾക്കു ഒടിവു്, ഞരമ്പുകൾക്കു തകരാറു് തുടങ്ങി അനേകം വൈരൂപ്യങ്ങൾ ജന്മനാലുള്ളവയായും, പ്രസവഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനിവാര്യമായ അപകടങ്ങൾ മൂലവും, ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ മൂലവും ശിശുക്കൾക്കു സംഭവിക്കാറുണ്ടു്.

അതിനാൽ ശിശുജനനത്തിനുശേഷം അതിനെ ആപാദചൂഡം സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു് എന്തെങ്കിലും വൈരൂപ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡാക്ടറെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുവാൻ മററാരെക്കാളും കൂടുതലായി മിഡ്വൈഫ് ബാധ്യസ്ഥയാണു്.

ശ്വാസബന്ധം (ASPHYXIA NEONATUS)

ശ്വാസബന്ധത്തോടുകൂടിയോ ശ്വാസവിമിഷ്യത്തോടുകൂടിയോ ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കളുണ്ടു്. നവജാത ശിശുക്കളിൽ ശ്വാസബന്ധം രണ്ടു വിധത്തിലാണു് കണ്ടുവരുന്നതു്.

A) ശ്വാസബന്ധവും നീലനിറവും (BLUE ASPHYXIA)

പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ മിഡിപ്പണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ശിശുവിന്റെ മുഖത്തു് നീലനിറം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായും അതിനു് ശ്വാസവിമിഷ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. രക്തത്തിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രാണവായു (Oxygen) വിന്റെ കുറവുമൂലമാണു് ശിശുശരീരത്തിൽ വിശിഷ്ടാ മുഖത്തു നീലനിറം വ്യാപിക്കുന്നതു്.

കാരണങ്ങൾ: (1) മറുപിള്ള സമയത്തിനുമുമ്പ് ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ടുപോകുന്നതിനാൽ മാത്രം രക്തവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നു. തന്നി മിത്തം മറുപിള്ളയിൽനിന്നും ശിശുവിനു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രക്തവിതരണത്തിന് തടസ്സം നേരിടുക.

2) ഗർഭാശയത്തിന്റെ ശക്തമായ സങ്കോചം (Tonic contraction of the uterus) മൂലം മറുപിള്ളയ്ക്കു പുറത്തുപോകുന്നതും അതിൽക്കൂടി ശിശുവിലേയ്ക്കുള്ള രക്തവിതരണം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

3) പൊക്കിയുകൊടിയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടുക.

4) ശിശു പൂർണ്ണമായും പിറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശ്വാസിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

5) ശസ്ത്രപ്രയോഗത്താലും മറ്റും തലച്ചോറിലെ ശ്വാസോച്ഛാസ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രം (Respiratory centre) ത്തിന് തകരാറു സംഭവിക്കുക.

B. ശ്വാസബന്ധവും വിളറി വെളുത്ത മുഖവും (WHITE ASPHYXIA):—

ശിശുവിന്റെ മുഖം വിളറി വെളുത്തതും ശ്വാസിക്കുവാനുള്ള യാതൊരുശ്രമവും കൂടാതെയുമിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ശിശുക്കളുടെ മാംസപേശികൾ തളർന്നും, പൊക്കിയു വള്ളിയിലെ മിഡിപ്പ് വളരെ മന്ദഗതിയിലും ആയിരിക്കും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായാൽ പിന്നെ ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ശിശു ശ്വാസോച്ഛാസം ആരംഭിച്ചാൽപോലും അതിടയ്ക്കുനിന്നു പോകുന്നതും കുട്ടി മരിക്കുവാനും മരണപ്പെടുന്നതുമാണ്.

പ്രതിവിധി: കുട്ടി പിറക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അതിന് നീലനിറമുണ്ടായിരിക്കുകയും പൊക്കിൾക്കൊടി സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന (Blue Asphyxia) സാഹചര്യത്തിൽ മിഡ് വൈഫ് താഴെ പറയും പ്രകാരം ചെയ്യുക. കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

1) കുട്ടി പിറക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അതിന് നീലനിറമുണ്ടായിരിക്കുകയും, പൊക്കിൾക്കൊടി സ്പന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന (Blue Asphyxia) സാഹചര്യത്തിൽ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുവാൻ ധൃതിവയ്ക്കരുത്. കുട്ടികൾ യാതൊരുപക്ഷം രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം അതിനെ ഇളക്കിനോക്കുകയും, മൂക്കിലോ വായിലോ വല്ല അഴുക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്യുക.

2) എന്നിട്ടും കരയുകയോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് എക്സ്ട്രാക്ടർ (Mucus Extractor) എന്ന കഴൽ ശിശുവിന്റെ നാസാഭാരത്തിനുള്ളിൽക്കടത്തി മറേ അററത്തുകൂടി മിഡ് വൈഫ് ശ്വാസം വലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്കും വെള്ളവും കഴലിൽക്കടി പുറത്തുപോരുന്നതാണ്. പിന്നീട് പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചു മാറിയതിനുശേഷം മിഡ് വൈഫ് തന്റെ ഇടത്തേക്കയ്യിൽ കുട്ടിയുടെ കാൽ രണ്ടുംകൂടി കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് തലകീഴാക്കിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടു കറച്ചുനേരം നെഞ്ചിൽ മെല്ലെ അമർത്തുക. ശ്വാസകോശങ്ങളിലോ ശ്വാസനാളത്തിലോ കയറിപ്പോയിട്ടുള്ള മൂന്നിരം കഫവും മറ്റും വാൻപൊയ്ക്കാളും. അതിനുശേഷം ഒരു കഷണം നല്ല തൂണിയോ ഗോസോ ചൂണ്ടു വിരലിൽ ചുറ്റി ശിശുവിന്റെ തൊണ്ടയിൽ കടത്തി കഫവും മറ്റും തുടച്ചെടുത്തുകളയുകയും ചെയ്യണം.

3) എന്നിട്ടും ഫലമില്ലെങ്കിൽ ശിശുവിന്റെ പുഷ്പത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നുപ്രാവശ്യം തട്ടുകയോ ചൂടുവെള്ളവും പച്ചവെള്ളവും മാറിമാറി ശരീരത്തിൽ തളിച്ചുനോക്കുകയോ ചെയ്യണം. തലയൊഴിച്ചുള്ളഭാഗം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പച്ചവെള്ളം തളിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കരുത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കുട്ടികരയുകയോ ശ്വാസവാച്ഛാസം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായി കൃത്രിമശ്വാസോച്ഛാസം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക.

കൃത്രിമശ്വാസോച്ഛാസം:-

(ARTIFICIAL RESPIRATION)

മിഡ്‌വൈഫ് ശിശുവിന്റെ തലയ്ക്കുപിന്നിൽനിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൈമുട്ടുകളിൽ പിടിച്ച് ആദ്യം തലയ്ക്കു മീതെ കൊണ്ടുപന്ന് അതിന്റെ വാരിഭാഗത്തേയ്ക്ക് അമർത്തുക. മിന്നിട്ടിൽ ഇരുപതുപ്രാവശ്യംവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിൽ കൂടരുത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മററൊരാളെക്കൊണ്ട് ശിശുവിന്റെ കാലിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ കുറച്ചുസമയം ചെയ്തിട്ടും കുട്ടി കരയുന്നില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി ഈ ക്രിയ ചെയ്യുക. ഇതു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊണ്ടയിൽ വിരലിട്ട് കഫമോ മററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തുകളയുകയും വേണം.

കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് ലഘുവായ ചില മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ട്.

- 1 കുട്ടിയുടെ മൂക്കിലേയ്ക്ക് വണ്ണുകറഞ്ഞ ഒരു റബ്ബർ കത്തിററർ കടത്തി അതിൽക്കൂടെ ഊതുക.

- 2 ശിശുവിനെ മലർത്തി കയ്യിലെടുത്ത് കുനിക്കുകയും നിവർക്കുകയും ചെയ്താൽ വായു ഉള്ളിലേയ്ക്കു കയറുന്നതിനും ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിനും സഹായകമാവുന്നു.
- 3 കുട്ടിയുടെ കാലുകളിൽ പിടിച്ചു് തല കീഴോട്ടാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടു് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ആട്ടിയതിനുശേഷം തല പെട്ടെന്ന് മേല്പോട്ടു പൊക്കിയാൽ കുട്ടി കരഞ്ഞേക്കും.
- 4 ശിശുവിന്റെ നാക്കിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും വിടുകയും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഫലം കിട്ടാറുണ്ടു്.

എല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നപക്ഷം ഓക്സിജൻ (പ്രാണവായു) കൊടുത്തേ മതിയാവൂ. ആശുപത്രികളിലേ അതിനു സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ.

നീലനിറം അധികമാവുമ്പോൾ പൊക്കിയുകൊണ്ടി മുറിച്ചു് അല്പം രക്തം ചോർത്തിക്കളയുന്നതു് ശ്വാസം വീഴുന്നതിനുപകരിക്കാറുണ്ടു്. അഡ്രിനലിൻ (Adrenalin), ലോബെലിൻ (Lobelin) തുടങ്ങിയ ചില ഔഷധങ്ങൾ കുത്തിവച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടി കരഞ്ഞേക്കും. ഡാക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കൂടാതെ മിഡ് വൈഫ് ഔഷധപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു.

അകാലപ്രസവവും ശിശുപരിചരണവും

ഏഴുമാസം പൂർത്തിയായതിനുശേഷം പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുവിന് ജീവനുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എത്ര തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിചരണം നൽകിയാലും 75 ശതമാനം ശിശുക്കളും മരിച്ചുപോകുന്നതായിട്ടാണ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 36 ആഴ്ച പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ശിശുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. എങ്കിലും മാംസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഒരു വയസ്സാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മരണപ്പെടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. മാംസംതികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് അത്യാധുനികങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരാശുപ

ത്രിയിൽ ഇത്തരം ശിശുക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് വലിയ പ്രയാസമില്ല.


മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾക്കും മാസംതികഞ്ഞു പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾക്കും തമ്മിൽ പ്രകടമായ പലവ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു മിഡ് വൈഫ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളിൽ പലർക്കും മാസനിശ്ചയമില്ലാതെ വരാറുണ്ട്. മാസമുറയില്ലാതെ തന്നെ ഗർഭധാരണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഈ നിശ്ചയമില്ലായ്മ പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളുടെ തൂക്കത്തിനും പൊക്കത്തിനും വളരെക്കുറവുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടര കിലോഗ്രാമിൽ (2500 gm) താഴെ ഒരു കിലോഗ്രാം (1000 gm) വരെ തൂക്കവും 46 സെന്റീ മീറ്ററിന് താഴെ 36 സെ: മീ: വരെ പൊക്കവുമുള്ള ശിശുക്കളെല്ലാം മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കണം. മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളുടെ തൊലി ചുവന്നും ചുളുങ്ങി (ഞൊറിഞ്ഞും) യും ഇരിക്കുന്നു. ദേഹമാസകലം രോമങ്ങൾ കണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. നഖങ്ങൾ വിരൽതുമ്പുവരെ വളരാതെയും, ശബ്ദം അടച്ചു മിരിക്കും. വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രം അനങ്ങുന്നതും എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മുല വലിച്ചുകടിക്കാനും സാധിക്കയില്ല.

മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളെ പരിചരിക്കേണ്ടക്രമം:-

ചൂടുള്ള തുണികൊണ്ട് ശിശുവിന്റെ ശരീരമാസകലം നന്നായി തുടച്ചു, വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ഫ്ലാനൽ തുണി

കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചുകിടത്തുക. മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിനാൽ ശിശുവിന്റെ കിടക്കയുടെ അടിയിൽ ഇരുപഗങ്ങളിലും കാൽച്ചവട്ടിലുമായി മൂന്നു നാല് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് (Hot water bag) വച്ചു കൊടുക്കണം.



ചിത്രം 133: CUVETTE.

മാസംതികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കളെക്കിടത്തി ഹോട്ടുവാട്ടർ ബാഗ് വച്ചു സംരക്ഷിക്കേണ്ടവിധം.

കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് മലദ്വാരത്തിൽ തെർമോമീറ്റർ വച്ചു പരിശോധിച്ചു കുറിച്ചുവരുന്നു. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസവശേഷം നാലു മണിക്കൂർ എങ്കിലും കഴിയാതെ ശിശുവിന് പാൽ കൊടുക്കരുത്. മാതാവിന്റെ മുലയിൽ പാൽ ഉണ്ടാ

കുന്നതുവരെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ പാൽ കൊടുക്കണം. പാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മൂന്നു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് രാത്രിയിലും പകലും പാലുകൊത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശിശുവിനു മുല വലിച്ചുകുടിക്കുവാൻ കഴിയാത്തപക്ഷം മുലപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് സമം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺകൊണ്ട് കോരിക്കൊടുക്കണം. കുറെദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ശിശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാവൂ. അതിനു ശുദ്ധവായു വളരെ ആവശ്യമായതിനാൽ അതു ലഭിക്കുന്നതിനു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം കിടത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ തണുപ്പടിക്കാതെ എപ്പോഴും കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയും വേണം.

ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ

മർദ്ദി (MORNING SICKNESS)

ഗർഭധാരണത്തിനുശേഷം ഒന്ന് ഒന്നരമാസം കഴിയു
മ്പോൾ മുതൽ ആരംഭിച്ചു മൂന്ന് മൂന്നര മാസമാകുമ്പോഴേ
ക്കും അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഗർഭകാലമർദ്ദി
സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. ആഹാരം വേണ്ടായ്ക്ക,
ആഹാരസാധനങ്ങൾ പാകംചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഗന്ധം
പിടിക്കുക, മനംമറിച്ചിൽ (മനംപുരട്ടൽ), മർദ്ദി
എന്നിവ പലകും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ അസുഖങ്ങൾ പ്ര
ത്യേകിച്ചു, രാവിലെയുള്ള മർദ്ദി പ്രഥമഗർഭിണികളി
ലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. അണ്ഡാശയങ്ങളി
ലുണ്ടാകുന്ന അന്തഃസ്രവണങ്ങളുടെ (Hormones) വ്യത്യാ
സമാണിതിനു പ്രധാന കാരണം. പ്രത്യേകിച്ചൊരു ചി
കിത്സയും കൂടാതെതന്നെ ഈ ഘട്ടം പല ഗർഭിണികളും
തരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനു മുമ്പു
തന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സ് കടുപ്പംകുറഞ്ഞ ചായ
യും ഒരു കഷണം റൊട്ടിയും കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുറെനേരം
കൂടി കിടന്നാൽ മനംപുരട്ടലിനും മർദ്ദിക്കും ആശ്വാസം
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശരിയായ മലശോധനയുള്ളവർക്ക് ഈ

അസുഖങ്ങൾ താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണ്. ഹർട്ടിയുണ്ടാകുമെന്നു കരുതി ഗർഭിണി ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നു കൂടാ.

മൂന്ന് മൂന്നു മാസമായിട്ടും ഹർട്ടി മാരാതെ ഗുരുതരാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്ന ചില കേസുകളുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഹൈപ്പർ എമിസിസ് ഗ്രാവിഡാരം (Hyper Emesis Gravidarum) എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രസംജ്ഞ.

ചികിത്സ (ട്രീറ്റ്മെന്റ്-TREATMENT)

പരിചരണങ്ങൾകൊണ്ടും സാമാന്യചികിത്സകൾ കൊണ്ടും ഹർട്ടിയും മററസുഖങ്ങളും മാരാത്തപക്ഷം ഗർഭിണിയെ ഹോസ്പിറ്ററലൈസ് (ആശുപത്രിയിൽ ആക്കുക) ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മോർഫിയാ (Morphia $\frac{1}{2}$ Gr.), സോഡിയം ലൂമിനൽ (Sodium Luminal $\frac{1}{2}$ Gr.) എന്നിതിൽ ഏതെങ്കിലും I. M. ആയി കത്തി വയ്ക്കുന്നു.

ഗർഭകാലഹർട്ടിക്ക് സാധാരണയായി താഴെപ്പറയുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് കൊടുത്തുവരുന്നത്.

(1) വിറ്റാമിൻ ബി-6 (Pyridoxin Hydrochloride) കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഓരോ ഗുളികചീതം.

(2) സിറൈ ഓക്സാലസ് (Cerii Oxalas $\frac{1}{2}$ Gr.)

സോഡാ ബൈ കാർബ് (Soda Bi Carb 3 Gr) ഇവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദിവസം 3 നേരംചീതം കൊടുക്കുന്നു.

(3) റിഞ്ച് പർ ജൻഷൻ കോ (Tr. Gentian Co 4 ml)

അക്വാക്ലോറോഫോം (Aqua Chloroform 30 ml) ഈ മിക്ചർ കൂട്ടിയെടുത്ത് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നു.

(4) അവോമിൻ (Avomin)

(5) സീക്വിൽ (Sequil)

ഈ ഗുളികകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ആവശ്യാനുസരണമോ മൂന്നു നേരമോ രോഗാവസ്ഥയുടെ ഗൗരവസ്ഥിതിയനുസരിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സികപിൽ ഇൻജക്ഷൻരൂപത്തിലും ലഭിക്കും. ഇവ കൂടാതെ മറ്റനേകം പേററൻറ് ഔഷധങ്ങളും മോർണിംഗ് സിങ്ക്നെസ്സ് എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടി മാർക്കറ്റിലുണ്ട്.

ചിലപ്പോൾ ഔഷധപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയായാൽ 24 മണിക്കൂർനേരത്തേയ്ക്കു യാതൊരു ആഹാരവും കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടിവേണ്ടതു്. ആഹാരമില്ലാത്തതിനാൽ ഗർഭിണിക്കു ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ സലൈൻ ഗ്ലൂക്കോസ് (Saline Glucose) ഇൻട്രാവീനസ്സ് ഡ്രിപ്പ് ആയി കൊടുക്കുന്നപക്ഷം ക്ഷീണം മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്.

ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഗർഭിണിക്കു കൃത്യമായ മലശോധന ആവശ്യമാണ്. മലശോധനയ്ക്കുവേണ്ടി ഔഷധങ്ങൾ വായിൽക്കൂടി കൊടുക്കരുതു്. സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് എന്നിമാ വയ്ക്കുന്നതാണുത്തമം.

24 മണിക്കൂറിനുശേഷം ആഹാരം കൊടുത്തുതുടങ്ങാവുന്നതാണ്. പാൽ, പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊടുത്തുകൂടാ. പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം ലാക്ടോസ് (Lactose) കൊടുക്കാം.

ചില അപൂർവ്വസന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ പരിചരണങ്ങളെയും ഔഷധപ്രയോഗങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ഛർദ്ദി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതും രോഗിയുടെ നില ആശങ്കാജനകമായി പരിണമിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗർഭം അലസിപ്പിച്ചുകളയാറുണ്ട്.

സാമാന്യപരിചരണങ്ങൾകൊണ്ടൊന്നും തന്റെമേൽ നോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ഛർദ്ദിയും മറ്റും ശമി

കുന്നിപ്പെന്നുകളാൽ അവരെ ഒരാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മിഡ്‌വൈഫിന്റെ കടമ. അതിൽ കവിഞ്ഞാന്നും ചെയ്യുവാൻ മിഡ്‌വൈഫിന് കടമയോ അധികാരമോ ഇല്ല.

മലബന്ധം (കൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ-CONSTIPATION):-

ഗർഭകാലത്തു സാധാരണയായി മലശോധന കുറഞ്ഞുകാണുന്നു. ആഹാരക്രമീകരണംകൊണ്ട് ഇതു മാറുകയാണുത്തമം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സമൃദ്ധിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ മലബന്ധം മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. മലശോധനയ്ക്കുവേണ്ടി മരുന്നുകഴിക്കുന്നതിലും നല്ലതു എന്നിമാ വയ്ക്കുകയാണ്. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും വയറിളക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മരുന്നുകഴിച്ചുകൂടാ.

മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ:-

(ആൽബുമിനൂറിയ-ALBUMINURIA)

മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ആൽബുമിനൂറിയ എന്നു പറയുന്നത്. പ്രഥമ ഗർഭിണികളിലാണ് ഇതു കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും അഞ്ചുശതമാനത്തിലധികം ഗർഭിണികളിൽ ആൽബുമിനൂറിയ എന്ന രോഗം കണ്ടുവരുന്നില്ല. ഏടുമാസം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് സാധാരണയായി ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നത്. ഗർഭിണിയുടെ കൈകാലുകൾ, മുഖം, ഉദരഭാഗം, യോനീമുഖം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നീരുണ്ടായി വീങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാകുന്ന നീരിൻ (Oedema) ആൽബുമിനൂറിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥ മാത്രമല്ല കാരണമായിട്ടുള്ളതു്. ഗർഭാശയം, ഉപസ്ഥാശയത്തിലുള്ള രക്തധമനികളിൽ അമ്നിരികുന്നതുകൊണ്ടും, ഏട്‌രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നീരു് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്.

പ്രതിവിധി:- മൂത്രം പരിശോധിച്ചു ആൽബിമിൻ അധികമുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ ഡാക്ടറെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചികിത്സിക്കുക. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള നീരും മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളും വിശ്രമംകൊണ്ടു മാറുന്നതാണ്. കാൽപാദങ്ങളിലും മറ്റും നീരുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചു മാറസുഖങ്ങളാണു മില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഗർഭിണികൾ കാര്യമായ വിശ്രമമെടുക്കാതെ നിരന്തരമായി വീട്ടുജോലികളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ് പതിവു. ഈ സമ്പ്രദായം നല്ലതല്ലെന്നും എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമാക്കിടന്നു വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗർഭിണികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് മിഡ്‌വൈഫിന്റെ ചുമതലയാണ്.

നല്ല ശോധനയുണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി ആൽബാമിക്ലച്ചർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

Mist Alba

Mag Sulph	1 oz (28 gm.)
Mag Carb	30 grs. (18.00 gm)
Spt Mentha Pip	1 m. (1 drop)
Aqua ad	3 oz (90 ml)

ഈ മിക്ലച്ചർ ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. അത്യാവശ്യസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതു സമയത്തും ഇതു കഴിക്കാവുന്നതാണ്.


മാംസ്യങ്ങൾ (പ്രോട്ടീൻസ്—Proteins), കൊഴുപ്പുകൾ (ഫാറ്റസ്—Fats) എന്നിവ വർദ്ധിക്കേണ്ടതും അനുജാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുകയും വേണം. നീരു് അധികമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാർലിവെള്ളം തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കണം. എന്നാൽ നീരു ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരികയും അതു നിലനില്ക്കുകയുമാണു് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം കൊടുക്കരുതു്. ഉപ്പു് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ആൽബിമിനൂറിയ വളരെ ഗുരുതരമായൊരവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്ന ചില അപൂർവ്വസന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവളുടെ ഗർഭാവസ്ഥതന്നെ ചിലപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകളയുന്നു.

സിരാവീക്കം:-

(വെരിക്കോസു് വെയിൻ-VERICLOSE VEIN)

ഗർഭകാലത്തു ഗുഹ്യപ്രദേശത്തും, മലദ്വാരത്തിനുമുറ്റം, കാലിലും മറ്റുമുള്ള രക്തസിരകൾ വീങ്ങി തടിക്കാറുണ്ട്.



ചിത്രം 134: ഗുഹ്യഭാഗത്തുള്ള രക്തസിരകൾ വീങ്ങി തടിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പ്രതിവിധി:- ഗുഹ്യഭാഗത്തും, മലദ്വാരത്തിനുമുറ്റം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുകയും, കാലിൽ താഴെനിന്നും മേലോട്ട് അല്പം മുറുക്കി ഒരു ബാൻഡേജ് ഇടുകയും ചെയ്യുക. ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. തീരെ ആശ്വാസം ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.

ഗുഹ്യഭാഗത്തു ചൊരിച്ചിൽ:-

(പ്രൂറിറ്റസ് വൾവാ-PRURITUS VULVA)

ഗർഭകാലത്തിൽ ഗുഹ്യഭാഗത്തു അസഹനീയമായ ചൊരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പടിക്കാരം (Alum Lotion 1%) ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ചൊരിച്ചിലുള്ളിടം കഴുകിയാൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. യോനീവാച്ചയുടെ ഫലമായും ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആലം ലോഷൻകൊണ്ട് ദിവസം രണ്ടുപ്രാവശ്യം യോനിയും ഗുഹ്യഭാഗവും ശുദ്ധിചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ പരിചരണങ്ങൾക്കൊണ്ടും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഏതെങ്കിലും പുരട്ടുക.

- 1) Anthisan Cream.
- 2) Bradex Vioform Cream.
- 3) Mycostatin Ointment.

ചൊരിച്ചിൽ അസഹനീയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഗുളികകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളിലേയ്ക്കു കഴിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

- 1) Vallergran Tabs
- 2) Periactin Tabs

അദ്ധ്യായം 24

ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ (തുടർച്ച)

മസ്തിലുകയറം (ക്രാമ്പ്സ്)-CRAMPS:-

കാൽവണ്ണയിലും തുടകളുടെ പിൻഭാഗത്തുമുള്ള മാംസ പേശികളുടെ ഉരുണ്ടുകയറം ചില ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഗർഭത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചകളിലാണ് ഇതു സാധാരണയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

പ്രതിവിധി:-

കാൽ നീട്ടിവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയും തിരുമ്മിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റു ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല.

നിദ്രാഹിത്യം:-

(ഇൻസോംനിയ-INSOMNIA)

ഗർഭിണികൾക്കു നല്ല ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒഴിവാക്കേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. കുറേനാളത്തേക്കു് ഉറക്കം തീരെയില്ലാതെ വന്നാൽ അതു് ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിന്റെ മുൻ സൂചനയായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ അഥവാ ലഘുഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും ഉറങ്ങാൻ നേരത്തു് ഒരുഗ്ലാസ്സ് ചൂടുള്ള പാൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ഉറക്കത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. തീരെ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതു്. ഉറക്കമരുന്ന കഴിച്ചെങ്കിലും സുഖനിദ്രയുണ്ടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വൃക്കരോഗം:-

(PREGNANCY KIDNEY)

ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന അപകടകരമായ രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൃക്കരോഗം. എട്ടാം മാസത്തിനു ശേഷമാണ് സാധാരണയായി വൃക്കകൾ രോഗബാധിതമായി കാണപ്പെടുന്നതു്. പ്രഥമഗർഭിണികളിലാണ് ഈ രോഗബാധയും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതു്. ശക്തിയായ ഛർദ്ദി, അപസ്ഥാരം, രക്തസ്രാവം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു വഴിതെളിക്കുന്നു. വൃക്കരോഗത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, ഗുഹ്യഭാഗത്തും കൈകാലുകളിലും, മുഖത്തും നീരു്, മുത്രക്കുറവു്, മുത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ, ഛർദ്ദി, കാഴ്ചക്കുറവു് എന്നിവയാണ്.



ചിത്രം 135:—വീക്കത്തിനു വിധേയമായ ഗുഹ്യഭാഗം.

ഈ രോഗത്തിന് വിദഗ്ദ്ധമായ ചികിത്സ ആവശ്യമായതിനാൽ ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്.

ഗർഭകാല മഞ്ഞപ്പിത്തം:—
(ACUTE YELLOW ATROPHY)

ഗർഭകാലരോഗങ്ങളിൽ അപകടകാരിയായ ഈ രോഗം സാധാരണമല്ലെങ്കിലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഏതു കാലത്തും പെട്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഗർഭത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിലോ, പ്രസവകാലമുക്കുമ്പോഴോ ആണ് ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായിക്കണ്ടുവരുന്നത്. ഗർഭിണിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സൂചനയും

ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു് ശക്തമായ തലവേദന, വയറിൽവേദന ഹർട്ടി എന്നിവ ആരംഭിക്കുകയും മഞ്ഞ പിത്തലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മഞ്ഞ പിത്ത രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഈ രോഗത്തിനു് ഇക്ലാമ്പ് ഗ്രാവിസ് ഗ്രാവിഡാരം (Ecturus Gravis Gravidarum) എന്നാണു് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രസംജ്ഞ. ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണിയുടെ മൂത്രത്തിലും, ഹർട്ടിയിലും രക്തം കലർന്നിരിക്കും. മൂത്രം വളരെ കറവായിരിക്കുന്നതും ഉള്ള മൂത്രത്തിൽ ആൽബമിൻ വളരെക്കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും. അല്പദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗസ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമായിത്തീരുന്നതും ഗർഭിണി അബോധാവസ്ഥയിലോ, ദീർഘനിദ്രയിലോ അകപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി:-

ഗർഭിണിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗർഭം നശിപ്പിക്കുക ആവശ്യമായതിനാൽ ഏറ്റവും വേഗം അവരെ ഒരു നല്ല ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക. നാലുമാസത്തിനു മുമ്പാണു് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാവുന്നതെങ്കിൽ ഗർഭാശയഗളം വികസിപ്പിക്കുവാനും (സെർവിക്കൽ ഡയലാറ്റേഷൻ-Cervical Dilatation), ഓവം ഫോർസെപ്സ് (Ovum Forceps) ഉപയോഗിച്ചു് ഗർഭം നശിപ്പിക്കുവാനും പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ നാലുമാസത്തിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു് പലപ്പോഴും ആപത്സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ.

ഗർഭാപസ്ഥാരം

(എക്ലാംപ്സിയ-ECLAMPSIA):-

ഗർഭകാലത്തോ, പ്രസവസമയത്തോ, അതിനു ശേഷമോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുമാതിരി ഇളക്കത്തിനാണു്

എക്സാംപ്സിയ (ഗർഭാപസ്മാരം) എന്നു പറയുന്നതു്. വളരെ അപകടകാരിയായ ഈ രോഗം പ്രഥമഗർഭിണി കളിലാണു കൂടുതലായ് കണ്ടുവരാനുള്ളതു്. ഏഴാം മാസം മുതലാണു് രോഗം കണ്ടുവരുന്നതു്.

ഗർഭാപസ്മാരബാധ (ഇളക്കം--കോട്ടു്) ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളതിന്റെ മുൻ സൂചനയായി താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.

വളരെ പെട്ടെന്നു് അതിശക്തമായ തലവേദന ആരംഭിക്കൽ,

മനംമറിച്ചിൽ (മനംപുരട്ടൽ),

നെഞ്ചെരിച്ചിൽ,

ഹർദ്ദി,

കാഴ്ചക്കുറവു്,

മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ.

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടനെ വിദഗ്ദ്ധമായ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കും, ചികിത്സയ്ക്കും ഗർഭിണിയെ വിധേയയാക്കേണ്ട ചുമതല മിഡ്വൈഫിനുള്ളതാണു്. ഏറ്റവും വേഗം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപകടകാരിയായ ഈ രോഗത്തിൽനിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു്. ഗർഭിണി ഒരുദിവസം ഒഴിക്കുന്ന മൂത്രം ആകെ ശേഖരിക്കുകയും അതുനന്നോക്കി എത്രയുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽനിന്നും കുറെ മൂത്രമെടുത്തു് പരിശോധനയ്ക്കു വേണ്ടി ഡാക്ടറു ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഇളക്കം (Fits) പെട്ടെന്നാറംഭിക്കുകയും, ഇളക്കമുള്ളസമയത്തും അതിനുശേഷവും ഗർഭിണിക്കു് ബോധമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗർഭാപസ്മാരരോഗത്തിനു് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളതു്.

ഒന്ന് പ്രഥമഘട്ടം:—

(പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ്—PRELIMINARY STAGE)

ഈ പ്രാഥമികാവസ്ഥയിൽ ശിരസ്സിലും മുഖത്തിലും മുളള മാംസപേശികൾ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും കൺ പോളകൾ വിറയ്ക്കുകയും, കൺമിഴികളും തലയും ഒരുവശത്തേയ്ക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രഥമ ഘട്ടം ഒരുമിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിക്കാറില്ല.

ദ്വിതീയഘട്ടം:—

(ടോണിക് സ്റ്റേജ്—TONIC STAGE)

ഞരമ്പ് വലിമൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ടോണിക് സ്റ്റേജ് എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരമാസകലമുള്ള മാംസപേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നതും താടി വിറച്ചുതുടങ്ങുന്നതുമാണ്. തല പിന്നോട്ടു വളയുകയും കഴുത്തു് (പിടലി, പിരടി) വിറങ്ങലിക്കയും (ബലവത്തായി തീരുകയും) ഉച്ചാറിമാത്രം നിലത്തുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞുനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈകൾ നീട്ടി മുഷ്ടിചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച രീതിയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതും അതിനാൽ മുഖം നീലനിറമായിത്തീരുന്നതുമാണ്. നാക്ക് പല്ലുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് മുറിയുവാനും രക്തവും, നരയും പതയും ഒഴുകുവാനും ഇടയാകുന്നു. രോഗിപൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടവും അധികനേരം നിലനില്ക്കുകയില്ല.

തൃതീയഘട്ടം:—

(ക്ലോണിക് സ്റ്റേജ്—CLONIC STAGE)

ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാമാംസപേശികളും വിറച്ചുതുടങ്ങുന്നതും, വിറയൽ മുഖത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ചു് ശരീരമാ

സകലം വ്യപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. വായ്പ്പെട്ടന്ന് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും വായിൽനിന്നും രക്തവണ്ണത്തിൽ നരയും പതയും ഒഴുകിതുടങ്ങുന്നതുമാണ്. തുടന്ന് മാംസപേശികൾ തളന്ന് അയയുന്നതും രോഗിബോധരഹിതയായി കിടക്കുന്നതുമാണ്. ക്രമേണ ബോധം തെളിഞ്ഞു ആശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ ഗുരുതരമായ ചില കേസുകളിൽ ബോധം തെളിയാതെ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

ഗർഭാപസ്മാരത്തിന്റെ അപായ ലക്ഷണങ്ങൾ:-

- 1 തുടച്ചയായി വളരെ പ്രാവശ്യം ഇളക്കമുണ്ടാവുക.
- 2 പനി 103 ഡിഗ്രിയിലധികമാവുക.
- 3 മൂത്രം തിളപ്പിച്ചുനോക്കിയാൽ അതു കട്ടിയായി തീരുക.
- 4 നീര് തീരെയില്ലാതിരിക്കുക.
- 5 മൂത്രം പോകാതിരിക്കുക. പോയാൽതന്നെ വളരെ മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം മാത്രമായിരിക്കുക.
- 6 മഞ്ഞപ്പിത്ത ലക്ഷണമുണ്ടായിരിക്കുക.
- 7 ഇളക്കത്തിനു ശേഷം തീരെ ബോധമില്ലാതിരിക്കുക.
- 8 ഹൃദയപ്രവർത്തനത്തിന് ഗുരുതരമായ മാനദ്യം സംഭവിക്കുക.
- 9 പ്രസവവേദന ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമോ പ്രസവം നടന്നുകഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇളക്കമുണ്ടാവുക. മേൽവിവരിച്ച ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ശുഭസൂചകമല്ല.

പ്രതിവിധി:-

ഗർഭകാലത്തു മൂത്രം ആഴ്ചയിലൊരിക്കലൈങ്കിലും പരിശോധിക്കുകയും ആൽബുമിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടാൽ അ

തിനുള്ള പ്രത്യേകചികിത്സ ചെയ്യുകയും, ഗർഭകാലം മുഴുവൻ ഡാക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യണം.

ഏതെങ്കിലും ഗർഭിണിക്കു പെട്ടെന്നു് അപസ്സാര ഇളക്കം ആരംഭിച്ചാൽ ഏറാവും വേഗം ഡാക്ടറെ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണു്.

ഇളക്കംബാധിച്ച സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അയച്ചിടുകയും, ഇറുകിക്കിടക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവ അഴിച്ചുമാറുകയും ചെയ്യണം. രോഗി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ അധികം വെളിച്ചവും ശബ്ദവും ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും, ദേഹത്തു് പരക്കുകൾ ഒന്നുമേല്ലാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മുറിയിലുള്ള മേശ, കസേര തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുകയുംവേണം. ചെവികൾ പഞ്ഞിവെച്ചു് അടയ്ക്കുകയും നാക്കു കടിച്ചമുറിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്പൂണിന്റെ പിടിയിലോ ഒരു കമ്പിലോ തൂണിപ്പുറി അതു് പല്ലിനിടയിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുകയുംചെയ്യുക. ഇളക്കം കഴിഞ്ഞാലുടനെ വായിലെ നരയും പതയും മറ്റും ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുവേണ്ടി രോഗിയെ ഒരു വശത്തേയ്ക്കു് ചരിച്ചുകിടത്തുക. മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുകയും, ഡാക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്കുവേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിമാ കൊടുത്തു് മലം കളയേണ്ടതും ശ്വാസോച്ഛ്വാസക്രമം, നാഡീസ്പന്ദനനിരക്കു്, പനി എന്നിവനോക്കി കറിച്ചുവയ്ക്കുകയും ഡാക്ടറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇളക്കത്തിനുശേഷം രോഗി വെള്ളം കുടിക്കുമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻകൊടുക്കുകയും ഒരു കമ്പിളികൊണ്ടു് പുതപ്പിച്ചുകിടത്തുകയും ചെയ്യണം.

മുനീർ ആധിക്യം:-

(ഹൈഡ്രാമ്നിയോസ്-HYDRAMNIOS):-

ഗർഭിണിക്ക്, ഏദ്രോഗം, വൃക്കരോഗങ്ങൾ, സിഫിലിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ളപ്പോഴും, ഗർഭത്തിൽ ഒന്നിലധികം ശിശുക്കൾ ഉള്ളപ്പോഴും, ശിശു ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചു മരണപ്പെടുമ്പോഴും ആണ് സാധാരണയായി മുനീർ ആധിക്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. മുനീർ അധികമായാൽ ഗർഭിണിക്കു ശ്വാസംമുട്ടൽ, ഇരിക്കുവാനും കിടക്കുവാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മുനീർ അഞ്ചു പൈൻറിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നാലെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. മുനീർ ആധിക്യം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഗർഭം അഞ്ചാറു മാസമാകുമ്പോഴാണ്.

മുനീർ ആധിക്യംമൂലം മാസംതികയാൻ പ്രസവിച്ചുപോവുകയോ, ഗർഭസ്ഥശിശു ക്രമവിരുദ്ധമായ ശയനനിലയിലായിരിക്കുകയോ, പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി വരികയോ, പ്രസവശേഷം രക്തസ്രാവമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടനെ ഒരു ഡാക്ടറെക്കാണിച്ച് ചികിത്സിപ്പിക്കുവാൻ മാഡം വൈഫ് ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ്.

- 1 വയറ് ക്രമാതീതമായി വീങ്ങിയിരിക്കുകയും വയറിനുമേൽതൊടുമ്പോൾ നൊമ്പരവും, വയറിൻ വേദനയും ഉണ്ടായിരിക്കുക.
- 2 ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടായിരിക്കുകയും, മുഖം ക്രമേണ നീലനിറമായിവരികയും ഇരിക്കുവാനും കിടക്കുവാനും പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

- 3 വയറ്റ്, ഗുഹ്യഭാഗം, കാലുകൾ എന്നിങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വീക്ഷിക്കുക.
- 4 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ശ്രവിക്കുവാനോ അംഗങ്ങൾ സ്പർശിച്ചറിയാനോ കഴിയാതെ വരിക.

എന്നിവയാണ് മൂന്നു ആധികൃതരും പ്രകടമാകുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഗർഭാവസ്ഥയായ ചില കേസുകളിൽ ഹർട്ടി, പനി, ദൂതഗതിയിലുള്ള നാഡിമിടിപ്പ് എന്നിവയും കാണപ്പെടുന്നതാണ്.

ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ചുള്ള ശിശുമരണം:-

(INTRA UTERINE DEATH OF THE FOETUS):-

ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ചുള്ള ശിശുമരണങ്ങൾക്കു പ്രധാന കാരണം മാതൃശരീരത്തിന്റെ രോഗസ്ഥിതിയാണ്. മാതൃശരീരത്തിൽ ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിഷാവസ്ഥ (Toxaemia of pregnancy), പാർസിപ്പിസ് (Syphilis), മലേറിയ (Malaria), സന്നിപാതജ്വരം (Typhoid) തുടങ്ങി രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, പ്രസവത്തിനു മുമ്പുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം എന്നിവയാണ് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ മരണത്തിനുള്ള മാതൃസംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ.

ശിശുവിന്റെ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ, പൊക്കിൾക്കൊടിയിലുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശിശു ഗർഭത്തിൽവെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെടാറുണ്ട്.

ഗർഭസ്ഥശിശു ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഗർഭിണിക്കുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും.

1. ശിശുവിന്റെ അനക്കം പെട്ടെന്നുനിന്നുപോവുക.
2. വയറു വലുതാകാതെയിരിക്കുക.
3. മുലകൾ വലുതാകാതിരിക്കുക.
4. അടിവയറിൽ ഘനവും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുക.
5. രാവിലെയുണ്ടാകുന്ന ഛർദ്ദി പെട്ടെന്നു നിന്നുപോവുക.
6. ഭക്ഷണത്തിന് തീരെ രുചിയില്ലാത്തതായും ശരീരത്തിനു മൊത്തത്തിൽ വിവരിക്കാനാവാത്ത അസുഖം തോന്നുകയും ചെയ്യുക.
7. രക്തവണ്ണത്തിലുള്ളതും ദുഗ്ന്ധമുള്ളതുമായ യോനീവാച്യയുണ്ടാവുക.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ശിശു ഗർഭാശയത്തിൽപ്പച്ചു മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി മിഡ്‌വൈഫ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഉടനെതന്നെ അവരെ ഒരാശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ (തുടർച്ച)

ഗർഭം അലസിപ്പോവുക (അബോർഷൻ—ABORTION):—

ഭൂതം പൂർണ്ണശിശുവായി വളച്ച് പ്രാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതായത് പ്രസവിച്ചാൽ ശിശുവിന് ജീവിക്കാവുന്ന കാലമായ ഏഴുമാസത്തിനുമുമ്പ് ഗർഭം നശിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അലസിപ്പോവുക (Abortion) എന്നു പറയുന്നത്. ഏഴുമാസത്തിനുശേഷവും പത്തുമാസത്തിനുമുമ്പും പ്രസവിച്ചാൽ അതിന് അകാലപ്രസവം (Premature Birth or Miscarriage) എന്നാണ് പറയുന്നത്. പത്തുമാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ നാശത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഗർഭം അലസി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അബോർഷനും, മിസ്കാറേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മിഡ് വൈഫ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഏഴാംമാസത്തിനുമുമ്പുള്ള ഗർഭനാശത്തിന് അബോർഷൻ എന്നും, ഏഴാംമാസത്തിനുശേഷവും പത്താംമാസത്തിനുമുമ്പും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസവത്തിനോ ഗർഭനാശത്തിനോ മിസ്കാറേജ് എന്നും ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.

ഏഴാംമാസത്തിനുമുമ്പ് ഗർഭം നശിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രമേഹം (ഡയബറ്റിസ്മ്—Diabetes), വൃക്കരോഗങ്ങൾ (കിഡ്നി ഡിസീസ്—Kidney Diseases), ഹൃദ്രോഗം (ഹാർട്ട് ഡിസീസ്—Heart Disease), വസൂരി (സ്റ്റാർപോക്സ്—Small Pox), ന്യൂമോണിയാ (Pneumonia), സന്നിപാതജ്വരം (ടൈഫോയ്ഡ്—Typhoid), പാർസിപ്പ് (സിഫിലിസ്—Syphilis) എന്നീ രോഗങ്ങളിലേതെങ്കിലും ഗർഭകാലത്ത് ഗുരുതരാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ഗർഭാശയത്തിന്റെ ക്രമവിരുദ്ധമായ കിടപ്പ്, ശക്തമായ വീഴ്ച, ഉദരഭാഗത്ത് അടി, ഇടി എന്നീ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും, രൂക്ഷമായ ഔഷധസേവകൊണ്ടും അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്.

ഗർഭിണിക്ക് അടിവയർ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ വേദനയും, നടുക്കുഴപ്പം, രക്തവാച്ചയും കാണുന്നപക്ഷം അത് ഗർഭമലസിപ്പോകാനുള്ള ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കി ഉടനെ ഡാക്ടറെ വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഡാക്ടർ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുമുമ്പ് താഴെപ്പറയുന്ന പരിചരണങ്ങൾ മിഡ് വൈഫ് നൽകേണ്ടതാണ്.

ഗർഭിണിയെ അനക്കാതെ കിടത്തുകയും മലമൂത്രവിസർജ്ജനത്തിന് ബെഡ് പാൻ (Bedpan) വച്ചുകൊടുക്കുകയും യോനീമാഗ്ഗമായി പോകുന്ന രക്തക്കുട്ടകൾ, ഡാക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എടുത്തുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം.

രക്തസ്രാവം അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ലൈസോൾ ചേർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഡൂഷ് (Douche-യോണീവസ്തി) ചെയ്യണം. ഡൂഷ് ചെയ്തിട്ടും രക്തവാച്ചു ശമിക്കാതെ തുടരുന്നപക്ഷം യോനി തുറടയ്ക്കണം.

യോനി തുറടയ്ക്കേണ്ട രീതി:-


(PLUGGING THE VAGINA)

യോനി തുറടയ്ക്കുന്നതിന് (പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നതിന്) മുമ്പ്, ഗുഹ്യഭാഗം സോപ്പ് ചൂടുവെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകി, ലൈസോൾ ലോഷൻകൊണ്ട് ഡൂഷ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഗർഭിണിയെ കട്ടിലിന്റെ ഒരുകിഴിയിൽ കിടത്തി കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മുത്രമെടുത്തു കളയുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറിലൈസുചെയ്ത ഗോസ്സ് തൂണികൊണ്ട് ആദ്യം ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തിന് (Cervix) ചുറ്റും പിന്നീട് യോനിഭാഗവും നല്ലപണ്ണി പ്ലഗ് ചെയ്യണം. പ്ലഗ് ചെയ്തതിനുശേഷം വയററത്ത്




Plugging the uterus and vagina. Wide three-layer bandage is grasped with a dressing forceps so that by turning the dressing forceps in one direction the bandage is gradually unrolled

ചിത്രം 136: ഗർഭാശയവും യോനിയും തുറടയ്ക്കാനുള്ള ബാൻഡേജ് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന വിധം.



Plugging the vagina.
The bandage used for
packing is folded ac-
cordion-fashion




Plugging the uterus
by hand in cases of atonic
hemorrhage after childbirth

ചിത്രം 137:

യോനി തുറക്കുന്നള്ള
ബാൻഡേജ് മടക്കിവ
യ്ക്കേണ്ട വിധം..

ചിത്രം 138

പ്രസവശേഷമുള്ള ശക്തമായ രക്ത
സ്രാവം തടയുന്നതിനുവേണ്ടി
ഗർഭാശയം തുറക്കുന്നു.



Plugging the vagina. After packing the vagina a pressure bandage
is applied by means of a towel tied around the waist with a rolled
sheet placed under the towel

ചിത്രം 139

യോനി തുറക്കുന്നു: തുറച്ചതിനുശേഷം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതു
പോലെ മടക്കിയ ഷീറ്റ് വച്ച് അതിനുമുകളിൽക്കൂടി അറക്കെട്ടു
ചുറ്റി ഒരു ട്രാപ്പുകൊണ്ട് മുറക്കിക്കെട്ടുക,

ഒരു ബൈൻഡർ ഇട്ട്, ഒരു തുണികൊണ്ട് തറുപ്പിക്കുക. സ്റ്റേറിലൈസ് ചെയ്ത ഗോസ്സ് തുണി ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ഒരുടിയന്തിര പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ തിളപ്പിച്ച് ലേസോം ലോഷനിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ നല്ല പഴുതുണികൊണ്ടും തുറടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

പ്ലഗിംഗ് (തുറടയ്ക്കൽ) വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാകയാൽ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ മിഡ്‌വൈഫ് അതു ചെയ്യാവൂ.

രക്തസ്രാവം നിന്നതിനുശേഷവും ഗർഭിണി ഒരാഴ്ചത്തേക്കു കിലും സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗർഭം അലസിപ്പോകാനിടയായാൽ പിന്നെ ആറുമാസത്തേക്കു കിലും ഗർഭിണിയാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ഗർഭം അലസി പോയിട്ടുള്ളവർ ആ വിവരം പ്രത്യേകമായി ഡാക്ടറെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതും ഗർഭമലസിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

അകാലപ്രസവം:-

(MISCARRAGE OR PREMATURE BIRTH)


ഏഴു മാസത്തിനുശേഷവും പത്തുമാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസവത്തെയാണ് അകാലപ്രസവം എന്നു പറയുന്നത്. ഗർഭം അലസിപ്പോകുന്നതിനു പത്തുനൂറ്റാണ്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും അകാലപ്രസവങ്ങൾക്കുമുള്ളത്. പരിചരണങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടത്.

ശിശുവിനു ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ (Incubator) കിടത്തിയോ പുറം ചൂടുവെള്ളം

നിറച്ച സഞ്ചികൾ (Hot water bag) വച്ചോ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതാണ്. [അകാലപ്രസവവും ശിശുപരിചരണവും എന്ന ഭാഗം നോക്കുക.]

വെസികുലർ മോൾ (VESICULAR MOLE) -

മുന്നീക്കടത്തോലിനു് ആംനിയോൺ (Amnion) എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബാഹ്യപാളി (പുറത്തോൽ) യും കോറിയോൺ (Chorion) എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആന്തരികപാളിയും (ഉൾത്തോൽ) ചേർന്നു് രണ്ടുക്കകളാണുള്ളതു്. അപൂർവ്വം ചില ഗർഭിണികളിൽ ഗർഭം മൂന്നു മാസമാകുന്നതിനു മുമ്പു് കോറിയോണിൽ മുന്തിരിക്കലപോലെ ഒരു വളച്ചു



ചിത്രം 140: വെസികുലർ മോൾ.

യുണ്ടാകുന്നു. മുന്തിരിക്കലപോലെയുള്ള ഈ കുമിളകൾ (Vesicular mole) ധാരാളമായി വളർന്ന് ഗർഭാശയം നിറയുകയും ഭ്രൂണവളച്ചത് ഹാനികരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനുശേഷം കുമിളകളുടെ ആക്രമിയിലുള്ള ഇത് കറേക്ട്രിയായി പൊട്ടി രക്തത്തോടുകൂടി ഭഗദാരമാറ്റേണ വെളിയിൽ വരുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും ഭ്രൂണം നശിച്ചു നാമാവശേഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും.

ലക്ഷണങ്ങൾ:- പരിശോധനയിൽ ഗർഭാശയം ക്രമത്തിലധികം വലുതായും മാർദ്ദവപ്പെട്ടു മിരിക്കുന്നതായി കാണാം. മൂന്നാംമാസത്തെ വലിപ്പത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ട ഗർഭാശയം ആറാംമാസത്തെ വലിപ്പത്തിൽ ഉയർന്ന് പൊക്കിൾവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. രക്തവാച്ച് അല്പാല്പമായി ആരംഭിച്ചു ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന രക്തത്തിൽ വെന്ത ചൗവുരിപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രമേണ ഗർഭിണിക്കു വിളച്ചുബാധിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു വശയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. യാദൃശ്ചികമായി ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അലസി വെളിയിൽപ്പോകുകയും അങ്ങനെ ഗർഭിണിക്കു ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ രക്തവാച്ചയുടെ ആധിക്യം മൂലമോ, ഗർഭാശയം പൊട്ടിയോ ഗർഭിണിക്കു ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു.

പ്രതിവിധി:-

ഏറ്റവും വേഗം ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടുക. ഗർഭിണിയെ സ്വസ്ഥമായി കിടത്തുകയും യോനിമാറ്റേണ സ്രവിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം ശേഖരിച്ചു വച്ച ഡാക്ടറെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം കേസുകളിൽ മിഡ്‌വൈഫിന് ചെയ്യാനുള്ളത്.

കാർണിയസ്സുമോൾ:-

(CARNEOUS MOLE)

ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ നിമിത്തം മൂന്നു മാസമാകുന്ന തിനുമുമ്പ് പ്രജമരിച്ചാൽ കുറെനാൾ അതു ഗർഭാശയത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് ശുഷ്കിക്കുകയും അതിനുശേഷം രക്തവണ്ണമായ ഒരു വാർച്ച യോനിയിൽക്കൂടി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓക്കാനം ഛർദ്ദി മുതലായ ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രം നിലനിന്നതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോകയും രക്ത വണ്ണമായ യോനീവാർച്ച തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാൻ പ്രജമരിച്ച് “കാർണിയസ്സുമോൾ” ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ഊഹിക്കേണ്ടതും ഉടനെ ഡാക്ടറെ വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ [(തുടർച്ച)

ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന നീരൊഴുക്കു:—

(ഹൈഡ്രോറിയാ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി—
HYDRORRHOEA OF PREGNANCY)

മൂന്നാംമാസത്തിനുശേഷം ചില ഗർഭിണികൾക്കു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നുള്ള നീരൊഴുക്കു അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടു്. ഇതു് ഗർഭാശയഭിത്തിയുടേയും മൂന്നിടക്കുടത്തോലിന്റെയും ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നീരോ (ദ്രാവകം), മൂന്നിരുതന്നെയോ ചോർന്നുവരുന്നതാവാം. ഏതു വിധത്തിലായാലും യോനീമാറ്റേണ നീരൊഴുക്കു കാണപ്പെടുന്നതു് ഗർഭം അലസിപ്പോകുന്നതിനോ അകാലപ്രസവത്തിനോ ഉള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണു്. ഇതിനു് പ്രത്യേക ചികിത്സയൊന്നുമില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. പൂണ്ണമായ വിശ്രമമാണു് പ്രധാന പ്രതിവിധി. അതിനാൽ ഈ ലക്ഷണം കാണുന്ന ഗർഭിണികൾ പൂണ്ണവിശ്രമമെടുത്തു് കഴിയുന്നത്ര അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണു്.

വെള്ളപോക്ക് (ല്യൂക്കോറിയാ-LEUCORRHOEA):-

അസ്ഥിസ്രാവം, ഉഷ്ണത്തിന്റെ ദീനം, അസുഖം എന്നൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞുവരാറുള്ള ഒരുതരം യോനീസ്രാവത്തെയാണ് വെള്ളപോക്ക് എന്ന പദംകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. “ല്യൂക്കോറിയാ” എന്ന പദത്തിനു വെളുത്ത ഊറൽ എന്നാണർത്ഥം. യോനീമാർഗ്ഗേണയുള്ള ഈ വെള്ളപോക്കിന് അസ്ഥിയുമായോ മറ്റോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അസ്ഥിയുരുകിപ്പോവുകയാണെന്നുവരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഭയപ്പെടുന്ന അനേകം സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഗേഭാരമാഗ്ഗ്ത്തിനു ഉറച്ചിൽ തട്ടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആ ഭാഗത്തു് ഒരുതരം ദ്രാവകം ഊറി എപ്പോഴും മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ദ്രാവകം അല്പസപ്തമായി പുറത്തേക്കും ഊറിവരാറുണ്ടെന്നുമാത്രം. ഇതിനെയാണ് അസ്ഥിസ്രാവമെന്നും ഉഷ്ണത്തിന്റെ ദീനമെന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊരുരോഗമേയല്ല. വെള്ളപോക്ക് അല്പമായിട്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളുമില്ല. എന്നാൽ വെള്ളപോക്ക് അമിതമായി കാണപ്പെട്ടാൽ അതൊരു രോഗലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുകയും ഡാക്ടറെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അമിതമായ വെള്ളപോക്കിനു കാരണമെന്തെന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആവശ്യമെങ്കിൽ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമാണ്.

എല്ലാ സ്ത്രീകളുടേയും ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിലും സെർവിക്സിന്റെ (ഗർഭാശയഗുളം) ചർമ്മത്തിലും എപ്പോഴും ദ്രാവകമുറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ദ്രാവകം പുറത്തേക്കും ഊറിവരുന്നതിന്റെ കൂടെ പ്രസ്തുതഭാഗങ്ങളിലെ ചർമ്മത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഇളകിപ്പോരാറുണ്ട്. ഇതിന് നേരിയ വെള്ളനിറമായിരിക്കും.

പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ അഭാവം, വിളച്ച് (അനീമിയാ-*Anaemia*) തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ശരീരത്തിന് പൊതുവായി സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷീണംമൂലവും,

ഗുഹ്യഭാഗം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തതുമൂലം രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഭോഗശയചർമ്മത്തിന് വീക്കമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലും,

കൃമിശല്യമുള്ളവരുടെ മലദ്വാരത്തിൽനിന്ന കൃമികൾ യോനീമാഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാലും,

ജനനനിയന്ത്രണോപകരണങ്ങൾ യോനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാലും മറ്റുമാണ് വെള്ളപ്പോക്ക കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത്. വെള്ളപ്പോക്കമൂലമാണ് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചുവരുന്നതെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ധാരണ ശരിയല്ല; മറിച്ച് ശരീരക്ഷീണവും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധശക്തിക്കുറവുമാണ് രോഗാണുബാധയ്ക്കും തലജന്യമായ വെള്ളപ്പോക്കിനും കാരണം.

പ്രതിവിധി:-വെള്ളപ്പോക്ക അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു യുക്തമായ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമായതിനാൽ ലജ്ജിക്കാതെ ഡാക്ടറെ വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സാവിധികൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യോനീസ്രാവത്തിന്റെ നിറം ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിലായാൽ രോഗാണുബാധയുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചികിത്സ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു.

ഭേദാരമാഗ്ഗത്തിലെ ചർമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അണ്ഡാശയത്തിൽ (*Ovary*) നിന്നുള്ള അന്തഃസ്രവണ (*Hormone*) ഞ്ഞ ആശ്രയിച്ചാണ്. കുറെ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾക്കു അന്തഃസ്രവണത്തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളതി

നാൽ വെള്ളപോക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ്. അന്തഃസ്രവണത്തകരാറുകൾ മൂലമാണ് വെള്ളപോക്കു ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതും ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗർഭകാലത്തും മെൻസസു അടുക്കുമ്പോഴും വെള്ളപോക്കു കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. അതിനു പ്രത്യേക ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല.

വൃത്തിഹീനതകൊണ്ടാണ് വെള്ളപോക്കുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനു കോൺഡീസു ലോഷൻ (Condy's Lotion) കൊണ്ട് ഡ്യൂഷ് ചെയ്യുകയും ഗുഹ്യപ്രദേശം എന്നും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൽ മതിയാകും.

ആത്മവസമാപ്തി (Menopause) സ്തംഭശേഷമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപോക്കിനു പടിക്കാരം (Alum) ചേർത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ഡ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും.

ശിശുപ്രായത്തിലും, കൗമാരപ്രായത്തിലും പെൺകുട്ടികൾക്കു വെള്ളപോക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനു പ്രധാന കാരണം അവർ മണ്ണിലും മറ്റുമിരുന്നു കളിക്കുമ്പോൾ രോഗാണുക്കളോ മലിനവസ്തുക്കളോ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

ഗുഹ്യഭാഗം എന്നും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിഷ്കർഷപാലിക്കുകയും, ശരീരത്തിനു ഗുരുതരമായ ക്ഷീണം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം വെള്ളപോക്കു ആർക്കും സാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ഗൊണോറിയ (GONORRHOEA):-

പുയമേഹം, ഉഷ്ണസ്രാവം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് "ഗൊണോറിയ" എന്ന രോഗത്തെയാണ്. ഗൊണോറിയ രോഗബാധയുള്ളവരുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാലും മറ്റുമാണ് ഈ രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്.

ലക്ഷണങ്ങൾ:- മഞ്ഞനിറത്തിൽ ദുഗ്ന്ധത്തോടു കൂടിയ ചലം യോനിയിൽനിന്നും സ്രവിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. യോനീദളങ്ങൾക്കും മൂത്രദാരത്തിനും വീക്കവും, മൂത്രവിസർജ്ജനം നടത്തുമ്പോൾ ചുടിച്ചിലും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു. കഴലയ്ക്കു നീര്, വേദന, ചെറിയതോതിൽ പനി എന്നിവയും സാധാരണമാണ്.

ഗൊണോറിയ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും വേഗം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഗൊണോറിയ അണക്കൾക്കു (Gonococci) മൂത്രദാരംവഴി മൂത്രാശയത്തിലേയ്ക്കും, വൃക്കകളിലേയ്ക്കും, യോനീമാറ്റമായി ഗർഭാശയത്തിലേയ്ക്കും അണ്ഡവാഹിനിക്കുഴലുകളിലേയ്ക്കും അണ്ഡാശയങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കാനിടയായാൽ പ്രസ്തുതഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വീക്കവും പഴുപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ രോഗാണുക്കൾ കഴിവുണ്ട്. ഗൊണോറിയ രോഗാണുബാധമൂലം പ്രസവജ്വരം, വന്ധ്യത, എന്നീരോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. ശരിയായ ചികിത്സ യഥാസമയം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കുറെക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ യോനീദാരം, മൂത്രദാരം എന്നിവയ്ക്കു പുറം അരിവാറ (Warts) പോലെയുള്ള വളച്ചുരുണ്ടാകുന്നു. ഗൊണോറിയ രോഗമൂലമുണ്ടാകുന്ന യോനീവാച്ചിൽ രോഗാണുക്കൾ ധാരാളമുള്ളതിനാൽ ഈ വാച്ചുകളിൽ പററാൻ ഇടയായാൽ മാതാവിനും ശിശുവിനും ഗുരുതരമായ കണ്ണുപഴുപ്പു ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയാകുന്നു.

ഗൊണോറിയ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായ ഉഷ്ണസ്രാവത്തിന്, ടിപ്സേന കോൺഡീസ് ലോഷൻകൊണ്ട് യോനീവസ്തി (Donche) ചെയ്യുകയും, മലമൂത്രവിസർജ്ജനത്തിനുശേഷം ഈ ലോഷൻകൊണ്ട് കഴുകുവാൻ ഗർഭിണിയെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യേ

ണ്ടതാണ്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലുടനെ ശിശുവിന്റെ കണ്ണിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ (Silver nitrate solution 2%) ഇറിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗൊണോറിയ രോഗം പകരുന്നതായതിനാൽ മിഡ് വൈഫ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പെരുമാറണം. പരിചരണങ്ങൾക്കുശേഷം കൈകളും മറ്റും വൃത്തിയായി ലോഷനിൽ കഴുകേണ്ടതും രോഗികൾ ഉപയോഗിച്ച തുണികളോ മറ്റോ യാതൊരാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.

ലൈംഗികബന്ധം കൂടാതെതന്നെ, ഗൊണോറിയ രോഗികൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവയ്ക്കു കൂടി ഈ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളതായി രേഖകൾ കാണുന്നതിനാൽ രോഗികളും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരും കരുതലോടെ പെരുമാറേണ്ടതാകുന്നു.

പറികിപ്പണ്ണ് (സിഫിലിസ്-SYPHILIS):-

രോഗബാധിതരുമായി ലൈംഗികവേഷയിൽ ഇടപെടുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു മാതൃകരോഗമാണ് സിഫിലിസ്. ഉഷ്പണ്ണ്, പറികിപ്പണ്ണ്, എന്നെല്ലാം ഈ രോഗത്തിന് പേരണ്ട്. സ്രീപുരുഷഭേദമന്യേ എല്ലാ നിലകളിലുമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഈ രോഗത്തെ 'കപ്പൽ' എന്നു പറയാറുണ്ട്. ഈ വാക്ക് വിശേഷിച്ചിവിടെ എടുത്തുപറയുവാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. സിഫിലിസ്, പറികിപ്പണ്ണ് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരും ഈ രോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം 'കപ്പൽ' എന്നുതന്നെയാണെന്നു ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ അനേകം രോഗികളെ എനിക്കറിയാം. കപ്പൽമാറ്റം കേരളത്തിലെത്തിയ പറികികളാണ് ഈ രോഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനിന്നായിരിക്കണം

ഈ രോഗത്തിന് പരികീപ്പണ്ണം, കപ്പൽ എന്നീ പര്യായ പദങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായത്.

സിഫിലിസ് രോഗബാധിതരുമായുള്ള സംസ്കൃതം കൊണ്ടും അവരുപയോഗിക്കുന്ന തുണികൾ പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഈ രോഗപ്രകൃതിയുണ്ടാകാവുന്നതാണ്.

ലക്ഷണങ്ങൾ:—രോഗപ്രകൃതിബാധിച്ചസ്ഥാനത്തു് ആദ്യമായി ഒരു ചിരങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ അതു് കട്ടിയുള്ള ഒരു പുണ്ണം (ഹാർഡ് ഷാങ്കർ—Hard Chancre) ആയിത്തീരുന്നു. ലൈംഗികവേഷ്ടയ്ക്കുശേഷം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടേ സാധാരണയായി ഈ ചിരങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ.

ആദ്യത്തെ ചിരങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു മുതൽ ഒന്നരണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ തലവേദന, പനി, വിശപ്പില്ലായ്മ, അസ്ഥികുഴപ്പ്, തൊണ്ട വേദന, കലശലായ ക്ഷീണം, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, ഗുഹ്യഭാഗത്തും മറ്റും കൂടുതൽ വൃണങ്ങൾ, നഖങ്ങൾക്കു പഴുപ്പ്, വായിലും തൊണ്ടയിലും പാരനിറത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെമ്പുനിറത്തിലുള്ള ചിരങ്ങുകൾ, കഴലകൾ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

സിഫിലിസ് രോഗബാധ നിമിത്തം, അനേകം മാസങ്ങളോ കൊല്ലങ്ങളോ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും ശരീരത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി ആഴത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. യഥാകാലം ശരിയായി ചികിത്സ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഭയങ്കരമായ ഈ രോഗം നിമിത്തം മൃകു്, അസ്ഥികൾ എന്നിവ ദ്രവിച്ചുപോകുന്നതിനും, ഹൃദ്രോഗം, സിരാരോഗങ്ങൾ, ട്രാക്കു് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയുണ്ടു്. സിഫിലിസ് രോഗമുള്ള

വർഷം, മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർക്കും ഗർഭം മിക്കവാറും അലസിപ്പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചാപിള്ളയെ പ്രസവിക്കുന്നു. ജീവനോടുകൂടിയ ശിശുവിനെ പ്രസവിച്ചാൽത്തന്നെയും ആ ശിശു നിത്യരോഗിയായിത്തീരാനാണു സാധ്യത.

പ്രതിവിധി:-

പെനിസ്സിലിൻ, ടെറാമൈസിൻ തുടങ്ങിയ ആന്റിബയോട്ടിക് സിദ്ധൗഷധങ്ങളുള്ള ഇക്കാലത്തു് സിഫിലിസും, ഗൊണോറിയായുമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേയല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഈ രോഗബാധയുണ്ടായാൽ ഏതാനുംദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ ലഘുവായ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണു്. പ്രത്യക്ഷലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽക്കൂടി സംശയാസ്സദമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനേതന്നെ ഒരു ഡാക്ടറെ കാണേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. സിഫിലിസു് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായാൽപ്പിന്നെ ഡാക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്രയും കാലം ചികിത്സ തുടരേണ്ടതാണു്. രണ്ടോ മൂന്നോ പെനിസ്സിലിൻ ഇൻജക്ഷൻ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിനാൽ പല രോഗികളും ചികിത്സ തുടരാറില്ല. ഇതു് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കിടവരുത്തുന്നതാണു്. ഡാക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്ര ഇൻജക്ഷനും മറ്റു് ഔഷധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുവാൻ എല്ലാ രോഗികളും ബാധ്യസ്ഥരാണു്.

പരിചരണം:-

സിഫിലിസു് രോഗബാധയുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ മിഡ്വൈഫ് തനിക്കു രോഗം പകരാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കരുതലോടെ പെരുമാറേണ്ട

താണ്. ശർഭിണിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും മെക്‌ട്രിലോഷനിൽ കൈകളും മറുപകരണങ്ങളും ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രസവഘട്ടത്തിൽ റബ്ബർ കയ്യറ ധരിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും.

സിഫിലിസ് രോഗമുള്ള ശർഭിണി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഡ്രസ്ട്രങ്ങളും മറ്റും മറ്റാരും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. രോഗബാധയുള്ള സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരാളെ ചുംബിക്കുകയോ, അവരുടെ കുട്ടിക്കു് മറ്റു സ്ത്രീകൾ മുലകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകൂടാത്തതുമാകുന്നു.

സിഫിലിസ് രോഗത്തിന്റെ ഗൗരവം ശർഭിണിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും വിദഗ്ദ്ധമായ ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടതും മിഡ്‌വൈഫിന്റെ മാനുഷികമായ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമാകുന്നു.

അസ്ഥാനഗർഭം:-

(എക്ടോപ്പിയൻജസേഷൻ-ECTOPIAN GESTSTATION OR എക്സ്"ട്രാ യൂട്ടറിൻ പ്രഗ്നൻസി-EXTRA-UTERINE PREGNANCY)

സ്ത്രീബീജാണു. അണ്ഡകോശത്തിൽനിന്നും വെളിയിൽ വന്നു് അണ്ഡവാഹിനിക്കഴലിൽക്കൂടി സഞ്ചരിച്ചു്, പുരുഷബീജവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെട്ടു് ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തി ശിശുവായി വളരുക എന്നതാണ് ല്ലോ സാധാരണസംഭവം.

എന്നാൽ ഈ സാധാരണപ്രക്രിയയ്ക്കു വിപരീതമായി ചിലപ്പോൾ ഗർഭം ഗർഭാശയത്തിനു വെളിയിൽ വളരാറുണ്ടു്. ഗർഭാശയത്തിനു പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്ഥാനഗർഭം മൂന്നുവിധത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു.

1. അണ്ഡാശയഗർഭം:-

(ഒവേറിയൻ പ്രഗ്നൻസി-OVARIAN PREGNANCY)

ഭഗഭാരത്തിൽ സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷബീജം അവിടെനിന്നും ഗർഭാശയത്തിലൂടെയും അണ്ഡവാഹിനി

മഴലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അണ്ഡാശയ (Ovary)ത്തിൽ എത്തി അവിടെവെച്ച് സ്ത്രീബീജാണുവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെട്ട് ഗർഭമായി അവിടെത്തന്നെ ഉറച്ച് വളരാനിടയാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്കാണ് അണ്ഡാശയഗർഭം (Ovarian Pregnancy) എന്നു പറയുന്നത്.

2. നാളഗർഭം:-

(ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി-TUBAL PREGNANCY)

അണ്ഡനാളത്തിൽ (Fallopian Tube) വെച്ച് ഗർഭസ്ഥിരീകരണം നടന്ന് അത് അവിടെത്തന്നെ ഉറച്ച് ഗർഭമായി വളരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നാളഗർഭം എന്നു പറയുന്നത്.

3. ഉദരഗർഭം:-

(അബ്ഡോമിനൽ പ്രഗ്നൻസി-ABDOMINAL PREGNANCY)

നാളഗർഭം (Tubal Pregnancy) ഒന്നര മുതൽ രണ്ടര മാസംവരെ അണ്ഡവാഹിനിക്കഴലിൽ തന്നെ കിടന്നു വളരാൻ ഇടയാകുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി അണ്ഡവാഹിനിക്കഴൽ പൊട്ടി പിളർന്നുപോകാനിടയാകുന്നു. ആ പിളപ്പിൽക്കൂടി ഗർഭപിണ്ഡം വയറിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെക്കിടന്ന് വളരാനിടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഉദരഗർഭം എന്നു പറയുന്നത്. അണ്ഡവാഹിനിക്കഴൽ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ രക്തസ്രാവം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നപക്ഷം ഗർഭിണി മരണപ്പെടുന്നതാണ്.

ഭാഗ്യവശാൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഈ മൂന്നു വിധത്തിലുമുള്ള അസ്ഥാനഗർഭം കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അപൂർവ്വമായിട്ടാണെങ്കിലും അസ്ഥാനഗർഭങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി (നാളഗർഭം) ആകുന്നു.

അസ്ഥാന ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ:-

- 1 ആത്മവം നിന്നുപോവുക, രാവിലെ ഹർട്ടിയുണ്ടാവാക, സ്നാനങ്ങൾവലുതാവുകയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങി സാധാരണഗർഭാവസ്ഥയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എല്ലാലക്ഷണങ്ങളും അസ്ഥാന ഗർഭത്തിലുമുണ്ടാകുന്നു.
- 2 പരിശോധനയിൽ ഗർഭാശയം സാധാരണവലുപ്പത്തിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായും അത് അടിവയറിൽ ഒരുവശത്തേയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു.
- 3 ഗർഭാശയം ഇരിക്കുന്ന വശത്തിന് എതിർവശത്തായി ഒരു മാംസപിണ്ഡം വളർന്നുവരുന്നതായി കാണുന്നു.
- 4 നാളഗർഭമാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ അണ്ഡവാഹിനികൾ പൊട്ടി പ്രജവയറിനുള്ളിലേയ്ക്ക് വീഴുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ശക്തിയായ വയറിൽ വേദനയും, വയറിനുള്ളിലേയ്ക്ക് രക്തവാർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നു. യോനി മാഗ്നമായും കറേറ്റേറക്തം വരാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മിക്കവാറും, ഗർഭിണി മരിച്ചുപോകുന്നു.

നാളഗർഭം പൊട്ടുന്ന അവസരത്തിലുണ്ടാകുന്ന

പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ:-

- 1 ഹർട്ടി, ചെവിയിൽമുളുൽ, കാഴ്ചയില്ലാത്തവരൽ, കണ്ണിൽ മിന്നൽപോലെ തോന്നൽ, കഠിനമായ ക്ഷീണം, കലശലായ ദാഹം, ബോധക്ഷയം.
- 2 നാഡീസ്സന്ദനനിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു: എന്നാൽ മിടിപ്പ് വളരെ ക്ഷീണിച്ചരീതിയിലായിരിക്കുക.
- 3 കണ്ണുകളും ചിറികളും ശരീരം മൊത്തത്തിലും വിളറുന്നതും വളരെ അധികരിച്ച രീതിയിലുള്ള വിയർപ്പും, അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടുക.

- 4 ശ്വാസേവാഹാസഗതി അതിവേഗത്തിലാവുകയും തുടന്ന് ശ്വാസവിമിഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.
- 5 ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് നോർമലിൽ താഴുകയും കൈകാലുകൾ തണുക്കുകയും ചെയ്യുക.

പ്രതിവിധി:-

ഏറ്റവും വേഗം രോഗിയെ ഒരു സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാക്കേണ്ടതിനാൽ അല്പംപോലും സമയം പാഴാക്കാതെ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക.

അണ്ഡാശയഗർഭവും, നാളഗർഭം പോലെയെന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് പതിവ്. എങ്കിലും അപൂർവ്വമായി അണ്ഡാശയവും അണ്ഡാവാഹിനിക്കുഴലും പൊട്ടിയതിനു ശേഷവും അണ്ഡാശയഗർഭവും, നാളഗർഭവും വയറിൽ ഉച്ചു് വളന്ന് പൂർണ്ണതയിലെത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗർഭം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ പ്രസവലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് പുറത്തു വരുവാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാത്തതിനാൽ അതു് വയറിൻ തന്നെ കിടന്നു മരിച്ചുപോകുന്നു. അതിനു മുൻപ് വയറുകീറി കുട്ടിയെ രക്ഷപെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നേക്കാം.

നാളഗർഭത്തിൽ, കുട്ടി അവിടെക്കിടന്നതന്നെ മരിച്ച ശുഷ്കിച്ചുപോകുകയാണ് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നത്.

അസ്ഥാനഗർഭം പൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും മിഡ്വൈഫിന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, പ്രസ്തുത ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടനെ രോഗിയെ ഓശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. അല്പമായ താമസംപോലും ഗർഭിണിയുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നതാണ്.



ചിത്രം 141: OBSTETRIC OPERATIONS.

Note how the Doctor makes the head follow the natural curve of birth canal; head rises up on pubis; external restitution (see physiology of labour); anterior shoulder comes out; Posterior Shoulder (don't overstretch neck!); Note obliquity of head from pressure during pregnancy and labour (disappears soon); Cord has been tied; identification band on wrist.

പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ

പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും ഡാക്ടർമാരാണ്. എങ്കിലും പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഏതേതു സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നതെന്നതിനേക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു മിഡ്‌വൈഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമെ ഗർഭകോലപരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിഡ്‌വൈഫിന് തക്കസമയത്ത് ഡാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം തേടുന്നതിനും ലഘുവായ തോതിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും കഴിയൂ.

പ്രസവസംബന്ധമായി സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ചില ശസ്ത്രക്രിയകൾ,

- 1 ശസ്ത്രപ്രയോഗംമൂലം കുട്ടിയെ എടുക്കുക. (ഫോഴ്സെപ്സ് ഡെലിവറി-Forceps Delivery)

- 2 വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടർ (Vacuum Extractor)
- 3 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല തുറന്നു അതിനെ എടുക്കുക. (ക്രേനിയോട്ടമി-Craniotomy)
- 4 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല മുറിച്ചെടുക്കുക. (ഡീ ക്യാപ്പിറേഷൻ-Deccapitation)
- 5 മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രസവിപ്പിക്കുക. (ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ-Induction of Labour)
- 6 കീറിപ്പോയിട്ടുള്ള യോനിയും പെരിനിയവും തുറന്നുക. (Suture of Lacerated Vagina and Perineum)
- 7 ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ക്രമരഹിതമായ ജനനമുഖം തിരിച്ചു നേരെയാക്കുക. (വെർഷൻ-Version)
- 8 വയറുകീറി കുട്ടിയെ എടുക്കുക. (സിസ്സേറിയൻ സെക്ഷൻ-Caesarean Section)

പ്രസവസംബന്ധമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഈ പ്രധാന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ സിസ്സേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയയിലൊഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവയിലെല്ലാം ഓപ്പറേഷനുമുമ്പ് താഴെപ്പറയുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

1. മലശോധന.- പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ എന്നിമാകൊടുത്തു മലശോധനയുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷനുമുമ്പ് എന്നിമാകൊടുത്തു മലശോധനയുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

2. മൂത്രം:- പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭംമുതൽ ഗർഭിണി പല പ്രാവശ്യം മൂത്രവിസർജ്ജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം കാണാനിടയില്ല. മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം കെട്ടിനിന്നാൽ ശസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തു

മ്പോൾ മൂത്രാശയം കീറിപ്പോകാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ ശസ്ത്രപ്രയോഗത്തിനുമുമ്പ് മൂത്രമെടുത്തുകളയുകയും, വേണ്ടിവന്നാൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ഒരു കത്തിററർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തുപച്ചിരിക്കുകയും വേണം.

3. ഗുഹ്യഭാഗത്തെ രോമം:- ഗർഭിണിയുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്തുള്ള രോമംവെട്ടിച്ച്, സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി തുടച്ചതിനുശേഷം ഡെറ്റോൾ ക്രീം (Dettol Cream) പുരട്ടണം.

4. ഭക്ഷണം:-ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഗർഭിണിയെ ബോധംകെടുത്തുന്പോൾ അവർക്ക് ഛർദ്ദിയുണ്ടാകുന്നതിനും ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാകും. സാധാരണയായി പ്രസവവേദനയുടെ ആരംഭംമുതൽതന്നെ ഗർഭിണികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. അതിനാൽ അപകടംകൂടാതെത്തന്നെ ബോധംകെടുത്താൻ കഴിയും. പ്രസവഘട്ടത്തിൽ ഗർഭിണിയെ ബോധംകെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടേക്കാമെന്ന് മിഡ്‌വൈഫ് ഒരന്തിരിക്കേണ്ടതും, പ്രസവവേദന ആരംഭിക്കുമ്പോൾമുതലേകിലും ഘനാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഗർഭിണിയെ വിലക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

5. ഗർഭിണിയെ കിടത്തേണ്ട രീതി:- എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും ഗർഭിണികളെ മലർത്തിക്കിടത്തുകയാണു നല്ലത്. കാലുകൾ മടക്കി അകറ്റിക്കുത്തിവെച്ച നിലയിലായിരിക്കണം കിടത്തേണ്ടത്. ഫോഴ്‌സെപ്‌സ് ഡെലിവറിയിൽ, ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭിണിയെ ഇടത്തോട്ടു ചരിച്ചുകിടത്തേണ്ടിവന്നാൽ വലത്തെകാൽ അല്പം ഉയർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ശസ്ത്രപ്രയോഗം മൂലം കട്ടിയെ എടുക്കുന്നതിനും (Forceps Delivery), ജനനമുഖം തിരിക്കുന്നതിനും (Version) ഗർഭിണിയെ കട്ടിലിൽതന്നെ കിടത്തിയാലും മതിയാകും. മറ്റു ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾക്കെല്ലാംതന്നെ മേശമേൽ കിടത്തുകയാണു വേണ്ടതു്.

6. മേശ ഒരുക്കേണ്ട വിധം:- ഒരടിയന്തിര സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിൽവെച്ചു് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതായി വന്നാൽ, ഒരു സാധാരണ മേശയുടെ പുറത്തു് രണ്ടുമൂന്നു് കമ്പിളി മടക്കി പലനത്തിൽ വിരിക്കുക. കമ്പിളിക്കു മീതെ ഒരു വെളുത്ത വിരിപ്പും അതിനുമീതെ ഒരു റബ്ബർഷീറ്റും വിരിക്കണം. റബ്ബർഷീറ്റു് വിരിക്കേണ്ടതു്, ഗർഭിണിയെ കിടത്തിയാൽ അവരുടെ അരക്കെട്ടുഭാഗം മേശയുടെ ഏതുഭാഗത്തു വരുമോ അതിനു് അല്പം മുകളിൽനിന്നു് കീഴോട്ടായിരിക്കണം. റബ്ബർഷീറ്റിന്റെ കീഴ്ഭാഗം മേശയ്ക്കുതാഴെ വയ്ക്കുന്ന ബക്കറുവരെയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. റബ്ബർഷീറ്റു് വിരിച്ചതിനുശേഷം അതു് ഊന്നുപോകാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വിരിപ്പും റബ്ബർഷീറ്റും തമ്മിൽ സേഫ്റ്റിപിൻ ഉപയോഗിച്ചു് കുത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുക. റബ്ബർഷീറ്റിനുമീതെ സ്റ്റേറിലൈസു് ചെയ്ത ഒരു വലിയ തുവാലു വിരിച്ചിരിക്കയും വേണം.

ശസ്ത്രക്രിയാവസരത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു ക്ലിപ്തയുണ്ടു മറ്റു സാധനങ്ങൾ,

- 1) ബക്കറു് (വെള്ളവും മറ്റും ഒഴുകി വീഴുന്നതിനു് മേശച്ചുവട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നതിനു്).
- 2) ഡ്യൂഷ്കാൻ (യോനീവസ്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ).

3) ഇനാമൽബേസിൻ	5 എണ്ണം
4) ഇനാമൽ ജഗ്ഗ്	1 ,,
5) ഇനാമൽ ടേ	1 ,,
6) ചെറിയ മേശ	2 ,,
7) സ്കൂൾ	1 ,,
8) വലിയ പാത്രം	1 ,,


കൂടാതെ ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഡ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായി ധാരാളം വെള്ളം ശുദ്ധമായി തിളപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കണം. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണസാമഗ്രികളും സ്റ്റേറിലൈസ് ചെയ്യണം.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം രോഗിയെ പരിചരിക്കേണ്ടതു് എപ്രകാരമെന്നു് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞുതരും. ഓപ്പറേഷൻകഴിഞ്ഞു് രോഗിക്ക് ബോധം വീണ്ടുകിട്ടുകയും മറ്റു് അസുഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നു് ബോധ്യംവരികയും ചെയ്തതിനുശേഷമേ മിഡ്വൈഫ് രോഗിയുടെ അടുക്കൽനിന്നും മാറാവൂ. ബോധംകെട്ടു് ത്തിയ രോഗികൾക്ക് ബോധം വീഴുമ്പോൾ ചർദ്ദിയുണ്ടാകുവാനും കട്ടിലിൽനിന്നു വീണു പരിക്കേൽക്കാനും ഇടയുള്ളതിനാൽ മിഡ്വൈഫ് വളരെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം.

ഫോഴ്സെപ്സ് ഡെലിവറി

(FORCEPS DELIVERY)


താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശസ്ത്രപ്രയോഗം മൂലം കുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടതായി വരും. കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നതിനു് ഒബ്സ്റ്റേറ്റിക് ഫോഴ്സെപ്സ് (Obstetric Forceps) എന്ന കരുവാണു് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതു്.



ചിത്രം 142: FORCEPS DELIVERY.

Making sure the baby is well. Prophylactic Episiotomy; applying the first blade, usually left; testing the "fit" for the forceps; position for traction; head visible.

Follow action from above down ward.



ചിത്രം 143: ഫോഴ്സെപ്സിന്റെ പ്രയോഗക്രമം.

ഫോഴ്സെപ്സ് പ്രയോഗസ്ഥാനത്തു കടത്തുന്നതിനുമുമ്പായി അതിന്റെ ഇടത്തെ അഥവാ താഴത്തെ ബ്ലഡ് പിടിക്കുന്നവിധം.

ഫോഴ്സെപ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ:

1) ഗർഭാശയത്തിന്റെ ആലസ്യംമൂലം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പുറത്തേയ്ക്കു തള്ളുവാനുള്ള ശക്തി ഗർഭാശയസങ്കോചങ്ങൾക്ക് (Contractions) ഇല്ലാതെ വരിക.

2) ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കുക.

3) ഗർഭിണിക്ക് രക്തസ്രാവമോ, ഹൃദ്യരോഗമോ, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങളോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസവം വേഗത്തിൽ നടത്തേണ്ടതായി വരിക.

4) ഗർഭാശയം ചരിഞ്ഞിരിക്കുക.

5) പ്രായംചെന്ന ഗർഭിണികളുടെ പെരിനിയത്തിന് അയവില്ലാതിരിക്കുക.

6) ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നിലകളിൽ ശിരസ്സ് തിരിഞ്ഞ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുക. (Unreduced Occipito-Posterior Position).


7) പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ സാധാരണയിൽ വളരെക്കൂടുതൽ താമസം നേരിടുക.

8) മുഖം, ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവങ്ങളിൽ ശിശുവിന്റെ താടി ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുവരാതിരിക്കുക. (Unreduced Mento Posterior Position).

9) പൂഷം ജനനമുഖമായിവരുന്ന കേസ്സുകളിൽ ശിശു ശിരസ്സ് അവസാനം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോഴ് സെപ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരിക.

മാതാവിനും ശിശുവിനും ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കയില്ലെന്ന ബോദ്ധ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ശസ്ത്രപ്രയോഗം മൂലം കട്ടിയെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടു.

ഫോർസെപ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾക്കും മുമ്പ് ഗർഭിണിയുടെ ബന്ധുക്കളെയോ ഭർത്താവിനെയോ വിവരമറിയിക്കണം.




ചിത്രം 144: ഫോർസെപ്സിന്റെ പ്രയോഗക്രമം. ഇടതുവശത്തു ഡ്രൈഡ് കടുത്തുനീർ. യോനിയിൽ കടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടുവിരലുകളുടെ സ്ഥിതി ശ്രദ്ധിക്കുക.

ശിശുശിരസ്സ് ഉപസ്ഥാശയത്തിനുമീതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴും, മുനീക്കും പൊട്ടുന്നതിനുമുമ്പും, സെർവിക്സ് പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തപ്പോഴും, ഉപസ്ഥാ

ശയത്തിന്റെ ബാഹ്യകവാടം (External Os) വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കുമ്പോഴും, ഗർഭാശയസങ്കോചങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല.


ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഗർഭിണിയെ ബോധം കെടുത്തിയതിനുശേഷമേ ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബോധരഹിതയാക്കുന്നതുമൂലം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല അവർ അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നതുമാണ്.



ചിത്രം 145: ഫോർസെപ്സിന്റെ പ്രയോഗക്രമം.
 വലത്തും മുകളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് പിടിക്കുന്ന വിധം. ഇടത്തും അടിയിലും ആയി ഇരിക്കുന്ന ബ്ലേഡ് അതേസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു.

ശസ്ത്രപ്രയോഗംമൂലം കുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടതു് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനിവാര്യമാണെങ്കിലും അതുമൂലം പല വിപത്തുകളും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടു്. കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്കു് പരിക്കു് ഏല്പുന്നതും ചിലപ്പോൾ രക്തവാച്ചു് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണു്. കണ്ണിനും ക്ഷതമേല്ക്കാനിടയുണ്ടു്. ഗർഭാശയഗളം പൂണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫോർസെപ്സു് ഉപയോഗിച്ചു് ശിശുവിന്റെ




ചിത്രം 146: ഫോർസെപ്സു് പ്രയോഗക്രമം.

വലത്തും മുകളിലുമായിരിക്കുന്ന ബ്ലേഡു് കടത്തുന്ന രീതി. ഉപകരണത്തിന്റെ നേരെയുള്ള നിലത്തൊരാൽ ഒരു വലിവോടുകൂടി ബലപ്പെടുത്തി നിറുത്തുവാനുള്ള വലത്തെ ബ്ലേഡിനോടു് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലേഡു്, ചുരുട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന കൈത്തലോപരിഭാഗത്തു് നടുവിലിന്റെ മുഴച്ചുനിൽക്കുന്ന ചുവടുഭാഗത്തു് താങ്ങിയിരിക്കുന്നു.


തല ശക്തിയായി പുറത്തേയ്ക്കു വലിക്കുന്നതുമൂലം ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും ഗർഭാശയകണ്ഠവും (സെർവിക്സ്) കീറിപ്പോകാനിടയാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ യോനീമാർഗ്ഗത്തിനും മൂത്രാശയത്തിനതന്നെയും ക്ഷതമേല്ക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഗർഭാശയഗളം പൂർണ്ണമായും വികസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തിയാൽ ഗുരുതരമായ ചില തകരാറുകൾ ഗർഭിണിക്കു് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഗർഭാ



ചിത്രം 147: ഫോർസെപ്സിന്റെ പ്രയോഗക്രമം.
ഫോർസെപ്സ് ശരിയായി കടത്തി ബലപ്പെടുത്തി പുട്ടിയശേഷം ആക്കത്തോടെ വലിക്കുന്ന രീതി.

ശയം ഇറങ്ങി വരിക (യൂട്ടിറൈൻ പ്രൊലാപ്സ്—
Uterine Prolapse) എന്ന ഗർഭാശയരോഗാവസ്ഥയ്ക്കും,
ഇതു കാരണമായിത്തീരുന്നു. അതു അവരുടെ ഭാവിയിലു
ള്ള ലൈംഗികജീവിതത്തേയും പ്രസവത്തേയും ക്ലേശകര
വും ആപൽക്കരവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്.



ചിത്രം 148: ശിശുശിരസിന് ഫോർസെപ്സ് പിടി
പ്പിക്കേണ്ട ശരിയായ രീതി.

(The proper application of the forceps to the baby's head

—“ഗ്ലാസിലൂടെ ശർക്കരിച്ചു) കിട്ടിയ വിത്തുക്കൾ
 1. ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി
 പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന
 കൈകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന
 ഉപകരണങ്ങൾ.

അദ്ധ്യായം 28


പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ (തുടർച്ച)

വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടർ:-
 (VACUUM EXTRACTOR)

ഫോർസെപ്സ് എന്ന ഉപകരണം പോലെതന്നെ പ്രസവഘട്ടത്തിൽ, കൂടുതൽ ഉപയോഗക്ഷമമായ മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടർ. ഈ ഉപകരണം, ജനനമാഗ്നത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയും വെളിയിലേക്ക് വരുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരോഭാഗത്തെ നന്നായി ഇറക്കിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജനനശിശുവിന്റെ തലയോട്ടിയും തലമുടിയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ശിശുവിനെ ആകെ വെളിയിലേക്കുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്നു പറയാം.

1956-ൽ മാം സ്റ്റ്രോം (Malam Strom) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണ

ഞെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണപത്രികയിൽ, തന്റെ സ്വന്തം ഉപകരണത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ എപ്രകാരം അനയോജ്യമാണെന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രരീत्या ന്യായീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാന്ത്രികോപയോഗസൗകര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലും ഫോർസെപ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.



ചിത്രം 149: വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടറർ
(VACUUM EXTRACTOR)

വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടററും, ഫോർസെപ്സും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടകാരി ഫോർസെപ്സ് ആണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടറന്മാർ ഇതു് ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ഉപകരണത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്.

വാക്വം ബോട്ടിൽ (Vacuum Bottle-വായു ബാഹിഷ്കരണി)

അങ്കനം ചെത്തിട്ടുള്ള ഡയൽ (Gauge).

റബ്ബർ അടപ്പ് (Rubber Stopper)

ലോഹക്കുഴലുകൾ 3 (Metal pipes)

പമ്പ് (Pump)

പമ്പ് (Pump Hose)

വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പകൾ (Extraction Cups)

പല വലിപ്പത്തിലുള്ള കപ്പകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയ്ക്ക് 30, 40, 50, 60 മില്ലിമീറ്റർ വീതം വ്യാസമാണുണ്ടായിരിക്കുക.

ഉപകരണം കടത്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ജനനമാർഗ്ഗം സമീപഭാഗങ്ങളും മാത്രം മരവിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് (Local Infiltration Anaesthesia) ജനനശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിൽ ഇറുകിയിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ കപ്പ് പിടിപ്പിച്ച് കുട്ടിയെ പുറത്തേയ്ക്കെടുക്കുന്നത്. സന്ദർഭാനുസരണം അനുയോജ്യമായ കപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ വായഗ്രം ജനനമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കത്തക്കവണ്ണം യോനിയിലേയ്ക്കുവെച്ച് പിന്നോട്ട് അല്പം ബലമായി പെരിനിയത്തിന്റെ നേക്ക് അമർത്തി വേണം ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കടത്തുവാൻ. രണ്ടു വിരലുകളുടെ സഹായത്താൽ കപ്പ്, ശിശുശിരസ്സിനു നേക്ക് തള്ളി, അതിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും പിൻഭാഗവും കൂടി ഒരുമിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പിൻഭാഗവും കീഴ്ഭാഗവും തനിച്ചോ നേരിട്ടു പറിച്ചെറിയിക്കത്തക്കവണ്ണം വയ്ക്കുക. കപ്പിന്റെ മുന്നോട്ടു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉരുണ്ട മൂടഭാഗം ജനനമാർഗ്ഗത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായി മുൻവശത്തേയ്ക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇട

യാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം; കാരണം ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന പക്ഷം ജനനമാഗ്ഗ്ദിശയ്ക്ക് നേരെന്നിന്നും കൂടുതൽ അകന്നതും കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞതുമായ ഒരു ദിശയിലേയ്ക്കായിരിക്കും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തിപ്രയോഗം ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ യോനീമാഗ്ഗ്ത്തിനനുസരണമല്ലാതെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ ദിശയിലേയ്ക്ക് ശിശുശിരസ്സ് വലിക്കപ്പെടുന്നതും ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എന്ന അപകടസാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ശിശുശിരസ്സിന്റെ യുക്തമായ ഭാഗത്തു് ഡാക്ടർ വിരലുകളുടെ സഹായത്താൽ കപ്പ് ശരിയായി ചേർത്തുപിടിച്ചുവെക്കുമ്പോൾ മിഡ്‌വൈഫ് അതേസമയംതന്നെ വായുബാധിപ്പിക്കണം. നടത്തി ശുന്യാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. സാധാരണ അന്തരീക്ഷസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പത്തിൽ രണ്ടുഭാഗം എന്ന കണക്കിനാണു് ശുന്യാവസ്ഥ സംജാതമാകേണ്ടതു്. ശിശുശിരസ്സിന്റെ പുറത്തായി കപ്പിനുള്ളിൽ വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു രൂപപദാർത്ഥം രൂപവൽകൃതമാകുന്നതിനു് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ആവശ്യമാണു്. കപ്പിന്റെ വാൽവുചുറ്റും പുറമേ ചുണ്ടുവിരലോടിച്ചു്, കപ്പിനുള്ളിലേയ്ക്കു് ശിരോഭാഗമല്ലാതെ യോനീഭിത്തിയുടേയോ, ഗർഭാശയകണ്ഠത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗംകൂടി അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു് പരിശോധിക്കുവാൻ ഈസമയം ഉപയോഗിക്കണം. രണ്ടുമൂന്നു മിനിറ്റിനുശേഷം ശുന്യം സാധാരണ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന്റെ പത്തിൽ നാലു് എന്ന കണക്കിന്നും, അതേ ഇടനേരത്തിനുശേഷം പത്തിൽ ആറായും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവസാനമായി പത്തിൽ ഏതായും വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ ഇടവേളകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമേ ശിശുശിരസ്സ് പുറത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കാൻ പാടുള്ളു. ശിരോപരിഭാഗത്തു് ഉണ്ടാകേണ്ട കൊ

ഴുത്ത ദ്രവപദാർത്ഥമാണ്, ഉപകരണവിച്ഛേദനത്തിനിടയാകാതെ ശിരസ്സും കപ്പലുതമ്മിൽ പററിച്ചേർന്നിരിക്കുവാനും പുറത്തേയ്ക്കു വലിച്ചെടുക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സമയം ആവശ്യത്തിന് അനുവദിച്ചശേഷമേ അടുത്ത പടിയിലേയ്ക്കു കടക്കാവൂ.

മേൽവിവരിച്ച പ്രകാരമെല്ലാം ചെയ്തതിനുശേഷം ശിശുവിനെ പുറത്തേയ്ക്കു വലിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ശ്രമം ഇടവിട്ടിടവിട്ടമാത്രമേ നടത്താവൂ, എന്നു തന്നെയുമല്ല ഗർഭാശയത്തിന് സ്വയമുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചവികാസങ്ങളോടൊപ്പം മാത്രമേ ഇതു ചെയ്യുവാനും പാടുള്ളൂ.

വാക്വം എക്സ്ട്രാക്റ്ററിന്റെ ഉപയോഗത്താലും ചുംഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ സ്ഥാനനില, ഉപസ്ഥാശയത്തിന് ചുവട്ടിൽ പുകുപശ്ചത്തു് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഇസ്ട്രീയം എന്ന അസ്ഥിഭാഗത്തിന്റെ നിരപ്പിലേയ്ക്കു താഴ്ന്നിറങ്ങിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത നിരപ്പിനു താഴോട്ടു എത്രമാത്രം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഉപകരണം പ്രയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം സൂതിശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധരുടെയും അഭിപ്രായം.

ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം, ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ മാതാവിനും ശിശുവിനും ഉണ്ടാകുവാനിടയുള്ള പരിക്കുകളോ മറ്റപകടങ്ങളോ വളരെ ലഘുവായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്.

ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള പ്രസവത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ദോഷമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രസവത്തിനു കൂടുതൽ താമസം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ വിമ്മിഷ്ടം കൂടുതലുള്ള ഗർഭിണികളിൽ പ്രസവം എളുപ്പം നടത്തുന്നതിന് ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ (തുടർച്ച)

ക്രേനിയോട്ടമി (CRANIOTOMY):-

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല തുരന്ന് കുട്ടിയെ എടുക്കാറുണ്ട്. തല തുരന്ന് തലച്ചോറുകളെന്നതുകൊണ്ട് തലയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതും കുട്ടിയെ സുഗമമായി പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്.

കാരണങ്ങൾ:-

1) ശിശു ഗർഭാശയത്തിൽ മരിച്ചുകിടക്കുകയോ, ശിശുശിരസ്സ് ക്രമത്തിലധികം വലുതായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രകൃത്യാലുള്ള പ്രസവം നടക്കുവാൻ യാതൊരുസാധ്യതയുമില്ലാതിരിക്കുക.

2) ശസ്ത്രപ്രയോഗംകൊണ്ടോ ജനനമുഖം തിരിച്ചോ കുട്ടിയെ എടുക്കുവാൻ യാതൊരുനിവൃത്തിയുമില്ലാതെ വരിക,


3) ശിരസ്സ് ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസ്സുകളിൽ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ നിലകളിൽ ശിരസ്സ് തിരിഞ്ഞ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു വരാതിരിക്കുകയും ശസ്ത്രപ്രയോഗംമൂലം കട്ടിയുടെ തല എടുക്കാൻ കഴിയാതെവരികയും ചെയ്യുക.

4) പൂപ്പം, കാലു എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ജനനമുഖമായി വരുന്ന കേസ്സുകളിൽ ശിശുശിരസ്സ് ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ തിങ്ങിയിരുന്നുപോവുക.

5) മുഖം, ജനനമുഖമായിവരുന്ന പ്രസവത്തിൽ ശിശുവിന്റെ താടിതിരിഞ്ഞ് ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കു വരാതിരിക്കുമ്പോൾ, ശസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടും തല പുറത്തേയ്ക്കുടുക്കുവാൻ കഴിയാതെവരിക.

6) ശിശുശിരസ്സ് വെള്ളംകൊണ്ടുനിറഞ്ഞ് വളരെ വലുതായിരിക്കുക.


7) ഉപസ്ഥാശയം വളരെച്ചുരുളായിരിക്കുക.



ചിത്രം 150: CRANIOTOMY

LONGITUDINAL SLIT MADE BY PERFORATOR.

(രസ്രുനിർമ്മാണോപകരണംകൊണ്ട് നെടുകെ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു)



ചിത്രം 151: CRANIOTOMY:


യോനീമാറ്റേണ രസ്രനിർമ്മാണോപകരണം. കൈവീരലു കളുടെ സഹായത്താൽ കടത്തുന്നു. അതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ ഫോർസെപ്സ് എന്ന ഉപകരണത്താൽ ശിശുശിരസ്സ് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചശേഷം, യോനീയിലേയ്ക്കു കടത്തപ്പെടുന്ന രസ്രനിർമ്മാണോപകരണം. ശിരസ്സിനനേരെ, സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ കടത്തുന്നു.



ചിത്രം 152: CRANIOTOMY

LANCE LIKE PERFORATOR IS INTRODUCED IN TO
THE CRANIUM OF THE DEAD FETUS.

ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ശിശുവിന്റെ
തലയോട്ടിക്കുള്ളിലേയ്ക്ക് ശുലം പോലെയുള്ള രസ്സനി
യ്ക്കാനോപകരണം കയറ്റുന്നു.



ചിത്രം 153: CRANIOTOMY

CRANIOCLAST APPLIED TO PERFORATED HEAD OF FETUS

പാരമുണ്ടാക്കിയ ശിശുശിരസ്സിൽ ക്രേനിയോക്ലാസ്റ്റ് എന്ന ഉപകരണം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിൽ ശിശുശിരസ്സുതരന്ന് തലച്ചോറു കളഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ക്രേനിയോട്ടമി നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഗർഭാശയഗളത്തിലും യോനിയിലും മൂത്രാശയത്തിലും ക്ഷതമേല്ക്കാനും തൽഫലമായി പഴുപ്പുണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണയായി ശിശു മരിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സാധാരണ

മാഗ്നളിലൂടെ പ്രസവം നടക്കയില്ലെന്ന ബോധ്യമായാൽ ശിശു മരണപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ സിസ്സേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ (Lower Segment Caesarian) ചെയ്ത് കട്ടിയെ എടുക്കുകയാണിപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്നത്. അതിനാൽ ക്രേനിയോട്ടമി ഇക്കാലങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടേ ചെയ്തുവരുന്നുള്ളൂ.

ഡീക്യാപ്പിറേഷൻ (DECAPITATION):—


ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് മുറിച്ച് അതിനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ഡീക്യാപ്പിറേഷൻ എന്നു പറയുന്നത്.

താഴെപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും.



ചിത്രം 154: DECAPITATION

ശിരഃഛേദിക്കുവാൻ ശസ്ത്രക്രിയ: പുറംപോലുള്ള കൊളുത്തു് യഥാസ്ഥാനത്തുറപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ മുഴുപോലുള്ള ഭാഗം കരവസരത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കും.



ചിത്രം 155: DECAPITATION
BRAKING THE SPINE BY A TURN OF BRAUN'S
DECAPITATION HOOK.
(ബ്രൗൺസ് ഡി ക്യാപ്പിറേഷൻ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ച്
നട്ടെല്ല് ഒടിക്കുന്നു)

- 1 ഗർഭത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവ കുറുകെയും വിലങ്ങനെയുമായി പൂട്ടുവീണ പോലെ (Locked twins) കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രസവം സ്വാഭാവികമായി നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാതിരിക്കുക.
- 2 ഗർഭസ്ഥശിശു വിലങ്ങനെ കിടക്കുകയും അതിന്റെ കൈ ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയും ജനനമുഖം തിരിച്ചാൽ ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോകത്തക്ക രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് മുറിച്ച് ക്ഷാത ഗർഭിണിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാ

യിരിക്കും. ഡീക്ടാപ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ജനനമാഗ്നത്തിൽ ക്ഷതങ്ങൾ ഏല്പാനിടയുണ്ട്.

ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ:-

(INDUCTION OF LABOUR)

മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രസവിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്നു പറയുന്നത്.

കാരണങ്ങൾ:-

- 1 ഉപസ്ഥാശയത്തിന് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. മുപ്പത്തിയാറാളയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പ്രസവിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ഉത്തമം. അതിനുമുമ്പ് പ്രസവിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.
- 2 മുൻ പ്രസവങ്ങളിൽ മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് കുട്ടി മരിച്ചുപോവുക പതിവായിരിക്കുക.
- 3 ഗർഭിണിക്ക് ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗങ്ങൾ, രക്തവിളച്ച് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മാസം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രസവിപ്പിക്കേണ്ടതായിവരും.

വെർഷൻ (VERSION-തിരിക്കൽ):-

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശയനനിലയെ മാറ്റിത്തിരിച്ച് ശിരസ്സോ, പൃഷ്ഠമോ ജനനമുഖമാക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് വെർഷൻ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ തിരിക്കൽ സമ്പ്രദായം സന്ദർഭാനുസരണം പലവിധത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്.

1. കെഫാലിക് വെർഷൻ:-


(CEPHALIC VERSION)

ജനനമുഖത്തെ തിരിച്ച് സ്വാഭാവികവും സുഗമവുമാക്കിത്തീർക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ പൃഷ്ഠം, തോൽ എന്നിവ ജനനമുഖമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് തിരിച്ചു ശിരോഭയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ കെഫാലിക് വെർഷൻ രണ്ടു

വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. ബാഹ്യമായ തിരിക്കൽകൊണ്ടും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായി ഏകസമയത്തുള്ള തിരിക്കൽ കൊണ്ടും ഇതു സാധിക്കുന്നു.

a) എക്സ്‌ടേർണൽ കെഫാലിക് വെർഷൻ:-
(EXTERNAL CEPHALIC VERSION)


ഒരു കൈ ഗർഭാശയത്തിന് മുകളിലോരത്തും മറ്റേ കൈ നാഭീഭാഗത്തും വച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശയനനിലയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉദ്ദേശപരിഭാഗത്തു ചെയ്യുന്ന ക്രിയയ്ക്കാണ് എക്സ്‌ടേർണൽ കെഫാലിക് വെർഷൻ എന്നു പറയുന്നത്.



ചിത്രം 156: ബാഹ്യമായ കെഫാലിക് വെർഷൻ
(EXTERNAL CEPHALIC VERSION)

b) ബൈപോളാർ വെർഷൻ:—
(BIPOLAR OR COMBINED VERSION)


ഇടതുകരം ഉദരത്തിനു മീതേ വച്ചുകൊണ്ട് വലതുകയുടെ രണ്ടു വിരലുകൾ യോനീമാത്രേണ കടത്തി ജനനമുഖം തിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് ബൈപോളാർ വെർഷൻ എന്നു പറയുന്നു.



ചിത്രം 157

**BIPOLAR OR COMBINED
 VERSION: FIRST STAGE**

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിലും പൃഷ്ഠഭാഗത്തും ഒരേ സമയം മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശിരസ്സും പൃഷ്ഠവും ഒരേ ദിശയിലേയ്ക്കു തിരിയത്തക്കവണ്ണം ചലനമുണ്ടാക്കുന്നതീതി. ഇപ്രകാരമുള്ള ബാഹ്യ പ്രേരണയാൽ ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ മറേറതുജനനമുഖത്തിനും സ്ഥാനചലനമുണ്ടാക്കി പകരം ശിരസ്സോ പൃഷ്ഠമോ ജനനമുഖമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം.



ചിത്രം 158

BIPOLAR OR COMBINED VERSION: SECOND STAGE.

ഇരുകാലത്തും ബാഹ്യപ്രേരണയാൽ സ്ഥാനം മാറ്റിയ ശേഷം മാക്കി പുതിയ ജനനമുഖം സ്വീകരിപ്പിക്കുന്ന രീതി. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനം: രണ്ടാം ഘട്ടം.

c) ഇൻടേർണൽ വെർഷൻ (INTERNAL VERSION):-

ഇടത്തെ കയ്യ് വയറിനു മീതേ വച്ചുകൊണ്ട് വലത്തെ കയ്യ് ഗർഭാശത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കു കടത്തി ശിശുവിനെ തിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ഇൻടേർണൽ വെർഷൻ എന്നു പറയുന്നത്. ഇൻടേർണൽ വെർഷൻ നടത്തുന്നത് മുന്നീക്കും പൊട്ടിയ ഉടനെയാണ്.


ഗർഭസ്ഥശിശു ഗർഭാശയത്തിൽ വിലങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇൻടേർണൽ വെഷ്ൻ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശിശുവിന്റെ ശയനനിലയെ തിരിച്ച് പൂഷോഭയമാക്കി മാറ്റുന്നു. ശയനനിലയെ ആന്തരികമായി തിരിച്ച് പൂഷോഭയമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് ഇൻടേർണൽ പൊഡാലിക് വെർഷൻ (Internal Podalic Version) എന്നും പറയുന്നു.



ചിത്രം 159

INTERNAL PODALIC VERSION.

ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ കൈവിരലുകൾ കടത്തി ജനനമുഖം തിരിക്കുന്ന രീതി. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ പൂഷം മാത്രമേ ജനനമുഖമായി വരികയുള്ളൂ. ഒരു കൈ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ കടത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ മറോ കയ്ക്ക് ഗർഭാശയമേൽഭാഗം (Fundus) അങ്ങൊതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അമത്തിപ്പിടിപ്പിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക.



ചിത്രം 160

INTERNAL PODALIC VERSION.

ഒരു കാല് പാത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
കാൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നസമ്പ്രദായം ശ്രദ്ധിക്കുക.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസവങ്ങളിൽ ജനനമുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

- 1 ഗർഭസ്ഥശിശു വിലങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ തിരിച്ച് ശീരസ്സോ പൃഷ്ഠമോ ജനനമുഖമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതാണ്.
- 2 മുഖം, നെറ്റി എന്നിവ ജനനമുഖമായി വരികയും അതു് ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു് ഇറങ്ങാതെ വരികയും ചെയ്താൽ അതു തിരിയേണ്ടിവരും.

- 3 പൊക്കിൾക്കൊടി യോനിയിലേയ്ക്കു വീഴുകയും അതു് തിരിച്ചുവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്താൽ ജനനമുഖം തിരിച്ച് പൂഷം ജനനമുഖമാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണു്.
- 4 ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ, ഹൃദ്യരോഗം, ഗർഭാപസ്സാരം, എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ പ്രസവം കഴിവതും വേഗത്തിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ടു്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനനമുഖം തിരിച്ച് പൂഷോദയമാക്കി പ്രസവം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
- 5 കുട്ടിക്കുമ്പനായി മറുപിള്ള സ്ഥിതിചെയ്താൽ ജനനമുഖം തിരിച്ച് പൂഷം ജനനമുഖമാക്കേണ്ടിവരും.

ജനനമുഖം തിരിക്കേണ്ട പല സന്ദർഭങ്ങളും പ്രസവ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതു വളരെ കരുതലോടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാകുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനനമുഖം തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടാ.

- 1 ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്തും, ശക്തിയായി ചുരുങ്ങിനില്ക്കുന്ന സമയത്തും ജനനമുഖം തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതു്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗർഭാശയം പിളർന്നു പോകാനിടയുണ്ടു്.
- 2 ശിരസ്സോ, പൂഷമോ ഉപസ്ഥാശയത്തിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങി ഉറച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ജനനമുഖം തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതു്.
- 3 ശിശു ശിരസ്സ് വെള്ളംകൊണ്ടു് നിറഞ്ഞു് വളരെ വലുതായിരിക്കുമ്പോഴും ഉപസ്ഥാശയം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴും ജനനമുഖം തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടാ.

ഈവകകര്യങ്ങളൊന്നും മിഡ് വൈഫ് ചെയ്തുകൂടാത്തതാകുന്നു. ഡാക്ടർമാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിവ.

എക്സ് ട്രേണൽ വെർഷൻ ദോഷരഹിതവും, ബൈപോളാർ വെർഷൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും ഇൻടേർണൽ വെർഷൻ വളരെ അപകടകരവുമായ ക്രിയകളാകുന്നു.

പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ (തുടർച്ച)

സിസേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ:-
(CAESAREAN SECTION)

ഗർഭിണിയുടെ വയറുകീറി കുട്ടിയെ എടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് സിസേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ എന്നു പറയുന്നത്.

പ്രധാനമായും താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ് വയറുകീറി കുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നത്.

- 1) ഉപസ്ഥാശയം വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കുക.
- 2) ഗർഭാശയത്തിലോ, യോനീമാഗ്ഗ്ത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മാംസപിണ്ഡവളച്ച് (മുഴ) ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അത് പ്രസവത്തിനു തടസ്സമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

3) നാല്പതുവയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഥമ ഗർഭിണിയെ സ്വാഭാവികപ്രസവത്തിന് അനുവദിച്ചാൽ ശിശുവി-

നും അപകടം സംഭവിക്കുകയാണിടയുണ്ടു്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താവുന്നതാണു്.

4) യാദൃച്ഛികമായുള്ള രക്തസ്രാവം, കുട്ടിക്കുമ്പായി മറുപിള്ള സ്ഥിതിചെയ്യൽ എന്നീ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷനായിരിക്കും മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപായരഹിതമായ പ്രതിവിധി.

സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷനുമുമ്പ്

ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:-

സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ വയറിക്കുന്നതിനുള്ള ഔഷധങ്ങളൊന്നും ഗർഭിണിക്കു കൊടുത്തുകൂടാ. എന്നിമാകൊടുത്തു മലശോധനയുണ്ടാക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ഗുഹ്യഭാഗത്തും വയററത്തുമുള്ള രോമം വെട്ടിച്ച്, സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി ഉരച്ചുകഴുകി തുടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം പ്രസ്തുത ഭാഗങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള രോഗാണുനാശകൗഷധങ്ങൾ പുരട്ടി രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണം.

ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിലേയ്ക്കു് ഗർഭിണിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പ് അവരുടെ മുടി രണ്ടായി പിന്നിയിടുകയും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും മൂത്രമെടുത്തുകുളയുകയും ചെയ്യണം.


സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മിഡ്വൈഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും വയറുകീറി കുട്ടിയെ എടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നു് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഡ്വൈഫും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണു്. അതിനാൽ സിസ്റ്റേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യമായും സംക്ഷിപ്തമായും വിവരിക്കാം.

സിസ്റ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടുവിധത്തിൽ ചെയ്തു വരുന്നു.

A. ലോവർ സെഗ്മെൻറ് ഓപ്പറേഷൻ:--

(LOWER SEGMENT OPERATION)

ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഗർഭിണിയുടെ തല താഴ്ന്നും കാലുകൾ ഉയർന്നും ഇരിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണ് കിടത്തുന്നത്. ആദ്യമായി അവരെ ബോധം കെടുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഡാക്ടർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ക്ത്തികൊണ്ട് ഗർഭിണിയുടെ പൊക്കിളിന്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്നും നേരെ കീഴോട്ട് ഉദരം രണ്ടായി കീറി പിളരുന്നു.




ചിത്രം 161: ഉദരഭിത്തിയിലുള്ള കീറിൽ

(LOWER SEGMENT CAESAREAN: ABDOMINAL INCISION)

ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്‌വണ്ഡത്തിൽ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ: ഉദരഭാഗം നെടുക്കെ ആഴത്തിൽ കീറിയ മാതൃക.

പിളർ ഭാഗത്തു് സലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയ തുണിവെച്ചു് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കടലുകൾ ഒരു വശത്തേയ്ക്കു് മാറിവയ്ക്കുകയും, ഡോയൻസ് റിട്രാക്ടർ (Doyen's Retractor) എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ടു് പിളർ ഉദരഭിത്തികൾ സാവധാനമായി വലിച്ചു് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം പെരിടോണിയം വിലങ്ങനെ



ചിത്രം 162: LOWER SEGMENT CAESAREAN.

ഉദരഭിത്തി പിളർന്നു് അകത്തിവെച്ചുകൊണ്ടു് ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്വശത്തിൽ കറുകെ അല്പം വളഞ്ഞരീതിയിൽ, മൂത്രാശയത്തിനുമുകളിലായി കീറിയിരിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുക.

രണ്ടായി കീറുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂത്രാശയം സ്വയം കീഴോട്ടമറയ്ക്കുകയും അതു കീഴോട്ടമറിയിരിക്കുന്നു. തുടന്ന് ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം ഏകദേശം 9 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കീറിയതിനുശേഷം കട്ടിയുടെ തല വില്ലേററ് ഫോർസെപ്സുകൊണ്ട് പിടിച്ചു പുറ



ചിത്രം 163:

LOWER SEGMENT CAESAREAN:

അധോവണ്ഡശസ്ത്രക്രിയ:

ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്‌വണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ കീറൽ.




ചിത്രം 164:

അധോവണ്ഡശസ്ത്രക്രിയ:

ആദ്യം ഇടുന്ന കീറൽ, കൈവിരലുകൾ കടത്തി അകത്തി വലുതാക്കുന്ന രീതി.

ത്തേയ്ക്കെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് പൊക്കിൾക്കൊടി കെട്ടി മുറിച്ചു മറുപിള്ളയേയും ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നും നീക്കംചെയ്യുന്നു. തുടന്ന് ഗർഭാശയവും ഉദരഭാഗവും തുണുകയും ചെയ്യുന്നു.



ചിത്രം 165: LOWER SEGMENT CAESAREAN:

അയോവണ്ഡ ശസ്ത്രക്രിയ: കീറിയുണ്ടാക്കിയ
വിടവിൽക്കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രസവം.

ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെങ്കിലും അതു ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതു കൊണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല.


ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതായാൽ ചില പ്രത്യേക മെച്ചങ്ങളുണ്ട്. അവ:—

a) ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു്, മേൽഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ചു് രക്തപ്രവാഹം കുറവാണ്. അതിനാൽ രക്തസ്രാവം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും.

b) പെരിട്രോണിയത്തിൽ കൂടുതൽ നീളത്തിൽ മുറിവുണ്ടാകേണ്ടതായി വരുന്നില്ല.

c) ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം, മേൽഭാഗത്തെക്കാൾ നേർത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് തുണലിടുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്.

d) ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തിടുന്ന തുണലുകൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കുന്നതിനാൽ, പിന്നീടുള്ള പ്രസവത്തിൽ ആ ഭാഗം, അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറേ



ചിത്രം 166

LOWER SEGMENT CAESAREAN: കീറിയ ഗർഭാശയത്തിന്റെ അധോഭാഗം തുണന്ന രീതി.

ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പോകാറില്ല.

e) മരണനിരക്കും താരതമ്യേന വളരെ കുറവായിരിക്കുന്നു.



ചിത്രം 167: LOWER SEGMENT CAESAREAN:
ഗർഭാശയത്തിന്റെ കീഴ്വശത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെരിടോണിയം തുറന്നു.

ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷനുശേഷം മലദ്വാരമാറ്റേണ സലൈൻ ഗ്ലൂക്കോസ് (Saline Glucose Solution) കൊടുക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷനുശേഷമുള്ള പത്രണ്ടു മണിക്കൂർനേരത്തേക്കും അതിനുശേഷവും വെള്ളവും പാലും


മല്ലാതെ മററൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അതുതന്നെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഒരുൺസിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ല. നാലാംദിവസം ഗ്ലിസറിൻ എനിമാ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടിക്ക് മൂല കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം മററസുഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചാരിയിരുത്തുകയാണുണ്ടല്ലത്. “ലോക്കിയാ” ശരിക്കു ഷുക്രിപ്പോകുവാൻ ഈ സമ്പ്രദായമാണ് അഭികാമ്യം.

B. അപ്പർ സെഗ്മെന്റു് ഓപ്പറേഷൻ:—

(UPPER SEGMENT OPERATION)

ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഖണ്ഡത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പൊക്കിളിന്റെ അല്പം മീതെവരെ ഉദരഭാഗം നെടുക്കെ കീറുന്നു. അതിനുശേഷം ലോവർ സെഗ്മെന്റു് ഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്തതുപോലെ കടലുകൾ ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു മാറിയതിനുശേഷം ഗർഭാശയത്തിന്റെ മേൽഭാഗം 10 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നെടുക്കെ കീറുന്നു. ഗർഭാശയഭിത്തിയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് മറുകുട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രക്തസ്രാവം സാധാരണയിൽ വളരെക്കൂടിയിരിക്കും. എങ്കിലും ഇതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം ശിശുവിനെയും മറുപിള്ളയേയും പുറത്തെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഗർഭാശയം ചുരുങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതും രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നതുമാണ്. മറുകുട്ടി ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഉടനെ ഹേദിക്കുന്നതും അതോടുകൂടി മുന്നീർ പുറത്തേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കുന്നതുമാണ്. മറുകുട്ടി ഗർഭാശയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുന്നീർക്കും ഭേദിക്കുമ്പോഴേ മുന്നീർ പ്രവാഹമുണ്ടാകുവുള്ളു. തുടന്ന് ഡാക്ടറുടെ ഒരു കയ്യ് ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ കടത്തി ശിശുവിന്റെ കാലുകൾ പിടിച്ച് അതിനെ പുറത്തേയ്ക്കെടുക്കുന്നു.



ചിത്രം 168

THE ABDOMINAL CAESAREAN SECTION: CLASSICAL
ഉദരഭിത്തിയിലുള്ള സിസ്റ്റേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ:
പ്രാമാണിക മാതൃക. ഉദരഭിത്തി ഭേദിച്ച
ശേഷം ഗർഭാശയഭിത്തിയിൽ പിളർക്കാനുള്ള
രേഖ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുടനെ “പിറേറാ
സിൻ” എന്ന ഇൻജക്ഷൻ (Pilocin 5 units) ഗർഭാശ
യത്തിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്
ഗർഭാശയസങ്കോചം ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതിനും രക്തസ്രാ
വം തടയുന്നതിനും സഹായകമായിത്തീരുന്നു. അനന്തരം
ഗർഭാശയം പൊന്തിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് സലൈൻ ലോ
ഷനിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ പാഡുകൊണ്ട് അമർത്തുന്നു. ശി
ശുവിന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ രണ്ടു സ്ഥലത്തും
ക്ലാമ്പുചെയ്തുകൊണ്ട് നടുവിൽ മുറിച്ചു ശിശുവിനെ വേർ



ചിത്രം 169: ഗർഭാശയഭിത്തി പിളർന്ന് ശിശുവിനെ എടുക്കുന്ന രീതി.

പെട്ടത്തുന്നു. പൊക്കിരക്കൊടി കെട്ടി, മറുകുട്ടിയും മുന്നീർക്കടത്തോലും നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം ഗർഭാശയം തുന്നി വസ്ത്രകയും തുടന്ന് ഉദരഭാഗവും തുന്നിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.


മേൽവിവരിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾ കൂടാതെ, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തോളെല്ലഭാഗംകണ്ട് രണ്ടായി മുറിച്ച് പ്രസവവൈഷമ്യം ലഘൂകരിക്കുന്ന ക്ലൈഡോട്ടമി (Cleidotomy), ഗർഭസ്ഥശിശുവിനെ ഗർഭാശയത്തിൽവച്ചുതന്നെ തുണ്ടുതുണ്ടായി മുറിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്ന എംബ്രിയോട്ടമി (Embryotomy),

നട്ടെല്ലു രണ്ടായി മുറിച്ച് ഉടൽ രണ്ടു ഭാഗമാക്കി പുറത്തെടുക്കുന്ന സ്പോൺഡൈലോട്ടമി (Spondylotomy),


വജ്രയിനൽ സിസ്റ്റേറിയൻ സെക്ഷൻ (Vaginal Caesarian Section),

പ്യൂബിയോട്ടമി (Pubiotomy)


തുടങ്ങിയ മറ്റനേകം ശസ്ത്രക്രിയകളും പ്രസവസംബന്ധമായി നിലവിലുണ്ട്. വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇക്കാലങ്ങളിൽ നടത്താറുള്ളൂ.




ചിത്രം 170: ക്ലൈഡോട്ടമി-CLEIDOTOMY.




ചിത്രം 171: എംബ്രിയോട്ടമി—EMBRYOTOMY.



ചിത്രം 172: സ്പോൺഡൈലോട്ടമി—SPONDYLOTOMY.
(Delivery of the distal half of the body after
Spondylotomy)



ചിത്രം 173:




ചിത്രം 174:

വജൈനൽ സിസ്സേറിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ—

VAGINAL CAESARIAN SECTION.


1. Incision on the Cervix and Lower Uterine Segment:
(ഗർഭാശയഗുളവും, കീഴ്വണ്ഡവും കീറിപ്പിളർന്നിരിക്കുന്നു)
2. The suturing-up of the Cervix and Lower Uterine Segment after delivery.
(പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയഗുളവും, കീഴ്വണ്ഡവും തുറന്നു)



ചിത്രം 175: പ്യൂബിയോട്ടമി-PUBIOTOMY.


ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷമുള്ള പരിചരണങ്ങൾ:-

ഓപ്പറേഷനുശേഷം രോഗിയെ കിടക്കയിൽ കൊണ്ടു പോയി കിടത്തി ഒരു കമ്പിളികൊണ്ട് പുതപ്പിക്കുന്നു. അവർക്കു ബോധം വീണ്ടുകിട്ടുന്നതുവരെ മിഡ്‌വൈഫ് അവരുടെ സമീപത്തുനിന്നും മാറിത്തുടങ്ങാ. ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനുശേഷം രോഗി അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുന്നതും തന്നിമിത്തംകട്ടിലിൽനിന്ന് മറിഞ്ഞുവീഴാനിടയുള്ളതുമാണ്. അബോധാപസ്ഥയിൽ രോഗി ഹർദ്ദിച്ചു എന്നും അതു് ശ്വാസനാളത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാക്കി കൂടുതൽവൈഷമ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും വരേപുന്നതാണ്. അതിനാൽ രോഗിയുടെ തല അവരുടെ ഇടുത്തുഭാഗത്തേയ്ക്ക് ചരിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതും കഴുത്തിനുചുറ്റും ഒരു രൂവാലയോ മഫ്ളറോ മടക്കിച്ചുറ്റി വയ്ക്കുകയും ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഹർദ്ദിക്കുവേണ്ടി അടുത്തുതന്നെ സൗകര്യപ്രദമായി വച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡാക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണംമാത്രം ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു.




ചിത്രം 176: OBSTETRIC OPERATIONS.

Instruments for forceps operation. The Surgeon Selects the appropriate Obstetric forceps. Tracheal Catheter and trap should always be available.




ചിത്രം 177: OBSTETRIC OPERATIONS.

Instruments for dilatation and Curettage for the treatment of abortion. Several sizes sharp and semi sharp curets should be available. The graduated Hegar's dilators illustrated have shields to prevent slipping through the uterus.



Uterine curet

ചിത്രം 178:



Hegar's dilators


ചിത്രം 179



Vaginal speculums
a—grooved; b—flat, elevator



Bullet
forceps for grasping the lips of the cervix uteri



Mjuso forceps
(double-pronged)



Dressing forceps



Uterine
probe graduated in centimetres

വിസർജ്ജനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥ

എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം—EXCRETORY SYSTEM)


ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർജ്ജ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾക്കാണ് വിസർജ്ജനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. വിസർജ്ജനേന്ദ്രിയവ്യവസ്ഥയിൽ വൃക്കകൾ, ഗ്ലാസുകോശങ്ങൾ, ത്വക്ക് എന്നീ അവയവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനേന്ദ്രിയം വൃക്കകൾ (കിഡ്നീസ്—Kidneys) ആകുന്നു.

ഗർഭകാലത്തും പ്രസവസമയത്തും പ്രസവിച്ചുകിടക്കുമ്പോഴും വൃക്കകളിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മൂത്രമാർഗ്ഗങ്ങളിലും രോഗബാധയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉള്ളതിനാൽ വൃക്കകളേയും അനുബന്ധിതാവയവങ്ങളെയും പറ്റി മിഡ്വൈഫിന് സാമാന്യമായ അറിവെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

വൃക്കകൾ (KIDNEYS):—

ഏകദേശം പത്തു സെന്റിമീറ്റർ നീളവും, ആറു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും, മൂന്നു സെന്റിമീറ്റർ ഘനവും അമരവിത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളവയുമാണ് വൃക്ക

കൾ. ഇവ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഉദര അറയുടെ മേൽഭാഗം കണ്ട് ആമാശയ (Stomach) അതിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തു്



ചിത്രം 181: വൃക്കകളും അനുബന്ധിതാവയവങ്ങളും

1. ഇടത്തെ വൃക്ക (Lft Kidney)
2. മുതുന്നാളികൾ (Rt & Lft Ureters)
3. മുതസഞ്ചി (Bladder)
4. മുതുദാറം (Urethra)

നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഓരോ വൃക്ക വീതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഓരോ വൃക്കയിലും ഓരോ വലിയ രക്തധമനിവഴി രക്തം വന്നുചേരുകയും ഓരോ വെയിൻ (സിർ) വഴി രക്തം തിരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്തത്തിൽനിന്ന് യൂറിയ തുടങ്ങിയ ലവണങ്ങളും അധികമുള്ള ജലവും മറ്റു മലിനപദാർത്ഥങ്ങളും കിഡ്നികൾ (വൃക്കകൾ) വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം രക്തത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കിഡ്നിയിൽനിന്നും താഴോട്ടുവരുന്ന ഓരോ കഴലുകൾ (യൂറിനർ-Ureter) വഴി താഴെയുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിൽ പെന്റുചേരുന്നു.

കിഡ്നികൾ രക്തത്തിൽനിന്നും അരിച്ചെടുത്ത യൂറിനോഴ്സ് വഴി ബ്ലാഡറിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്ന് യൂറിത്രാവഴി വെളിയിലേയ്ക്കും വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തെയാണ് മൂത്രം (യൂറിൻ-Urine) എന്നു പറയുന്നത്. കിഡ്നികളിൽനിന്നും തുളളിതുളളിയായി ഊറിവരുന്ന മൂത്രം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന സഞ്ചിക്കാണ് മൂത്രസഞ്ചി അഥവാ മൂത്രാശയം (യൂറിനറി ബ്ലാഡർ-Urinary Bladder) എന്നു പറയുന്നത്. വൃക്കകളിൽനിന്നും മൂത്രത്തെ മൂത്രസഞ്ചിയിലേയ്ക്കു എത്തിക്കുന്ന കഴലുകൾക്കാണ് മൂത്രനാളികൾ അഥവാ മൂത്രനാളങ്ങൾ (Ureters) എന്നു പറയുന്നത്. ഈ മൂത്രനാളങ്ങൾക്ക് 25-30 സെ: മീറ്റർ നീളം വരും. ഇവവഴിയായിട്ടാണ് ഉദര അറയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൂത്രസഞ്ചിയിൽ മൂത്രം വന്നുചേരുന്നത്. മാംസപേശീനിർമ്മിതമായ മൂത്രസഞ്ചി മൂത്രംകൊണ്ടുനിറയുമ്പോൾ ശാരീരികപ്രേരണാനുസരണം, മൂത്രസഞ്ചിയിൽനിന്നും പുറത്തേയ്ക്കുള്ള ഒരു കഴൽവഴിയായി മൂത്രം വിസർജിക്കപ്പെടുന്നു. മൂത്രസഞ്ചിയുടെ കഴൽത്തിൽനിന്നും ആരംഭിക്കുന്നതും, വെളിയിൽപ്പോകവാനുള്ള മൂത്രത്തിന് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായിരിക്കുന്ന

തുമായ ഒരു കഴലുണ്ട്. ഈ കഴലിനാണ് യൂറിത്രാ (Urethra-മൂത്രദാറം-മൂത്രമാറ്റം) എന്നു പറയുന്നത്.

യൂറിററർ: യൂറിത്രാ എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ മൂത്രനാളം എന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഇവ രണ്ടിന്റേയും സ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമായതിനാൽ വൃക്കകൾ (കിഡ്നീസ്) മുതൽ കീഴോട്ടുള്ള മൂത്രമാറ്റത്തെ സംക്ഷിപ്തമായി ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കാം.

കിഡ്നീ (KIDNEY):-

ഇവ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു വൃക്കകൾ എന്നും മൂത്രപിണ്ഡങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവ ആമാശയത്തിനു താഴെയായി പുറകിൽ നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രക്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന മലിനാംശങ്ങളെ അരിച്ചെടുത്ത് വെളിയിൽത്തള്ളുന്ന മുഖ്യാവയവമാണ് വൃക്കകൾ.

യൂറിററർ (URETER):-

ഓരോ വൃക്കയിൽനിന്നും ഓരോ കഴൽ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ അഥവാ മൂത്രാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ കഴലുകളിലൂടെയാണ് വൃക്കകൾ രക്തത്തിൽനിന്നും അരിച്ചെടുക്കുന്ന മൂത്രം (മലിനാംശങ്ങൾ) മൂത്രസഞ്ചിയിൽ എത്തുന്നത്. ഈ കഴലുകളെയാണ് മൂത്രനാളങ്ങൾ (യൂറിററേഴ്സ്) എന്നു പറയുന്നത്.

യൂറിനറി ബ്ലാഡർ:-

(മൂത്രസഞ്ചി അഥവാ മൂത്രാശയം)

അടിവയർ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അത് ഉപസ്ഥാശ

യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മൂത്രം നിറയുമ്പോൾ അത് നാഭിയെല്ലിന്റെ മുകൾ വരെ ഉയർന്നിരിക്കും. സ്രീകുളുടെ മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തും, നാഭിയെല്ലിന്റെ പിൻഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

യൂറിത്രാ (മൂത്രക്കുഴൽ അഥവാ മൂത്രഭാരം):-

മൂത്രാശയത്തിൽനിന്നും വെളിയിലേയ്ക്കുവരുന്നതും ഏകദേശം 4 സെ: മീറ്റർ നീളമുള്ളതുമായ ഒരു ചെറുകുഴലാണിത്. ഈ കുഴലിനെയാണ് യൂറിത്രാ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മൂത്രക്കുഴൽ, മൂത്രഭാരം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിലും പറയുന്നത്. ഈ കുഴലിലൂടെയാണ് നാം മൂത്രവിസർജ്ജനം നടത്തുന്നത്.

യൂറിൻ (മൂത്രം):-

ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മലിനാംശങ്ങൾ മൂത്രരൂപേണയാണ് മുഖ്യമായും വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ ശരാശരി ഒരു ദിവസം 1200 മുതൽ 1500 വരെ മില്ലി ലിറ്റർ (40-50 ഓൺസ്) മൂത്രം വിസർജ്ജിക്കുന്നു. മൂത്രത്തിന്റെ നിറം നേരിയമഞ്ഞയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഗർഭകാല മൂത്രാശയരോഗങ്ങൾ

A. മൂത്രശങ്ക (ഫ്റീക്വൻസി ഓഫ് മിക്ചുറിഷൻ—FREQUENCY OF MICTURITION)

കൂടകൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന തോന്നലിനെയാണ് മൂത്രശങ്ക എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

ഗർഭകാലത്തു മൂത്രശങ്കയുണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.

1) ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ആദ്യത്തെമൂന്നുമാസങ്ങളിൽ കൂടകൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ഇക്കാലത്തു ഗർഭാശയം മൂത്രാശയത്തിലേയ്ക്കു അല്പം അമരുന്നതിനാലാണ് ഈ തോന്നലുണ്ടാകുന്നത്. ക്രമേണ ഗർഭാശയം വലുതായി അതു നാഭിയെല്ലിന്റെ മുകളിലേയ്ക്കുയരുന്നതോടുകൂടി ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വയം മാറുന്നതാണ്. ഗർഭകാലത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലും മൂത്രശങ്കയുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതിനുകാരണം കുട്ടിയുടെ ജനനമുഖം (ആദ്യം വരുന്നഭാഗം) ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങി മൂത്രാശയത്തിനുമേൽ അമരുന്നതുകൊണ്ടുമാകുന്നു. മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കാനിടയായാലും, മൂത്രവസ്തിക്കു (മൂത്രസഞ്ചി) വീക്കം (cystitis) സംഭവിക്കുന്നതിനാലും മൂത്രശങ്കയുണ്ടാകുന്നതാണ്.

2) പ്രസവസമയത്തു് ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തല ഇറങ്ങിവരുന്നതോടുകൂടി മൂത്രശങ്കയുണ്ടാകും. അതിനാൽ പ്രസവ വേദനയുടെ ആരംഭം മുതൽ കൂടെക്കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കുവാൻ ഗർഭിണിയെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്.

3) പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന കാലത്തും മൂത്രശങ്കയുണ്ടാകാവുന്നതാണു്. ഇതിനുകാരണം മൂത്രം കെട്ടിക്കിടക്കാനിയാവുന്നതോ മൂത്രാശയ വീക്കമോ ആയിരിക്കും.

B. മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കൽ:-

(റിറെൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ -RETENTION OF URINE)

ഗർഭകാലത്തു് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് മിക്കവാറും നാലുമാസം ഗർഭമായതിനുശേഷമായിരിക്കും. ഗർഭാശയം ഉപസ്ഥാശയത്തിലേയ്ക്കു് പിന്നോക്കം ചരിയുന്നതു (റിട്രോവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിഡ് യൂടേഴ്സ് -Retroversion of gravid uterus) കൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഗർഭാശയത്തിന്റെ കഴുത്തു (cervix) മുന്നോട്ടു വന്നു് മൂത്രാശയത്തിന്മേൽ അമരുന്നതും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയാതെ മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കാനിടയാകുന്നതുമാണു്.

പ്രസവത്തിന്റെ പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ കൂടെക്കൂടെ മൂത്രവിസർജ്ജനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിൽ മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കാനിടയാകുന്നു. പ്രസവഘട്ടത്തിൽ മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കാനിടയാകുന്നത് പ്രസവവേദനയെ മന്ദീഭവിക്കുന്നതിനുകാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ശിശുശിരസ്സു് മൂത്രക്കുഴലിൽ അമർന്നിരിക്കും. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ മൂത്രം ശരിക്കുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു കെട്ടിനില്ക്കുകയേയുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ മൂത്രവിജ്ജനം സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു.

മൂത്രാശയവീക്കം (സിസ്റ്റൈറ്റിസ് -CYSTITIS):-

പലകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു് മൂത്രാശയവീക്കം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണു്. ഗുരുതരമായ ശാരീരികസ്ഥിതിവിശേഷം ഉളവാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു രോഗമാണിതു്. മൂത്രം

ശയ വീക്കത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നു പറയാവുന്നത് കത്തീറ്റർ ഉപയോഗമാണ്. കത്തീറ്റർ (മൂത്രക്കുരു) ഉപയോഗിച്ചു മൂത്രമെടുക്കുന്നതിലുള്ള അശ്രദ്ധയാണിതിൽ മുന്നിട്ടനിൽക്കുന്ന കാരണം. തിളപ്പിച്ചു രോഗാണു വിമുക്തമാക്കാത്ത കത്തീറ്റർ മൂത്രാധാരം വഴി മൂത്രാശയത്തിലേയ്ക്കു കടത്തുന്നതുകൊണ്ടും, ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ ശുദ്ധിവരുത്താതെ കത്തീറ്റർ കടത്തുന്നതിനാൽ പുറമേയുള്ള അഴുക്കും രോഗാണുക്കളും അകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് അപകട കാരിയായ ഈ രോഗം ബാധിക്കാനിടയാകുന്നത്.

ചെറിയൊരു ശുദ്ധ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവനെ അപഹരിക്കാനിടയാകുമെന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴും മിഡ് വൈഫിനുണ്ടായിരിക്കണം. തിളപ്പിച്ചു രോഗാണുവിമുക്തമാക്കുകയും ഉപയോഗത്തിനുശേഷം വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചു ലോഷണിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത കത്തീറ്റർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്.


മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുചുറ്റുപ്, വേദന, കൂടുകൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന തോന്നൽ, വിറയലോടുകൂടിയ പനി എന്നിവയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടുംവൈകാതെ ഡാക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്.

ഏതു ലട്ടത്തിലായാലും മൂത്രക്രമം (Suppression of urine) വേദനയോടുകൂടിയ മൂത്രവിസർജ്ജനം (painful micturition), എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവയഥാക്രമം വൃക്കരോഗങ്ങൾ, മൂത്രാശരോഗം എന്നിവ മൂലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വിവരം ഡാക്ടറെ ധരിപ്പിച്ച് ചികിത്സിക്കുകയും വേണം.

മൂത്രം എടുക്കുന്ന വിധം

കത്തീറ്റർ (CATHETER):— മൂത്രം എടുക്കാനും മൂത്രവസ്തി കഴുകാനും മറ്റുമുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനാണ് കത്തീറ്റർ എന്നു പറയുന്നത്. കത്തീറ്റർ റബ്ബർ,

ഗ്ലാസ്സ്, ലോഹം, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവകൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ളത്



ചിത്രം 182

മൂത്രമെടുക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന മൂത്രക്കുരു (CATHETER)

റബ്ബർ കത്തീററുകളാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം കത്തീററുകൾ ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്കുപയോഗിക്കുന്ന കത്തീററിന് മെയിൽ കത്തീറർ (Male catheter) എന്നും സ്ത്രീകൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന കത്തീററിന് ഫീമെയിൽ കത്തീറർ (Female catheter) എന്നും പറയും. കത്തീറർ ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പമനുസരിച്ചു പല നമ്പരുകളിലായി ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. സാധാരണയായി പ്രായമായവർക്ക് 8-ാം നമ്പർ കത്തീറർ (Catheter No 8) ഉപയോഗിച്ചാണ് മുത്രമെടുക്കുന്നത്.

ഒരു രോഗി മുത്രം പോകാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ മുത്രം എടുത്തു കളയാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. മുത്രം എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കത്തീറർ വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച് രോഗാണുവിമുക്തമാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ അല്പം വാസ്‌ലൈൻ പുരട്ടി, വശത്തുമാത്രം ദ്വാരമുള്ളതും വണ്ണക്കുറഞ്ഞതുമായ ഭാഗം മുത്രദ്വാരത്തിൽക്കൂടി മേലോട്ടു കയറ്റുക. കത്തീററിന്റെ മുകളറ്റം മുത്രവസ്ഥി (Bladder) കുള്ളിലായാൽ മുത്രം പുറത്തേയ്ക്കു ഒഴുകിവരുന്നതാണ്. മുത്രക്കുരു മുത്രദ്വാരത്തിൽക്കൂടി കടത്തുന്നതിനു മുൻപ്, മുത്രം താഴെവീഴാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി രോഗിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനു ചുവട്ടിലായി ഒരു പാത്രം വച്ചിരിക്കുകയും വേണം.

പുരുഷന്മാർക്കാണ് മുത്രമെടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ലിംഗാഗ്രം നന്നായി കഴുകിയതിനുശേഷം അഗ്രചർമ്മം പുറകോട്ടു പിടിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് കത്തീററിന്റെ വണ്ണക്കുറഞ്ഞഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരം അടിയിൽ വരത്തക്കവിധം കത്തീറർ പിടിച്ച് മുത്രദ്വാരം വഴി സാവധാനത്തിൽ കടത്തുക. രോഗിയെ മലന്തിക്കിടത്തി കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കി മേലോട്ടാക്കി നിറുത്തിക്കൊണ്ടുവേണം മുത്രം എടുക്കേണ്ടത്. ഇരിക്കുമ്പോഴും, മലന്തുകിടക്കുമ്പോഴും മുത്രം എടുക്കാറുണ്ട്.

സ്രീകരക്കാണ് മൂത്രമെടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ കിടത്തി കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കി മേലോട്ടാക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് യോനീമാഗ്ഗം വൃത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് യോനീഭട്ടങ്ങൾ പിടിച്ചുകുറി കതീററർ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കണം.

ചിലപ്പോൾ കത്തീററർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്പം ചോരവരുന്നതും മറുചിലപ്പോൾ മൂത്രംകിട്ടാതെവരുന്നതുമായിരിക്കും. കതീററർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മൂത്രംവരാതിരിക്കുന്നസാഹചര്യത്തിൽ ഡാക്ടറെ വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കതീററർവഴി മൂത്രം വരാതെയിരിക്കുമ്പോൾ മൂത്രവസ്തിക്കു മുകളിൽ ഉദരഭാഗം തുളച്ച് മൂത്രം വലിച്ചെടുക്കുകയാണുചെയ്യുന്നത്.

മൂത്രാശയവസ്തി:-

(ബ്ലാഡർ ലാവേജ്—BLADDER LAVAGE)

മൂത്രാശയം കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുവാൻ ഒരു റബ്ബർ കത്തീററും ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ഫണലും അതിന്റെ അറ്റത്തു ഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച് രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. രോഗിയെ മലർത്തിക്കിടത്തി കാലുകൾ അകറ്റിക്കുത്തിവെച്ച് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ ശരിക്കും ശുദ്ധിയാക്കിയതിനുശേഷം കതീററർ കടത്തി മൂത്രമെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫണലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റബ്ബർട്യൂബും കതീറററുമായി ഘടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടു 100 ഡിഗ്രിയെങ്കിലും ചൂടുള്ള ബോറിക്ക് ലോഷൻ പറ്റു മുപ്പതു മിഡ്ലി ലിറ്റർ വീതം ഫണലിൽ ഒഴിക്കുക. അനന്തരം താഴെവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേയ്ക്കു ഫണൽ കമർപ്പിപ്പിച്ചാൽ മൂത്രാശയത്തിലേയ്ക്കു കടത്തിയ

ലോഷൻ തിരിച്ചൊഴുകി പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നതാണ്. പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. തിരിച്ചു പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്ന ലോഷൻ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതുവരെ ഈ ക്രിയ തുടരണം. അതിനുശേഷം കതീറാർ എടുത്തു മാറുക.

യോനീവസ്തി:-

(വജയിനൽ ഡൂഷ്—VAGINAL DOUCHE)

സാധാരണ എനിമാകാൻ, വജയിനൽ സിറിഞ്ചു എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു യോനീമാഗ്നം കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുന്നതാണ്. ഡൂഷ് ചെയ്യുന്നതിനു സാധാരണ എനിമാകാൻ (Enemacan) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ നോസ്സൽ (Nozzle) മാറിയിട്ടു പകരം വജയിനൽ നോസ്സൽ (Vaginal nozzle) ഘടിപ്പിച്ചു ഡൂഷ് ചെയ്യുകയാണുവേണ്ടത്. ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 4 മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന കണക്കിന് ലൈസോൾ (Lysol) ചേർത്താണ് സാധാരണയായി വജയിനൽ ഡൂഷ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നു മുതൽ ആറുവരെ ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മിഡ്‌വൈഫ് തന്റെ കൈകൾ സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവുമുപയോഗിച്ചു കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയശേഷം രോഗിയെ മലർത്തിക്കിടത്തി കാലുകൾ മടക്കി അല്പം അകറ്റി കുത്തിച്ചുപാച്ചു അവരുടെ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കണം. ആദ്യമായി രോഗിയുടെ ഗുഹ്യഭാഗം സോപ്പുതേച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇടത്തേക്കയുടെ തള്ളുവീരലും ചൂണ്ടുവീരലും ഉപയോഗിച്ചു യോനീഭട്ടങ്ങൾ അകറ്റിപ്പിടിച്ച് വലത്തേ കൈകൊണ്ട് വജയിനൽ നോസ്സൽ മെല്ലെ യോനീഭാഗത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കു കടത്തണം. നോസ്സൽ മെല്ലെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

സാധാരണ സ്ത്രീചെയ്യാനപയോഗിക്കുന്ന
ലോഷനുകൾ:-

1. Boric acid Irrigation

Rx

Boric acid	(20 grs)
D/water	(20 ozs)

2. Pot: Permanganate Irrigation

Rx

Pot: Permanganate	(10 grs)
D/water	(20 ozs)

3. Zinc Chloride Irrigation

Rx

Zinc Chlorid	(5 grs)
D/water	(20 ozs)

മുത്രപരിശോധന (യൂറിൻ ടെസ്റ്റ്—URINE TEST):-

TEST FOR SUGAR:

1) മുത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ടോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്ന വിധം.

Benedict's test:- വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണനാളി (Test tube) എടുത്തു അതിൽ ൨ M. L ബനഡിക്ട് സോള്യൂഷൻ ലായനി (Benedict's Solution) എടുക്കുക ഇതിൽ 8 തുള്ളി മുത്രവും ചേർക്കുക. തുടന്ന് അത് ഒരു സ്റ്റിരിംഗ് ലാമ്പു കത്തിച്ച അതിനുമുകളിൽ പിടിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം തണുക്കുവാനനുവദിക്കുക. മുത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ടെങ്കിൽ ലായനിയുടെ നീലനിറം

മാറി പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ് എന്നീനിറങ്ങളിൽ മൂത്രത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ആധിക്യമനുസരിച്ചുള്ള നിറം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. പച്ചനിറത്തിൽ തീരെക്കറച്ചും മഞ്ഞനിറത്തിൽ അതിലധികവും ചുവപ്പുനിറത്തിനു വളരെക്കൂടുതലും പഞ്ചസാരയുടെ അംശമുള്ളതായി കണക്കാക്കണം.

കുറിപ്പ്:- പതിവായി മൂത്രപരിശോധനയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷണനാളിയെങ്കിൽ ബനഡിക്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷമേ അതിൽ മൂത്രം ചേർക്കാവൂ. മുൻപു പരിശോധിച്ച മൂത്രത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അംശം പരീക്ഷണനാളിയിൽ പററിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണിപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.

TEST FOR ALBUMIN:

2) മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ (Albumin) ഉണ്ടോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്ന വിധം:-

ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണനാളിയെടുത്തു അതിൽ മുക്കാൽഭാഗം മൂത്രം എടുക്കുക മൂത്രത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കിയഭാഗത്തു വെളുപ്പുനിറം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിനോ, ഫോസ്ഫേറോ (Phosphate) ഉണ്ടെന്നുതീർന്നുമാണ്. 5% അസറ്റിക് അസിഡ് (Acetic acid) അല്പം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പുനിറം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ ഫോസ്ഫേറേറ്റ് ഉണ്ടെന്നും, അസറ്റിക് അസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടും വെളുപ്പുനിറം അപ്രത്യക്ഷമാകാതെ നില്ക്കുന്നെങ്കിൽ ആൽബുമിൻ ഉണ്ടെന്നു തീരുമാനിക്കാം.

TEST FOR BILE PIGMENT:-

3) മൂത്രം പരിശോധിച്ചു മഞ്ഞപ്പിത്തമുണ്ടോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധം.

(a) ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ ചകുതിഭാഗം മൂത്രമെടുത്തു നാളി അല്പം ചരിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂത്രത്തിനുമീതെ നിൽക്കത്തക്കവിധം ഒരു മില്ലിലിറർ റിങ്ച്വർ അയോഡിയൻ (Tr Iodine) വളരെ സാവധാനം ഒഴിക്കുക. മൂത്രത്തിൽ പിത്തരസവർണ്ണവസ്തു (Bile Pigment) ഉണ്ടെങ്കിൽ അയോഡിനും മൂത്രവും കൂടി യോജിക്കുന്നഭാഗത്തു് പച്ചനിറം ദൃശ്യമാകുന്നതാണു്. മൂത്രത്തിൽ 'ബൈൽപിഗ്മെൻറ്സ്' പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു് മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗലക്ഷണമാകുന്നു.

TEST FOR BILE SALTS:—

(b) ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ മുക്കാൽഭാഗം മൂത്രമെടുത്തു് അതിൽ അല്പം ഗന്ധകപ്പൊടി (Sulphur) ഇടുക. മൂത്രത്തിൽ പിത്തരസലവണം (Bile Salts) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗന്ധകപ്പൊടി താണു പോകുന്നതായിക്കാണാം. മൂത്രത്തിൽ ബൈൽ സാൾട്ട്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗലക്ഷണമാകുന്നു.

TEST FOR BLOOD:—

4) മൂത്രത്തിൽ രക്തമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നവിധം.

ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ കുറച്ചു മൂത്രമെടുത്തു് അതിലേയ്ക്കു ഏതാനും തുള്ളി റിങ്ച്വർഗയക്കം (Tr Guaia-cum) ചേർത്തു നല്ലവണ്ണം കുലുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ അല്പം ഓസോണിക്ക ഇതർ (Ozonic Ether) പരീക്ഷണനാളി അല്പം ചരിച്ചുപിടിച്ചു വക്കിൾകൂടി സാവധാനത്തിൽ ഒഴിക്കുക. മൂത്രത്തിൽ രക്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുണ്ട നീലവളയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണു്.

TEST FOR PUS:—

5) മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടോ എന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നവിധം.

ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ കുറച്ചു മൂത്രമെടുത്തു് അതിൽ ഏതാനും തുള്ളി ലൈക്കർ പൊട്ടാസി Liq Potass-ae) ചേർത്തതിനുശേഷം അതു് മറെറാരു പരീക്ഷണനാളിയിലേയ്ക്കു ഒഴിക്കുക. മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതു പശുപോലെ കൊഴുത്തുവരുന്നതായിരിക്കും.

എനിമാ


മലാശയം (റെക്റ്റം-RECTUM):-

വൻകുടലിന്റെ കീഴറ്റത്തെ ഏതാണ്ട് 15 സെ. മീറ്റർ ഭാഗത്തിനാണ് മലാശയം (Rectum) എന്നു പറയുന്നത്. മലാശയവും മറവയവങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മിഡ്‌വൈഫ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. മലാശയത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം യോനിയുടെ കീഴ്ഭാഗത്തോടു തൊട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസവത്തിനു മുമ്പ് എനിമാ കൊടുത്ത് മലശോധനയുണ്ടാക്കാത്തപക്ഷം പ്രസവസമയത്ത് കുട്ടിയുടെ തല ഇറങ്ങിവരുന്നതിന് അതു തടസ്സമായിത്തീരുന്നതും പ്രസവത്തിനു താമസം നേരിടുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ കുട്ടിയുടെ തലയിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മലാശയം സമ്മർദ്ദത്തിനു വിധേയമാകുന്നതും തൽഫലമായി മലവിസർജ്ജനം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതുമാണ്. ഇപ്രകാരം മലവിസർജ്ജനമുണ്ടായാൽ അതു പ്രസവജ്വരത്തിനു കാരണമായിത്തീരാവുന്നതുമാണ്.

പ്രസവഘട്ടത്തിൽ പെരിനിയം മുഴുവനായി ചീന്തിപ്പോകാനിടയായാൽ അതോടുകൂടി മലാശയവും കീറിപ്പോവുകയും മലം വെളിയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അർഗ്ഗസ്സ് (മൂലക്കുരു) എന്ന രോഗമുണ്ടെങ്കിലും പ്രസവസമയത്ത് വലിയ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

എനിമാ (ENEMA):-

മലാശയം കഴുകി മലം പുറത്തുകളയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് എനിമാ കൊടുക്കുക, വസ്തിവയ്ക്കുക വയറു കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.



ചിത്രം 183

- 1 ഗ്ലിസറിൻ സിറിഞ്ച് (GLYCERINE SYRINGE)
- 2 എനിമാ സിറിഞ്ച് (ENEMA SYRINGE)

എനിമാ വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു എനിമാകാൻ (Enema Can and Nozzles) നോസ്സലും ആവശ്യമാണ്. തിളപ്പി

ച്ചാരിയ ചെറുചുട്ടവെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് കലർത്തിയാണ് സാധാരണ എനിമാ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം.

എനിമാൻ കാൻ, എനിമാ സിറിഞ്ച്, ഗ്രിസ്സറിൻ സിറിഞ്ച് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് എനിമാ കൊടുത്തുവരുന്നു. എനിമായ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടു സ്കൂൺ ഒലിവെണ്ണയോ ഒന്നോ രണ്ടോസ്കൂൺ ഗ്രിസറിനോ ചേർക്കുന്നതു കൊള്ളാം. ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ സോപ്പുചേർത്തു മാത്രമായും ചുട്ടവെള്ളത്തിൽ ഗ്രിസറിൻ മാത്രം ചേർത്തും ഗ്രിസറിൻ തന്നിച്ചും എനിമായ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വച്ചതിനുശേഷം കിടക്കയിൽ ഒരുറബർഷീറ്റ് വിരിച്ച് രോഗിയെ ഇടത്തോട്ടു ചരിച്ച് കാൽ അല്പം മടക്കിവച്ച രീതിയിൽ കിടത്തണം. അനന്തരം എനിമാകാനിന്റെ അറ്റത്തുള്ള നോസ്സലിൽ അല്പം വാസ്‌ലൈനോ, സോപ്പോ പുരട്ടി മയപ്പെടുത്തിയശേഷം സാവധാനം മലദ്വാരത്തിലേയ്ക്കു കടത്തുക. എനിമാ കൊടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉപകരണത്തിൽക്കൂടി വെള്ളം കടത്തിവിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളു വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തനം ശരിയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

നോസ്സൽ മലദ്വാരത്തിനകത്തു നല്കുവണ്ണം കടത്തിയതിനു ശേഷം എനിമാകാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ റാപ്പ തുറന്നുവിടുക. വെള്ളം മലാശയത്തിലേയ്ക്കു കയറിക്കൊള്ളും. എനിമാകാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു സ്കൂളിൽ വച്ചിരിക്കുകയോ മറ്റൊരാളേക്കൊണ്ട് ഉയർത്തി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യണം.

എനിമാസിറിഞ്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യഭാഗംകഴൽ സോപ്പുവെള്ളത്തിലും നോസ്സൽഭാഗം മലദ്വാരത്തിലും കടത്തിവിച്ച് മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള റബ്ബർഗോളത്തിൽ പിടിച്ച് അമർത്തുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക.

വെള്ളം മുഴുവനും മലാശയത്തിലേയ്ക്കു കയറിക്കഴിയുന്നതുവരെ മലവിസർജ്ജനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം തടയാൻ രോഗിയെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വായുകൊണ്ട് വയറു വീർത്തിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സോപ്പുവെള്ളത്തിന്റെകൂടെ രണ്ടു മില്ലിലിറ്റർ ടെർപ്പൻ ടൈൻ ചുറ്റു് എനിമാകൊടുക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

കുട്ടികൾക്കു് എനിമാ കൊടുക്കുന്നതിനു ഗ്ലിസ്സറിൻ സിറിഞ്ചു് ഉപയോഗിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ഒരു വയസ്സിനു് അഞ്ചു മില്ലിലിറ്റർ ദ്രാവകം എന്ന തോതിലെ കുട്ടികളിൽ വെള്ളം കയറാറുവു ഗ്ലിസ്സറിൻ സിറിഞ്ചിൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തശേഷം അതിന്റെ നോസ്സലിൽ വാസ്തേനോ സോപ്പോ പുരട്ടി മലദാരുത്തിൽ കടത്തി വച്ചു് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതുപോലെ അതിന്റെ പിസ്റ്റൺ തള്ളിയാൽ മതിയാകും.

സലൈൻ എനിമാ:—

(റെക്റ്റൽ സലൈൻ—RECTAL SALINE)

ഓപ്പറേഷനു ശേഷവും, രക്തസ്രാവത്തിനുശേഷവും രോഗിയുടെ ഹൃദയബലത്തിനു വേണ്ടി സലൈൻ മലാശയം വഴിയായി കൊടുക്കാറുണ്ടു്. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനു് 3 ഗ്രാം എന്ന കണക്കിനു് ശുദ്ധമായ കറിയപ്പു ചേർത്തു് സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു എനിമാകാനിൽ ഒഴിച്ചു് റബ്ബർ ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്തു് നോസ്സലും അതിന്റെ അറ്റത്തു് ഒരു കത്തീറ്ററും ഘടിപ്പിച്ചു് സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ തള്ളി തള്ളിയായി കയറത്തക്കവിധത്തിൽ ശരിപ്പെടുത്തി, കത്തീറ്റർ മലദാരുത്തിലേയ്ക്കു കടത്തണം. ഒരു ലിറ്റർ സലൈൻ ഒരു മണിക്കൂർ നേരംകൊണ്ടു കയറാൻ അനുവദിക്കാറുവു. എനിമാകാൻ അര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തി വയ്ക്കരുതു്. ഉയരം കൂടിയാൽ ഒഴുക്കു് വേഗത്തിലാകുന്നതും ഒരുമണിക്കൂറിനു മുൻപു് സലൈൻ ഉള്ളിൽ കയറുന്നതുമായിരിക്കും.

പാനീയങ്ങൾ-

പരിചരണങ്ങൾ

റവക്കഞ്ഞി:-

എട്ടു ററീസ്പൂൺ റവ, രണ്ടു ഗ്ലാസ്സ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുക. വേറെ കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പുചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ഉപ്പുചേർത്ത വെള്ളം തിളച്ചതടങ്ങുമ്പോൾ റവ ചേർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം അതിൽചേർത്തു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർനേരം ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ റവക്കഞ്ഞിയായി.

കൂവപ്പൊടിക്കഞ്ഞി:-

ഒന്നര ററീസ്പൂൺ കൂവപ്പൊടി (Arrow Root), രണ്ടു ററീസ്പൂൺ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കുക അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സ് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളംചേർത്ത് 10 മിനിറ്റുനേരത്തേയ്ക്ക് തിളപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സ് പാലും അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് വീണ്ടും 10 മിനിറ്റുനേരംകൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക.

ബാർലിവെള്ളം:-

15 ഗ്രാം ബാർലി കഴുകി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഏകദേശം മൂക്കാൽ ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം അരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ബാർലിവെള്ളം വളരെ വേഗത്തിൽ പുളിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണുത്തമം.

ആൽബുമിൻവാട്ടർ:-

രണ്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളമാത്രമെടുത്ത് അതിൽ ഒന്നൊന്നര ലിറ്റർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി കുലുക്കുക. പഞ്ചസാര, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തുപയോഗിക്കാം.

എഗ്ഗ് ഫ്ളിപ്പ് (EGG FILP):-

ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള എടുത്ത് അത് നല്ലവണ്ണം അടിച്ചു പതയാക്കി അതിൽ മൂക്കാൽലിറ്റർ ചൂടുപാൽ കുറേയ്ക്കെ ഒഴിച്ചു അടിച്ചു പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുപയോഗിക്കാം. ക്ഷീണം മാറുന്നതിനു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പാനീയമാണിത്. ഒരുൗൺസ് ബ്രാൻഡിക്ടെ ഇതിന്റെകൂടെ ചേർത്തുപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഹേനവും വിശപ്പും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

ഉപകരണങ്ങളും പരിചരണങ്ങളും

ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് (HOT WATER BAG):-

റബ്ബർകൊണ്ടുള്ളതും ചൂടു പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഈ സഞ്ചിയിൽ പകുതിയോളം മാത്രമേ ചൂടു വെള്ളം എടുക്കാവൂ. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതിനുശേഷം വെള്ളം നില്ക്കുന്നതിനു മുകളിലാകാം രണ്ടു കൈകൊണ്ടും അമർത്തി അതിലുള്ള വായു കളഞ്ഞതിനുശേഷം അതിന്റെ പിരിഅടപ്പുകൊണ്ട് നന്നായി പിരിച്ചു മുറുക്കി അടയ്ക്കണം. അടച്ചതിനുശേഷം സഞ്ചി കീഴോട്ടാക്കിപ്പിടിച്ച് വെള്ളം ചോരുന്നില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് അതൊരു തുണികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ ശരീരഭാഗത്തോടു ചേർത്തുവയ്ക്കാവൂ.

ഐസ്സ് ബാഗ് (ICE BAG):-

ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു റബ്ബർ സഞ്ചിയാണിതും. ഐസ്സ് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി പൊട്ടിച്ച് ബാഗിന്റെ കാൽഭാഗം നിറച്ച് അതിൽ കുറെ ഉപ്പുകല്ല് മിട്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ വായു കളഞ്ഞ് നന്നായി മുറുക്കി അടയ്ക്കുക. ഐസ്സ് ബാഗ് വയ്ക്കേണ്ട ശരീരഭാഗത്തു് ഒരു കഷണം ലിൻറു് ഇട്ടു് അതിനുമീതെ വേണം ബാഗ് വയ്ക്കാൻ.

ഫോമെന്റേഷൻ (FOMENTATION):-

താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണു് ആവി പിടിക്കേണ്ടതു്. ആവി പിടിക്കുന്നതിനു് ഒരു ബേസിൻ, മൂന്നോ നാലോ

ആയിരമക്കിയ ഒരു കഷണം ഫ്ലാസ്കിൽ, ഒരു ടെമ്പ്ലിൽ, ബൈൻഡർ, സേഫ്റ്റിപിൻ, തിളച്ചവെള്ളം എന്നിവയെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. ടെമ്പ്ലിൽ നിലവർത്തിവെച്ച് മടക്കിയ ഫ്ലാസ്കിൽ രൂവാല നിവർത്തി അതിനുള്ളിൽവെച്ച് അതു ബേസിനിൽ വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ടെമ്പ്ലിലിന്റെ അറ്റങ്ങൾ ബേസ്സിനു പുറത്തു കിടക്കണം. ഫ്ലാസ്കിൽ മുങ്ങത്തക്കവണ്ണം തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ചു ടെമ്പ്ലിലിന്റെ അറ്റങ്ങൾ പിടിച്ചു മുക്കി പിഴിയുക. വേദനയുള്ള ഭാഗത്തു ഫ്ലാസ്കിൽ കഷണം വരത്തക്കവിധം വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ പണിയിച്ച് ബൈൻഡർ ഇട്ട് സേഫ്റ്റിപിൻകൊണ്ട് കുത്തിപ്പിടിപ്പിക്കണം. വേദന കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാസ്കിലിൽ ടെർപ്പൻറയിൻ തളിച്ചു വെച്ച് കെട്ടാവുന്നതാണ്. പതിനഞ്ചുമിന്നിട്ടിടവിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവയ്ക്കാം. മറ്റൊന്ന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിനുശേഷമേ ആദ്യത്തേതു മാറ്റാവൂ.

ഫോമെന്റേഷൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനു തുല്യം ത്വക്കുകളായി മലയാളത്തിൽ, ആവി പിടിക്കുക, കിഴി കുത്തുക, ചൂടുവയ്ക്കുക, വിയപ്പിക്കുക എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

ടെമ്പറേച്ചർ (TEMPERATURE):-

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ ചൂട് (നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ) 98.4 ഡിഗ്രി 'ഫാരൻഹീറ്റ്' (98.4°F) ആകുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒരാളുടെ ശരീരോഷ്ണാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ ആളിനു പനിയാണെന്നു നാം പറയുന്നു.

ഒട്ടനേകം രോഗങ്ങളുടെ, ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചൂട് 98.4 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുക അഥവാ പനിയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതു്.

ശരീരത്തിന്റെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ (Clinical Thermo-meter) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു സാധാരണ തെർമോമീറ്ററിൽ 95 മുതൽ 110 വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിൽ ഓരോ രേഖയും ഓരോ ഡിഗ്രിയെ കുറിക്കുന്നു. 98-നും 99-നും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചുവന്ന അടയാളം കാണാം. അത് ശരീരത്തിന്റെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിനേ (സാധാരണ ചൂട്) സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തെർമോമീറ്റർ, നാക്കിനടിയിലോ, കക്ഷത്തിലോ, മലദ്വാരത്തിലോ വെച്ച് പനി നോക്കാവുന്നതാണ്.

കക്ഷത്തിലാണ് തെർമോമീറ്റർ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ കക്ഷം തുടച്ചുവേണം വയ്ക്കുവാൻ. മലദ്വാരത്തിലാണെങ്കിൽ തെർമോമീറ്ററിൽ അല്പം വാസ്‌ലൈൻ പുരട്ടുകയും ചെയ്യണം.

കക്ഷത്തിലെ ചൂടിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുതൽ വായിലും, വായിലെ ചൂടിനേക്കാൾ അര ഡിഗ്രി കൂടുതൽ മലദ്വാരത്തിലും എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും.

തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രസം കിടക്കുന്ന ഭാഗം കീഴോട്ടാക്കിപ്പിടിച്ച് കടഞ്ഞു് രസം നോർമലിനാക്കയാക്കണം. തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും സോപ്പും പച്ചവെള്ളവുമുപയോഗിച്ചു കഴുകി ഡെറോറം ലോഷനിൽ മുക്കിക്കടഞ്ഞുവേണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ. തെർമോമീറ്റർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കൂടാ. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടേയും, അബോധാവസ്ഥയിലുള്ളവരുടേയും, അപസ്താരലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുടേയും വായിൽ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചു പനി നോക്കുകയുമാരുത്.

കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ

(ഇൻജക്ഷൻസ് - INJECTIONS):-

സബ്കട്ടേനിയസ്, ഇൻട്രാമസ്ക്കുലർ, ഇൻട്രാവീനസ് എന്നീ കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ. (Technique of Subcutaneous, Intramuscular and Intravenous Injection):-


ഏതുവിധത്തിലുള്ള കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനു മുൻപും കുത്തിവയ്ക്കാനുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണം. കുത്തിവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറിഞ്ചും സൂചിയും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയോ റെക്റ്ററിഫൈഡ് സ്റ്റീരിററിൽ കഴുകി എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവ രോഗാണുവിമുക്തമായി. നിങ്ങളുടെ കൈകളും, സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവുമുപയോഗിച്ചു കഴുകി രോഗാണുവിമുക്തമാക്കിയതിനുശേഷമേ സിറിഞ്ചും സൂചിയും കൈകൊണ്ടെടുക്കാവൂ. സിറിഞ്ചിനുള്ളിലും സൂചിക്കുള്ളിലുമുള്ള വെള്ളമോ സ്റ്റീരിട്ടോ നന്നായി കടഞ്ഞു കളഞ്ഞതിനു ശേഷമേ കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നു വലിച്ചെടുക്കാവൂ.

കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നു ആംപ്യൂളി (Ampule) ൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴുത്തു മുറിക്കുക. (ഗ്രാസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആംപ്യൂൾ മുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഫയൽ മിക്കവാറും മരുന്നുകളോടൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കും.) ആംപ്യൂൾ ഇടത്തുകയ്യിൽ തള്ളിവിരൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു വിരൽകൊണ്ടു പിടിക്കുക. സൂചി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സിറിഞ്ച് വലതുകയ്യിലും പിടിച്ച് ആംപ്യൂളിനുള്ളിലേക്ക് സൂചി കടത്തി അതിലുള്ള മരുന്നു സാവധാനമായി സിറിഞ്ചിനുള്ളിലേയ്ക്കു വലിച്ചെടുക്കുക. ആംപ്യൂളുകളിൽ വരുന്ന മരുന്നു കറ മിക്കവാറും ഒരു ഡോസായിരിക്കും. എന്നാൽ അഞ്ചോ പത്തോ കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നു ഒന്നിച്ച് ചെറിയ കുപ്പികളിലും (Vials) വരാറുണ്ട്. അതും മേല്പറഞ്ഞതുപോലെ പിടിച്ച് കുപ്പിയുടെ മുകളിലെ റബർ ക്യാപ്പിൽക്കൂടി സൂചിയിറക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ സി. സി. മരുന്നു ആവശ്യാനുസരണം വലിച്ചെടുക്കുന്നു.

കുപ്പികളിൽ വരുന്ന മരുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂചി റബർ ക്യാപ്പിൽ കുത്തി ഇറക്കുന്നതിനു മുൻപ് റബർ ക്യാപ്പ് സ്വീരിട്ടുകൊണ്ടു തുടയ്ക്കണം. റബർ ക്യാപ്പിൽ കുത്തിയിറക്കി മരുന്നു വലിച്ചെടുക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന സൂചികൊണ്ട് ആരെയും കുത്തിവയ്ക്കരുത്. മരുന്നു വലിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം ആ സൂചി മാറി മറ്റൊരു നല്ല സൂചി സിറിഞ്ചിൽ പിടിപ്പിച്ചുവേണം രോഗിയെ കുത്തിവയ്ക്കുവാൻ.


മരുന്നു വലിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം സൂചി മുകളിലോട്ടാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട്, സിറിഞ്ചിനുള്ളിൽ മരുന്നിനോടൊപ്പം കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള വായുക്കുമിളകളെ പിസ്റ്റൺ മേലോട്ടുതള്ളി പുറത്തുകളഞ്ഞതിനു ശേഷമേ കുത്തിവയ്ക്കാവൂ.

കുത്തിവയ്ക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം സ്വീരിറോ, അയോഡിനോ, (Tr. Iodine) പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി അതു



ചിത്രം 184

ആപ്തളിൽനിന്നും മരുന്നും സിറിഞ്ചിലേയ്ക്കും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വിധം.



ചിത്രം 185


കപ്പിയിൽനിന്നും മരുന്നും സിറിഞ്ചിലേയ്ക്കും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വിധം.

കൊണ്ടു തുടച്ചു രോഗാണുവിമുക്തമാക്കണം. കുത്തിവച്ചതിനുശേഷം സൂചി വലിച്ചെടുത്താലുടനെയും മേല്പറഞ്ഞതുപോലെ തുടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് അഥവാ ഹൈപ്പോഡെർമിക് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം:-

(SITE OF SUBCUTANEOUS OR HYPODERMIC INJECTION)

രക്തവാഹികളും സിരകളും വളരെ കുറവുള്ള ഭാഗമാണ്, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് അഥവാ ഹൈപ്പോഡെർമിക് ഇൻജക്ഷനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ക



ചിത്രം 186

സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി.


SUBCUTANEOUS INJECTION, SHOWING THE METHOD OF INSERTING NEEDLE.

യുടെ മുകൾഭാഗത്തു് അല്പം പുറത്തേയ്ക്കു മാറി (Supra Lateral Aspect) അതായതു് ഉരത്തിൽനിന്നും ഏകദേശം 15 സെ: മീ: താഴെ തൊലിക്കടിയിലോ' തുടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തോ ആണ് സാധാരണയായി ഹൈപ്പോഡെർമിക് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതു്. (ഹൈപ്പോ-Hypo = താഴെ, ഡെർമിസ്-Dermis = തൊലി.)

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ തൊലി പൊക്കി പ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉരത്തിനു സമാന്തരമായി, സൂചിയുടെ മുകൾ ഭാഗം മേലോട്ടിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ സൂചി കുത്തിക്കൊള്ളുക. സൂചിയിറങ്ങി ഉരത്തിനു സമാന്തരമായി തൊലിക്കടിയിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള തൊലി വിടുക. തുടന്ന് സാവധാനത്തിലും തുടച്ചായും മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുക. കുത്തിവെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്കനുവദിക്കാവുന്നവിധത്തിൽ സാവധാനമായിത്തന്നെ സൂചി ഉറക്കുകയും ചെയ്യുക. കുത്തിയ പാടിൽ സ്പിരിറ്റോ അയോഡിനോ പുരട്ടിക്കൊടുക്കുകയും വേണം. സൂചി കഴിയുന്നത്ര വണ്ണംകുറഞ്ഞതും മൂച്ചയുള്ള മുന്നയോടുകൂടിയതുമായിരുന്നാൽ കത്തുമ്പോൾ വേദന കാര്യമായി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല.

ഇൻട്രാമസ്ക്യൂലർ ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നഭാഗം: (SITE OF THE INTRAMUSCULAR INJECTION)

ഇൻട്രാമസ്ക്യൂലർ ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ശരീരഭാഗം നിതംബം (ചന്തി-കുണ്ടി) ആകുന്നു. കുത്തിവെക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഒരു സി. സി. യോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ ഉരത്തിനു താഴെയും കുത്തിവെക്കാവുന്നതാണ്. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്സ് ഇൻജക്ഷൻ വിവരിച്ചതുപോലെ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഭാഗം വൃത്തിയാക്കുക. നിതംബത്തിന്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് 1½'', 2'', 2½'' സൂചിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുവേണം കുത്തിവെക്കുവാൻ. നിതംബത്തിൽ കുത്തിവെക്കാനുള്ള സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധയാവശ്യമാണ്. താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കി കുത്തിവെക്കുന്ന സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുന്ന വിധം മനസ്സിലാക്കുക.



ചിത്രം 187


നിതംബത്തിൽ ഇൻട്രാമസ്ക്ലേർ ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധം. + ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലാണ് കുത്തിവയ്ക്കേണ്ടത്.

ANATOMICAL DIAGRAM, GLUTEAL REGION SHOWING THE SITE FOR INTRAMUSCULAR INJECTIONS.

ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം:-
(SITE FOR INTRAVENOUS INJECTION)

തെരമ്പിൽക്കൂടി മരുന്നുകളോ ട്രൂക്കോസ്റ്റോ മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളോ സിറിഞ്ചുപയോഗിച്ച് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ എന്നു പറയുന്നത്. കൈമുട്ടിന്റെ അകത്തുഭാഗത്തുള്ള 'മീഡി

യൻ സീഫാലിക് വെയിൻ' (Median cephalic vein) അല്ലെങ്കിൽ 'മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ' (Median cubital vein) എന്നീ ഞരമ്പുകളിലേതിലേക്കിലുമാണ് സാധാരണയായി ഇൻട്രാവീനസ്സ് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്.



ചിത്രം 188

ഇൻട്രാവീനസ്സ് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഞരമ്പ്
കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക

DIAGRAM SHOWING INTRODUCTION OF NEEDLE IN
MEDIAN CEPHALIC VEIN FOR INTRAVENOUS INJECTION.

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനു് ഈ ഞരമ്പുകൾ കിട്ടാതെ വരുന്നപക്ഷം 'മീഡിയൻ ബേസിലിക് വെയിനിൽ (Median basilic vein) കുത്തിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ബേസിലിക് വെയിനിൽ കുത്തിവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽക്കിടക്കുന്ന ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി (Brachial artery) യിൽ സൂചി കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


സൂചി ഞരമ്പിനുള്ളിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈമുട്ടിനുമുകളിലുള്ള കെട്ട് അഴിച്ചുകളയേണ്ടതും രോഗിയുടെ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച കയ്യ് അയയ്ക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. മിനിറ്റിൽ ഒരു സി. സി. എന്ന കണക്കിൽ സാവധാനത്തിലേ കുത്തിവയ്ക്കാവൂ. കുത്തിവയ്ക്കുന്നശേഷം അല്പം രക്തം സിറിഞ്ചിലേയ്ക്കു വലിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷമേ സൂചി സാവധാനത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാവൂ.

ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിറിഞ്ചിൽ അല്പം പോലും വായുക്രമീകരം ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇൻജക്ഷൻ വഴി പൊതുരക്തപര്യവേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനിടയാകുന്ന വായുക്രമീകരം (എയർ എംബോളസ്--Air embolus) ഞരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ മരണം തന്നെയോ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കുത്തിവയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു് സിറിഞ്ചിലുള്ള വായുക്രമീകരം മുഴുവൻ തള്ളിക്കളയുകയും, അല്പം മരുന്ന് സിറിഞ്ചിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഇൻജക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വായുക്രമീകരം അകത്തു കടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. സൂചി ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൻ 'ട്രിബ്സോയിൻ കൊ' (Trbenzoin co) പഞ്ഞിയിൽ മുക്കിവച്ചു് അല്പ

നേരം അമർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതും അതിനുശേഷം പഞ്ഞി അവിടെത്തന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ കയ്യ് മേല്പോട്ടു ചേർത്തുമാക്കി അല്പനേരത്തേയ്ക്കു പിടിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവിധം:-

കൈ മലർത്തി നീട്ടി പുറകോട്ടു ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ട് കൈമുട്ടിനു മുകളിൽ ഒരു കെട്ടു



ചിത്രം 189

ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന വിധം.

ILLUSTRATION SHOWING THE PROCESS OF PUSHING THE INTRA
VENOUS INJECTION AFTER REMOVING THE CONSTRICTION
ROUND THE UPPER ARM AND RELAXING THE FIST.

കെട്ടുക. കൈവിരലുകൾ അകത്തോട്ട് ബലമായി ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും രോഗിയോടു നിർദ്ദേശിക്കുക. കൈമുട്ടിനു മുകളിൽ കെട്ടാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്തപക്ഷം മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ട് ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് കൈമുട്ടിനു മുകളിൽ അമർത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചാലും മതിയാകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞരമ്പു തെളിഞ്ഞുവരുന്നതിനു വേണ്ടിയാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞരമ്പു തെളിഞ്ഞുകിട്ടാതെ വിഷമിച്ചുപോകാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ രോഗിയുടെ കൈവിരലുകൾ ശക്തിയായി ചുട്ടുകയും നിവർക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഉപദേശിക്കുക. അപ്പോൾ ഞരമ്പു തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതാണ്. കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ളഭാഗം സ്പിരിറ്റുകൊണ്ടോ അയോഡിൻകൊണ്ടോ തുടച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കുത്തുക. ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 10 c. c. സിറിഞ്ചും, സാമാന്യം വലുതും ബലമുള്ളതുമായ സൂചിയുമാകുന്നു. സൂചി ഞരമ്പിനുള്ളിൽ ആയാൽ സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് രക്തം വരുന്നതാണ്. സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് രക്തം നല്ലവണ്ണം ഒഴുകിവരുന്നുണ്ടെന്നു ബോധ്യമായാൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ തുളിതുളിയായി മരുന്നു കയറുക. സൂചി 1½ ഇഞ്ചെങ്കിലും നിളമുള്ളതായിരിക്കുവാനും സൂചിമുനയിലെ ദ്വാരം മേലോട്ടായിരിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തുനിന്നും സൂചി കുത്തി മേലോട്ടു പോകുന്നവിധത്തിലുമായിരിക്കണം എപ്പോഴും കുത്തേണ്ടത്.

ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ:-

- 1 ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്സ് ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂചി ഒരു ഞരമ്പിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടയാവാതെ

സൂക്ഷിക്കുക. സൂചി ഞരമ്പിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ സൂചി കുത്തിയിറക്കിയതിനു ശേഷം സിറിഞ്ചിന്റെ പിസ്റ്റൺ അല്പം പുറകോട്ടുവലിച്ച് പത്തിരപതു സെക്കൻഡു നേരത്തേയ്ക്കു പിടിക്കുക. ഞരമ്പിലാണ് സൂചിയുടെ മുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രക്തം സിറിഞ്ചിലേയ്ക്കു വരുന്നതാണ്. അല്പമെങ്കിലും രക്തം സിറിഞ്ചിലേയ്ക്കു വരുന്നപക്ഷം മരുന്ന് കയറാത്തതാണ്. അവിടെനിന്ന് ഉറവിടത്തു കയ്യിലോ മറ്റോ കുത്തിവെക്കുക.

- 2 തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം സിറിഞ്ചിന്റെ പിസ്റ്റണിലും സൂചിയിലും കൈകൊണ്ടു തൊടരുത്. അഥവാ തൊടുക്കുന്നതിൽത്തന്നെ കൈകൾ സോപ്പും ചൂടുവെള്ളവുമുപയോഗിച്ചു കഴുകി റെക്റ്ററിഫൈഡ് സ്റ്റീരിട്ട് പുരട്ടിയതിനു ശേഷമേ ആകാവൂ.
- 3 കുത്തിവെച്ചതിനു മുമ്പും പിമ്പും കുത്തിവെച്ച ശരീരഭാഗത്തു സ്റ്റീരിറോ അയോഡിനോ പഞ്ഞിയിൽ മുക്കിത്തേക്കുക.
- 4 ഏതു ഇൻജക്ഷൻ കൊടുത്താലും അതിനുശേഷം കഴിയുമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേയ്ക്കെങ്കിലും രോഗിയെ വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക. വിശ്രമിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.
- 5 ലഘുവായ അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻജക്ഷൻ ശേഷം കാണുന്നപക്ഷം ചൂടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാനീയം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക, ചായയാണ് ഉത്തമം.
- 6 ഗുരുതരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണുന്നപക്ഷം പ്രതികരണങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി ഡോക്ടറെ വിവരമറിയിക്കുക.

സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ (STERILIZATION):-

ചൂട്, മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗാണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശക്തമായ ചൂട് വേണ്ടത്ര സമയം നിലനിൽത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതു സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചോ, ആവി എല്ല്ച്ചാ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഡാക്ടറും മിഡ് വൈഫും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചു രോഗാണു വിമുക്തമാക്കണം. ആവി കയററിയും രോഗാണുക്കളെ വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആശുപത്രികളിൽ ആവി കയററിയാണ് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ശുദ്ധമാക്കുന്നത്. ചൂടേറാൽ ഉരുകിപ്പോകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ശുദ്ധീകരണക്രമങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നു പറയുന്നത്.

ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ്:-

(ANTISEPTICS-രോഗാണുനാശിനികൾ)

രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്നു പറയുന്നു. പ്രസവസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ലോഷനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.

1) ലൈസോൾ (LYSOL):-

ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് മൂന്നു മില്ലിലിറ്റർ എന്ന കണക്കിന് ചേർത്ത് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ലോഷണുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം.

2) കോൺഡിസ് സൊല്യൂഷൻ

(CONDY'S SOLUTION):-

300 മില്ലിഗ്രാം (300mg) പൊട്ടാസ്സിയം പെർമാംഗനേറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിനാണ് കോൺഡിസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നു പറയു

നതു്. ഇതിൽനിന്നും ഒരുഭാഗമെടുത്തു് നാലുഭാഗംവെള്ളം കൂടിചേർത്താൽ വായിൽ കവിൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനു് കോൺഡീസ് ഗാർഗിൾ (condy's gargle) എന്നും പറയുന്നു.

3) ഡെറ്റോൾ (DETTOL):-

മുറിവുകൾ, വൃണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കഴുകാനും, ശുദ്ധീകരണത്തിനും മറ്റും സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഔഷധമാണിതു്. ഇതു് വിഷമില്ലാത്തതും കറുപ്പിക്കാത്തതും, ഉപയോഗിച്ചാൽ നീറലോ വേദനയോ ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. 1: 50 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തു് ലോഷനാക്കിവരുന്നു.

4) കാർബോളിക് ആസിഡ് (CARBOLIC ACID):-

ശക്തിയേറിയ ഒരു രോഗാണുനാശിനിയാണിതു്. കാർബോളിക് ആസിഡ് കൈകൊണ്ടു് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്നതാണു്. അതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു് വീര്യംകുറയ്ക്കാതെ ഉപയോഗിക്കരുതു്. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനു് രണ്ടോ മൂന്നോ മില്ലിലിറ്റർ എന്നകണക്കിനു ചേർത്തു് കാർബോളിക് ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

5) ബോറിക് ആസിഡ് (BORIC ACID):-

വിവിധോപയോഗസമർത്ഥമായ ഒരു സാധാരണ രോഗാണുനാശിനിയാണിതു്. പേരുസൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഇതൊരാസിഡല്ല. ശരീരത്തിനുതൊരു ഭോഷവും ചെയ്യാത്തതും ബാഹ്യോപയോഗത്തിനു മാത്രമുള്ളതുമായ ഒരു വെളുത്തപൊടിയാണിതു്. ബോറിക് പൗഡർ എന്നു് സാധാരണ പറയും.

6) സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് (SILVER NITRATE):-

300 മില്ലിഗ്രാം (5 grs) സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് മുപ്പതു് മില്ലിലിറ്റർ (1oz) വാറുജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു് അതിൽനിന്നും രണ്ടു തുള്ളിവീതം എടുത്തു് കണ്ണിൽ ഇറക്കാം. നയനരോഗങ്ങൾക്കു് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

ലോഷൻസ് (LOTIONS)

1) ANTIPRURITIC LOTION

Rx

Menthol	600 mg. (10 gr)
Phenol	2 gm. ($\frac{1}{2}$ dr)
Glycerine	8 ml (2 dr)
Alcohol (30 percent)	300 ml (10 oz)

2) BORIC ACID EYE LOTION

Rx

Boric Acid	6 gm. (90 gr)
Sterile water	180 ml (6 oz)

3) POTASSIUM PERMANGANATE LOTION (For Gastric Lavage)

Rx

Potassium Permanganate	1 g. (15 gr)
Water	2 L (4 pint)

എന്നിത്ത (ENEMAS)

1) GLYCERINE OLIVE OIL ENEMA

Rx

Glycerine

60 ml (2 oz)

Olive Oil

120 ml (4 oz)

2) SOAP ENEMA

Rx

Soft Soap

30 g. (1 oz)

Water

570 ml (1 pint)

3) STARCH OPIUM ENEMA

Rx

Tincture of Opium

4 ml (60 m)

*Mucilage of Starch

120 ml (4 oz)

BATHS

1) ALKALINE BATH

Rx

Sodium Bicarbonate

30 g (1 oz)

Warm water

1 L (2 pint)

*Starch powder

30 g (1 oz)

Water

120 ml (4 oz)

2) POTASSIUM PERMANGANATE BATH

℞

Potassium Permanganate	100 mg (1½ gr)
Warm Water	1 L (2 pint)

MOUTH WASH

POTASSIUM PERMANGANATE MOUTH WASH

℞

Potassium Permanganate	500 mg (10 gr)
Water	240 ml (8 oz)

OINTMENTS

1) AMMONIATED MERCURY OINTMENT

℞

Ammoniated Mercury	600 mg (10 gr)
Soft Paraffin to	30 g (1 oz)

2) ATROPINE YELLOW OXIDE OF MERCURY OINTMENT

℞

Atropine Sulphate	250 mg (4 gr)
Yellow Oxide of Mercury	120 mg (2 gr)
Soft Paraffin to	30 g (1 oz)

For Application to the Eyes only.

3) WHITFIELD'S OINTMENT

℞

Salicylic Acid	1 g (15 gr)
Benzoic Acid	1.6 g (25 gr)
*Cocoanut Oil	16 g (4 dr)
*Bees Wax to	30 g (1 oz)

For External Application only

*Soft white paraffin (40 g) may be Substituted for both.

PAINTS

1) GENTIAN (CRYSTAL) VIOLET PAINT

Rx

Gentian (Crystal) Violet 200 mg (3 gr)

Water 30 ml (1 oz)

For External Application only.

2) GLYCERINE BORIC ACID PAINT

Rx

Boric Acid 8 g (2 dr)

Glycerine 30 ml (1 oz)

For Application in the Mouth.

BORIC ACID DUSTING POWDER

Rx

Boric Acid 5 g (75 gr)

Starch 5 g (75 gr)

Talc (Purified and Sterilised) 60 g (2 oz)

For External Application only.

ANTISEPTIC BODY OIL FOR SMALL POX

Rx

Boric Acid 8 g (120 gr)

Thymol 4 g (60 gr)

Eucalyptus Oil 10 ml (120 m)

Olive Oil up to 570 ml (1 pint)

For External Application only.

നേത്രവിദ് (EYE DROPS-OPHTHALMIC)

1) ARGYROL DROPS

Rx		
	Argyrol	48 grs
	Distilled water	1 oz

2) ATROPINE SULPHATE DROPS

Rx		
	Atropine Sulphate	5 grs
	D/Water	1 oz

3) COPPER SULPHATE DROPS

Rx		
	Copper Sulphate	3 grs
	D/Water	1 oz

4) SILVER NITRATE DROPS

Rx		
	Silver Nitrate	5 grs
	D/Water	1 oz

അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളം

(WEIGHTS AND MEASURES)

- 1 Grain (Gr)
- 1 Ounce 1 oz = $437\frac{1}{2}$ Grains
- 1 Pound = 16 oz = 7000 Grains
 - 1 Gram (Grm or G)
 - 1 Kilogram kg = 1000 Grms
 - 1 Milligram mg = 1000 Microgram
 - 1 Gram = 15.43 Grains = 0.26 drachm
 - 1 Kilogram = 35 27 oz = 2 2 lb
- 1 Decigram (dg) = 1.54 Grain
- 1 Centigram (cg) = 0 15 Grain
- 1 Milligram (mg) = 0 015 Grain
 - 1 oz (Troy) = 480 grs = 31 1 Grams
 - 1 oz (Avoir) = $437\frac{1}{2}$ grs = 28 35 Grams
 - 1 lb = 16 oz = 7000 grs = 435.59 Grams
- 1 Millimetre (m m) = 0.039 Inch
- 1 Centimetre (cm) = 0.39 Inch
- 1 Metre = 100cm = 39 37 Inch = 3.28 ft = 1.09 yard
- 1 Kilometre = 1000 Metres = 093 5yds = 0.62 mile
- 1 Mile = 1.6 Kilometre
- 1 Yard = 11.4 Centimetre
- 1 Foot = 3.48 Centimetre
- 1 Inch = 2.54 Centimetre

DOMESTIC MEASURES

A teaspoonful = 1 fl, dr = 3.5 c.c. or ml

A dessertspoonful = 2 fl, dr = 7.0 c. c. or ml

A tablespoonful = $\frac{1}{2}$ fl, oz = 15.0 c. c. or ml

APOTHECARIES WEIGHT


20	grains	=	1 scruple
3	scruples	=	1 drachm = 60 grains
8	drachms	=	1 ounce = 480 grains
12	ounces	=	1 pound = 5760 grains

APOTHECARIES FLUID MEASURE


60	minims	=	1 fluid drachm
8	fluid drachms	=	1 fluid ounce
20	fluid ounces	=	1 pint
2	pints	=	1 quart
4	quarts	=	1 gallon

Minim into Ml. (Ml = Milli litter)


5	minims	=	0.3 ml
10	„	=	0.6 ml
17	„	=	1.0 ml
35	„	=	2.0 ml
60	„	=	3.75 ml
120	„	=	7.5 ml
1	fl ounce	=	30.0 ml
1	pint	=	568.0 ml




ചിത്രം 190



ചിത്രം 191



ചിത്രം 192




ചിത്രം 193




ചിത്രം 194



ചിത്രം 195



ചിത്രം 196



ചിത്രം 197

അനുബന്ധം (APPENDIX) A

ABBREVIATIONS

KILOGRAM	=	kg
GRAM	=	gm
DECIGRAM	=	dg
CENTIGRAM	=	cg
MILLIGRAM	=	mg
LITER	=	L
MILLILITER	=	ml
PINT	=	o
DRACHM	=	5 or dr
OUNCE	=	3 or oz
MINIMS	=	m
DROPS	=	gtt
CUBIC CENTITETER	=	cc. (ml)

CAPACITY

4 cc.	=	1 FLUID DRACHM
32 cc.	=	1 FLUID OUNCE
480 cc.	=	1 PINT
960 cc.	=	1 QUART
1 OUNCE	= (fl)	8 DRACHMS
60 MINIMS	= (fl)	1 DRACHM
480 MINIMS	= (fl)	1 OUNCE
1 DRACHM	=	1 TEASPOONFUL
4 DRACHM	=	1 TABLESPOONFUL

DISTANCES

METER	=	39 37 INCH
KILOMETER	=	0.62137 MILE
CENTIMETER	=	0 3937 INCH
1 Inch	=	2.54 cm
1 FOOT	=	30.48 cm
1 YARD	=	91.44 cm

METRIC MEASURES & EQUIVALENTS

Grams	Deci grams	Centi grams	Milli grams	Grains	c.c.	Minims
0.0003		..	0.3	1/200	0.06	1
0.00045	..	..	0.45	1/150	0.12	2
0.0006	..	..	0.6	1/100	0.18	3
0.001	..	..	1.0	1/64	0.25	4
0.002	..	..	2.0	1/30	0.31	5
0.003	..	..	3.0	1/20	0.37	6
0.005	..	..	5.0	1/12	0.43	7
0.006	..	..	6.0	1/10	0.50	8
0.008	..	..	8.0	1/8	0.56	9
0.1	..	1.0	10.0	1/6	0.62	10
0.012	..	1.2	12.0	1/5	0.68	11
0.016	..	1.6	16.0	1/4	0.75	12
0.022	..	2.2	22.0	1/3	0.81	13
0.032	..	3.2	32.0	1/2	0.87	14
0.044	..	4.4	44.0	2/3	0.93	15
0.048	..	4.8	48.0	3/4	1.00	16
0.65	..	6.5	65.0	1	..	..
0.13	1.3	13.0	..	2	..	..
0.2	2.0	20.0	..	3	..	..
0.26	2.6	26.0	..	4	..	..
0.33	3.3	33.0	..	5	..	..
0.4	4.0	40.0	..	6	..	..
0.47	4.7	47.0	..	7	..	..
0.5	5.0	50.0	..	7 1/2	..	..
0.54	5.4	54.0	..	8	..	..
0.6	6.0	60.0	..	9	..	..

Grams	Deci grams	Centi gram	Milli gram	Grains	c.c.	Minims
0.67	6.7	67.0	..	10	..	..
0.73	7.3	73.0	..	11	..	..
0.8	8.0	80.0	..	12	..	..
0.87	8.7	87.0	..	13	..	..
0.94	9.4	94.0	..	14	..	..
1.0	..	..	..	15	..	..
1.33	..	..	..	20	..	..
1.67	..	..	..	25	..	..
4.0	..	..	..	60-1 drachm	..	..
8.0	..	..	..	120-2 drachm	..	..
11.5	..	..	..	3 „	..	..
15.0	..	..	..	4 „	..	..
31.0	..	..	..	1 ounce	..	..
455.0	..	1.0 lb	..	..	..	..
1000.0	..	2.2 lb	..	..	..	..

THERMO METERS

CENTIGRADE

FAHREN HEIT

36.0	96.8
37.0	98.6
38.0	100.4
38.6	101.4
39.0	102.2
39.4	103.0
40.0	104.0
40.6	105.2
41.0	105.8
42.0	107.6

RECOMMENDED DIETARY ALLOWANCES

	Ca	Fe	Vitamin A I. U.	Thia- mine. mg	Ribo- flavin mg	Niacin mg	Ascorbic Acid mg	Protein mg
Normal Woman (55 kg)	0.8	12	5000	1.2	1.4	12	70	55
Pregnancy	1.5	15	6000	1.5	2.0	15	100	80
Lactation	2.0	15	8000	1.5	2.5	15	150	100

അനുബന്ധം (APPENDIX) B

NORMAL VALUES

BLOOD

Bleeding time (Duke)	1-3 minutes
Clotting time:	
Capillary blood	4-8 minutes
Venous blood	5-10 minutes
Clot retraction:	
Begins in	2 hours
Completes in	24 hours
Colour index	0.98-1.04
Fragility test:	
Begins	0.45-0.38% NaCl
Completes	0.36-0.30% NaCl
Haemoglobin (Adults):	
Male	14.4-16.3 g. percent
Female	13.5-15 g. percent
Mean corpuscular volume (M. C. V.)	80.94 cu microns
Mean corpuscular hemoglobin (M. C. H.)	27.32 micrograms
Mean corpuscular haemoglobin concentration (M. C. H. C.)	33.38 g. percent
Packed cell volume (P. C. V.)	41.45 percent
Prothrombin time (Quick)	12.14 seconds

Platelets	200,000-600,000/cu.mm	
Red cells (Adults):		
Male	4.6-5.8 million/cu. mm.	
Female	4.2-5.4 " "	
Reticulocytes	0.-3.8 per cent	
Sedimentation Rate	(Wintrob)	(Westergren)
Male	0-9	2-8 mm/hr.
Female	0.20	4-15 " "
White cells (total)	5000-10,000/cu.mm (Adult)	
	10,000-12,000/cu.mm (infant)	
Polymorphs	60-65 percent	
Lymphocytes	20-30 "	
Eosinophils	4-8 "	
Monocytes	2-6 "	

URINE

(PHYSIOLOGIC NORMALS)

Average volume in 24 hours	1200 to 1500 ml
Reaction to litmus	faintly acid
Specific gravity	1005 to 1020
Colour	amber or straw colour
Constituents (in 24 hour specimen)	
Urea	20.0-30.0 g
Chlorides	10.0-15.0 g

PULSE RATE VARIATIONS

VARIATION WITH AGE

Foetus in Utero	150-140	7th to 14th year	90-81
New born	140-130	15th to 20th year	85 to 78
1st year	130-115	Adult	75 to 68
2nd year	115-100	very old age	60 to 70
3 years	105-95		

Variation with sex—Average of pulse rate in women is as a rule higher than in men of same age.

Variation with size—Tall individuals have a slower pulse rate than shorter persons of same age.

Variation with temperature—With each Fahrenheit degree rise of temperature of an adult, the pulse rate usually rises by 10.

RESPIRATION RATE VARIATIONS

Age:

At infancy	35	12 to 15 years	10-18
2 to 6 years	23	Adults	18
6 to 12 years	20	Very old age	16-18

Sex: Respiration in the adult female is usually slightly more than in the male, especially during pregnancy.

BLOOD PRESSURE VARIATIONS

Age	Healthy systolic range in mm. Hg.	Healthy diastolic range in mm Hg.
15-24	106-136	
25-34	109-139	
35-44	111-141	70-105
45-54	115-145	
55-64	120-150	
	124-154	

AVERAGE PRESSURE OBTAINED IN INDIA

Age:	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Systolic:	113	120	122	123	154	126	128	130	132	135
Diastolic:	75	80	81	82	83	84	85	86	87	89

RELATION BETWEEN HEIGHTS AND WEIGHTS

(INDIAN LIVES)

Height	Minimum	Average	Maximum
5 ft. 1 inch	95	125	155
5 ft. 2 inches	97	128	158
5 ft. 3 „	100	131	161
5 ft. 4 „	102	134	164
5 ft. 5 „	105	137	167
5 ft. 6 „	108	141	171
5 ft. 7 „	111	146	176
5 ft. 8 „	115	151	181
5 ft. 9 „	119	156	166
5 ft. 10 „	123	161	191
5 ft. 11 „	126	167	197
6 ft.	131	173	203

DENTITION TABLE

MILK TEETH

Central incisors	(1) Lower 6th month
	(2) Upper 7th month
Lateral incisors	(1) Upper 9th month
	(2) Lower 10th month
First molars	12th month
Canines	18 th month
Second molars	2nd year (often later)

FULL PRIMARY DENTITION IS 20 TEETH

PERMANENT TEETH

First Molars	6 years
Lower Central Incisors	7 years
Upper Central Incisors	8 years
Lateral Incisors	9 years
First Biscuspid	10 years
Second Biscuspid	11 years
Canines	12 years

COMPOSITION AND CALORIE VALUES OF PRINCIPAL FOODS

(PER 30 G., ONE OUNCE)

	Food:	Carb	g. per oz.		Calories
			Prot	Fat	
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ	Cereals				
കൂവ (കിഴങ്ങ്, പൊടി)	Arrowroot	25	0.24	trace	101
ബാർലി	Barley „	22.7	2.4	0.5	105
റൊട്ടി	Bread (White)	15	2	0.3	73
ഗോതമ്പ് മാവ്	Flour whole meal (atta)	20.7	3.4	0.8	102
സൂചിഗോതമ്പ്	Wheat grains (Sooji)	14.7	4.2	0.6	80
ഓട്ടമീൽ	Oat meal	19	3.8	1.7	106
കൈക്കത്തരി	Rice unmilled	25.7	1.9	0.2	104
മില്ലിൽ കുത്തിയ അരി	Milled	22.7	1.6	0.1	106
ചോറ്	Cooked	7.7	0.8		32

		g. per oz.			Calories
		Carb	Prot	Fat	
മലത്ത്	Fried rice	25	1.4	trace	105
പയർവ്വർഗ്ഗം	Pulses as peas, lentils etc	15-17	5.7	0.5-1.5	100
Egg & Meat					
മുട്ടയും മാംസവും	Eggs (duck's)	..	3.9	3.2	46
താറാവിൻമുട്ട	Do (hen's)	..	3.8	2.3	38
കോഴിമുട്ട	Fowl	..	7	1.9	47
കാട്ടുകോഴി	Meat	..	5	7	36
മൃഗമാംസം	Mutton	..	6	8	40
ആട്ടിറച്ചി	Fish:				
കൊഞ്ചു/പെമ്മീൻ	Prawns	..	5	0.6	21
	Bhetki (Lates calcarifer)	..	46	1.2	30
	Hilsa	..	4.2	2.6	40
	Rohi (Labia rohita)	..	4.9	2.2	40
	Magoor (clarias batrachus)	..	5.7	0.1	23
മീൻമുട്ട/പനിഞ്ഞിൽ	Fish roe	..	5.6	2.5	45
ക്ഷീരവും	Milk and Milk products:				
ക്ഷീരോല്പന്നങ്ങളും	Cow's milk	1.1	1.2	1.1	20
പശുവിൻപാൽ					

എരുമപ്പാൽ	Buffalo's milk	1.2	1.8	2.2	22
തൈരും	Curd	0.8	1.4	1	17
മോരും	Butter milk	0.1	6.6	5.5	76
പാൽപ്പാട	Cream 50%	..	3.5	13.2	127
വെണ്ണ	Butter	..	0.3	24	224

എണ്ണകൾ—കൊഴുപ്പുകൾ

Fats & Oils

കടുകെണ്ണ	Mustard oil			20	264
ഒലിവെണ്ണ	Olive oil			30	273
നെയ്യും	Clarified butter (Ghee)			38	252

ഫലവൃത്തങ്ങൾ

Fruits:

ബദാം	Almond (Badam)	5.1	3.0	14	158
ആപ്പിൾ	Apple	5	0.1	0.1	21
നേത്രക്കായം	Banana	4.8	0.3	Trace	25
നാളികേരം	Coconut	6	1.1	16.8	290
വെള്ളരിക്ക	Cucumber	0.9	3.2	..	6
ഇത്തപ്പഴം	Dates (Khejur)	23.5	0.6	..	103
മുന്തിരിങ്ങ	Grapes	5.7	0.3	0.4	29
കമ്പിളിനാരങ്ങ	Grape fruit	3.4	0.3	0.8	16
പേരയ്ക്ക	Guave	5.1	0.2	0.1	22
ചക്ക	Jack fruit	5.3	2.1	0.5	38

		g. per oz			Calories
		Carb	Prot	Fat	
ചെറുനാരങ്ങാ	Lemon	2.2	0.1	0.6	13
മാങ്ങാ	Mango	5.3	0.4	0.3	25
തണ്ണിമത്തങ്ങാ	Melons (Tarmu)	2.1	0.1	Trace	9
മധുരനാരങ്ങാ	Orange	3.4	0.2	..	15
കപ്പളങ്ങ/കർമൂസു്	Papaya	2.0	0.2	Trace	10
പീച്ചപ്പഴം	Peaches	3.2	0.2	..	14
കരുവില്ലാമുന്തിരി	Plums (Kool)	4.1	0.6	..	17
കൈതച്ചക്ക	Pineapple	2.1	0.1	..	9
കിസ്മിസു്	Raisins (Kismis)	23.0	0.7	1	104
പച്ചക്കറികൾ		Vegetables:			
ശതാവരി	Asparaged green	0.3	0.9	0.3	..
ബീൻസു്	Beans	1.8	0.5	0.2	10
വഴുതനങ്ങാ	Brinjal	0.5	0.1	..	10
മുട്ടക്കൂസു്	Cabbage	1.5	0.6	0.1	10
കാരട്ടു്	Carrot	0.2	..	2.6	10
കാളിഫ്ളവർ	Cauliflower	0.4	0.5	0.2	5
പച്ചനേത്രക്കായ	Green Banana	4.6	0.3	4.5	24
പച്ചച്ചക്ക	do Jack fruit	2.1	5.2	0.4	20

പച്ചപ്പയറു്	do Peas	6.6	2.5	0.5	39
പച്ചകുപ്പങ്ങ/കർമൂസു്	do Papaya	0.1	0.1	..	1
വെണ്ടക്കായു്	Lady's finger	1.7	0.5	0.3	12
ഉള്ളി	Onions	3.4	0.7	Trace	14
ഉരുളക്കിഴങ്ങു്	Potato	5.9	0.5	0.1	27
ചീര	Spinach	0.3	1.5	..	5
തക്കാളി	Tomoto	1.0	0.2	0.2	7
തക്കാരിക്കിഴങ്ങു്	Turnip	2.2	0.3	..	11

പലവക, ബിസ്കുറ്റ് **Miscellaneous, Biscuits:**

ഉപ്പുബിസ്കുറ്റ്	Salted	10	3.0	4.5	82
മധുരമുള്ള ബിസ്കുറ്റ്	Sweets	18	3.5	6	152

ചോക്ലേറ്റ് **Chocolate:**

പാൽ ചോക്ലേറ്റ്	Milk	18	1.5	10	147
സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ്	Plain	20	1.5	8.5	137
ജാം, മാർമലേഡു്	Jam, Marmalade	18	0.2	..	75
ചായ, കാഫി	Coffee or tea	8	0.4	0.5	19
തേൻ	Honey	21	..	..	18
പഞ്ചസാര	Sugar	28	..	..	115

NORMAL HEIGHTS AND WEIGHTS

CHILDREN

BOYS					GIRLS			
Age	Weight		Height		Weight		Height	
	Kg.	Lbs.	Cm.	Inches	Kg.	Lb.	Cm.	Inches
At birth	3.4	7.5	50	19.70	3.2	7.1	49	19.30
1 month	3.6	7.9	53	20.87	3.4	7.5	52	20.47
2 months	4.4	9.7	57	22.44	4.2	9.3	56	22.05
3 "	5.1	11.2	60	23.62	4.8	10.6	59	23.23
4 "	6.0	13.2	63	24.80	5.6	12.4	62	24.41
5 "	6.7	14.8	66	25.98	6.3	13.9	65	25.59
6 "	7.3	16.1	68	26.77	6.8	15.0	67	26.38
7 "	7.8	17.2	70	27.56	7.2	15.9	69	27.17
8 "	8.2	18.1	71	27.95	7.6	16.8	70	27.56
9 "	8.6	18.9	72	28.35	8.0	17.6	71	27.95
10 "	9.0	19.8	73	28.74	8.4	18.5	72	28.25
11 "	9.4	20.7	74	29.13	8.8	19.4	73	28.74
12 "	9.8	21.6	75	29.53	9.2	20.3	74	29.13

13	„	10.1	22.3	76	29.92	9.5	20.9	75	22.53
14	„	10.3	22.7	77	30.31	9.8	21.6	76	29.92
16	„	10.5	23.1	78	30.71	10.0	22.1	77	30.31
17	„	10.7	23.6	79	31.10	10.2	22.5	78	31.10
18	„	10.9	24.0	80	31.50	10.4	22.9		
19	„	11.1	24.5	81	31.89	10.6	23.4	80	31.50
20	„	11.3	24.9	82	32.28	10.8	23.8	81	31.90
22	„	11.6	25.6	83	32.68	11.0	24.2	82	32.68
		11.8	26.0	84	33.07	11.5	24.7		
2	Years	12.0	26.5	85	33.46	11.5	25.3	84	33.07
3	„	14.1	31.1	93	36.61	13.6	30.0	92	36.22
5	„	16.5	36.4	101	39.76	15.8	34.8	100	39.37
6	„	20.2	44.5	113	44.49	19.1	42.1	111	43.70
7	„	22.0	48.5	118	46.46	20.9	46.1	116	45.67
8	„	24.4	53.8	123	48.43	23.2	51.2	121	47.64
9	„	2.68	59.1	128	50.39	25.6	56.4	126	49.61
10	„	29.0	63.9	132	51.97	28.4	62.6	131	51.57
11	„	32.0	70.6	137	53.94	32.0	70.6	137	53.94
12	„	35.5	78.2	142	55.91	36.5	80.5	143	56.30
13	„	40.0	88.2	148	58.27	52.0	92.6	150	59.06
14	„	45.0	99.2	154	60.63	46.5	02.6	155	61.0
15	„	50.5	111.3	160	62.99	50.0	110.2	158	62.2

INDIAN ADULTS

HEIGHT			WEIGHT					
Feet.	Cm.		Minimum		Average		Maximum	
			Lbs.	Kg.	Lbs.	Kg.	Lbs.	Kg.
5'	1"	154.9	95	43.09	125	56.70	155	70.31
5'	2"	157.5	97	44.00	128	58.06	158	71.67
5'	3"	160.0	100	45.36	131	59.42	161	71.67
5'	4"	162.1	102	46.27	134	60.78	164	73.03
5'	5"	165.1	105	47.63	137	62.14	167	75.75
5'	6"	167.6	108	48.99	141	63.96	171	77.56
5'	7"	170.2	111	50.35	146	66.22	176	79.83
5'	8"	172.7	115	52.16	151	68.49	181	82.10
5'	9"	175.3	119	53.98	156	70.76	186	84.37
5'	10"	177.8	123	55.79	161	73.03	191	86.64
5'	11"	180.3	126	57.15	167	75.76	197	89.36
6'	0"	182.9	131	59.42	173	78.47	203	92.08

ELY'S TABLE FOR CALCULATING THE DATE OF DELIVERY

പ്രസവതീയതി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പട്ടിക

അവരവരുടെ ആത്മവദിനത്തിന്റെ അവസാനതീയതി ഏതെന്നു മുകളിലത്തെ വരിയിൽ നോക്കികണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനു നേരെതാഴെയുള്ള തീയതിയായിരിക്കും പ്രസവദിനം. ഉദാഹരണത്തിനു നവംബർ ഒന്നാംതീയതി ആയിരുന്നു ആത്മവദിനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം എന്നുവിചാരിക്കുക. പ്രസവതീയതി ഏതായിരിക്കും? നവംബർ 1-നു നേരെ താഴെയുള്ള ദിവസംതന്നെ ആഗസ്റ്റ്-8.


അതിവർഷം (Leap year) ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസംമുൻപേ ആയിരിക്കും അതായത് ആഗസ്റ്റ്-7.

(ഇതു വളരെ കൃത്യമായൊരു കണക്കാണെന്നു കരുതരുതു്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം)

Explanation:- Find in top line the date of the last day of the last menstruation, the figure below will indicate the date when confinement may be expected-*ie.* if the date of menstruation is November 1, the confinement may be expected on August 8, or one day earlier if it is leap year.

January	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	November
October	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	26	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
February	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				December
November	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				
March	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	January
December	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
April	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		February
January	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	27	28	22	30	31	1	2	3	4		
May	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	March
February	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	
June	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	22	30		April
March	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		

July	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	May
April	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	
August	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	June
May	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
September	1	2	3	4	5	6	7	1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		July
June	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7		
October	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	August
July	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
November	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		September
August	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
December	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	October
September	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	23	21	22	23	24	25	26	57	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	



The chronology of reproduction. (Diagram.) Nurse, follow red line and arrows: begin at left, x. Below are days of the menstrual cycle and changes in the uterine mucosa. Note growth of its glands. Follow course of corpus luteum.

അനുകൂലമണിക

പേജ്

അ

അകാലപ്രസവം	359
അകാലപ്രസവവും ശിശുപരിചരണവും	333-336
അഗ്രചർമ്മം	4
അണ്ണാക്കുവിള്ളൽ	327
അണ്ഡകോശങ്ങൾ	26-27
അണ്ഡവാഹിനികുഴലുകൾ	22
അണ്ഡസഞ്ചികൾ	27
അണ്ഡാശയം	23
അണ്ഡാശയഗർഭം	371
അതിസാരം	320
അയോവണ്ഡശസ്ത്രക്രിയ	409
അനാട്ടമി	1
അനാർത്ഥം	63
അനിവാര്യമായ രക്തസ്രാവം	255-259
അനുബന്ധിതമുപിള്ള	87
അപസ്വാദം	325
അപ്പർസൈഗ്‌മെന്റസ് ഓപ്പറേഷൻ	415
അസ്ഥാനഗർഭം	371
അസ്ഥാനഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ	373
അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും	468
അംബിലിക്കൽകോർഡ്	468

ആ

ആന്ത്രവേഷനം	25
ആൽബുമിൻവാട്ടർ	446
ആസനയെല്ല്	94-96
ആഹാരം	183
ആർത്ഥം	31-36
ആർത്ഥവസമാപ്തി	36

പേജ്

ഇ	
ഇൻജക്ഷനുകൾ	450
ഇൻടേർണൽവെർഷൻ	403
ഇൻഡ്രാമസ്കലർ ഇൻജക്ഷൻ	454
ഇൻഡ്രാവീനസ് ഇൻജക്ഷൻ	455
ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ	400
ഇരട്ടക്കട്ടികൾ—ഏകാക്ഷരം, ദ്വയാക്ഷരം	189-205
ഇരട്ടപ്രസവവും അപകടവും	200
ഇളക്കം	348
ഇറക്കം	140
ഇഴ	
ഇററപ്പനി	281
ഉ	
ഉച്ചി	103
ഉദരഗർഭം	372
ഉപകരണങ്ങളും പരിചരണങ്ങളും	447-449
ഉപസ്ഥം	10
ഉപസ്ഥം കീറിപ്പോവുക	275
ഉപസ്ഥാശയം	91-107
ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉള്ളൂ	99
ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ഉള്ളുവുകൾ	101
ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ ദ്വാരം	99
ഉപസ്ഥാശയത്തിന്റെ വൈരൂപ്യം	242-254
ഉപോദ്ഘാതം	1
ഉള്ളിലുള്ള തിരിച്ചിൽ	141
ഉഴിച്ചിൽ	269
ഉറക്കം	180
എ	
എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം	426
എക്സ്റ്റേ	73
എഗ്ഗ്ഫ്ളിപ്	446

പേജ്

എനിമ	441-464
എപ്പിസിയോട്ടമി	158
ഏപ്രൺ	143
ഐ	
ഐസ് ബാഗ്	447
ഒ	
ഒക്കല്ലെകൾ	94
ക	
കണ്ണുപഴുപ്പ്	315
കണ്ണുപഴുപ്പ് - പ്രതിവിധി	315
കണ്ണുപഴുപ്പ് - ലക്ഷണങ്ങൾ	315
കതീറൻ	433
കന്യാചര്യം	14
കല്പിതഗർഭം	75
കാൽവീക്കം	292
കാർണിയസ് മോരം	362
കാർബോളിക് ആസിഡ്	462
കാലുകൾ നിവർന്നിരിക്കുക	230
കാൽമുട്ടോ കാൽപാദമോ ജനനമുഖമായ പ്രസവം	233
കിഡ്നി	429
കുടലിറക്കം	327
കുട്ടി-ആണോപെണ്ണോ?	50-53
കുട്ടിഉടുപ്പ്	298
കുട്ടിക്കുമ്പ് മറുകുട്ടി	260
കുട്ടി-തലയുടെ അളവുകൾ	106
കുട്ടിയുടെ തൂക്കം	299
കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ	450-462
കുത്തിവെയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ	459
കുറുകാല്	328
കുവപ്പെടികഞ്ഞി	445
കൃത്രിമശ്വാസോഹ്വാനം	331
കൃത്രിമാഹാരങ്ങൾ	309-314

	പേജ്
കെഫാലികു വെർഷൻ	402
കൈകൾ തലയ്ക്കുമീതെ ഉയർന്നിരിക്കുക	231
ക്ലൈറോറിസ്	13
കോൺഡീസ് സൊല്യഷൻ	461
കോശങ്ങൾ	40
ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രസവകാരണങ്ങൾ	207
ക്രമവിരുദ്ധമായ പ്രസവം-പ്രതിവിധികൾ	208
ക്രമവിരുദ്ധമായ ജനനമുഖങ്ങൾ	206
ക്രേനിയോട്ടമി	393
ക്രോമസോമുകൾ	43
ഗ	
ഗർഭകാലചര്യ	65
ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന നീരാഴ്ച	363
ഗർഭകാല മഞ്ഞപ്പിത്തം	346
ഗർഭകാലരോഗങ്ങൾ	337-375
ഗർഭകാല വൃക്കരോഗം	345
ഗർഭധാരണം	37-39
ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ	63-73
ഗർഭകാലസംരക്ഷണം	76-83
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ചലനം	65
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ നില	123
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ മുഖം	
ജനനമുഖമായി വരുന്ന പ്രസവം	209
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശയനനില	119
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ്	102
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയഗണ്ഡുശ്രവണം	130
ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ഹൃദയസ്സന്ദനം	71
ഗർഭം അലസിപ്പോവുക	355
ഗർഭാപസ്കാരം	78-347
ഗർഭാശയം	17-20, 67
ഗർഭാശയം അകം പുറമായി മറിയുക	279
ഗർഭാശയ ഉടൽ	21
ഗർഭാശയകണ്ഠം	70

പേജ്

ഗർഭാശയകന്ദരം	23
ഗർഭാശയഗുളം	20
ഗർഭാശയഗുളം കീറിപ്പോവുക	277
ഗർഭാശയത്തിന്റെ തളച്ച്	253
ഗർഭാശയത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന രക്തസ്രാവം	258
ഗർഭാശയത്തിൽവെച്ചുള്ള ശിശുമരണം	353
ഗർഭാശയ പാശ്ചവിസ്തൃതചർമ്മം	26
ഗർഭാശയം പിളരുന്നസമയത്തുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ	278
ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോയതിനുശേഷമുള്ള ,,	279
ഗർഭാശയം പിളർന്നുപോവുക	277
ഗർഭാശയ പൂർവ്വസ്ഥിതി	180
ഗർഭാശയഭാഗങ്ങൾ	20
ഗർഭാശയഭിത്തികൾ	24
ഗർഭാശയമാന്ദ്യം	251
ഗർഭാശയമൂലം	21
ഗർഭാശയസങ്കോചം	248
ഗർഭാശയസങ്കോചം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം	250
ഗർഭാശയസ്ഥാനം	28
ഗർഭാശയാന്ത്രവിഭജന അറ	25
ഗർഭിണിയുടെ ദേഹപരിശോധന	82
ഗർഭിണിയുടെ വസ്ത്രധാരണം	80
ഗുദാസ്ഥി	94, 96
ഗുന്മൻ	75
ഗുഹ്യഭാഗം കീറിപ്പോവുക	274
ഗുഹ്യഭാഗത്തുള്ള ചൊരിച്ചിൽ	343
ഗൈനക്കോളജി	2
ഗൊണോറിയ	366

ച

ചെറിയ ഉപസ്ഥാശയം	243
-----------------	-----

മര

മർദ്ദി	321, 337
മർദ്ദി-ചികിത്സ	338

പേജ്

ജ

ജനനമുഖം	121
ജനനമുഖം-നെറി	215
ജനനമുഖം-പുഷ്പം	216
ജനനവും ശരീരനിമിത്തിയും	40-50
ജന്മനാലുള്ള പരകീപ്പണ്ണം	316
ജന്മനാലുള്ള വൈരൂപ്യങ്ങൾ	325
ജലവീക്ഷം	241
ജൈവരസപരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ	73

ട

ടൈമ്പറേച്ചർ	295, 448
ടെസ്റ്റീസ്	5
ടൈറനസ്	319

ഡ

ഡീ ക്യാപ്പിറേഷൻ	398
ഡം ഷുചെയ്യുവാൻപയോഗിക്കുന്ന ലോഷനുകൾ	438
ഡെറോൾ	462

ത

തല പുറത്തേയ്ക്കു വരാൻ താമസം	232
തലയിൽ മുഴ	328
തലയിൽ വീക്ഷം	328

ദ

ദ്വിതീയ രക്തസ്രാവം	268, 272
--------------------	----------

ന

നവജാതശിശു	294-308
നാഡി	182
നാഡികൾ	30
നാഭി	12
നാഭിയെല്ലം	94, 96
നാളഗർഭം	372
നാളഗർഭം-പൊട്ടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ	373
നിദ്രാഹിത്യം	245

	പേജ്
നിപ്പിൾ	311
നിവരൽ	141
നേത്രബിന്ദു	467
പ	
പതോളജി	2
പയീമിയ	283
പയീമിയാ-പരിചരണം	286
പയീമിയാ-പ്രതിവിധി	284
പയീമിയാ-ലക്ഷണങ്ങൾ	284
പരന്ന ഉപസ്ഥാശയം	242
പരന്നതും ചെറുതുമായ ഉപസ്ഥാശയം	244
പരിചരണം	280
പല്ലകൾ	81
പറങ്കിപ്പുണ്ണ്	368
പാനീയങ്ങൾ-പരിചരണങ്ങൾ	445-446
പുനരുത്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ	1-9
പുരുഷജനനേന്ദ്രിയം	4
പുരുഷബീജങ്ങൾ	45
പുരുഷലിംഗം	4
പുറത്തുള്ള തിരിച്ചിൽ	141
പുറമേ കാണുന്ന രക്തസ്രാവം	256
പുറം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നാൽ	235
പൂണെല്ല	94
പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കൽ	141
പുഷ്പം ഉപസ്ഥാശയത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുക	230
പുഷ്പം ജനനമുഖമാകുന്നതിനുള്ള കാരണം	224
പുഷ്പം ജനനമുഖമാകുന്ന കേസുകളിലെ	
പ്രസവപുരോഗതി	242
പുഷ്പം ജനനമുഖമാകുമ്പോഴുള്ള അപകടങ്ങൾ	221
പ്രഷോദയം	222-223
പെട്ടെന്നുള്ള പ്രസവം	247
പെരിനിയം	15
പൊക്കിൾക്കൊടി	90, 297

	പേജ്
പൊക്കിൾക്കൊടി ജനനമുഖമായി വരിക	237
പൊക്കിൾക്കൊടി പഴക്കുക	318
പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കേണ്ട വിധം	166
പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽനിന്നുള്ള രക്തവാർച്ച	318
പെരുരുഷഗ്രസ്ത	8
പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ്	74
പ്രസവം	109-117
പ്രസവ ഓപ്പറേഷനുമുമ്പു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ	377
പ്രസവകാല പരിചരണങ്ങൾ	183
പ്രസവക്ഷതങ്ങൾ	273
പ്രസവഘട്ടങ്ങൾ	113
പ്രസവചിത്തദ്രവം	288
പ്രസവജ്വരം	281
പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള രക്തസ്രാവം	255-265
പ്രസവത്തിന്റെ ക്രമരാഹിത്യം	247
പ്രസവപരിചരണം	142
പ്രസവപുരോഗതി	136-142
പ്രസവമുറി	146
പ്രസവാനന്തരഘട്ടവും പരിചരണവും	179-188
പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവം	266-280
പ്രസവാനന്തര രോഗങ്ങൾ	281-293
പ്രസവാനന്തര വേദന	182
പ്രസവവേദന	110
പ്രസവശുശ്രൂഷയ്ക്കു കരുതേണ്ട സാധനങ്ങൾ	379
പ്രസവസംബന്ധമായ ചിത്തദ്രവം	288
പ്രസവസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ	376-425
പ്രസവസംബന്ധമായ സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയകൾ	376
പ്രസൂതികമ്വിദ്യ	3
പ്രസൂതിവിജ്ഞാനീയം	1
പ്രാഥമിക രക്തസ്രാവം	267
പ്രോട്ടോപ്ലാസം	41
ഫ	
ഫണ്ടൽഗ്രിപ്പ്	125

പേജ്

ഫിസിക്യോളജി	2
ഫ്യൂണിക് സൂഫിൾ	72
ഫോമെന്റേഷൻ	447
ഫോഴ്സെപ്സ് ഡെലിവറി	380

ബ

ബലോട്ടുമെൻറ്	71
ബാഹ്യചർമ്മം	25
ബാഹ്യമായ ബലോട്ടുമെൻറ്	72
ബാർലിവെള്ളം	446
ബീജസൂത്രം	7
ബൃഹത്ഗോധരങ്ങൾ	12
ബൈനോവുലർ-ദയാണയജം	190
ബോറിക ആസിഡ്	462

ഭ

ഭക്ഷണം	80
ഭക്ഷണപട്ടിക	312-313
ഭഗദാരം	14
ഭഗദാരമാത്രേണയുള്ള പരിശോധന	133
ഭഗശിശ്നിക	13
ഭൂണവളച്ചു	54-62

മ

മഞ്ഞപ്പിത്തം	324
മടങ്ങൽ	140
മലത്തിൽ രക്തം	322
മലദാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക	326
മലദാരത്തിന് ചുറ്റും തൊലിപോവുക	322
മലബന്ധം	321-340
മലവിസർജ്ജനം	184
മലശോധന	82-296
മലാശയം	441
മസ്തിലുകയററം	344
മുകുട്ടിയുടെ പരിശോധന	174



	പേജ്
മറുപിള്ള	84-90
മായാമുഴ	75
മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരിചരിക്കേണ്ട വിധം	334
മിഡ്‌വൈഫ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ	135
മിഡ്‌വൈഫറിബാഗ്	144
മുക്കുവാൻ സാധിക്കായ്ക	254
മുഖം-ജനനമുഖമായി വരിക	212
മുച്ചുണ്ടു്	327
മുന്നീർ	89
മുന്നീർ ആധികൃ.	352
മുന്നീർക്കടത്തോൽ	88
മുന്നീർക്കടം പൊട്ടുക	229
മുലകുടി മാററൽ	306
മുലകൊടുക്കേണ്ട രീതി	304
മുലക്കണ്ണുകൾ പിൻവലിഞ്ഞിരിക്കുക	289
മുലക്കുപ്പികൾ	310
മുലഞ്ഞെട്ടുകൾ പ്രണപ്പെട്ടുക	289
മുലപ്പുരു	292
മുലപ്പാലിലെ ഘടകങ്ങൾ	300
മുലവെള്ളം	301
മൂത്രം	295-430
മൂത്രം എടുക്കുന്ന വിധം	433
മൂത്രം കെട്ടിനില്ക്കൽ	432
മൂത്രക്കുരു	185
മൂത്രക്കുഴൽ	430
മൂത്രഗർഭാശയ വികസനയറ	25
മൂത്രതടസ്സം	323
മൂത്രത്തിൽ ആൽബുമിൻ	340
മൂത്രദുഃഖം	13
മൂത്രദുഃഖം ഇല്ലാതിരിക്കുക	326
മൂത്രം പരിക്കുശാധന	81-438
മൂത്രമെടുക്കേണ്ട വിധം	185

പേജ്

മുത്രവിസർജനം	184
മുത്രശങ്ക	431
മുത്രസഞ്ചി	429
മുത്രാശയം	70
മുത്രാശയവസ്ത്രം	436
മുത്രാശയവീക്ഷം	432
മൂലം തള്ളിനില്ക്കൽ	327
മൂലസേതു	15

യ

യഥാർത്ഥ പ്രസവവേദന	111
യാദൃശ്ചിക രക്തസ്രാവം	255
യുക്തേനസ്	17
യൂനി ഓവുലർ-ഏകാണുജം	191
യൂറിത്ര	430
യൂറിൻ	430
യൂറിറ്റർ	429
യോനി	16
യോനി കിറിപ്പോവുക	276
യോനി തുറടയ്ക്കേണ്ട രീതി	357
യോനീഭാരം	14
യോനീമാർഗ്ഗം തുറടയ്ക്കുന്ന വിധം	269
യോനിയിൽനിന്നു രക്തം	325
യോനീവസ്ത്രം	437
യോനീവാചു	181

ര

രക്തവിതരണം	29
രക്തസ്രാവം-പരിചരണവും പ്രതിവിധിയും	263
രക്തസ്രാവം-പ്രതിവിധി	257
രക്തസ്രാവലക്ഷണങ്ങൾ	268

ല

ലഘുഭഗായരങ്ങൾ	12
ലബിയാമൈജോറ	12

പേജ്

ലബിയാമൈനോറാ	12
ലിംഗചർമ്മം ഇറുകിയിരിക്കുക	326
ലിംഗഭേദനിർണ്ണയം	51-53
ലൈസോറം	461
ലോവർസെഗ് മെൻറാക്സറേഷൻ	409
ലോഷൻ	463

വ

വയറു വലുതായിവരിക	65
വയറിൽവേദന	320
വാക്യം എക്സ് ടാക്റ്റർ	388
വായ്പുണ്ണി	317
വിലങ്ങനെയുള്ള കിടപ്പ്	121-234
വിസർജ്ജനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ	426-430
വൃക്കകൾ	426
വൃഷണങ്ങൾ	5
വെസിക്കുലർമോൾ	360
വെള്ളപോക്ക്	364
വെർഷൻ	400
വൈരൂപ്യങ്ങൾ	82
വ്യാജനോവ്	110

ശ

ശരീരശുശ്രൂഷ	188
ശരീരോഷ്ണാവ്	182
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷമുള്ള പരിചരണങ്ങൾ	421
ശിരസ്സിന്റെ നില	131-33
ശിരസ്സും കൈയും ഒന്നിച്ചുവരുന്ന പ്രസ്ഥം	233
ശിശുരോഗങ്ങൾ	315-332
ശിശുവിന്റെ മുലകൾക്കു വീക്കം	324
ശിശുശിരസ്സ്	104
ശിശുസ്നാനം	296
ശ്വാസബന്ധം	328
ശ്വാസബന്ധവും നീലനിറവും	328

പേജ്

ശ്വാസബന്ധവും വിളിവിളക്കു മുഖവും	329
ശ്വാസോച്ഛ്വാസം	295
ശ്ലേഷ്മ	24

സ

സമ്പ്രദായ	283
സമ്പ്രദായനിയമം ഇൻജക്ടർ	453
സലൈൻ എനിമാ	441
സാധാരണപ്രസവത്തിന്റെ പുരോഗതി	140
സാങ്കല്പികഗർഭം	75
സിരാവീക്കം	342
സിസ്റ്റർനൈറ്റിസ്	462
സിസ്റ്ററിയൻ ശസ്ത്രക്രിയ	407
സൂക്ഷ്മസം	103
സെപ്റ്റിസിമിയ	282
സ്നാനം	63-187
സ്നാനങ്ങളിൽ ചോരകെട്ടുക	291
സ്നാനപരിചരണം	81
സ്നാനവീക്കം	291
സ്നാനഭാഗം	183-299
സ്നാനഭാഗംകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ	302
സ്നാനഭാഗക്രമം	302
സ്നാനഭാഗംപാടിപ്പാത്തപ്പട്ടങ്ങൾ	309
സ്രീജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ	10-30
സ്രീബീജാണു.	27-46
സ്നാനം	81
സ്നാനപരിശോധന	125
സ്നാനിലെസേഷൻ	461

ഹ

ഹോട്ട് വാട്ടർബാഗ്	447
-------------------	-----

റ

റവക്കഞ്ഞി	445
-----------	-----

INDEX

A

	<i>Pages</i>
Abdominal Pregnancy	372
Abnormal Presentations	206
Abortion	355
Abscess of the Breast	292
Acute Yellow Atrophy	346
After Pain	182
Albuminuria	340
Amenorrhoea	63
Amniotic Fluid	89
Anatomy	1
Antiseptics	461
Apron	143
Arrow root	445
Aschheim-Zon-dek test	73
Asphyxia Neonatus	328
Atonic Haemorrhage	267

B

Ballottement	71
Baths	464
Bed sores	287
Binovular	190
Bipolar version	402
Bladder Lavage	436
Blue Asphyxia	328
Blue Asphyxia	330
Body of the Uterus	21
Breech Presentation	216
Broad Ligament of Uterus	26
Brow Presentation	215

C

	<i>Pages.</i>
Caesarean Section	407
Carbolic Acid	462
Carneous mole	362
Cavity	91
Cells	40
Constipation	240
Cephal Haematoma	328
Cephalic version	400
Cervix	20-70
Chromosomes	43
Cleft Palate	327
Clitoris	13
Club Foot	328
Coccyx	96
Colostrum	301
Colic	320
Combined Version	402
Concealed Haemorrhage	258
Condy's Solution	461
Congenital Deformities	325
Congenital Syphilis	316
Constipation	321
Convulsion	325
Cord Presentation	237
Craniotomy	393
Cramps	344
Crede's Method	269
Cystitis	432

D

Decapitation	398
Delay in the after coming head	232

Pages.

Descent	140
Dettol	462
Diet	183

E

Eclampsia	347
Ectopian Geststation	371
Egg Flip	446
Endometrium	84
Engorged Breasts	291
Engorged Breast	324
Enema	442-464
Enlargement of the Abdomen	65
Episiotomy	158
Eye Drops	467
Excretory System	426
Exhausted uterus	253
Extension	141
Extension of the childs arm	231
Extension of the leg	230
External Ballottement	72
External Cephalic Version	401
External Rotation	141
External Urethral Orifice	13

F

Face Presentation	212
False Pain	110
Female Genitalia	10-30
Fimbriae	23
Fimbria	27
Fits	348
Flat Pelvis	95

	<i>Pages.</i>
Flat Pelvis	242
Flexion	140
Flushed Breasts	291
Foetus Compressus	193
Foetal heart beats	71
Foetal membrane	88
Foetal Movement	65
Foetus Papyraceous	193
Fomentation	447
Forceps delivery	380
Frequency of Micturition	431
Fundal grip	125
Fundus	21
Funic souffle	72
G	
Garfian Follicles	27
Generally contracted and flat pelvis	244
Generally contracted Pelvis	243
Gonorrhoea	366
Gynaecology	2
H	
Hare-lip	327
Hydramnios	352
Hydrocephalus	241
Hydrorrhoea	363
Hymen	14
I	
Ice Bag	447
Imperforate Rectum	326
Imperforate Urethra	326
Induction of Labour	400
Infantile Diarrhoea	320

	<i>Pages</i>
Ileum	94
Impaction of Breech	230
Injections	450
Innerlips	12
Insomnia	345
Internal rotation	141
Internal Podalic Version	404
Internal Version	403
Intramuscular Injection	454
Intera Uterine death of the Foetus	353
Interavenous Injection	455
Inversion of the Uterus	279
Involution of the Uterus	180
Ischium	96
J	
Jaundice	324
K	
Kidneys	426-429
L	
Labia Majora	12
Labia Minora	12
Labour Pain	110
Labour room	146
Laceration of the Cervix	277
Laceration of the Perineum	274
Laceration of the Vagina	276
Laceration of the vulva	275
Leucorrhoea	364
Liquor Amnii	89
Living Cells	40

	<i>Pages</i>
Lochia	181
Longitudinal lie	119
Lotions	463
Lower segment operation	409
Lysol	461

M

Melaena Neonatus	322
Male Genital Organ	4
Menopause	36
Mensturation	31-36
Midwifery Bag	144
Miscarrage	359
Morning Sickness	65-337
Motion	296
Mouth Wash	465
Meningocele	328
Mucus membrane	24-84
Myometrium	24

O

Obstetrics	3
Ointments	465
Ophthalmic	467
Os innominatum	94
Ophthalmia neonatus	315
Outer lips	12
Ovum	27-46
Ovaries	23-26-27
Ovarian Pregnancy	371

P

Paints	466
Palpation	125

	<i>Pages</i>
Parametrium	26
Parts of Uterus	20
Pathology	2
Pelvic grip	127
Pelvic inlet	90
Pelvic outlet	90-91
Pelvis	90
Penis	4-5
Precipitate Labour	247
Perinium	15
Peritoneum	25
Phantom Tumor	75
Phimosis	326
Physiology	2
Physiology of Labour	110
Placenta	84-90
Placenta Praevia	260
Placenta Succenturiata	87
Plural birth	189
Position	123
Post Partum Haemorrhage	266-280
Pregnancy	37-39
Pregnancy-Kidney	345
Pregnancy Scars	65
Premature Rupture of the Membrane	229
Presentation	121
Prostate Gland	8
Prolapse of the Rectum	327
Protoplasam	41
Pseudo Pregnancy	75
Pyemia	283

	<i>Pages</i>
Pubis	10-96
Puerperium and the care of the Puerpera	179
Puerperal fever	281
Puerperal Insanity	288
Pulse	182-295
Pruritus Vulva	343

R

Rectal Saline	444
Rectum	441
Recto Uterine Pouch	25
Reproductive organs	4-9
Respiration	295
Restitution	141
Retention of Urine	432-323
Retracted Nipples	289
Revealed Haemorrhage	256
Ricket	95
Rupture of the Uterus	277

S

Sacrum	94
Sapraemia	283
Secondary post partum Haemorrhage	272
Septicaemia	282
Silver Nitrate	462
Sluggish Uterus	251
Sore Nipples	289
Sore Buttock	322
Spermatozon	45
Spina bifida	328
Spurious Pregnancy	75
Sterilization	461

	<i>Pages</i>
Subcutaneous Injection	453
Sutures	103
Syphilis	368

T

Temperature	295-182
Testes	5
Tetanus	319
Thrush	317
Tonic contraction of Uterus	248
Traumatic Haemorrhage	267
Tranverse lie	121
Triplets	189
True Pain	111
Tubal Pregnancy	372

U

Umbilical Cord	90
Umbilical grip	126
Umbilical Haemorrhage	318
Umbilical Hernia	327
Umbilical Sepsis	318
Unavoidable Haemorrhage	255-259
Unefficient action of the auxiliary powers	254
Uniovular	191
Upper segment Operation	415
Uterine cavity	23
Uterus	67-17-20
Ureter	429
Urinary Bladder	70-429
Urine test	438

V

Vacuum Extractor	383
Vagina	16
Vaginal Douche	437
Vaginal entrance	14
Vericose vein	342
Version	400
Vesico Uterine Pouch	25
Vesicular mole	360
Vomiting	321
Vulva	10

W

Weaning	306
White Asphyxia	329
White leg	292

X

X-ray	73
-------	----

മോഡേൺ മെഡിസിൻ

കറസ്പോണ്ടൻസ്

കോഴ്സ് (മലയാളം)


അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രവും ചികിത്സാമുറകളും മറ്റും വിശദമായി മലയാളഭാഷയിൽ തപാൽ മാഗ്ഗും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡ്യയിലെ ഏകസ്ഥാപനമാണ് ശാന്തിനികേതൻ മെഡിക്കൽ മിഷൻ.

അലോപ്പതി ഡിഗ്രികോഴ്സിന്റെ പാഠപദ്ധതിയിൽനിന്നും ശസ്ത്രക്രിയയും (സർജറി-surgery) സൂതികർമ്മവിദ്യയും (മിഡ്വൈഫറി-midwifery) മാത്രം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും, മറുകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എൺപത്തഞ്ചോളം പാഠങ്ങളിലായി ചോദ്യോത്തരരൂപേണ വൈദ്യശാസ്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം, അംഗവിശകലനശാസ്ത്രം, രോഗികളെ പരിശോധിക്കേണ്ടവിധം, രക്തപരിശോധന, രക്തസമ്മർദ്ദനിർണ്ണയം, രോഗനിർണ്ണയം കത്തിവെയ്പ്പുകൾ, അത്യാധുനിക ചികിത്സകൾ എന്നതൂടങ്ങി ഒരു ആധുനിക ഡാക്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുടെയും ചാർട്ടുകളുടെയും സഹായത്തോടെ സംശയലേശമെന്യേ വിശദമായി മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്,

ഡയറക്ടർ,

ശാന്തിനികേതൻ മെഡിക്കൽമിഷൻ, കോട്ടയം-1.



KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM

Cl. No. M618.2

Acc. No. 130435

This book should be returned on or before the date last stamped below.

[illegible]

If the book is not returned on due date
a fine of 25 Ps. per day will be charged

copy
0833R1


M618.2

GOS-M

130435

ജോസഫ് മിത്തും

മിസ്തെമ്പർ



മിസ്സൗവഹ്