

6288.



ജനുശാസ്ത്രപ്രവേശം

(ഒന്നാം ഭാഗം)

629

പ്രീഡിഗ്രി സുവോളജി

39



കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്



ജന്തുശാസ്ത്രപ്രവേശം

(ഒന്നാം ഭാഗം)

പ്രീഡിഗ്രി സുവോളജി

പ്രൊ. കെ. പി. വിജയകൃഷ്ണൻ
പ്രൊ. കെ. ടി. വിജയമാധവൻ
വി. എം. എൻ. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
എം. ശിവശങ്കരൻ.



കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

6288



ജനുവരി ൧൯൫൦-1

Malayalam

JANTHUSASTRAPRAVESAM-1

(Pre-Degree Zoology-1)

First Published December 1971

Copies 2000

Printed at the Rainbow Press,
Vazhuthacaud. Trivandrum-14.

Price Rs. 7.50

Published by

State Institute of Languages
Trivandrum

Copyright

State Institute of Languages
Trivandrum

Published under the scheme for production of University level literature in Indian Languages with the assistance of the Ministry of Education and Social Welfare, Government of India.



ജനുശാസ്ത്രപ്രവേശം

(ഒന്നാംഭാഗം)

പ്രിഡിഗ്രി സുവോളജി

ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ

പ്രൊ. കെ. പി. വിജയകൃഷ്ണൻ
പ്രൊ. കെ. ടി. വിജയമായവൻ
ശ്രീ വി. എം. എൻ. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ശ്രീ എം. ശിവശങ്കരൻ.



കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
കുരുവനന്തപുരം,

ജനറൽ എഡിറ്റർ

എൻ. വി. കൃഷ്ണ വാരിയർ

എഡിറ്റർ

ഡോ. ഏ. എൻ. പി. ഉമ്മർകുട്ടി

പരിശോധകൻ

പ്രൊ. കെ. എൻ. പരമേശ്വരൻ

പ്ര.ഫ്

എം. എൻ. സുബ്രമണ്യൻ,

ഡി. വി. സിറിൽ.

അവതാരിക

കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിൽ സർവകലാശാലാനിലവാരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിന്നും ഒരു പരിപാടി കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പെട്ട മുപ്പത്തെട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ, പ്രീഡിഗ്രിതലത്തിലേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ജന്തുശാസ്ത്രപ്രവേശം ഒന്നാംവാളും. കേരള, കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലകളുടെ പ്രീഡിഗ്രികോഴ്സുകളിലെ ജന്തുശാസ്ത്രസിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതും, അടുത്തു തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ രണ്ടാം വാളുവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതു്.

ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാഥമികതത്വങ്ങളും അകശേതകികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ഈ ഒന്നാം വാളുത്തിൽ അടങ്ങുന്നു. കശേതകികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും പ്രാഥമികമനുഷ്യശരീരശാസ്ത്രവും രണ്ടാംവാളുത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രീഡിഗ്രിവിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെതിനേക്കാൾ അല്പം വിപുലമാണ് ഇവയുടെ ഉള്ളടക്കം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഘടകമാണല്ലോ സിലബസ്; പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളുടെ സിലബസ്. അധ്യയനമാധ്യമം പ്രാദേശികഭാഷയാകുന്നതോടെ പ്രീഡിഗ്രി, ഡിഗ്രിക്ലാസ്സുകളിലെ സിലബസിന്റെ ഉൾക്കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഡിഗ്രിക്ലാസ്സുകളിലെ വിശദമായ ജന്തുശാസ്ത്രപഠനത്തിന്നും യോജിച്ച ആമുഖമായിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രീഡിഗ്രിയിലെ പാഠ്യപുസ്തകം ഏകക്കോ സമഗ്രമായിരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ധാരാളം ചേർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്തുശാസ്ത്രത്തെ പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിച്ചു സരസമാക്കുന്നതിൽ ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് സുവിദിതമാണല്ലോ.

പ്രൊഫസർ കെ. പി. വിജയകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഫസർ കെ. ടി. വിജയമായൻ, ശ്രീ വി. എം. എൻ. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ശ്രീ എം. ശിവശങ്കരൻ എന്നീ പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ ചേർന്നെഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം എറ

ണാകളും മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആർ. പരമേശ്വരയ്യർ സനിഷ്ഠർഷം പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

എൻ. സി. ഇ. ആർ. ടി. ഹയർസെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിലേയ്ക്കു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത ഏഴു വിഭാഗങ്ങളുള്ള “ബയോളജി” എന്ന ബ്രഹ്മം ഗ്രന്ഥം പ്രീഡിഗ്രിക്ലാസ്സുകളിലെ ജന്തുശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധികവായനയെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

വിജ്ഞാനതൽപരരായ കേരളീയരുടെ കൈകളിൽ ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലുള്ള കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞരായിരിക്കും. കാരണം അടുത്ത പതിപ്പിൽ അവ പരിഹരിച്ച് ഗ്രന്ഥം കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാക്കാമല്ലോ.

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,

തിരുവനന്തപുരം

1 ഡിസംബർ 1971.

എൻ. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ

ഡോ. ഏ. എൻ. വി. ഉമ്മർകുട്ടി



ഉള്ളടക്കം

1. ആമുഖം	1
2. ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം	5
3. കോശഭംഗം	26
4. ജന്തുശരീരം	34
5. അവയവങ്ങൾ	45
6. ഫൈലം പ്രോട്ടോസോവ	52
7. ഫൈലം സിലന്ററോ	81
8. ഫൈലം റാറിനോഫോറ	105
9. ഫൈലം പ്ലാറ്റാറിഫെൽമിൻതസ്	107
10. ഫൈലം ആഷ്-ക്കെൽമിൻതസ്	133
11. ഫൈലം അനലിഡ	169
12. ഫൈലം മൊളസ്ക	192
13. ഫൈലം ആർത്രോപോഡ	211
14. മറ്റു ചെറുഫൈലങ്ങൾ	247
15. ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമാറ്റ	260
16. ഫൈലം ഹെമികോർഡേറ്റ	266
ശബ്ദാവലിയും സൂചികയും	269

ആ മുഖം

മനുഷ്യൻ നിരീക്ഷണ, പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി ആർജ്ജിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അറിവാണു് ശാസ്ത്രം. കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പറ്റി സൂക്ഷ്മമായ അറിവു സ്മ്പാദിക്കാൻ മനുഷ്യനുള്ള വാസന അവന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽക്കേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ വാസനയുടെ ഫലമായി അവൻ നിരന്തരം പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ നിരീക്ഷണാസക്തി വളർന്നു വളർന്നു വരികയും അവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവു സ്മ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി കിട്ടിയ അറിവു് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനും, പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അവൻ യത്നിച്ചു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി അവനു ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചും തന്നെക്കുറിച്ചും കരയൊക്കെ മനസ്സിലായി. തലമുറകൾ പിന്നിട്ടു് തോറും ഈ അറിവു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അഭൂതപൂർവമായി വളരാൻ തുടങ്ങിയതു് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുവാനും അവന്റെ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഉടച്ചുവാക്കാനും തക്കവണ്ണം ശാസ്ത്രം വളന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ നിലയ്ക്കു പോയാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മനുഷ്യനു് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലും അവശേഷിക്കുമോ എന്നു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം.


ശാസ്ത്രത്തെ പല ശാഖകളാക്കി പിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്—ഭൗതികം, രസതന്ത്രം, ഗണിതം, ജീവശാസ്ത്രം—എന്നിങ്ങനെ. ഭൗതികം ദ്രവ്യത്തെയും ഊർജ്ജത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണു്. രാസവസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെയും വ്യവഹാരത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണു് രസതന്ത്രം. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിനു് ജീവശാസ്ത്രമെന്നു് പറയുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ശാസ്ത്രശാഖകളെല്ലാം അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടവയാണു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖയെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നു് പാടേ വേർതിരിച്ചു നിർത്തി കൊൾവാനു് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന

തല്ല. ജീവശാസ്ത്രം വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റു ശാസ്ത്രവിഭാഗങ്ങളും കർഷാക്കെ അറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ.

ജീവശാസ്ത്രം, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ സ്വർഗ്ഗീകരണ ശാസ്ത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവശാസ്ത്രത്തെ സൗകര്യാർത്ഥം രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം സസ്യങ്ങളെയും, മറേറത് ജന്തുക്കളെയും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തേത് സസ്യശാസ്ത്രം (Botany); രണ്ടാമത്തേത് ജന്തുശാസ്ത്രം (Zoology). ഈ പുസ്തകം ജന്തുശാസ്ത്രത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ.

ജന്തുശാസ്ത്രത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളതും നോക്കി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാണെന്നും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ ശാഖയ്ക്കും ജന്തുനൽകുന്നു. ശരീരഘടന, വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, ശരീരത്തിന്റെ വികാസം (development), ജന്തുവും ചുറ്റുപാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പാദസ്ഥാനം, പരിണാമം, പരസ്പരബന്ധം ഇങ്ങനെ പലതും ഈ ശാഖകൾക്ക് വിഷയം നൽകുന്നു. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ താഴെ കാണിക്കുന്നു.

ആകൃതിവിജ്ഞാനം അഥവാ രൂപശാസ്ത്രം (Morphology): ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഭാഗമാണിത്. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ അവയവങ്ങളെ 'മോർഫോളജി'യിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആന്തരികവയവങ്ങളുടെ ഘടനയെപറ്റി പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉപവിഭാഗത്തിന് അംഗശാസ്ത്രം (Anatomy) എന്നു പറയുന്നു. ശരീരത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂകളെ (tissues) കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പഠനമാണ് സൂക്ഷ്മശാസ്ത്രം (Histology). കോശവിജ്ഞാനം (Cytology) കോശത്തിന്റെ ഘടനയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്നു. വളരെ വേഗം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രവിഭാഗം. വർഗീകരണവിജ്ഞാനം (Taxonomy) ജന്തുക്കളെ പഠനസൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി വകുപ്പുകളും ഉപവകുപ്പുകളും മറ്റുമായി തരം തിരിക്കുന്നു. പുരാജീവിവിജ്ഞാനം (Palaeontology) ഭൂതകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവയും ഇന്നു നിലവിലില്ലാത്തവയുമായ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച പഠനമാകുന്നു. പഴുതാണികകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പാറകളുടെ അടിതടവിൽ കിട്ടിയതും മറ്റും പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ജീവാശ്മങ്ങൾ (ഫോസിലുകൾ) എന്നാണ് പേരു്. ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പുരാജീവിവിജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ടതും. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം അഥവാ ശരീരക്രിയാവിജ്ഞാനം (Physiology). ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഭക്ഷ്യാംശങ്ങൾ ശരീരഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതും പ്രവർത്തനശക്തി സമ്പാദിക്കുന്നതും വിതർജിക്കുന്നതും മറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നു ഈ ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കുന്നു.



ജനുശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ രസതന്ത്രവും ഉയർജ്ജതന്ത്രവും കൗശലിങ്ങേ പഠാം. ജനുശാസ്ത്രപ്രവർത്തനസംബന്ധമായ രസതന്ത്രത്തിന് ജീവരസതന്ത്രം (Biochemistry) എന്നും താഴ്ന്നതായ ഉയർജ്ജതന്ത്രത്തിന് ജീവഭൗതികം (Biophysics) എന്നും പറയുന്നു. ജീവികളുടെ വളർച്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനശാഖയ്ക്ക് ഭൂണശാസ്ത്രം അഥവാ ഭൂണവിജ്ഞാനീയം (Embryology) എന്നാണ് പറയുക. ബീജം പടിപടിയായി വളന്ന് സങ്കീർണമായ ശരീരമായിത്തീരുന്നതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂണശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ സന്തതികളിലേക്ക് പകരുന്നതെങ്ങനെയെന്നും പാരമ്പര്യത്തിനിടിസ്ഥാനമായ ജീനുകളുടെ രഹസ്യമെന്തെന്നും ജനിതകവിജ്ഞാനം (Genetics) വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവികളും പരിസ്ഥിതിയും (ചുറ്റുപാട്) തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം (Ecology). ഓരോ ചുറ്റുപാടിലുമുള്ള ജീവികളും പരിതസ്ഥിതിയും തമ്മിലെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓരോ ജീവികളുമുള്ള പ്രത്യേകതകളും, പരിതസ്ഥിതിയും ജീവിയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധവും ഇവിടെ പഠനവിഷയമാകുന്നു. ആദിമജീവികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പടിപടിയായി പല ദശകളും തരണം ചെയ്ത് സങ്കീർണങ്ങളായ നാനാതരം ജീവികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത കഥ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പരിണാമം (Evolution). ജീവന്റെ ഉൽഭവം മുതൽ ഇന്ന് കാണുന്ന അനവധി തരം ജീവജാലങ്ങളുടെ വികാസത്തിന്റെയും മാറ്റത്തിന്റെയും ചരിത്രം വരെ പരിണാമത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നു. ജന്തുഭൂമിശാസ്ത്രം (Zoogeography) ജന്തുക്കളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണത്തെ വിശദമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്. ഭൂമിയെ പല മണ്ഡലങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോന്നിലും കാണുന്ന ജീവികളേതെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള വിതരണത്തിന് കാരണമെന്തെന്നുമാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

രോഗാവസ്ഥാവിജ്ഞാനം (Pathology): ജന്തുവിന്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് വിഘാതം വരുത്തുന്ന ശാരീരികാവസ്ഥയാണ് രോഗമെന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുകയും, അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെത്തന്നെ നീയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് രോഗവിജ്ഞാനം. പെരുമാറ്റശാസ്ത്രം (Ethology): വ്യത്യസ്തസമയ-സ്ഥലങ്ങളെയും സ്വന്തം ഫിസിയോളജിയാവസ്ഥയെയും ആശ്രയിച്ച് വിഭിന്നരീതിയിലാണ് ജന്തുക്കൾ പെരുമാറുന്നത്. പലപ്പോഴും വിരുദ്ധമെന്നതോന്നുന്ന ഈ പെരുമാറ്റരീതികളെ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് പെരുമാറ്റശാസ്ത്രം.

ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസം

വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണ് ജീവൻ. ഈ ശക്തിയുടെ സവിശേഷതകളെന്തെല്ലാമെന്നും അതുറക്കൊള്ളുന്നതും ഉറക്കൊള്ളാത്തതുമായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങളെന്തെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ജീവനെന്നും ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരുത്തരും തരാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ സചേതനങ്ങളെന്നും മറ്റുള്ളവയെ അചേതനങ്ങളെന്നും ആണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. അചേതനവസ്തുക്കൾക്കില്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും സചേതനവസ്തുക്കൾക്കുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രത്യേകതകൾക്കടിസ്ഥാനമായ ഒരു പ്രതിഭാസവിശേഷമെന്നേ ജീവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൂട്ടൂ. അല്ലെങ്കിൽ അചേതനവസ്തുക്കൾ പരിണമിച്ചു് അത്തരം പ്രത്യേകതകൾ നേടിയപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിപ്രതിഭാസമാണ് ജീവനെന്നു പറയാം. ഏതായാലും ഇന്നു വരെ ആർക്കും നിർവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും അത്യുൽഭാവാപഹവും വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, അമീബ മുതലായ സൂക്ഷ്മശരീരികൾ മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള ജീവികളിലെല്ലാം ഒരുപോലെ സദാ പ്രാവർത്തികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ഇന്നു വരെ മനുഷ്യനു നിർമ്മിക്കാനാവാത്തതും ആയ അൽഭുതപ്രതിഭാസമാണ് ജീവനെന്നു പറയാം.

ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതകൾ

ജീവനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവനുള്ള വസ്തുവിനെ അവലംബിക്കണം. ജീവിയിൽ നിന്നും ജീവനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു പറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രത്യേകത, സ്വവർഗോല്പാദനശേഷിയാണ് (reproductive capacity). തന്നെപ്പോലൊന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവു് ജീവനുള്ള വസ്തുവിന്റെ മാത്രം ഗുണമാണ്. എത്ര വിലപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രമായാലും അതു മറ്റൊരു യന്ത്രത്തെ പ്രസവിക്കില്ല. മറിച്ചു്, ഏതൊരു ജീവികും സന്തതികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടു് താനും. ഒരാക്കണിക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൂക്ഷ്മശരീരിയായ ജന്തുവിനു കൂടിയുണ്ടു് ഈ കഴിവു്. അത്രയുമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ

കണികയുണ്ട് ഈ ഗുണം. ഓരോ കോശവും വളർച്ചയെത്തിയാൽ രണ്ടായി പിളർന്നു രണ്ടു കോശങ്ങളായി വളരുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടായ രണ്ടു കോശങ്ങളും മാതൃ കണികയോടു് ഘടനയിലും പ്രവൃത്തിയിലും സമാനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവവസ്തുവിന്റെ സ്വയം പെരുകാനുള്ള കഴിവാണു് ജന്തുവർഗങ്ങളുടെ നിലനില്പിനും പൂർവാപരബന്ധത്തിനും അടിസ്ഥാനം.

സചേതനവസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം ശരീരം കോശം (cell) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണു് നിർമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഓരോ കോശവും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റാണു്. അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം മറ്റൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകവസ്തുവും. ഈ വസ്തുവിനു പ്രോട്ടോപ്ലാസം (protoplasm) എന്നാണു് പേരു്. ജീവന്റെ ഭൗതികാടിസ്ഥാനം പ്രോട്ടോപ്ലാസമാകുന്നു. ഈ വസ്തു ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിലേ കാണു്; അചേതനവസ്തുക്കളിലില്ല. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു് അന്യത്ര പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സചേതനവസ്തുക്കളുടെയെല്ലാം ശരീരം പ്രോട്ടോപ്ലാസത്താൽ നിർമിതമാണു്. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒരു കാർബണികയൗഗികമാണു് (organic compound). അതിൽ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം. കാർബണിനു് പുറമേ, ഗണ്യമായ തോതിൽ ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ എന്നീ മൂലകങ്ങളും നന്നേ ചെറിയ തോതിൽ ഫോസ്ഫറസ്, സൽഫർ, കാൽസിയം, മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം, ഇരുമ്പു തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലുണ്ടു്. ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നു് വെള്ളമാണു് മൂല്യഘടകം. പിന്നെ കാർബൺ, ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നീ മൂന്നു മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തതോതിൽ സംയോജിച്ചുണ്ടായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും കൊഴുപ്പും അതിലടങ്ങുന്നു. ഈ മൂന്നു മൂലകങ്ങളും നൈട്രജനും ചേർന്നുണ്ടായ പ്രോട്ടീൻ, പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമായ അംശമാണു്. കാർബൺ അടങ്ങുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പൊതുവേ കാർബണികപദാർത്ഥങ്ങൾ (organic matter) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ജീവനുള്ള വസ്തുവിൽ സദാ നിർമാണാത്മകവും ക്ഷയാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണു് താനും. ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയ്ക്കു് ഉപാപചയം (metabolism) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ ശരീരവളർച്ച സാധിക്കുന്നതിനും സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേയ്മാനം തീക്കുന്നതിനും വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർമാണവും (നിർമാണാത്മക പ്രവർത്തനം) ജീവിയുടെ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഊർജം (energy) ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ വിശ്ലേഷിച്ച് പുറത്തുവിടലും (ക്ഷയാത്മകത്വം) അടങ്ങുന്നു. ജീവവസ്തുവിൽ നടക്കുന്ന നിർമാണാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് ഉപാപചയം (anabolism) എന്നും ക്ഷയാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് അപാപചയം (katabolism) എന്നും പറയാം. ഉപാപചയവും അപാപചയവും പ്രാണക്രിയയിൽ അടങ്ങുന്നു. ആ പ്രാണക്രിയയാവട്ടെ പ്രാണികളുടെ പ്രത്യേകതയുമാണു്. ജീവനില്ലാത്ത വസ്തു പുറമേ നിന്നെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്വശരീരഭോഗമാക്കിമാറ്റിവെക്കുകയില്ല. വേണ്ട സമയത്തു് വേണ്ട

തോതിൽ പ്രവർത്തനശക്തി, പുറമേ നിന്നുള്ള യാതൊരു നിയന്ത്രണവും കൂടാതെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയുമില്ല. ഇതു രണ്ടും ജീവനുള്ള പദാർത്ഥത്തിന് സാധ്യമാണ്.

പോഷണം (nutrition), ശ്വാസനം, വിസർജനം (രോചനം) എന്നിവ പ്രാണക്രിയകളിൽ ചിലതാണ്. പുറമേ നിന്ന ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച്, അവയെ ദഹിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് പോഷണം. അതായത്, ഭക്ഷണം സമ്പാദിച്ച് വേണ്ട പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. തന്മൂലം ശരീരം വളർത്തുവാനും തേയ്മാനം തീർക്കുവാനും വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചിലതിനെ പ്രാണവായുവുമായി ചേർത്ത് (ഓക്സീകരിച്ച്) ഊർജം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരപോഷണത്തിന് വേണ്ട വസ്തുക്കളും ഊർജനിർമാണത്തിന് വേണ്ട ഇന്ധനവും പോഷണക്രിയ വഴിയാണ് പ്രാണികൾ സമ്പാദിക്കുന്നത്. സങ്കീർണശരീരത്തോടു കൂടിയ ജീവികൾക്കു പ്രത്യേക പചനവ്യൂഹം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നാമില്ലാത്ത അതിസൂക്ഷ്മജീവികളിലും പോഷണക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട്. അമീബ എന്ന അണുജീവിയുടെ ശരീരം ഒരു തുള്ളി പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ്. അവിടെയും പ്രാണക്രിയ നടക്കുന്നു. പുറുവാട്ടുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നു ആവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാണക്രിയ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്നു പറയാം.

ഊർജോല്പാദനത്തിന് ഇന്ധനവും പ്രാണവായുവും വേണം. ഇന്ധനം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുവെന്ന് മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ശ്വാസനം വഴി ജീവികൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നു. ഇന്ധനവും, ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ഓക്സീകരണം നടന്നാണ് ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷണശാലയിലോ മറ്റോ ഇന്ധനം കത്തിയുണ്ടാകുന്ന മാതിരിയല്ല ഇതുശരീരത്തിൽ ശക്തിയുണ്ടാകുന്നത്. അടുപ്പിൽ വിറകുകത്തിച്ചാൽ അതികഠിനമായ ചൂടാണല്ലോ അനുഭവം. അതായത്, ഇന്ധനം കത്തിയാൽ (ഓക്സീകരിച്ചാൽ) ഊർജം ഒന്നിച്ചാണ് പുറത്തുവരിക. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ അങ്ങിനെയല്ല. ശരീരതാപമുയരാതെ തന്നെ ശക്തി അവിടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുസാധിക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം പടിപടിയായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ പടിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓരോ രാസവസ്തുവാണ്. അത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ എൻസൈമുകൾ എന്ന വകുപ്പിൽപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസക്രിയകളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ തരം എൻസൈമുകളാണ്.

രാസക്രിയകളുടെയും മറ്റും ഫലമായി ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പുറംതള്ളാനുള്ള ഫീർപ്പാടും ജീവനുള്ള വസ്തുവിലുണ്ട്. അത്തരം മാലിന്യങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും, യൂറിയ, യൂറിക് ആസിഡ് എന്നിവയും. ഉയർന്ന ജീവികളിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രത്യേകം വിസർജനവ്യൂഹം തന്നെയുണ്ട്. അതില്ലാത്തവയിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ മാലിന്യങ്ങളും ദേഹത്തിൽ ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള ജലാംശവും പുറംതള്ളപ്പെടുന്നു.

ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വളർച്ചയുണ്ട്. അചേതനവസ്തുക്കളും വളരാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ക്രിസ്തൽ ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു പൂരിത ലായിനിയിൽ കെട്ടി താഴ്ത്തിയാൽ അതു വളരും. ലായിനിയിൽ നിന്ന് പദാർത്ഥത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ ചുറ്റും അടിച്ചു കൂട്ടുന്നതു കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തൽ വലുതാവുന്നത്. എന്നാൽ സചേതനവസ്തു വളരുന്നതങ്ങനെയല്ല. പുറമേയുള്ള വളർച്ചയല്ല താനും അത്. ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വശരീരാംശമാക്കി മാറിക്കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വളർച്ചയാണത്. പോഷണക്രിയ വഴി കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളെപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ശരീരം വളരുന്നതെന്ന് മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിർമാണാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ ശക്തിസമ്പാദനത്തിനു വേണ്ടതിലേറെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ലഭ്യമാകുകയും അതു വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജീവികൾക്കു മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു ഗുണമാണ് സ്വമേധയാ-പരസഹായം കൂടാതെ-ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ്. എത്ര വിലപിടിച്ച യന്ത്രമായാലും ഡ്രൈവറുടെ സഹായം കൂടാതെ അതു നീങ്ങുകയില്ല. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിനു അങ്ങിനെയൊരു ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങാനുള്ള കഴിവു മിക്ക ജീവികൾക്കുമുണ്ട്. ജീവവസ്തുവിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് പരിസരപ്രേരണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നത്. സാഹചര്യാനുപ്രതികരണം(irritability) എന്ന് ഈ വിശേഷഗുണത്തിനു പേരിടാം. ഇത്-ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുപോകുക-ജീവിയുടെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമാണ്. ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ച് അറിവു കിട്ടാൻ ബോധേന്ദ്രിയങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. അത്തരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മജീവികൾ കൂടി ചുറ്റുപാടിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്നതു കാണാം. ഒരമീബയ്ക്ക് അതിന്റെ മാർഗമധ്യേ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടായാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വെളിച്ചം കൂടുതലുള്ളിടത്തുനിന്നും ആപൽക്കാരികളായ രാസവസ്തുക്കളുള്ളിടത്തു നിന്നും അതു ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റം. അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി പ്രോട്ടോപ്ലാസം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അമീബ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കു പോലും സാഹചര്യാനുപ്രതികരണശക്തിയുണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

അചേതനവസ്തുക്കൾക്കു പ്രത്യേക ജീവിതദശകളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ജീവനുള്ള വസ്തു പല ദശകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. മാത്രമല്ല അവസാനഘട്ടത്തിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാശമെന്നാൽ ജീവരഹിതമായിത്തീരുക എന്നർത്ഥം. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർധക്യം എന്നീ ദശകളുണ്ടല്ലോ. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ മറ്റു ജീവികളുടെ ജീവിതചക്രത്തിലും കാണാം.


ജീവന്റെ ഉൽഭവം

വിവിധ തരത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഇന്നു ഭൂമി വെട്ടുന്നു. ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടു മുതൽ മലകളുടെ ഉത്തുംഗതുംഗങ്ങൾ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ജീവലോകം; ഉത്തരധ്രുവം മുതൽ ദക്ഷിണധ്രുവം വരെ



വെള്ളത്തിലും കറയിലും വായുവിലും ജന്തുക്കളെ കാണാം. എന്നാൽ ഇന്നു സർവ്വ വ്യാപിയായ ജീവൻ എന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ജീവന്റെ അറങ്ങേറാത്തെയും ആദികാലചരിത്രത്തെയും പറ്റി നമുക്കു ചിന്തിച്ചുനോക്കാം.

ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ഉദ്ദേശം 480 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പായിരിക്കണമെന്നത്രേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ആ കാലത്തു ഭൂമി വെറും വാതകരൂപത്തിലായിരുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആ വാതകഗോളത്തിന് അതികഠിനമായ ചൂടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ക്രമേണ അതു തണുത്തു. ദ്രവരൂപത്തിലായി. അടുത്ത പടിയായി, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ഘനീഭവിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ ഘട്ടത്തിലൊന്നിലും ജീവനുള്ള വസ്തു ഭൂതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ന്യായമില്ല. ജീവനു നിലനില്ക്കാനൊക്കുന്നതായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതി. ഭൂമി തണുത്തു ഒരു പ്രത്യേകഘട്ടത്തിലെത്തിയതോടെ സാരമായ പല പരിവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നുമാനിക്കാം. ആ സമയത്തു, വായുമണ്ഡലത്തിൽ ധാരാളം ഹൈഡ്രജനുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ധാതുപദാർഥങ്ങളുണ്ടു്. കാർബണം ലോഹവും ചേർന്ന കാർബൈഡുകൾ (carbides) ഇതിലൊരു പ്രധാനവസ്തുവാണ്. ഭൂമിയുടെ തിളച്ചുചരിയുന്ന അന്തർഭാഗത്തു നിന്ന അഗ്നിപർവതകോളങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ, ലാവയുടെ രൂപത്തിൽ കാർബൈഡുകൾ പുറത്തേക്കു വന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ ബഹിർഗമിച്ച കാർബൈഡുകൾ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്നു ഹൈഡ്രോകാർബൈഡുകൾ (hydrocarbons) ഉണ്ടായി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹൈഡ്രജനു പുറമേ നൈട്രജൻ എന്ന വാതകവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഹൈഡ്രജനും കലർന്നു അമോണിയ വാതകം രൂപം കൊണ്ടു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലമായിരുന്നു. അതിൽ ഹൈഡ്രോകാർബണുകളും അമോണിയയും ഒത്തുചേർന്നു പലതരം അമിനോ അമ്ളങ്ങൾക്കു രൂപം കൊടുത്തു.



ഈ സംഭവം ജീവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. അമിനോ അമ്ളങ്ങൾ അചേതനവസ്തുവിൽ നിന്നുണ്ടാവുക എന്ന കൃത്യമാണിവിടെ നടന്നതു്. അതെങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു എന്നു വ്യക്തമായി പറയാനാവില്ല. അന്നത്തെ താപനിലയും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളും അതിനു പറ്റിയതായിരുന്നിരിക്കണമെന്നു പറയാനാകൂ. അതുപോലെ തന്നെ, തക്കതായ പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടായപ്പോൾ അമിനോ അമ്ളങ്ങൾ ചേർന്നു പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. ജലപ്പരപ്പിൽ

പാറിക്കിടന്നിരുന്ന പ്രോട്ടീൻ തുള്ളികൾ അടുത്ത കൂടി ഏകീഭവിച്ച് പ്രോട്ടീൻ കണക്കുടങ്ങാൻ അഥവാ കൊഅസർവേറുകൾ (coacervates) ഉത്ഭവിച്ചു. പ്രോട്ടീൻ കണങ്ങളും ജലബിന്ദുക്കളും ഒത്തുചേർന്നാണ് ഇതു രൂപം കൊണ്ടത്. ഈ കൊഅസർവേറുകൾ ആയിരുന്നിരിക്കണം ജീവന്റെ ഉറവിടം. ചുറ്റുമുള്ള നേരിയ ജലപടലത്തിലൂടെ പല പദാർത്ഥങ്ങളും അകത്താകാനും മറ്റു ചിലതിനെ പുറത്തുവിടാനുമുള്ള കഴിവ് കൊഅസർവേറുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ക്രമേണ അകത്തെടുക്കുന്ന ചില തന്മാത്രകളെ ഭേദിക്കാനും അവയിലടങ്ങിയിരുന്ന ഊർജ്ജം വിമുക്തമാക്കി ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് അവയ്ക്കു സ്ഥായിയായി വന്നുചേർന്നു. ജൈവനിർമ്മാണക്രിയയുടെ ഉത്ഭവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. സ്വയം ഇരട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള - ഇന്ന് ഏതൊരു ജീവിയിലും പാരമ്പര്യത്തിനടിസ്ഥാനമായി നില്ക്കുന്ന ജീനുകളിലെ പ്രധാനഘടകമായ-ഡി എൻ എ എന്ന വസ്തു പിന്നീട് ഉത്ഭവിച്ച് കൊഅസർവേറുകളുമായി ചേർന്ന ജീവനുള്ള പദാർത്ഥമായി മാറിയെന്നു നമുക്കുനമനിക്കാം. ഇതു വെറും അനമാനമാണ്. അനവധി ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം ഇന്നതായിരുന്നുവെന്ന് തീർത്തും പറയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലല്ലോ.

ആദിമജീവികൾ വെറും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മകളെങ്കിലും മാത്രമായിരുന്നു. പ്രത്യേക രൂപമോ ആവരണമോ അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലനില്പിനും ഉല്പാദനത്തിനും വേണ്ടതായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നു സമ്പാദിച്ചു. അമീനോ അമ്ളങ്ങൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ അവയ്ക്കു ത്യാവശ്യമായിരുന്നു, അതെല്ലാം ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ക്രമേണ ആദിജീവികൾ പെരുങ്കകയും ആഹാരസാധനങ്ങൾക്കു ക്ഷാമം നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഇതു ജീവികൾക്കു വലിയൊരാപത്തായി. അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനു ഭക്ഷണം സ്വയം പാകപ്പെടുത്തുകയേ വഴിയുള്ളൂവെന്നു വന്നു. ഹരിതം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ (chlorophyll) എന്ന വസ്തു ചില ജീവപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ കാലത്തായിരിക്കണം. അതോടെ ആ സചേതനവസ്തുക്കൾ വെളുപ്പും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് അന്നജം (starch) നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജീവോൽപത്തിയോളം തന്നെ സുപ്രധാനമാണ് ക്ലോറോഫിലിന്റെ ആവിർഭാവം. കാരണം, ഹരിതമുള്ള ജീവവസ്തുക്കൾ നിർജീവവസ്തുക്കളിൽനിന്നു സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാനും അതുപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതോടെ ജീവലോകം രണ്ടു പ്രധാനവിഭാഗങ്ങളായിത്തീരിഞ്ഞു. ഒന്ന് സ്വപോഷിതങ്ങളായ സസ്യങ്ങൾ, മറേറത് പരിപോഷിതങ്ങളായ ജന്തുക്കൾ. ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ഭക്ഷണം സ്വയം നിർമ്മിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ നിർമ്മിച്ച ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉത്ഭവത്തോടു കൂടി രണ്ടായിവിരിഞ്ഞ ജീവലോകം വീണ്ടും ശാഖോപശാഖകളായി പിരിഞ്ഞു വീവിധങ്ങളായ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഉണ്ടായിത്തീർന്നു.

സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും

സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മാത്രമാണ് മുഖ്യസചേതനവസ്തുക്കൾ. ജീവന്റെ മുഖ്യഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മനിർമ്മിതമായ

ശരീരം രണ്ടിനമുണ്ട്. പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്താൻ രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും കഴിയും. ജീവകൃതി രണ്ടിലും നടക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും വേർതിരിച്ചു വിവരിക്കുക പതിവാണു്.

സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ലോറോഫിലിന്റെ സഹായത്തോടെ സസ്യങ്ങൾ അന്നജം (starch) നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം (photosynthesis) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ കഴിവു് ജന്തുക്കൾക്കില്ല. അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ക്ലോറോഫിലില്ലാത്തതാണിതിനു കാരണം. ചുറ്റും ചില ജന്തുക്കൾക്കു് (സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കു്) ക്ലോറോഫിലും തന്നിമിത്തം പ്രകാശസംശ്ലേഷണക്കഴിവുമുണ്ട്. കുമിൾ (കൂൺ) മാതിരി പച്ചനിറമില്ലാത്ത സസ്യങ്ങൾക്കു് ആ കഴിവില്ലാതന്നെ. എങ്കിലും, പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, അന്നജനിർമ്മാണം സസ്യങ്ങളുടെ മൗലികലക്ഷണമാണു്. അങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണു് ജന്തുക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നതു്. മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കാതെ പരിവേഷിതങ്ങൾക്കു ജീവിക്കാനൊക്കുകയില്ല. ഇങ്ങിനെ സസ്യഭുക്കുകളോ സസ്യഭുക്കുകളായ ജന്തുക്കളെ തിന്ന ജീവിക്കുന്നവരോ ആണു്. ജന്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്നർത്ഥം.

മിക്ക സസ്യങ്ങളും ചിരപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളാണു്. റിട്രന്ററച്ചുനിൽക്കുക എന്നതു് അവയുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. നേരെമറിച്ചു് ജന്തുക്കൾ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളാൽ ജന്തുക്കളും നിങ്ങളെന്ന സസ്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ അവ അപവാദങ്ങൾ മാത്രമാണു്, ഉത്സർഗങ്ങളല്ല.

ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്നു് ഒറ്റക്കുറുവും പ്രത്യേകരൂപവും ഉണ്ടു്. ചെടികളാകട്ടെ കൊമ്പും ചില്ലുമായി പടന്നിരിക്കുന്നു. താഴുന്നതരം സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും ഈ നിയമത്തിനു വിധേയമല്ലാത്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവ്യമാണു്.

ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസം സാഹചര്യപ്രതികരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണു്. ചില്ലു വെട്ടിയാൽ മരത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം പ്രതിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ജന്തുവിനു മുറിവേല്പിച്ചാലോ? തീർച്ചയായും പ്രതികരണമുണ്ടാകും. സസ്യങ്ങൾക്കു് വേദനയും ചൂടും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല, പ്രതികരണം പുറത്തു കാണിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു്, ബാഹ്യ പ്രചോദനമുണ്ടായാലും അവ നിശ്ചലമായി വർത്തിക്കുന്നതു്.

ചെടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ജന്തുശരീരത്തിലുള്ളതു പോലെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അവയവവ്യൂഹങ്ങളൊന്നും കാണുകയില്ല. ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പചനവ്യൂഹം, ശ്വാസനവ്യൂഹം, വിസർജനവ്യൂഹം, നാഡിവ്യൂഹം മുതലായ അവയവസമൂഹങ്ങളുണ്ടു്. ഓരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ താഴുന്ന തരം ജീവികളിൽ ഇത്തരം അവയവസംഘടന രൂപപ്പെട്ടു കാണുകയില്ല.

സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ശരീരം കോശങ്ങളാൽ (cell) നിർമ്മിതമാണു്. എന്നാൽ രണ്ടിലെയും കോശങ്ങൾക്കു് ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം കാണാം,

സസ്യത്തിന്റെ കോശത്തിന് ചുറ്റും സാമാന്യം കട്ടിയുള്ളൊരാവരണമുണ്ട്. കോശസീന്ദ്ര (cellulose) എന്ന വസ്തുവിനാലാണ് ഇതു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജന്തുക്കളുടെ കോശത്തിന് ചുറ്റും നടന്ന നേർത്ത ഒരു കോശഭിത്തി മാത്രമേ കാണൂ.

സസ്യങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾക്കു മറ്റു ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ വളരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ചേരിയൊരായ ചില്ലുകളുടെയും അറ്റങ്ങൾക്കാണ് കഴിവു. എന്നാൽ ജന്തുക്കളിൽ ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വളർച്ച ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്.

പ്രോട്ടോപ്ലാസവും കോശവും

ജീവൻ കടികൊള്ളുന്ന രാസയന്ത്രഗതികളിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസമെന്ന പറയുന്നു. ഇതേയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദാർത്ഥമില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. ജീവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെന്തെല്ലാമാണെന്നും മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രത്യേകതകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഏകവസ്തു പ്രോട്ടോപ്ലാസമാകുന്നു.

എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കില്ലെങ്കിലും പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനു പൊതുവായ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലായാലും ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തായാലും പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആ ഗുണങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ചാരനിറത്തിലുള്ളതും ജെല്ലി പോലെയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു അതിസങ്കീർണ്ണ പദാർത്ഥമാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. അതിൽ 70 മുതൽ 80 വരെ ശതമാനം ജലമാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ചില പദാർഥങ്ങളും അതിലടങ്ങുന്നു. ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും മറ്റു ചിലവയുടെ കണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മട്ടിലാണിരിക്കുക. പദാർഥകണങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേരാതെ നിലംബിതമായി വർത്തിക്കുന്ന (suspended) ഒരു വസ്തുവെ കൊളോയ്ഡ് (colloid) എന്നുപറയുന്നു. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒരു കൊളോയ്ഡ് ആകുന്നു. ഒരു കൊളോയ്ഡ് രണ്ടു രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. കൂടുതൽ ദ്രവഭാവമുള്ള സോൾ (sol), കൂടുതൽ ജെല്ലി രൂപമുള്ള ജെൽ (gel) എന്നിവയാണിവ. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനു സോൾ രൂപത്തിൽ നിന്നു ജെൽ രൂപത്തിലേക്കും മറിച്ചും മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ പലതരം രാസവസ്തുക്കളടങ്ങുന്നു. മുഖ്യഘടകം വെള്ളം തന്നെ. അലിഞ്ഞു അല്ലാതെയും പല പദാർഥങ്ങളും പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലുണ്ട്. പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് അലിയാതെ കിടക്കുന്നവ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അലിഞ്ഞോ അല്ലാതെയോ കാണുന്നു. പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു അന്നജം അലിയാതെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനുകളുടെ കണങ്ങളാണ് നിലംബിതമായ മുഖ്യവസ്തു. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ടകവും ഇതു തന്നെ.

പ്രോട്ടീനുകൾ: അമിനോ അമ്ലങ്ങളെന്ന ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവാണ് പ്രോട്ടീൻ. ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപതു തരം അമിനോ അമ്ലങ്ങൾ പല വിധത്തിലും സംയോജിച്ചാണ് പല തരം പ്രോട്ടീനുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അമിനോ അമ്ലങ്ങളിലെ രാസപദാർഥങ്ങൾ നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, കാർ

ബസ് എന്നിവയാണ്. ഒരു ജീവിയിൽ തുടച്ചായി ജീവന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിലെ പ്രോട്ടീനുകൾക്കാണ് പരയാം.

അമിനോ അമ്ലങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ ഒന്നിനു പിന്നിലൊന്നായി കൂട്ടിയിണക്കി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ചങ്ങല പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള തന്മാത്രകളെ പോളിപെപ്റ്റൈഡുകൾ (polypeptides) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ: കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂലകങ്ങൾ 1:2:1 എന്ന തോതിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. രണ്ടുവിധത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുണ്ട്. 1. മോണോസാക്കറൈഡുകൾ-വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന പഞ്ചസാരകൾ 2. പോളിസാക്കറൈഡുകൾ-വെള്ളത്തിലലിയാത്ത അന്നജം, ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്നീ വസ്തുക്കൾ.

കൊഴുപ്പുകൾ: കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ചേർന്നുണ്ടായതെന്നാണ് കൊഴുപ്പുകളും (fats). എന്നാൽ ഇതിൽ ഓക്സിജന്റെ തോത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലുള്ളതിൽ കുറവാണ്.

ന്യൂക്ലിയിക് അമ്ലങ്ങൾ: ജീവനുള്ള പദാർത്ഥത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ അംഗമാണ് ഈ അമ്ലങ്ങൾ. ഒരു പ്രത്യേകതരം (പെന്റോസ്) പഞ്ചസാരയും ഒരു ഫോസ്ഫോറിന്റെ അംഗവും നൈട്രജനടങ്ങുന്ന ബേസുകളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയിക് അമ്ലങ്ങൾ (nucleic acids). (ഇവയെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് അനൗത പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.) മേൽപറഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലെ ജൈവവസ്തുക്കളാകുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമേ, അജൈവവസ്തുക്കളായ (inorganic) ക്ഷാരങ്ങളും അതിലുണ്ട്. സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം, കാൽസിയം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ക്ഷാരങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന ക്ഷാരങ്ങൾ.

കോശം (സെൽ)

ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ശരീരം പ്രോട്ടോപ്ലാസമെന്ന യൗഗികതാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അനേകായിരം ചെറുമാതൃകളായാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഓരോ മാതൃകയും പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ഒരു ചെറുകണികയാണെന്നർത്ഥം. ഈ മാതൃകൾക്കു കോശങ്ങൾ അഥവാ സെല്ലുകൾ എന്നു പറയുന്നു. ജീവശരീരത്തിന്റെ ഘടനാപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ മാതൃകയായി കോശത്തെ കണക്കാക്കാം. പ്രോട്ടോസോവനുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരോ ഒരു കോശം മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിൽ നിരവധി കോശങ്ങളുണ്ട്. കോശങ്ങളാകുന്ന ഇഷ്ടികകൾ ചേർത്തുവെച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ജന്തുശരീരമെന്നു പറയാം.

സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോശം നന്നേ ചെറിയതാണ്. സൂക്ഷ്മദർശിനിലൂടെ നോക്കിയാലേ അതു ഗോചരമാകൂ. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ കോശവും അത്യുത്പന്നസിദ്ധികളുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനമാണ്. അവയുടെ ഘടന, പ്രവർത്തനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അനവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉറ്റ ശ്രമിച്ചിട്ടു

ണ്ടെങ്കിലും കോശത്തെക്കുറിച്ച് പലതും ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ഒരു ചെറുതുള്ളിയായി മാത്രം പഴയ കാലത്തു കോശത്തെ കണക്കാക്കിപ്പോന്നു. എന്നാൽ സെല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം പിന്നീട് അത്യധികം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാഭൈജവപ്രക്രിയകളുടെയും മൗലികഘടകമായാണ് ഇന്നു കോശം കരുതപ്പെടുന്നത്.

ജന്തുശരീരത്തിൽ പലതരം കോശങ്ങൾ കാണാം. പേശിയിലെ കോശവും ത്വക്കിലെ കോശവും ഒരു പോലെയാണല്ലോ. എങ്കിലും എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ചില പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബാഹ്യ കവചവും മർദ്ദവും മറ്റു ചില ഉപാംഗങ്ങളും എല്ലാശരീരങ്ങളുണ്ട്. പുറമേ നിന്ന് വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഊർജ്ജം (energy) ഉല്പാദിപ്പിക്കാനും എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും കഴിയും. അവ ഓരോന്നും, രാസപ്രക്രിയകൾ പലതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരങ്ങും നിർമ്മിക്കപ്പെടാത്ത പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയ അതിസങ്കീർണ്ണ ഭൈജവപദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഫാക്ടോറികളാണെന്നു പറയാം. കോശത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാണ് ജന്തുശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനഘടകങ്ങൾ. കോശത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിരവധി എൻസൈമുകളും കോശത്തിൽത്തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളാകുന്നു. കോശത്തിലടങ്ങുന്ന ന്യൂക്ലിയീക് അമ്ലങ്ങൾ അതി പ്രധാനമായ വസ്തുവാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരമ്പരാഗതമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നു മറ്റൊരുതലമുറയ്ക്കു പകർത്തുന്നതും സ്വയം ഇരട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ന്യൂക്ലിയീക് അമ്ലങ്ങളാകുന്നു.


ഒരു സാമാന്യകോശം

കോശത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സാധാരണ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിൽക്കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നേർത്ത കോശമെംബ്രേനും ഏകദേശം മധ്യത്തിലായി നിലകൊള്ളുന്ന ന്യൂക്ലിയസ്സും വിവിധരൂപത്തിലുള്ള മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ഗോൾഗികായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ന്യൂക്ലിയസ്സിനടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ തരികളുകൾക്കുള്ള ഒരു കേന്ദ്രകായ (central body)വും എളുപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിയുടെ സഹായത്താൽ കോശത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെയും അജ്ഞാതമായിരുന്ന സൂക്ഷ്മരൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ അടുത്ത കാലത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധുനികമായ അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കോശത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കോശത്തെ രണ്ടു ഭാഗമായി തരം തിരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും ഘടകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണെളുപ്പം. കോശമെംബ്രേനിനും ന്യൂക്ലിയസ്സിനുമിടയിലുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസ്സുമാണ് ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ. ന്യൂക്ലിയസ്സിനു പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിനു സൈറോപ്ലാസമെന്നും അതിനകത്തെ ദ്രവത്തിനു ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസമെന്നും പറയുന്നു. രണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയ

സ്റ്റീന്റെ പുറംഭിത്തിയായ ന്യൂക്ലിയർമെംബ്രേനാണ്. കോശരസത്തിൽ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ പല പദാർഥങ്ങളുണ്ട്. ചർമത്തിനുള്ളിലാണ് പാരമ്പര്യത്തിനടിസ്ഥാനമായ വസ്തുക്കൾ കടികൊള്ളുന്നത്.

കോശമെംബ്രേൻ: കോശത്തിന്റെ പുറം കവചമാണിത്. സാധാരണ, സൂക്ഷ്മദർശിനിയിൽ അതിന്റെ ഘടന സ്പഷ്ടമാകുകയില്ല. അത്രയ്ക്കു നേർത്ത ഒരു പടലമാണിത്. ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ലക്ഷത്തിലൊരംശം (നൂറിലൊന്നു മൈക്രോൺ) മാത്രമേ കോശമെംബ്രേനിന് കട്ടിയുള്ളൂ.



ചിത്രം. 2. ഒരു സാമാന്യകോശം—സാധാരണ മൈക്രോസുകോപ്പിലൂടെ

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. ഗോൾഗികായങ്ങൾ | 2. സൈറോപ്ലാസം |
| 3. ന്യൂക്ലിയമെംബ്രേൻ | 4. ക്രോമസോം |
| 5. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ | 6. കോശമെംബ്രേൻ |
| 7. റിക്തക | 8. ന്യൂക്ലിയോലസ് |
| 9. ന്യൂക്ലിയസ് | 10. സെൻട്രിയോൾ |
| 11. സെൻട്രോസോം. | |


ചിലപ്പോൾ ഇതിനു പുറത്തു് ഉറപ്പു നല്കാനായി പശുപോലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ അടിക്കു കൂടി ഒരാവരണം രൂപപ്പെട്ടു കാണാം. സാധാരണ മെംബ്രേൻ

കർക്കിശ്ശാത്ത അതുതാവഹമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് കോശമെംബ്രേനുള്ളത്. സന്ദർഭത്തിനും ആവശ്യത്തിനുമനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റം. ഇതിനുള്ളിൽക്കൂടി, തിരഞ്ഞെടുത്ത പദാർഥങ്ങളെ മാത്രമേ കടത്തിവിട്ടു. അതാവസരത്തിൽ കോശത്തിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു കോശസത്തിലേക്കും അവിടെനിന്നു ത്യജിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്കും കടത്തിവിട്ടുവാനുള്ള കഴിവു കോശമെംബ്രേനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിശ്ചിതവസ്തുക്കളെ മാത്രം അകത്തോട്ടോ പുറത്തോട്ടോ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവു ജൈവമെംബ്രേനിന്റെ പ്രത്യേകഗുണമാണ്. കോശത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും അതിനകത്തെ സമതുലിതസ്ഥിതിയും നിലനിർത്താൻ ഇത്തരമൊരാവരണം അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ്. ആവശ്യമുള്ള പദാർഥങ്ങളെ മാത്രം-തിരഞ്ഞെടുത്ത വസ്തുക്കളെ മാത്രം-തന്നിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന മെംബ്രേനിന്നു ഭിന്നതാര്യമെംബ്രേൻ (differentially permeable membrane) എന്നു പറയാം. കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും കൊണ്ടാണ് ഈ മെംബ്രേൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതു്. ഇതിൽ ചെറുസുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ പറന്നു നടത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ സുഷിരങ്ങൾ വഴി പദാർഥങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടാവാം.

അന്തഃപ്ലാസ്മജാലിക: കോശസത്തിൽ വലുപ്പംകൊണ്ടുള്ള ചില നാളിവിപുലങ്ങളുണ്ട്. ഇവയാണ് അന്തഃപ്ലാസ്മജാലിക (endoplasmic reticulum). ഈ നാളികൾ കോശമെംബ്രേനിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കോശമെംബ്രേനിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കോശസത്തിലേക്കു തള്ളപ്പെട്ടു കഴൽ രൂപത്തിൽ വളർന്നു ശാഖോപശാഖകളായി പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണി നാളിവിപുലങ്ങളെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

അന്തഃപ്ലാസ്മജാലികകളോടു പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിറവയി തരികളുണ്ട്. ഇവയാണ് റൈബോസോമുകൾ (ribosomes). ജന്തുശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനഘടകമായ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതു് റൈബോസോമുകളിലാകയാൽ അവ പ്രധാനമർഹിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണശാലകളായി റൈബോസോമുകളെ കണക്കാക്കാം. റൈബോ ന്യൂക്ലിയീക് അമ്ലം എന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യഘടകം. പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വസ്തു ഇതാണ്. കോശസത്തിൽ നിന്നു അമിനോ അമ്ലങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു് പ്രത്യേകരീതിയിൽ ചേർത്തു് ഓരോ തരം പ്രോട്ടീനുകൾ റൈബോസോമുകളിൽ നിർമ്മിതമാകുന്നു.


കേന്ദ്രകായം: കോശസത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ്സിനടുത്തായി ഗോളാകൃതിയിൽ കേന്ദ്രകായം (central body) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തരികൾ (granules) ഉണ്ടാവാം. ഇവയെ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിയോളുകൾ (centrioles) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ ബിന്ദുക്കൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള കോശസത്തിന്നു അല്പം കട്ടി കൂടും. കോശസത്തിൽ ഈ ഭാഗം വേർതിരിച്ചു കാണാം. ഇതാണ് സെൻട്രോസോം (centrosome). കോശത്തിന്റെ വിഭജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായ പങ്കാണ് കേന്ദ്രകായം വഹിക്കുന്നതു്. വിഭജനം ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതിനിന്നാണ്.



ചിത്രം. 3. ഒരു സാമാന്യകോശം—ഇലകുടോൺമൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. ന്യൂക്ലിയമെന്റ്രോൻ | 2. ന്യൂക്ലിയോലസ് |
| 3. ന്യൂക്ലിയസ് | 4. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ |
| 5. ലൈസോസോം | 6. സൈറ്റോപ്ലാസം |
| 7. റിക്തീക | 8. പിനകോസൈറ്റോകിസഞ്ചി |
| 9. ഗോൾഗികായങ്ങൾ | 10. സെൻട്രോസോം |
| 11. അന്തഃപ്ലാസ്മികക്കെട്ടികൾ | |
| 12. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് | 13. കോശമെന്റ്രോൻ |

മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങൾ: പല രൂപത്തിലും കോശരസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവവസ്തുക്കളാണ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങൾ (mitochondria). തരിയായും ദൃഢരൂപത്തിലും നൂറ്റു മാതിരിയും ഇവയെ കാണാം. കോശത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങൾ ജാസ്തിയുണ്ടാവും. ചിലവയിൽ നന്നേ കറുപ്പു കാണും. ചുവന്ന രക്താണുവിൽ ഒട്ടും തന്നെയില്ല. ഓരോ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയത്തിനും രണ്ടുതൂണുള്ള ഭിത്തിയുണ്ട്. ഉൾഭാഗം മുറിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് കുറുകേ ആനവധി അറകളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അറകൾക്കുള്ളിൽ കോശരസത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു ദ്രവം അടങ്ങുന്നു. ഇതിൽ പലതരം പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പ്, എൻസൈമുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നീ പദാർഥങ്ങളുണ്ട്.



ചിത്രം. 4. വിവിധതരം മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങൾ.

1. പ്രോട്ടോസോവൻ 2. യകൃത്തിലെ കോശം
3. വൃക്കകോശം 4. ചെപ്പ്—പ്രത്യുല്പാദനേന്ദ്രിയകോശം
5. സസ്യകോശം.

കോശത്തിനാവശ്യമായ ഊർജ്ജം (energy) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി (power houses) മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങളെ കണക്കാക്കാം.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കത്തിൽ കൂടി കോശത്തിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നു കോശരസത്തിലേക്ക് ആവശ്യം പോലെ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ഓക്സീകരണം (oxidation) നടന്നാൽ വെള്ളവും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും ഉണ്ടാവുകയും ധാരാളം ഊർജ്ജം വിമുക്തമാവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഇന്ധനമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഓക്സീകരണക്രിയ കോശത്തിൽ വെച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട്. അതു വഴിയാണ് കോശത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജം കിട്ടുന്നത്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങളിൽ വച്ചാണ് മേൽപറഞ്ഞ പ്രക്രിയ നടക്കുക. പരീക്ഷണശാലയിൽ വെച്ചും ഇത്തരം ഓക്സീകരണം വഴിയുള്ള ഊർജ്ജം

ജസന്മാദനം സാധ്യമാണെങ്കിലും കോശത്തിൽ വെച്ചു നടക്കുന്ന ഓക്സീകരണം വളരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമായി പടിപടിയായാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉൾജം ഒന്നിച്ചു പുറത്തു വന്ന് താപനില വളർത്തുകയില്ല. ഓക്സീകരണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില രാസവസ്തുക്കൾ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇവയെല്ലാം എൻസൈമുകളാണ്. സ്വയം ഒരു മാറ്റവും വരാതെ അവ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്സീകരണം വഴിയുണ്ടാകുന്ന ഉൾജം നഷ്ടപ്പെടാതെ സംഭരിച്ചുവെക്കൽ കൂടി മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങളിൽ വച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട്. കോശസത്തിൽ നിന്നു അഡിനോസിൻ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് (എഡിപി) എന്ന വസ്തു എടുത്ത് അതിനോടു ഫോസ്ഫേറ്റ് (പി) ചേർത്ത് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് നിർമിച്ചു (എ ടി പി) അതിലാണ് ഉൾജം സംഭരിക്കുക. എ ഡി പി യും 'പി' യും ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ എ ടി പി എന്ന ഉൾജ സംഭരണിയുണ്ടാകുന്നു. ഈ സംഭരണികൾ കോശസത്തിലേക്ക് കടന്നു വ്യാപിക്കും. ഉൾജം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ എ ടി പി തന്മാത്രകൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും അതു് എ ഡി പി യും 'പി' യുമായി പിരിയുകയും അതിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾജം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓക്സീകരണം വഴി ഉൾജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും അതു സംഭരണികളിലാക്കി കോശസത്തിലേക്ക് അയക്കുകയുമാണ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന വ്യക്തമായല്ലോ.

ഗോൾഗികായങ്ങൾ

നാരുകൾ പോലെയോ തരികൾ പോലെയോ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ കോശസത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ജീവവസ്തുക്കളാണ്. ഒരു സെല്ലിൽ ഇവയെല്ലാം രൂപമാറുമെങ്കിലും അതിൽത്തന്നെ പല ദശയിൽ വിവിധ രൂപത്തിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുക. പ്രായം കറഞ്ഞ കോശത്തിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ അധികമുണ്ടാകും. പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇവ കുറയിടുന്നു. കോശത്തിൽ കാണുന്ന ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ സ്രവിക്കുന്നത് ഗോൾഗികായങ്ങളാണെന്നു (go'gi-bodies) കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവയുടെ ഭിത്തിയും അന്തർവസ്തുക്കളുടെ ഭിത്തിയും ഒരുപോലെയാണ്. ആ നാളികളും ഈ വസ്തുക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതും കാണാം.


ലൈസോസോം

കോശത്തിലെ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ പ്രബലമായ ചില രാസവസ്തുക്കൾ നിർമിതമാവുന്നുണ്ട്. കോശത്തിനാവശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രൂപത്തിലാക്കലാണ് ഈ വസ്തുക്കളുടെ പ്രവൃത്തി. ഈ ദീപനരസങ്ങൾ ഓരോ ചെറുസഞ്ചികളിലാക്കിയാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ വച്ചിരിക്കുക. ഈ സഞ്ചികൾക്കു ലൈസോസോമുകൾ (lysosomes) എന്ന പേർ പറയുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു പദാർത്ഥം നശിക്കുകയോപ്ലാസത്തിൽ കടന്നാൽ ലൈസോസോം അതിനെ സമീപിക്കുകയും ദീപനരസമുപയോഗിച്ചു ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മേൽ പറഞ്ഞ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കു പുറമെ ജീവിനില്പാത്ത വസ്തുക്കളും കോശത്തിലുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ, പിതകം (yolk), കൊഴുപ്പിന്റെ ചെറുതുളികൾ, റിക്തികകൾ (vacuoles), കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, കോശത്തിലെ പ്രാണ ക്രിയ മുഖമുണ്ടാകുന്ന വിസർജനവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഇവയിൽ പെടുന്നു.

നൂക്ലിയസ് (Nucleus)

കോശത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഘടകം നൂക്ലിയസാകുന്നു. കോശത്തിലെ ഉപാപചയം (metabolism) നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ജീവിയുടെ പാരമ്പര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും നൂക്ലിയസാണ്. സാധാരണയായി നൂക്ലിയസ് ഗോളാകൃതിയിലാണു കാണപ്പെടുകയെങ്കിലും മറ്റു പല രൂപങ്ങളും കൈക്കൊ



ചിത്രം. 5. ബ്രോസോഫിലയുടെ ക്രോമസോമം.

B—ക്രോമസോമത്തിൽ ബന്ധിതമായ വെസിക്ൾ രൂപീകരണം.

ജോറൂണ്. ഒരു സെല്ലിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസാണുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസുകളുള്ള കോശങ്ങളും കാണാം. വളർച്ചയത്തീയ ചില കോശങ്ങളിൽ (ഉദാഹരണം—മനുഷ്യന്റെ ചുവന്ന രക്താണു) ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടില്ലെന്നു വാാം. ന്യൂക്ലിയസിനു ചുറ്റും അതിനെ കോശാസത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൻ (nuclear membrane) ഉണ്ട്. ഇതിന് രണ്ടുതരം കാണാം. പുറത്തു അട്ടിയിൽ സൂചിരങ്ങളുണ്ടെന്നു ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തുളകളിലൂടെ പദാർത്ഥം തന്മാത്രകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാകണം. കോശാസത്തിലെ അനുഷ്ഠാനികജാലിക ന്യൂക്ലിയർപടലവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്തെ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉരുണ്ട വസ്തുക്കൾ കാണാം. ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് (nucleolus). റൈബോസോമുകളിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ആർ എൻ എ തരികൾ ന്യൂക്ലിയോലസിലും ധാരാളമുണ്ടെന്നു ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിലെ പ്രധാനവസ്തു നേരിയ നാരുകളടങ്ങുന്നതും പാരമ്പര്യവാഹികളായ പദാർത്ഥങ്ങളെ വഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു “നൂൽവല” യാണ്. ഈ നൂലുകളെ ക്രോമാറ്റിൻ തന്മാത്രകളെന്നു (chromatin threads) പറയുന്നു. ഇവയിലുടനീളം നിരവധി തരികളുണ്ട്. ഈ തരികളാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ഗ്രാനുലുകൾ (chromatin granules). ഈ തരികളിലാണ് പാരമ്പര്യത്തിനടിസ്ഥാനമായ ജീനുകൾ (genes) എന്ന മുഖ്യമായ വസ്തു കടികൊള്ളുന്നത്. കോശം വളർച്ചയെത്തി വിഭജനത്തിന്നു തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിലെ ക്രോമാറ്റിൻ വല രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, പല രൂപത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള നാടകമായിത്തീരും. ഈ നാടകത്തെ ക്രോമസോം (chromosomes) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവികളുടെയും കോശങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണം സ്ഥിരമാണ്. ഉദാഹരണമായി മനുഷ്യന്റെ കോശങ്ങളിൽ 46 ക്രോമസങ്ങളാണുണ്ടാവുക. എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല, രൂപത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരേ മാതിരിയുള്ള ക്രോമസങ്ങളാണ് ഒരു ജാതിയിലെ എല്ലാ ജീവികളുടെ കോശങ്ങളിലും കാണുക. ഓരോ ക്രോമസത്തിലും നേർത്ത റിംഗ് കാണാം; ഏതാണ്ട് അരക്കെട്ടു പോലെ. ഈ അരക്കെട്ടിൽ സെൻട്രോമിയർ (centromere) എന്ന ഒരു ബിന്ദുവും ഉണ്ടാകും. ഇതിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള ക്രോമസത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കു ഭുജങ്ങളെന്നു പേർ പറയാം. സെൻട്രോമിയറിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നനുസരിച്ചു ഭുജങ്ങളുടെ നീളത്തിനു വ്യത്യാസം വരും. ബിന്ദു മധ്യത്തിലായാൽ ഭുജങ്ങൾക്കു തുല്യനീളവും, അതു ഒരറ്റത്തേക്കു നിങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഭുജത്തിനു നീളത്തുടതലും മറേതിന്നു നീളത്തുടതലും വരും. ക്രോമസത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തിനടുത്തായാൽ ആ അറ്റത്തെ ബിന്ദു നന്നേ കറിയതായിരിക്കും.

ക്രോമസത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ പ്രോട്ടീനുകളും ന്യൂക്ലിയിക് അമ്ലങ്ങളുമാണ്. ഡിഓക്സൈറൈബോ ന്യൂക്ലിക് അമ്ലമെന്നാണ് (deoxyribo nucleic acid) ന്യൂക്ലിയസിൽ മുഖ്യമായി കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയിക് അമ്ലത്തിനു പേർ. ജീന

കളുടെ മുഖ്യഘടകം ഇതാണ് താനും. ഇതിനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഡി എൻ എ (D N A) എന്നു വിളിക്കാം. ഇതിന്റെ തന്മാത്രകൾക്ക് സ്വയം ഇരട്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മറ്റൊരറിനും ന്യൂക്ളിയിക് അമ്ളമാണ് റൈബോന്യൂക്ളിക് അമ്ളം (ribo nucleic acid) അഥവാ ആർ എൻ എ. റൈബോസോമുകളിലാണ് മുഖ്യമായും ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ജനുവിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾക്കടിസ്ഥാനമായ പ്രോട്ടീനുകളെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നൽകുന്നത് ഡി എൻ എ യാണ്. ആ പ്രേരണക്കനുസരിച്ച് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീനുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നത് അതിന്റെ കോശങ്ങളിലെ ഡി എൻ എ യും ആർ എൻ എ യും ആകുന്നു.


ന്യൂക്ളിയിക് അമ്ളങ്ങൾ

ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവും ന്യൂക്ളിയിക് അമ്ളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ക്രോമസോമങ്ങളിലെ ഡി എൻ എ യിലാണ് പരമ്പരാഗതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമായ മൂലദ്രവ്യം (കോഡ്) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അമ്ളത്തിന്റെ തന്മാത്ര (molecule) കളാണ് ജനുവിന്റെ വികാസ (development) ന്നെയും വളർച്ച (growth) നെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും. മാതൃമല്ല, വംശപാരമ്പര്യമുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതും അവ തന്നെ. രണ്ടു തരം ന്യൂക്ളിയികമ്ളങ്ങളുണ്ടെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതിൽ മുഖ്യം ഡി എൻ എ തന്നെ. ഇതിന്റെ കല്ലനകൾ നടപ്പിലാക്കലാണ് ആർ എൻ എ യുടെ ജോലി. ഡി എൻ എ

കോശത്തിന്റെ രൂപത്തെയും ഘടനയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിലെ ഡി എൻ എ യുടെ തന്മാത്രകളാണ്. ഒരു വർഗത്തിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും പൈതൃകമായ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഈ പദാർത്ഥം വഴിയാകുന്നു. ക്രോമസം ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളും ഇരട്ടിക്കും. സ്വയം ഇരട്ടിക്കാനുള്ള ഈ കഴിവാണ് ഡി എൻ എ യുടെ പ്രത്യേകത.

ഒരു ഡി എൻ എ തന്മാത്രയിൽ പഞ്ചസാര (sugar), ഫോസ്ഫേറ്റ് (phosphate) നൈട്രജൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബേസ് (nitrogen base) എന്നീ മൂന്നു ഘടകങ്ങളുണ്ടാവും. ഡി എൻ എ യുടെ എല്ലാ തന്മാത്രകളിലുമുള്ള പഞ്ചസാരയുടെയും ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെയും അംശങ്ങൾ ഒരു പോലിരിക്കും. എന്നാൽ നൈട്രജൻ അടങ്ങുന്ന ബേസുകൾ നാലു തരമാണ്. അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലതായിരിക്കും ഒരു ഡി എൻ എ തന്മാത്രയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം അവയിലെ ബേസുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമാകുന്നു.

ബേസുകളെ പൂർവ്വരേഖകൾ എന്നും പിരമിഡൈൻകൾ എന്നും (purines and pyrimidines) രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വരേഖകൾ അധിനി



ചിത്രം. 6. A വാട്സൻ-ക്രിക്ക് മോഡലിനെ, ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള ഡി എൻ എ യുടെ ചിത്രം. സർപ്പില ഏണി രൂപത്തിലുള്ള രണ്ടു ഫോസ്‌ഫേറ്റ്-പഞ്ചസാര ചങ്ങലകൾ ബേസുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായ് കാണിക്കുന്നു.

B വാട്സൻ-ക്രിക്ക് മോഡലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 p—ഫോസ്‌ഫേറ്റ്; S—ഡെഓക്സൈഡ് പഞ്ചസാര;
 A—അഡിനിൻ; T—തൈമിൻ; G—ഗുവാനിൻ; C—സൈറ്റോസിൻ.

(Adinine), ഗുവാനിൻ (Guanine) എന്നീ ബേസുകളും മറോതിൽ തൈമിൻ (Thymine), സൈറോസിൻ (Cytosine) എന്നീ ബേസുകളും അടങ്ങുന്നു. ഡിഎൻഎ യെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിന്റെ തന്മാത്രകളുടെ ഒരു മാതൃക നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാറംസൺ, ക്രിക്ക് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൂടിയാണ് ഈ മാതൃകയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. അവരുടെ സംഭാവനയായ മാതൃക ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിക്കാം.

പഞ്ചസാരയുടെ അംശത്തോടു് ഒരു ബേസ് ചേർന്ന് ന്യൂക്ലിയോസിഡ് (nucleosid) ആവുന്നു. അതിനോടു് ഫോസ്ഫേറേറ്റം ചേർന്ന് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് (nucleotide) രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ചേർന്ന് ഒരു ശൃംഖല — പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ശൃംഖല (polynucleotide chain) — ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൽ പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറേറ്റവും ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു ലംബവും അതിനോടു് വിലങ്ങനെ ചേർന്ന ബേസുകളും ആണുള്ളത്. ഓരോ ബേസും ഓരോ പഞ്ചസാര തന്മാത്രയോടു ചേർന്നിരിക്കും. ഒരു ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ശൃംഖലകൾ കാണാം. ഒന്നിനെതിരെ സ്ഥിതി ചെയ്യും മറ്റൊന്ന്. രണ്ടിന്റെയും ബേസുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കും. ബേസുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. പ്യൂറൈൻ പ്യൂറൈൻ തമ്മിലോ പിരമിഡൈൻ പിരമിഡൈൻ തമ്മിലോ ചേരില്ല. ഒരു പ്യൂറൈൻ ഒരു പിരമിഡൈൻ തമ്മിലേ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയിലെ ഒരു ശൃംഖലയിൽ ഒരിടത്തു് പ്യൂറൈനാണുള്ളതെങ്കിൽ മറ്റേ ശൃംഖലയിൽ അതിനെതിരെ ഒരു പിരമിഡൈനാണുണ്ടാവുക. രണ്ടു ശൃംഖലകളും കൂടി ബേസുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് 'കോണി' രൂപത്തിലാവുന്നു. അതിന്റെ നെട്ടം പടികൾ പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റും കൊണ്ടും, കുറമ്പടികൾ നൈട്രജനടങ്ങുന്ന ബേസുകൾ കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക. ബേസുകളുടെ തരത്തിനും സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് പല തരം ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ജീൻ എന്നത് ഒരു ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയുടെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര മുഴുവനുമോ ആകാവുന്നതാണ്. ഒരു ജീനും മറ്റൊരു ജീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവയിലെ ബേസുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനടിസ്ഥാനം അവയിലുള്ള ബേസുകളുടെ സ്ഥാനവും തരവുമാകുന്നു. ഒരു ഡിഎൻഎയുടെ വ്യക്തിത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിലെ ബേസുകളാകയാൽ ഡിഎൻഎ യാൽ നിർമ്മിതമായ ജീനുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കും ആ ബേസുകളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്നു പറയാം. ചുരുക്കത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനായ ജീനുകളിൽ ആ സന്ദേശം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ എ യിലെ ബേസുകളാകുന്നു അക്ഷരങ്ങളുപയോഗിച്ചാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആർഎൻഎ യും ഡിഎൻഎ യും തമ്മിൽ ഘടനാപരമായി വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഇരുശൃംഖലയ്ക്കും പകരം ഒരശൃംഖലയായ

യിട്ടേ ആർഎൻഎ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം കൂടതലുണ്ട്. കൂടാതെ ആർഎൻഎ യിൽ തൈമിൻ എന്ന ബേസിനു പകരം യുറാസിൽ എന്ന ബേസാണ് ഉണ്ടാവുക. ന്യൂക്ലിയർ തന്തുവിലാണ് ഡിഎൻഎ സ്ഥിതിചെയ്യുക; ആർഎൻഎ ആകട്ടെ പ്രധാനമായും കോശരസത്തിലുള്ള റൈബോസോമുകളിൽ ചെന്നു പറ്റുന്നു. ആർഎൻഎ യെ സൃഷ്ടിച്ചുവീട്ടുന്നതും ഡിഎൻഎ തന്നെ. ഡിഎൻഎ യുടെ സന്ദേശങ്ങളുമായി കോശരസത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ സന്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുകയെന്നതാണ് ആർഎൻഎ യുടെ പ്രവൃത്തി. ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോലസിലും ധാരാളം ആർഎൻഎ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിന്നായിരിക്കണം അതു കോശരസത്തിലേക്കു കടക്കുന്നത്.

കോശഭംഗം


വളച്ചെയ്തയിരുന്ന കോശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ശരീരം വളരുന്നത്. ഒരാക്കണികജീവികൾ ഈ വിഭജനം വഴി പ്രജനനം (ഉല്പാദനം) നടത്തുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു കണിക വിഭജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഭാഗവും വളർന്നു പൂർണ്ണജീവികളാകുന്നു. ഉയർന്നതരം ജന്തുക്കളിൽ മാതാവിന്റെ അണ്ഡവും പിതാവിന്റെ പുംബീജവും കൂടിച്ചേർന്നു സൈഗോട്ടായിത്തീരുകയും സൈഗോട്ട് തുടർച്ചയായുള്ള വിഭജനം വഴി നിരവധി ആയിരം കോശങ്ങളുള്ള സങ്കീർണ്ണ ശരീരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൂന്നുതരം കോശഭംഗങ്ങൾ

1 ലാലഭംഗം (direct division, amitosis): (ചിത്രം അടുത്ത പേജിൽ)


ചില ഏകകോശ ജീവികളിലും ബഹുകോശജീവികളിലെ ചിലതരം കോശങ്ങളിലും ഇതു നടക്കുന്നു. ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയസ് നീണ്ടു മെലിയും. പിന്നെ അതിന്റെ നടുവരം (നീണ്ട അക്ഷത്തിൽ വിലങ്ങനെ) അരക്കെട്ടു പോലെ ചുരുങ്ങും. ഈ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗം ക്രമേണ കൂടുതൽ മെലിയുകയും ഒടുവിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായി മുറിയുകയും ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പമോ ഇതിനുശേഷമോ കോശരസവും രണ്ടായി മുറിയും. കോശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സങ്കോചം (constriction) ഉണ്ടാവുകയും അതിനു ആഴം കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്തിട്ടാണ് കോശം രണ്ടായി മുറിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കോശഭാഗത്തിലും, ചുരുക്കം മുറിഞ്ഞുണ്ടായ ഓരോ ഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോശം രണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഓരോന്നിലും ആദ്യത്തെ കോശത്തിലുള്ളപോലെ ന്യൂക്ലിയസും ചുറ്റും കോശവുമുണ്ടായിരിക്കും. ചില കോശങ്ങൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് അനേകം ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കോശരസം അതനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുന്നില്ല. ഒരു കോശത്തിൽ

തന്നെ ഒന്നിലേറെ ന്യൂക്ലിയസുകളുണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേകതരം ഭംഗപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം.



ചിത്രം.7 ലഘുകോശ ഭംഗം. നാബറുകൾ യഥാക്രമം വിവിധ ദശകളെ കാണിക്കുന്നു.

2 ക്രമഭംഗം (mitosis): അതിസങ്കീർണ്ണമായ ക്രമഭംഗമാണ് സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഭംഗം വഴി കോശത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഇതു വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സന്തതികൾ (രണ്ടു കോശങ്ങൾ) ഘടനയിൽ സമാനമായിരിക്കും, പരസ്പരം തമ്മിൽ വേണ്ടി ക്രമഭംഗത്തെ നാലു ദശകളായി തിരിക്കാം.



ചിത്രം 8. ക്രമകോശഭാഗം.

1—3 പ്രോഫേസ്; 4 മെറ്റാഫേസ് 5—6 ഏനാഫേസ്;
7—റീലോഫേസ്.

പ്രഥമദശ (Prophase): വിഭജനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കോശത്തിൽ ക്രോമസോം, നേർത്ത ചുരുളുകളിലൂടെ നാട പോലെയാണു വർത്തിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഡിപ്ലിൻഡ് തന്മാത്രകളുടെ ഇരട്ടിക്കലും ക്രോമസോം

ഒരു ഇരട്ടിക്കലും നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു അടുത്തകാലത്തു അറിവായിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമദശയിലെ ഒരു മുഖ്യസംഭവം സെൻട്രോസോമിയൻ വിഭജനമാണ്. അതു രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും. ഓരോന്നിലും ഓരോ സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചുണ്ടായ പുതിയ സെൻട്രോസോമുകൾ അന്യോന്യം അകന്നകന്നു കോശത്തിന്റെ രണ്ടു വ്യവങ്ങളിലേക്കും പോകും. ഓരോ ബിന്ദുവിന്നു ചുറ്റിലും രശ്മികൾ പോലെയുള്ള കറേ നേരിയ നാരുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നാരുകളുടെ പരിവേഷത്തോടുകൂടിയ സെൻട്രോമിയറിനു ആസ്റ്റർ (Aster) എന്ന പേർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രോമസോമം ക്രമേണ തെളിഞ്ഞു വ്യക്തമായിത്തീരുന്നു. ഒരു കോശത്തിൽ ഈ സമയത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ക്രോമസോമങ്ങളുടെ എണ്ണം, ആ കോശം അടങ്ങുന്ന ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും (ഉല്പാദനബീജങ്ങളൊഴിച്ചു) തുല്യമായിരിക്കും. മാതൃമല്ല ഈ സംഖ്യ, ആ സ്ത്രീഷിസിലെ എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെ കോശങ്ങളിലും സ്ഥിരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണമായി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ കോശങ്ങളിലും 46 ക്രോമസോമങ്ങളാണുള്ളതു്. അതു പോലെ നായയിൽ 52-ഉം തവളയിൽ 26-ഉം കാണപ്പെടുന്നു. ക്രോമസോമം സാന്ദ്രീഭവിച്ച് ചുരുളകയും തൽഫലമായി അവയ്ക്കു നീളം കുറഞ്ഞു വണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്തു്, ക്രോമസോമങ്ങളെ സാധാരണ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ തന്നെ നന്നായി കാണാൻ പാറും. ക്രോമസോമങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുന്നതോടെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസ്മം അപ്രത്യക്ഷമാവും. ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസ്മം ക്രമേണ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസ്മത്തിൽ ക്രോമസോമം മാത്രം ഒറ്റതരിഞ്ഞു വർത്തിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ ഓരോ ക്രോമസോമവും രണ്ടായി നീളത്തിൽ മുറിയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മുറിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വേർപെടാതെ ജോഡികളായിത്തന്നെയാണു നിലകൊള്ളുന്നതു്. അതായതു്, ഈ ദശയിൽ ഓരോ ക്രോമസോമവും രണ്ടു ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ ചേർന്നതാണു്. ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡ് മറ്റൊരിയ്ക്കു തനിപ്പകർപ്പായിരിക്കും. ക്രോമസോമങ്ങളിലെ ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകളെല്ലാം തന്നെ ഇരട്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടു് ഒരു ക്രോമസോമത്തിലെ രണ്ടു ക്രൊമാറ്റിഡുകളിലും സർവസമങ്ങളു (identical) ഉായ ഡിഎൻഎ തന്മാത്രകളാണുണ്ടാവുക എന്നും ധരിക്കാം. ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ രണ്ടും സെൻട്രോമിയറുകളാൽ ബന്ധിതമാണു്. ഈ ബന്ധം വിട്ടുനാലു് ഭാഗത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദശയിലാണു്.

പ്രഥമദശയിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ആസ്റ്ററുകൾക്കിടയിൽ അവയെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില നീണ്ട തന്തുക്കളുടെ ആവിർഭാവമാണു്. ഈ തന്തുക്കളെ തക്കതന്തുക്കൾ (spindle fibres) എന്നു വിളിക്കുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലാണു് തക്കതന്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. ഒന്നു്, ആസ്റ്ററുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന തന്തുക്കളും, മറ്റൊരു് ഓരോ ആസ്റ്ററിനെയും കോശത്തിന്റെ മധ്യത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമങ്ങളെയും ബന്ധിക്കുന്ന തന്തുക്കളുമാണു്. തക്കതന്തുക്കളും ആസ്റ്ററുകളും ചേർന്ന രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിതിയിൽ മാതിരിയുള്ള വസ്തുവിന്നു അവർണകരൂപം (achromatic figure) എന്നാണു് പേർ. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ടാണു് ക്രോമസോമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. അവയിൽ കാണുന്ന വർണകവസ്തു

ക്കർ (ക്രൊമാറ്റിൻ) തക്കതത്തുക്കളിലില്ലാത്തതിനാലാണ് ആ തത്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമിതമായ രൂപത്തിന് അവർണകരൂപം എന്ന പേർ വന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, കോശകേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഭജനം ആസ്സറുകളുടെയും തക്കതത്തുക്കളുടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ, ന്യൂക്ലിയർ പടലത്തിന്റെയും ന്യൂക്ലിയോലസിന്റെയും തിരോടാവം, ക്രോമസങ്ങളുടെ ഇരട്ടിപ്പ്, കോശത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്കുള്ള അവയുടെ പലായനം, സെന്ട്രോമിയറ്റം തക്കതത്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ദൃഢ ബന്ധം ഇത്രയുമാണ് പ്രഥമദശയിൽ നടക്കുന്നത്.

മധ്യദശ (Metaphase): ക്രോമസങ്ങൾ, തക്കതത്തുക്കളുടെ ഒത്ത നട്ടവിലേക്ക് നിങ്ങളുകയും അവ ഓരോന്നും ഈരണ്ടു സന്തതികൾ ചേർന്നതാണെന്നു തെളിയിക്കുമാറ് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ക്രോമസത്തിലെയും സന്തതികൾ അന്വേദനം അകലുന്നു. എന്നാൽ അവ രണ്ടും ഒരിടത്തു—സെന്ട്രോമിയറിൽ—ബന്ധിക്കപ്പെട്ട തന്നെയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണകലുന്നത്. ക്രോമസങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം വ്യക്തമായിരിക്കാണെന്നത് മധ്യദശയിലാണ്.

വികേന്ദ്രദശ (Anaphase): ഈ ദശയിൽ ഓരോ ക്രോമസവും അതിന്റെ സെന്ട്രോമിയർ പിളർന്നു തിരിച്ചു രണ്ടായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ക്രോമസവും സമാനമായ രണ്ടെണ്ണമായിത്തീർന്നു അന്വേദനം അകലുന്നു. ഓരോന്നും എതിർധ്രുവങ്ങളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. തക്കതത്തുവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ക്രോമസം നിലകൊള്ളുന്നത്. തക്കതത്തുക്കൾ ക്രോമസങ്ങളെ വലിച്ചു ധ്രുവങ്ങളിൽ ആസ്സറുകളുടെ അടുത്തേക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആസ്സറുകൾക്കും ക്രോമസങ്ങൾക്കും എതിർ വിദ്യുത് പ്രേഷണമുള്ളതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടമെന്നും അതു കാരണം ക്രോമസങ്ങൾ ആസ്സറുകളോടു കൂടുന്നവെന്നും കരുതുന്നു. കോശത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നു ധ്രുവത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്ന ക്രോമസത്തിന്റെ സെന്ട്രോമിയറാണ് ദൃഢവേ നീങ്ങുന്ന ഭാഗം. അതുകൊണ്ട്, ക്രോമസത്തിന് അപ്പോൾ “V” രൂപമോ കൊക്കിയുടെ രൂപമോ കൈവരുന്നു. സെന്ട്രോമിയർ നട്ടവിലാണെങ്കിൽ “V” രൂപം; അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കിരൂപം. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു ഭ്രമം നീണ്ടും മറോത്ത് കുറിയതായുമിരിക്കും.

ദശാനന്ദദശ (Telophase): ക്രമംഗത്തിലെ അവസാന ഘട്ടമാണിത്. ക്രോമസസന്തതികൾ എതിർ ധ്രുവങ്ങളിൽ ചെന്നു ചേരുന്നതോടെ ഈ ദശ തുടങ്ങുന്നു. രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള ക്രോമസങ്ങൾ സമാധാനിരിക്കും. ഒരു ധ്രുവത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രോമസങ്ങളുടെയും നേർപകർപ്പുകൾ മറോത്ത് ധ്രുവത്തിലുണ്ടെന്നു താല്പര്യം.

ക്രോമസങ്ങൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞു നീളം തുടങ്ങുന്നു. അവയിലെ വർണതന്തു ചുരുളുകൾ വിടരുകയും എല്ലാ ക്രോമസങ്ങളിലേയും വർണതന്തുക്കൾ കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രഥമദശയ്ക്കു മുമ്പു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാതിരി ഒരു വർണകുലം (chromatic net work) ഓരോ ധ്രുവത്തിലും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇവയ്ക്കു ചുറ്റുമായി ന്യൂക്ലിയർ പടലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിനുള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയോലസും, പ്രഥമദശയ്ക്കു മുമ്പുമാത്രം കോശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഓരോ ധ്രുവത്തിൽ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ആസ്സ

റിലെ നൂലുകൾ നശിക്കുകയും ആസ്റ്റർ കോശകേന്ദ്രമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി ഓരോ ഗ്രുവത്തിലും ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും അതിനടുത്തു് ഓരോ സെൻട്രോസോമും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. പ്രഥമദശയിൽ നടക്കുന്നവയ്ക്കു് നേരെ വിരുദ്ധമായ സംഭവങ്ങളാണു് ഭഗ്നദശയിൽ നടക്കുന്നതെന്നു ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായല്ലോ.

ന്യൂക്ലിയസ് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോശരസത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി ഒരു ചാൽ വളർന്നുവരും. ഈ ചാലിനു് ആഴം കൂടി കോശത്തെ രണ്ടായി പിളർക്കുന്നു. ഓരോ ഭാഗത്തിലും ഓരോ മർദ്ദവും കോശകേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയങ്ങളും ഗോൾഗികായങ്ങളും പുതിയ രണ്ടു കോശങ്ങൾക്കും സമം ലഭിക്കുന്നു.

ക്രമഭംഗം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും അതുവഴി അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം സാധ്യമാകുന്നുണ്ടു്. ഓരോ ക്രോമസോം—അതിലെ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെ—ഇരട്ടിച്ചു് രണ്ടു പുതിയ തുല്യഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നതാണിതിനാലും. ഇതു മൂലം ക്രമഭംഗം വഴിയുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾക്കു്, മാതൃകോശത്തിലടങ്ങുന്ന പാരമ്പര്യവാഹികളായ എല്ലാത്തരം ജീനുകളും ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന രണ്ടു കോശങ്ങളിൽ ഒന്നു് മറ്റേതിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണു്. ഈ വിഭജനം പരിമാണപരം മാത്രമല്ല, ഗുണപരം കൂടിയാണു് (quantitative and qualitative). ജീനുകളുടെ തുല്യമായ വിഭജനം നടക്കുന്നവെന്നതാണു് ഈ വിഭജനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാ പ്രധാനവും. 46 ക്രോമസങ്ങളുള്ള ഒരു കോശമാണു വിഭജനം വരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ 92 ക്രോമസങ്ങളുണ്ടാകും. പിന്നീടവ രണ്ടു സൈറുകളായി പിരിയുകയും 46 എണ്ണം വീതമുള്ള ഓരോ സൈററു പുതിയ ഓരോ കോശത്തിലെ ക്രോമസങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രോമസങ്ങളുടെ ഇരട്ടിക്കലും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള വിഭജനവുമായിവിടെ നടക്കുന്നതു്. തൽഫലമായി മാതൃകോശത്തിലും സന്തതികളിലും ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണം സമാനം തന്നെ.


ക്രമാർദ്ധഭംഗം (Meiosis): ബഹുകോശ ജീവികളിൽ മിക്കവയിലും ലൈംഗികപ്രത്യുൽപ്പാദനം (sexual re-production) നടക്കുന്നു. പെൺജീവി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അണ്ഡ (egg) വും പുരുഷന്റെ പുംബിജ (Sperm) വും കൂടിച്ചേർന്നു ഒരു സിക്താണു് അഥവാ സൈഗോട്ടു് (zygote) രൂപം കൊള്ളുന്നു. സൈഗോട്ടു് തുടർച്ചയായി ക്രമഭംഗം വരിച്ചിട്ടാണു ബഹുകോശശരീരം ഉണ്ടാവുന്നതു്. അണ്ഡത്തിലും പുംബിജത്തിലും മറ്റു കോശങ്ങളിലുള്ളതു തന്നെ ക്രോമസങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിൽ സിക്താണുത്തിന്നും അതു ഭേദിച്ചുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഇരട്ടി ക്രോമസങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അങ്ങനെ വന്നാൽ ക്രോമസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള സ്ഥിരത നിലനില്ക്കുകയില്ല. പക്ഷേ, ഈ സംഖ്യാസ്ഥിരതയ്ക്കു യാതൊരു തകരാറും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അണ്ഡത്തിലും പുംബിജത്തിലും ഉള്ള ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണം മറ്റു കോശങ്ങളിലുള്ളതിന്റെ മേർ പകുതി മാത്രമായിരിക്കുമെന്നതാണു് ഇതിന്റെ കാരണം. അണ്ഡവും പുംബിജവും ഉണ്ടാകുന്നതു് അവയുടെ മാതൃകോശം വിഭജിച്ചിട്ടാണു്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ വിഭജനം

പ്രത്യേകരീതിയിൽ നടക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ക്രോമസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ്. ഈ പ്രത്യേക വിഭജനത്തെ ക്രമാർദ്ധഭാഗമെന്നു പറയുന്നു. ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണം നേർപകുതി കണ്ടു കരയുന്നതാണി ഭാഗത്തിലെ പ്രധാന സാദരം. സാധാരണ കോശത്തിൽ കാണുന്ന ക്രോമസങ്ങൾ ഒരവസരത്തിൽ ജോഡികളായാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 46 ക്രോമസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ 23 ജോഡികളായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നർത്ഥം. ജോഡിയിലെ അംഗക്രോമസങ്ങളെ സമജാത ക്രോമസങ്ങൾ (homologous chromosomes) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കോശത്തിനെ യൂഗംമി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്ലോയിഡ് (diploid) എന്നു പറയുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കോശമുള്ള ജീവിയിുടെ അണ്ഡത്തിലും പുംബീജത്തിലും 23 മർമക്രോമസങ്ങളേ കാണുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം കോശങ്ങൾ ഏകഗുണി (haploids) കളാകുന്നു. രണ്ട് ഏകഗുണികൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ ഒരു ഡിഗ്ലോയിഡുണ്ടാവും. ഡിഗ്ലോയിഡിൽ നിന്ന് ഏകഗുണികളുണ്ടാകുന്നത് ക്രമാർദ്ധഭാഗം വഴിയാണ്. ക്രോമസങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രവും ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടു പ്രാവശ്യവും വിഭജിക്കുന്നതിനാൽ ക്രമാർദ്ധഭാഗം മൂലം നാല് ഏകഗുണികളായ കോശങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ക്രമാർദ്ധഭാഗത്തിന് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.


ഒന്നാംഘട്ടം: ക്രമഭാഗത്തിലേതുപോലെ ആസ്റ്ററുകളും തർക്കത്തുള്ളിരംഗത്തു വരുന്നു. ക്രോമസങ്ങൾ വ്യക്തമാകുകയും ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയ്ൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രോമസങ്ങൾ ഇരട്ടയായിത്തീരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തന്തുക്കേന്ദ്ര ബീന്ദ്രം (സെന്റ്രോമിയർ) രണ്ടിനെയും ബന്ധിച്ചിരിക്കും.

അടുത്ത പടിയായി സമജാതക്രോമസങ്ങൾ ഓരോന്നും അന്യോന്യം അകന്ന് എതിർ ധ്രുവങ്ങളിലെത്തും. അവ ഒരോന്നും ഇരട്ടകളാണെന്നു മറക്കരുത്. ക്രമഭാഗത്തിൽ ഈ വേർപാടിനു മുമ്പുതന്നെ ക്രോമസങ്ങൾ അകന്നു വ്യത്യസ്തധ്രുവങ്ങളിൽ ചെന്നു പരസ്പരം അടുത്തുവന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഓരോ ധ്രുവത്തിലും കോശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ പകുതിയേ ഉണ്ടാകൂ. തുടക്കത്തിൽ 24 ക്രോമസങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ധ്രുവത്തിലും 12 ക്രോമസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ഓരോന്നും ഇരണ്ടു തന്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന ജോഡികളാണ്; താനും. ജോഡിയിലെ തന്തുക്കളെ തന്തുക്കേന്ദ്ര ബീന്ദ്രം (സെന്റ്രോമിയർ) അന്യോന്യം ബന്ധിച്ചു നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ക്രോമസങ്ങൾ ധ്രുവങ്ങളിൽ ചെന്നു പരസ്പരം കോശം രണ്ടായി പിളരുന്നു.


രണ്ടാംഘട്ടം: ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ രൂപം പൂണ്ട കോശങ്ങളിലെ ഇരട്ടകളായ ക്രോമസങ്ങൾ തന്തുക്കേന്ദ്രബീന്ദ്രം (സെന്റ്രോമിയർ) പിളർന്നു പൂർണ്ണമായും വേർപിരിയുന്നു. അങ്ങനെ വേർപിരിയുന്ന തന്തുക്കൾ അകന്നുപോയി രണ്ട് ഏകഗുണികളായ ക്രോമസങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിനെത്തുടർന്നു കോശരസവിഭജനവും നടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകോശത്തിൽ നിന്ന് 4 ഏകഗുണികളായ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഇവയാണ് പിന്നീട് പല മാറ്റങ്ങളും വരിച്ചു ഉൽപാദകബീജകങ്ങൾ (അണ്ഡവും പുംബീജവും) ആയിത്തീരുന്നത്.




1



2



3



4



5



6



7



8



9

ചിത്രം 9 ക്രമാർദ്ധകോശഭംഗം.

1. ഒന്നാം പ്രോഫേസ്. 2. ഒന്നാം മെറ്റാഫേസ്. 3. ഒന്നാം ഏനാഫേസ്. 4. ഒന്നാം റീലോഫേസ്. 5. രണ്ടു സന്താനകോശങ്ങൾ. 6. രണ്ടാം മെറ്റാഫേസ്. 7. രണ്ടാം ഏനാഫേസ്. 8. രണ്ടാം റീലോഫേസ്. 9. ഏകകരോമോസോമുകളുള്ള ഒരു (കേവലികളായ) രണ്ടു സന്താനകോശങ്ങൾ.

ജന്തുശരീരം

ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഹുകോശജന്തു (multicellular animal) വിന്റെ ശരീരം വിശകലനം ചെയ്താൽ അതു വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണെന്നു തെളിയും. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ഓരോ തരം അവയവവ്യൂഹം അതിൽ കാണാം. ദീപനക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീപനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശ്വാസനത്തിനുള്ള ചെങ്കിളുകൾ, ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നിവ, വിസർജനം നടത്തുവാനുള്ള വൃക്കകൾ, പേശിവ്യൂഹം, നാഡിവ്യൂഹം, പരിസഞ്ചാണവ്യൂഹം, ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അനുസ്രവണഗ്രന്ഥികൾ ഇങ്ങനെ പലതും ജന്തുദേഹത്തിലുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും ഒരവയവം എടുത്തു സൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചാൽ അതു് അനവധി കോശങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒന്നാണെന്നു കാണാം. പക്ഷേ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മാതിരിയായിരിക്കുകയില്ല. പലതരം കോശങ്ങൾ ഒരേ അവയവത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒരവയവത്തിൽ കാണുന്നതരം കോശങ്ങളാവില്ല മറ്റൊന്നിൽ കാണപ്പെടുന്നതു്. വിവിധാവയവങ്ങളിലുമായി പലതരം കോശങ്ങൾ ജന്തുശരീരത്തിലുണ്ട്. അവ പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയുമാകുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരു സാമാന്യകോശത്തിന്റെ മുഖ്യഗുണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നോർക്കണം. ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ കോശവും ജന്തുശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളതു്. കോശത്തിന്റെ ഘടനയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളതെന്നു സാരം.


കലകൾ

ജന്തുവിന്റെ ആദ്യദശയിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കോശങ്ങളാണ് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതു്. ക്രമേണ അവ പല തരത്തിൽ വൈവിധ്യം

വരിച്ച് പെരുക്കുന്നു. ഒരേ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കോശങ്ങൾ യോജിച്ച് കോശക്കൂട്ടങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോശക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂകൾ അഥവാ കലകൾ (tissues) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു ടിഷ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരേ തരത്തിൽ സവിശേഷതകൾ വരിച്ച് ഒരേ കർമ്മ നിർവഹിക്കാൻ പ്രാപ്തങ്ങളാകും. കലകളെ, അവയുടെ ഘടനയ്ക്കും പ്രവർത്തനത്തിനുമനുസരിച്ച് താഴെ പറയും വിധം തരം തിരിക്കാം.

(1) അധിതലീയകല (epithelial tissue)

ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലും (ബാഹ്യാവരണത്തിലും) അനുകൂലമായും ആന്തരാവയവങ്ങളുടെയും അകഭിത്തിയിലുമാണ് ഈ കല കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെ കോശങ്ങൾ തൊട്ടുതൊട്ടാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അവയ്ക്കിടയിൽ സ്ഥലം നന്നേ കുറവു. കോശങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അധിതലീയകലയെ മൂന്നുതരമായി വിഭജിക്കുന്നു.



ചിത്രം. 10. വിവിധതരം അധിതലീയങ്ങൾ.

1. ഫലകാധിതലീയം 2. സമപാർശ്വാധിതലീയം.
3. സ്തൂണാധിതലീയം. 4. സിലിയാധിതലീയം.

(എ) ഫലകാധിതലീയം (squamous epithelium) ഇതിലെ കോശങ്ങൾ പരന്നവയാണ്. അവ ഒരു നേരിയ സ്തരത്തിനു മുകളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നു. ഈ സ്തരം ഒന്നോ അതിലധികമോ അടുക്കുകൾ ചേർന്നതാവാം. ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തു് - ത്വക്കിന്റെ പുറംഭാഗത്തു് - കാണുന്നത് ഈ കലയാണ്. വായുക്കളിലും ഇതൊരാവരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംരക്ഷണമാണ് ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി. ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നു ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഇതിന്റേതാണ്.

(ബി) സമപാർശ്വാധിതലീയം (cubical epithelium) ഇതും കോശങ്ങൾ പരത്തി വെച്ച കലയാണ്. കോശങ്ങൾ സമപാർശ്വങ്ങളോടുകൂടിയവയാണെന്നു മാത്രം. വൃക്കാനാളിയുടെ (urinary tubule) യും മറ്റു ചില നാളികളുടെയും ഉൾഭിത്തിയിൽ ഇതു കാണപ്പെടുന്നു.

(സി) സ്തൂണാധിതലീയം (columnar epithelium) ഇതിലെ കോ

ശരീരം ഇങ്ങനെ പോലെ നീളം കൂടിയവയായിരിക്കും. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികളുടെ ഉപരിതലത്തിലും എല്ലാ ജീവികളുടെയും അനുകൂലയുടെ ഭിത്തിക കവശത്തും ഇതു കാണപ്പെടുന്നു. ശ്വാസനാളത്തിനുള്ളിലും ഉല്പാദനേന്ദ്രീയങ്ങളുടെ നാളങ്ങളിലും കാണുന്ന സ്തംഭാധിതലീയത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ പുറം വശത്തു് രോമം പോലെയുള്ള കറു സിലിയങ്ങൾ (cilia) കാണാം. ഇത്തരം കലകളെ സിലിയാധിതലീയം (ciliated epithelium) എന്നു പറയാം. ഇതിലെ സിലിയങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ വശത്തേക്കുമാത്രം സ്വന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.


അധിതലീയത്തിലെ ചില കോശങ്ങൾ സ്രവണം നടത്താൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. ഇത്തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നു 'ഗ്രന്ഥികൾ' (glands) നിർമ്മിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥികൾ പല തരത്തിലുണ്ട്. വിവിധതരം രാസവസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവൃത്തി. പുറം തള്ളപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കളെ സ്രവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. വായലുള്ള ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി, ആമാശയത്തിലെയും കടലിലെയും ഗ്രന്ഥികൾ, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കാണുന്ന ശ്ലേഷ്മഗ്രന്ഥികൾ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗമുള്ള സ്രവങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നു. തലക്കിലെ സ്പൈഗ്രന്ഥികളും മറ്റു വിസർജനഗ്രന്ഥികളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന പുറം തള്ളപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു വിസർജിക്കുന്നു.

(2) ആധാരകല (supporting tissue)

ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുകയോ കലകളെയും അവയവങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കലകളാണ് ഈ ഇനത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇതിൽ പല ഉപവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്.

(എ) സംയോജക കല (connective tissue): ഇതിൽ കോശങ്ങൾ പൊതുവേ ചെറുതായിരിക്കും. കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ദ്രവമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദ്രവം കോശങ്ങൾ സ്രവിച്ചുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവാൽ നിർമ്മിതമാണ്. അതു ജെല്ലിപോലെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങുമായി ഒട്ടേറെ നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ തന്തുക്കൾ കിടക്കുന്നതു കാണാം. ഈ തന്തുക്കളും കോശങ്ങൾ സ്രവിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടു തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നവയാണ്. രണ്ടു തരം തന്തുക്കളുണ്ട്, സംയോജക കലയിൽ. ഒന്ന്, വെള്ളനിറത്തിലുള്ള സ്ഥിതി സ്ഥാപകശക്തിയില്ലാത്ത (non-elastic) അനിലാസ്തീകതന്തുക്കളും മറേറത് ഈ ശക്തിയുള്ള ഇലാസ്തീകതന്തുക്കൾ (elastic fibres) ഉമാകുന്നു. ആദ്യത്തേതിനു വലിയാനും ചുരുങ്ങുവാനും പ്രാപിക്കാനും കഴിവില്ല. രണ്ടാമത്തേതിനു് അതാണ്. ആ തന്തുക്കൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളവയും ഒരാൽ കിടക്കുന്നവയുമാണ്. കൂട്ടുചേർന്ന തന്തു വ്യൂഹങ്ങളായിട്ടാണ് വെള്ള തന്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ (കെട്ടിൽ) ഒട്ടേറെ ഇഴകളുണ്ടാകും. ഇലാസ്തീകതന്തുക്കൾ ജാസ്റ്റിയുള്ള കലയ്ക്ക് ഇലാസ്തീകതന്തുക്കൾ എന്നു പറയും. രക്തക്കുഴലുകളിലും ശ്വാസനാളങ്ങളിലും ഈ കല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

സംയോജകകലയിലെ കോശങ്ങൾ പരന്നാണിരിക്കുക. ഓരോന്നിലും ഓരോ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം. ഈ കല കൊണ്ടാണ് ശരീരാവയവങ്ങൾ അന്വേഷം നശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



ചിത്രം. 11. ആധാരകല. 1—4. സംയോജകകല, 5—6. തരണാസ്ഥി 7—8 അസ്ഥികല. 1. മിസൻകൈകോരം 2. ഇലാസ്തിക ശക്തിയില്ലാത്ത കോരം 3. ഇലാസ്തിക കോരം. 4. മേദഃകോരം 5. നാരും-തരണാസ്ഥി. 6. സുതാര്യ തരണാസ്ഥി. 7. ഒരു ഹാവർഷ്യൻ കനാലിനും ചുറ്റുമുള്ള മൂന്നു വലയങ്ങൾ 8. എല്ലിനെ ദീർഘമായും വിലങ്ങനെയും മുറിച്ചതു്.

(ബി) തരണാസ്ഥി (cartilage): നല്ല ബലമുള്ള ഒരുതരം ഭൂമികയിൽ (ground mass) കോശങ്ങൾ ഇരട്ടയായോ നാലായോ കൂടുകൂടി അങ്ങിങ്ങായി കിടക്കുന്ന കലയാണിതു്. ഭൂമികയ്ക്കു് ഇലാസ്തികതയുള്ളതുകൊണ്ടു് കാഠിന്യം കൂടും. എന്നാൽ അസ്ഥിയുടെ അത്ര കട്ടപ്പറ്റമൊന്നുമില്ല. കോൺഡ്രിൻ എന്നൊരു വസ്തുവിലാണ് ഈ ഭൂമിക നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതു്. കോൺഡ്രോബ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളുടെ സ്രവമാണ് കോൺഡ്രിൻ. ഈ തരണാസ്ഥിയെ രണ്ടു തരമാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

(i) സുതാര്യ തരണാസ്ഥി (hyaline cartilage): ഭൂമികയിൽ നാരുകളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മൂക്കിനറ്റത്തും ശ്വാസനാളഭിത്തിയിലും അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നിടത്തും ഇതാണുള്ളതു്

(ii) നാരും - തരണാസ്ഥി (fibro cartilage): ഇതിന്റെ ഭൂമികയിൽ വെള്ളയോ മഞ്ഞയോ ആയ തന്തുക്കൾ (സംയോജകകലയിലുള്ളതു പോലെ) ഉണ്ടായിരിക്കും. മഞ്ഞ തന്തുക്കൾ, ഇലാസ്തികങ്ങളാകയാൽ അവയുള്ള തരണാസ്ഥിയെ ഇലാസ്തിക തരണാസ്ഥി (elastic cartilage) എന്നു വിളിക്കും. ഇതിനു കറച്ചൊക്കെ സ്ഥിതിസ്ഥാപകശക്തിയുണ്ടു്. ചെവിയിലും അണ്ണാ

ക്കിലും ഇതു കാണപ്പെടുന്നു. വെള്ള തന്തുക്കളുള്ള തന്തുസാന്നിധ്യം നട്ടെല്ലിലെ കശേരു (vertebra) കൾക്കിടയിൽ ഉള്ളതു്.


സംയോജകകലയും തന്തുസാന്നിധ്യം തമ്മിലുള്ള മുഖ്യ വ്യത്യാസം അവയിലെ ഭൂമികയുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ്. സംയോജകകലയിൽ ഭൂമിക ജെല്ലി പോലെയും തന്തുസാന്നിധ്യത്തിൽ അതു് കട്ടപ്പുള്ളതുമായിരിക്കും.

(സി) അസ്ഥി: കാഠിന്യം കൂടിയ കലയാണിതു്. കോശങ്ങൾ സ്രവിക്കുന്ന ഭൂമിക, ആദ്യം ജെല്ലി പോലെയായെങ്കിലും ക്രമേണ അതിൽ ധാരാളം കാൽസിയം ലവണങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂമികയിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു കൊളാജനാണ്. അസ്ഥിയിലെ കോശങ്ങൾ അഭിരസ്രോതാശങ്ങൾ (osteoblasts) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂമികയിൽ ഒന്നിനൊന്നു പുറകിലുള്ള ഗുത്തങ്ങളിലായി കക്ഷ്യാവൃത്തങ്ങൾ (concentric rings) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിള്ളലുകളി (പോരങ്ങളി) ലാണു കോശം നില കൊള്ളുന്നതു്. ഇങ്ങിനെ, ഗുത്തങ്ങളിൽ നിറത്തിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളും അവയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമികയും കൂടി അസ്ഥിയുടെ ഓരോ പാളികളുണ്ടാകുന്നു. ഒന്നിനൊന്നു പുറകിലുള്ള ഗുത്തങ്ങളായാണു അസ്ഥിപാളികൾ കിടക്കുന്നതു്. പാളികളെ അന്യോന്യം 'ലേപ്പിച്യുകൊങ്' ചെറുനാളികളുണ്ടു്. ഇവയിൽ ചിലതിലൂടെ രക്തക്കുഴലുകൾ കടന്നുപോയി അസ്ഥിയിലെ കോശങ്ങൾക്കു് രക്തമെത്തിക്കുന്നു.

(ഡി) മേദ: കല (adipose tissue): സാധാരണയായി തപകിനടിയിലായി കാണുന്നതാണു മേദ: കല. ഇതിൽ തെട്ടു തെട്ടു കിടക്കുന്ന വലിയ കോശങ്ങളാണുള്ളതു്. ഓരോ കോശവും കൊഴുപ്പു കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു വിന്തിരിക്കും. കോശരസവും ന്യൂക്ലിയസും ഒരു വശത്തേക്കു തള്ളപ്പെട്ടാണു കിടക്കുന്നതു്. കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമികയുണ്ടാവില്ല. ഈ കോശങ്ങളെ മേദസ്സു നിറച്ചവെച്ചു സംഭരണികളായി കണക്കാക്കാം. ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഈ മേദസ്സുപയോഗിച്ചു് ജീവികൾ ഉൾജമുല്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

(3) മാംസപേശി-സങ്കോച കല (muscles contractile tissue): ഇതിലെ കോശങ്ങൾ വണ്ണം ചുരുങ്ങി നിളം കൂടിയവയാവും. അവയിലെ കോശരസം വളരെച്ചെറു സങ്കോചശക്തി (contractility)-സങ്കോചവീക്കാനുള്ള കഴിവു്-പ്രദർശിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഈ കല അത്യാവശ്യമാണ്. പേശികളുടെ ഇടവിട്ടുള്ള സങ്കോചവികാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജന്തുക്കൾ ഒരിടത്തുനിന്നു മററൊരിടത്തേക്കു് നീങ്ങുന്നതും ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും. പേശിയിലെ കോശങ്ങൾ തന്തുരൂപമായതിനാൽ അവയെ പേശിതന്തുക്കളെന്നു വിളിക്കാം. പേശിതന്തുക്കളുടെ രൂപത്തിന്നു പ്രവർത്തനനിമിഷം അനുസരിച്ചു് പേശികളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(i) രേഖിത പേശി (striated muscle): ഈ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടു് സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലിരിക്കും. ഓരോന്നിന്നു നല്ല നിളം കാണും. വിലങ്ങനെ യുള്ള രേഖകൾ ഈ കോശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇളം നിറത്തിലും കട്ടംനിറത്തിലും ഉള്ള രേഖകൾ (striations) ഇടവിട്ടിടവിട്ടു് ഒരൊരം മുതൽ മറോ അറോ വരെ വളയങ്ങൾ മാതിരി കിടക്കുന്നതു്.



ചിത്രം. 12. പേശികോശങ്ങൾ 1. ഇച്ഛാനുസരിച്ച പേശി.

2. ഹൃദപേശി. 3. ഇച്ഛാനുസരിച്ച പേശി (അസ്ഥിപേശി)

കാണാം. ഓരോ കോശത്തിലും ഒന്നിലേറെ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളുണ്ടാവും. ഇലക്ട്രോൺ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഓരോ കോശത്തിലും അനവധി ചെറുനാരുകൾ നെട്ടുകെ കിടക്കുന്നതു കാണാം. ഇവ രണ്ടുതരം പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. പേശിതന്തുവിലെ സങ്കുചിത വികാസശക്തിയുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ ചെറുനാരുകൾ. പേശിതന്തുക്കൾ കെട്ടുകെട്ടായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഓരോ കെട്ടിനും ഫാസിക്കുലസ് (fasciculus) എന്നാണ് പേര്. അതിനു ചുറ്റും സംയോജകകല കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉറയുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെത്തെ കെട്ടുകൾ (bundles) ചേർന്നു പേശികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. പേശിയിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിക്കാൻ കഴിവു നോത്തേ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ഘട്ടം വരെ വളർച്ചയെത്തിയ ജീവിയിൽ പേശിയിലെ കോശങ്ങൾ പെരുക്കുകയില്ല. പക്ഷേ അവ വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. അസ്ഥികൂടത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടുകാണുന്ന കലയാകയാൽ രേഖിതപേശിയെ അസ്ഥിപേശി (skeletal muscle) എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഈ പേശികൾ ജീവിയുടെ ഇഷ്ടക്കനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഇച്ഛാനുസരിച്ച (voluntary) പേശികളെന്നും പേരുണ്ട്. ഈ പേശികൾ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ ചൊൽപ്പടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ഇവയെ ജീവിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.

(ii) അരേഖിതപേശി (nonstriated muscle) ഇതിലെ കോശങ്ങൾ അഥവാ പേശിതന്തുക്കൾ നീണ്ട രണ്ടറ്റവും കൂത്ത്, നടുവിന്ത് സ്പിൻഡിൽ പോലെയായിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിലും ഓരോ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ കാണൂ. വിലങ്ങനെയുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല. ന്യൂക്ലിയോലസിനു നല്ല വലിപ്പം കാണാം. കോശങ്ങൾ ഒരു തരം അയഞ്ഞ സംയോജകകലയാൽ തമ്മിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആനുരോധവങ്ങളിലാണ് ഈ പേശിയുള്ളത്. അനുകല്പയുടെ ഭിത്തി, മുതുകഴലുകൾ, ഗ്രന്ഥികളുടെ നാളങ്ങൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ എന്നിങ്ങനെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുള്ളത് അരേഖിതപേശിയാണ്. ഈ പേശി ജന്തുവിന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഈ കാരണത്താൽ ഇതിന്, ഇച്ഛാനുസൃതവർത്തി (involuntary) എന്ന പേർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ജീവികളിൽ ഇതു ഇച്ഛാനുസൃതവർത്തിയാണെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

(iii) ഹൃദയപേശി (cardiac muscle): ഹൃദയഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതരം പേശിയാണ് ഹൃദയപേശി. മുൻ വിവരിച്ച രണ്ടു തരം പേശികളുടെയും ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. കോശങ്ങളിൽ വെള്ള വരകൾ കുറവ് കിടക്കുന്നതു കാണാം. ഒന്നിലേറെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും കോശങ്ങൾക്കു രാഖകളുള്ളതായും അടുത്തുകിടക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ രാഖകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ഈ പേശി ഇച്ഛാനുസൃതവർത്തിയാണ്. ഹൃദയപേശിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതു ഇടതടവില്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം സദാ സമയവും മിടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.


(iv) പര്യയനകല (രക്തവും ലസികയും-blood & lymph): ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള രക്തവും ലസികയും ചേർന്നതാണ് പര്യയനകല. ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി, ഭക്ഷണവും പ്രാണവായുവും മറ്റു പദാർഥങ്ങളും ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ വിസർജനേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ്.

രക്തം: ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള രക്തദ്രവം (blood plasma) അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്താണുക്കൾ (blood corpuscles) ഇവ ചേർന്നാണ് രക്തം. രക്തദ്രവത്തിൽ ചിലതരം പ്രോട്ടീനുകളും ഷ്വാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രോട്ടീനുകൾ കൊളോയ്ഡ് രൂപത്തിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഷ്വാരങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കും. ദിവനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവനം വന്ന ആഹാരപദാർഥങ്ങളും ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ഹോർമോണുകളും വിസർജനവസ്തുക്കളും ഇതിൽ കലർന്നിരിക്കും. രക്താണുക്കളെ രണ്ടു തരത്തിൽ കാണാം.

(i) ചുവന്നരക്താണുക്കൾ: (red corpuscles) കോശത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുവിൽ മിക്കവയിലും ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം. സസ്തനങ്ങളിൽ (mammals) ചുവന്ന രക്താണു വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചുവന്ന രക്താണുവിന് 0.0008 സെ. മീറ്റർ വ്യാസം കാണാം. ഒരു ഘന മി. മീറ്റർ രക്തത്തിൽ ഏതാണ്ടു 50,00,000

അണക്കർ ഉണ്ടാകും. ഇതിനു ചുവപ്പുനിറം കൊടുക്കുന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ അംശം അടങ്ങുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ (Haemoglobin) എന്ന വസ്തുവാണ്. നട്ടെല്ലുകളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്താണക്കർക്കുള്ളിലും നട്ടെല്ലുരഹിതരിൽ അത് പ്ലാസ്മയിലുമാണു ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രാണവായുവുമായി ചേരാൻ അതിനുള്ള അതിയായ ആസക്തിയാണ്. പ്രാണവായു ധാരാളമുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രാണവായു കുറഞ്ഞ പരിതസ്ഥിതിയിലെത്തിയാൽ ഇതു പ്രാണവായുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉള്ളടത്തുനിന്ന് ഓക്സിജനെ ടത്തു ഇല്ലാത്തടത്തേത്തിച്ചു കൊടുക്കുക—ഇതാണു ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ധർമം.

ഞാണയുൽ മുതലായ ജീവികളുടെ രക്തരസത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടു്. ഈ ജന്തുവിന്റെ പ്ലാസ്മയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാണു് അതു കാണു്.



ചിത്രം. 13. പര്യയനകോശങ്ങൾ

1. ചുവന്ന രക്താണു—പാർശ്വ വിക്ഷണം. 2. ചുവന്ന രക്താണു—മുകളിൽ നിന്നു 3—7 വിവിധ തരം ശ്വേത രക്താണക്കർ (ലിംഫോസൈറ്റു്, മോണോസൈറ്റു്, ന്യൂട്രോഫിൽ, ഇഴസീനോഫിൽ, ബേസോഫിൽ)

പ്പെടുന്നത്. ചെമ്പിന്റെ അംശം കലർന്ന പ്രോട്ടീനായ ഹീമോസയാനിൻ (Haemocyanin), രക്തനിലം എന്ന വസ്തുവാണ് ആർത്രോപോഡുകളുടെ രക്തത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ മാതിരി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


രക്തഗ്രന്ഥകങ്ങൾ (white corpuscles, Leucocytes): ഇവ ചുവന്ന അണുക്കളെക്കാൾ വലിയവയാണ്. പക്ഷേ എണ്ണത്തിൽ നന്നേ കുറയും. അമീബയെപ്പോലെ ആകൃതി മാറാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഈ രക്താണുക്കൾ. രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയിലൂടെ പുറത്തു കടക്കാനും ഇവയ്ക്കു സാധിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ഒരു വെള്ളരക്താണുവിന് സുമാർ 0.001 സെ.മീ. വ്യാസമുണ്ടാകും. ഒരു ഫൻ മി.മീറർ രക്തത്തിൽ ഏകദേശം 10,000 വെള്ള രക്താണുക്കളുണ്ടാകും. രക്തത്തിൽ കടന്നു കൂട്ടുന്ന ആപൽക്കാരികളായ വസ്തുക്കളെ (ബാക്ടീരിയ മുതലായ രോഗകാരികളെ) ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കലാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം.

രക്തപ്ലേറ്റ് ലാറ്റുകൾ: രക്തപ്ലേറ്റ് ലാറ്റുകൾ (blood platelets) രക്താണുക്കളല്ല. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ ശകലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. രക്തസ്രാവം തടയാൻ രക്തം കട്ടപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ വസ്തുവിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

ലസിക: നിറമില്ലാത്തൊരു ദ്രാവകമാണ് ലസിക (lymph). കരളുകളുടെ ശരീരത്തിലാണിതു കാണപ്പെടുന്നത്. രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യേകം നാളികളിലൂടെ ഇതു പ്രവഹിക്കുന്നു. ടിഷ്യൂക്കളിൽ നിന്നു ദ്രവം ശേഖരിച്ച് രക്തക്കുഴലുകളിൽ എത്തിക്കലാണ് ഈ നാളികളുടെ ജോലി. ലസികയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം അണുക്കളെ കാണാം. രക്തത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം വെള്ള രക്താണുക്കളായ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ആണ് ഈ പ്രത്യേകാണുക്കൾ.

(5) നാഡീടിഷ്യു: പുറമേ നിന്നുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചുറ്റുപാടിനെപ്പറ്റി ജീവിക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ശരീരാവയവങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകുന്നതും നാഡീടിഷ്യൂക്കൾ (nervous tissues) ആണ്. ഈ കല ജീവിയെ പരിതസ്ഥിതിയുമായും അതിന്റെ അവയവങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിലും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഉത്തേജനശീലത (irritability) യും ചാലകത (conductivity) യും ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് നാഡീടിഷ്യൂക്കുകൾക്കാണ്. പുറമേ നിന്നോ ആന്തരാവയവങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ (stimuli) സ്വീകരിച്ച്, അവയെ മണ്ഡിഷ്കത്തിലോ മറ്റു നാഡീകേന്ദ്രങ്ങളിലോ എത്തിക്കുകയും മണ്ഡിഷ്കത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വഹിച്ച് പേശികളിലും ഗ്രന്ഥികളിലും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാഡികളാണ്. നാഡീകോശങ്ങളാലാണ് നാഡീകേന്ദ്രമായ മണ്ഡിഷ്കവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണ്ഡിഷ്കം, നാഡീകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവയവങ്ങൾക്ക് സന്ദേശങ്ങളയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവയ്ക്കനുസരിച്ച് അവയവങ്ങളെ പ്രവർത്തി

പ്രീകാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതതവയവങ്ങളിൽ സമയോചിതം എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നാഡീടിഷ്ഠവിന്റെ മുഖ്യപ്രവൃത്തി.



ചിത്രം.14. നാഡീകോശം വലുതാക്കിയത്.

1. കോശകായം 2. ന്യൂക്ലിയസ്. 3. നാഡികാബ്ധം (ആക്സൺ)
4. മെഡുല്ലറി ഉറ.

നാഡീകോശവും നാഡീതന്തുവും (nervous cells and nerve fibres) അടങ്ങുന്നതാണ് നാഡീടിഷ്ഠ. നാഡീകോശം നാഡീടിഷ്ഠവിലെ പ്രവർത്തനയൂണിറ്റാണ്. വൈദ്യുതാവേഗങ്ങളെ (electric impulses) പ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള (transmit) കഴിവു നാഡീകോശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ കോശങ്ങൾ സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ നിന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയസും അതിനു ചുറ്റും കോശരസവും സാധാരണപോലെ കാണുന്നതാണ്. കോശരസത്തിൽ മറ്റു കോശങ്ങളിൽ കാണാത്ത നിസ്സൽകായങ്ങൾ (Nissel bodies) എന്നു പറയുന്ന ഒരുതരം വസ്തുക്കളെ കാണാം. നാഡീകോശ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ട ഊർജ്ജം (energy) ഇവയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ നാഡീകോശത്തിന്റെയും ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നു കറെ നാരുകൾ

പുറപ്പെടുന്നതു കാണാം. ഈ നാളുകളിൽ ഒരു വളരെ നീളമുള്ളതും ശാഖകളില്ലാത്തതുമായിരിക്കും. ഇതിനു നാഡികാബന്ധം (axon) എന്ന പേർ. മറ്റുള്ള നാളുകൾ നീളം കുറഞ്ഞവയും ശാഖകളോടു കൂടിയവയും ആയിരിക്കും. ഇവയാണ് നാഡീജടകൾ (dendrites). നാഡീകോശങ്ങളുടെ കോശകായം (cell body) മസ്തിഷ്കത്തിലും സൂക്ഷ്മനയിലും പ്രധാന നാഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗാൻഗ്ലിയോൺ (ganglion)കളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നാഡികളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് നാഡികാബന്ധങ്ങളാണ്. നാഡികാബന്ധം മേന്മപദാർത്ഥം (myelin) എന്നൊരു വസ്തുവാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇതിനും പുറത്തായി നൂരിലൈമ്മ (neurilemma) എന്ന പേരുള്ള സ്തരമുണ്ട്. നാഡികാബന്ധങ്ങളാണ് നാഡികളിലെ നാഡീതന്തുക്കൾ. ഇത്തരം അനവധി തന്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന കെട്ടുകളാണ് നാഡികൾ.

നാഡികൾ രണ്ടു തരമാണ്. ഒന്ന് ബോധേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ (impulses) മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ സൂക്ഷ്മനയിലേക്കോ എത്തിക്കുന്ന സംവേദകനാഡികൾ (sensory nerves). രണ്ടാമത്തേതു് അവുടെ നിന്നു സന്ദേശങ്ങളെ പേശികളിലെത്തിക്കുന്ന പ്രേരകനാഡികളും (motor nerves). ചില നാഡികളിൽ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും.

അവയവങ്ങൾ

ടിഷ്യൂക്കൾ കൂടിച്ചേർന്നു പ്രത്യേകകർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പ്രത്യേകരീതിയിൽ സംഘടിതമായാണ് അവയവം (organ) രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഒരു ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. ഓരോ അവയവത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആമാശയം, ഹൃദയം, വൃക്ക, തലച്ചോറ് ഇവയെല്ലാം അവയവങ്ങളാണ്. ഏതെങ്കിലും അവയവമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അത് സങ്കീർണമായ ഒരു വസ്തുവെന്നും അതിൽ വ്യത്യസ്ത കലകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും. ഉദാഹരണത്തിന് ആമാശയം പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ അധിതലീയകലയും പേശികലയും കാണാം; അതിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ പല തരം ഗ്രന്ഥികളുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഏതവയവവും സങ്കീർണമാണെന്നും വിവിധ കലകൾ അടങ്ങുന്നതാണെന്നും തെളിയും. ജന്തുശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിരിക്കും. അന്നകല്യ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ദീപനം വരുത്തുന്നു. ഹൃദയം രക്തത്തെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. വൃക്കകൾ മാലിന്യങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തുന്നു. അങ്ങിനെ ഓരോ അവയവവും ഓരോ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങൾ ചേർന്നു അവയവ വ്യൂഹങ്ങളായാണ് (organ systems) ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ കൂറെ അവയവങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒരേ തരം ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന അവയവവ്യൂഹങ്ങളുടെ ചെറുവിവരണം താഴെ കൊടുക്കാം.

പചനവ്യൂഹം

ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ദീപനം വരുത്തുകയും ദീപനം വന്ന പദാർഥങ്ങളെ ആഗിരണം (absorption) ചെയ്തു ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും

ഉപയുക്തമാക്കി തീർക്കുകയാണ് പചനവ്യൂഹ (digestive system) ന്റെ മുതല. വായിൽ നിന്ന തുടങ്ങി ഗുദഭാഗത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട കഴലും അതുമായി ബന്ധിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികളും ഇതിൽ അടങ്ങുന്നു. പ്രസ്തുത കഴലിന് അനേകലു എന്നാണ് പേര്. ഇതു് പല തരം ജീവികളിൽ പല തരത്തിൽ രൂപഭേദം കൈവരിച്ചിരിക്കും. താഴ്ന്നതരം ജീവികളിൽ അനേകലു ഒരൊറ്റതൽ മറ്റോ അറാം വരെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയിരിക്കും. എന്നാൽ മിക്ക ജീവികളിലും ഇതു് പല ഭാഗങ്ങളായി മാറി ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ അവയവമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മണ്ണിരയുടെ അനേകലു എട്ടാകും. ഇതു് ഗുളം (pharynx) അന്നനാളം (oesophagus), അന്നമർദി (gizzard), കടൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവയവങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം. എന്നാൽ ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഒന്നായിച്ചേർന്ന് ഒരേ കഴലായിത്തന്നെയാണിരിക്കുന്നതു്. പക്ഷേ ഓരോ ഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക രൂപവും ഘടനയും പ്രവൃത്തിയും ആണുണ്ടാവുക. പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദീപനവും ആഗിരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അനേകലുയിലേക്കു തുറക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥികളും പചനവ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ അവയവങ്ങളാണ്. ജീഹ്വാഗ്രന്ഥികൾ, യക്രീനു്, അഗ്യാശയം (pancreas) ഇതെല്ലാം അത്തരം ഗ്രന്ഥികളാകുന്നു. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അനേകലുയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചു് ദീപനഗ്രന്ഥികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രസങ്ങളായിച്ചേരും. അത്തരം രസങ്ങളിൽ എൻസൈമുകളെന്ന രാസവസ്തുക്കളുണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ എൻസൈമും ആഹാരത്തിലടങ്ങുന്ന ഓരോ പദാർത്ഥത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ആഹാരത്തിലടങ്ങുന്ന അന്നജത്തെ പഞ്ചസാരയാക്കി മാറ്റുന്നതു് ദീപനരസത്തിലടങ്ങുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. അതുപോലെ പ്രോട്ടീനേയും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എൻസൈമുകൾ അനേകലുയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീപനം വന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ശരീരത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അനേകലുയുടെ ഭിത്തികൾ തന്നെയാണ് ദീപനത്തിന് ശേഷം പോഷകദ്രവ്യങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതു്. ഈ ക്രിയക്ക് ആഗിരണമെന്നു പറയുന്നു. കടലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നു രക്തം വഴിയോ മറ്റോ പോഷകപദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നു. ദീപനം വരാത്ത ഭക്ഷണാംശം മലമായി ഗുദഭാഗം വഴി പുറത്തേയ്ക്കു പോകുകയും ചെയ്യും. ദീപനക്രിയ എല്ലാ ജീവികളിലും മേൽപറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ചു തന്നെയാണ് നടക്കുക. ചില ജീവികളിൽ വളരെ വിസ്തരിച്ച മട്ടിലായിരിക്കും; മറ്റു ചിലവയിൽ ലഘുവായ രീതിയിലും. താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചില ജീവികളിൽ (ഉദാ: നാപ്പുഴുക്കൾ) അനേകലു ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അത്തരം ജീവികൾ പരജീവികളായിരിക്കും. മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരത്തിനകത്തു് പോഷകദ്രവ്യങ്ങളിലാണ് അവയുടെ വാസം. തങ്ങൾക്കു വേണ്ട ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൽനിന്നു് ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യസ്തരത്തിലൂടെ അവ വലിച്ചെടുക്കും. ദീപനക്രിയ നടത്താൻ അവയ്ക്കു കഴിവില്ല. ദീപനം വന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ആതിഥേയന്റെ (host) ശരീരത്തിൽ നിന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നല്ലാതെ സ്വയം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്കു് സാധ്യമല്ല.

ശ്വാസനവ്യൂഹം

ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്നു കീർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയാണ് ശ്വാസനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശ്വാസനം നടക്കുന്നത് ശ്വാസനവ്യൂഹത്തിൽ (respiratory system) ലാണ്. പല തരം ജീവികളിൽ പല തരം ശ്വാസനാവയവങ്ങൾ കാണാം. ജലജന്തുക്കളിൽ ഗില്ലുകളും കരജന്തുക്കളിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളുമാണ് പ്രധാന ശ്വാസനാവയവങ്ങൾ. ചില ജീവികളിൽ ബാഹ്യചർമ്മവും ശ്വാസനക്രിയ നടത്തുന്നത്. വായുവിൽ നിന്നു ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വായുമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കു വിടുകയാണ് കരജന്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നത്. ജലജന്തുക്കളാവട്ടെ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന പ്രാണവായുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. രക്തത്തിലടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പദാർത്ഥമാണ് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ പദാർത്ഥം ഹീമോഗ്ലോബിനോ ഹീമോഗ്ലൂട്ടിനോ (മുൻപു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്) ആവാം. വാതകക്കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന ശ്വാസനേന്ദ്രീയങ്ങളിൽ ധാരാളം രക്തസഞ്ചാരമുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലേ ശ്വാസനക്രിയ വേണ്ടപോലെ നടക്കുകയുള്ളൂ. കരജീവികളിൽ പുറമേ നിന്നു വായുവിനെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ നാസാധാരണമാണ്. അവ ചെന്നു ചേരുന്ന കഴലാണ് ശ്വാസനാളം. ഇത് ശ്വാസകോശങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പാറ, ശലഭം തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ പുറമേ നിന്നു വായുവിനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കാൻ തക്കവിധം സങ്കീർണമായ ഒരു ക്ഷോമവ്യൂഹം (tracheal system) ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വ്യൂഹം കുറെ കഴലുകളും അവയുടെ ശാഖോപശാഖകളും ചേർന്ന് രൂപം പൂണ്ടതാണ്. ഈ കഴലുകൾ വഴി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഓക്സിജൻ നേരിട്ടു കിട്ടും. രക്തത്തിന്നു ഇവിടെ ശ്വാസനക്രിയയുമായി ബന്ധമില്ല.

വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ മിക്കവയിലും ശ്വാസനം നടത്താൻ ഗില്ലുകൾ കാണാം. വെള്ളവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന, രക്തക്കഴലുകളാൽ നിബിഢമായ, കനം കുറഞ്ഞ ഇതളുകൾ പോലെയുള്ള അവയവങ്ങളാണ് ഇവ. ഗില്ലുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം ചുറ്റുപാടുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിനെ പുറംതള്ളും.

പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം

പോഷകദ്രവ്യങ്ങൾ, ഓക്സിജൻ എന്നിവയെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുകയും വിസർജനേന്ദ്രീയങ്ങളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങളെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുകയുമാണ് പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹത്തിന്റെ (circulatory system) കടമ. ഒരു പമ്പിങ്ങ് സ്റ്റേഷനും (ഹൃദയമോ സ്പന്ദിക്കുന്ന കഴലോ) അതുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കുറെ കഴലുകളും പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ വ്യൂഹം ഒരു ദ്രവപദാർത്ഥത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാണ് രക്തം.

രക്തത്തിൽ കൂടിയാണ് പദാർഥങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രവഗതാഗതപദ്ധതിയാണ് പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം. താഴ്ന്നതരം ജീവികളിൽ ഹൃദയം വളരെ ലളിതമായിരിക്കും, വെറും ഒരു കഴലാണത്. പക്ഷേ അതു സദാ സങ്കോചിച്ചും വികസിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും. ഉയർന്നതരം ജീവികളിൽ ഹൃദയം അറകളായി ഭാഗിക്കപ്പെടുകയും ഓരോ അറയും ഓരോതരം രക്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട രണ്ടുതരം കഴലുകൾ കാണാം. ഒരുതരം കഴലുകളിലൂടെ രക്തം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു വരുന്നു. ഈ കഴലുകളെ സിരകൾ (veins) എന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു മറാവയവങ്ങളിലേയ്ക്കു രക്തം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കഴലുകളെ ധമനികൾ (arteries) എന്നും പറയുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനം മൂലം രക്തം സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടുതരം കഴലുകളും ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു ചെറുചെറുകഴലുകളായി പിരിഞ്ഞു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു കാണാം.

പാറാ തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ പ്രത്യേക രക്തക്കുഴലുകളൊന്നുമില്ല. കഴൽ രൂപത്തിൽ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. രക്തം ശരീരത്തിനകത്തു വ്യാപ്തമാണ്. സർവ അവയവങ്ങളും അതിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ശരീരാന്തർഭാഗത്തെ രക്തഗുഹിക (haemocoel) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ജീവികളിൽ ശ്വാസനം നടത്തുന്നത് മുൻ പ്രസ്താവിച്ചപോലെ ക്ലോമവ്യൂഹമാകയാൽ രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹിമോഗ്ലോബിനോ ഹിമോസയാനിനോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതാണ് പാറായുടെ രക്തം നിറമില്ലാത്തതാവൻ കാരണം. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഹൃദയം അനുകല്പകപരിയായി അപാക്ഷഭാഗത്തു (dorsal) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കശേരുകികളിൽ അനുകല്പസ്തംഭത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനം.

വിസർജനവ്യൂഹം

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ സ്വരൂപിച്ചു പുറം തള്ളുകയാണ് വിസർജനവ്യൂഹം (excretory system) ചെയ്യുന്നത്. ചില താഴ്ന്ന ജീവികളിൽ ശരീരത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കഴലുകളാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. ചില ജീവികളിൽ ഈ കഴലുകൾ ചുരുങ്ങുകൂടി പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യും. ശരീരത്തിൽ നിന്നു വിസർജിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെ വേർപെടുത്തിയെടുത്തു ഈ കഴലുകൾ പുറത്തേക്കു വിടുന്നു. ഭൂനാഗം (ഈഞ്ഞൂൽ) മുതലായ പൂശുക്കളിൽ ഇങ്ങിനത്തെ അനവധി ജോഡി കഴലുകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് വൃക്കക്കുടർ (nephridia) എന്നാണ് പേർ. ഉയർന്നതരം ജീവികളിൽ വലിയ രണ്ടു അവയവങ്ങളാണ് ഈ കഴലുകളുടെ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇവയാണ് വൃക്കകൾ (kidneys). ഓരോ വൃക്കയും അനേകം കഴലുകൾ ചേർന്നുണ്ടായ കഴലുകളുടെ ഒരു പോക്കറാണ്. ഈ കഴലുകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് മലിനവസ്തുക്കളെ വേർപെടുത്തുന്നത്. അങ്ങിനെ വേർപെടുത്തിയെടുത്ത വസ്തുക്കളും ശരീരത്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത ജലാംശവും ചേർന്ന് മൂത്രമായിത്തീരുന്നു. അതു വൃക്കകളിൽ നിന്നു മൂത്ര

ക്ഷയകൾ വഴി വസ്തിയിലെത്തി മുത്രനാളം (urethra) വഴി പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു. തലക്കും വിസർജനം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിയർപ്പ് ഒരു വിസർജ്യവസ്തുവാണ്.

പേശിവ്യൂഹം

ശരീരഭിത്തിയിലും അസ്ഥികളോടു ചേർന്നാണ് പേശിവ്യൂഹം (muscular system) വികസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേശികളുടെ ഇടവിട്ടുള്ള സങ്കോചവികാസങ്ങൾ വഴി ജീവികൾ ചലിക്കുന്നു. അട്ട, മണ്ണീർ തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ ശരീരഭിത്തിയിൽ ഉള്ള പേശികളുടെ സങ്കോചവികാസങ്ങളാണ് ശരീരചലനത്തിനു സഹായകമാകുന്നത്. കൈകാലുകളും ചിറകും ചലിപ്പിക്കുന്നതും പേശികളുടെ സഹായത്താലാണ്. അതായത്, ശരീരത്തിന്റെ ചലനം സാധ്യമാക്കുന്ന അവയവമാണ് പേശി. ആന്തരാവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവയിലെ പേശികളുടെ സഹായത്താലാകുന്നു.

അസ്ഥിപഞ്ജരം

ശരീരത്തിനു താങ്ങായി വർത്തിക്കുന്ന കാഠിന്യമുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടാകുന്ന അസ്ഥിപഞ്ജരം (skeleton). നട്ടെല്ലില്ലാത്ത പല ജീവികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്രോപോഡുകളിൽ, ശരീരത്തിനു പുറത്തു കട്ടിയുള്ളൊരു കവചം കാണാം. ഇതിനെ ബാഹ്യാസ്ഥികൂടം (exoskeleton) എന്നു പറയുന്നു. കുമ്പസരങ്ങളിൽ അസ്ഥിപഞ്ജരം ശരീരത്തിനകത്താകുന്നു. അത് തന്റണാസ്ഥികൊണ്ടോ അസ്ഥികൊണ്ടോ ഇവ രണ്ടും കൊണ്ടോ നിർമ്മിതമായിരിക്കാം. ഓട്ടാ ജീവിയിലും അനവധി അസ്ഥികളുണ്ട്. അതെല്ലാം ചേർന്നാണ് അസ്ഥികൂടം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അസ്ഥിപഞ്ജരം ശരീരത്തിനു താങ്ങായി നിൽക്കുന്നതിനു പുറമെ അവയവങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല കൈകാലുകളുടെയും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളുടെയും ചലനത്തിനു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നാഡിവ്യൂഹം

മസ്തിഷ്കം (brain), സുഷുമ്ന (spinal cord), നാഡികൾ എന്നിവയാണ് നാഡിവ്യൂഹത്തിന്റെ (nervous system) ഭാഗങ്ങൾ. ഉദ്ദീപനങ്ങളെ (stimuli) സ്വീകരിക്കുകയും പ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ആണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യജോലി. ശരീരഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി ഒത്തൊരുമിച്ചു പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിലും നാഡിവ്യൂഹത്തിന് നല്ല പങ്കുണ്ട്. ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ച് ജീവിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നാഡിവ്യൂഹത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ്. കണ്ണ്, മുക്ക്, ചെവി, ജീഹ്വ, തൊലി എന്നീ ബോധേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണ് ജീവിക്ക് ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിവിധ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ സവിശേഷ ബോധേന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാത്ത താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ നാഡിവ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക കണികകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തു് ആസക്തമോ അങ്ങിങ്ങായോ ഉണ്ടാകും. ഈ കണികകൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവയാകുന്നു. ബോധേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി എത്തുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾ നാഡികൾ വഴി സഞ്ചരിച്ച് തലച്ചോറിലോ പ്രധാന നാഡിയിലോ എത്തും. അവിടെ നിന്നു ഉദ്ദീപനത്തിനനുസരി

ചുഷ്പം എന്നു തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രേരകനാഡികൾ വഴി പേശികളിലേത്തും. അങ്ങിനെ എത്തുന്ന നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചു പേശികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് നാഡിവ്യൂഹപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുരുക്കം.

അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികൾ

ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ചില നാളിയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥികളാണ് (ductless glands). അകശേതുകികളിൽ ഇത്തരം ഗ്രന്ഥികൾ ജീവിയുടെ വളർച്ചയിലും മറ്റും പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. കശേതുകികളിലെ അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികളെപ്പറ്റി (endocrine glands) വളരെയേറെ അറിവ് നാം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിർമ്മിതമാകുന്ന രാസപദാർഥങ്ങൾക്കു ഹോർമോണുകൾ (hormones) എന്നാണ് പേര്. ഓരോ ഹോർമോണിനും ഓരോ പ്രത്യേക ജോലിയാണ് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളത്. ഹോർമോണുകൾ നേരിട്ടു രക്തത്തിൽ കലരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രക്തത്തിലൂടെ ശരീരമാസകലം അത് വ്യാപിക്കുന്നു.

ആർത്രോപോഡയിലെ പല സ്പീഷീസുകളിലും അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞെങ് തുടങ്ങിയ ജീവികളിൽ കണ്ണുകൾ ഓരോ തൈട്ടിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ണുതൈട്ടികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരതരം അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ നിറമാറ്റത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥികൾ സ്രവിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾക്കു നല്ല പങ്കുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷട്പദങ്ങളുടെ വളർച്ചയും രൂപാന്തരണവും പുഴു ദശയിൽ അവയുടെ തലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അവയുടെ നിർമ്മാധനം (moulting) എന്ന ക്രിയ നടക്കുന്നതും ഒരു അന്തഃസ്രവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ്.

കശേതുകികളിൽ അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികൾ നല്ലപോലെ വളർന്നു വികസിച്ചതായതു കാണാം. തലച്ചോറിനടിയിലെ പിററുട്ടി, കഴുത്തിൽ അടിവശത്തു കിടക്കുന്ന തൈറോയ്ഡ്, അതിൽതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചെറുഗ്രന്ഥികളായ പാരാതൈറോയ്ഡ്, ഉറസ്സിൽ കാണുന്ന തൈമസ്, വൃക്കകളുടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥികൾ, അഗ്നീശയ ഗ്രന്ഥിയിൽ അങ്ങിങ്ങായി കിടക്കുന്ന ലാൻഗർ ഹാന്റെ ഐലന്റുകൾ (Islets of Langerhans), പുരുഷന്റെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയമായ വൃഷണം, സ്ത്രീയുടെ ഗർഭകോശം ഇവയെല്ലാമാണു നട്ടെല്ലുകളിലെ പ്രധാന അന്തഃസ്രവഗ്രന്ഥികൾ. ഇവയ്ക്കോരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചുമതലകൾ നിറവേറാറുണ്ട്. ഇവയുടെ സ്രവങ്ങളുടെ തക്ക സമയത്തുള്ള ക്രമമായ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. അവയവങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിന്നു ഹോർമോണുകളും നാഡികളും നല്ല പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രത്യുൽപാദനവ്യൂഹം

ആണിലും പെണ്ണിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവക്കൂട്ടമാണ് പ്രത്യുൽപാദനവ്യൂഹം (reproductive system). ആണിൽ പുംബീജങ്ങളെല്ലാദി

പിന്നെ വൃഷണങ്ങളും (testes) അവയുടെ നാളങ്ങളും ആണുണ്ടാവുക. പെണ്ണിൽ ഈ അവയവങ്ങൾക്കു പകരം അണ്ഡങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന അണ്ഡാശയങ്ങളും അവയുടെ നാളങ്ങളും കാണുന്നു. ചില ജീവികളിൽ രണ്ടുതരം അവയവങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അത്തരം ജീവികളെ ഉഭയലിംഗികർ (hermaphrodites) എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. പല ജീവികളിലും ആണിനും പെണ്ണിനും ബാഹ്യമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ലൈംഗിക ദ്വിരൂപത (sexual dimorphism) എന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഒട്ടേറെ ജീവികളിൽ ആണിനേയും പെണ്ണിനേയും ബാഹ്യസ്വഭാവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി തരം തിരിക്കാനാകുകയില്ല.

മേൽ വിവരിച്ച അവയവവ്യൂഹങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് അൽഭുതാവഹമായൊരു വസ്തുതയാണ്. എല്ലാ ജീവികളും ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു ചെറുകോശമായ അണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ അവയവങ്ങളോ കലകളോ ഒന്നും കാണുകയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ആ അണ്ഡം പുംബിജവുമായി ചേർന്ന് (ചിലതിൽ അങ്ങനെയല്ലാതെയും) തുടർച്ചയായി ഭംഗം വരിച്ച് ബഹുകോശസമൂഹമായി മാറുന്നു. ഈ കോശസമൂഹം ആദ്യം അവയവവ്യൂഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളെ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി ക്രമത്തിൽ സങ്കീർണങ്ങളായ അവയവങ്ങൾക്കു രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യദശയിൽ ജീവികളിൽ അവയുടെ അവയവങ്ങളുടെ ഒരാദിരൂപം-വെറും അടിത്താ-മാത്രമേ കാണൂ. ജീവി വളരുന്നതോടെ അവയവങ്ങൾക്കു വ്യതിരിക്തതയും വൈവിധ്യവും കൂടിക്കൂടിവരുന്നു.


ഹൈലം പ്രോട്ടോസോവ

ജീവികളെ പൊതുവെ രണ്ടു തരമായി വിഭജിക്കാം; ഏകകോശജീവികളും (unicellular organisms) ബഹുകോശജീവികളും (multicellular organisms). ഇവയിൽ, ആദ്യത്തെ തരത്തിൽ പെട്ടവയെ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന ഹൈലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടോസോവയിൽ പെട്ട ജീവികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോശം മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും, ആ കോശത്തിന് പതിവിലധികം പ്രാവർത്തികസിദ്ധികൾ ഉള്ളതായി കാണാം. സാധാരണയായി, ഒരു കോശത്തിന് ഒരു പരിമിതപ്രവർത്തനമേ സാധ്യമാവൂ. ഉദാഹരണമായി, ഒരു നാഡികോശത്തിന് ആവേശവാഹകമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഏതൊരു ബഹുകോശജീവിയിലും നടക്കാനിടയുള്ള എല്ലാ ജൈവപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു ഏകകോശജീവിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതു് ഒരു സ്ഥലത്തു് നിന്നു് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു് ചലിക്കുന്നു; ഭക്ഷണം തേടിപ്പിടിച്ച് ഭവ്നീകരിക്കുന്നു; ഉപാപചയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവശിഷ്ടവസ്തുക്കളെ വിസർജിക്കുന്നു; നിവാസസ്ഥലത്തെ പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായി സ്വഭാവഭേദങ്ങൾ വരുത്തുന്നു; പ്രജനനം വഴി പ്രവർധനം നടത്തുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പ്രോട്ടോസോവയിലെ ഒരു കോശം, സാധാരണ ഒരു കോശം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലും എത്രയോ അധികം പ്രവർത്തനവൈവിധ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ധാരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹൈമൻ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രോട്ടോസോവയെ അകോശ (acellular) ജീവികൾ എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏകകോശജീവികളെ വിവിധ ആവാസങ്ങളിൽ (habitat) കാണാം. കടലിലും, പുഷ്പകളിലും, കുളങ്ങളിലും, അഴുക്കു് ചാലുകളിലും, മനുഷ്യശ്വാസികളുടെ ദേഹങ്ങളിലും ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നു. ഇത്തരം ഏകകോശജീവികളുടെ പ്രരൂപം എന്ന നിലയ്ക്കു് അമീബ എന്ന ജീവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അമീബ പ്രോട്ടിയസ്

ഓടകളിലെ വെള്ളമോ ജലസസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിൽ വച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അമീബ. സ്ലൈഡിനടുത്തുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മകോശം, ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സാവധാനം ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നതായി കാണാം. ഈ ജീവിയുടെ വ്യാസം ഏകദേശം 0.25 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. പ്രോട്ടിയസ് എന്ന പൌരാണികദേവനെപ്പോലെ ആകൃതി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന് കഴിവുണ്ട്. അമീബയുടെ ദേഹത്തിൽ പുറത്തോട്ട് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ചില മുഴകൾ കാണാം. ഇവയെ കപടപാദങ്ങൾ (pseudopodia) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അമീബക്ക് ഇത്തരം മുഴകൾ, സ്വദേഹത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്; അതുപോലെ അവയെ സ്വദേഹത്തിലേക്ക് പിൻവലിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുവാനും. ഇത്തരം കപടപാദങ്ങൾ ദേഹത്തിൽ അവിടവിടെ ഉല്ലാഭിപ്പിച്ചും, ഇതരസ്ഥാനങ്ങളിൽ പിൻവലിച്ചും ആണ് അമീബ രൂപവ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്. കപടപാദങ്ങൾ ജീവിയുടെ ചലനത്തിലും, ഭക്ഷണത്തിലും ഒരു പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.




ചിത്രം 15. അമീബ പ്രോട്ടിയസ്.

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. നൂകുളിയസ് | 2. സംകാചനരികിതിക |
| 3. കപടപാദങ്ങൾ | 4. ആഹാരരികിതിക. |

രൂപപ്രകൃതി: അമീബയുടെ കോശത്തിൽ, ഏകദേശം മധ്യത്തിലായി കോശകേന്ദ്രം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കോശകേന്ദ്രം, സൈറോപ്ലാസത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വർത്തിക്കുന്നതു്. സൈറോപ്ലാസം പ്ലാസ്മാമെമ്പ്രെയിൽ (Plasma membrane) ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോശാവരണത്തിന് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന സൈറോപ്ലാസം, കോശകേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സൈറോപ്ലാസത്തേക്കാൾ അല്പം ഘനീഭവിച്ചതാണ്. പുറമേ കിടക്കുന്ന ഘനീഭവിച്ച സൈറോപ്ലാസത്തിന് എക്ടോപ്ലാസമെന്നും, ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഘനംകുറഞ്ഞ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന് എൻഡോപ്ലാസമെന്നും പറയുന്നു. എൻഡോപ്ലാസം തരിമയമാണ് (granular). ഇവിടെ ശുദ്ധമായ ഒരു പ്രധാനകാര്യം എൻഡോപ്ലാസം ഘനീഭവിച്ച് എക്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടിയെന്നും വരാം എന്നതാണ്. അതേപോലെ എക്ടോപ്ലാസം ദ്രവിഭവിച്ച് ഭാഗികമായി എൻഡോപ്ലാസമായെന്നും വരാം. എൻഡോപ്ലാസത്തിൽ, സാധാരണ കോശത്തിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ഗോൾഗികായങ്ങൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ ചെറുചെറുകുമിളകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ കുമിളകൾക്ക് റിക്തികകൾ (vacuoles) എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയെല്ലാം ദ്രാവകം നിറഞ്ഞവയാണ്.

രണ്ടുതരം റിക്തികകൾ ഉണ്ട്. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണരീതികകളും (food vacuoles), വികസിക്കുവാനും ചുരുങ്ങുവാനും കഴിവുള്ള സംകുചനശീല റിക്തികകളും (contractile vacuoles). കോശത്തിലെ ഗോൾഗി ബോഡികൾ, സംകുചനശീലരിക്തികകൾക്ക് അടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ചലനം (Locomotion): അമീബ ഒരു സ്ഥലത്തു് നിന്നു് മറ്റൊരു സ്ഥല



ചിത്രം. 16. അമീബയുടെ ചലനം.


ഒരു മൺ പൊടി അമീബയുടെ കോശമെംബ്രേനോടൊപ്പം നിങ്ങളു ന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തു് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ത്തേക്ക് ചലിക്കുന്നത് കപടപാദം ഉപയോഗിച്ചാണ്. കപടപാദം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സോപ്ലാസം കറച്ച് ദ്രവീഭവിക്കുന്നുവെന്നും, അവിടെക്കു മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ ദ്രവീഭവിച്ച എൻഡോപ്ലാസം ഒഴുകിവരുന്നുവെന്നും, അതിനാൽ ആ ഭാഗം മുഴക്കുന്നുവെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

അതെന്നായാലും, കപടപാദം നീളുന്തോറും അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തേക്ക് ദേഹത്തിലെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈറോപ്ലാസം കൂടുതലായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അതോടെ അമീബയുടെ ദേഹം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വലിയുന്നതായി കാണാം.

പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം ചലനത്തെ അമീബിയചലനം (amoeboid movement) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

ഭക്ഷണരീതിയും ദഹനവും: അമീബയുടെ ഭക്ഷണം, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയം, മറ്റു ഏകകോശജീവികൾ എന്നിവയാണ്.



ചിത്രം. 17. അമീബയുടെ ആഹാരരീതി.


ഒന്നാം ചിത്രത്തിൽ അമീബ! ആഹാരദാർമ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതും തുടർന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ക്രമേണ അതിനെ അകത്താക്കുന്നതും കാണാം.

ഒരു ഭക്ഷണസാധനം അമീബയുടെ കോശത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു് തൊട്ടു തമ്മിയാൽ, ആ ഭാഗത്തു് വേണ്ടത്ര കപടപാദങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും, അവ ഭക്ഷണസാധനത്തിനു് ചുറ്റും ഒരു വലയം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കപടപാദങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുന്നതോടെ, ഭക്ഷണസാധനം ഒന്നു് രണ്ടു് തുള്ളി വെള്ളത്തോടുകൂടി അമീബക്കുള്ളിൽ കടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണു് ഭക്ഷണരീതികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതു്.

അമീബയുടെ ഭക്ഷണരീതി: എൻഡോപ്ലാസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദഹനഎൻസൈമുകൾ (digestive enzymes) രീതികളുടെ ഉള്ളിലേക്കു് കിനിയെത്താഴ്കുന്നു. ആദ്യം രീതികളുള്ളിലെ ദ്രവം അമ്ലമയം (acid) ആയിരിക്കും; പക്ഷേ ദഹനം നടക്കുന്നതോടൊപ്പം അതു് ക്ഷാരമയം (alkaline) ആയിത്തീരുന്നു. എൻസൈമുകളുടെ പ്രക്രിയകൾ മൂലം രീക്തികയിലെ ഭക്ഷണസാധനം ദഹിക്കുകയും, ദഹിച്ച പദാർത്ഥങ്ങൾ എൻഡോപ്ലാസത്തിലേക്കു് ആവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദഹിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ രീക്തികയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളേയും പേരി ഭക്ഷണരീതിക എക്ടോപ്ലാസത്തിനടുത്തേക്കു് നിങ്ങളുകയും, ദഹനത്തിന്റെ ബാഹ്യാവരണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അനിശ്ചിതമായ സ്ഥാഠത്തു് വെച്ചു് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ കമിയ്ക്കൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മലിനപദാർത്ഥം വിസർജിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗന്ധനം: നിവാസകേന്ദ്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലെ മോളികുളുക്കൾക്കിടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആണു്* അമീബ ഗന്ധനത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. അമീബയുടെ കോശത്തിൽ ഓക്സിജൻ മോളികുളുക്കൾ കുറയുമ്പോൾ, പുറമെ നിന്നുള്ള മോളികുളുക്കൾ കോശത്തിനുള്ളിലേക്കു് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയക്കു് വിസരണം (diffusion) എന്നു പറയാം. ഒരു പടലത്തിനു് (membrane) രണ്ടു് വശത്തുമായി, രണ്ടു് ലായനികൾ (solutions) ഉണ്ടെന്നു് വെക്കുക. അവയിൽ ഒന്നിൽ, മറ്റൊരു ലായനിയെ അപേക്ഷിച്ചു്, ഒരു തരം മോളികുളുക്കൾ അധികമായി നില്ക്കുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങിനെ ആണെങ്കിൽ അധികമായി നില്ക്കുന്ന ലായനിയിൽ നിന്നു് മറ്റൊരുതേക്കു് മോളികുളുക്കൾ പ്രവഹിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. രണ്ടു് ലായനിയിലും, മോളികുളുക്കൾ സമതുലനാവസ്ഥ (state of equilibrium) പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ ഈ പ്രവണത നില നില്ക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള, മോളികുളുലാർ പ്രവാഹത്തിന്നാണു് വിസരണം എന്നു പറയുന്നതു്. അമീബയുടെ കാര്യത്തിൽ, കോശാവരണത്തെ ഒരു പടലമായും, പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ ഒരു ലായനിയായും വിവക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രതിഭാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമുണ്ടാവില്ല. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ അപേക്ഷിച്ചു്, നിവാസ സ്ഥലത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ മോളികുളുക്കൾ അധികമായി നില്ക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ, നിവാസസ്ഥലത്തിലെ ജലത്തിൽ നിന്നു് ഓക്സിജൻ

*H₂O എന്ന മോളികുളിലെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അല്ല ജലത്തിൽവിളിനമായ ഓക്സിജനാണു് അമീബ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.




ചിത്രം. 18. അമീബയിൽ ശ്വസനം നടക്കുന്നവിധം

1. മാധ്യമം. 2. ദേഹഭിത്തി. 3. സൈറോപ്ലാസം.
4. ന്യൂക്ലിയസ്.

മോളികുലുകൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് കൂടുമ്പോൾ കോശാവരണത്തിലൂടെ അത് പുറത്തോട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു.

വിസർജനം: അമീബയുടെ കോശത്തിൽ ഉപാപചയം (metabolism) നടക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന അപചയ (katabolic) വസ്തു അഥവാ വിസർജ്യവസ്തു അമോണിയയാണ്. അമോണിയ, വെള്ളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ വിലേയം (soluble) ആയതുകൊണ്ട്, ദ്രുതഗതിയിൽ കോശത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിസരണം വഴി നിർമാർജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഓസ്മോസന ക്രമീകരണം (Osmoregulation): രണ്ട് ലായനികൾ, ഒരു പടലത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളികുലുകളുടെ ഏകീകരണത്തിലേക്ക് അനുസരിച്ച് അവ അങ്ങമിങ്ങം വിസരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ. രണ്ട് ലായനികൾ വ്യത്യസ്തസാന്ദ്രതയിലുള്ളവയാണെന്നും, പടലം ലായനികളിലെ ചില പ്രത്യേക മോളികുലുകളെ മാത്രം വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നും കരുതുക. ഉദാഹരണമായി പടലത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് 50 ശതമാനം സാന്ദ്രതയുള്ള 'എ' എന്ന ഒരു പഞ്ചസാര ലായനിയും, മറുഭാഗത്ത് 5 ശതമാനം സാന്ദ്രതയുള്ള 'ബി' എന്ന ഒരു പഞ്ചസാര ലായനിയും ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. പടലം, വെള്ളത്തിന്റെ മോളികുലുകളെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. ഈ ലായനികളിലെ ജലാംശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മോളികുലുകൾ അധികമായി നില്ക്കുന്നത് 'ബി' യിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട്, വെള്ളത്തിന്റെ മോളികുലുകൾ 'ബി'



ചിത്രം. 19. ഓസ്മോസിസ് ക്രമീകരണം അമീബയിൽ.

യിൽ നിന്ന് 'എ' യിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. (പഞ്ചസാര മോളികുളികൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ 'എ' യിൽ നിന്ന് 'ബി' യിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുവാൻ പ്രവണത കാണിക്കും; പക്ഷേ അവയ്ക്ക് പടലത്തിലൂടെ മറ്റുപുറത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല). ഇക്കാരണത്താൽ, 'എ' യിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മോളികുളികൾ കൂടുന്നു; അഥവാ ലായനിയുടെ സാന്ദ്രത കറയുന്നു. ജലാംശത്തിന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവാഹത്തെയാണ് ഓസ്മോസിക് പ്രവാഹം (osmotic flow) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അമീബയിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രവാഹം സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അമീബയുടെ കോശത്തിലെ പ്രോട്ടോപ്ലാസവും, ആ ജീവി നിവസിക്കുന്ന ജലവും, വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയിലുള്ള രണ്ട് ലായനികളാണെന്നും, അവയെ വേർപെടുത്തി നിർത്തുന്നത് കോശാവരണം എന്ന പടലമാണെന്നും, ഓക്സൈഡിൽ ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ ധാരാളം ജലാംശമുണ്ട്; അതുപോലെ പലതരം വിദ്രവ്യങ്ങളും (solutes). അമീബ ജീവിക്കുന്ന ശുദ്ധജലത്തിൽ പൊതുവെ വിദ്രവ്യങ്ങൾ നന്നേ കുറവായിരിക്കും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അമീബ നിവസിക്കുന്ന ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, പ്രോട്ടോപ്ലാസം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു ലായനിയാണ്. അതുകൊണ്ട്, അമീബയുടെ ശരീരകോശത്തിലേക്ക് ഒരു ഓസ്മോസിക് പ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങിനെ പ്രവഹിക്കുന്ന ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ അമീബ ചിർത്തു വിർത്തു വരും; കോശത്തിലെ ഉപാപചയം അപകടത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലെ ജലാംശം ക്രമീകരിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എത്ര വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ, അത്ര തന്നെ വെള്ളം

പുറത്തേക്ക് ഷുദ്ധയെടുത്ത് ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരം ക്രമീകരണത്തിനാണ് ഓസ്മോസനക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അമീബയിൽ ഇത്തരം ക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് സംക്രംചനശീലാരികതികൾ മുഖേനയാണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലെ ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ, അധികപ്പരായി വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മോളികുറ്റുകൾ ഈ രീതികയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. (ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം, വികസപരരീതികയിലേക്ക് ജലാംശത്തെ ചാനുന്നതിൽ ഗോർഗിബോഡികൾ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്) അങ്ങിനെ സംക്രംചനശീലാരികതിക വലുതാവുകയും, ക്രമേണ കോശാവരണത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ച് രീതിക പൊട്ടുകയും, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലം പുറം തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ ജലമോളികുറ്റുകളുടെ ഒരു ധാര (current) തന്നെ ഉദ്ദിപിപ്പിക്കുകയും, അതിനെ ചൈതന്യമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


പ്രവാഹധാരയിൽ, പലപ്പോഴും വിഭേയപദാർത്ഥങ്ങളും വലിച്ചിടക്കപ്പെടാറുണ്ട്; ജലാംശത്തോടൊപ്പം ഇവയും ബഹിർഗമിക്കാറുണ്ട്. ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിസർജ്യവസ്തുക്കളാണെന്ന ധാരണയിൽ, പലപ്പോഴും, സംക്രംചനശീലാരികതികക്ക് വിസർജനപ്രവർത്തനമുള്ളതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്.

പ്രത്യുൽപ്പാദനം (reproduction): അമീബയിൽ അലൈംഗിക പ്രജനനം (asexual reproduction) മാത്രമേ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അതായത്, അവ ഇണമേരാതെ തന്നെ പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്തുന്നു. പ്രജനനം രണ്ടുതരത്തിൽ നടത്തപ്പെടാറുണ്ട്. ഒന്ന്, ദ്വിവിഭജനം (binary fission) രണ്ട്, ബഹുവിഭജനം (multiple fission). ഇവയിൽ ആദ്യത്തേത് അനുകൂലകാലാവസ്ഥയിൽ—വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ—നടക്കുന്നു; രണ്ടാമത്തേത് പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയിലും; അതായത്, വരൾച്ച ബാധിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം ദുർലഭമാകുമ്പോഴും.

(a) **ദ്വിവിഭജനം:** പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ അമീബയിൽ ദ്വിവിഭജനത്തിന്റെ ആദ്യലക്ഷണമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, കോശകേന്ദ്രത്തിന്റെ നീളലാണ്. (ഈ ജീവിയിൽ ക്രമഭംഗം (mitosis) നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ വെച്ചാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ലിൻഡിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് നീളുന്നത്.) ന്യൂക്ലിയസ് നീളുന്നതോടെ അതിന്റെ മധ്യഭാഗം കൃശമാകുകയും പിന്നീട് രണ്ടായി വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ സൈറോപ്ലാസവും രണ്ടായി പിളരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അമീബാകോശം രണ്ടായിത്തീരുന്നു.*


(b) **ബഹുവിഭജനം:** നിവാസസ്ഥലത്ത് വെള്ളം വരുന്നതോടെ, അഥവാ ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂല സ്ഥിതി വിശേഷം സംജാതമാകുന്നതോടെ, അമീബയുടെ കോശത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചില സ്രാവങ്ങൾ (secretions) കോശാവരണത്തെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബാഹ്യചർമ്മം സൃഷ്ടി

*പ്രോട്ടോസോവയിൽ നടക്കുന്ന വിഭജനം എമൈറ്റോസിസ് ആണെന്നായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ധാരണ. പക്ഷേ അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നടക്കുന്ന മൈറ്റോസിസ് ആണെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അഭിപ്രായം.



ചിത്രം. 20. അമീബയുടെ പ്രത്യുൽപാദനം—ഭിവിഭജനത്തിലെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ.

കുന്നു. ഈ ബാഹ്യചർമ്മത്തെ 'സിസ്റ്റ്' ഭിത്തി (cyst wall) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ചർമ്മം പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അമീബയുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് അമീബയുടെ കോശകേന്ദ്രം തുടർച്ചയായുള്ള മൈറ്റോസിസ് മുഖേന അനേകം ചെറുഖണ്ഡങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന്, സൈറോപ്ലാസവും തുണ്ടുകൂടാവും. ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിനെയും ആവരണം ചെയ്യുകൊണ്ട് ഓരോ കണ്ണും സൈറോപ്ലാസവും ഉണ്ടാകും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന അമീബ അനേകം



ചിത്രം. 21. അമീബയുടെ പ്രത്യുല്പാദനം—ബഹുവിഭജനത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ.


ചെറുചെറുകോശങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. സിസ്റ്റ്, കാരാരിൽ പറന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താലോ, അനുകൂല കാലാവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ, സിസ്റ്റ് ചർമ്മം വിള്ളുകയും അതിലൂടെ ചെറുകോശങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയിലെ ഓരോ കോശവും, ഓരോ അമീബയായി വളരുന്നു. ഇങ്ങിനെ, ബഹുവിഭജനത്തിൽ, ഒരു അമീബയിൽനിന്ന് നിരവധി അമീബകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. (സിസ്റ്റിനുള്ളിൽവച്ച് ബഹുവിഭജനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്.)

അമീബയുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിലെ ഒരു സവിശേഷത ശ്രദ്ധേയമാണ്. മൂല കോശത്തിലെ ഒരംശം തലമുറകളായി നിലനിന്നു പോരുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ്, അമീബയെ ഒരു ചിരഞ്ജീവിയാക്കി ചിലർ ഗണിച്ച് വന്നത്. ആകൃതിയിലും ഘടനയിലും വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഏകകോശജീവികളുണ്ട്. ചലനത്തിനായി അവയുപയോഗിക്കുന്ന കോശാംഗ (organelle)ത്തിന്റെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ച്, പ്രോട്ടോസോവയെ നാല് ക്ലാസ്സായി വിഭജിക്കാം.

- ക്ലാസ്സ് 1 റൈസോപോഡ അഥവാ സാർക്കോഡൈന കപടപാദമുള്ള ഏകകോശജീവികൾ
- ക്ലാസ്സ് 2 ഫ്ലാജെല്ലേറ്റാ അഥവാ മാസ്റ്റിഗോമോറ നാരപോലുള്ള ഫ്ലാജെല്ലം ഉള്ള ഏക കോശജീവികൾ
- ക്ലാസ്സ് 3 സ്പോറോസോവ ചലനത്തിന് പ്രത്യേക കോശാംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഏകകോശജീവികൾ. ഇവയെല്ലാം തന്നെ പരാജീവി (parasite) കളാണ്.
- ക്ലാസ്സ് 4 സിലിയാമോറ സിലിയം എന്ന ചെറുരോമങ്ങളാൽ ആവൃതമായ ഏകകോശജീവികൾ.

വർഗം 1 റൈസോപാഡ

ഈ വർഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് പ്രകൃതമായി വിവരിച്ച അമീബ. അമീബയുടെ ഒരു ചാർച്ചക്കാരനാണ് മനുഷ്യന്റെ കടലിലെ ഒരു അന്തേവാസിയായ എൻമീബ ഹിസ്റ്റാലിറ്റിക്ക. അമീബിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ പരാജീവി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഇതിന്റെ ഒരു ചെറുവിവ




ചിത്രം. 22. എൻറമീബ ഹിസ്റ്റോലിറിക്ക

1. സാധാരണ രൂപം. 4-6. സ്‌പോർ രൂപത്തിലൂടെയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനം.

രണം താഴെ ചേർക്കുന്നു. ശാരീരരൂപം അമീബയുടേതിനോടു വളരെ സദൃശമാണ്. സംക്രമണശീലാധിപതിക ഇല്ലെന്നാണു്. (നിവാസസ്ഥലം പ്രോട്ടോപ്ലാസം തന്നെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു്, ഇവിടെ ഓസ്മോസന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നില്ല; സംക്രമണശീലാധിപതിക ആവശ്യവുമില്ല.) കോശത്തിന്റെ വ്യാസം ഏതാണു് 0.6 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഭക്ഷണാധിപതികകളിൽ മനുഷ്യന്റെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ (red blood corpuscles) അടങ്ങിയതായി കാണാം. ഈ പരജീവി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ കടലിന്റെ ഉൾത്തൊലിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ കടലിലെ ചെറുരക്തധമനികൾ അന്തഃവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ധമനികൾ അവിടവിടെ പൊട്ടുന്നതോടെ രക്തം കടലിലേക്കു് കിനിയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങിനെ കിനിയുന്ന രക്തത്തിലെ, രക്താണുക്കളെയാണു് എൻറമീബ ഭക്ഷിക്കുന്നതു്. അമീബിയാസ് എന്ന രോഗത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വയറിളക്കത്തിനും (amoebic dysentery) മലത്തിൽ രക്തം കലരുന്നതിനും കാരണം ഇതാണു്. ഇന്ത്യയിൽ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണു് അമീബിയാസിസ്സ്. ഈ രോഗം തക്കസമയത്തു് ചികിത്സിച്ച് എൻറമീബയെ ഉൾമലനാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവ ക്രമേണ യകൃത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു് അവിടെ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.

കടലിൽ വച്ച് എൻറമീബ പെരുകുന്നതു് ദ്രവിഭിജ്ജനം വഴിയാണു്. ഒരു പോഷാദ (host)ത്തിൽ നിന്നു് മറ്റൊരാളവനിലേക്കു് ഇതു് പകരുന്നതു് സിസ്റ്റ്



ചിത്രം. 23. മറ്റു പ്രോട്ടോസോവകൾ.


1. റോഡിയോലേറിയ. 2-3 ഫൊറാമിനിഫെറ.

രൂപത്തിലാണ്. അമീബയെപ്പോലെ, സിസ്റ്റ് ചർമം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവു ഈ പാജീവികളുണ്ട്. സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ വച്ച് കോശകേന്ദ്രം രണ്ടുപ്രാവശ്യം വിഭജിച്ചു നാലായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള നാലു കോശകേന്ദ്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ സിസ്റ്റ് പോഷദത്തിന്റെ മലത്തോടൊപ്പം പുറത്തുറങ്ങുന്നു. മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള സംദൂഷണം (contamination) വഴി, സിസ്റ്റം കർ പുതിയ പോഷദത്തിന്റെ കടലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് സിസ്റ്റ് ചർമം വിള്ളുകയും, അതിലടങ്ങിയ നാലു ചെറു എൻറമീബ കോശങ്ങൾ പുറത്തു ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതേ വർഗത്തിൽ പെട്ടവയാണ് റോഡിയോലേറിയ, ഫൊറാമിനിഫെറ എന്ന പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന സമുദ്രപ്ലവകജീവികൾ (marine planktons). റോഡിയോലേറിയ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ജീവികൾക്ക് സിലിക്ക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കവച (shell)ങ്ങളുണ്ട്; ഫൊറാമിനിഫെറക്ക് കാൽസിയം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കവചങ്ങളും. ഇവ ചത്തൊട്ടുണ്ടുവാൻ കവചത്തിന്റെ കനം കാരണം സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് കീഴോട്ടു, സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് പൊഴിയുന്നു. കാലാനുസൃതമായി, ഇവ ഊറിക്കൂടി സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു സ്തരം തന്നെ സംജാതമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള സമുദ്രതലങ്ങൾ എണ്ണു വന്നെത്തിന്ന് ഉത്തമങ്ങളാണ് എന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വർഗം 2 ഫ്ലാജെല്ലാ

ഈ വർഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രകൃപമാണ് ട്രൈപനോസോമ. ഇത് മനുഷ്യരക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാജീവിയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉറക്കുവാഗം (sleeping sickness) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാരകരോഗത്തിന് ഫേതു ട്രൈപനോസോമ ആണ്. രണ്ടുഗ്രൂപ്പ്. കൂന്തു, മെലിഞ്ഞു. വീളത്തിലുള്ളതാണ് ശരീരകോശം. നീളം ഏകദേശം 0.025 മില്ലിമീറ്റർ വരും. കോശം പെരിപ്ലാസ്മാറ്റ എന്ന ചർമത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ടതാണ്. കോശത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിലായി അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ മറ്റുള്ള ചെറു



ചിത്രം. 24. ട്രൈപനോസോമ അനുദൈർഘ്യവിഭജനത്തിലൂടെ ജന്തു രണ്ടായിത്തീരുന്നു. 1. വിഭജിക്കുന്നതിന് മുൻപ്. 2-3വിഭജനത്തിന്റെ രണ്ടു ദശകൾ.

കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ട്രോഫോന്യൂക്ലിയസ്സ് എന്ന വിളിക്കാറുണ്ട്. കോശത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള അഗ്രത്തിനടുത്തായി തരിരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെറു കോശകേന്ദ്രമുണ്ട്. ഇതിന്ന് കൈനെറോന്യൂക്ലിയസ്സ് എന്നാണ് പേര്. കൈനെറോന്യൂക്ലിയസിന് തൊട്ട് മുൻപിൽ മറ്റൊരു തരിരൂപത്തിലുള്ള കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ കേന്ദ്രത്തെ ബ്ലൈഫരോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ബേസൽ ഗ്രാനൂൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൈനെറോന്യൂക്ലിയസ്സിനേയും, ബ്ലൈഫരോപ്ലാസ്റ്റിനേയും ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പോലുള്ള ഒരു കോശാംഗമുണ്ട്. ഇതിനെ റൈസോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ബ്ലൈഫരോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച്, കോശത്തിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവിടെയുള്ള പെരിപ്ലാസ്മാമായി ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നെട്ടനീളത്തിൽ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു മുന്നോട്ട് ചെന്നു, മുൻ അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് തള്ളിനില്ക്കുന്ന ഒരു നാൽകാണ്. ഇതിനെ ഫ്ലാജെല്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫ്ലാജെല്ലത്തെ പെരിപ്ലാസ്റ്റമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പടലം-ഇത് പെരിപ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി വേണം കരുതുവാൻ- ഉണ്ട്. ഈ പടലം, ഫ്ലാജെല്ലത്തിന്റെ കിടപ്പനുസരിച്ച്, വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ പടലത്തെ തരം





ഗിത പടലം (undulating membrane) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഫ്ളാജെല്ലം ചലിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊത്തു തരംഗിതപടലവും ചലിക്കുന്നു. ഈ ചലനതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്. ഫ്ളാജെല്ലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൈനെറോനാക്റ്റിയസ് ആണ്.

മനുഷ്യരക്തത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ഒരു കോശത്തിന് ഓസോസന പ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല; കാരണം പോഷഭത്തിന്റെ പ്ളാസ്മയും പരജീവിയുടെ പ്രോട്ടോപ്ളാസവും ഏകദേശം സമസാന്ദ്രതയുള്ള ലായനികളായിട്ടാണല്ലോ നിലകൊള്ളുക. അതുകൊണ്ട് പരജീവിയിൽ സംകം ചന്ദ്രീലരികത്രിക കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്ഷണം പ്ളാസ്മയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര (sugar)കളാണ്. വിസരണം വഴിയാണ് അവ ജീവിയിലേക്ക് അവശോഷിക്കപ്പെടുന്നത് (absorbed). മനുഷ്യരക്തത്തിൽ വെച്ച്, ഇതിന്റെ ദ്രവിഭജനം നടക്കുന്നു. ട്രൈപനോസോമയിൽ ദ്രവിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ, ജീവി നെട്ടുകെ (longitudinally) യാണ് പിളരുക. ആദ്യമായി ബ്ലൈഫറോപ്ലാസ്റ്റ് രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു; പിന്നീട് കൈനെറോനാക്റ്റിയസ്സും. ഇതിനുശേഷം, ഫ്ളാജെല്ലം നെട്ടുകെ രണ്ടായി പിളരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ട്രോഫോനാക്റ്റിയസ്സും വിഭജിക്കുന്നു. ഇത് കഴിയുന്നതോടെ, കോശം മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് എന്ന ദിശ (direction) യിൽ നെട്ടുകെ രണ്ടായി പിളരുന്നു.

ട്രൈപനോസോമയെ പകർത്തുന്നത് ട്സി ട്സി ഫ്ളൈ (tse tse fly) എന്ന നാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈച്ചയാണ് (ജിനസ്സിന്റെപേര് ഗ്ലോസൈന). ഈ ഈച്ച മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ, രക്തത്തോടൊപ്പം പരജീവിയും ഈച്ചയുടെ ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെനിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പരജീവി ഒട്ടവിൽ ഈച്ചയുടെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി (salivary gland)കളിലെത്തുന്നു. ഉമിനീർഗ്രന്ഥികളിൽ വെച്ച് അത് പെരുങ്കുകയും, ചില ദശകളിലൂടെ വളന്ന് പൂർണ്ണവികാസം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈച്ച മരൊരാളെ കുടിക്കുമ്പോൾ, പരജീവി ഉമിനീരിലൂടെ പുതിയ പോഷഭത്തിന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു.

ആഫ്രിക്കയിലെ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് നിദാനമായി രണ്ട് സ്ത്രീഷിസുകളാണ് ഉള്ളത്—ട്രൈ. ഗാംബിയൻസ്, ട്രൈ. റൊഡിസിയൻസ് എന്നിവ. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീഷിസിനെ ഗ്ലോസൈന പാൽപാലിസ് എന്ന ഈച്ചയും രണ്ടാമത്തേതിനെ ഗ്ലോ. മോർസിറാൻസ് എന്ന ഈച്ചയുമാണ് പരത്തുന്നത്. തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചാഗാസ് രോഗം എന്ന ട്രൈപനോസോമിയാസിസ് രോഗത്തിന് കാരണകൃതൻ ട്രൈപനോസോമയുടെ ഒരു ബന്ധുവായ ഷിസോട്രൈപനം ക്രൂസൈ എന്ന പരജീവിയാണ്. ഇവയെ പരത്തുന്നത് ട്രയാട്ടോമ മെജിസ്റ്റ എന്ന ഷട്പദമാകുന്നു.

മറ്റു സസ്തനജീവികളുടെ രക്തത്തിലും ട്രൈപനോസോമയെ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കതിരുകളുടെ രക്തത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്രൈ. എവാൻസി, ട്രൈ. ഇക്വിപെർഡം, കനകാലികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്രൈ. ബ്രൂസൈ, എലിക



ചിത്രം. 25. 200 ഫ്ലാജല്ലേറ്റുകൾ.

1. നോക്ടിലൂക്ക 2. ട്രൈകോമോണാസ് 3. തിയാർഡിയ ഇൻറർസ്റ്റിനാലിസ് 4. ട്രൈക്കോനിംഫ

ഉൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈ. ഡ്രിസി എന്നീ സ്ലിഷിസുകൾ. ഇവയിൽ ടൈ. എവാൻ സിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കതിരകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സുരാരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഈ വർഗത്തിലെ മാറ്റം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജൈവദീപ്തി (bioluminescence) പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്ലവകജീവിയാൽ നോക്ടിലൂക്കയും മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ടൈക്കോമോണാസ്, ഗിയാർഡിയ എന്നീ പരാജീവികളും. ചിതലിന്റെ ആമാശയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ടൈക്കോനീഫെ എന്ന സഹജീവി (Symbiont), വേദാന്തദാഹരണമാണ്. നോക്ടിലൂക്കയുടെ കോശത്തിന് ചില ബാഹ്യസ്രവങ്ങൾ (ectocrines) പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ സ്രവങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമാണ്, അതിനാൽ അവ നോക്ടിലൂക്കെ ധാരാളമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയുന്നതായി കാണാം. മനുഷ്യയോനികളിൽ നിവസിച്ചു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു പരാജീവിയാണ് ടൈക്കോമോണാസ് വജൈനാലിസ്. ഗിയാർഡിയ ഇൻറസ്റ്റൈനാലിസ് ചെറുകടലിൽ നിവസിക്കുന്നു. ഗ്രഹണി എന്ന രോഗവുമായി ഈ പരാജീവിക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. ചിതലിന്റെ ആമാശയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ടൈക്കോനീഫെ ഒരു ഉപകാരിയാണ്. ആതിഥേയനായ ചിതലിന് സ്വന്തമായി ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സെല്ലുലോസ് മുഴുവൻ പാകപ്പെടുത്തി ദഹനവിധേയമാക്കുന്നത് ഈ സഹജീവിയുടെ എൻസൈമുകളാണ്. ടൈക്കോനീഫെയുടെ സഹായമില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ. ചിതലിന് മരം, കടലാസ് മുതലായ ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തരപ്പെട്ട മാധ്യമമില്ല.

വർഗം 3. സ്പോറോസോവാ


ഈ ക്ലാസ്സിലെ കപ്രസിഡി നേടിയ ഒരു പ്രത്യേകമാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പരാജീവി. മനുഷ്യാശ്മിയെ പലപ്പോഴും ഹനിക്കുന്ന മലേറിയ രോഗത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ജീവിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് ഈ പരാജീവികളുടെ നിവാസകേന്ദ്രം. ഇവ രക്താണുക്കൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് വളർന്നു പെരുകി, രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിച്ചും, രക്തത്തെത്തന്നെ ദുഷിപ്പിച്ചും ആണ്, പോഷഭത്തിൽ മലേറിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു പോഷഭത്തിലേക്ക് പരാജീവിയെ സംക്രമിപ്പിക്കുന്നത് കൊതുക്കളാണ്.

മലേറിയക്ക് കാരണകൃതങ്ങളായി, മൂന്ന് സ്ലിഷിസുകളാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്—പ്ലാ. വൈവാക്സ്, പ്ലാ. മലേറിയേ, പ്ലാ. ഫാൾസിപാരം എന്നിവ, രോഗത്തിനുള്ളതാവാനുള്ള സ്ലിഷിസ് അനുസരിച്ച്, ലക്ഷണഭേദങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത ഇടവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അത്യുഗ്രമായ വിറയൽപ്പനിയാണ് പ്ലാ. മലേറിയയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം. പ്ലാ. വൈവാക്സ് ആണ് രോഗത്തിന് നിദാനമെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പനി ഉണ്ടാകുന്നു; പ്ലാ. മലേറിയേ ആണെങ്കിൽ 72 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പനി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; പ്ലാ. ഫാൾസിപാരം ആണെങ്കിൽ ഇടന്തരം 24 മണിക്കൂറിനും 48 മണിക്കൂറിന് ഉള്ളിടവായിരിക്കും.

പ്ലാസ്മോഡിയം: മനുഷ്യരക്തത്തിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടാറുവരും കൂടുന്ന ഒരു ചെറുകോശത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഉണ്ടാവുക. കോശത്തിന്റെ ഏകദേശം നട്ടുവിലായി ഒരു കോശകേന്ദ്രവും ഉണ്ടാകും. ഈ കോശരൂപത്തിനെ മിറ്റോസസാഭവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മിറ്റോസോഭവം ക്രമേണ ചുവന്ന രക്താണുവിൽ തുളച്ചു കയറുകയും അവിടെയുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ നുകനുകൊണ്ട് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ദശയെ ട്രോഫോസൈറ്റൈവർ ദശ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പരജീവി വലുതായി ഒരു അമീബയുടെ രൂപം കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ദശക്ക് അമീബുല എന്നാണ് പേര്. അമീബുല വലുതാവുന്നതോടെ, അതിനുള്ളിൽ ഒരു രിക്തിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. രിക്തിക വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് രക്താണുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരജീവികോശത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കൂടുന്നു. ഈ ദശയിൽ, പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് ഒരു മോതിരത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഉള്ളത്. രിക്തികയും, രിക്തികയെ ആവരണം ചെയ്ത് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന സൈറോപ്ലാസ്മമാണ് ഈ രൂപസാമ്യത്തിന് കാരണം. സൈറോപ്ലാസ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി കോശകേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ മോതിരരൂപത്തിലുള്ള ദശക്ക് സിഗ്നറ്റ്-റിങ്ങ് ദശ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ദശയുടെ അവസാനത്തിൽ, പരജീവി രക്താണുവിന്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതായി കാണാം. ക്രമേണ രിക്തിക ചുരുങ്ങുകയും, അതിന്റെ സ്ഥാനം സൈറോപ്ലാസ്മം കൈയേറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് സൈറോപ്ലാസ്മത്തിൽ നിറയെ കറുത്ത തരികൾ കാണപ്പെടുന്നു. പരജീവിയാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന അവശിഷ്ട വിസർജന വസ്തുക്കളാണ് ഇവ. ഈ തരികൾക്ക് ഹിമോസോയിൻ തരികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കോശകേന്ദ്രം നിരവധി കഷ്ണങ്ങളായി ഖണ്ഡിക്കുകയും, ഈ കോശകേന്ദ്രഖണ്ഡങ്ങൾ കോശത്തിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരവധി കോശകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ഈ ദശക്ക് ഷൈസോണ്ട് ദശ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ക്രമേണ, ഷൈസോണ്ട് വിഭജിക്കുന്നു. എത്ര കോശകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും കഷ്ണങ്ങളായി സൈറോപ്ലാസ്മവും വിഭജിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ, ബഹുവിഭജനം മുഖേന നിരവധി കോശങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. ഈ ചെറുകോശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഒരു പൂവിന്റെ ഇതളുകളുടെ ചിട്ടയിൽ രക്താണുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം; പൂവിന്റെ ഏകദേശം മധ്യത്തിലായി ഹിമോസോയിൻ തരികളും. ഈ ദശക്ക് റോസറ്റ് ദശ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. താമസിയാതെ രക്താണു പൊട്ടുകയും, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചെറുകോശങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചെറുകോശങ്ങൾക്ക് മിറ്റോസോഭവം എന്ന് പറയും. പ്ലാ. വൈവാക്സിൽ ഒരു ബഹുവിഭജനത്തിൽ 12 മുതൽ 24 വരെ മിറ്റോസോഭവം ഉൾപ്പെടുന്നു; പ്ലാ. മലേരിയേയിൽ 6 മുതൽ 12 വരെയും പ്ലാ. ഫാൾസിപാരത്തിൽ 8 മുതൽ 18 വരെയും. മിറ്റോസോഭവം പൂർണ്ണ വഴനതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിമോസോയിൻ തരികളും രക്ത



ഹൈലം പ്രോട്ടോസോവ



ചിത്രം. 26. പ്ലാസ്മോഡിയം—ജീവനചക്രം.

ത്തിൽ കലരുന്നു. ഈ തരീകർ വിഷാംശം കലർന്നവയാകയാൽ പനി മുതലായ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ഓരോ മീരോസോവൈറ്റും പിന്നീട് ഓരോ പുതിയ രക്താണുവിൽ നശിച്ചു കയറുകയും, മേൽ വിവരിച്ച ജീവിതരീതി കൈക്കൊണ്ട് ബഹുവിഭജനം നടത്തി പെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്താണുവിൽ വെച്ചു നടക്കുന്ന ഈ ജീവനചക്രത്തിന് ഗോൾഗിയുടെ ചക്രം (cycle of golgi) അഥവാ അന്താരക്താണു ചക്രം (endoerythrocytic cycle) എന്നാണ് പേര്. പ്ലാ. വൈവാക്സിൽ ഈ ജീവനചക്രം 48 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പനിയുടെ ഇടനേഴം 48 മണിക്കൂറായിത്തീരുന്നു; പ്ലാ. മലേറിയേയിൽ സമയം 72 മണിക്കൂറാണ്, അതുകൊണ്ട് പനി 72 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു.

ഈ ജീവനചക്രം പ്രതിബന്ധമൊന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ, കാലാന്തരത്തിൽ രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം പെരുക്കുകയും, രക്താണുക്കൾ പാടെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും. രക്താണുക്കൾ കറയുന്നതോടെ രോഗിക്ക് വിളർച്ച ബാധിക്കുകയും അതുമൂലം ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യേക്കാം. പോഷദത്തിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി, രക്തത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരജീവിയും നശിക്കാനിടയുണ്ടല്ലോ. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ, പ്ലാസ്മോഡിയം ലൈംഗികപ്രജനനം ഉൾക്കൊണ്ട് മരൊന്ത ജീവനചക്രം കൂടി ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നടക്കുന്നത് കൊതുകിന്റെ ആമാശയത്തിനകത്താണ്.

അന്താരക്താണചക്രത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില മീരോസോ വൈറുകൾ, രണ്ടു പ്രത്യുക്തരും കോശങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ മീരോസോവൈറുകൾ രക്താണക്കളിൽ കയറി വലുതാവുവാൻ അവയിൽ രീതിക കാണ്മപ്പെടുന്നില്ല; അവ വലുതായി പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ ബഹുവിഭജനത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യുക്തരും കോശങ്ങളു ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു താം ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റുകളുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ വലിയ ഒരു കോശകേന്ദ്രവും തരിയില്ലാത്ത സ്ഫടികസമാനമായ സൈറ്റോപ്ലാസവും കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയെ മൈട്രോഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് അഥവാ ആൺ ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറ്റോ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് കോശങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു കോശകേന്ദ്രവും തരി നിറഞ്ഞ സൈറ്റോപ്ലാസവും. ആണ് ഉള്ളത്. ഇവയെ മാട്രോഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് അഥവാ പെൺ ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റുകൾക്ക് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കൊതുക്കിന്റെ ആമാശയത്തിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വളർന്ന് വിഭജനം നടത്താൻ കഴിവുള്ളൂ.

അനോഫെലിസ് എന്ന ജിനസിൽ പെട്ട കൊതുക്കളാണ് ഈ പരജീവിയെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് പകർത്തുന്നത്. ഈ കൊതുക്ക് ഒരു രോഗിയുടെ രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ രക്താണക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരജീവികളും കൊതുക്കിന്റെ ആമാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് രക്താണക്കൾ ഭവിക്കുകയും അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരജീവികൾ വിട്ടുമാചിതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പരജീവികളിൽ ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് ശേഷിലല്ലാത്ത എല്ലാ കോശങ്ങളും നശിക്കുന്നു; ഗാമെറ്റാറാസൈറ്റുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. മൈട്രോഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് ബഹുവിഭജനം വഴി അഞ്ചോ ആറോ ചെറുകോശങ്ങളായി തീരുന്നു. അഗ്രങ്ങൾ കൂർത്ത ഈ ചെറു ആൺകോശങ്ങൾക്ക് മൈട്രോഗാമേറ്റ് അഥവാ ലംപുഗാമിററ്റ് എന്നാണ് പേര്. ഉത്ഭവസമയത്തു ഈ ഗാമിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുക. പിന്നീട് അവ ഇഴഞ്ഞു നിങ്ങി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിടർത്തുന്നു. ഈ വേർപെടൽപ്രക്രിയയെ എക്സ്-ഫ്ളജെല്ലേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതേ സമയത്തു, മാട്രോഗാമെറ്റാറാസൈറ്റ് രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു—ഒരു വലിയ കോശവും ഒരു ചെറുകോശവും. ഇതിൽ വലിയ കോശമാണ് സൂലഗാമിററ് അഥവാ മാട്രോഗാമിററ് എന്ന സ്ത്രീബീജം ആയി പരിണമിക്കുക. ചെറിയ കോശത്തെ ധ്രുവീയകായം അഥവാ പോളാർ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ കോശം പിന്നീട് നശിച്ചു പോകുന്നു.

ആമാശയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഒരു പുംബീജം സ്ത്രീബീജത്തോടു ഇണ ചേർന്ന് സംയോജിക്കുകയും തൽഫലമായി സൈഗോട്ട് എന്ന കോശം ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബീജസംഗമത്തിന് യുഗ്മസംലയനം അഥവാ സിംഗമി എന്നു പറയുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ സൈഗോട്ടിന് ചലനവും സിദ്ധിക്കു

ന്നതോടെ, അതിനെ ഊകൈനിറു എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഊകൈനിറു ആമാശയകോശങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നശഞ്ഞു കയറി, ഈ അവയവത്തിന്റെ പുറം തൊലിക്ക് തൊട്ട് അടിയിലായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ഊകൈനിറു വലുതാകുകയും ഒരു പുറംതൊലി അഥവാ സിസ്റ്റ് ചർമം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സിസ്റ്റിൻ ഊ സിസ്റ്റ് എന്നു പറയുന്നു. സിസ്റ്റ് റൂൾ വളരുന്നതോടെ കൊതുകിന്റെ ആമാശയത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തു മുഴുകി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഒരു കൊതുകിന്റെ ആമാശയത്തിൽ ഇത്തരം അമ്പതു മുഴുകി വരെ കാണാം. ഈ മുഴുകി ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് റോണാർഡ് റോസ്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. കൊതുകിന്റെ ദേഹഗുഹ (body cavity) യിലുള്ള രക്തത്തിലേക്ക് ഈ മുഴുകി ഉന്തിനില്ക്കുന്ന വസ്തു ഓർക്കേഷെന്റേ. ഷട് പദങ്ങളിൽ, രക്തം ദേഹഗുഹയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുമല്ലോ. സിസ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് ബഹുവിഭജനം വഴി മെലിഞ്ഞു അഗ്രങ്ങൾ കൂർത്ത നിരവധി ചെറുകോശങ്ങൾ (ഒരു സിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 10,000 എന്ന തോതിൽ) ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് സ്റ്റോറോസോവൈറുകൾ എന്നു പറയും. സിസ്റ്റ് വിള്ളുന്നതോടുകൂടി, സ്റ്റോറോസോവൈറുകൾ കൊതുകിന്റെ രക്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. രക്തത്തിലൂടെ നിന്തി അവ, കൊതുകിന്റെ ഉമിനിർഗ്രന്ഥികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഉമിനിർഗ്രന്ഥികളിൽ തുളച്ചുകയറി അവ കൊതുകിന്റെ ഉമിനിറിലെത്തുന്നു. കൊതുകി മനുഷ്യരെ കടിക്കുമ്പോൾ സ്രവിക്കുന്ന ഉമിനിറിൽ കൂടി സ്റ്റോറോസോവൈറുകൾ മനുഷ്യരക്തത്തിലെത്തുന്നു. കൊതുകിന്റെ ഈ ജീവനചക്രത്തിന് റോസ്സിന്റെ ചക്രം എന്നു പറയാറുണ്ട്.

മനുഷ്യരക്തത്തിലെത്തിയ ഉടനെ സ്റ്റോറോസോവൈറുകൾ രക്താണുക്കളെ ആക്രമിക്കുകയല്ല, രക്തത്തിലെത്തിയശേഷം 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, പരജീവികോശങ്ങൾ തീരെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അവ രക്തം വഴി മനുഷ്യന്റെ യകൃത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും യകൃത്തിൽ കോശങ്ങളിൽ വെച്ച് ബഹുവിഭജനം നടത്തി പെരുങ്കകയും വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. യകൃത്തിൽ ആദ്യ മുതൽ എട്ടു വരെ ദിവസം കഴിച്ച് കൂടിയ ശേഷം, പെരുങ്കിയ സാധ്യതയുള്ളതോടെ പരജീവികോശങ്ങൾ രക്തത്തിൽ വിണ്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ ദശയിൽ അവയ്ക്ക് മീറ്റോസോവൈറുകളുടെ രൂപമാണ് ഉണ്ടാവുക. മീറ്റോസോവൈറുകൾ ഓരോന്നായി പുതിയ പോഷദത്തിന്റെ രക്താണുക്കളെ ആക്രമിക്കുകയും, മലേറിയ രോഗത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ യകൃത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ജീവനചക്രത്തിന് ബാഹ്യരക്താണുചക്രം (exoerythrocytic cycle) എന്നു പറയുന്നു.

രക്തത്തിലെ പരജീവികൾ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടോ സപാർജിതമായ പ്രതിരോധികൊണ്ടോ നശിക്കുകയാണെങ്കിൽ യകൃത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കഴിയുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ പരജീവിതലമുറ പുറത്തിറങ്ങുകയും, പുനഃപ്രതിഷ്ഠ സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണത്താലാണ് ശമിച്ച മലേറിയപ്പനി, കറച്ച കാലത്തിനു ശേഷം പുനരാവർത്തനം

ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നത്. പരജീവിയെ തീരെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യകൃത്തിലെ പരജീവികോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മലേറിയയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകൾക്കും യകൃത് കോശത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പരജീവികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല.

പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ ജീവനചക്രത്തിൽ രണ്ട് ആതിഥേയർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്; മനുഷ്യനും കൊതുകിനും. പാജീവിയുടെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് കൊതുകിൽ വെച്ചാണ് എന്ന വസ്തുതയെ ആധാരമാക്കി, കൊതുകിനെ സ്ഥിരം ആതിഥേയൻ ആയും മനുഷ്യനെ താൽക്കാലിക ആതിഥേയൻ ആയും കരുതുന്നതിൽ തെറ്റിയില്ല.


മലേറിയ രോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായി രണ്ട് ഉപാധികളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, മനുഷ്യനിൽ കണ്ടുവരുന്ന പാജീവികളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുക. ഇതിനായി ക്ലോറോക്വിൻ, പാലുഡ്രിൻ എന്നീ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ട്, രോഗാണുവാഹകരായ കൊതുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക. കീടനാശികളെപ്പറ്റി പൊതുവെ അറിവുള്ള ഇക്കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതില്ല.

പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട മറ്റു പാജീവികളാണ് ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ഉൽപാദനേന്ദ്രീയങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്ന മോണോസിസ്റ്റിസ്, പാരാ (ക്രൂ)കളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഗ്രെഗാറൈ മുതലിന്റെ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫുജേറിയ ട്രൈയായ്‌വേ എന്നിവ.

വർഗം 4. സിലിയോഫോറ

സിലിയോഫോറയുടെ ഒരു പ്രമുഖ പ്രരൂപമാണ് പാരമീസിയം. അഴുക്കുചാലുകളിലും കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ഈ ജീവിയെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ, ഏകദേശം ചെരുപ്പിന്റെ അടിഭാഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതും അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ആയ ഇത്തരം ജീവികളെ സുലഭമായി കാണാം.

രൂപവക്രതി: പാരമീസിയത്തിന് ആകൃതിയിൽ ചെരുപ്പിന്റെ അടിഭാഗത്തോടു സാമ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ശരീരത്തിന് 0.3 മില്ലിമീറ്റർ നീളം കാണാം. മുൻഭാഗം ഉരുണ്ടതും പിൻഭാഗം കൂർത്തതും ആയിരിക്കും. മുകൾവശം (dorsal side) ഉരുണ്ടും അടിവശം (ventral side) പരന്നും ഇരിക്കും. അടിഭാഗത്തു് ഫണൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചാൽ കാണാം. ഈ ഫണൽ മുന്നിൽ ഇടതു ഭാഗത്തു് നിന്ന് തുടങ്ങി, പിന്നോട്ടു് ചെല്ലുംതോറും വിതികുറഞ്ഞും വലതു വശത്തേയ്ക്കു് ചരിഞ്ഞും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ചാലിന് മുമ്പമണൽ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നോട്ടു് ചെല്ലുംതോറും മുമ്പമണൽ കോശത്തിനുള്ളിലോട്ടു് നീങ്ങുകയും, ഉൾഭാഗത്തു് ഒരു കഴലിന്റെ രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴൽ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ കോശഗുളം അഥവാ സൈറോഫാരിങ്ങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ദേഹമാസകലവും മുമ്പമണൽ, സൈറോഫാരിങ്ങ്സ് എന്നിവയും സിലിയങ്ങളാൽ ആവൃതമാണ്.



ചിത്രം. 27. പാരമീസിയം

1. മുട്ടജീവി. 2. പാരമീസിയയിൽനിന്നു ചലനം 3-4 ചലനദിശയിൽ സിലിയങ്ങളുടെ നീക്കം. 3 ഷോക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ സിലിയങ്ങൾ ഇരുവശത്തേക്കും നീങ്ങുന്നു. 4. ജീവി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ സിലിയങ്ങളുടെ നീക്കം.

ശരീരകോശത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുകൊണ്ടുള്ള ചർമത്തിന് പെല്ലി ക്കീർ എന്നാണ് പേര്. ഈ ആവരണത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തായി നിറവായി പരന്ന കഴികൾ കാണാം. ഇവ ഷഡ്ഭുജരൂപത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സമകോണീയങ്ങളോ ആയിരിക്കാം. ഇവക്കിടയിൽ കഴികളെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്ന ഉയർന്ന വരമ്പുകളുണ്ട്. കഴികളുടെ നടുക്കായി ഓരോ പോരുകളുണ്ട്. ഈ പോരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സിലിയങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഉതിർന്നിരിക്കുന്നത്. വരമ്പുകളിലും ചെറുചെറുസുഷിരങ്ങൾ കാണാം. ഇവ ട്രൈക്കോസിസ്റ്റംകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളുടെ ബാഹ്യഭാഗങ്ങളാണ്. ട്രൈക്കോസിസ്റ്റംകൾ അടിഭാഗം കൂത്ത് സഞ്ചികൾ പോലെ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇവ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രോമരൂപത്തിലുള്ള നാരുകൾ പുറത്തോട്ട് വിശ്കുന്നു. ഈ നാരുകളുടെ ഉപയോഗമെന്തെന്ന് തിട്ടമായി പറയുക വിഷമമാണ്. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവ പ്രതിരോധികളെ തളർത്തുവാൻ (ഹൈഡ്രയുടെ ദാശകോശിക പോലെ) ഉപയുക്തങ്ങളാണ്. മറ്റു ചിലരുടെ അനുമാനം, ജീവിയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിശ്ചലമായി നിർത്തുവാനുള്ള നങ്കൂരങ്ങളായി ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതേ.

പെല്ലിക്കിളിന് തൊട്ട് ഉള്ളിലായി എക്സോപ്ലാസവും, അതിനകത്ത് തരിമയമായ എൻഡോപ്ലാസവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കോശത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യത്തിലായി രണ്ട് കോശകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്ന് വലുതും വൃക്ക (kidney) യുടെ രൂപത്തിലുള്ളതുമാണ്; മറ്റേത് ചെറുതും ഒരു തരിയുടെ രൂപത്തിലുള്ളതും. ഇവയിൽ വലുതിനെ ഗുരുതൃക്ലീയസ് അഥവാ മാത്രോന്യൂക്ലീയസ് എന്നും, ചെറുതിനെ സൂക്ഷ്മതൃക്ലീയസ് അഥവാ മൈക്രോന്യൂക്ലീയസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

കോശത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് തരം റിക്തികകളുണ്ട്; ഭക്ഷണറിക്തികകളും, സംക്രമണശീലറിക്തികകളും. എൻഡോപ്ലാസത്തിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന സൈറോഫാരീഞ്ഞ്സിന്റെ തലപ്പത്തുവെച്ചാണ് ഭക്ഷണറിക്തികകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നത്. രൂപം കൊണ്ടശേഷം അവ സൈറോഫാരീഞ്ഞ്സിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട്, ജീവിയുടെ എൻഡോപ്ലാസത്തിൽ മുൻഭാഗത്തേക്കും, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പിൻഭാഗത്തേക്കും ഒരു നിശ്ചിത പഥത്തിലൂടെ പരിസഞ്ചരണം (circulation) ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിസഞ്ചരണത്തിനിടക്ക്, ഭക്ഷണറിക്തികയിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹിക്കുകയും, ദഹിച്ചവ കോശത്തിലേക്ക് അവശോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മലപദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ റിക്തിക പിന്നീട് പെല്ലിക്കിളിനടുത്തെത്തി ശരീരകോശത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് വച്ച് പൊട്ടി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഈ മലപദാർത്ഥത്തെ സൈറോപൈജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അമീബയിൽ ഇത്തരമൊരു നിശ്ചിത പോരമില്ലെന്നത് സ്മരണീയമാണ്.

പാരമിസിയത്തിൽ സാധാരണ രണ്ട് സംക്രമണറിക്തികകളാണ് കാണ

നന്ദി; ഒന്ന് മുൻഭാഗത്തും, മറോത്ത് പിൻഭാഗത്തും. ഇവയിൽ ഒന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മറോത്ത് ചെറുതായി നിലകൊള്ളുന്നത് കാണാം. ചെറിയ സാക്ഷാപരീക്ഷിക്കുക ചുറ്റും ഓസോസനജലത്തെ രീതികയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന കര ചാലുകൾ കാണാം. ഇവയെ രോഡിയേററിങ്ങ് കനാലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. രീതിക പൂർണ്ണവികാസം പ്രാപിച്ചാൽ, അത് പതുക്കെ പെല്ലിക്കിളിനട്ടത്തേക്ക് നിങ്ങളുകയും അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടി അന്തർഭാഗത്തെ പുറത്തുള്ള കയ്യും ചെയ്യുന്നു.

പാരമിസിയ ത്തിന്റെ എക്സക്യൂഷൻ, അമിബയുടെതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. നിരവധി കോശാംഗങ്ങളും ഒരു ആദിമ നാഡീവ്യൂഹം തന്നെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സിലിയം പുറപ്പെട്ടുന്നത് എക്സക്യൂഷൻസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇവ ഓരോന്നിന്റേയും ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു്, സിലിയത്തിന്റെ ചലനം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഓരോ തരീയുണ്ട്. ഇവയെ കൈനെറോസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൈനെറോസോമുകളെ അങ്ങുചിങ്ങു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാരുകളുടെ ഒരു വ്യൂഹം (network of fibrils) ഉണ്ട്. നാരുകൾക്ക് കൈനെറോസൈന്യ എന്ന് പറയുന്നു. കൈനെറോസോമുകളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൈനെറോസൈന്യകളുടെ ഈ വ്യൂഹത്തെയാണ് ആദിമ നാഡീവ്യൂഹം അഥവാ ന്യൂറോ മോട്ടോർ വ്യൂഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വ്യൂഹത്തിന്റെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് മോട്ടോറിയം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു നാഡീകേന്ദ്രമാണ്. ഈ കേന്ദ്രം സൈറോഫാരിങ്ങ്സിനടുത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സിലിയങ്ങളുടെ ക്രമീകൃതചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മോട്ടോറിയം എന്ന കേന്ദ്രം മുഖേനയാണ്. കൈനെറോസൈന്യയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ മരോരുതരം നാരുകൾകൂടി എക്സക്യൂഷൻസത്തിൽ കാണാം. നെട്ടുകെ കിടക്കുന്ന ഈ നാരുകൾക്ക് മാംസതന്തുക്കളെപ്പോലെ ചുരുങ്ങുവാനോ വികസിക്കുവാനോ കഴിവുണ്ട്. ഈ തന്തുക്കളെ മയോനീമുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് പാരമിസിയ ത്തിന്റെ ശരീരരൂപത്തിൽ ചെറുവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. മരോരുത കോശാംഗമായ ട്രൈക്കോസിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഇതിനു് മുമ്പ് പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ.

ചലനം: സിലിയങ്ങളുടെ സംഘടിതവും നിരന്തരവുമായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ജീവി ചലിക്കുന്നത്. ഓരോ സിലിയവും മുന്നിൽനിന്നു പിന്നോട്ടു് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. പിന്നിലോട്ടു് എത്തിയശേഷം, അവ ഓരോന്നും അയഞ്ഞ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു് തന്നെ ഇഴഞ്ഞു് വലിയുന്നു. മുമ്പിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും പിന്നോട്ടു് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിലാണ് ഓരോ സിലിയവും പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷേ, ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവ നേരെ പിന്നോട്ടല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തിനു് വികർണമായ ഒരു ദിശയിലാണ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ, ജീവി മുന്നോട്ടു് ചലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ, അതിന്റെ അക്ഷത്തിനു് ആപേക്ഷികമായി ഉരുളുകയും ചെയ്യുന്നു. സിലിയങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു സംഘടിതരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവ മന്ദമാതത്തിൽ അലമാല പോലെ ചാഞ്ചാടുന്ന നെൽക്കതിരുകളുടെ പ്രതീതിയാണ് ഉളവാ


ക്കുക. സിലിയങ്ങളുടെ സംഘടിതചലനത്തിലുള്ള ഈ താളലയത്തെ മറ്റൊരാളോട് താളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വസ്തു കൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുഖഘടനയിലെ സിലിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടി ജീവിയുടെ ചലനത്തിൽ കാണുന്ന ഉരുളലിൽ പങ്കുണ്ട്.

ഭക്ഷണരീതിയും ദ്വാനവും: പാരമിസിയം ഭക്ഷണം തേടിപ്പിടിക്കുന്നത് മുഖഘടനയിലെ സിലിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ്. സിലിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഖഘടനയിൽ ഉള്ളിലോട്ടൊഴുകുന്ന ഒരു ജലധാരതന്നെ ഉദ്ദിപ്പിക്കുന്നു, ഈ ജലധാരയിൽ അകപ്പെട്ട് ബാക്ടീരിയ, ഡയാറ്റോമിറ്റാക്ടാ എന്നിവയെ സൈറോഫോറാക്കി അഗ്രത്തിൽ വെച്ച് കടുപ്പമേറിയതാക്കി വെച്ചു. സൈറോഫോറാക്കി അഗ്രത്തിൽ വെച്ച് അവ ഭക്ഷണരീതികളിൽ അടങ്ങിപ്പോകുകയും, ഭക്ഷണരീതികൾ പരിസരത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിസരത്തെത്തിയപ്പോൾ സൈക്ലോസിസ് എന്ന് പേരുണ്ട്. സൈക്ലോസിസിന്റെ ആദ്യദശകളിൽ, രീതികളിലെ ദ്രവം അമ്ലമായായിരിക്കുമെങ്കിലും, പിന്നീട് അത് ക്ഷാരമായായി പരിണമിക്കും. ഇതിനിടക്ക് ദഹനഎൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ, രീതികളിലെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ദഹിക്കുകയും, ദഹിച്ചവ കോശത്തിലേക്ക് അവശോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മലപദാർത്ഥങ്ങൾ സൈറോഫോറാക്കിയെടുത്ത് ബഹിർഗമിക്കുന്നു.

ഗ്രസനവും, വിസർജനവും, ഓസ്മോസിസ് ക്രമീകരണവും: ഏകദേശം അമീബയിലേതു പോലെ തന്നെയാണ് പാരമിസിയത്തിലും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഓസ്മോസിസിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു സംഗതി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാരമിസിയത്തിന്റെ പെല്ലിക്കിൾ ഓസ്മോസിസിനെപ്പറ്റി തടയുവാൻ ഒട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്; പക്ഷേ മുഖഘടനയിലൂടെയുള്ള ധാര ഒട്ടോര ജലം കോശത്തിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാരമിസിയത്തിൽ രണ്ട് സംകാചനരീതികളുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിത്തീരുന്നത്.

പ്രത്യുൽപാദനം: പാരമിസിയത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദനരീതികൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമായി കണ്ടുവരുന്ന രീതികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ; അലൈംഗികപ്രജനനമായ ദ്വിവിഭജനവും, ആദിലൈംഗികപ്രജനനം (primitive sexual reproduction) പ്രവണതയുള്ള സംയുഗ്മനവും (conjugation).

ദ്വിവിഭജനം: ഭക്ഷണസമൃദ്ധിയുള്ള ദശകളിലാണ് ഈ പ്രജനനം നടക്കുന്നത്. ഈ ജീവിയിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിവിഭജനത്തെ അനപ്രസ്ഥദ്വിവിഭജനം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഉത്തമം. ആദ്യമായി ഗുരുനൂക്രിയസ്സും, സൂക്ഷ്മനൂക്രിയസ്സും നെടുമുടി നില്ക്കുന്നു. കോശഭേദങ്ങൾ നില്ക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മധ്യഭാഗങ്ങൾ കൃശമാകുന്നു. മുഖഘടന, സൈറോഫോറാക്കിസ് എന്നിവ ചുരുങ്ങി, ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു. പിന്നീട് ശരീരകോശം അന



ചിത്രം. 28. 1-3പാരമിസിയത്തിന്റെ പ്രവിഭജനം—വിവിധദശകൾ.
4-5പാരമിസിയത്തിന്റെ സംയുക്തം.


പ്രസ്ഥമായി പിടയുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ടു പാദമിസിയായ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവ ഓരോന്നിലും ഒരു ഗുരുനൂറ്റിയുടേയും, ഒരു സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയുടേയും, ഒരു വികസപരീതികളും, ഭക്ഷണനാളിയുടെ ഒരു കണ്ണുവും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

സംയുഗ്മനം: സംയുഗ്മനത്തിൽ രണ്ടു വ്യക്തികൾ ഇണചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യുൽപ്പാദനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇണചേരുന്നതോടൊപ്പം അവയിലുള്ള കോശകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൈമാറപ്പെടുകയും, അതുവഴി ജനിതകവസ്തുക്കളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സാദവിഷകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇണചേരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജൈവശേഷിയും ചൈതന്യവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. ജനിതകവിനിമയത്തിൽ സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് ആണ് സുപ്രധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നത്.

ആദ്യമായി രണ്ടു പാദമിസിയങ്ങൾ അവയുടെ അടിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് ഇണചേരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇണചേരുന്ന വ്യക്തികളെ സംയുഗ്മകങ്ങൾ (conjugants) എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സംയുഗ്മകങ്ങളിലോരോന്നിലും സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിഭജിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഓരോ സംയുഗ്മകത്തിലും നാലു സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ വിഭജനങ്ങൾ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗുരുനൂറ്റിയെന്ന് വിഘടിക്കുകയും കറേറ്റായായി അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നാലു സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉടൻതന്നെ വിഘടിച്ചു കൂടേണ്ട തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങിനെ ഓരോ കോശത്തിലും ഓരോ സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് അവശേഷിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് അസമാനമായി വിഭജിച്ച് രണ്ടു സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലുതിനെ അപ്രവാസിനൂറ്റിയെന്ന് (stationary nucleus) എന്ന് ചെറുതിനെ പ്രവാസിനൂറ്റിയെന്ന് (migratory nucleus) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

ഒരു സംയുഗ്മകത്തിലെ പ്രവാസിനൂറ്റിയെന്ന്, സംയോജിച്ചു കിടക്കുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലൂടെ നിങ്ങളി മറ്റോ സംയുഗ്മകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അത് അപ്രവാസിനൂറ്റിയെന്ന്യുമായി സംയോജിച്ച് ഒരു സംയുഗ്മകീകരണ നൂറ്റിയെന്ന്യായി (conjugation nucleus) മാറുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഓരോ സംയുഗ്മകത്തിലും ഓരോ സംയുഗ്മകീകരണ നൂറ്റിയെന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു. ഈ സാധാരണത്തിന് ബീജസങ്കലനത്തിന് (fertilization) പരിവേഷമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സംയുഗ്മകീകരണ നൂറ്റിയെന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതോടെ സംയുഗ്മകങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധം വിടർത്തി വേർപെടുന്നു. ഇങ്ങനെ വേർപെടുന്ന വ്യക്തികളെ പൂർവ്വ സംയുഗ്മികൾ (ex-conjugants) എന്ന് വിളിക്കാം. ഓരോ പൂർവ്വസംയുഗ്മികീകരണ നൂറ്റിയെന്ന് സംയുഗ്മകീകരണ നൂറ്റിയെന്ന് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ തവണ വിഭജിക്കുകയും അതുവഴി എട്ടു കോശകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ നാലെണ്ണം വലുതായി ഗുരുനൂറ്റിയെന്ന്യായിത്തീരാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മനൂറ്റിയെന്ന് വിഭജിക്കുകയും വിഭജിക്കുന്നു. ഈ ശേയിൽ ഓരോ പൂർവ്വസംയുഗ്മികീകരണ നൂറ്റിയെന്ന് നാലു



ചിത്രം. 29. സിലിയോഫോറയുടെ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ

1-4 പാലിന രാണേരിയം-വിഭജനഘട്ടങ്ങൾ, 5-നിക്രോത്തി
റസ് 6. ബാലൻറിഡിയം കോലി. 7-9 വോർട്ടിസെല്ല
10 കാർക്കിസിഡം. 11. സ്ക്വെപറോസ്റ്റോമ.

ഗുരുനൃക്ഷീയസ്സും രണ്ടു സുക്ഷുനൃക്ഷീയസ്സും കാണാം. ദശയുടെ അവസാനത്തിൽ പൂർവ്വസംയുഗ്മി തന്നെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു. വിഭജനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറുകോശങ്ങളിലും രണ്ടു ഗുരുനൃക്ഷീയസ്സും, ഒരു സുക്ഷുനൃക്ഷീയസ്സും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകോശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും സുക്ഷുനൃക്ഷീയസ് വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്നു. അതോടെ ചെറുകോശവും പിച്ചൻ രണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉൽഭവിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുകോശത്തിലും ഒരു ഗുരുനൃക്ഷീയസ്സും ഒരു സുക്ഷുനൃക്ഷീയസ്സും ഉണ്ടാവും. ഇവ ഓരോന്നും വളർന്നു ഒരു മുഴു പാരമീസിയം ആയിത്തീരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പൂർവ്വസംയുഗ്മിയും വിഭജിച്ച് നാലു പാരമീസിയങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതായത്, ഒരു ഇണയിൽ നിന്നു സംയുഗ്മനം വഴി എട്ട് പാരമീസിയങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രവാസിനൃക്ഷീയസ്സുകളുടെ വിനിമയം മുഖേനയാണ് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത സ്മരണീയമാണ്.

സിലിയോഫോറയുടെ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. തവളയുടെ മലാശയത്തിൽ കാണുന്ന പൊലിന, നിക്രോത്തീറസ് എന്നീ പരജീവികൾ; മനുഷ്യന്റെ കടലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ബാലൻറിഡിയം, സ്പൈറോസ്റ്റോമം, മോർട്ടിസെല്ല എന്നീ ശുദ്ധജലപ്രരൂപങ്ങൾ; ജലാശയങ്ങളിൽ ചെടി പോലെ വളരുന്ന കാർക്കിസിയം എന്ന സമൂഹ ജീവി. സിലിയോഫോറയിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ജീവികളിൽ സിലിയങ്ങൾ ഉദ്ഭവദശയിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പൂർണ്ണവളർച്ച എത്തുന്നതോടെ ഇവയിലെ സിലിയം തിരോഭവിക്കുകയും, തൽസ്ഥാനത്തു് ഗ്രാഹികൾ രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സിലിയോഫോറ വിഭാഗത്തെ സക്റോറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാ: എഫിലോട്ട.

ഫൈലം സീലൻററോറ

വ്യക്തമായ ടിഷ്യൂകൾ വികസിച്ചതായ ആദ്യത്തെ അകശേതകികളാണ് സീലൻററോറുകൾ. 'സീൽ' (coel) എന്ന ഗ്രീക്കുപദത്തിന് 'പൊള്ളയായ' എന്നാണർത്ഥം; 'എൻററോൺ' (enteron) എന്നതിന് 'കുടൽ' എന്നും. പൊള്ളയായ കുടൽ പോലുള്ള ഒരു അറ മാത്രമാണ് ഈ ജന്തുക്കളുടെ ദേഹത്തിലുള്ളതെന്നാണ് വിവക്ഷ. ജെല്ലിമീനകൾ, കുടൽ അനിമോണകൾ, കോറലുകൾ തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ പെടുന്നു. സീലൻററോറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുടൽ ജന്തുക്കളാണ്. മൈസ്രയെപ്പോലുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. സീലൻററോറുകളുടെ മുഖ്യലക്ഷണം അവ അരിയസമമിതിയുള്ള ജന്തുക്കളാണെന്നതാണ്. അതായത് ഏതു അരിയതലത്തിൽ കത്തനെ മുറിച്ചാലും ജന്തുവിനെ രണ്ടു നേർപകുതിയാക്കാം. ഇടത്തു്, വലത്തു്, മുൻപു്, പിൻപു് എന്നീ വശങ്ങൾ ഈ ജന്തുവിന്നില്ല. ഞാഞ്ഞൂൽ, പാറ, എലി തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെ മധ്യതലത്തിൽ മുറിച്ചാൽ മാത്രമാണല്ലോ രണ്ടു തുല്യ ഇടം-വലം ഖണ്ഡങ്ങളാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ ഈ ജന്തുക്കൾക്കു ദ്വിപാർശ്വസമമിതിയാണുള്ളതു്. ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്ടു് സമാനമാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിൽ രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ ആ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഘടനയിൽ സമാനമായിരിക്കുകയില്ല.

സീലൻററോറുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യലക്ഷണം, അതിന്റെ ദേഹം വികസിക്കുന്നത് രണ്ടു് കോശനിരകളിൽ നിന്നു മാത്രമാണെന്നതാണ്. ഈ കോശനിരകളെ എക്ടോഡോ, എൻറോഡോ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. രണ്ടു് കോശനിരകൾക്കിടയിൽ മിസോസ്റ്റിയ എന്ന അർദ്ധദ്രവരൂപ പദാർത്ഥം കാണാം. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിൽ മിസോസ്റ്റിയയുടെ സ്ഥാനത്തു് മിസോഡേമാണുള്ളതു്. ഉയർന്ന ജന്തുക്കളിൽ വിവിധ ആന്തരാവയവങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ കോശനിരയിൽ നിന്നാണ്.


ദേഹത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തു നിന്നു് ഒന്നിലധികം ഒൻറാക്കിളുകൾ വളരുന്നു എന്ന് സീലൻററോറുകളുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. നെമറോ

സിസ്റ്റ് എന്ന പോലീലറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളാൽ സിലൻററോറുകളുടെ ഭേദത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം. സിലൻററോറുകളിൽ പോളിപ്, മെഡൂസ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം ഭേദഘടനകൾ കാണാവുന്നതാണ്. പോളിപ് ഭാഗം അന്യപദാർഥങ്ങളോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടർ ആകൃതിയുള്ള ഭേദത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്താണ് വായ, ടെൻടക്കിളുകൾ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുള്ളത്. മെഡൂസഭാഗം സ്വതന്ത്രമാണ്. കടരൂപത്തിലുള്ള മെഡൂസയുടെ നിമ്നഭാഗത്തു വായ, ടെൻടക്കിളുകൾ എന്നിവ കാണാം. പോളിപ്, മെഡൂസ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഒരേ ജന്തുവിൽ ഇടവിട്ടു കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ തലമുറകളുടെ ഏകാന്തരണം (alternation of generations) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

മൈസ്ര


ശുദ്ധജലാരയങ്ങളിൽ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറുജീവിയാണ് മൈസ്ര വർഗ്ഗാരിസ്. ഏറ്റവും വികസിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സെ മീ നീളം കാണാം. വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ തവിട്ടു നിറത്തിലോ, ഇളം മഞ്ഞനിറത്തിലോ ഉള്ള ചെറിയൊരു നാരു പോലെ ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ്. ശരീരത്തിൽ വ്യക്തമായ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ കാണാം: പൂ പോലുള്ള അഗ്രഭാഗവും, പൂത്തുണ്ടുപോലുള്ള തടിയും. ആവാസതലത്തോട് ഭേദം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആധാരഫലകം (basal disc) എന്ന അവയവത്താലാണ്. ജലചലനത്തിൽ തടി ഉപയോഗമെങ്കിലും വിശ്വാസിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ജലചലനത്തെ അതിജീവിച്ചു ജന്തുവെ ആവാസതലത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുവാൻ ആധാരഫലകത്തിന് ശേഷിയുണ്ട്. അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ നടുവിലാണ് വായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ അഗ്രഭാഗത്തെ മുഖീയഭാഗമെന്നും ഇതിനെതിരായ ആധാരഫലകഭാഗത്തെ വിമുഖീയഭാഗമെന്നും പറയുന്നു. വായയെ ചുറ്റി അന്വധി ഗ്രാഹികളുണ്ട്. പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ വിടൻ വർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഹികളാണ്.

മൈസ്രയുടെ ഭേദം രണ്ടടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. പുറം സ്തരത്തെ അധിചർമ്മം (epidermis) എന്നും, അകത്തെ സ്തരത്തെ അന്തശ്ചർമ്മം (endoderm) എന്നും വിളിക്കുന്നു. അധിചർമ്മത്തിലെ കോശാവലി ഒരു രക്ഷാ നിരയാണ്. ജന്തുവിനെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നു പരിരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് ഈ കോശനിരയുടെ മുഖ്യജോലി. ഗ്രന്ഥികോശങ്ങൾ, നാഡികോശങ്ങൾ, നിഷ്പാദകങ്ങൾ (cnidoblasts) എന്നീ പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷവൽകൃത കോശങ്ങളും അധിചർമ്മത്തിലുണ്ട്. അന്തശ്ചർമ്മം ഭേദഗുഹയുടെ ആവരണമാണ്. അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വായയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഭേദഗുഹയുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ദ്വാരമാണ് വായ. ഈ ജന്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ഗുദോദരമോ മറ്റു ബാഹ്യസുഷിരങ്ങളോ ഇല്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ഭേദഗുഹയുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരേയൊരു ദ്വാരം വായയാണ്. അന്തശ്ചർമ്മത്തിന്റെ മുഖ്യധർമ്മം ഇറയെ പിടിക്കലും ഭവ്നീകരണമാണ്. അധിചർമ്മവും അന്തശ്ചർമ്മവും ഉയർന്ന ജന്തുക്കളുടെ ചർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്.



ചിത്രം. 30. മൈഥിലം—ഇടത്തു് ടെൻറക്കിളുകൾ നിവർത്തിയ ജന്തു; വലത്തു ടെൻറക്കിളുകൾ സങ്കോചിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. വായ. 2. നിവർത്തിയ ടെൻറക്കിൾ. 3. സങ്കോചിച്ച ടെൻറക്കിൾ.


വായ തുറക്കുന്നതു് ദേഹഗുഹയിലേക്കുവന്നു പരഞ്ഞുവല്ലോ. ഗ്രാഹികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ആഹാരകണികകൾ വായിലൂടെ ദേഹഗുഹയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്നു് പ്രാഥമികമായ ഭവനം സംഭവിക്കുന്നതു് ഈ അറയിലാണു്. ദേഹഗുഹയെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന അന്തഃശർമ്മത്തിൽ ധാരാളം സിലിയങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഈ സിലിയങ്ങൾ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നതിനാൽ നേരിയ ഒരു ജലധാര സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ സദാ പരിസഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണു് ഇതിന്റെ ഫലം. അതായതു്, ദേഹഗുഹയിൽ ഭവനം മാത്രമല്ല, പരിസഞ്ചാരവും നടക്കുന്നുണ്ടു്. ഇക്കാരണത്താൽ ആമാശയ-സിരാഗുഹ എന്നു കൂടി ദേഹഗുഹക്കു് പേരുണ്ടു്.



ചിത്രം. 31. പോളിപ്—മെഡുസരൂപങ്ങളുടെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ. A-പോളിപ് രൂപത്തെ കത്തനെ മുറിച്ചത്. B. പോളിപ് രൂപത്തെ വിലങ്ങനെ മുറിച്ചത്. C. മെഡുസരൂപത്തെ കത്തനെ മുറിച്ചത്. 1. ഹൈപോസ്റ്റോം 2. വായ 3. ഖാഹ്യകോശനിര 4. മിസോഗ്ളിയ 5. ആന്തരകോശനിര 6. സർക്കുലർകനാൽ 7. അരിയകനാൽ 8. വില്വം.

ഹൈഡ്രയുടെ വിലങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ അധിചർമ്മത്തിന്റെയും അന്തസ്ഥർമ്മത്തിന്റെയും ഘടനകൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. അധിചർമ്മത്തിൽ കൂടുതലും കോണിയകോശങ്ങളാണുള്ളത്. വിവിധ കൂടിയ ഭാഗം പുറത്തോട്ടും കൂർത്ത ഭാഗം അകത്തോട്ടുമായാണ് ഇവ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂർത്ത കോണിന്റെ അറ്റം സങ്കോചപ്രവർത്തനങ്ങളായി (contractile processes) മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവ ദേഹതലത്തിന് സമാന്തരമായാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ സങ്കോചം ദേഹഭേദരൂപത്തെ ചുരുക്കാനും വികാസം ദൈർഘ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാനും കാരണമാകുന്നു. അധിചർമ്മകോശങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറംതൊലിയുടെ മാത്രമല്ല, പേശിവ്യൂഹത്തിന്റെ കൂടി കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഇവയെ ഇക്കാരണത്താൽ, പേശി-അധിചർമ്മകോശങ്ങൾ

എന്നു വിളിക്കുന്നു. പേശിയ-അധിചർമകോശങ്ങൾക്കിടയിൽ അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ചെറുകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയെ അന്തരാളകോശങ്ങൾ (interstitial cells) എന്നു വിളിക്കുന്നു. പല പ്രത്യേക തരം അധിചർമ




ചിത്രം. 32. ഹൈഡ്ര-കോശനിരകളുടെ ഘടന A. അനുദൈർഘ്യപരിച്ഛേദം B. അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം C. കോശനിരകൾ വിപുലീകരിച്ചതു്. 1. വായ 2. എപിസ്റ്റോം. 3. ടെൻറക്കിൾ 4. എക്തോഡേം 5. എന്റോഡേം 6. മിസോഗ്ലിയ 7-9 പാർശ്വാവകൾ 10. ആധാരഡിസ്ക് 11. നെമറ്റോസിസ് 12. സംവേദകകോശം 13. പേശി-തലിയകോശം 14. ഫുള ജല്യം 15. ദഹനകോശം. ഒരു ആഹാരകണിക ഗ്രസിക്കപ്പെടുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുക. 16. സ്രവണകോശം 17. ഭക്ഷ്യരികതിക

കോശങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ ഈ അന്തരാളികോശങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. നിദ്രാബ്ജാസ്കരൻ, നാഡികോശങ്ങൾ, സംവേദകകോശങ്ങൾ (sensory cells), ഗ്രന്ഥികോശങ്ങൾ, ജനനകോശങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ അന്തരാളികോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നവയാണ്.

അന്തരവർമ്മ കറുക്കുടി കനാ കൂടിയതാണ്. ഈ നിരയിലെ സ്തോഭരൂപ കോശങ്ങളുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം ഭവനവും ആഗിരണവുമാണ്. ഭവനക്കഴലിലെത്തുന്ന ആഹാരകണികകളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഇവയാണ്. ഇവ കൂടാതെ പേശീയ-അധിചർമ്മ കോശങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥികോശങ്ങൾ, സംവേദകകോശങ്ങൾ എന്നിവയും അന്തരവർമ്മത്തിൽ കാണാം. ആദ്യത്തെതാണ് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്. മിസോസ്റ്റിയയോട് തൊട്ടു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തു് ഈ കോശങ്ങൾക്ക് പേശീയനാരുകളുണ്ട്. അധിചർമ്മത്തിലെ തത്തുല്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി, ദേഹവ്യാസത്തിന് സമാന്തരമായാണ് ഈ നാരുകൾ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവയുടെ സങ്കോചം ദേഹഭൈർഘ്യത്തെ കൂട്ടുന്നു. ഈ കോശങ്ങളുടെ മറ്റൊരുതരം, എന്റോസിലിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഒന്നിലേറെ ഫ്ലാജെല്ലകളുണ്ട്. കഴലിനകത്തെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥത്തിന്റെ നിക്ഷേപത്തെ സുഗമമാക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ലാജെല്ലകളുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യം. ഗ്രന്ഥികോശങ്ങൾ ഹൈപോസ്റ്റോമിന് ചുറ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ നന്നേ ചെറുതാണ്. ഭവനത്തിനാവശ്യമായ ഭവനദ്രവങ്ങൾ ഇവ വിതർജിക്കുന്നു. സംവേദകകോശങ്ങളും ഏറിയകൂറും ഹൈപോസ്റ്റോമിന് ചുറ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

നീഡോബ്ജാസ്കരൻ: അന്തരാളികോശങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന നീഡോബ്ജാസ്കരൻ അഥവാ നിഷാഗങ്ങൾ സിലൻററോകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. പേരക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സഞ്ചിയും (വെസിക്കിൾ) അതിനുള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചുരുണ്ട (springlike) പൊള്ളയായ നൂലു പോലുള്ള കഴലും കൂടിയതാണ് നിഷാഗങ്ങൾ. തക്കതായ പ്രചോദനം ലഭിച്ചാൽ ഈ നൂൽ പുറത്തേക്കു തള്ളപ്പെടും. വെസിക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള നിഡോസിൽ അഥവാ തന്തുശരം (ഇന്റസീരോമം) തോക്കിന്റെ കാഞ്ചിപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഉദ്ദേശം പതിനേഴ് തരം തന്തുശരങ്ങൾ സിലൻററോയിൽ ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയേക്കാവുന്നതുപോലെ ചൈന്യവും മറ്റും പ്രാകൃതജീവികളല്ല എന്നതിന് തെളിവാണ് തന്തുശരങ്ങളുടെ വിപുലമായ പരിണാമം. തന്തുശരങ്ങളുടെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് അവയെ ഓരോ തരം പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഡെസ്മോണിമിന് ചെറുതുകങ്ങളോടുകൂടിയ (bristles) ചുരുണ്ട നൂലുണ്ട്. ഇത് ഇരയുടെ ഉന്തിനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സാധാരണമായ തന്തുശരം സ്റ്റീനോടിലാണ്. ഇതിന്റെ സഞ്ചിയിൽ മൂന്നു മുളകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കകത്തു് വിഷദ്രവവും, ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രാസ പ്രചോദനം (chemical stimulation) മൂലം നിഷാഗം കൂടുതൽ പ്രവേശ്യം (permeable) ആയിത്തീരുന്നു. തൽഫലമായി കോശത്തിനകത്തെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും നൂൽച്ചുരുട്ടു് പുറത്തേക്കു് ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ നൂലിന്റെ അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി

വിഷം വിസർജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമെ ഐസോസൈസ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു തരം തന്തുശരങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ നൂൽ നഗ്നവും മററതിന്റേതു് ശൂകങ്ങൾ കൊണ്ടു് പൊതിയപ്പെട്ടതുമാണു്. ഇരയെ മരവിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവ രണ്ടും സഹായിക്കുന്നു.



ചിത്രം. 33. നിയോബ്ബാസ്റ്ററം മറ്റുതരം കോശങ്ങളും

A. സ്റ്റീനോടിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ B. സ്റ്റീനോടിൽ പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ C. പേശി-തലിയുകോശം D. നാഡികോശം.

ഇരതേടൽ: ചൈലം മാംസഭോജിയാണു്. സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രാണികളുടെ ചെറുലാർവകളും ക്രസ്റ്റേഷിയനുകളുമാണു് ചൈലയുടെ ഭക്ഷണം. ഏതെങ്കിലുമൊരു ഗ്രാഹിയിൽ ഇരതൊട്ടാൽ മതി, ഉടൻ നിരവധി തന്തുശരങ്ങളുടെ നൂലുകൾ കൊണ്ടു് ആതു പൊതിയപ്പെടും. ഗ്രാഹികർ എപ്പോഴും വിടൻ വെള്ളത്തിൽ വിശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല തന്തുശരങ്ങളിൽനിന്നും വിഷമേറുകഴിഞ്ഞാൽ ഇര ബോധരഹിതമായി തളരുന്നു. പിന്നീട് ഗ്രാഹികർ ഇരയെ ചുറ്റി വരിയുകയായി. ഇതിനിടയിൽ വായ വിടരുകയും ഇര അതിലേക്കു് ആനയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരയെ വിഴങ്ങുന്നതിൽ ദേഹത്തിലെ മാംസ പേശികൾക്കും വായയിലെ ശ്ലേഷ്മഗ്രന്ഥികൾക്കും പങ്കുണ്ട്.

ഭവനം: ആമാശയസിരാഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണു് ഭവനം നടക്കുന്നതു്.

അന്തരവർത്തനത്തിലുള്ള ഗ്രാമികൾ പ്രധാനമായി പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ഫോസ്ഫറും എന്നിവയെടുക്കുകയും സ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഈയുടെ ഉദ്ദേശ്യഭാഗങ്ങളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ഈ പദാർത്ഥത്തെ ദഹന സംബന്ധമായ കോശങ്ങൾ കപടപാദങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി അകത്താക്കും. മേല്പറഞ്ഞ കോശങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യരീതികൾ (food vacuoles) കള്ളിലാണ്. ദഹനം പൂർണ്ണമാകുന്നത്, പ്രോട്ടോസോവയുടെ ഭക്ഷ്യസസ്യദായം ഹൈഡ്രയുടെ കരയാക്കെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ദഹനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വലിയൊരു ദഹനഗുഹയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ഹൈഡ്രയ്ക്ക്, താരതമ്യേന വലിയ ജന്തുക്കളെ ഈയാക്കുവാൻ കഴിയും. ദഹിക്കാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദഹനഗുഹയിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുകയും പിന്നീട് വായിൽക്കൂടി തന്നെ വിസർജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വിസരണം വഴി മറ്റു കോശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. മാംസപേശികളുടെ സങ്കോചവും അന്തരവർത്തനകോശങ്ങളിലെ ഫ്ലജെല്ലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും കൊണ്ട് ഭക്ഷണം, ആമാശയസിരാഗുഹയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ (ഗ്രാമികളുടെ ഉള്ളിലും) എത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഹൈഡ്രയുടെ ദഹനഗുഹ ദഹന-പരിസഞ്ചരണ-വിസർജന വ്യൂഹങ്ങൾ ചേർന്നതാണെന്ന് പറയാം.

ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും വിസർജനവും വിസരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്ര വളരെ ചെറിയ ജീവിയാകുന്നതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാണ്. ശരീരഭിത്തി തുലോം കട്ടി കറഞ്ഞതായതിനാലും, ആമാശയ-സിരാഗുഹയിൽ സദാ പരിസഞ്ചരണം നടക്കുന്നതിനാലും മിക്കവാറും എല്ലാ കോശങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു.




ചിത്രം. 34. ഹൈഡ്രയുടെ ചലനം

ചലനം

സാധാരണയായി ജലസസ്യങ്ങളിൽ പരാദിപ്പിടിച്ചാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഹൈഡ്രയ്ക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ചലനം (locomotion) സാധ്യമാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതി തെന്നി നില്ക്കലാണ് (gliding). ആധാരഫലകത്തിനടിയിലെ കോശങ്ങളുടെ അമിബോയ്ഡ് ചലനം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. വളരെ വേഗം യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്ര തലകുത്തിമറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഹൈഡ്ര കുനിഞ്ഞ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന നിഷ്കങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഗ്രാമികളെ നിലത്തുറപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആധാരഫലകത്തെ അയച്ചു

വിട്ടു, വായയുടെ മുകളിൽക്കൂടെ വിശിയെടുത്ത് നിലത്തു ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രാഹികളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുന്നു.



ചിത്രം. 35. ഹൈഡ്രയുടെ നാഡീവ്യൂഹം

നാഡികളും പെരുമാറ്റരീതികളും

ഹൈഡ്രയ്ക്ക് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു നാഡീവലയുണ്ട്. ഇത് വായയുടെ സമീപത്തിൽ സ്വല്പം കേന്ദ്രീകൃതമാണെങ്കിലും ഹൈഡ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക കേന്ദ്രീകൃത, നാഡീവ്യൂഹമില്ല. അധിചർമ്മത്തിലും അനുശർമ്മത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദ്വീപ്രവക്തവുമാ, ത്രീപ്രവക്തവുമായ നാഡീകോശങ്ങൾ കൂടിയോജിച്ചാണ് നാഡീജാലമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് നാഡീജാലത്തിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന നാഡീ ആവേഗത്തിന് പല നാഡീബന്ധങ്ങൾ (synapses) കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം നാഡീബന്ധങ്ങൾ ഉയർന്നതരം ജീവികളുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷേ ഇവയിൽ നാഡീആവേഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊരു ദിശയിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ഉയർന്ന ജീവികൾക്ക് സവിശേഷവൽക്കൃതമായ നാഡീ പന്ഥാവികൾ (nervous pathways) ഉണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. ഹൈഡ്രയിലാകട്ടെ, നാഡീആവേഗങ്ങൾ ഇരുദിശയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആവേഗങ്ങൾ നിശ്ചിതദിശയിലേ സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്നില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു ബിന്ദുവിൽ നാഡീ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആവേഗം നാഡീജാലത്തിന്റെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കും. പ്രാവർത്തികമായി ഇത് അത്ര ഉത്തമമായ

നാഡീവ്യൂഹമല്ലെങ്കിലും *ഹൈഡ്ര*യെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനബദ്ധജീവി (sedentary) ക്ക് മതിയായതാണ്.


ഉദ്ദീപനങ്ങൾ (stimuli) സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രത്യേക സംവേദകകോശങ്ങൾ (sensory cells) ഉണ്ട്. ഇവ സ്पर्ശനത്തിനും, രാസപദാർഥങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം സൂക്ഷ്മഗ്രാഹകം (sensitive) ആണ്. നേന്ത്, മൃഗ പോലുള്ള അഗ്രത്തോട്ടു കൂടിയ ഈ കോശങ്ങൾ ശരീരഭിത്തിയുടെ രണ്ടുക്കകളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതു കാണാം. കൂന്ത അഗ്രം അധിചർമ്മത്തിൽ പുറത്തേക്കും, അന്തരചർമ്മത്തിൽ അകത്തേക്കും ചൂണ്ടിയാണിരിക്കുന്നത്. സംവേദകകോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ അധിചർമ്മ കോശങ്ങളുടെ ആധാരം (base) ത്തിലുള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവ നാഡീആവേഗങ്ങളെ പേശികോശങ്ങളിലേക്കും ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളിലേക്കും റിലേ ചെയ്യുന്നു. നാഡീജാലം വെറുതെ ആവേഗങ്ങളെ റിലേ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് *ഹൈഡ്ര*യുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരു ചെറുജീവി ഏതെങ്കിലും മൊരു ഗ്രാഹിയിൽ മുടി എന്നിരിക്കട്ടെ. ഉടനെ എല്ലാ ഗ്രാഹികളും കൂടി ഈ ചെറുപ്പിടിക്കുകയും, വായയിൽ കത്തിത്തീരുകവാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായി. തത്സമയം ആവേഗങ്ങൾ വായ തുറന്നു പിടിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദീപനവും നൽകും. അതായത് ഈ വായയുടെ വശങ്ങളിൽ തൊട്ടുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ, വായ തുറന്നു പിടിച്ചു കഴിയും. ഇതേപോലെ ഇറയെ വിഴുങ്ങുന്ന പേശീസങ്കോചങ്ങളെയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാഡികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രത്യുൽപാദനം

(a) അലൈംഗികപ്രത്യുല്പാദനം (asexual reproduction): സാധാരണയായി മൊട്ടുകൾ വഴിയാണ് *ഹൈഡ്ര* പ്രത്യുല്പാദനം നടത്തുന്നത്. ആധാര ഫലകത്തിനും അഗ്രഭാഗത്തിനുമിടയിൽ തടിയിൽ അൽപം ഉയരത്തിലാണ് മൊട്ടുകൾ കാണുക. ഇവിടെ രണ്ടു ചർമ്മങ്ങളും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു മുഴയുണ്ടാകുന്നു. ഇത് ക്രമേണ നിങ്ങ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഗ്രാഹികൾ പൊട്ടിച്ചുറപ്പെടുന്നു. രണ്ടോ, മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഒരു കൊച്ചു *ഹൈഡ്ര*യുടെ രൂപം കൈക്കൊള്ളും. ഗ്രാഹികളും തണ്ടും വായുമെല്ലാം ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും. ക്രമേണ മാതൃദേഹത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ചുരുങ്ങുകയും, ഒടുവിൽ മുറിഞ്ഞു വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മുറിഞ്ഞു വേർപെട്ട *ഹൈഡ്ര* പുതിയൊരു അധഃസ്തരത്തിൽ സ്വയം ബന്ധിച്ചു സ്വതന്ത്രജീവിയായിത്തീരുന്നു.

(b) ലൈംഗികപ്രത്യുല്പാദനം (sexual reproduction): വർഷത്തിൽ ചില കാലങ്ങളിൽ (സാധാരണ ശീതകാലത്ത്) മാത്രമാണ് *ഹൈഡ്ര* ലൈംഗികപ്രത്യുല്പാദനം നടത്തുക. *ഹൈഡ്ര*യുടെ മിക്ക സ്ത്രീഷിസിലും പുംബീജവും അണ്ഡവും ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണുണ്ടാകുക. ഇത്തരം ജീവികളെ ഉഭയലിംഗി (hermaphrodite) എന്നു വിളിക്കുന്നു. മറ്റു ചില സ്ത്രീഷിസിലാകട്ടെ സ്ത്രീ-പുരുഷവ്യക്തികൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് മധ്യകലയിലുള്ള (mesenchyme) കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബീജങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം. ചില ദേഹഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കോശങ്ങൾ പൊട്ടുന്നതെ പെരുതവാൻ തുടങ്ങും.

ദേഹത്തിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു മുഴ പോലെയാകും. ഇങ്ങിനെയുള്ള മുഴകളെ പുംബീജം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ വൃഷണമെന്നും, അണ്ഡമാണുള്ളതെങ്കിൽ അണ്ഡാശയമെന്നും വിളിക്കുന്നു. വൃഷണങ്ങളിൽ നിരവധി ബീജങ്ങളുണ്ടാക



ചിത്രം. 36. പ്രത്യുൽപാദനം ഹൈഡ്രയിൽ A. മുക്കുനും, B. ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ വളർച്ച. 1. വളരുന്ന മുക്കുനും 2. വളർന്നു കഴിഞ്ഞ മുക്കുനും 3. വൃഷണം 4. അണ്ഡാശയം.

മെങ്കിലും അണ്ഡാശയത്തിൽ ഒരൊറ്റ മുട്ട മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അണ്ഡാശയത്തിലെ മിക്ക കോശങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും, ഒന്നൊഴിച്ചു മറ്റൊറ്റാ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളും അവക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. അണ്ഡാശയത്തിലെ വസാനം അമിഞ്ചയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു അണ്ഡം അവ ശേഷിക്കുന്നു. ഇത് പീതകം (yolk) നിറഞ്ഞ മറ്റു മധ്യകലാകോശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പകുത പ്രാപിക്കുന്നു. പീതകം വളരുന്ന ഭൂമണത്തിനു ഭക്ഷണമായിത്തീരുന്നു.

പകുത വന്ന മുട്ടകൾ അധിചർമ്മം പൊളിച്ചു പുറംഭാഗം മാത്രം വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചു വെക്കുന്നു. വൃഷണത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവെച്ച പുംബീജങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടി നീന്തിവന്ന് മുട്ടയെ പൊതിയുമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മൊരൊണ്ണത്തിനു മാത്രമേ അകത്തു കയറി സേകം (fertilization) നടത്താ

നാവു. അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ സേകം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പകുത വന്ന മുട്ടകൾക്ക് വികസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. സിക്താബ്ധം അധികം വളർച്ചയെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ വീഴും. ശീതകാലങ്ങളിൽ സിക്താബ്ധം വളർച്ച തുടരാതെ പ്രസുപ്താവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.


പുനരുത്ഭവനം (regeneration)

നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാഹികളെ വീണ്ടും വികസിപ്പിക്കുവാനും, ഗുരുതരമായ മറ്റു പക്ഷകൾ തനത്താർ കേട്ട തിട്കുവാനും *ഹൈഡ്ര*ക്ക് കഴിയും. ഇതിനു പുറമേ ഹൈഡ്രയെ തുണ്ടുകളായി മുറിച്ചാൽ, മിക്ക തുണ്ടുകൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ടാക്കി പൂർണ്ണ ഹൈഡ്രകളായിത്തീരുവാൻ കഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ജീവിക്ക് “ഹൈഡ്ര” എന്ന പേരു കിട്ടിയത് തന്നെ. ഗ്രീക്കു പുരാണത്തിലെ ‘ഹൈഡ്ര’ എന്ന ഭീകരസന്തപത്തെ ഹെർക്കുലീസ്സാണ് അവ സാനം കൊന്നത്. ആദ്യം ഒമ്പതു തലകളുണ്ടായിരുന്ന ഇതിന്റെ ഓരോ തല വെട്ടിക്കളയുമ്പോഴും തൽസ്ഥാനത്തു് രണ്ടു തലകൾ വളർന്നു വന്നത്രെ! ഒബീലിയ

വെറും കണ്ണു കൊണ്ടു നോക്കിയാൽ, ശിഖരിതമായ ചെറു സസ്യത്തെ പോലെ തോന്നുന്ന ഈ കോളുണിജീവിയെ കടലോരങ്ങളിൽ കാണാം. മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല പദാർഥങ്ങളിലും ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്.

കോളുണിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കരുത്തേറിയ തൊലി പോലെയുള്ള പെരിസാർക്ക് എന്ന ഒരു ഉറ കൊണ്ടു് മൂടിയിരിക്കും. ശിഖരങ്ങളുടെ അഗ്രത്തിൽ ഓരായ പോഷകപോളിപ്പുകൾ (nutritive polyps) അഥവാ സുവോയിഡുകൾ ഉണ്ട്. കോളുണിയുടെ അടിഭാഗത്തു കാണുന്ന വേരുകൾ പോലുള്ള ഭാഗം ഹൈഡ്രോരൈസ (മൂലം) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു. ഓരോ പോഷകപോളിപ്പും അതിന്റെ പ്രാഥമികഘടനയിൽ *ഹൈഡ്ര*യോടു് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഹൈഡ്രോതിക്ക എന്ന പൂപ്പാതും പോലുള്ള ഒരു ഭാഗം ഓരോ പോഷകപോളിപ്പിനേയും ചുറ്റിനിൽക്കുന്നു. ഇതു് പെരിസാർക്കിന്റെ വകഭേദമാണ്. പെരിസാർക്കിനുള്ളിൽ തരിമയമായ യോജകനാള (coenosarc) നിറയുണ്ട്. പോളിപ്പുകളുടെയും, യോജകനാളത്തിന്റേയും ഭിത്തിക്ക് രണ്ടു നിരയിൽ കോശങ്ങളുണ്ട്. പുറത്തെ നിര ബഹിർധരവും അകത്തെ നിര അന്തർധരവുമാണ്. യോജകനാളം പൊള്ളയാണ്. ഇതു് ആമാശയസിരാഗ്രഹയാണ്. എല്ലാ പോളിപ്പുകളുടെയും ഗ്രഹകളായി ഈ വലിയ ഗ്രഹബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്താണ് റഹനം നടക്കുന്നത്. *ഹൈഡ്ര*യിലെല്ലെ പോലെ ഒബീലിയയിലും റഹനം മാത്രമല്ല, പരിസഞ്ചരണവും ഈ അറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആമാശയസിരാഗ്രഹയിൽ ഭാഗികമായി റഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്കകത്തു് വെച്ച് പൂർണ്ണമായി റഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രധാനതലങ്ങളിന്റെയും, ചില പോളിപ്പുകളുടെയും കോണുകളിൽ ഉരുളിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ വളരുന്നു. ഇവയിലെ കോളുണിയിലെ ഗൊണാൻജിയങ്ങൾ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനഅംഗങ്ങൾ, ഓരോ



ചിത്രം. 37. ബെലിയ—ജീവനചക്രം 1. മുഴുകോളണി. 2-3 മെഡൂസകൾ 4. പുംബീജവും അണ്ഡവും സംയോജിക്കുന്നത്. 5-9 സീക്താബും വികസിച്ചു വീണ്ടും കോളണിയായിത്തീരുന്നത്. ഗൊണാൻജിയത്തിനും ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈൽ എന്നൊരു നട്ടത്തം പെരിസാർക്കിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗോണോത്തിക്ക എന്ന പൂക്ക (capsule) വൃദ്ധ്യം. ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈൽ വശങ്ങളിൽ ചെറിയ തളി കൾ പോലുള്ള മെഡൂസാമൊട്ടുകൾ കാണാം, ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈൽ, വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു സുവോയിഡ് ആണ്. അതിനാൽ, ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈൽ, മെഡൂസാമൊട്ടുകൾ, പോഷക പോളിപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരം സുവോയിഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ത്രിരൂപ (trimorphic) കോളണിയാണെന്ന് സാരം. ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈലുകൾക്ക് വായോ ഗ്രാഹികളോ ഇല്ല. തന്മൂലം സ്വതന്ത്രമായി ഇരപിടിച്ചു തിന്നുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കില്ല. ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈലുകൾ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് മാത്രമുള്ളവയാണ്. മെഡൂസാമൊട്ടുകൾ ഒട്ടവിൽ പകുത വന്നു, ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈലിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവും. ഈ ചെറിയ മെഡൂസകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലിമെന്ററോ ഗോണോത്തിക്കയുടെ അറ്റം പൊട്ടിച്ചു പുറത്തുവരും.

മെഡൂസക്ക് ഒരു തുറന്ന കടയുടെ ആകൃതിയാണുള്ളത്. പുറം കട (exumbrella) എന്ന മധ്യഭാഗം കൊണ്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസ്പോറൈലിൽ ഇത് തുടങ്ങിയിരുന്നത്. മറുവശത്തെ അവതലമായ (concave) ഭാഗത്തെ കീഴ്ക്കട (subumbrella) എന്നും വിളിക്കാം, കീഴ്ക്കടയുടെ മധ്യത്തിൽനിന്ന് മണി

നാക്കപോലെ മനുഷ്യരും തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അഗ്രത്തിലാണ് നാലു കോണുകളുള്ള വായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വായ തുറക്കുന്നത് ആമാശയസിരാ ഗുഹയിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ ശാഖോപശാഖകളും, ചാലുകളും ഭക്ഷണാശയത്തെ മെഡുസയുടെ നാനാഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നു. കടയുടെ അരികിൽ നിന്നു നിരവധി തന്തുശരങ്ങളുള്ള ഗ്രാഹികൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മണിയുടെ ആകൃതിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ദേഹത്തിന്റെ ഇടവിട്ടുള്ള സംകോച-വികാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ജീവി നീന്തുന്നു. ഇങ്ങനെ നീന്തുവോർ പിന്നിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രാഹികൾ ചെറുപ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നു.

കോളണിയിലെ പോളിപ്പുകൾ സാധാരണയായി അലൈംഗികപ്രത്യുല്പാദനം (asexual reproduction) വഴിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. നേരെ നിൽക്കുന്ന ഏതു തണ്ടിലും മൊട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനുപുറമേ വേരപോലുള്ള തണ്ടുകൾ അടിഭാഗത്തു നിന്നും കറച്ചുഭരം ഭൂതലത്തിനു സമാന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചശേഷം, നേരെ മേലോട്ടുയർന്ന് പുതിയൊരു കോളണി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പോളിപ്പുകളിൽ ലൈംഗികപ്രജനനം തീരെ നടക്കുന്നില്ല.

മെഡുസയുടെ പ്രഥമകർത്തവ്യം ലൈംഗികപ്രജനനം നടത്തുകയെന്നതാണ്. കടയുടെ അടിഭാഗത്തുനിന്നും നാല് ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. പെൺമെഡുസയും, ആൺമെഡുസയും വെച്ചേറേയുണ്ട്. പുറംബീജങ്ങളും, അണ്ഡങ്ങളും കടലിലേയ്ക്കു വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുകയും അവയിടവെച്ചു സേകം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിക്താഞ്ചം വളർന്ന് രണ്ടുതക്ക കോശങ്ങളുള്ളൊരു ലാർവയായിത്തീരുന്നു. ഏതാനും കാലം നിന്തികഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ലാർവ പാറക്കൽപ്പത്തിന്മേലോ മറ്റോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. സ്വതന്ത്രമായ അററത് വായയും, ഗ്രാഹികളും വികസിക്കുകയും, ജന്തു ഒരു പോളിപ്പ് ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പോളിപ്പ് അലൈംഗികപ്രജനനം വഴി പുതിയൊരു കോളണിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലാർവയും, നിന്തിനിങ്ങുന്ന മെഡുസയും ഒബീലിയയെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പോളിപ്പും മെഡുസയും

കാഴ്ചയ്ക്കു പോളിപ്പും, മെഡുസയും തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യതയുണ്ട്. പോളിപ്പിൽ ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന അക്ഷം വ്യാസത്തേക്കാൾ നീളം കൂടിയതാണ്. നിവർത്തിയ കടയുടെ ആകൃതിയുള്ള മെഡുസയിലാകട്ടെ വ്യാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രധാന അക്ഷം ചെറുതാണ്. രണ്ടും ബാഹ്യചർമവും, അന്തരചർമവും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. രണ്ടിലേയും കോശങ്ങളും, ഒരേതരത്തിലുള്ളവയാണ്. മെഡുസയിൽ കടയുടെ മുകളിലേയും താഴത്തേയും പുറം ഭാഗങ്ങളും, ഗ്രാഹികളും ബാഹ്യചർമം കൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. ആമാശയഗുഹയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അന്തരചർമം കൊണ്ടു മൂടിയതാണ്. മെഡുസക്ക് പോളിപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം രണ്ടുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ജെല്ലിങ്ങ് കട്ടി വളരെ കൂടുതലാണെന്നതാണ്. ജെല്ലി ജന്തുവിന് കൂടുതൽ കട്ടി നൽകുകയും പ്ലവക്ഷമത (buoyancy) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചലനത്തിന് കൂടുതൽ കഴിവുള്ള മെഡുസയുടെ നാഡീവല കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ളതാണ്.

നാഡീവലയ്ക്ക് വർധിച്ച നിയന്ത്രണശക്തിയുള്ളതും അരിക് വളയമുണ്ട്. (marginal ring). ഇവയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷപ്പെട്ട സംവേദകകോശങ്ങളുമുണ്ട് (sensory cells). പോളിപ്പും, മെഡൂസയും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ജീവിതരീതികൾക്ക് അനുവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് - ഞ് സ്ഥാനബദ്ധ (sessile) ജീവിതത്തിനും മറോത്ത് പ്ലവകജീവിതത്തിനും.

ബെിലിയയുടെ പോളിപ്പുകൾ ലൈംഗികപ്രത്യുല്പാദനം നടത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ മെഡൂസകൾ പുംബിജവും, അണ്ഡവും ഉല്പാദിപ്പിച്ച് പ്രജനനം നടത്തുന്നു. ഓരോ സിക്താബ്ദവും ഓരോ പോളിപ് ആയിട്ടാണ് വികസിക്കുന്നത്. ഈ പോളിപ് അലൈംഗികപ്രജനനം വഴി പോഷകസുവോയിഡുകളും, പ്രജനനസുവോയിഡുകളുമുള്ള ഒരു കോളണിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് ബെിലിയയുടെ ജീവനചക്രത്തിൽ അലൈംഗികപ്രജനനം നടത്തുന്ന ഒരു പോളിപ്പും അലൈംഗിക പ്രജനനം നടത്തുന്ന മെഡൂസയും ഒന്നിടവിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതിനാണ് തലമുറകളുടെ ഏകാന്തരണം (Alternation of generations) അല്ലെങ്കിൽ മെറാജെനിസ് എന്നു പറയുന്നത്.

വർഗീകരണം


ക്ലാസ് - ഹൈഡ്രോസോവ: ജീവിതചക്രത്തിൽ പോളിപ് ഭരയും, മെഡൂസ ഭരയും ഇടവിട്ടുണ്ടാകുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭര ചുരുക്കുകയോ വീട്ടുകളയപ്പെടുകയോ ആകാം. ഇതിൽ അന്നനാളം വിഭജിക്കപ്പെട്ടതല്ല. റോയായോ, കോളണിയായോ ജീവിക്കുന്നു. ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കോളണികളും, പവിഴപ്പുറുകളും ഈ വർഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഉദാ:- ഹൈഡ്ര, ബെിലിയ, ഫൈസാലിയ, മില്ലിപ്പോറ, വിലെല്ല.

ക്ലാസ് - സ്കൈറോസോവ: മെഡൂസ ഭരക്കാണ് പ്രധാനവും; അന്നനാളം നാലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഉദാ:- റിലിയ, സയേന

ക്ലാസ് - ആന്റോസോവ: ഇവയിൽ പോളിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്നനാളം ആരോ, എട്ടോ ഇവയുടെ പെരുകങ്ങളോ ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഉദാ:- വിവിധതരം കടൽ അനിമോണകൾ, കോലുകൾ.

ക്ലാസ് - ഹൈഡ്രോസോവ: മിക്ക ഹൈഡ്രോസോവനുകളും, നിന്തിനിങ്ങു മെഡൂസകളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പോളിപ് കോളണികളാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ മെഡൂസകളും, ചില പവിഴപ്പുറുകളും പെടും. ഹൈഡ്രയും മറ്റു ചിലവയും ശുദ്ധജലജീവികളാണെങ്കിലും ബഹുദ്രാഭം ഹൈഡ്രോസോവനുകളും കടൽ ജീവികളാണ്.

മില്ലിപ്പോറ എന്ന കോളണിജീവിയുടെ അധിചർമ്മം പെരിസാർക്കിന പകരം ചുണ്ണാമ്പ് (കാൽസിയം കാർബണേറ്റ്) കൊണ്ടുള്ള വലിയ അസ്ഥികൂടം ഉല്പാദിപ്പിക്കും. ഈ അസ്ഥികൂടത്തിൽ പരക്കെ കാണുന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പോളിപ്പുകൾ പുറത്തേക്കു തള്ളിനിൽക്കുന്നത്. മില്ലിപ്പോറയെ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെ കടലോരങ്ങളിൽ സാധാരണമായി കാണാം.



ചിത്രം. 38. മൈസിലിയ.

1. ന്യൂമാറോഫോർ 2. ഡാക്ടൈലോസ്തോമിയം 3. ടെൻറാക്കിൾ
4. ഗാസ്ത്രോസ്തോമിയം 5. ഗൊണോസ്തോമിയം.

ഇത് ഉദ്ദേശം 30 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ വരെ വളരുന്നു. പവിഴപ്പുറുനിർമാണത്തിൽ ഇതിന് പ്രധാനമായൊരു പങ്കുണ്ട്.

ഹൈഡ്രോസോവയിലെ പ്രധാനമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് സൈഫൊനോഫോറ. ജലനിരപ്പിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇവയെല്ലാം കോളണി ജീവികളാണ്. സ്വയം നിന്നിക്കഴിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്ക് കുറവാണ്. സൂര്യസിദ്ധമായൊരുദാഹരണമാണ് പാർക്കിപ്പടക്കപ്പൽ (Portugese man of war) എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈസിലിയ. നിലനിറത്തിലുള്ള പൊന്തോട്ട കൂടിയ ഇവ




ഉഷ്ണമേഖലയിലെ പുറം കടലിൽ സാധാരണ കാണാം. കടലോരത്ത് ഇവ സാധാരണ വരാറില്ല. സൈഫൊനോഫോർ കോളണിയിലെ വ്യക്തികൾ ഘടനയിലും, പ്രവൃത്തിയിലും വളരെയേറെ സവിശേഷത ആർജ്ജിച്ചവയാണ്. ഫൈസാലിയക്ക് പൊന്തിക്കിടക്കവാൻ ബലൂൺ പോലെ ഒരു 'പൊന്ത്' ഉണ്ട്. വിശേഷവൽക്കരണം സംഭവിച്ച ഘടനയാണ് പൊന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റോഫോർ (pneumatophore). പൊന്ത് വാതകം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരതരം ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വാതകമുണ്ടാകുന്നത്. പൊന്താണ് മുഴുവൻ കോളണിയെയും പൊന്തിക്കിടക്കവാൻ സഹായിക്കുന്നത്. പൊന്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ചുരു (crest) യിൽ കാര്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ജീവി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പൊന്തിനടിയിൽ വിശേഷവൽക്കരണം സംഭവിച്ച പോളിപ്പുകൾ, പാറിപ്പിടിച്ച മെഡൂസകൾ, കൂടിപ്പിണഞ്ഞ നിണ്ട ഗ്രാഹികൾ എന്നിവയുണ്ട്. നിരവധി തന്തുശരങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രാഹികൾക്ക് 20 മീറ്റർ നീളമുണ്ടാകാം. വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ പോലും മറവിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവു് ഇവയ്ക്കുണ്ട്. പോഷക പോളിപ്പുകൾ അതായത് ആമാശയ-സുവോയിഡുകൾ (gastrozooids) കോളണിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം തേടുകയും ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനകസുവോയിഡുകൾ പ്രത്യുല്പാദനത്തിന് മാത്രമുള്ളവയാണ്. ഡാക്ടൈറ്റോലോസുവോയിഡുകൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വ്യക്തികളാണ്.

വിലെല്ലാ എന്ന സൈഫൊനോഫോറൻ കോളണിയെയും ഉഷ്ണമേഖല കടലുകളിൽ സുലഭമായി കാണാം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മെഡൂസയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. മുകൾഭാഗത്തുനിന്നും പായ (sail) പോലെ പൊന്തിനിൽക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അരികിന് ചുറ്റും ഒറ്റനിരം രംഗന (stinging) പോളിപ്പുകൾ (dactylozooids) കളുണ്ട്. അടിഭാഗത്ത് നിരവധി ജനകപോളിപ്പുകൾ വളരുന്നു. എന്നാൽ അടിഭാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി ഒരു വലിയ പോഷകപോളിപ്പാണുള്ളത്.

സ്പൈറോസോവ

മിക്ക ജെല്ലിമത്സ്യങ്ങളും ഇതിൽപ്പെട്ടവയാണ്. വലിപ്പത്തിൽ ഇവ 2 സെമീ വ്യാസമുള്ളവ മുതൽ അനേകം സെ. മീ. വ്യാസമുള്ളവ വരെയാകാം. ഹൈഡ്രോസോവയുടെ മെഡൂസയിലുള്ള വീലം എന്ന അവയവം ഇവയ്ക്കുണ്ട്. അതിന് പകരം ആമാശയനാൽ (gastric filament) എന്ന അന്തർഗ്ഗാഹിയുണ്ട്. ആമാശയസിരാഗുഹ ഭിത്തികൾ (septa) കൊണ്ട് ഒരു മധ്യആമാശയവും നാല് ആമാശയസഞ്ചി (pouch) കളുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെഡൂസയുടെ വക്ക് കർണിത (lobulated)മാണ്.

മധ്യശ്ലേഷ്മരം (mesogloea) ഹൈഡ്രോസോവയുടെതിനെക്കാൾ കട്ടി കൂടിയതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ബാഹ്യചർമ്മത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച നിരവധി നാളകളും അമീബ പോലുള്ള കോശങ്ങളും കാണാം. ഈ കൂട്ടത്തിലെ മിക്ക അംശങ്ങളെയും മെഡൂസരൂപത്തിൽ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അവയുടെ ജീവനചക്രത്തിൽ പോളിപ് അവസ്ഥയുള്ളതായി ഇതുവരെ അറിയില്ല.



ചിത്രം. 39. ജീവിത-ചരിത്രം.

സികതാബ്ദം ആദ്യം ഹൈഡ്രാറൂപം പ്രാപിക്കുന്നതും, പിന്നീട് ഖണ്ഡനം സംഭവിച്ച നിരവധി സ്വതന്ത്രമെഡ്യൂസകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

കടവക്കൽ മാംസപേശികൾ സുവികസിതമാണ്. നീന്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോരണോയിഡ് മാംസപേശികളാണിവ. ഈ മാംസപേശികളിൽ വികസിതമായ ഒരു നാഡീജാലമുണ്ട്. ഭിമനാതകളുള്ള ഈ നാഡീവൃഹത്തെ പരിധിയാനാഡീജാലം (circumferential plexus) എന്നു വിളിക്കുന്നു. കടയുടെ വക്കിൽ സമുദാർത്ഥമായി വർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും സ്റ്റാറോസിസ്റ്റുകൾ കാണാം. ഇവയ്ക്കുള്ളിലെ കോശങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള സംതുലനാശ്മകളെ (statolith) നിർമ്മിക്കുന്നു. സ്റ്റേറോലിത്ത് സംതുലനാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവയവമാണ്.


സ്കെലോസോവയിലെ മിക്ക ജീവികളും ഏകലിംഗി (dioecious) കളാണ്. അതായത് ആൺ പെണ്ണു വെവ്വേറായാണ്. അന്നശ്ചർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ലൈംഗികാവയവങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ആമാശയത്തിലേക്കു വിമോചി

പിടിക്കുന്ന ബിജുങ്ങൾ വായ വഴി പുറത്തെത്തുന്നു. അണ്ഡവും പുംബിജവും സംയോജിച്ചുണ്ടാവുന്ന സിക്താബ്ബം 'പ്ലാനല' എന്ന ലാർവയായിത്തീരുന്നു. 'പ്ലാനല' അനുയോജ്യമായ അടിത്തട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനു (settle) ശേഷം കാഹള (trumpet) ത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സ്കെലോസ്റ്റോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോളിപ്പായി മാറുന്നു. ഇതു കറുകെ ചെറുവണ്ഡങ്ങളായി മുറിഞ്ഞു എഫെറ എന്ന ലാർവകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു. ഇവ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അടൻ വീഴുകയും, വെച്ചേറ ചെഡുസകളാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എഫെറകൾ ചെറിയ തളിക പോലുള്ള നിന്നിനടക്കുന്ന മെഡുസകളാണ്. ഇവ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളർന്ന് വലിയ മെഡുസകളായിത്തീരും. ചില കാലങ്ങളിൽ തളികകൾ അടുക്കിവെച്ചതുപോലെ നിരവധി എഫെറകളെ ഒരു സ്കെലോസ്റ്റോമയിൽ കാണാം.

ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന സ്കെലോസോവൻ മെഡുസയാണ് *ജെറിലിയ* അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ഞാമ്പോതു്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ശരീരത്തിന് ഇളം മഞ്ഞനിറമാണ്. പരന്ന അടിഭാഗത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിലുള്ള നാലു മൂലയുള്ള വായയുടെ ഓരോ മൂലയും കൈ പോലെ നീണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. *ജെറിലിയ* 5 സെമീ മുതൽ 30 സെമീ വരെ പല വലുപ്പത്തിൽ വളരുന്നു. ഇളുപ്പത്തിൽ *സയേനിയ* ഒരു ഭീമാകാരനാണ്. ഓറഞ്ചോ, നീലയോ നിറമുള്ള ഇവയെ വടക്കെ അറാബ്‌ലാൻറിക്സിൽ കാണാം. രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ *സയേനിയ* നാലു മീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട്. അതിന്റെ ഗ്രാഹികളുടെ നീളം 35 മീറ്റർ വരെയുമാവാം.

ആനോസോവ (കടൽപുക്കർ)

കടൽപുക്കിനു് (sea anemone) തടിച്ച് മാംസളമായ ശരീരമുണ്ട്. തുൺ പോലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരന്ന മുകൾഭാഗം മുഖീയഫലകം (oral disc) ആണ്. മുഖീയഫലകത്തിൽ പല വലയങ്ങളിൽ നിരത്തിയ പൊള്ളയായ ഗ്രാഹികളുടെ നടുവിലാണ് വെറും വിടവുപോലുള്ള വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അടിഭാഗത്തു് മൂലവും, മാംസളവും, വഴുവഴുപ്പുള്ളതുമായ ആധാരഫലകം ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് കടൽപ്പു സാവധാനത്തിൽ വഴുതി സഞ്ചരിക്കുന്നതും, പാറപ്പുറത്തു് ബലത്തിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നു വർത്തിക്കുന്നതും. വായയിൽ നിന്ന് പരന്നതും മാംസളവുമായ അന്നനാളം (gullet) ആമാശയസിരാഗുഹയിലേക്കു നയിക്കുന്നു. അന്നനാളത്തെ ശരീരഭിത്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഭജകങ്ങൾ (septa) ഉണ്ട്. ഇവയാണ് പ്രാഥമികവിഭജകങ്ങൾ (primary septa). ഇതിനു പുറമേ അപൂർണ്ണമായ ദ്വിതീയവും, തൃതീയവുമായ വിഭജകങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഇവ ശരീരഭിത്തിയിൽ നിന്ന് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഏതാനും ദൂരം വരെ മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാഥമിക വിഭജകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അറകൾ അന്നനാളത്തിന്നു താഴെ അന്ത്യോന്ത്യം ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അന്നനാളഭാഗത്തു് വിഭജകങ്ങളിലുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ ദ്വാരങ്ങൾ (ostia) വഴി മാത്രമാണ് ഇവ തമ്മിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത്.



ചിത്രം. 40. കടൽപ്പൂവ് (അനിമോൺ)

1. വായ 2. ടെൻറക്കിളുകൾ 3. എപിസ്റ്റോം 4. ആധാരം

വിഭജകങ്ങൾക്കു നടുവിൽ ജെല്ലിയം, അകത്തും പുറത്തും അന്തർധരവുമാണ്. ഇവ ഫേനതലം (പ്രതലം) വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്നു. വിഭജകങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വശത്തുനിന്നും ആമാശയനാളുകൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഫേനഎൻസൈമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരാളം ഗ്രന്ഥികോശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രയെപ്പോലെ ഇവയിൽ അന്തർധാരകോശങ്ങൾക്കകത്താണ് ഫേനം പൂർത്തിയാകുന്നത്. അന്നാളും ഉണ്ടുതല്ല; മറിച്ചു പരന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒരറ്റത്തോരണ്ടറ്റത്തുമോ നിളത്തിലൊരു ചാലുണ്ടായിരിക്കാം. ഇവയിൽ ധാരാളം സിലിയങ്ങൾ കാണാം. ഈ സിലിയങ്ങൾ അന്നനാളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്തുള്ളവയേക്കാൾ നീളം കൂടിയവയാണ്. സിലിയങ്ങളുടെ ചലനം മൂലമാണ് കടൽപ്പൂവിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇതേസമയം അന്നനാളത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സിലിയങ്ങൾ നേരെ എതിർവശത്തേക്ക് ചലിച്ചു അന്നനാളത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടി മറ്റൊരു ജലപ്രവാഹമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതു കാരണം

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്കു പോകുന്നു. ചെറിയൊരു ജീവി മുട്ടി യാലുടൻ ഗ്രാഹികളിലെ സിലിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നേരെ വിപരീതരീതിയിലായിത്തീരും. അന്നനാളത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടിയുള്ള ജലപ്രവാഹത്തിൽ ഇറയെ ഭഹനഗഹപരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഏറ്റവുമധികം വിശേഷവൽക്കരണം സംഭവിച്ച പോളിപ്പുകളുള്ള സിലന്ററോകൾ കടൽപ്പുറുകളാണ്. ഇവക്ക് നല്ല പോലെ വികസിച്ച നാഡീ വലയവും, മാംസപേശികളുമുണ്ട്. അന്തർധാരത്തിനും ബഹിർധാരത്തിനുമിടക്കുള്ള മധ്യകലയും വളർച്ച പ്രാപിച്ചതാണ്. പല തരത്തിൽ വിശേഷവൽക്കരണം വന്ന മാംസപേശികളും വെവ്വേറെയുണ്ട്. വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന മാംസപേശികൾ സങ്കോചിച്ചാൽ ശരീരം ഇടുങ്ങിയതാവുകയും തൽഫലമായി നീളം വെക്കുകയും ചെയ്യും. വായ മുതൽ ആധാരഫലകം വരെ നീളത്തിലുള്ള മാംസപേശികൾ പല കൂട്ടങ്ങളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ ഓരോ വിഭജകത്തിലും ഓരോന്നു എന്ന നിലയിലാണ് നിറത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവ സങ്കോചി



1



2



3

ചിത്രം. 41. വിവിധതരം പവിഴപ്പുറുകൾ

1. പരപ്പൻപുറുകൾ 2. പ്രതിരോധപ്പുറുകൾ 3. അറ്റോറാർ.

ചാൽ മുഖീയഫലകവും ഗ്രാഹികളും അകത്താകും. തൊട്ടുതാഴെയുള്ള, വട്ടത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മാംസപേശി തുടന്ന് സങ്കോചിച്ചു് ഈ ദ്വാരവും അടയ്ക്കുന്നു. ഈ വിധം സങ്കോചിച്ച അവസ്ഥയിൽ കടൽപ്പുക്കൾക്ക് പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.


കടൽപ്പുറുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അലൈംഗികപ്രജനനം (asexual reproduction) നടത്തുവാൻ കഴിയും. ലൈംഗികപ്രത്യുല്പാദനത്തിന് ബീജങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാവുന്നത്. ബീജങ്ങൾ വായിൽക്കൂടി പുറത്തുവന്ന് വെള്ളത്തിൽ സേകം (fertilization) നടക്കുന്നു. സിക്താഞ്ചം വികസിച്ചുണ്ടാകുന്നത് പ്ലാനല ലാർവയാണ്. ഇവ ക്രമേണ കടലിനടിയിലേക്ക് താണു് കടൽപ്പുവായി വളരുന്നു.

പവിഴപ്പുറുജന്തുക്കൾ കോളണിജീവികളായ ചെറുകടൽപ്പുക്കളാണ്. ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പുകൽകല്ലുകളിലേയ്ക്കു പോളിപ്പുകളെ പിൻവലിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കല്ലിന്റെ ഭിത്തികളിൽ നിന്ന് ബാഹ്യാക്രമണത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനായി കത്തനെയുള്ള പലകൾ ഉള്ളിലേയ്ക്കു് ഉന്തിനില്ക്കുന്നു. വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി ഇടവിട്ടാണ് ഇവയുണ്ടാകുക. ഏകാന്തജീവികളായ പവിഴപ്പുറു ജന്തുക്കളെ ശീതമേഖലാ കടലുകളിൽ കാണുമെങ്കിലും കോളണി ജീവിതം നയിക്കുന്ന പവിഴപ്പുറു ജീവികളെ ധാരാളമായി ഉഷ്ണമേഖലയിലാണ് കാണുന്നത്.

പവിഴപ്പുറു പാറക്കെട്ടുകൾ (coral reefs) മൂന്നു തരത്തിലുള്ളവയാണ്. പരപ്പൻപുറുകൾ (fringing reefs) ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണുണ്ടാവുക. ഇവയും കടലോരവും തമ്മിൽ വളരെക്കുറച്ച അകലമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ന മാത്രമല്ല വേലിയിറക്കത്തിൽ ഇവയിലേക്കു കരയിൽനിന്നു നടന്നുപോകാം. പ്രതിരോധപ്പുറുകളും (barrier reef) തീരത്തോടു സമാന്തരമായിട്ടാണ് കാണുകയെങ്കിലും ഇവയ്ക്കും ആന്തേലിയാ വൻകരയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തിലെ വിസ്തൃതമായ ഗ്രോൺ ബാരിയർ റീഫ് പ്രതിരോധപ്പുറാന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. പുറാരിനും തീരത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള തോട്ടിന്ന് വളരെ ആഴമുണ്ട്. അറോറുകൾ (പവിഴ ദ്വീപ്) വൃത്താകൃതിയിൽ നടുവിൽ ഒരു ഉൾക്കടലോടു കൂടിയവയാണ്. ദക്ഷിണശാന്തസമുദ്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനു അറോറുകളുകൾ (പവിഴദ്വീപുകൾ) കാണാം. നമുക്കു തീരത്തിന് സമാന്തരമായി കിടക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപുകൾ അറോറുകളാണ്.

പവിഴപ്പുറുപാറക്കെട്ടുകൾ എങ്ങിനെയാണുണ്ടായതു് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനാണ് ഇന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം. പരപ്പൻപുറുകളുള്ള ഒരു ദ്വീപ് സാവധാനം കീഴ്പോട്ടു് താഴുന്ന എന്നു കരുതുക. അപ്പോൾ ദ്വീപിന്റെ വിസ്താരം കുറയുകയും അതിന്നു പുറാരിനുമിടയ്ക്കുള്ള ചാലു് ആഴമേറിയതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നാൽ പാപ്പൻ പുറുകൾ ക്രമേണ പ്രതിരോധപ്പുറുകളാമാറുന്നു. കാലാനുരത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയയുടെ അവസാനദശയിൽ ദ്വീപ് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു് വരാം. നടുവിൽ ഉപ്പു ജലതടാകമുള്ള വൃത്താകാരമായ പുറു

കർമാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണു് പവിഴഭവീകൃതമാകുന്നതു്.



ചിത്രം 42. മറ്റു ചില ആന്തോസോവനകൾ. A. കാവർന്നലാരിയ, (മുഴുവി). B. ചെന്നാറ്റല-ഇടത്തു മുഴുവി; വലത്തു് ഒരു 'ഇല' വിപുലമാക്കിയതു്.

കടൽപ്പുക്കളും പവിഴപ്പുറങ്ങളുക്കളും ആന്തോസോവയിലെ സുആന്തോയി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണു്. ഇവയുടെ ഗ്രാഹികളും വിഭജകങ്ങളും

ജന്തുശാസ്ത്രപ്രവേശം-1

ആറോ ആറിന്റെ പെന്തക്കങ്ങളോ ആയിട്ടാണ് കൂമികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൽ സിയോണേറിയ (Alcyonaria) എന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയിൽ എപ്പോഴും എട്ടു ശാഖിതഗ്രാഹികളും എട്ടുവിജ്ജേകങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയിലെ മിക്ക ജന്തുക്കളും കോളണിജീവികളാണ്. മാത്രമല്ല, കോളണിയിലെ എല്ലാ വൃത്തികളും തമ്മിൽ അന്തർവർദ്ധാലുകൾ വഴി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഇവയുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ദേഹത്തിലെ ഉദ്ദേഹകളിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്നു. ഇവ കൊമ്പുമയമോ (horny) ചുണ്ണാമ്പുമയമോ ആയ പദാർത്ഥം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറുതരികളാണ്. ചില ജീവികളിൽ അസ്ഥികൂടം ദൃഢമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെയുള്ളവയാണ് പവിഴപ്പുറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കടൽവിശറി (Gorgonia) കടൽപ്പേന്ത (Pennatula) വിലമതിക്കാനാവാത്ത ചുവന്ന പവിഴം (Corallium) ഇവയെല്ലാം സുവാന്തേരിയയിൽപ്പെട്ടവയാണ്.


ഫൈലം റാഡിയോഫോറ-കടലടയ്ക്കുകൾ

കടലടയ്ക്കുകളും ചീർപ്പു ജെല്ലികളും ഉൾപ്പെട്ടതാണീ വിഭാഗം. കടലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉദ്ദേശം നൂറു സ്പീഷീസുകളേയുള്ളൂ. ഇവയ്ക്ക് ബാഹ്യസ്തരം (ectoderm), മധ്യസ്തരം (mesoderm), അന്തസ്തരം (endoderm) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു നിര കോശങ്ങളുണ്ട്. "മാംസകോശങ്ങളെല്ലാം മധ്യസ്തരത്തിലാണ്. അരീയസമമിതിയും (radia symmetry) ദ്വിപാർശ്യസമമിതിയും (bilateral symmetry) റാഡിയോഫോറയിൽ കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നു. *പ്ലൂറോബ്രാങ്കിയ* എന്ന റാഡിയോഫോറിന് നെല്ലിക്കായുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവുമുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ കടൽനെല്ലിക്കയെന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാം. ദേഹം തികച്ചും സുതാര്യമാണ്. ദേഹത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തു് ഒരു ദ്വാരമുണ്ട്. ഈ ദ്വാരം തന്നെയാണ് വായയും ഗുദവും. മുകൾഭാഗത്തു് സംതുലനപ്പുടി (statocyst) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു വായയിൽ ചെന്നുവസാനിക്കുന്ന എട്ടു ചീർപ്പുപ്പോറുകൾ (comb-plates) ദേഹത്തിനു ചുറ്റും തുല്യദൂരത്തിൽ കാണാം. ഈ പ്പോറുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കടൽ നെല്ലിക്കുകൾ നീന്തുന്നത്. ദേഹത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും രണ്ടു കഴികളിൽ നിന്നു് രണ്ടു നീണ്ട തൂവൽ പോലുള്ള ഗ്രാഹികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഇരപിടിക്കാൻ പയോഗിക്കുന്ന ഇവയെ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ കഴികളിലേയ്ക്കു വലിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ഗ്രാഹികളുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ തന്തുശരണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് പശക്കുട്ടക്ക (colloblast) കളാണുള്ളതു്.

ആമാശയസിരാഗന്ധാരം (coelenteron) ഒരു പറ്റം അറകളും ചാലുകളുൾപ്പെട്ടതാണ്. ബാഹ്യസ്തരത്തിനും അന്തസ്തരത്തിനുമിടയ്ക്കു് ജെല്ലി പോലുള്ള ഒരു പദാർഥമുണ്ട്. ഇതിലാണ് നാഡീവല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ റാഡിയോഫോറുകളും ഉഭയലിംഗികളാണ്. സിക്താബ്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാർവകൾ വികസിച്ചു മുതിർന്ന കടലടയ്ക്കുകൾ ആയിത്തീരുന്നു.

റാഡിയോഫോറകളെല്ലാം ഉരണ്ടവയല്ല. ഉദാഹരണമായി *സെസ്റ്റം* (വീന

സ്ലീന്റെ അംഗം) - ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്റർ നീളവും 5 സെ. മീ. വീതിയുമുള്ള നാട പോലെയിരിക്കും. മേല്പറഞ്ഞവയെല്ലാം കടലിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്നവയാണ്. ബീജം എന്ന റാറനോഫോറാകട്ടെ കടലിനടിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ അനുവർത്തകമായി ഇതിന്റെ ദേഹം പരന്നതാണ്. ഇതിന് ഗ്രാഹികൾ ഇല്ല.



ചിത്രം 43. കടലടയ്ക്ക (റാറനോഫോർ) 1. ടെൻറക്കിൾ. 2. ചിർപ്പുവരികൾ. 3. സ്റ്റോമോഡേയം. 4. വായ. 5. അപമുഖ സംവേദാവയവം.

ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്


സിലൻററോയിൽ പെടാത്ത മറ്റു ബഹുകോശജീവികളുടെ ശരീരം മൂന്ന് കോശസ്തരങ്ങളാൽ നിർമിതമാണ്. ബാഹ്യസ്തരം (ectoderm), അന്തസ്തരം (endoderm), ഇവ രണ്ടിനും ഇടക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മധ്യസ്തരം (mesoderm) എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്നു സ്തരങ്ങൾ. ഇത്തരം ബഹുകോശ ജീവികളെ ത്രൈസ്തരജീവികൾ അഥവാ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് (triploblastic) ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു. സിലൻററോ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ബഹുകോശജീവികളെല്ലാം തന്നെ ത്രൈസ്തരജീവികളാണ്.

ത്രൈസ്തരഘടനയുടെ ലളിതരൂപങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്, പുഴക്കുൾ (worms) എന്ന പൊതുനാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവികളിലാണ്. പുഴക്കുൾ എന്ന നാമം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളെ മൂന്ന് തരമായി വിഭജിക്കാം. ബാഹ്യരൂപം, ദേഹഗുഹയുടെ (coelom) പ്രകൃതി എന്നീ രണ്ടു മുഖ്യഘടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് തരംതിരിവ് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുഴക്കുളിലെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. പരന്ന പുഴക്കുൾ (flat worms): ഇവയുടെ ശരീരം ഇല പോലെ പരന്നതാണ്. ദേഹഗുഹയില്ല. എക്ടോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അയഞ്ഞ രീതിയിൽ അടുക്കപ്പെട്ട മീസോഡേം കോശങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പുഴക്കുളെ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് (platyhelminthes) എന്ന ഫൈലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. അഖണ്ഡപുഴക്കുൾ (unsegmented worms): നീണ്ടു, ഉരുണ്ടു, രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരരൂപമാണ് ഈ പുഴക്കുൾക്ക് ഉള്ളത്. ദേഹം ഖണ്ഡിതമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇവയിൽ ഒരു ദേഹഗുഹയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു കപടദേഹഗുഹ (pseudocoel) ആണ്. നിർവചനവിധിപ്രകാരം, ഒരു യഥാർത്ഥ ദേഹഗുഹ (true coelom) ൽ ഒരു ബാഹ്യാവരണവും ഒരു ആന്തരാവരണവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ട് ആവരണങ്ങളും മീസോഡേമിനാൽ നിർമിതവുമായിരിക്കണം. ബാഹ്യാവരണം എക്ടോഡേമിന് ഉള്ളിലായും, ആന്തരാവരണം എൻഡോഡേമിന് തൊട്ട് പുറത്തായും ആണ്

സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടതു്. ഈ രണ്ടു് ആവരണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ദേഹഗുഹ ഒരു യഥാർത്ഥ ദേഹഗുഹയല്ല; കപടദേഹഗുഹയാണു്.



ചിത്രം 44. പുഴക്കുളിലെ ത്രൈസ്തോലടന്തും ദേഹഗുഹയുടെ വികസനവും.

A. പരന്നപുഴ—ദേഹഗുഹാരഹിതം B. അഖണ്ഡപുഴ—കപടദേഹഗുഹയുള്ളവ. C. സഖണ്ഡപുഴ—യഥാർത്ഥദേഹഗുഹയുള്ളവ.
1. എന്റേറിയോ 2. എക്ടോറിയോ 3. മിസോഡോ 4. കപടദേഹഗുഹ 5. യഥാർത്ഥദേഹഗുഹ.

അഖണ്ഡപുഴക്കുളിൽ എന്റേറിയോലേമിസ് ചുറ്റും മിസോഡോ ആവരണം കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണു് ഇവയിലുള്ള ദേഹഗുഹയെ, കപടദേഹഗുഹ എന്നു് വിളിക്കുന്നതു്. ഇത്തരം പുഴക്കുളെ (ഉദാ: വെറ, കുമി) ഫൈലം ആഷ്കെൽമിത്തസ് (phylum aschelminthes) എന്ന വർഗത്തിലാണു് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു്. മേൽപറഞ്ഞ അഖണ്ഡപുഴക്കുൾക്കു് പുറമെ, കപടദേഹഗുഹയുള്ള മറ്റനേകം ജീവികളും - റോട്ടീഫെറ (rotifera), കൈനോ

റിക (kinorhyncha), ഗാസ്ട്രോട്രിക്ക (gastrotricha) എന്നിവ ഈ ഫൈലത്തിൽ പെട്ടു എന്ന വസ്തുത സ്മരണീയമാണ്.

3. സഖണ്ഡപുഴക്കര (segmented worms): ഇവയുടെ ശരീരം അവണ്ഡപുഴക്കളെതു പോലെ തന്നെ നിണ്ഡ്, ഉരുണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നിരവധി ഖണ്ഡങ്ങളാൽ (segments) നിർമിതമാണ്. ഇവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ ദേഹഗുഹയുണ്ട്. ഇത്തരം പുഴക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് അന്നെലിഡ (annelida) എന്ന ഫൈലത്തിലാണ്.

ഫൈലം പ്ലാറിയെൽമിനസ്

ഈ ഫൈലത്തിൽ പെട്ടവ പുഴക്കളുടെ ദേഹം പരന്നതാണ്. അവയുടെ ദേഹത്തിൽ മുൻഭാഗം (anterior end), പിൻഭാഗം (posterior end), മുകൾഭാഗം (dorsal side), അടിഭാഗം (ventral side) എന്നിവ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അവയവങ്ങൾ ദേഹത്തിന്റെ ഇടതും വലതും ഭാഗങ്ങളിൽ സമമിതമായി അടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അഥവാ ഈ ജീവികൾ ദ്വിപാർശ്വസമമിതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ദേഹഗുഹ ഇല്ല. അതിനാലാണ് ഈ ജീവികളെ ദേഹഗുഹരഹിതർ (acoelomates) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്സോഡേമിനം എൻഡോഡേമിനം, ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ, അയഞ്ഞ രീതിയിൽ സംഘടിതമായ മീസോഡേംകോശങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം മീസോഡേം കോശങ്ങളെ പാരെൻകൈമ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്.

ദേഹവ്യൂഹം (അത് ഉള്ള ജീവികളിൽ) ശാഖിതമായി ദേഹത്തിനുള്ളിലാകെ പടർന്ന് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഈ വ്യൂഹത്തിന് വായ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗുദോരമില്ല. പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹവും ഇല്ല. വിസർജനവ്യൂഹം (excretory system) ശാഖിതവും ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാൽ—ഈ കോശങ്ങളെ ജ്വാലകോശങ്ങൾ (flame cells) എന്ന് വിളിക്കുന്നു—നിർമിതവുമാണ്. ശ്വാസനം വിസരണം വഴി നടക്കുന്നു. നാഡീകോശങ്ങളാൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക നാഡീവ്യൂഹം ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് എക്സോഡേമിൽ നിന്ന് വേർ തിരിഞ്ഞു (ഫൈഡായിൽ നാഡീവ്യൂഹം എക്സോഡേമിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു) അന്തർഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മുൻഭാഗത്തു് നില കൊള്ളുന്ന മസ്തിഷ്ക ഗാംഗ്ലിയോണുകളും അവയിൽ നിന്ന് ഉരുളവിച്ച് ദേഹത്തിനു നെട്ടുകെ കിടക്കുന്ന അനുഭവദർഘ്യനാഡികളും ചേർന്നതാണ് നാഡീവ്യൂഹം. പുരുഷജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും സ്ത്രീജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരേ വ്യക്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതായത് ഈ ജീവികൾ ഉഭയലിംഗി (hermaphrodite) കളാണ്.

ഈ ഫൈലത്തിൽപ്പെട്ട നല്ലൊരു വിഭാഗം സ്പിഷിസുകളും പരജീവികളാണ്. എന്നാൽ ക്ലാസ് ടർബല്ലേറിയ (Class Turbellaria) യിൽ പെട്ടവ സ്വതന്ത്രജീവികളായി (freeliving forms) കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഇവയെ കടലിലും ശുദ്ധജലത്തിലും കരയിലും കണ്ടുവരുന്നു.

ഈ ഫൈലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കമ്പ്രസിഡ പരജീവിയാക നാടപ്പുഴവിന്റെ വിവരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നാടപ്പുഴ. (Tape-worm)


മനുഷ്യന്റെ ചെറുകടലിൽ നിവസിക്കുന്ന ഒരു ആന്തരപരാജീവിയാണ് (endoparasite)—(നാടപ്പുഴ നാടവരെ, നാടകൃമി). സാധാരണയായി രണ്ട് സ്പീഷി സുകളെയാണ് മനുഷ്യനിൽ കണ്ടു വരുന്നത്; പന്നിമാംസം വഴി കടലിലെത്തുന്ന *ടിനിയ സോളിഡം*, ഗോമാംസം (beef) വഴി എത്തുന്ന *ടിനിയ സജിനേറ* എന്നിവ.

ശരീരാവടന

വെളുത്തു് പരന്നു് നാട പോലെ നിണ്ടു കിടക്കുന്ന ശരീരമാണു് ഈ ജീവികളുള്ളതു്. രണ്ടു മീറ്റർ മുതൽ അഞ്ചു മീറ്റർ വരെ നീളം കാണാം. ശരീരം നിരവധി ഖണ്ഡങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണു്. ജീവിയുടെ മുൻ അഗ്രം കൂത്തു്, ചെറുതായി, വീതി കറുത്തിരിക്കാം. പിന്നോട്ടു് ചെല്ലുന്തോറും ഖണ്ഡങ്ങൾക്കു് വലുപ്പവും വീതിയും ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം. ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ ഭാഗം പിൻ അഗ്രമായിരിക്കാം. മുൻ അഗ്രത്തിൽ മൊട്ടു സൂചിയുടെ മൊട്ടിനോളം വലുപ്പമുള്ള (1 മീ. മീ. വ്യാസമുള്ള) ഒരു ഭാഗം കാണാം. ഈ അവയവത്തിനു് സ്കോളെക്സ് എന്നാണ് പേരു്. സ്കോളെക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്, നാടപ്പുഴ കടലിനുള്ളിൽ ദൃഢതയോടെ പിടിച്ചുതുങ്ങുന്നതു്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി സ്കോളെക്സിൽ അംകുശങ്ങളും (hooks) സക്കുകൾ (suckers) ഉണ്ടു്. സ്കോളെക്സിന്റെ തലപ്പത്തു് കോൺ (cone) രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനു് റോസ്റ്റല്ലം (rostellum) എന്ന് പറയുന്നു. റോസ്റ്റല്ലത്തിന്റെ പിൻ അതിർത്തിരേഖയിൽ, സ്കോളെക്സിനു് ചുറ്റും; രണ്ടു് നിരയായി 26—28 അംകുശങ്ങൾ അണിനിരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു് പിന്നിലായി, നാലു് വശത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാലു് സക്കുകൾ ഉണ്ടു്. അംകുശങ്ങൾ മുളളുകൾ പോലെ കടലിനകത്തു് കൊളുത്തുന്നു; സക്കുകൾ അള്ളിപ്പിടിച്ചു് നിൽക്കാൻ ഉതകുന്നു.


സ്കോളെക്സിനു് തൊട്ടു പിന്നിലായി അഖണ്ഡിതമായ ഒരു ചെറുഭാഗം കാണാം. ഇതിനു് കഴുത്തു് എന്ന് പറയാറുണ്ടു്. കഴുത്തിന്റെ പിൻ ഭാഗം വിഖണ്ഡനം ചെയ്താണു് പുതിയ ഖണ്ഡങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. നൂതനഖണ്ഡങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തോടുകൂടി പുഴുവിന്റെ നീളം കൂടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, പുഴുവിന്റെ പിൻ അഗ്രത്തിലുള്ള വലുപ്പം കൂടിയ ഖണ്ഡങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും, അവ മനുഷ്യമലത്തോടൊപ്പം പുറത്തുള്ളപ്പോഴുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ മുൻഭാഗത്തു് നൂതനഖണ്ഡങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പിൻഭാഗത്തു് ഖണ്ഡങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

കഴുത്തിനു് തൊട്ടു പിന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖണ്ഡം ഡക്റൂംഖലക്കു് സ്കോബില എന്ന് പറയുന്നു. സ്കോബിലയിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിനും പ്രോട്രോട്ടിഡ് എന്നാണ് പേരു്. കഴുത്തിൽ നിന്നു് നൂതനപ്രോട്രോട്ടിഡുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കു് സ്കോബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. കഴുത്തിനു് തൊട്ടു പിന്നിലായി കിടക്കുന്ന ഖണ്ഡങ്ങളിൽ (ഏകദേശം 200-ാം ഖണ്ഡം



ചിത്രം 45. *ടിനിയ സോളിയം*—ഇടുത്തുവരത്തു മുഴുജീവി; വലത്തു വശത്തു തല വലുതാക്കിയതു്. 1. കൊളുത്തു 2. സക്കർ 3. കഴുത്തു വരെ) ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഇവയെ അപരിവക്ത പ്രോട്ടോട്ടിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതന്തരാ ഖണ്ഡം മുതൽ ഏകദേശം 650—ാം ഖണ്ഡം വരെയുള്ള പ്രോട്ടോട്ടിഡുകളിൽ ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയിരിക്കും. ഇവയിൽ 200-300ൽ പുരുഷ ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമേ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയിൽ പുരുഷഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളും സ്ത്രീജനഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളും വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കും. ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള പ്രോട്ടോട്ടിഡുകളെ പരിവക്തപ്രോട്ടോട്ടി


ധൂകർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് തൊട്ടു ചിറകിലുള്ള (അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തുള്ള) ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഉല്പാദനേന്ദ്രീയങ്ങൾ നശിക്കുകയും, സിക്താണു് ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗർഭാശയസഞ്ചി (uterine bag) മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ഖണ്ഡങ്ങളെ ഗ്രേവിഡ് പ്രോജോട്ടീഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു.



ചിത്രം 46. A. പരിപക്വമായ പ്രോജോട്ടീഡ് (അനുഭവേച്ഛാപരിച്ഛേദം). പ്രത്യുല്പാദനാവയവങ്ങൾ കാണാം.

1. സിറസ് 2. ജനനാഗഭാരം 3. യോനി 4. ശുക്രസ്പികരണസഞ്ചി 5. അണ്ഡവാഹിനി 6. ഉരഭൈവ് 7. മെഹ് ലിസിന്റെ ഗ്രന്ഥി 8. പീതകഗ്രന്ഥി 9. വിസർജനകഴൽ 10. നാഡി 11. പുഞ്ചിജക്കുഴൽ 12. ഗർഭാശയം 13. അണ്ഡാശയം 14. വൃഷണം

നാടപ്പുഴവിന്റെ ശരീരമാകെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായ ഒരു ബാഹ്യാവരണമുണ്ട്. ഈ ആവരണം, പരജീവിയുടെ




ചിത്രം 46. B. അബ്ബനിർഭരമായ പ്രോസ്റ്റോട്ടിയസ് (ശാഖിതമായ ഗർഭാശയം ഖണ്ഡം നിറഞ്ഞതിൽക്കുന്നു)

15. അബ്ബനിർഭരമായ ശാഖിതഗർഭാശയം 16. ജനനാംഗ ഓരം.

ശാിരത്തെ, ആതിഥേയനായ മനുഷ്യന്റെ ദഹനരസങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ആവരണം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പരാജീവിയുടെ ദേഹം കടലിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടുമായിരുന്നു. കൂട്ടിക്കിളിന് തൊട്ട് ഉള്ളിലായി ഒരു നിറ എപിത്തിലിയ കോശങ്ങൾ അബ്ബനിർഭരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എപിത്തിലിയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ അയഞ്ഞ രീതിയിൽ അഥവാ ശൃംഗമായി അടുക്കപ്പെട്ട പാരെൻകൈമ കോശങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേഹഗുഹയില്ല. പാരെൻകൈമ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യ

ത്തിൽ മുക്തർ ഭാഗത്തും ചുവട്ടിലുമായി രണ്ടു നിര അനുപ്രസ്ഥപേശിത്തന്തുക്കൾ (transverse or circular muscle fibres) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവ കൂടാതെ ചില അനുഭവദർശ്യ പേശിത്തന്തുക്കളും അവിടവിടെ കാണാം. ഈ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പേശിത്തന്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്, പുഴ ദുർബലമായ ചലനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപറഞ്ഞ അനുപ്രസ്ഥപേശിത്തന്തുനിരകൾ പാരെൻകൈമ പ്രദേശത്തെ രണ്ടു മേഖലകളായി വേർപെടുത്തുന്നു; മുകളിലെയും ചുവട്ടിലെയും നിരകൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അന്തർമേഖലയും അവയ്ക്കു രണ്ടിനും പുറമെ കിടക്കുന്ന ബാഹ്യമേഖലയും. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്തർമേഖലയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.



ചിത്രം 47. ടിനിയ സോളിയ (പരിവക്ചമായ പ്രോസ്റ്റോട്ടീഡ്-അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം.)

1. വിസർജനക്കുഴൽ 2. വൃഷണം 3. ഗർഭാശയം 4. അണ്ഡാശയം 5. വർത്തിപേശി 6. അണ്ഡവാഹിനി 7. നാഡിത്തന്തു.


ഭവനം

ദഹിച്ച ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യക്കുടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പരജീവിക, പ്രത്യേക ദഹനാവയവങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതിനാൽ, ഈ പുഴവിനു ദഹനാവയവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ആതിഥേയന്റെ കുടലിൽ നിന്ന് പോഷകാംശങ്ങൾ വിസരണം വഴിയാണ് പുഴ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്.

പരിസഞ്ചരണം, ശ്വാസനം എന്നിവ വിസരണം വഴി നടക്കുന്നു.

വിസർജനം

ഈ ജീവിയിൽ വിസർജനത്തിനായി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക കോശങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെ ജ്വാലാകോശങ്ങൾ അഥവാ സൊളിനോസൈറ്റുകൾ (flame cells or solenocytes) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓരോ കോശത്തിൽ



ചിത്രം 48. ജാലാകോശത്തിന്റെ സ്വഭാവം.

1. പാരൻ കൈമാകോശങ്ങൾ 2. ജാലാകോശം 3. ന്യൂക്ലിയസ് 4. സിലിയങ്ങൾ 5. ജാലാകോശദാറം.

നെയും ഉള്ള പൊള്ളയാണ്. പൊള്ളയായ പ്രദേശത്തേക്ക് തുങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നീളമുള്ള സിലിയങ്ങളുണ്ട്. സിലിയങ്ങൾ കോശത്തിനകത്തു ചാഞ്ചാട്ടുമ്പോൾ, അവ ഒരു കത്തുന്ന ജാലയുടെ പ്രതിമി ഉളവാക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് കോശങ്ങളെ ജാലാകോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പാരൻ കൈമാകോശങ്ങൾക്കിടക്ക് തങ്ങിനിൽക്കുന്ന ദ്രവത്തിൽ നിന്ന് വിസരണം വഴി വിസർജനവസ്തുക്കൾ ജാലാകോശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. അന്തർഭാഗത്തുള്ള സിലിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഈ പദാർഥങ്ങൾ, ജാലാകോശങ്ങളുടെ നളികകളിലേക്കും അവയിലൂടെ പ്രോഗ്ലോട്ടിയൂകളുടെ ഇരുപാർപ്പുകളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിസർജനനളികകളിലേക്കും തള്ളപ്പെടുന്നു. ദേഹത്തിലുടനീളം നെടുക്കെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡി വിസർജനനളികകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവയിൽ ഒരു ജോഡി ഓരോ പ്രോഗ്ലോട്ടിഡിന്റെയും ഇടത് ഭാഗത്തും, മറോ ജോഡി വലതുഭാഗത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒട്ടവിലത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ ഈ നാലു നളികകളും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു പൊതുദാറത്തിലൂടെ പുറത്തോട്ട് തുറക്കുന്നു. ഈ പൊതുദാറത്തിലൂടെയാണ് വിസർജനവസ്തുക്കൾ ബഹിർഗമിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രോഗ്ലോട്ടിഡിലും ഇരുവശത്തുമുള്ള നളികകളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട്, അന്തപ്രസ്ഥനളികകളുണ്ട്. ഇവ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിന്റെയും പിൻഭാഗത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

നാഡീവ്യൂഹം


പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, ഏതു പരജീവിയുടെ നാഡീവ്യൂഹവും, സംവേദനാഗ്രങ്ങളും (sense organs) അവികസിതങ്ങളായാവാൻ സാധ്യത. ഭക്ഷണ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു സുരക്ഷിതമായി നിലവിലുള്ള പരജീവിക്ക്, ഇത്തരം അവയവങ്ങളുടെ ആവശ്യം വിരളമായേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. സ്കോളെന്ദ്രിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഡി ഗാംഗ്ലിയോണുകളും—മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയാറുണ്ട്—അവയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പ്രോഗ്ലോട്ടിയൂകളിൽ നെടു

ഒരു കിടക്കുന്ന ഏതാനും നാഡിനാരുകളും മാത്രമേ നാടപ്പുഴവിൽ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നാഡിനാരുകളിൽ പാർപ്പാഗ്രങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ തടിച്ചവയാണ്.

പ്രതപ്തപാദനം

ഒരു ആതിഥേയന്റെ ആനന്ദാവവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കട്ടങ്ങിപ്പോയ ഒരു പരജീവിയുടെ മുഖ്യപ്രശ്നം പ്രതപ്തപാദനം വഴി സ്വവർഗശാശ്വതി (perpetuation of race) സുസ്ഥിരമാക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഒരു പരജീവിയിൽ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതു് ഉല്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതു തന്നെയാണ് നാടപ്പുഴവിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പുഴവിന്റെ ഓരോ പ്രോജോട്ടിഡിലും പ്രാമാണ്യം വഹിച്ചു നില്ക്കുന്നതു് അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നാടപ്പുഴ ഒരു ഉഭയലിംഗി ആണ്. അതിനാൽ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും പുഷ്പനേന്ദ്രിയങ്ങളും സ്ത്രീജനേന്ദ്രിയങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു.

പുഷ്പജിജങ്ങളെ (sperms) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു്, പ്രോജോട്ടിഡിനുള്ളിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന ഉരണ്ടു വൃഷണങ്ങളാണ് (testes). ഇവയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബീജങ്ങൾ വാസ് എഫറൻസ് എന്ന ചെറു നളികകളിലൂടെ വാസ് ഡെഫറൻസ് എന്ന പൊതു പുഷ്പജവാഹിനിയിലെത്തുന്നു. അവയുടെ നിന്നും ബീജങ്ങൾ ഖണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു പാർശ്വത്തിലുള്ള ജനനാഗരന്ധ്രത്തിലൂടെ (genital aperture) ബഹിർഗമിക്കുന്നു. രന്ധ്രത്തിൽ ബീജസങ്കലനത്തിനു് ഉതകുന്ന ഒരു അറകൾ പോലുള്ള ശിശ്നം (penis) ഉണ്ടു്.



ചിത്രം 49. നാടപ്പുഴവിന്റെ ജീവചക്രത്തിലെ വിവിധദശകൾ.

അണ്ഡങ്ങളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ദ്വിലോകമായ (bilobed) അണ്ഡാശയം (ovary) ആണ്. അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്ന് ഉൽഭവിക്കുന്ന അണ്ഡവാഹിനി (oviduct) രണ്ടായി വിഭജിച്ചു, ഒരു നളിക ജനനാഗരസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു; മറേറത് ഒരു അന്ധ (blind) സഞ്ചിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ നളികയെ സേകനളിക എന്നും രണ്ടാമത്തെതിനെ ഗർഭാശയം (uterus) എന്നും വിളിക്കുന്നു. സേകനളിക തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാനത്തു്, അതിലേക്ക് സ്രാവങ്ങൾ (secretions) പകർന്നുകൊണ്ടു് വിറ്റാലൈൻ ഗ്രന്ഥി, ഷെൽ ഗ്രന്ഥി എന്നീ അവയവങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗ്രന്ഥികളാൽ പൊതിയപ്പെട്ട ഈ ഭാഗത്തെ-സേകനളികയുടെ ഉൽഭവസ്ഥാനത്തെ-ഉഴുക്കപ്പു് (ootype) എന്നു് വിളിച്ചു വരാറുണ്ടു്. രസ്ത്രത്തിലെത്തുന്നതിനു് മുമ്പു്, സേകനളികയുടെ ഒരു ഭാഗം വികസിച്ചു് നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. കൈമാറ്റപ്പെട്ട പുംബീജങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു് സംഭരിച്ചു് നിർത്തുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനു് ബീജസ്വീകരണി (seminal receptacle) എന്നു പറയുന്നു.


പ്രത്യുൽപാദനസമയത്തു് ചുരുങ്ങുകൂടി കിടക്കുന്ന നാടപ്പുഴുവിന്റെ ഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ഒരു പ്രോഗ്നോട്ടിഡിന്റെ രസ്ത്രം വേദാനിന്റെ തുമ്പായി സംഗമിക്കുന്നു. ഈ സംഗമാവസ്ഥയിൽ, ഇരു പ്രോഗ്നോട്ടിഡുകളിലെയും പുംബീജങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റപ്പെടുന്നു. ശിശുനങ്ങൾ മുഖേനയാണു് ഈ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നതു്. (പ്രോഗ്നോട്ടിഡുകളിൽ ആദ്യം പരിവക്ത പ്രാപിക്കുന്നതു് പുരുഷജനനേന്ദ്രിയങ്ങളാണു് എന്ന വസ്തുത സ്മരണീയമാണു്). ജനനരസ്ത്രം വഴി സേകനളികയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുംബീജങ്ങൾ, പ്രോഗ്നോട്ടിഡിലെ അണ്ഡങ്ങളെ സേകം ചെയ്യുന്നു. സേകിതഅണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ സൈഗോട്ടുകൾ (zygotes) ഷെൽ എന്ന ബാഹ്യാവരണം ധരിച്ച ശേഷം, ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും, അവിടെ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരജീവികൾ, പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, ധാരാളം അണ്ഡങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാറുണ്ടു്—ജീവനചക്രത്തിനിടക്കു് വന്നു ചേരാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കു് ഒരു പ്രതിവിധി എന്നോണം. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ പ്രത്യുൽപാദനസമൃദ്ധി (prolific fecundity) എന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. ഈ അണ്ഡങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതോടെ, അതു് വിർത്തു് പ്രോഗ്നോട്ടിഡിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന അവയവമായിത്തീരുകയും, മറ്റുള്ളവ ക്ഷയിച്ചു് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്നോട്ടിഡു് ഒരു സേകിത അണ്ഡസഞ്ചിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. രൂപാന്തരപ്പെട്ട പ്രോഗ്നോട്ടിഡുകളെയാണു് ഗ്രേവിഡു് പ്രോഗ്നോട്ടിഡുകൾ എന്നു് വിളിക്കുന്നതു്. ശരീരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തു് നിലകൊള്ളുന്ന ഇത്തരം പ്രോഗ്നോട്ടിഡുകൾ ക്രമേണ നാടയിൽ നിന്നു് വേർപെട്ടു് മലത്തോടൊപ്പം പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു.

ഗർഭാശയത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട സിക്താണു്ഡങ്ങൾ ഇതിനകം കോശവിഭജനം വഴി വികാസം പ്രാപിച്ചു്, ഒരു പതു പോലെ ഉരുണ്ട ഭൂണശേയിൽ (embryo) എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഭൂണങ്ങൾക്കു് മൂന്നു

ജോഡി അഥവാ ആറു അംകുശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവയെ ഷഡ് അംകുശഭൂതം അഥവാ ഹെക്സാകാന്ത് ഭൂതം (hexacanth embryo) എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഭൂതത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷെൽ എന്ന ബാഹ്യാവരണം ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ വളരുന്ന പന്നി, മനുഷ്യമലം തിന്നുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം പ്രോട്ടോട്ടിഡുകളും അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭൂതങ്ങളും പന്നിയുടെ കടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പന്നിയുടെ കടലിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ താടപ്പുഴുവിന്റെ ഭൂതങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും. പന്നിയുടെ ദഹനരസങ്ങളുടെ പ്രക്രിയ മൂലം, ഭൂതത്തിന്റെ ഷെൽ അലിഞ്ഞുപോകുകയും ഭൂതം വിമോചിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അംകുശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഭൂതം കടലിലെ രക്തധമനികളിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നു. രക്തം വഴി അതു പന്നിയുടെ മാംസപേശികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇതോടെ ഭൂതം ഒരു കാരറ്റു നിറച്ച ബ്ലാഡറിന്റെ രൂപത്തിലാവുകയും, മാംസപേശിതന്തുക്കൾക്കിടയിൽ കടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂതത്തിന്റെ ബാഹ്യതലം ഒരു സിസ്റ്റം ചർമ്മത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭൂതത്തിന്റെ മുൻഭാഗം അതിന്റെ പൊള്ളയായ ഭാഗത്തേക്ക് അന്തർവലനം (invaginate) ചെയ്യുന്നു. പന്നിയുടെ പേശിതന്തുക്കൾക്കിടയിൽ നിശ്ചലമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂതദശക്ക് സിസ്റ്റിസെർക്കസ് അഥവാ ബ്ലാഡർ പുഴു എന്ന് പേരുണ്ട്. ബ്ലാഡർ പുഴുവിൽ, ഉള്ളിലോട്ട് ഉന്തിനിൽക്കുന്നതും അന്തർവലനം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഭാഗമാണ്, പിന്നീട് പുഴുവിന്റെ സ്കോളെക്സ് ആയിത്തീരുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ഭാഗത്തെ പ്രോസ്കോളെക്സ് എന്ന വിളിക്കാറുണ്ട്. ബ്ലാഡർ പുഴു എന്ന ദശയിലുള്ള ഭൂതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പന്നിമാംസത്തൊണ് മീസിലി പോർക്ക് (measly pork) എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഭൂതബാധിത പന്നിയിറച്ചി, വേണ്ട പോലെ വേവിക്കാതെ, ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൂതങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ കയറിക്കൂട്ടുന്നത്. ബ്ലാഡർ ഭൂതം മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെത്തുന്നതോടെ, അതിന്റെ സിസ്റ്റം ചർമ്മം തിരോധനം ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞ് നിന്നിരുന്ന പ്രോസ്കോളെക്സ് (ഇതിനകം അതിൽ അംകുശങ്ങളും സക്കറുകളും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും) പുറത്തോട്ട് തള്ളിവന്ന്, സ്കോളെക്സിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സ്കോളെക്സ് കടലി

ചിത്രം 50. താടപ്പുഴുവിന്റെ മനുഷ്യനിലെയും പന്നിയിലെയും ദശകൾ. പരിപക്വമായ പ്രോട്ടോട്ടിഡ്, മലത്തിലൂടെ പന്നിയുടെ ദഹനരസീയത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പേശികളിൽ ചെന്നെത്തി ബ്ലാഡർ രൂപീകൃതമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിയായി പാകം ചെയ്യാത്ത പന്നിമാംസം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാഡറുകൾ മനുഷ്യദഹനരസീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും, മുഴുപ്പുവായി വികസിക്കുന്നതും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.



ചിത്രം. 50. ചിത്രവിവരണം പേജ് 118ൽ

ന്റെ ആന്തരചർമ്മത്തിൽ കൊളുത്തിപ്പിടിക്കുകയും, സ്കോളെല്ലിന് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള കഴുത്തു് സ്കോബിലൈസേഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ പ്രോസ്തോട്ടിഡ് ഉല്പാദനം സമാരംഭിക്കുകയും, പുഴു വളന് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ഫൈലത്തെ മൂന്ന് വർഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം:

- വർഗം 1. ടർബല്ലേറിയ (Turbellaria)
 ,, 2. ട്രെമറ്റോഡ (Trematoda)
 ,, 3. സെസ്റ്റോഡ (Cestoda)


വർഗം ടർബല്ലേറിയ

ഈ വർഗത്തിൽ പെട്ട പുഴുക്കൾ ജീവിതരീതിയിലും ശരീരഘടനയിലും നാടപുഴുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇവ സ്വതന്ത്രജീവികളാണ്. സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ അടിത്തട്ടുകളിലും ശുദ്ധജലാശയങ്ങളുടെ അടിപ്പുറപ്പിലും കരയിൽ നനവുള്ള ഭിക്ഷുകളിലും ഇവ ഇഴഞ്ഞു നിങ്ങുന്നതായി കാണാം. ദേഹത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തു് ഏകദേശം മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വായയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ശാഖിതമായി ദേഹമാകെ പടന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ദഹനവ്യൂഹമുണ്ട്. ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ മുൻ ഭാഗത്തു് രണ്ട് തരിത്രപത്തിലുള്ള കണ്ണുകളുണ്ട്. ബാഹ്യദേഹാവരണമായ എപിത്തിലിയ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി സിലിയങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ സിലിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുഴു ഇഴഞ്ഞു് നിങ്ങുന്നതു്. ഈ പുഴുക്കൾ ഉഭയലിംഗികകളാണ്. ലൈലിംഗികപ്രജനനത്തിന് പുറമെ, പുനരുത്ഭവനത്തിനുള്ള അസാമാന്യകഴിവുകളും ഇവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജീവികളെ പൊതുവെ പ്ലനേറിയനുകൾ (planarians) എന്നു പറയാറുണ്ട്.

ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന നിലയ്ക്കു് ഡുജിസിയ എന്ന പ്ലനേറിയന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തവിവരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ശുദ്ധജലാശയങ്ങളുടെ അടിഭാഗത്തു് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പുഴുവാണ് ഡുജിസിയ. ഇലപോലെ പരന്ന ഈ പുഴുവിന്റെ മുൻഭാഗം വിതിയുള്ളതും പിൻഭാഗം കൂർത്തതുമാണ്. മുൻഭാഗത്തു് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശസുഗ്രാഹ്യത (photosensitivity) ഉണ്ടെങ്കിലും, ശരിയായ കാഴ്ചയില്ല (കണ്ണുകൾക്ക് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവില്ല). വായ അടിഭാഗത്തു് മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വായിലൂടെ ഒരു ആനത്തുവി പോലെ പുറത്തോട്ടു് തള്ളി നിൽക്കുവാൻ ഫാറിങ്ങ്സിന് കഴിവുണ്ട്. ജനനാംഗാസ്ത്രം വായയ്ക്ക് പിന്നിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിസർജനദാറം മുൻപിൽ, മുകൾഭാഗത്തു് ചെറുചെറു സുഷിരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യചർമ്മം ഒരു നിറ സിലിയമയമായ ബാഹ്യചർമ്മത്താൽ നിർമിതമാണ്. ഇവയിലെ ചില കോശങ്ങൾ ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും റാബ്ഡെറാറ്റു് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദാർഥം




ചിത്രം 51. പ്ലാനേറിയ. A. മൃഗജീവി. B. ദഹനേന്ദ്രിയവ്യക്തമാക്കുവാൻ ജന്തുവെ മുറിച്ചതു്. 1. ഫാരിങ്ക്സ് 2. ജന്താഗ്രസ്ത്രം 3. ഫാരിങ്ക്സിന്റെ ചോരം. 4. വായ 5. ഗാസ്ട്രോവാസ്കുലർ അറ.

ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം നനയുമ്പോൾ പശ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉപയോഗം തിട്ടമായി പറയുക വിഷമമാണ്. ഈ കോശനിരയ്ക്ക് ചുവട്ടിലായി പേശിതന്തുക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യചർമ്മനിരയ്ക്ക് അമവാ എപിഡെർമിസിന് തൊട്ട് കിടക്കുന്നത് അനുപ്രസ്ഥതന്തുനിരയാണ്. അതിനുള്ളിലായി അനുദൈർഘ്യതന്തുനിര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവ കൂടാതെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില പേശിതന്തുനിരകളും കാണാവുന്നതാണ്. പുഴുവിന്റെ ചലനത്തിൽ പേശിതന്തുക്കൾ ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അനുദൈർഘ്യപേശിതന്തുനിരയ്ക്കും ആന്തരാവയവങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് പാറൻകൈകണ്ടുവരുന്നു.

ദഹനവ്യൂഹം

വായ -ബഹിസ്തരണത്തിന് കഴിവുള്ള (protrusible) ഫാരിങ്സിഡേ



ചിത്രം 52. പ്ലാനേറിയ-വിസർജനവ്യൂഹം. വലത്ത് ഒരു ജ്വാലാകോശം വലുതാക്കിയത്.

ക്ക് തുറക്കുന്നു. ഫാരിങ്സ്സ് പേശിതന്തുക്കളാൽ ആവൃതമാണ്. ഫാരിങ്സ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഭാഗനളികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഒന്ന് മുന്പോട്ടും രണ്ടെണ്ണം പിന്നോട്ടും പോകുന്നു. ഈ നളികകൾ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി പിരിഞ്ഞു് ദഹനാസക്തം പടന്ന് കിടക്കുന്നു. നളികകൾ, അവയുടെ ശാഖകൾ, ഉപശാഖകൾ എന്നിവ ചേർന്നുള്ള അവയവത്തിനെ ആന്ത്രം (intestine) എന്നു് വിളിക്കുന്നു. ആന്ത്രം അന്തരവർമത്താൽ നിർമിതമാണ്; ഗുദോരമിപ്പു.

ഈ പുഴ മാംസഭുക്ക് ആണ്. ചെറിയ പുഴക്കുൾ, ക്രസ്സേഷ്യയിൽ പെട്ട ചെറുജീവികൾ എന്നിവയെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ തേട്ടുന്നതിൽ റാബ്ഡെറാ എന്തോ പക്ഷു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് കരുതപ്പെടുന്നു. ശാഖിതമായി കിടക്കുന്ന ആന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരിച്ച പദാർഥങ്ങൾ വിസരണം മുഖേന ദഹനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരുന്നു. ദഹനത്തിനു ശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടപദാർഥങ്ങൾ ബഹിർഗമിക്കുന്നത് വായയിലൂടെ തന്നെയാണ്.

ശ്വാസനം

ബാഹ്യചർമത്തിലൂടെ വിസരണം വഴി നടക്കുന്നു.

വിസർജനവ്യൂഹം


നാടപ്പുഴവിന്ദേരതു പോലെ ജാലാകോശനിർമിതമായ ഒരു വ്യൂഹമാണ് പ്ലന്റേറിയയിലും കണ്ടുവരുന്നത്. ജാലാകോശങ്ങളുടെ നളികകൾ, ദഹനത്തിന്റെ ഇരുപാർപ്പങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടു് അനുഭവദർശ്യവിസർജനനളികകളിൽ ചെന്നു് ചേരുന്നു. ഇവ രണ്ടും മുൻഭാഗത്തു് വെച്ചു് സംയോജിക്കുകയും മുകൾ ഭാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചെറുസുഷിരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തോട്ടു് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിയിലെ ഓസ്മോസനക്രമീകരണത്തിൽ വിസർജനവ്യൂഹം ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കാര്യം സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

നാഡീവ്യൂഹം

രണ്ടു് വലിയ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ ചേർന്ന ഒരു മസ്തിഷ്കവും അവയിൽ നിന്നു് ഉത്ഭവിച്ചു് ശരീരത്തിനു് നെടുക്കെ, അടിഭാഗത്തായി കിടക്കുന്ന രണ്ടു് നാഡീനാരുകളിൽ നിന്നു് നിരവധി നാഡീതന്തുക്കൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും അവ ദഹനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവയവങ്ങളിലേക്കും കടന്നു് ചെന്നു് ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെത്തുമുള്ള രണ്ടു നാഡീനാരുകളെയും അങ്ങമിങ്ങും ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കഠിന അനപ്രസംഗസംധായക നാഡീതന്തുക്കളും (transverse commissures) കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. കണ്ണുകളിലേക്കുള്ള നാഡീതന്തുക്കൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറുകഴിക്കു ചുറ്റും ചിട്ടയായി അടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം പ്രകാശഗ്രാഹികളായ കോശങ്ങളെയാണ് കണ്ണു് എന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അവയവത്തിനു് ലെൻസോ പ്രതിബിംബം സ്വരൂപിക്കാനുള്ള കഴിവോ ഇല്ല. കണ്ണിനു പുറമെ രാസഗ്രാഹികളും (chemoreceptors) മറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സം

വേദകോശങ്ങളും ഈ ജീവിയിൽ കാണാം.

പ്രതപ്ലാദനം




ചിത്രം 53.

പ്ലാറ്റോഡെൽമോസോം-നാഡിപുരുഷം. റാബഡെൽ ഗ്രന്ഥികൾ കാണാം. ഇവയാണ് അണ്ഡത്തിന് ആവശ്യമായ പിതകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, അണ്ഡം അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ പിതകം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല; അണ്ഡവാഹിനിയിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടക്കാണ് അണ്ഡകോശ

നാഡുപുരുഷിനേക്കാൾ പോലെ, ഈ ഉഭയജീവിയിലും ഉല്പാദനേന്ദ്രീയങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. മൊത്തത്തിൽ, ഈ വൃഹത്തിന് നാഡുപുരുഷിനേക്കാൾ സാമ്യമുണ്ട്. പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിത്രം 9. ശുദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. വൃഷണങ്ങൾ ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപാർപ്പങ്ങളിലും ഉടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.

പുണ്ഡിജവാഹിനികളായ വാസ് ഡെഫറൻസുകൾ പിൻഭാഗത്തു സംഗമിച്ചു ഒരു പൊതുനളികയിലൂടെ ജനനാഗരസ്ത്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു. സംഗമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപിൽ, ഓരോ വാസ് ഡെഫറൻസിലും ഓരോ വീൽ ഭാഗം കാണാം. ഇവയെ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രതപ്ലാദനത്തിന് ആവശ്യമായ പുണ്ഡിജങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സംഭരിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പൊതുനളികയിലേക്ക് നിരവധി ഗ്രന്ഥികോശങ്ങൾ അവയുടെ സ്രാവങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായി കാണാം. ഗ്രന്ഥികോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ അവയവത്തെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നു.

ഒരു ജോഡി അണ്ഡാശയങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രണ്ടു അന്തർവാഹിനികൾ ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപാർപ്പങ്ങളിലൂടെ പിൻഭാഗത്തു ചെന്നു ചേർന്ന്, അവിടെ വെച്ച് സന്ധോജിച്ചു യോനി (vagina) എന്ന പൊതുനളികയായിത്തീരുന്നു. യോനി ജനനാഗരസ്ത്രത്തിലൂടെ പുറത്തോട്ടു തുറക്കുന്നു. അണ്ഡവാഹിനിയുടെ ഇരുപുറത്തുമായി ദേഹത്തിലുടനീളം നിരവധി പിതകഗ്രന്ഥികൾ അഥവാ വി




ചിത്രം 54. പ്ലാറീഫെർമിനസ്-പ്രകൃതിചിത്രം. 1. അഗ്രഭാഗം. 2. അഗ്രഭാഗത്തിൽ. 3. പീതഗ്രന്ഥി. 4. സുഷുപ്തസഞ്ചി. 5. വൃഷണം. 6. പുഷ്പിജകൾ. 7. ശിശു. 8. പ്രജനനാവരണം. 9. പ്രജനനദോഷം.

അവയിൽ കണ്ടുവരുന്ന പീതകം സമ്പാദിക്കുന്നത്, ജനനാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് സഞ്ചികൾ കാണാം. അവയിൽ ഒന്ന് ഗർഭാശയവും മററത് ഒരു പേരിക അവയവവും ആണ്. പേരിക അവയവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്ന് തിട്ടമായി അറിവില്ല. ഗർഭാശയം എന്ന അവയവം ഇവിടെ ഒരു ബീജസങ്കരണി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിചിത്രം പ്ലാറീഫെർമിനസ് ഇങ്ങനെയാണ്. പുഷ്പിജങ്ങൾ ശിശുസഹായത്തോടെ കൈമാറപ്പെടുന്നു. ഇവ ഗർഭാശയത്തിൽ സങ്കരണിച്ച് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ ഷെൽ എന്ന പുറം ആവരണത്താൽ പൊതിയപ്പെടുകയും ജനനാഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂണം, വികാസം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ, ഷെൽ പൊ


ടിച്ചു ഒരു ചെറുപുഴുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.



ചിത്രം 55. പൂനേറിയയെ അനുഭവിക്കുകയായി കണ്ണിച്ചാൽ.

പുനരുത്ഭവനം (Regeneration)

പൂനേറിയ പുനരുത്ഭവനത്തിനുള്ള അസാമാന്യ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിയെ രണ്ടായി മുറിച്ചു എന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ മുൻഭാഗത്തെ കണ്ണും പിൻഭാഗം പുനരുത്ഭവിപ്പിച്ചു ഒരു മുഴുവൻ പൂനേറിയ ആയിത്തീരും. അതു പോലെ പിൻഭാഗത്തെ കണ്ണും മുൻഭാഗം പുനരുത്ഭവിപ്പിച്ചു പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിക്കും. മൂന്ന് കണ്ണുള്ളതായി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുൻപിലെ കണ്ണും





ചിത്രം 56. പൂനേറിയയുടെ തലഭാഗം നെടുക്കെ രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ.

ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പുനരുത്ഥാപിച്ച് പൂർണ്ണരൂപം കൈവരിക്കും; അതു പോലെ പിൻപിലത്തെ കണ്ണും. നട്ടുവിലെ കണ്ണും അതിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി തലയും പിൻഭാഗത്തായി വാലും പുനരുത്ഥാപിക്കുന്നു. പ്ലാറിയയുടെ മുൻഭാഗം നെട്ടുകെ രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ, ഇരുപകുതികളും മറ്റോ പകുതികൾ പുനരുത്ഥാപിച്ച് രണ്ടു തലയുള്ള ഒരു ജീവിയാകുന്നതിനാൽ. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ഒട്ടിക്കൽ (grafting) പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ ജീവിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഉളവാകുന്ന അനമാനങ്ങൾ രസാവഹവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്.

മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ

തൈസനോസ്യസ് കരക്കുട്ടനായ് കടലിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ അടിത്തട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. നിരവധി കണ്ണുകളുണ്ട്. വികാസത്തിനിടക്ക് ഒരു ലാർവാദശയുണ്ട്. ലാർവക്കു മുളച്ചപ്പോൾ ലാർവ (Muller's larva) എന്നാണ് പേരു്.



ചിത്രം 57. ഇടത്തു മുളച്ചപ്പോൾ ലാർവ; വലത്തു വൈലംപാലിയം.


വൈലംപാലിയം കളിമുറികളിലും നനവുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നു. മുഖ്യമായി രാത്രിയെറങ്ങാൻ. മുൻഭാഗം ചന്ദ്രക്കലയുടെ രൂപത്തിൽ വിതകൂടിയതായിരിക്കും. നിരവധി കണ്ണുകളുണ്ട്.

വർഗ്ഗം ട്രൈമറ്റോഡ

ഈ വർഗത്തിൽ പെട്ട ജീവികളെല്ലാം തന്നെ പരാജീവികളാണ്. ഒരു മുഖ്യ ഉദാഹരണമാണ് ആട്ടുകളിൽ കരകനാശം (liver rot) വരുത്തുന്ന ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് (liver fluke) എന്ന ജീവി. ദേഹം ഒരു ഇലയുടെ രൂപം

ത്തിലാണ്. ഇലയുടെ തെട്ടി പോലെ ഉന്തിരിയുന്നതാണ് മുൻഭാഗം; പിൻ അഗ്രം കൂർത്തതാണ്. മുൻഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു ചുഷകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പരാജീവി കരളിനുള്ളിൽ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നത്. മുൻ അഗ്രത്തിലുള്ള മുഖസങ്കറിന്റെ നടുക്ക് വായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സങ്കർ അടിഭാഗത്തു, തെട്ടി പോലുള്ള തലയും പരന്ന ശരീരവും കൂടിച്ചേർന്നിടത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.


ജനനാഗ്രന്ഥം അടിഭാഗത്തു, രണ്ടു സങ്കറിനുമിടക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വിസർജനപ്രായം പിൻ അഗ്രത്തിലാണ്.



ചിത്രം 58. ഫാസിയോളീഫിപാറിക്ക എന്ന ലിവർഫ്ളക്ക്. A. ദഹനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം. B. വിസർജനവ്യൂഹം. C. പ്രത്യുല്പാദനവ്യൂഹം. 1. വായ. 2. മുൻസങ്കർ 3. പിൻസങ്കർ 4. പുംലിംഗം. 5. ശുക്ലവാഹകം. 6. വൃഷണം. 7. പീതഗ്രന്ഥികൾ. 8. പീതവാഹിനി. 9. മെഹ്ലിയുടെ ഗ്രന്ഥി. 10. ഉരപ്പൈ. 11. അണ്ഡാശയം. 12. ഗർഭാശയം. 13. ദഹനക്ഷേൽ.

ശാഖിതമായ ഒരു ദഹനവ്യൂഹം ഉണ്ടു്. വിസർജനവ്യൂഹം ജപാലാകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണു്. മൂന്നു ഗാസ്ട്രിയോണുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു മസ്തിഷ്കവും രണ്ടു അനലൈറ്റോപ്യ നാഡീനാളുകളും ചേർന്നതാണു് നാഡീവ്യൂഹം. സംവേദകോശങ്ങൾ ഇല്ല. ഉഭയജീവിയാണു്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാണു്.

രണ്ടു ജീവികൾ തമ്മിൽ ഇണ ചേർന്നു് പ്രത്യുല്പാദനം നടത്തുന്നു. സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ പിത്താസം (bile) എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുക്തസ്രാവത്തോടൊപ്പം ആടിന്റെ കടലിലെത്തുകയും മലത്തോടൊപ്പം പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നനവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചു് സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ, മിറാസിഡിയം



ചിത്രം 59. ലിവർഫ്ലൂക്കിന്റെ വികാസരേഖകൾ.

ആടിന്റെ മലത്തിലൂടെ ഫ്ലൂക്കിന്റെ മുട്ടകൾ നനഞ്ഞ പുൽപ്രദേശങ്ങളിൽ പതിയുന്നു. മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മിറാസിഡിയം ലാർവ് ചെടിന്റെ ഭാഗത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്നു. മിറാസിഡിയം വികസിച്ചു ആദ്യം സ്പോറോസിസ്റ്റം എന്ന പദം റെഡിയം, സെർക്കോവ എന്നീ രേഖകളായി മാറുന്നു. സെർക്കോവ ചെടിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു നനഞ്ഞ പുൽപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങിയെന്നു, പുല്ലു മേയുന്ന ആട്ട് അതു ഭക്ഷിക്കുകയും സംക്രമണം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാലപ്പട്ടുന്ന ലാർവാദശയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇത്താൽ ലാർവകൾ അവയുടെ സിലിയ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്നി, ലിംഗേയ എന്ന ചെടിന്റെ ഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം അവ ചെടിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു വളർവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ലാർവയുടെ സിലിയ എല്ലാം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും, ലാർവ ഒരു നീളമുള്ള സഞ്ചിയുടെ രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രേഖയ്ക്ക് സ്പോറോസിസ്റ്റം എന്ന പദം പറയുന്നു. സ്പോറോസിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ചില കോശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വികാസശക്തിയുണ്ട്. ഇവയെ ജനനകോശങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവ ഓരോന്നും കോശവിഭജനം വഴി പെരുകി, ഒരു ഭൂണം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ, സ്പോറോസിസ്റ്റിനകത്തു നിന്നുവെച്ചു ഭൂണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. ഈ ഭൂണങ്ങൾ വളർന്നു വളരായി റെഡിയ (redia) എന്ന ലാർവകളായിത്തീരുന്നു. ഈ റെഡിയകൾ ചെടിന്റെ യകൃത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്നു. ഈ സമയത്തു റെഡിയ എന്ന ലാർവയ്ക്കുള്ളിലെ ജനനകോശങ്ങൾ വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ചെറുറെഡിയ (daughter redia) കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

റെഡിയകളുടെയും ചെറുറെഡിയകളുടെയും ആക്രമണത്താൽ ചെടിന്റെ യകൃത്തു നശിക്കുന്നു; അതു കാരണം ചെട്ടി ചാകുന്നു. ഇതോടെ റെഡിയ


കൾക്കുള്ളിലെ ജനനകോശങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തരം ലാർവകളായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ലാർവാദശയ്ക്ക് സെർക്കേറിയ എന്ന് പറയുന്നു. വട്ടത്തിലുള്ള തലയും, ഒരു വാലും ഉള്ള ശരീരമാണ് സെർക്കേറിയക്കുള്ളത്. തലയിൽ ഒരു മുഖസങ്കുറും മറ്റൊരു സാധാരണ സങ്കുറും ഉണ്ടായിരിക്കും. സെർക്കേറിയകൾ രാസീയകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടുകയും വാലിന്റെ സഹായത്തോടെ നിന്നി വല്ല പുൽത്തലപ്പിലോ ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തോ ചെന്ന് പറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ വാൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു; ശരീരമാകെ ഒരു പുറം സിസ്റ്റിനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആട്ട് മേയ്യമ്പോൾ സിസ്റ്ററുകൾ നിറഞ്ഞ സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും, അതു വഴി ലാർവകൾ ആടിന്റെ കടലിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതോടെ സിസ്റ്റ് ചർമം ഭേദിക്കുകയും വിമോചിതമായ ലാർവ ബൈൽ വാഹിനി (bileduct) വഴി ആടിന്റെ യകൃത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ജീവനചക്രമാണ് ലിവർഫ്ലൂക്കിന് ഉള്ളത്. പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജനനകോശങ്ങളുടെ വികാസം വഴി, പ്രത്യുൽപാദന സമൃദ്ധി കൈവരുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത. ഈ രീതിയെ ഒരു സവിശേഷ അലൈംഗികപ്രജനനമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

ഫാസിയോള കൈജ്ജാൻറിക്ക എന്ന ലിവർഫ്ലൂക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ കനകാലികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്.

മനുഷ്യരിൽ, ഷിസ്റ്റോസോമിയാസിസ് (schistosomiasis) എന്ന രോഗം വരുത്തുന്ന ഒരു പരജീവിയാണ് ഷിസ്റ്റോസോമ (Schistosoma). ഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ പരജീവി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. ഇതിനെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ജപ്പാനിലും ആണ്.

യകൃത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന സിരകളിലാണ് (portal veins) ഇവയെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഈ ജീവിയെ ബ്ലഡ്ഫ്ലൂക്ക് (blood fluke) എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവ ഏകലിംഗികളാണ്. പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആണ്ഡം പെണ്ണും ഇണചേർന്നാണ് കിടക്കുക. നീളം കുറഞ്ഞു തടിച്ച ആണിന്റെ ദേഹത്തിൽ നെട്ടുകെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചാൽ ഉണ്ട്. ഈ ചാലിലാണ് നീളക്കൂട്ടതലുള്ള കൂശാംഗിയുടെ കിടപ്പ്. ചാലിന് ഗൈനൈക്കോഫോറൽ കനാൽ (gynaecophoral canal) എന്ന് പറയുന്നു.

പ്രത്യുൽപാദനത്തിനു ശേഷം, സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെൺപുള ആണിനെ വിട്ടു പിരിയുന്നു. പെൺപുള രക്തധമനികൾ വഴി മുത്രാശയത്തിലെത്തുകയും ഈ അവയവത്തിലെ ചെറുസിരകളിൽ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മുട്ടകൾ സിരാവരണം തുളച്ചു കയറി മുത്രാശയത്തിനുള്ളിലെത്തുന്നു. മുട്ടകളുടെ ഈ നശീകരണപ്രവൃത്തി മൂലമാണ്, രോഗിയുടെ മുത്രത്തിൽ രക്തം കലർന്നു കാണുന്നത്. മുത്രാശയത്തിൽ വച്ചു അണ്ഡങ്ങൾ മിറാസിയഡിയം ലാർവകളായി തീരുന്നു. മുത്രത്തോടൊപ്പം ലാർവകൾ പുറത്തെത്തുകയും പ്ലഗോർബിസ്, ബുക്കെ



ചിത്രം 60. ഷിസ്റ്റോസോമ ഹിമറോബിയം.

ഇടത്ത് ആണ് പെണ്ണും; വലത്ത് സെർക്കേറിയ ലാർവ്വ.

1. അഭ്യക്ഷസങ്കർ 2. മുഖീയസങ്കർ 3. ഗൈനൈക്കോഫോറൽ ചാൽ 4. ആൺപുഴു 5. പെൺപുഴു.

നസ് എന്നീ സ്തീഷിസുകളിൽ പെട്ട ഒച്ചുകളിൽ കയറിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ലാർവകൾ വളർന്ന് വലുതായി, പെരുനിയശേഷം, സെർക്കേറിയ രൂപത്തിലാണു ചെലിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുന്നത്. സെർക്കേറിയ ലാർവകൾ നിന്നി മനുഷ്യന്റെ തലക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ, അവ സിരകളിലേക്കു തുളച്ചു കയറുന്നു; രക്തം വഴി വലിയ സിരകളിലേക്കു എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ പുഴുവിന്റെ സെർക്കേറിയ ഓക്കലും സിസ്റ്റ് ചർമ്മം ധരിക്കുന്നില്ല.

വർഗം ഐക്യോദ്ധ

ഈ വർഗത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രശ്നമാണ് ടിനിയ സോളിയം എന്ന നാടപ്പുഴ. ടിനിയ സജിന്റേറ എന്ന പേരുള്ളതും മനുഷ്യക്കുടലിൽ നിവസിക്കുന്നതുമായ നാടപ്പുഴ, നായയുടെ കുടലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടിനിയ എക്കൈറോകോക്കസ്യ എന്ന നാടപ്പുഴ എന്നിവ ഈ വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്.

ഫൈലം ആഷ്കെൽമിന്നസ്

കവടഭേദഗുഹയുള്ള, ദ്വിവാർഗ്ഗസമിതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളെയാണ് ഈ ഫൈലത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപി ഡെർമിസിസ് തൊട്ട് പുറത്തായി കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബാഹ്യാവരണമുണ്ട്. ശരീരം അഖണ്ഡമാണ്. ചിലവയിൽ ഖണ്ഡീഭവനം (segmentation) ഉള്ളതായി തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബാഹ്യ പ്രതിമ മാത്രമാണ്. കൂട്ടിക്കിടക്കി ഉണ്ടാവുന്ന വരകളും വളയങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രതിമ ഉളവാക്കുന്നത്. കൂട്ടിക്കിടക്കി നിർമ്മിതമായ മുളകളോ രോമങ്ങളോ ശതകങ്ങളോ (scales) കണ്ടുവെന്ന് വരാം. വായ മുതൽ ഗുദഭാഗം വരെ ഋജുവായി കിടക്കുന്ന ഒരു ദഹനവ്യൂഹമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. വായ മുൻവശത്തും ഗുദഭാഗം പിൻവശത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ദഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമായ ആന്തം എൻഡോഡം നിർമ്മിതമാണ്. അതിനെ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് പേശിതന്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു. മിക്കവയിലും ദഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും എക്സോഡം നിർമ്മിതമാണ്. ആദ്യഭാഗത്തെ സ്റ്റോമോഡിയം എന്നും അവസാനഭാഗത്തെ പ്രോക്റ്റോഡിയം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശ്വാസനവ്യൂഹം, പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നില്ല. വിസർജനവ്യൂഹം പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള നളികകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഒരു മസ്തിഷ്കവും (ഇത് വളയരൂപത്തിലുള്ളതാവാം) അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കറെനാഡിനാരുകളും ചേർന്നാണ് നാഡീവ്യൂഹം. ഈ ജീവികൾ മിക്കവയും ഏകലിംഗികളാണ്. വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ സാലിപ്പി ക്കപ്പെട്ട പ്രജനനവ്യൂഹമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്.

ഈ ഫൈലത്തെ ആറ് വർഗങ്ങളായാണ് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്.

- വർഗം 1. നെമറ്റോഡ (Nematoda)
- വർഗം 2. റോട്ടിഫെറ (Rotifera)
- വർഗം 3. ഗാസ്ട്രോട്രിക്ക (Gastrotricha)
- വർഗം 4. കൈനോറിങ്ക (Kinorhyncha)

വർഗം 5. പ്രയാപുലിഡ (Priapulida)

വർഗം 6. നെമറ്റോമോർഫ (Nematomorpha)

വർഗം നെമറ്റോഡ


ഉരുണ്ടു്, സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലുള്ള, അഖണ്ഡിതമായ ശരീരമാണ് ഈ ജീവികൾക്കുള്ളതു്. എപിഡെർമൽ കോശങ്ങൾക്കിടക്കു് കോശാവരണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ബാഹ്യചർമനിറ ബഹുകോശകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മികസ്തോമായാണ് കാണപ്പെടുക. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, എപിഡെർമിനു് ബഹുകേന്ദ്രമാണ് (syncytial). അനാദർശലൂപശീതത്തുകൾ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളു. ഈ തന്തുക്കൾ നാലു് കറാ (bundle) കളായാണ് അടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. മസ്തിഷ്കം വളയരൂപത്തിലാണ്. മിക്കവയും ഏകലിംഗികളാണ്.

ഈ വർഗത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യപ്രരൂപം എന്ന നിലയ്ക്കു്, മനുഷ്യക്കുടലിൽ നിവസിക്കുന്ന വെര എന്ന പുഴുവിന്റെ വിവരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു. അസ്കാരിനു് ലംബ്രികോയഡനു്

മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരാജീവിയാണ് വെര. വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ വളരുന്ന കുട്ടികളിലാണ് ഇവ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നതു്. ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ, സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ഈ പുഴുവിനുള്ളതു്. ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂന്തിരിക്കും. പെൺപുഴു ആൺപുഴുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലുതാണ്. ഇവയ്ക്കു് 25 മുതൽ 35 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളം കാണാം. പെൺപുഴുവിന്റെ പിൻഭാഗം ഗുരുവായിരിക്കും; എന്നാൽ ആണിന്റെതു് ചുരുങ്ങു് വളഞ്ഞു് ഒരു കൊക്കിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ആക്രതിയിലുള്ള ചെറുപ്പത്തെയും കൊക്കിരൂപത്തിലുള്ള പിൻഭാഗത്തെയും ആസ്പദമാക്കി ആൺപുഴുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും.


പുഴുവിന്റെ മുൻ അഗ്രത്തിലാണ് വായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. വായയുടെ ചുറ്റും ചെറുപല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ മൂന്ന് ചുണ്ടുകൾ അണിനിരത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ചുണ്ടുകളെ മുഖീയപാപ്പിലുകൾ (oral papillae) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വെര കുടലിനുള്ളിൽ കടിച്ചുതുങ്ങുന്നതു്. വായയുടെ തൊട്ടു പിന്നിൽ അടികാഗത്താണ് വിസർജനഭാഗം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. പെൺപുഴുവിൽ ഗുദഭാഗം പിൻ അഗ്രത്തിനടുത്തു് അടികാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പെൺപുഴുവിന്റെ ജനനാംഗരൂപം അടികാഗത്താണ് കാണപ്പെടുന്നതു്. അതു് പുഴുവിന്റെ നീളത്തിൽ മുൻ അഗ്രത്തിൽ നിന്നു് $1/3$ ഭാഗത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ആൺപുഴുവിൽ ഗുദഭാഗവും ജനനാംഗരൂപവും യോജിച്ച് ഒന്നായി കിടക്കുന്നു. ഈ പൊതുഭാഗത്തെ ക്ലോയാക്കൽ ഭാഗം (cloacal aperture) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഈ പൊതുഭാഗത്തോടു് അനുബന്ധിച്ച് രണ്ടു് അകശരൂപത്തിലുള്ള ശിഷ്ടങ്ങൾ (copulatory spicules) കാണാം. ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുറമ്പി ജങ്ങൾ പെൺവെയുടെ ജനനാംഗരൂപത്തിലേക്കു് പകരുന്നതു്.



ചിത്രം 61. ഉരുളൻപുഴുവീ (നെമറ്റോറാഡി)ന്റെ പൊതുഘടന. ഇടത്തു് പെൺ പുഴു, വലത്തു് ആൺപുഴു.

1.ചുണ്ടു് 2.നാഡീവലയം 3.വിസർജനദോരം 4.രക്തനദി
5.വിസർജനചാൽ 6.മുൻ അണ്ഡാശയം 7.ശുക്രസഞ്ചി
8.ഗർഭാശയം 9.വളഭജന. 10.വളഭജനാദോരം (വർവ)
11.അണ്ഡം 12.പിൻഅണ്ഡാശയം 13.ഗുദം 14.വൃഷ
ണം 15.ശുക്രാശയം 16.ശുക്രവാഹകം 17.സ്പലനഗ്രന്ഥി
18.ക്രോയാക്ക 19.ക്രോയാക്കൽദോരം 20.ബർസ. 21.സം
യുഗ്മനമുള്ളകൾ 22.മലാശയഗ്രന്ഥി 23.കൃഷ്ണിൾ 24.ഹെ
നക്ഷൗൽ.




ചിത്രം 62. അസ്കാരിസിന്റെ അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം.

1. കൂട്ടിക്കിൾ 2. അപാക്ഷനാഡിതന്തു 3. പേശികൾ 4. അണ്ഡവാഹിനി 5. അഭ്യക്ഷനാഡിതന്തു 6. ഗർഭാശയം 7. അണ്ഡാശയം 8. വിസർജനച്ചാൽ 9. ബാഹ്യചർമ്മം 10. ദഹനകുഴൽ 11. കപടദേഹഗുഹ.

പുഴുവിന്റെ ഒരു അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം പരിശോധിച്ചാൽ, ശരീരാഘടനയിൽ പങ്കുള്ള വിവിധ സ്തരങ്ങളുടെ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പുഴു ഉരുണ്ടതാകയാൽ പരിച്ഛേദം വൃത്തസമാനമായിരിക്കും. ഏറ്റവും ബാഹ്യമായി കാണപ്പെടുക കൂട്ടിക്കിൾ സ്തരമാണ്. അതിനുള്ളിലായി ബഹുകേരുകയുമായ എപിഡെർമിസ് കാണപ്പെടുന്നു. മുക്കർഭാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും അടിഭാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും ഈ പാർശ്വമധ്യങ്ങളിലും എപിഡെർമിസ്, നാല് അനുഭേദരൂപവരമ്പുകളായി ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത്

കാണാം. എപിഡെർമിസിന് തൊട്ടു താഴെയായി പേശിതന്തുസ്തരം കാണപ്പെടുന്നു. അനഭദ്രോഘമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേശിതന്തുക്കളാണിവ. പേശിതന്തുക്കൾ നാല്പു കറകളായാണ് അടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എപിഡെർമിസ് വരമ്പുകൾക്കിടക്കാണ് ഓരോ കറയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പേശിതന്തുക്കൾ പ്രത്യേകപ്രകൃതിയുള്ളവയാണ്. ഇവ ഓരോന്നിലും, എപിഡെർമിസിന് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗം വീതി കൂടിയതും പേശിയവും ആണ്; ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി കിടക്കുന്ന ഭാഗം വീതി കുറഞ്ഞതും പ്രത്യേക രൂപമൊന്നുമില്ലാതെയുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മത്താൽ നിർമ്മിതവുമാണ്. തന്തുവീന്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് കോശ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുക. ഈ കോശങ്ങളുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് നാഡീനാദകളിലേക്ക് പോകുന്ന നേരിയ നാദകൾ കാണാം. ഈ ചെറുനാദകൾ നാഡീതന്തുക്കളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. പേശിസങ്കോചത്തിന് വേണ്ട ആവേഗം (impulse) ഇവയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പേശിതന്തുസ്തരം കപടഭേദഗുഹയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു. കപടഭേദഗുഹയിലാണ് പ്രത്യുല്പാദനവ്യൂഹം, ദഹനവ്യൂഹം എന്നിവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വിസർജനനളികകൾ, ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലുള്ള എപിഡെർമിസ് വരമ്പുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മുകൾഭാഗത്തെയും അടിഭാഗത്തെയും വരമ്പുകളിൽ നാഡീനാദകൾ കാണാവുന്നതാണ്. കപടഭേദഗുഹ ഒരു പ്രത്യേകദ്രവത്താൽ നിറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ ദ്രവത്തിന് കപടഭേദഗുഹാദ്രവം (pseudocoel fluid) എന്ന് പറയുന്നു.




ചിത്രം 63. അസ്കാരിഡ് - ഒരു പേശിതന്തു വലുതാക്കിയത്.

1. സങ്കോചനഭാഗം 2. പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മികഭാഗം 3. ന്യൂക്ലിയസ്.
ദഹനവ്യൂഹം

വളരെ ലളിതമായ ഒരു ദഹനവ്യൂഹമാണ് ഈ പരജീവികളുള്ളത്. മനുഷ്യക്കുടലിലുള്ള ഒട്ടുകാലും ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ പദാർത്ഥങ്ങളാണല്ലോ വെറുയുടെ ആഹാരം. വായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേശീയസഞ്ചിയായ ഫാരിങ്ക്സ്, നീണ്ടു പരന്ന് ഋജുവായി കിടക്കുന്ന ആന്ത്രം, പേശീയമായ മലാശയം എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ദഹനവ്യൂഹം. ഫാരിങ്ക്സിന്റെ ഒരു അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം പരിശോധിച്ചാൽ, അതിന്റെ അറ്റത്ത് ത്രികോണികരൂപത്തിലുള്ളതാണെന്ന് കാണാം. ഫാരിങ്ക്സിന്റെ അന്തർഭാഗം ഒരു തടിച്ച കൂട്ടിക്കിൾ സ്പന്ദനാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും.

ക്ഷണത്തിലൂടെ ഫാരിങ്ക്സിൽ എത്തുന്ന മനുഷ്യദഹനരസങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ തടയുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധസ്മരമാണിത്. അവയവത്തിലുള്ള പേശിതന്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫാരിങ്ക്സിന് വികസിക്കുവാനും സങ്കോചിക്കുവാനും




ചിത്രം 64. അസ്കാരിഡ് - ഹെന്തേറിയവും പ്രജനന്തേറിയവും., ഇടത് പെൺ; വലത് ആൺ.

1. ഗുസനി 2. ഫെറിക്കുൾ 3. ഓഫിസോ 4. യോനി
5. ഗർഭാശയം 6. അസ്കാരിഡ് 7. ഗുദം 8. റെക്റ്റം
9. ക്ലോയാക്ക 10. ക്ലോയാക്കൽ ദ്വാരം 11. ശിശ്ന-നിയന്ത്രിക
12. സ്വലനീയവാഹിനി 13. ശിശ്നീയസഞ്ചി 14. ശിശ്നീയസഞ്ചി 15. വൃഷണം.

നം കഴിയും. ഈ വിധത്തിലാണ് ജീവിക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരരൂപം ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഫോറിംഗ്സിൽ നിന്ന് ആഹാരരൂപം കരോളിയായി ആന്തരികലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആന്തരികലേക്കുള്ള പ്രവേശനദ്വാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ചെറുവാൽവുകൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആഹാരം ഫോറിംഗ്സിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നതിനെ ഇവ തടയുന്നു.

ആത്മം ഒരു നിര എൻഡോഡോകോശങ്ങളാൽ നിർമിതമാണ്. ആത്മത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തു കൂട്ടിക്കിൾ പോലെ നേരിയ ഒരു പടലം ഉണ്ട്. ഉൾഭാഗത്തു സിലിയങ്ങളുടെ പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന നിരവധി ചെറുരോമങ്ങൾ കാണാം. ഇവ എൻഡോഡോകോശങ്ങളുടെ ഭാഗമായ മൈക്രോവില്ലൈ ആണെന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രാഭിപ്രായം. ആത്മത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഗ്രന്ഥിമയമാണ്. ദഹനാസങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ്. അവസാനഭാഗങ്ങൾ അവശേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അവശേഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കപടദേഹഗുഹാദ്രവം വഴി, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവശേഷിക്കുന്ന മലം മലാശയത്തിൽ സാഭരിക്കപ്പെടുകയും ഇടയ്ക്കിടക്ക് പുറംതള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പെൺവെരയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗുദപാദമുണ്ട്. പക്ഷേ ആൺവെരയിൽ മലാശയവും ജനനവ്യൂഹവും ഒരു പൊതു അറയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ഈ അവയവത്തിന് ക്ലോയാക്ക എന്നു പറയുന്നു; ബഹിർഭാഗത്തിന് ക്ലോയാക്കൽ ഭാഗമെന്നും.



ചിത്രം 65. അസ്കാരിസ് - ഗ്രസനിയുടെ പരിച്ഛേദം.


1. ആർക്കേഡ്കോശങ്ങൾ 2. ഗ്രസനി 3. സഹവാസകോശങ്ങൾ 4. ആധാരകോശം 5. ക്ലോവേറുകോശം 6. നാൽകോശം 7. ഫില്ലർകോശം.

വിസർജനവ്യൂഹം

ഇവധാർങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അനുദൈർഘ്യവരമ്പുകളിലാണ് വിസർജനനളികകളുടെ കിടപ്പ്. ഈ അനുദൈർഘ്യനളികകൾ ഒരേ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ഈ കോശം നീളകയും പൊള്ളയാവുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ, അത് നളികരൂപത്തിലായിത്തീരുന്നു. ഇതവശത്തുള്ള നളികകളെ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ജാലരൂപത്തിലുള്ള അനുപ്രസ്ഥനളികയുണ്ട്. അസ്കാരിസിൽ അനുപ്രസ്ഥനളിക മുൻഭാഗത്തായാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അനുപ്രസ്ഥമായി കിടക്കുന്ന ഒരു എപിഡെർ

മീസ് വരമ്പിലാണ് അനുപ്രസ്ഥനളിക കിടക്കുന്നത്. അനുപ്രസ്ഥനളികയിൽ നിന്ന് (ഇടുതുവശത്തു നിന്ന്) പുറപ്പെടുന്ന പൊതുവിസർജനനളിക മുൻപോട്ടു ചെന്ന് വിസർജനഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.

വിസർജനവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് ഇന്നും അപൂർണ്ണമാണ്. വിവാദപരവുമാണ്. വിസർജനപദാർഥങ്ങൾ കവചഭേദഗുഹാദ്രവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് വിസരണം വഴി വിസർജനനളികകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.



ചിത്രം 66. അസ്കാരിഡ്- വിസർജനാവയവം.

1. വിസർജനഭാഗം 2. പൊതുചാൽ 3. മുൻചാൽ 4. പിൻചാൽ 5. അനുപ്രസ്ഥചാൽ 6. ന്യൂക്ലിയസ്.

ശ്വസനം

മനുഷ്യക്കുടലിൽ ആഹാരപദാർഥങ്ങൾക്കിടക്ക് കടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഓക്സിജൻ മോളികുളുക്കളാണ് പരജീവി സാധാരണയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്സിജൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്നു വരുമ്പോൾ, പരജീവി സ്വശരീരത്തിലെ ഔട്ടോക്സൈൻ എന്ന സ്റ്റാർച്ച് നുറുപ്പിച്ച് (ferment) ശ്വസനം നടത്തുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. കവചഭേദഗുഹാദ്രവത്തിലടങ്ങിയ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന പദാർഥം, ഓക്സിജൻ സംഭരിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

നാഡീവ്യൂഹം

ഫാരിങ്സിനും ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ഒരു നാഡീവളയമാണ് മസ്തിഷ്കമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ വളയത്തിൽ മൂന്ന് സുപ്രധാന ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. രണ്ടെണ്ണം ഫാരിങ്സിന്റെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും മൂന്നാമത്തേത് അടിഭാഗത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിനും പുറമെ ഏതാനും ചെറിയ ഗാംഗ്ലിയോണുകളും വളയത്തിൽ കാണാം. വളയത്തിൽ നിന്ന് മുൻഭാഗത്തേക്ക് മൂന്നു ജോഡി നാഡീനാരുകൾ പോകുന്നതായി കാണാം. ഇവ മുഖീയ പാപ്പിലകൾ, സംവേദ അംഗങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധം പുലരുന്നു. വളയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പിൻഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആറോ അതിലധികമോ അനുദൈർഘ്യനാഡീനാരുകൾ കാണാം. ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണം മറുതളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കനം കൂടിയവയാണ്. ഒന്ന് മുകൾ വരമ്പിലും മററത് അടിവരമ്പിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അടിവരമ്പിലെ നാഡീനാരിൽ ഉടനീളം നിരവധി ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ കാണാം. മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് നാഡീനാരുകളെയും ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി അനുപ്രസ്ഥനാരുകൾ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നു.

മുഖീയപാപ്പിലകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചില പ്രത്യേകകോശങ്ങളാണ് മുഖ്യ സംവേദ അംഗങ്ങൾ. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, ഈ പരജീവിയിൽ സംവേദ അംഗങ്ങൾ കുറവാണ്.

ജനനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം

പുരുഷജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

പുരുഷജനനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അനുദൈർഘ്യ നളികയുടെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. മുൻ അഗ്രം മെലിഞ്ഞു കൂർത്തതും പിൻഭാഗങ്ങൾ വിതിയും വലുപ്പവും കൂടിയവയുമാണ്. നളികയുടെ മുൻഅഗ്രത്തിൽ ആണ് പുംബിജങ്ങൾ സ്രഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. പുംബിജങ്ങൾ അമീബരൂപത്തിലുള്ളവയാണ്. കപടപാദങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് അവ ചലിക്കുന്നത്. പുംബിജങ്ങളെ സ്രഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വൃഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നു പുംബിജങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗമായ വാസഡെഫറൻസിഡേക്ക് കടക്കുന്നു. അതു വഴി അവ നളികയുടെ പിൻഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബിജസംഭരണി എന്ന സഞ്ചിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിജസംഭരണിയും മലാശയവും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചെറുകുഴലുണ്ട്. ഇതിന് സഖലനീയ വാഹിനി (ejaculatory duct) എന്നാണ് പേര്. സഖലനീയവാഹിനി ബിജങ്ങളെ ക്ഷോധാക്കയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അക്രശശീലങ്ങൾ വഴി അവ ബഹിർഗമിക്കുന്നു.

സ്ത്രീജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

പെൺവെരയിൽ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു ജോഡി നളികകളുടെ രൂപത്തിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവയും അനുദൈർഘ്യമായി, വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു

കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവയുടെ മെലിഞ്ഞു കൂർത്ത അഗ്രങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ അഗ്രങ്ങളാണ് അണ്ഡാശയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന അണ്ഡങ്ങൾ, തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന അണ്ഡവാഹിനിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ അണ്ഡവാഹിനിയും ഒരു വിർത്ത സഞ്ചിയുടെ രൂപത്തിലായിത്തീരുന്നു. ഈ സഞ്ചിക്ക് ഗർഭാശയം എന്ന് പറയാം. മുൻഭാഗത്തു വെച്ച് രണ്ട് ഗർഭാശയങ്ങളാൽ ഒരു പൊതുനളികയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ഈ പൊതുനളികക്ക് യോനി എന്ന് പറയുന്നു. യോനി ജനനാഗ്രസ്ഥാ വഴി പുറത്തോട്ടു തുറക്കുന്നു. യോനിയോടു തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഗർഭാശയഭാഗങ്ങളിലാണ് പുംബീജം സ്വീകരിച്ച് സാദരിക്കപ്പെടുന്നത്.

പ്രാപ്തപാദനം

ഇണമേയുമ്പോൾ ആൺപുഴു, പെൺപുഴുവിനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുകയും തന്റെ ശിശ്നങ്ങൾ വഴി ഞെറുണജനനാഗ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പുംബീജങ്ങൾ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് സേകം നടക്കുന്നു. സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ ചെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ള ആവരണവും അതിനു പുറത്തായി പ്രോട്ടിൻ കൊണ്ട് നിർമിച്ച മറ്റൊരു ആവരണവും ധരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷാകവചങ്ങൾ ധരിച്ച സേകിതഅണ്ഡങ്ങൾ ആതിഥേയന്റെ കടലിൽ എത്തുന്നു. ഒരു പെൺവെരക്ക് 15,000 മുതൽ 20,000 അണ്ഡങ്ങൾ വരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ പുറത്തു വിടാൻ കഴിവുണ്ട് (പരജീവികളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യുല്പാദനസമൃദ്ധിയുടെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണിത്). ആതിഥേയന്റെ മലത്തോടൊപ്പം സേകിതഅണ്ഡങ്ങളും പുറത്തെത്തുന്നു. വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ, ആഹാരത്തിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഉള്ള സാറ്റഷണം വഴി അണ്ഡങ്ങൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ കടലിലെത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ച്, അണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നു വന്ന കൃമിരൂപത്തിലുള്ള ഭൂണാ കവചങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരുന്നു. ഈ ഭൂണശേഖം റാബ്ഡൈറാക്രൂപ ലാർവ എന്ന് പറയാറുണ്ട് (റാബ്ഡൈറാസിസ് എന്ന പേരിലുള്ള മറ്റൊരു പുഴുവിനോടുള്ള രൂപസാമ്യതയാണ് ഈ ശേഖയുടെ പേരിന് നിദാനം). ഈ ലാർവ ചെറുകടലിലെ രക്തയമനികളിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നു. രക്തം വഴി അവ ഹൃദയത്തിലും അവിടെ നിന്ന് ആതിഥേയന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ലാർവ രക്തധാര വിടുകയും, ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അറകളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. അറകളിൽ എത്തുന്നതോടെ, അവ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് കഫത്തോടൊപ്പം വായിലേക്ക് പുറംതള്ളപ്പെടുന്നു. വായിലെത്തുന്ന കഫം പുറത്തോട്ടു തുപ്പാതെ വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം ലാർവകൾ വീണ്ടും ആമാശയത്തിലും അതു വഴി ചെറുകടലിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. ചെറുകടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രക്തയമനികൾ, ശ്വാസകോശം എന്നിവയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെറുകടലിൽ തന്നെ എത്തുന്ന ഈ ഭൂണപ്രവാസത്തെയാണ് കടൽ ബാഹ്യപ്രവാസം (extra intestinal migration) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് കടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ലാർവ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു. ശരീരം വലുപ്പവും, വണ്ണവും വെള്ളനതോടെ പുറത്തുള്ള കൂട്ടിക്കിടാവരണം അപര്യാപ്തമായിത്തീരുന്നു—മനുഷ്യർ വണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ പഴയ ഷർട്ടും മറ്റും ഇറുകിയതായി തീരുന്നതുപോലെ. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഭൂണത്തിന് അതിന്റെ പഴയ ബാഹ്യാവരണം കൈവെടിഞ്ഞ്, കുറെക്കൂടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ കൂട്ടിക്കിടാവരണം ധരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ ബാഹ്യചർമ്മമാറ്റത്തെയാണ് പടംപൊഴിക്കൽ (moulting) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചെറുകടലിൽ വെച്ച് ലാർവ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പടം പൊഴിക്കുകയും അത് കഴിയുന്നതോടെ പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ, വെറു ഒരു നിരപദ്രവിയാകിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്; കടലിൽ എത്തുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം ചോത്തിയെടുക്കും എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ സംഖ്യാബലം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ—പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടികളിൽ—അവ വയറിനുള്ളിൽ കിടന്ന് പുളയുകയും, യകൃത്തുവാഹിനി (bile duct), ശ്വാസകോശം എന്നീ അവയവങ്ങളിൽ നശഞ്ഞു കയറി അസാധാരണ സ്രഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ബൈൽ വാഹിനിയിൽ കയറി അവ പ്രതിബന്ധം സ്രഷ്ടിച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം (jaundice) പിടിപെടാനിടയുണ്ട്; ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയാൽ ശ്വാസം മുട്ടും മൂലമായ അസാധാരണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്.

പിപെറാസിൻ ലവണങ്ങളടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ വെറുക്ക് ഒരു ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധിയാണ്.


മനുഷ്യരിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റു നെമറ്റോഡുകൾ

അസ്കാരിസിസ് പുറമെ, വേറേയും പല നെമറ്റോഡുകൾ മനുഷ്യരിൽ പരജീവികളായി നിവസിച്ചു, രോഗബാധയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമായ ചില പുഴുക്കളുടെ സംക്ഷിപ്തവിവരണമാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്. ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഖ്യവിവരങ്ങളും ജീവനചക്രത്തിന്റെ ഒരു രൂപരേഖയും മാത്രമേ ഈ വിവരണങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ.


1. കുമി (seatworm)

എൻറോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ചെറുകടലിൽ നിവസിക്കുന്ന ഈ ചെറുപുഴുവിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം. കട്ടികളിലും മറ്റും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കുമിടി എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം ഈ പുഴുക്കളാണ്. ആപല്ക്കാരി അല്ലെങ്കിലും, ഗുദഭാഗത്തിന് ചുറ്റും നശിച്ചുനടന്ന് വളരെയേറെ അസുഖം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരിൽ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നു.

പെൺപുഴു ഏതാണ്ട് 8 മുതൽ 13 വരെ മില്ലിമീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ്; ആൺപുഴുവിന്റെ നീളം ഏകദേശം 3.5 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ആൺപുഴുവിന്റെ പിൻഭാഗം കൊക്കി പോലെ വളഞ്ഞതാണ്. വായയുടെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലുമായി പക്ഷം പോലുള്ള രണ്ടു ബഹിർവേശനങ്ങൾ



ചിത്രം 67. എൻറോബിയസ് വെർമിക്കലാരിസ്, ഇടത്ത് പെൺ; വലത്ത് ആൺ.
 1. ശിരോവികാസങ്ങൾ 2. ഗ്രസനീ
 3. അന്ത്യബർബുകൾ 4. ദഹനക്ഷേത്രം
 5. അണ്ഡാശയങ്ങൾ 6. മുൻഅണ്ഡവാഹിനി
 7. മുൻഗർഭാശയം 8. പിൻഅണ്ഡവാഹിനി
 9. പിൻഗർഭാശയം 10. യോനി 11. വരവ 12. ഗുദം
 13. വൃഷണം 14. ശുക്രസഞ്ചി.



(projections) കാണാം. കൂട്ടിക്കിൾ നിർമിതമായ ഈ ബഹിർവേശനങ്ങൾക്ക് തലപാളികൾ (cephalic alae) അഥവാ ഏലാർ പാളികൾ (alar lobes) എന്നു പറയുന്നു. ഫാരിങ്ങ്സിൻ, അതിന്റെ പിൻതലപ്പുറത്ത് ഗോളരൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അറയുള്ളതായി കാണാം.

ജീവനചക്രം

ഇണ ചേരലോടെ ആൺപുഴു മരണമടയുന്നു. സേകിതരാണ്ഡങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെൺപുഴു വലിയ കടലിലേക്കും, അവിടെ നിന്ന് മലാശയത്തിലേക്കും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു. രാത്രിനേരത്ത് പെൺപുഴു ഗുദോരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും, ദോരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തപക്കിൽ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. മുട്ടയിടുന്ന സമയത്തു തന്നെ, മുട്ടകൾക്കുള്ളിലെ ഭൂണങ്ങൾ വളർന്ന് പുഴുരൂപത്തിലായിത്തീർന്നിരിക്കും; ഭൂണങ്ങൾ അണ്ഡാവരണത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. പെൺകുട്ടിയുടെ നഴഞ്ഞു കയററവും, മുട്ടയിടലും ആതിഥേയൻ അസുഖമായി അനുഭവപ്പെടും. അസുഖം നിമിത്തം, ആതിഥേയൻ ഗുദോരത്തിനടുത്തുള്ള തപക്ക് ചൊരിയുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട മുട്ടകൾ കയ്യിലും, നഖങ്ങൾക്കിടയിലും കയറിക്കൂടുന്നു. സംഭൂഷിതമായ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആതിഥേയൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയോ, തൊട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടകൾ ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സംഭൂഷിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതോടെ, മുട്ടകൾ മറ്റൊരു ആതിഥേയനിൽ കടന്നുകൂടുന്നു. പുതിയ ആതിഥേയന്റെ കടലിൽ എത്തുന്നതോടെ, അണ്ഡാവരണം വിളക്കുകയും, ഭൂണം വിമോചിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു മാസത്തിനകം ഭൂണം വികാസം മുഖേന പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തുന്നു. ഈ പുഴുവിന്റെ ജീവനചക്രത്തിൽ കടൽബാഹ്യപ്രവാസം നടക്കുന്നില്ല.

സംഭൂഷിതമായ വസ്തുങ്ങൾ രോഗപ്പകർച്ചയിൽ പങ്കു വഹിക്കാറുള്ളതായി തെളിവുണ്ട്. വായുവിലൂടെയും സംഭൂഷണം നടക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. പിലൈറസിൻ ലവണങ്ങളാണ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2. കൊക്കപ്പുഴു

ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡുവോഡെനേൽ, നെക്കോറർ അമേരിക്കാനസ് എന്നീ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സ്പീഷിസിൽപ്പെട്ട പുഴുക്കളെയാണ് കൊക്കപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻകൈലോസ്റ്റോമയെ അടപക്ഷിച്ച്, നെക്കോററിന് നീളവും വണ്ണവും കുറവാണ്. മനുഷ്യരുടെ ചെറുകടലിലാണ് നിവാസം. കടലിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങൾ കടിച്ചു മുറിച്ച് പ്രണമുണ്ടാക്കി, പ്രണത്തിലൂടെ ഉരുന്ന രക്തം നുകർന്നാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവ ഭയങ്കര രക്തക്കൊതിയരാണ്. പ്രണത്തിലൂടെയുള്ള രക്തവാർച്ചയെങ്ങാനും കുറഞ്ഞുപോയാൽ, വേറൊരു ദിക്കിൽ കേറിക്കടിച്ചു ഒരു പുതിയ പ്രണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. കാലാനുരത്തിൽ, ഈ പരജീവികളുടെ ദ്രോഹം നിമിത്തം, ആതിഥേയൻ വിളർച്ചയും (anaemia) മാരനവധി അസുഖസ്ഥിതിയും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യ

യിൽ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആൻകൈലോസ്റ്റോമിയോസിസ് അഥവാ കൊക്കപ്പുഴുബാധ.


ആൻകൈലോസ്റ്റോമ സ്റ്റിഷിസിൽ പെട്ട പെൺപുഴുവിന് 10 മുതൽ 13 വരെ മില്ലിമീറ്റർ നീളം കാണാം, ഏതാണ്ട് 6 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും ആൺപുഴു ചെറുതാണ്. നീളം 8 മുതൽ 11 വരെ മില്ലിമീറ്റർ, വീതി 4.5 മീറ്റർ. ആൺപുഴുവിന്റെ പിൻഅഗ്രത്തിൽ, കൂട്ടിക്കിടർ നിർമ്മിതമായ രണ്ടു പാളി കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു പരന്ന സഞ്ചി പോലുള്ള അവയവം കാണാം. ഇതിന് സംയുഗ്മന ബർസാ (copulatory bursa) എന്നു പറയുന്നു. ക്ഷോഭയാകൽ ദ്വാരം ഇതിനകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദ്വാരത്തോടു് അനുബന്ധിച്ചു് രണ്ടു് അറകൾക്കിടയിലുള്ള (copulatory spicules), ശിശ്നങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടു് സഞ്ചികളും കാണാം.

ആൺപുഴുവിന്റേയും, പെൺപുഴുവിന്റേയും മുൻഭാഗം മേലോട്ടു് വളഞ്ഞതാണ്. വായ മുൻഅഗ്രത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മുകൾഭാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വായ ഉപയോഗിച്ചു് കടിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മുൻഭാഗം അല്പം വളഞ്ഞു് നിൽക്കുന്നത്. വായയുടെ അടിവശത്തു് രണ്ടു് പ്ലോറുകളുണ്ടു്. ഓരോ പ്ലോറിലും മൂന്നു പല്ലുകളുണ്ടു്. ഇവയിൽ നടുവിലുള്ള പല്ലു് ചെറുതാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്ക് ആറു് പല്ലുകളുണ്ടു്. നാലെണ്ണം വലുതും, രണ്ടെണ്ണം ചെറുതും. ഇവക്ക് പുറമെ വായക്കുള്ളിലായി രണ്ടു് ത്രികോണികപല്ലുകളും ഉണ്ടു്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊക്കപ്പുഴു കടലിൽ കടിച്ചുതുങ്ങുകയും, അന്തർഭാഗങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഫാരിങ്ക്സ് സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്, രക്തംവലിച്ചു് കടിക്കുവാൻ ഉപയുക്തമായ രീതിയിൽ പേശിയവുമാണ്. ശ്വാസോലസനയെ സംബന്ധിച്ചു്, അസ്കാരിഡയുമായുള്ള മുഖ്യവ്യത്യാസങ്ങളാണു് മേലെ വിവരിച്ചതു്. അവയവവ്യൂഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഘടന, അസ്കാരിസിന്റേതിനോടു് വളരെ യേറെ സദൃശമാണു്.

ജീവനചക്രം

ഇണചേരൽ ആതിഥേയന്റെ കടലിൽ വെച്ചു് നടക്കുന്നു. സേകിതഅണ്ഡങ്ങൾ മനുഷ്യമലത്തോടൊപ്പം പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു. കൊക്കപ്പുഴു ഒരു ദിവസം 22, 000 മുതൽ 24, 000 വരെ അണ്ഡങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. അണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഷെൽ എന്ന ആവരണം ഉണ്ടാവും. പുറത്തെത്തി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അണ്ഡങ്ങളിലെ ഭ്രൂണങ്ങൾ പൂർണ്ണ സദൃശമായി വളരുന്നു. ഇവ ആവരണം പൊട്ടിച്ചു് പുറത്തുവന്നു് മണ്ണിൽ ഇഴയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ ദശയെ റാബ്ഡെററിഫോം ലാർവ എന്നു് വിളിക്കുന്നു. റാബ്ഡെററിഫോം ലാർവയുടെ ഫാരിങ്ക്സിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ കാണാം. ഫാരിങ്ക്സിന്റെ മുൻ അറ്റ നിളത്തിൽ സിലിണ്ടർ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. പിൻ അറ്റ ഗോളരൂപത്തിലും. ഈ രണ്ടു് അറകളേയും ബന്ധിച്ചു്



ചിത്രം 68. കൊക്കപ്പുഴു (ആൻകൈലോസ്റോറാമ).

- A ആൻകൈലോസ്റോറാമ ഡ്യൂഡോനേലിന്റെ പിൻഭാഗം
 B ആ. ഡ്യൂഡോനേലിന്റെ ആദ്യബാലദശ.
 C ആ. ഡ്യൂഡോനേലിന്റെ സാമൂഹികമായ മൂന്നാദശ.
 D നായയിലെ കൊക്കപ്പുഴുവിന്റെ മുൻവശം.
 E ആട്ടിലെ കൊക്കപ്പുഴുവിന്റെ മുൻവശം.
 F ഇതിന്റെ തന്നെ ബർസ.

1. പുംബിജവാഹിനി 2. ശുക്ലീയസഞ്ചി 3. സ്ഖലനീയ
 വാഹിനി 4. മുളുക്കൾ 5. സായുഗ്മനപേരി 6. ബർസ
 ഗ്രസനി 8. ഗ്രസനിയുടെ അന്ത്യബർബ്ബ 9. നാഡിവലയം
 10. ഹെനക്ഷൽ 11. പ്രജനനവ്യൂഹത്തിന്റെ ആദ്യകം
 12. ഗുദം 13. മൂന്നു കൊക്കകളോടുകൂടിയ മുറിക്കാപ്പോറം
 14. ലാൻസാറുകൾ 15. മുഖീയ കാപ്സ്യൂൾ 16. അപാ
 ക്ഷകോൺ 17. റെനറൈവ്യൂഹം 18. മുറിക്കാപ്പോറം
 19. അപാക്ഷബർസയുടെ ഭ്രൂം 20. അപാക്ഷഗ്രസനിഗ്രന്ഥി.

കൊണ്ട് ഒരു നളികരൂപത്തിലുള്ള ഭാഗം കാണാം. ഇതിനെ ഫാരിങ്സ് സിൻറർ ഇസ്റ്റ്മസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇസ്റ്റ്മസിന് ചുറ്റമാണ് നാഡിവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റാബ്ഡോറിഫോം ലാർവ് മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഭക്ഷിച്ചു വലുതാവുന്നു. മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനകം ഈ ലാർവ് പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിച്ചു പടം പൊഴിക്കുന്നു. അതോടെ പുഴ നായ പോലെ നിണ്ട് മെലിഞ്ഞതായിത്തീരുന്നു. ഈ ദശക്ക് ഫൈലേരി രൂപ ലാർവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ ലാർവ് വളന്ന് വലുതായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പടം പൊഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇത്തവണ പുഴ, അത് പൊഴിച്ച ചർമ്മത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു. ഈ ദശയിൽ ലാർവ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല. ബന്ധനസ്ഥനും നിരാഹാരിയുമായ ലാർവയെ നിരാഹാരിയായ ഫൈലേരി രൂപ ലാർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ലാർവ്ക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ബന്ധനസ്ഥനായി ജീവിക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ട്.


ഇതിനിടക്ക് ലാർവ് മനുഷ്യന്റെ തപകമായി സംസർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചാൽ, അത് ചർമ്മത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്ന്, തപകിലേക്കു തുളച്ചു കയറുന്നു. സാധാരണയായി കാലിന്റെയും, കച്ചിന്റേയും തപകിൽ കൂടിയാണ് ഇവ പ്രവേശിക്കുക. മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴോ, പാദരക്ഷയില്ലാതെ നടക്കുമ്പോഴോ ആണ്, സാധാരണയായി, ലാർവുകളുടെ നഷ്ടത്തുകയറാം സംഭവിക്കുക. തപകിലെ രക്തധമനികളിലൂടെ അവ ഹൃദയത്തിലേക്കും, പിന്നീട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പോകുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് അവ രക്തധാരയിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുകയും വായു അറകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് പുറം നുള്ളപ്പെടുന്ന കഫത്തോടൊപ്പം അവ വായിലേത്തുന്നു; അവിടെ നിന്ന് ദഹനവ്യൂഹത്തിൽ കടന്നുകൂടി ചെറുകടലിൽ എത്തുന്നു. കടലിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കൂടി പടം പൊഴിച്ചു, അത് പ്രൗഢാവസ്ഥ (adult stage) പ്രാപിക്കുന്നു.

മലവിസർജനത്തിന് പ്രത്യേകമായുള്ള കഴികളോ കളുടസാ ഉപയോഗിക്കുക, സംദൃഷിതമായ മണ്ണുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം കുറയ്ക്കുക, പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നീ നടപടികൾ രോഗബാധയെ ഒട്ടൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്നവയാണ്. ബൈഫിനിയം ഹൈഡ്രാക്ലിനാഫ്തോവേററ് (ആൽ കോപാർ) മുതലായ ഔഷധങ്ങൾ ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

3. മത്ത് പുഴ (Filarial worm)

മത്ത് രോഗത്തിന് കാരണഭൂതരായ പുഴക്കളെയാണ് മത്ത് പുഴ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ രണ്ടു സ്പീഷീസുകളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്; വളരെക്കുറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റിയം ബ്രൂനിയ മലായിയും. ഈ പുഴക്കൾ മനുഷ്യന്റെ ലിംഫ് ധമനി (lymph vessel) കളിലും ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിലും നിവസിക്കുന്നു. ഇവ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ചുരുണ്ടുകൂട്ടുമ്പോൾ, ലിംഫ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനെ തടയുന്നു. പ്രതിബന്ധം കാരണം ലിംഫ് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും, അതു മൂലം ലിംഫ് ധമനി വിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ആ


ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങൾ ചീർക്കുകയും ലിംഫ് പാരിസഞ്ചരണം നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മത്സ്യം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. സാധാരണയായി കൈകൾ മുട്ടുകളിലെയും വൃഷണസഞ്ചി (scrotum) യിലെയും ഗ്രന്ഥികളിലാണ് പ്രതിബന്ധം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. പാരിസഞ്ചരണം നിലയ്ക്കുന്നതോടെ പ്രസ്തുത ഭാഗങ്ങളിലെ കോശങ്ങൾക്ക് കോട്ടാ തട്ടുകയും അവ ഗ്ലാൻഡിലോകോസസ്, സ്ക്രോപ്കോകോസസ് എന്നീ ബാക്റ്റീരിയങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരകെട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന വ്രണങ്ങളും പഴുപ്പും ബാക്റ്റീരിയയുടെ ആക്രമണഫലങ്ങളാണ്.



ചിത്രം. 69. വൃശ്ചേരയിയ ബാൻ ക്രോമറ്ററി. പെൺപുഴുവിന്റെ മുൻ ഭാഗം. 1. നാഡിവലയം 2. ഗ്രസനിയുടെ പേശികാഗം 3. ഗ്രസനിയുടെ ഗ്രന്ഥികാഗം 4. വർവ 5. അണ്ഡസംഖലനാഗം 6. യോനി 7. ഹെതക്ഷൽ.

വളരെ മെലിഞ്ഞു നാരുരൂപത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. മഞ്ഞ കലർന്ന വെളുപ്പാണ് നിറം. പ്രൗഢാവസ്ഥ പ്രാപിച്ച പെൺപുഴുവിന് ഏതാണ്ട് 10 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 0.25 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവും കാണാം. ആൺ പുഴു വളരെ ചെറുതാണ്. ഏകദേശം 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളമേ കാണുകയുള്ളൂ. ആൺപുഴുവിന്റെ പിൻഭാഗം വളഞ്ഞതാണ്. അവിടെയുള്ള രണ്ട് അംകശശിശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് വലുതും മറേറു ചെറുതുമാണ്. വായയോടു അനുബന്ധിച്ചു പല്ലുകളോ പാപ്പിലകളോ ഇല്ല. നീളത്തിലുള്ള ഫാറിങ്സിന്റെ മുൻഭാഗം പേശിയവും പിൻഭാഗം ഗ്രന്ഥിയും (glandular) ആണ്.

പെൺപുഴുവിൽ ജനനാംഗരസ്യം വളരെ മുന്നിൽ, ഏതാണ്ട് ഫാരിങ്സിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനടുത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ രസ്യത്തോടു അനുബന്ധിച്ച്, അണ്ഡങ്ങളെ നിഷ്കാസനം (eject) ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അറ കാണാം. ഇതിന് ഓവിജെക്ടറാർ അഥവാ അണ്ഡസംഖലനി എന്ന് പറയുന്നു.



ചിത്രം. 70. *മുഷേറേറിയ*-ജീവനചക്രത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ. A-മൈട്രോഫെലേറിയ B-കൊതുക്കിലെ മൈട്രോഫെലേറിയയുടെ ഏറ്റവും ആദിമഭാഗം. C-D-പിന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ E-കൊതുക്കിലെ അന്തിമസാക്രൂമികഭാഗം.

1. ഉറ 2. ബാഹ്യചർമ്മം 3. ട്രെസ്സലേറാ 4. നാഡീവലയം
5. റെനറാകോശം 6. വിസർജനഭാഗവും ബ്ലാഡറും
7. ആന്തരപിണ്ഡം 8-11 നാലു വലിയ കോശങ്ങൾ
12. ഗുദം 13. ഗ്രസനി 14. ദഹനക്കുഴൽ.

ജീവനചക്രം

സാധാരണയായി ആൺപുഴുവും പെൺപുഴുവും ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. ഇണചേർന്ന് ശേഷം, പെൺപുഴുവിലെ സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ വളരെ ഓരോ ചെറുപുഴുവിന്റെ രൂപത്തിലായിത്തീരുന്നു. ഈ വികാസം നടക്കുന്നത് പെൺപുഴുവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചാണ്. പെൺപുഴു ഇത്തരം ശിശുക്കളെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശിശുക്കൾക്ക് സൂക്ഷ്മമൈലേറിയ അഥവാ മൈട്രോഫെലേറിയ എന്ന് പറയുന്നു.

ന്നു. ഇത്തരം ഭൂണങ്ങൾ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതായ ഒരു ചർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ഏകദേശം 0.2 മുതൽ 0.3 മില്ലിമീറ്റർ വരെ നീളം കാണും. ഇവ രക്തധാരയിൽ കടന്നുകൂടി ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നു. ഈ ഭൂണങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പകൽ സമയത്തു പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിൽ അവയെ രാത്രി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ (സാധാരണ, താപ്തം തൊട്ടടുത്തു നിന്നാണ് പരിശോധനക്കുള്ള രക്തം എടുക്കുക). അതായത് അവ താപ്തത്തിലുള്ള രക്തധമനികളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. പകൽ സമയത്തു അവ ആന്തരാവയവങ്ങളിലെ രക്തധമനികളിൽ ഒളിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. പക്ഷേ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരുവന്റെ രക്തത്തിൽ, മൈട്രോഫൈമലേറിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പകൽ സമയത്താണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തിനുള്ള കാരണം തീട്ടമായി പഠിക്കുക ഇന്നും വിഷയമാണ്. ഈ ദശയിലെ ഘടനാരൂപം ചിത്രം. 8. പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ചർമ്മത്തിനകത്തു അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂണത്തിൽ വികാസപ്രാപ്തിയുള്ള ഏതാനും കോശങ്ങളും മുൻഭാഗത്തായി തുളയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു അംകരവും - സ്റ്റൈലറും എന്നാണ് പേര് - കാണാം. ദഹനവ്യൂഹമോ മറാവയവങ്ങളോ കാണപ്പെടുന്നില്ല. മൈട്രോഫൈമലേറിയകൾ പിൽക്കാലവികാസം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, അവ കൊതുക്കളുടെ ദേഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. കൊതുക്കിനുള്ളിൽ വെച്ച് മാത്രമേ അവ വളരും വളരായി പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ.

കൂലേകസ് മോറിഗാൻസ്, കൂലേകസ് പൈപിയെൻസ് എന്നീ സ്പീഷിസുകളിൽ പെട്ട കൊതുക്കളാണ്, വ്യപാരോധയുടെ വാഹകർ. കൊതുക് രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ മൈട്രോഫൈമലേറിയകളും രക്തത്തോടൊപ്പം കൊതുക്ിന്റെ ആമാശയത്തിലേക്കു തുടങ്ങുന്നു. ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് മൈട്രോഫൈമലേറിയ അതിന്റെ ചർമ്മം ഭേദിച്ച് പുറത്തുവരുന്നു. സ്റ്റൈലറാന്റെ സഹായത്തോടെ അത് ആമാശയം തുളച്ച് കൊതുക്ിന്റെ വക്ഷീയപേശികളിൽ കയറിക്കൂട്ടുന്നു. പേശിതന്തുക്കൾക്കിടയിൽ ചുരുങ്ങു കൂടിയശേഷം, അത് വളർന്നു വളരുന്നതാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പടംപൊഴിക്കുകയും ഏകദേശം 1 മുതൽ 1.5 മില്ലിമീറ്റർ നീളം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഏതാണ്ട് 10 മുതൽ 12 ദിവസങ്ങൾ കൊതുക്ിൽ കഴിച്ച് കൂടിയ ശേഷം പുഴു ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുക കൊതുക്ിന്റെ മുഖാഗങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. കൊതുക് കുടിക്കുന്നതോടെ, പുഴു മനുഷ്യചർമ്മത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. കൊതുക്കുടി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വ്രണത്തിലൂടെ അത് നഴഞ്ഞു കയറുകയും അങ്ങനെ ലിംഫ്ധമനികളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബ്രൂഗിയ മലായി എന്ന പുഴുവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുന്നത് മാനസനായിരസ് ആൻഡിഫെറ എന്ന കൊതുക് ആണ്.

മനു്ദോഗത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ രണ്ടു പോംവഴികളാണു് ഉള്ളതു്:

1. പാജീവിയെ നശിപ്പിക്കുക. മനുഷ്യരക്തത്തിലെ പാജീവിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഡൈഇയുമൈൽ കാർബമേസീൻ (ഫെടസാൻ) എന്ന ഔഷധം സഹായകമാണ്.

2. കൊതുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. ഇതിനായി, കൊതുക്വലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മറ്റൊരു പോംവഴി കൊതുക്കളെ-അവയുടെ ലാർവകളെ-നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിന് കീടനാശിനികൾ ഫലപ്രദങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മാൻസറോയിഡസ് ലാർവയെപ്പറ്റി ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്നത് യുക്തമായിരിക്കും. സാധാരണ കൊതുക് ലാർവകൾ, വെള്ളത്തിന് മീതെയുള്ള വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാണവായു സമ്പാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാൻസറോയിഡസിന്റെ ലാർവ, ജലസസ്യങ്ങളുടെ (ഉദാ: കുളവാഴ) വേരുകളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്ന വായുസഞ്ചികളിൽ നിന്നാണ് പ്രാണവായു സമ്പാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഇത്തരം ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ജലസസ്യങ്ങൾ നീക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു.


4. ചുരുത്ത് പുഴു.

ടെക്ട്രാസ് ടെക്ട്രാ എന്നാണ് ഈ പുഴുവിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമധേയം. മനുഷ്യരുടെ വൻകുടലിലാണ് പാജീവിയുടെ നിവാസം. നിരുപദ്രവിയാണ്. ഏറിവന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വയറിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയെന്നു വരാം. കേരളത്തിൽ വിരളമാണ്.

ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മുൻഭാഗം ഒരു ചാട്ടവാറിന്റെ രൂപത്തിൽ നേരിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ വിപ്പ് (ചാട്ടവാർ) പുഴു (whip worm) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പെൺപുഴു ചെറുതാണ്, 35 മുതൽ 50 മിമീ നീളം വരെ; ആൺപുഴു ചെറുതാണ്, 30 മുതൽ 45 മിമീ നീളം കാണാം. ആൺപുഴുവിന്റെ പിൻഭാഗം വളഞ്ഞതാണ്. ഒരു അക്രശശീശ്ശി ഉള്ളു. ഫാരിങ്ങ്സ് നീണ്ടു മെലിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സ്ത്രീജനനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം ഏക നളിക രൂപത്തിലാണ്.

സേകിത അണ്ഡങ്ങൾ മനുഷ്യമലത്തോടൊപ്പം പുറത്തു വരുന്നു. പുറത്തു വന്നശേഷം, മണ്ണിൽ വെച്ച് അണ്ഡം വികസിക്കുകയും ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭൂണം പുഴുരൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂണം അണ്ഡാവരണത്താൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കും. സംഭാഷണം വഴി ഇത്തരം ഭൂണങ്ങൾ മനുഷ്യകുടലിൽ എത്തുമ്പോൾ, അവ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിമോചിതമാകുകയും വൻ കുടലിലേക്ക് പ്രവാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃമിയിലെന്ന പോലെ, ഈ പാജീവിടെ ജീവനചക്രത്തിലും കുടൽ ബാഹ്യ പ്രവാസം (extra intestinal migration) നടക്കുന്നില്ല.

ഡൈതയാസാനിൻ അയോഡൈഡ് എന്ന ഔഷധമാണ് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



ചിത്രം. 71. ചവോഷ്കപ്പുഴ (ചൈകുറ്റസ്)

A-പെൺപുഴ B-ആൺപുഴ C-സിറസ് സ്വീകൃതം അകം പുറത്താക്കിയത്.


1. മുൻവശത്തെ ചവോഷ് പോലുള്ള അവയവം 2. വർവ
3. യോനി 4. ഗർഭാശയം 5. അണ്ഡവാഹിനി 6. അണ്ഡാശയം 7. ഫെനക്കുഴൽ 8. ഗുദം 9. വൃഷണം 10. പുഞ്ചിജവാഹിനി 11. മുള 12. സിറസ് 13. ഗുസനി.

5 ട്രൈക്കിനാ പൂഴം (Trichina worm)

ട്രൈക്കിനെല്ലു ബ്ലാസ്റ്റോഡെൽഫിസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയനാമം. വാസ്തവത്തിൽ അവ എലികളിൽ ജീവിക്കുന്ന പരജീവികളാണ്. പ്രാഥമികമായി അവ എലിയുടെ ചെറുകുടലിലും ദ്വണ്ടരയിൽ എലിയുടെ മാംസപേശികളിലുമാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ എലിയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നിയും അത്തരം പന്നിയുടെ വേവാത്ത ഇറച്ചി തിന്നുന്ന മനുഷ്യനും ഈ പരജീവിക്ക് ആതിഥേയരാവാറുണ്ടെന്നു മാത്രം. മനുഷ്യന്റെ കുടലിലും മാംസപേശികളിലും കടന്നു കൂടിയാൽ, അവ കടുത്ത ജ്വരബാധ ഉളവാക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഈ രോഗബാധ വിരളമായേ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ.

പെൺപുഴ ഏതാണ്ട് 4 മി മി നീളം വരും; ആൺ പുഴ 1.5 മില്ലി മീറ്ററും. ആണിന് അകശശിശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. ആൺപുഴ സായുഗ്മനസമയത്തു ക്ഷോഭയാകെ പുറത്തോട്ടു തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. സായുഗ്മനം കഴിയുന്നതോടെ ആൺപുഴ ചാകുന്നു. സേകിതശാസ്ത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെൺപുഴ കുടലിലെ ലിംഫ് ധമനികളിൽ തുളച്ചു കയറുകയും, അവിടെ വെച്ച് ഏകദേശം 0.1 മില്ലിമീറ്റർ നീളമുള്ള കണ്ണുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെൺപുഴ 1500 കണ്ണുങ്ങൾ വരെ പ്രസവിക്കാറുണ്ട്. പ്രസവശേഷം പെൺ പുഴവും ചാകുന്നു. കണ്ണുങ്ങൾ രക്തധമനികൾ വഴി ദഹനോത്സാഹം പരക്കുന്നു. ഇവയിൽ മിക്കവയും രക്തധമനികളിൽ നിന്ന് മാംസപേശികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാംസപേശികളിലാണ് ഇവ കയറി കൂടുന്നത്. ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കടിയിലുള്ള ഡയഫ്രം, കൈകാലുകളിലെ മുഖ്യപേശികൾ എന്നീ പേശികളിലാണ് സാധാരണയായി പുഴശിശുക്കളെ കണ്ടുവരുന്നത്. പേശികളിൽ വെച്ച് ശിശുക്കൾ വലുതായി ഏതാണ്ടു, ഒരു മില്ലിമീറ്റർ നീളം കൈവരിക്കുന്നു. ഇതോടെ അവ പേശിതന്തുക്കൾക്കിടയിൽ ചുരുങ്ങു കൂടുകയും, ഒരു സഞ്ചിപോലുള്ള സിസ്റ്റം ചർമ്മത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രോഗബാധിതന്റെ പേശിയിൽ മേൽ വിവരിച്ച രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി 'സിസ്റ്റം'കൾ കാണാം.

സിസ്റ്റംകൾക്കുള്ളിലെ ശിശുക്കൾ വളർന്ന് വലുതാവണമെങ്കിൽ, അവ മറ്റൊരു ആതിഥേയന്റെ ദഹനവ്യൂഹത്തിൽ എത്തണം. സിസ്റ്റംബാധയുള്ള എലിയുടെ മാംസം പന്നി തിന്നുമ്പോൾ, സിസ്റ്റംകൾക്കകത്തെ ശിശുക്കൾ പന്നിയുടെ ചെറുകുടലിൽ എത്തുന്നു. ചെറുകുടലിൽ എത്തിയ ശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവ വളർന്ന് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ളവയായിത്തീരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ പന്നിയുടെ പേശികളിലും സിസ്റ്റംകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. സിസ്റ്റംകൾ നിറഞ്ഞ പന്നിമാംസം (നല്ലവണ്ണം വേവിക്കാതെ) ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവ മനുഷ്യന്റെ കുടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് പ്രത്യുൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾ, മനുഷ്യന്റെ മാംസപേശികളിൽ കയറിക്കൂടുന്നു. തയാബെൻഡസോൾ എന്ന മരുന്നു ശിശുശയ്യയിലുള്ള പുഴക്കളെ കൊല്ലുവാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.




ചിത്രം. 72. ട്രൈക്കിനാ പുഴ. (ട്രൈക്കിനെല്ല):

A. പെൺപുഴ B. ആൺപുഴ C. പരിപോഷപേരിയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ബാല്യദശ.

1. നാഡീവലയം 2. ഗുസനിയുടെ സ്വതന്ത്രഭാഗം 3. സ്റ്റീക്കോസോമം ഗുസനിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും 4. വർവ 5. ഗർഭാശയം 6. ദഹനക്ഷേൽ 7 അൻഡവാഹിനി 8. അൻഡാശയം 9. ഗുദം 10. വൃഷണം 11. പുംബീജവാഹിനി 12. ദഹനക്ഷേലവും പുംബീജവാഹിനിയും കൂടിച്ചേരുന്നതു്.

ഗിനിപ്പുഴ

ബ്രാക്കൻ കലസ് മെഡിനെൻസിസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രനാമം. മനുഷ്യന്റെ കാലിലെ തപക്കിനടിയിലുള്ള സന്യാജനകലയാണ് മുഖ്യവാസസ്ഥലം. മെലിഞ്ഞു, നാരു രൂപത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. പെൺപുഴ വളരെ നീളമുള്ളതാണ്, നീളം ഏകദേശം 50 സെന്റിമീറ്റർ വരും. ആൺപുഴവിനെ വിരളമായേ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അവ ചെറുതാണ്; ഏകദേശം 4 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആൺപുഴവിന്റെ പിൻഭാഗം വളഞ്ഞതാണ്.



ചിത്രം. 73 A. ബ്രാക്കൻ കലസ് മെഡിനെൻസിസ്, പെൺ. B. ബാല്യദശ ഡെസ്കോപ്പിനുള്ളിൽ 1. കൂട്ടിക്കിൾ നിർമിതമായ ചിറകുകൾ.

സംയുഗ്മന കഴിയുന്നതോടെ ആൺപുഴ ചാകുന്നു. സേകിത അൺഡങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെൺപുഴ തപക്കിനടുത്തു വന്ന്, ഒരു വിഷദ്രാവകം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതു മൂലം ആ ഭാഗത്തു് കമിള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണം പൊട്ടിപ്പറപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രണം പഴുത്തു് പൊട്ടുമ്പോൾ, പെൺപുഴ പ്രണഭാരത്തിലൂടെ തലനീട്ടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കാൽ വെള്ളത്തിൽ നനയുമ്പോൾ (കുളത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കുമ്പോളും മറ്റും) മാത്രമേ പുഴ തല നീട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതോടെ പുഴവിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജനനാഗാസ്രത്തിലൂടെ നിരവധി ശിശുക്കൾ വെള്ളത്തിലോട്ടു് ചാടുന്നു. ശിശുക്കൾക്കു് ഏതാണ്ടു് 0.6 മില്ലി

വൈലം ആഷ് കൺമിന്നസ്



മിറർ നിളം കാണാം. ഇവ വെള്ളത്തിൽ നിന്നി സൈകളോപ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രസ്റ്റേഷ്യനകത്ത് കയറിക്കൂടുന്നു. അവിടെ വെള്ളം വളരെ വലുതാകുന്നു. സൈകളോപ്സ് കലൻ വെള്ളം കടിക്കുമ്പോൾ, അവ മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അവ രക്തധമനികൾ വഴി കാലിലെ സാധാരണകലയിൽ എത്തുന്നു. ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് സംയോജനകലയിലേക്കുള്ള പ്രവാസത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ വിവരം ഇനിയും ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ സന്തമിച്ചശേഷം ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പെൺപുഴ പ്രസവിക്കുവാൻ തുടങ്ങും.

ഗിനിപ്പുഴയായ, കോളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിരളമാണ്. എന്നാൽ അയൽസ്റ്റേറ്റുകളായ തമിഴ്നാട്ടിലും, ആന്ധ്രയിലും ഈ രോഗം സാധാരണയായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ, മുട്ടയിടാൻ വെമ്പുന്ന പെൺപുഴവിന്റെ തലപ്പ് പിടിച്ചു ഒരു കോലിൽ ചുറ്റി, വളരെ സാവധാനം പുഴവിനെ മുഴുവൻ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള വിദഗ്ദ്ധരായ വൈദ്യന്മാരുണ്ട്. ഡൈ ഈമെൽ കാർബമേസിൽ പുഴുഗിരിക്കളെ കൊല്ലാൻ ഉപകരണങ്ങളാണ്. സംക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ സൈകളോപ്സിനെ, ക്ലോറിൻ, ഡി. ഡി. ടി. എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.


മനുഷ്യനിൽ പരാജീവികളായി നിവസിക്കുന്ന ഏതാനും നൈമറോഡുകളെപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഇവക്കു പുറമെ കണകാലികളിലും, മറ്റു മൃഗങ്ങളിലും നിവസിക്കുന്ന നിരവധി പരാജീവികളുണ്ട്. ചില നൈമറോഡുകൾ സസ്യങ്ങളിൽ പരാജീവികളായി കഴിയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം: ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വേരുകൾ നശിപ്പിച്ച് നാശം വരുത്തുന്ന ഹെറോറോഡി. ഇവയെല്ലാം പുറമെ സ്വതന്ത്ര ജീവികളായി, കടലിലും, ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിലും കരയിലും കഴിയുന്ന നിരവധി നൈമറോഡുകളുണ്ട്. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട സ്പിഷിസുകളിൽ ഏകദേശം 50 ശതമാനം സ്വതന്ത്രജീവികളാണ്. ഉദാ: കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന എനോപ്തസ്, ശുദ്ധജലത്തിലെ ഡോറിലേയ്മസ്, കരയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മോണോഹിസ്റ്ററാബ്ഡെറാസ് മുതലായവ.

വർഗ്ഗം: റോട്ടിഫെറ

ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിലെ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം മൈക്രോസ്കോപ്പിന്മീതെ വച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം ജീവികളാണ് ചക്രജീവികൾ (wheel animalcules). ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്. അവയുടെ നീളം 0.04 മുതൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ്. ഏകിലും മിക്ക ചക്രജീവികളുടെയും ശരീരത്തിന് 0.05 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളം കണ്ടുവരുന്നില്ല. ഈ ജീവികളുടെ മുൻ അഗ്രത്തിൽ വളയരൂപത്തിൽ അടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നിര സീലികളുണ്ട്. ഈ സീലികൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചക്രം തിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവികളെ ചക്രജീവികൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. കപടദേഹമുറയുണ്ട്. ദ്വിപാർപ്പസമമിതി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചക്രജീവികളുടെ ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള

ഒരു പൊതു വിവരണമാണ് താഴെ ചേർന്നത്.

ചക്രജീവിയുടെ ശരീരത്തെ മൂന്നു ഭാഗമായി വിഭജിക്കാം; തല എന്നും



ചിത്രം 74. ഒരു റോട്ടിഫെറിന്റെ സംഘടന.

1. ട്രോക്കൽഡിസ്ക് 2. വായ 3. വൃക്കകൾ 4. ഗുസനി 5. ഗളം 6. ആമാശയം 7. ജെർമോ വൈറല്ലേറിയം 8. സംകാചനസഞ്ചി 9. വാൽ 10. പാദം 11. സിമൻറഗ്രന്ഥി 12. ക്ലോയക്ക 13. ദഹനക്കുഴൽ 14. ലോറിക്ക 15. ദഹനഗ്രന്ഥി 16. അപാക്ഷആർക്കൻ 17. കണ്ണ് 18. മസ്തിഷ്കം

വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മുൻഭാഗം, ഉടൽ, കാൽ [വാൽ എന്നും പറയും] എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ. ഉടലും കാലും കൂട്ടിക്കിൾ നിർമ്മിതമായ ഒരു ബാഹ്യകവചത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. ഉടൽകവചത്തിന് ലോരിക എന്നു പറയുന്നു. പല ജീവികളിലും ലോരിക വളയരൂപത്തിലുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഖണ്ഡീഭവനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിക്ക് സ്വശരീരം വളയ്ക്കുവാനോ തിരിക്കുവാനോ വിഷമമായിത്തീരുമായിരുന്നു. ചിലവയുടെ ലോരികയിൽ ശൽക്കങ്ങളും മുളകളും കാണാം. കാലിന്റെ കൂട്ടിക്കിൾ കവചവും വളയരൂപത്തിൽ ഖണ്ഡിതമാണ്-സുഗമ ചലനത്തിനുവേണ്ടി തല ലോരികയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പിൻവലിക്കുവാനും, ആവശ്യമുള്ള നേരത്ത് പുറത്തോട്ട് നീട്ടുവാനും ജീവിക്ക് കഴിവുണ്ട്. തലയുടെ മുൻവശം ഏതാണ്ട് ഉരുണ്ടതാണ്. ഈ ഉരുണ്ട മുൻവശത്തിന് ചുറ്റുമായാണ് സിലിയങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സിലിയനീക്കം കൊണ്ടാണ് എന്നും, ഉരുണ്ട മുൻവശത്തിന് ശീർഷപ്രദേശം (apical field) എന്നു പറയുന്നു. വായ തലയുടെ അടിഭാഗത്തായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വായയുടെ മുൻഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിലിയനീക്കം ടോക്കസ് എന്നു വായയുടെ പിന്നിൽ കാണുന്ന സിലിയനീക്കം സിംഗുലം എന്നു പറയാറുണ്ട്. ചില ജീവികളിൽ കൊണ്ടാണെന്ന് പുറമെ തലയുടെ ഇരുപാർപ്പുള്ളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിലിയങ്ങളടങ്ങിയ രണ്ടു പാളികൾ ഉന്നിനിൽക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ പാളികളെ ഓറിക്കിളികൾ എന്നു പറയുന്നു. തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മരൊരു ബഹിർവേശനമാണ് മുൻകൂമ്പിക. ഇത് സംഭവദണ്ഡംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂമ്പികക്ക് പുറമെ മറ്റു ചില സംഭവദണ്ഡംഗങ്ങളും തലയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശീർഷപ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ചില കഴികൾ (ഇവ രാസഗ്രാഹികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു), മുളയരൂപത്തിലുള്ള ഓരോരും, തലയിലെ മസ്തിഷ്കത്തിനു മുകളിലായി ചുവപ്പുനിറത്തിൽ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ (ഇവ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ മാത്രമാണ്) എന്നിവ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ശീർഷപ്രദേശത്ത് തുറക്കുന്ന ഒരു ഗുന്മി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഗുന്മിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി വിവരം കുറവാണ്.

മിക്ക ജീവികളിലും ഉടൽ ഉരുണ്ടതാണ് (ചിലവയിൽ ഇത് പരന്നതായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്). ദഹനവൃഹം, വിസർജനവൃഹം, ജനനാംഗവൃഹം എന്നിവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഉടലിനകത്താണ്. ഉടലിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് പാർശ്വകൂമ്പികൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇവ സംഭവദണ്ഡംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കാൽ ഉടലിനടുത്തേക്ക് ചുരുക്കുവാനും, പുറത്തോട്ട് നീട്ടുവാനും ജീവിക്ക് കഴിവുണ്ട്. കാലിന്റെ പിൻ അഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ബഹിർവേശനങ്ങൾ കാണാം. ഇവക്ക് വിരലുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. വിരലുകൾക്കു പുറമെ, കൂട്ടിക്കിൾ നിർമ്മിതമായ ചില മുളകളും ഈ ആവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. കാലിൽ ഒരു ജോഡി ഗുന്മികളുണ്ട്. ഈ ഗുന്മികൾക്ക് പാദഗുന്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയുടെ സ്രാവങ്ങളും, തന്റെ നിലയുറപ്പി

ക്കാൻ ജീവി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ക്ലോയാക്കൻ ദ്വാരം ഉടലിനും, കാലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സന്ധിസ്ഥലത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജീവിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഈ ദ്വാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് (ആൺജീവികളിൽ, മിക്കവയിലും ദഹനവ്യൂഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഈ ദ്വാരവും കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധേയമാണ്).

വായ ഒരു സിലിയമയമായ നാളിക വഴി ഫാറിങ്സ് സിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. റോട്ടിഫെറയിൽ ഫാറിങ്സ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അവയവത്തെ മാസ്റ്റാക്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. മാസ്റ്റാക്സ് ഒരു പേശീയമായ സഞ്ചിയാണ്, അതിന് ഒരു കൂട്ടിക്കിൾ നിർമ്മിതമായ ആന്തരാവരണമുണ്ട്. ഈ ആന്തരാവരണത്തിനകത്തായി, ഏഴ് കൂട്ടിക്കിൾ നിർമ്മിതമായ പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവക്ക് ട്രോഫെം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവി; തന്റെ ഭക്ഷണം ചവക്കുന്നത്. മാസ്റ്റാക്സിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചെറു അന്നനാളം ആമാശയത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. ആമാശയം പേശീയമാണ്. ആമാശയം പിന്നോട്ട് ചെല്ലത്തോറും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ് ആന്ത്രമായിത്തീരുന്നു. ആന്ത്രം പിൻ അഗ്രത്തിൽ വെച്ച് ക്ലോയാക്ക എന്ന സഞ്ചിപോലുള്ള അവയവവുമായി യോജിക്കുന്നു. ക്ലോയാക്ക, ക്ലോയാക്കൻ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തോട്ട് തുറക്കുന്നു.

ദഹനവ്യൂഹത്തോടു അനുബന്ധിച്ചു രണ്ട് തരം ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നു; മാസ്റ്റാക്സിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഉമിനിർ ഗ്രന്ഥികളും, ആമാശയത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആമാശയഗ്രന്ഥികളും. ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ദഹനരസങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

സിലിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഉദ്ദിപിക്കുന്ന ജലധാരയിൽ കടുങ്ങിപ്പോയ മറ്റു ജീവികളാണ്, ചക്രജീവികളുടെ മുഖ്യആഹാരം.

വിസർജനവ്യൂഹം ജപാലാകോശനിർമ്മിതമാണ്. ജപാലാകോശങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഡി ചുരുങ്ങ ചെറു നളികകളിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ഈ വിസർജനനളികകൾ ഉടലിന്റെ പിൻ അഗ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു മുത്രാശയത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു; മുത്രാശയം ക്ലോയാക്കയിലേക്കും. ചിലവയിൽ വിസർജനനളികകൾ നേരിട്ട് ക്ലോയാക്കയിലേക്ക് തുറക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

രണ്ട് ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു മസ്തിഷ്കവും, അതിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാഡിനാളുകളും ചേർന്നതാണ് നാഡിവ്യൂഹം. മസ്തിഷ്കം മാസ്റ്റാക്സിന് മുകളിലായാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നാഡിനാളുകളിൽ സുപ്രധാനമായ രണ്ടെണ്ണം ഉടലിന്റെ അടിവശത്തായി കിടക്കുന്നതു കാണാം. സംവേദ അംഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചതാണ്. ചക്രജീവികൾ ഏകലിംഗികളാണ്. സാധാരണയായി ആൺ ജീവി വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതുമാണ്; ആയുസ്സും കുറവാണ്. ആൺ ജീവികളിൽ ദഹനവ്യൂഹം തുടങ്ങിയ അവയവസമൂഹം ക്ഷയിച്ചാണ് കാണപ്പെടുക. പ്രത്യുല്പാദനം എന്ന പ്രക്രിയക്കുവേണ്ടി മാത്രം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ശരീര

പ്രകൃതിയാണു് ഇവക്കുള്ളതു്. ആൺ ജീവിക്ക് ഒരു ശിശുമുണ്ടു്. ഈ ശിശു തപകിലൂടെ തുളച്ചുകയറ്റി, പെൺ ജീവിയുടെ ദേഹഗുഹക്കുള്ളിലാണു് ആൺ ജീവി തന്റെ പുംബീജങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതു്. ദേഹഗുഹാദ്രവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു് പുംബീജം അൺഡവുമായി സന്ധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സേകം നടക്കുന്നു.

ചക്രജീവികളിലെ അൺഡങ്ങൾക്കു് സേകം നടക്കാതെ തന്നെ വികാസം പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടു്. ഇത്തരം വികാസത്തിനു് അസേകിതവികാസം അഥവാ പാർതെനോജെനിസിസ് എന്നു് പറയുന്നു. ആൺ ഭൂണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അസേകിത രീതിയിലാണു് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതു്. പെൺ ഭൂണങ്ങൾ രണ്ടു് തരമുണ്ടു്: അസേകിത വികാസം മുഖേന ഉത്ഭവിക്കുന്നവയും, സേകിത അൺഡങ്ങൾ വളർന്നുണ്ടാകുന്നവയും. ചക്രജീവികളിലെ ചില സ്ത്രീജീവികൾ മുട്ടയിടുന്നു. ചിലവ പ്രസവിക്കുന്നു. രോട്ടിഫെറയിൽ വളരെ ചുരുക്കം സ്ത്രീജീവികൾ മാത്രമേ കടൽ ജീവികളായുള്ളൂ. [ഉദാ: സേയ്സോൺ സിൻക്വിറ്റാ]; മിക്കവയും ശുദ്ധജല നിവാസികളാണു്. ശുദ്ധജല ജീവികളിൽ പല തരക്കാരുണ്ടു്. ചിലവ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു. [ഉദാ: ബ്രാക്കിയോണസ്, പഡാലിയ ട്രോക്കോസ്ഫേറ]; ചിലവ ജലാശയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അട്ടകളെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. [ഉദാ: അഡിനൈറ] ചിലവ സ്ഥാനബദ്ധരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. [ഉദാ: ഫ്ലോറാക്കലേരിയ]; ചിലവ മറ്റു് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കയറിക്കൂടി അധിവസിക്കുന്നു. [ഉദാ: ഗമ്മാസസ് എന്ന ക്രസ്റ്റേഷ്യന്റെ ഗിൽ-അറക്കത്തു് ജീവിക്കുന്ന എംബാറ]. ഇവയെല്ലാം പുറമെ, കരയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചക്രജീവികളുണ്ടു്. നദീതീരത്തും, തടാകക്കരയിലും വളരുന്ന മോസ് സസ്യങ്ങൾക്കകത്തു് ഏതാനും സ്ത്രീജീവികൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. [ഉദാ: മോണോസ്റ്റേല, എൻസെൻട്ര]


വർഗ്ഗ ഗാസ്ത്രോടെക്ട

സമുദ്രജലത്തിലും, ശുദ്ധജലത്തിലും കണ്ടുവരുന്ന ഏതാനും ചെറു ജീവികളെയാണു് ഈ വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. നിളം ഏതാണ്ടു് 0.6 മില്ലിമീറ്ററോളമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിറം സ്റ്റികസമാനമായിരിക്കും.

മിക്കവയിലും, നിണ്ടു് ഉരുണ്ട ശരീരത്തിന്റെ അടിവശം പരന്നതായാണു് കാണപ്പെടുക. ശരീരത്തെ തല, ഉടൽ, വാൽ എന്നീ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണു്. തലയും ഉടലും ചേരുന്നിടത്തു് ശരീരം മെലിഞ്ഞിരിക്കും. ഈ മെലിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ കഴുത്തു് എന്നു് പറയാറുണ്ടു്. ചില സ്ത്രീജീവികളിൽ ഇത്തരം ഒരു കഴുത്തു് കാണപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ തലയും ഉടലും, വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയാസമാണു്. വാൽ ദ്വിശാഖിതമായിരിക്കാം, കൂർത്തതോ, ഉരുണ്ടതോ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വളരെ നീളമുള്ളതും ആയിരിക്കാം.

തലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ജോഡി പ്രകാശഗ്രാഹികൾ അഥവാ കണ്ണുകൾ കണ്ടുവരുന്നു. തലയിലും ഉടലിന്റെ പരന്ന അടിവശത്തും സീലിയങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു

നം. ഇവ അനഭെദേർഷ്യമായോ അനുപ്രസ്ഥമായോ ഉള്ള നിരകളായി അടുക്കപ്പെ



ചിത്രം 75. കിരോറാനോട്ടസ്

1. മുഖീയ കാപ്സുൾ 2. സംവേദമുള്ള 3. ഗ്രസനി
4. ഹെന്റേസ്രിയം 5. കൂട്ടിക്കിളിലെ മുള്ള് 6. വാൽമുള്ള്കൾ
ട്ടിരിക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ നിരകൾ ഉണ്ടായെന്നും വരാം; ചിലപ്പോൾ അതില
ധികവും ദേഹമാകെ നേരിയ കൂട്ടിക്കിൾ ആവരണത്താൽ ആവൃതമാണ്. ശരീ
രത്തിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലും മുകൾഭാഗത്തും കൂട്ടിക്കിൾ നിർമ്മിതമായ മുള്ള്കളും
രോമങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു; ചിലവയിൽ ശല്ല്യങ്ങളും. തലയിൽ ശല്ല്യങ്ങളാണ്
കണ്ടുവരുന്നത്. ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആസംജകനളികകൾ ഗാസ്ട്രോടെക്ക
യുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ചിലവയിൽ ഇത്തരം രണ്ടു നളികകൾ വാ
ലിന്റെ അറ്റത്തായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവക്കു പുറമെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും പാ
ർശ്വആസംജകനളികകൾ ചില സ്തിഷിസുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആസംജക
നളികകളോടു് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്രാവങ്ങൾ ഉപ
യോഗിച്ചാണ് ജീവി തന്റെ നിവാസസ്ഥലത്തു് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. (പ്രവ
ർത്തത്തിൽ ഇവ റോട്ടിഫെറയുടെ പാദഗ്രന്ഥികളോടു് സമാനമാണ്).

വായ മുൻഅഗ്രത്തിൽ സ്വൽപം അടിവശത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗുദ
ഭാഗം പിൻഅഗ്രത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ജനനാഗാസ്രം ഗുദഭാഗത്തി
ന് തൊട്ടു മുൻപിലോ, അതിനോടു് ചേർന്നോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രണ്ടു് വിസർ
ജനഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തു് അടിവശത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ജനനവ്യൂഹത്തെക്കുറിച്ചും, പ്രത്യുല്പാദനരീതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ
അവ്യക്തമാണ്. ഈ ജീവികളിൽ മിക്കവയും ഐന്റണജനന്റേസ്രിയവാഹ
കരാണ്. വേറൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവയിൽ പുരുഷജന
ന്റേസ്രയങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വസ്തുതകൾ കണക്കി
ലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ ഉഭയലിംഗികളാണെന്നു് വേണം കരുതാൻ.

അസേകിതവികാസമാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. പെണ്ണു
ങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു പോംവഴിയുമില്ല
ല്ലോ!

ഉദാ: സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കെഫലോഡാസിസ്, കളങ്ങളിൽ കണ്ടു
വരുന്ന കിരോറാനോട്ടസ്.

വർഗം കൈനോറിക്ക


ഈ വർഗത്തിൽ പെട്ടവയെല്ലാം തന്നെ സമുദ്രജീവികളാണ്. വലുപ്പത്തിൽ
വളരെ ചെറിയവയാണ്; അവക്കു് 1 മില്ലിമീറ്ററിലധികം നീളം കാണുകയി

ഒ. ശരീരാവരണമായ കൂട്ടിക്കിര, ഖണ്ഡിഭവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ, ശരീരം പതിമൂന്ന് ഖണ്ഡങ്ങളാൽ നിർമിതമാണെന്ന് തോന്നും. ശരീരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. തല, കഴുത്തും, ഉടൽ എന്നിവ. തല ഒരു ഖണ്ഡത്താൽ - ഖണ്ഡത്തിനെ സോണൈറ്റം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് - നിർമിതമാണ്. കഴുത്തിലും ഒരു സോണൈറ്റം ആണ് കാണപ്പെടുക. ബാക്കിയുള്ള പതിനൊന്നും സോണൈറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഉടൽ.

തല ഉരുണ്ടതാണ്. അത് ഉടലിനുള്ളിലോട്ട് പിൻവലിക്കുവാൻ ജീവിക്ക് കഴിവുണ്ട്. തലയുടെ മുൻതലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബഹിർവേശനത്തിലാണ് വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ബഹിർവേശനത്തിന് മുഖഭാഷൻ എന്നും പറയുന്നു. വായക്ക് ചുറ്റുമായി ഒരു നിറമുള്ളകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവയെ മുഖമുള്ളകൾ എന്നും വിളിക്കാം. തലയുടെ ചുറ്റും അഞ്ചോ ആറോ നിറപിടനാട്ട് ചൊരിഞ്ഞമുള്ളകൾ കാണാം. കൂട്ടിക്കിര നിർമിതമായ ഈമുള്ളകൾ പൊള്ളയാണ്. അവയുടെ ഉൾഭാഗം എപിഡെർമിസാൽ നിറക്കെട്ടിരിക്കാം. മുള്ളകൾക്ക് സ്കാലിഡുകൾ എന്നും പറയുന്നു. ഓരോ നിറയിലും 10 മുതൽ 20 വരെ സ്കാലിഡുകൾ കാണാം. പിൻനിരയിലേക്ക് ചെല്ലുതോറും സ്കാലിഡുകളുടെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞ് വരും. ജീവിക്ക് തന്റെ സ്കാലിഡുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്.

കഴുത്തിലെ കൂട്ടിക്കിര ആവരണം കുറെ ശൽക്കങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക. ചില ജീവികളിൽ, തല ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ മുൻഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ദ്വാരം അടയ്ക്കുവാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഉടലിലെ ഓരോ സോണൈറ്റിലും മൂന്ന് ശൽക്കങ്ങൾ കാണാം. ഇവയിൽ ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ടെർഗം എന്നും പറയുന്നു. അടിവശത്തു ഒരു ജോഡി ശൽക്കങ്ങളുണ്ട്; അവയ്ക്ക് സ്റ്റേർണം എന്നും പേരുണ്ട്. സ്റ്റേർണങ്ങളും ടെർഗവും പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലാണ് സന്ധിക്കുന്നത്. ഓരോ സോണൈറ്റിലും മുകൾ ഭാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി ഓരോമുള്ളം ഈപാർശ്വങ്ങളിലുമായി രണ്ടു മുള്ളുകളും കാണാം. ഇതിന് പുറമെ രോമരൂപത്തിലുള്ള മുള്ളുകളും അങ്ങിങ്ങായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒട്ടവിലത്തെ സോണൈറ്റിന്റെ പിൻ അഗ്രത്തിൽ ഒന്നോ ഒരു ജോഡിയോ, നീളമുള്ള മുള്ളുകൾ കാണാം. ഇവയെ അഗ്രമുള്ളകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഉടലിന്റെ അടിവശം പരന്നതാണ്. അടിവശത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി അനുഭവേദ്യമായ ഒരു ചാൽ കണ്ടുവരുന്നു. മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ സോണൈറ്റിന്റെ അടിവശത്തായി ഒരു ജോഡി ആസംജകനളികകൾ (adhesive tubes) കാണാം. ഗുദദ്വാരം പിൻ അഗ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു ജോഡി വിസർജനദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ഇവ പതിനൊന്നാമതു സോണൈറ്റിന്റെ ടെർഗത്തിലാണ് (ഈപാർശ്വങ്ങളിലുമായി) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജോഡി ജനനാഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്; ഇവ പതിമൂന്നാമത്തെ സോണൈറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.



ചിത്രം 76. കൈനോറികയുടെ ഘടന

1. മുഖീയ ട്രെസ്സലുകൾ 2. വായ-കോൺ 3. ഗ്രസനിശിഖരം
4. മസ്തിഷ്കഗാംഗ്വിയൻ 5. ഗ്രസനിയുടെ ഉൾഭിത്തി 6. ഗ്രസനിയുടെ പേശിഭിത്തി 7. ഗളം 8. ഓവറോവിയം 9. ഓവറോവിയം

മുള്ളുകളാണ് പ്രധാന സംവേദ അംഗങ്ങൾ. ചില സ്‌പിഷിസുകളിൽ കണ്ണുകളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് (ഉദാ: എക്കിനോഡിറസ്).

ഈ ജീവികൾ ഏകലിംഗികളാണ്. ജനനവ്യൂഹം ഒരു ജോഡി നളികകളുടെ രൂപത്തിലാണ്. ആണിപ്പോഴും പെണ്ണിപ്പോഴും രണ്ട് ജനനാംഗരസ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ആണിന്റെ ജനനാംഗരസ്യങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ചില പ്രത്യേക മുളകൾ കാണാം, ഇവ ശിശുക്കളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്

വിശ്വാസം. പ്രജനത്തെ പഠിയ്ക്കുവാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്നും അപൂർണ്ണമാണ്. സേകത്തിന് ശേഷമാണ് വികാസം നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.


ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ അധികവും കാണപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്യൻ കടലുകളിലാണ്. (മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രം, ബാൾട്ടിക് സമുദ്രം). കളിമൺരൂപത്തിലുള്ള അടിത്തടാണ് മുഖ്യനിവാസസ്ഥലം. ഉദാ: എക്കിനോഡിസ്, പിക്നോഫെസ്യം

വർഗം പ്രയാപുലിഡ

പ്രയാപുലസ് എന്ന ജീനസിൽ പെട്ട രണ്ടു സ്പീഷിസുകളും കോഡോറോസും ബൈക്കോഡോറോസും ഹാലിക്രിപ്റ്ററസ് സ്പൈറോലോസസ് എന്ന മറ്റൊരു സ്പീഷിസും മാത്രമേ ഈ വർഗത്തിൽ പെടുന്നുള്ളൂ. ഇവയെല്ലാം തന്നെ സമുദ്ര ജീവികളാണ്. കളിമൺരൂപത്തിലുള്ള അടിത്തട്ടിൽ ഇവ മാളങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഉത്തരധ്രുവത്തിനടുത്തും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തും ഉള്ള സമുദ്രങ്ങളിലാണ് ഇവ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ദേഹം ഉരുണ്ടതാണ്, ഏകദേശം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളം വരും. ദേഹത്തെ രണ്ടു ഭാഗമായി വിഭജിക്കാം; മുൻഭാഗത്തുള്ള പ്രോബോസിസ് അഥവാ പ്രിസോമയും പിൻഭാഗത്തുള്ള ഉടലും. പ്രയാപുലസിൽ പ്രോബോസിസിന് ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നീളം കാണാം; ഹാലിക്രിപ്റ്ററസിൽ ഏതാണ്ട് $\frac{1}{6}$ ഉം. ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇടക്കുള്ള സന്ധിസ്ഥലം കൃത്യമായിരിക്കും. പ്രോബോസിസിന്റെ ചുറ്റും ഭാഗത്തു് 25 അനുഭവദർഘ്യപാപ്പിലിനികൾ കാണാം.

ഈ പാപ്പിലകളിൽ നിന്ന് ചുറ്റത്തോട്ട് ഉതിനിൽക്കുന്ന രോമങ്ങൾ സംവേദനാഗ്രാഹകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വായ, പ്രോബോസിസിന്റെ അറ്റത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വായക്ക് ചുറ്റും മുർച്ചയേറിയ മുളകൾ കാണാം. പ്രയാപുലസിൽ അഞ്ചോ ഏഴോ നിര മുളകൾ കണ്ടുവരുന്നു; ഹാലിക്രിപ്റ്ററസിൽ മൂന്നോ നാലോ നിരയും. വായക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും, അതുപോലെ പ്രോബോസിസും ഉടലിനുള്ളിലേക്ക് പിൻവലിക്കുവാൻ ജീവിക്ക് സാധിക്കും.

ഉടലിന് ചുറ്റും ചെറിയ മുളകളും പാപ്പിലകളും കാണാം. ഇവ അനുപ്രസ്ഥവളയങ്ങളായാണ് നിരത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രയാപുലസിൽ ഇത്തരം വളയങ്ങളുടെ എണ്ണം 30 മുതൽ 40 വരെയാണ്; ഹാലിക്രിപ്റ്ററസിൽ നൂറിനടുത്തും. പിന്നുഗത്തിലുള്ള പാപ്പിലകൾ വലിയവയും ഗ്രന്ഥീമയവുമാണ്. ഉടലിന്റെ അടിഭാഗത്തു് മധ്യത്തിൽ നെടുക്കെ കിടക്കുന്ന പട്ട പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശം കാണാം. ഇവിടെയാണ് നാഡീനാൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പ്രയാപുലസിൽ ഉടലിന്റെ പിൻ അഗ്രത്തിലായി നിറയെ മുഴക്കുള്ള ഒരു വാൽ (caudal appendage) കാണാവുന്നതാണ്. ഹാലിക്രിപ്റ്ററസിൽ വാൽ ഇല്ല. ഈ വാലിന്റെ ഉപയോഗമെന്തെന്ന് ഇനിയും അറിയേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഗുദഭാഗം ഉടലിന്റെ പിൻ അഗ്രത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിന് ഇരുവശത്തുമായി രണ്ടു ജനനാഗാത്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.



ചിത്രം 77. പ്രയാപുലിയയുടെ ഘടന.


ഈ ജീവികൾ ഏകലിംഗികമാണ്. വിസർജനവ്യൂഹവും ജനനവ്യൂഹവും ബന്ധിതമാണ്. ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബീജങ്ങൾ ഒരു ജോഡി നളികകൾ വഴിയാണ് ബഹിർഗമിക്കുന്നത്. ഇതേ നളികകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ജ്യാലാകോശസമൂഹങ്ങളും തുറക്കുന്നത്. ഈ ജീവികളുടെ വികാസത്തെ പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം അപൂർണ്ണമാണ്. ഒരു ലാർവാദശ കാണപ്പെടുന്ന എന്നത് മാത്രം വ്യക്തമായറിയാം.

വർഗം നെമറോമോർഫ

പ്രാഥമികാവസ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്രജീവിയാകും ശൈശവദശയിൽ ആർത്രോപോഡ ജീവികളിൽ നിവസിക്കുന്ന ഒരു പരജീവിയാകും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന പട്ടികളെയാണ് ഈ വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ശരീരം നീളമുള്ള നാരിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ വ്യാസം ഒന്നോ

രണ്ടോ മില്ലിമീറ്ററോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. പക്ഷേ നീളം ഒരു മീറ്ററോളം ഉണ്ടാകാം. (കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഗോർഡിയസിന്റെ നീളം ഏകദേശം 15 മുതൽ 16 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ ജീവിയെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് കുളങ്ങളിലാണ്.) ഇവ ഏകലിംഗികളാണ്. മിക്ക സ്ത്രീഷിസുകളിലും ആൺപുഴു പെൺപുഴുവിന്റേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ആൺപുഴുവിന്റെ പിൻഅഗ്രം അടിയിലോട്ടു വളഞ്ഞിരിക്കും.

ശരീരത്തിന്റെ മുൻ അഗ്രം കൂർത്തതും വെളുത്തതുമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ തലപ്പത്തോ തലപ്പിൻ തൊട്ടു അടിയിലോ ആണ് വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പിൻ അഗ്രം ഉരുണ്ടതോ ദ്വിശാഖിതമോ ആയിരിക്കാം. പിൻ അഗ്രത്തിലോ അതിനടുത്തോ ആണ് ക്കളായാക്കൽ പോരം കാണപ്പെടുന്നത്. പിൻ അഗ്രം ദ്വിശാഖിതമാണെങ്കിൽ, ശാഖനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഭാഗത്തു അടിവശത്തായി ഈ പോരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കാണാം. (ഉദാ: ഗോർഡിയസിന്റെ ആൺപുഴു).



ചിത്രം 78. നെമറ്റോമോർഫയുടെ ഓലടനം.

ആൺപുഴുവിൽ, വൃഷണങ്ങളിൽ ഉരുളിക്കുന്ന ബീജങ്ങൾ രണ്ട് ബീജവാഹിനികൾ വഴി ക്കളായാക്കയിൽ എത്തുന്നു. പെൺപുഴുവിൽ, രണ്ട് അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അണ്ഡങ്ങൾ, രണ്ട് അണ്ഡവാഹിനികൾ വഴി, ഒരു പൊതു അറയായ ആൻട്രം (antrum) ൽ എത്തുന്നു; അവിടെ നിന്ന് ക്കളായാക്കയിലും. ആൻട്രത്തിൽ നിന്ന് ഉരുളിച്ചു

മുന്നോട്ട് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട്. ഇതിന് ബീജസംഗ്രാഹി (seminal receptacle) എന്ന് പറയുന്നു.

ആൺപുഴുവും പെൺപുഴുവും കൂടി പിണഞ്ഞു കിടന്ന് ഇണചേരുന്നു. സേകിതശൃംഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് പുറംതള്ളപ്പെടുന്നു. ഒരു ശൃംഖലാരൂപത്തിലാണ് മുട്ടകൾ കാണപ്പെടുക. ഇവയിലെ ഭ്രൂണങ്ങൾ വികാസം പ്രാപിച്ച് ലാർവകളായി പുറത്തു വരുന്നു. ലാർവകൾ തങ്ങളുടെ പ്രബോസിസിഡുള്ള മുളകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷട്പദങ്ങളുടെയും മറ്റും ദേഹഗുഹയിൽ തുളച്ചുകയറുന്നു. ദേഹഗുഹാവൃത്തിൽ (ആതിഥേയന്റെ രക്തമാണിത്) വെച്ച് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രശ്നാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നതോടെ പരജീവി പുറത്തു ചാടി സ്വതന്ത്രജീവിതരീതി കൈവരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

1. കള്ളങ്ങളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ഗോർഡിയസ്
2. സമുദ്രജീവിയായ നെക്ടോറാനിമ - ഈ ജീവിയുടെ ലാർവ ഞണ്ടുകളുടെ ദേഹഗുഹയിലാണ് വളരുന്നത്. പ്രശ്നാവസ്ഥയിൽ നിളം എകദേശം 20 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും.

ഫൈലം അനലിഡ

ജന്തുലോകത്തിൽ പ്രധാനമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് അനലിഡ. മണ്ണോ അഥവാ ഞാഞ്ഞൂൽ, നിറീസ്, അട്ട തുടങ്ങിയ പുഴുക്കൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ പെടുന്നു. ഇതുവരെ വിവരിച്ച ജീവികൾക്കില്ലാത്ത പല സവിശേഷതകളും അനലിഡക്കും, അനലിഡയെക്കാൾ പരിണമിച്ച മറ്റു ജീവികൾക്കും കാണാം. ശരീരഭിത്തിയുടെയും അന്നകലുയുടെയും ഇടയിൽ സിലോം (coelom) എന്ന റിയപ്പെടുന്ന ഗഹവരം ആദ്യമായി രൂപം പൂണ്ടത് അനലിഡുകളിലാണ്. ഈ ഗഹവരത്തിലാണ് ആന്തരാവയവങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ഫൈലത്തിലെ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് ദ്വിപാർശ്വസമമിതിയാണുള്ളത്. ഇവയുടെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത ശരീരം അനവധി ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നതാണ്. ഓരോ ഖണ്ഡവും ഓരോ മോതിരം പോലെയിരിക്കും. ബാഹ്യമായി മാത്രമല്ല ആന്തരമായും ശരീരത്തിൽ ഈ വിഭജനം കാണാം. ശരീരഗഹവരവും പുറമേയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അറകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ശരീരം അനവധി ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ജീവികളെ പൊതുവെ ഖണ്ഡിതദേഹികൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന് ഒരു നേരിയ ആവരണമുണ്ട്. ഇത് തപകുതന്നെ സ്രവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ഈ ദേഹാവരണത്തിന് കൂട്ടിക്കിൾ എന്ന പേർ പറയുന്നു.

ശരീരത്തിനകത്തു് ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും വിസർജനേന്ദ്രിയങ്ങളായ വൃക്കകൾ (Nephridis) അന്നകലുയുടെ ഇരുവശത്തും കാണാം. ശരീരത്തിന്റെ തലയറ്റത്തു്, അന്നകലുക്കു മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ മസ്തിഷ്കവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാഡികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നാഡിവളയവും അന്നകലുക്കു ചുവടെ നെട്ടാിളെ ഒരു ഇരട്ടനാഡിയും ഉണ്ട്.

ശരീരത്തിന്റെ ഖണ്ഡനം (ഖണ്ഡങ്ങളായുള്ള വിഭജനം) ബാഹ്യമായ വിഭജനം മാത്രമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ശരീരത്തിനകത്തും വിഭജനം കാണാം. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിനുമനുസരിച്ച് ചെറു മാംസഭിത്തികൾ കൊണ്ടു് സിലോം

(ദേഹഗുഹ) അനേകം അറകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഈ ഭിത്തികൾ ശരീരഭിത്തിയുടെ ഉൾവശത്തെയും അനുകല്പയുടെ പുറം വശത്തെയും ബന്ധിക്കുന്നു. ഓരോ അറയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ ആവർത്തനം കാണാം. പേശികൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ, നാഡികൾ, വൃക്കകൾ എന്നിവ ഖണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും പര്യന്തവ്യൂഹം, നാഡിവ്യൂഹം, വിസർജനവ്യൂഹം, പേശിവ്യൂഹം ഇവയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ചില ഖണ്ഡങ്ങളിൽ മറ്റു ചിലവയില്ലാത്ത അവയവങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. മേൽ പറഞ്ഞവോലെ അവയവവ്യൂഹങ്ങൾ കൂടി ഖണ്ഡനം വരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനു അനുഖണ്ഡിത ശരീരമെന്നു പറയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരീരവിഭജനത്തെ അനുഖണ്ഡനം (metamerism) എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം.


രക്തക്കുഴലുകൾ ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ടത് അനലിഡയിലാണ്. ഈ കുഴലുകൾ വഴി രക്തം ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ വകുപ്പിനു താഴെക്കിടയിലുള്ള ജീവികളിലില്ല.

കടലിലും കരയിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ജീവിക്കുന്ന അനലിഡകളുണ്ട്. മണ്ണു കരയിലും നിറീസ് കടലിലും അട്ട ശുദ്ധജലത്തിലും കഴിയുന്നു. ഞാഞ്ഞൂലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട ജീവി.

ഞാഞ്ഞൂൽ

മറ്റാരുമോ പറമ്പിലും എന്നു വേണ്ട മണ്ണിൽ സർവത്ര കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അനലിഡവിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഞാഞ്ഞൂൽ, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണു. ഇതിനു ഭൂനാഗമെന്നും പേരുണ്ട്. നനവുള്ളിടത്താണ് ഇവയെ കാണുക. മണ്ണിൽ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന കുഴികളിൽ പുണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ പുഴുക്കൾ പലപ്പോഴും മടയിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നു ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതായും കാണാം. വേനലിന്റെ കാഠിന്യം തുടങ്ങിയാൽ ഇവ മണ്ണിൽ വളരെ ആഴത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുക. പക്ഷേ ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവ ഉപരിതലത്തിലും വിഹരിക്കും. സാധാരണയായി രാത്രിയിലാണ് ഞാഞ്ഞൂലുകൾ പുറത്തു വരിക. പകൽ മണ്ണിനടിയിൽ കൂടാനാണിവയ്ക്കിഷ്ടം.

ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ദേഹം നീണ്ടു മെലിഞ്ഞു അനവധി ഖണ്ഡങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിതമാണ്. ദേഹത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റോ അറ്റം വരെ ഒരേപോലെയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങൾ (വളയങ്ങൾ) ആണുള്ളത്. ജന്തുവിന്റെ അപാക്ഷവശം ചുക്ചുക്ലൻ തവിട്ടനിറത്തിലും അടിവശം മങ്ങിയുമിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഖണ്ഡങ്ങളായിത്തീരിക്കുന്ന അനവധി ചാലുകളുണ്ട്. നൂറോ ചിലപ്പോൾ അതിലധികമോ ഖണ്ഡങ്ങൾ ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാം. ഇതിനു പ്രത്യേകമായൊരു തലയോ വാലോ ഇല്ല. പക്ഷേ, ഒരറ്റത്തു വായയും മറ്റോ അറ്റത്തു ഗുദോർവ്വം കാണാം. വായയുടെ മേലെ ഒരു കൂടിയെന്നോണം ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട്. ഇതിനു മുഖപിണ്ഡം (protomium) എന്നാണ് പേര്. ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലാണ് വായ. അതിനു മുഖഖണ്ഡം (peristomium) എന്നും പേരാകുന്നു. അവസാനത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ ഗുദം സ്ഥി



ചിത്രം 79. ഞാഞ്ഞൂൽ (മണ്ണേറ്)

1. പ്രോസ്റ്റോമിയം 2. പതിനാലു മുതൽ പതിനേഴു വരെയുള്ള
ഖണ്ഡങ്ങൾ 3. അപാക്ഷഭാഗങ്ങൾ 4. ഗുദം

തി ചെയ്യുന്നു. മുഖവണ്ഡം തൊട്ടെണ്ണിയാൽ 14 മുതൽ 17 വരെയുള്ള 4 ഖണ്ഡങ്ങൾക്കു വീർപ്പ് കൂടിയതായിക്കാണാം. ഈ പ്രദേശത്ത് ഖണ്ഡങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാലുകൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയുണ്ടില്ല. ഈ പ്രദേശത്തിന് പര്യാണം (clitellum) എന്നു പറയും. പര്യാണത്തിലെ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണം വിവിധ ജീനസുകളിൽ പലതായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന മെഗ്സാക്കോളെക്സ് എന്ന ജീനസിൽ 4 ഖണ്ഡങ്ങളാണ് പര്യാണത്തിലുള്ളത്.

ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും (ആദ്യത്തേതൊഴിച്ചു്) ചെറു മുളകൾ പോലെയുള്ള കറികൾ കാണാം. ഇവ നന്നേ ചെറുതാണ്. രണ്ടറ്റവും മെലിഞ്ഞു നട്ടുവീർത്ത ഈ മുളകളെ ശുക്ലങ്ങൾ (setae) എന്നു വിളിക്കുന്നു. കൈറാൻ എന്ന വസ്തുവിലാണിവ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. ഇവ ഓരോന്നും തപ്തകിലുള്ള ഓരോ ചെറുസഞ്ചിയിലാണ് കിടക്കുക. ഈ സഞ്ചിക

ശുക്രസഞ്ചി (setigious sac) എന്ന പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശുക്രങ്ങൾ ഇടക്ക് കൊഴിഞ്ഞുപോകും. അവയുടെ സ്ഥാനത്തു പുതിയ ശുക്രങ്ങൾ മുളക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാഞ്ഞൂൽ ഇഴയുമ്പോൾ നിലത്തു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ ശുക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാറ്റാണത്തിലെ ശുക്രങ്ങൾ പ്രജനനദശയിൽ (breeding season) കൊഴിഞ്ഞുപോകും. അതിനാൽ അവിടെ ശുക്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയില്ല.

ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ നട്ടുപറ്റാത്ത ഖണ്ഡങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ചാലുകളുടെ മധ്യത്തിലായി ഓരോ സൂക്ഷ്മമായ സുഷിരം കാണാം. ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ശരീരഗഹപരത്തിൽനിന്നു കൊഴുത്ത ഒരു ദ്രാവകം പുറത്തു വരും. ഇത് ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ദേഹാപരിതലം എടുപ്പാഴും നനവുള്ളതായി നില്ക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കാച്ച ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഈ സുഷിരങ്ങൾ ഇല്ല.

ശരീരത്തിന്റെ അഭ്യക്ഷഭാഗത്തു (ventral) പ്രജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ചില സുഷിരങ്ങൾ കാണാം. ആറും ഏഴും ഖണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിലും 7 ഉം 8 ഉം ഖണ്ഡങ്ങൾക്കും 8-ാം 9-ാം ഇടയിലും ഓരോ ജോഡി സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ 7, 8, 9 എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പുരുഷബീജങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു സംഭരിച്ചുവരുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നു ജോഡി സഞ്ചികളുടെ ബാഹ്യസുഷിരങ്ങളാണ്. 14-ാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലുള്ള ഒരു ജോഡി സുഷിരങ്ങൾ അണ്ഡനാളങ്ങളുടെ പുറം കവാടങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ ശുക്രനാളത്തിന്റെ ബാഹ്യപാദങ്ങൾ 18-ാം ഖണ്ഡത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഞാഞ്ഞൂൽ ഒരു ഉഭയലിംഗജീവിയാകയാൽ ആണിന്റേയും പെണ്ണിന്റേയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും.


സിലോം

ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ശരീരം ഒരു കഴലിനുള്ളിൽ മരൊറാരു കഴൽ എന്ന മട്ടിലാണു രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുറത്തെ കഴൽ ശരീരഭിത്തിയും മരൊറാത് അന്നകലയുമാണ്. രണ്ടിനുമിടയിലെ സ്ഥലത്തിനു സിലോം (ശരീര ഗഹപരം) എന്ന പേർ പറയുന്നു. സിലോമിലാണു ആന്തരാവയവങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ സിലോം ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞല്ലോ. അന്നകലയുടേയും ശരീരഭിത്തിയുടേയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന മാംസഭിത്തികൾ സിലോമിനെ ബാഹ്യമായ ഖണ്ഡനത്തിന്നു സരിച്ചു അറകളായി തിരിക്കുന്നു. സിലോമിന്റെ എല്ലാവശത്തും മധ്യധരം (merodum) മായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ മധ്യധരം പിളർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമാണു സിലോം.

ശരീരഭിത്തി

കുട്ടിക്കിടം ആണു ഏറ്റവും പുറത്തെ ആവരണം. അതിനടിയിൽ അധിചർമ (epidermis) എന്ന അധിതലിയുമാണു. ഇതിലെ കോശങ്ങളുടെ സ്രവണമാണു കുട്ടിക്കിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിലെ ചില കോശങ്ങൾ കൊഴുത്തൊരു ദ്രാവകം നിർമ്മിക്കും. ഇതു ശരീരത്തിനു നനവും വഴു

വഴുപ്പം കൊടുക്കുന്നു, അധിചർമ്മത്തിനടിയിൽ നേരിയ ഒരു ചർമ്മമുണ്ട്. സന്ധാനക്ഷയാൽ നിർമിതമായ ഈ തിരിച്ചറിയായൻ വിഷമമാണ്. ചർമ്മത്തിന് താഴെ ശരീരത്തെ ചുറ്റിയുള്ള വർത്തുളമാംസപേശികളും അതിന് താഴെയായി അനഭൈർഘ്യമാംസപേശികളും ഉണ്ട്. അവസാനമായി ഉൾഭാഗത്തു് ഒരു നേരിയ അധിതലിയം കാണാം.



ചിത്രം 80. ഞാഞ്ഞൂൽ: അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം

1. അനുശർമ്മം 2. അനഭൈർഘ്യപേശി 3. വൃത്തിയപേശി
4. ടിഫ്ളോസോർ 5. ക്ലോറോജൻ കോശങ്ങൾ 6. വൃക്ക
7. അപാക്ഷരകതകൾ 8. അഭ്യക്ഷരകതകൾ 9. അപാക്ഷ
- നാഡിതന്തു 10. സിറം.


ശരീരഭിത്തിയിലെ പേശികളുടെ ഇടവിട്ടുള്ള സങ്കോചവികാസങ്ങൾ വഴിയാണ് ഞാഞ്ഞൂൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വർത്തുളപേശികൾ സങ്കോചിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ശരീരത്തിന് നീളം കൂടുകയും വണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായി ശരീരത്തിന്റെ തലയറ്റം ശുക്ലങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ നിലത്തുറപ്പിക്കും. പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള പേശികൾ സങ്കോചിക്കും. തൽഫലമായി ശരീരത്തിന് നീളം കുറയുകയും ശരീരം മുന്നോട്ടു വലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് പിൻവശം മണ്ണിലൂന്നി മുന്നോട്ടോലേ മുൻവശം പ്രവർത്തിക്കും. ഇങ്ങിനെ തുടർച്ചയായാകുമ്പോൾ ശരീരം മണ്ണിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നത് കാണാം. പേശികളുടെ സങ്കോചവികാസങ്ങളെ സിലോമിലുള്ള ദ്രവം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദ്രവത്തിന്റെ വീക്കൽ പേശികൾക്കു ഒരു ആലംബം കൊടുക്കും. അതിനാൽ ഇതിനെ ദ്രവീകകകാലം (hydraulic skeleton) എന്നു വിളിക്കുന്നു.

പചനവ്യൂഹം

അന്നകല്പ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റോ അറ്റം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കഴലാണ്. ഇതിനു ശരീരത്തിന്റെ അത്രുതന്നെ നീളമുണ്ട്. ഒരറ്റത്തു് വായ വഴിയും മറ്റോ അറ്റത്തു് ഗുദഭാഗം വഴിയും അന്നകല്പ്യ പുറത്തേക്കു തുറക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മുഖഗഹപാദം (buccal cavity) ആണ് അന്നകല്പ്യയുടെ തലയറ്റത്തെ ഭാഗം. ഇതിലേക്കാണ് വായ് തുറക്കുക. ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ പേശികൾക്കു കട്ടികൂട്ടം. ഇതിന് ഗുളാ (pharynx). ഇത് മൂന്നാം നാലാം ഖണ്ഡങ്ങളിലായി കിടക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള അന്നകല്പ്യയുടെ ഭാഗം ചെലിഞ്ഞതും കുറിയതുമായ അന്നനാള (oesophagus) മാണ്. ഇതിന്റെ സ്ഥാനം അഞ്ചാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലാണ്. ഗുളത്തിനു പുറമുള്ള ഗുളഗുഹികൾ ഗുളത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. അവയിലുണ്ടാകുന്ന ദ്രവം ഗുളത്തിലേക്കാണ് വന്നുചേരുക. അന്നനാളം ആറാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ കിടക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ഒരു അറയിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. ഈ അറയ്ക്ക് അന്നമർദ്ദി (gizzard) എന്നു പേർ. ഇതിന്റെ ഭിത്തിയുടെ ഉൾവശത്തു കട്ടപ്പുള്ള കൈററിൻ എന്ന പദാർത്ഥം ഉണ്ട്. അന്നമർദിയെ തുടർന്നുള്ള അന്നകല്പ്യയുടെ ഭാഗത്തിനു ആത്രം (കുടൽ) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറെ ഭാഗം (14ാം ഖണ്ഡം വരെ) ചെലിഞ്ഞിരിക്കാം. അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലേക്കും തുറിച്ചു നിൽക്കുന്നതു കാണാം. ആത്രത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ ദീപനാസവും മാറ്റം സ്രവിക്കുന്ന ഗുഹികൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അപാക്ഷഭാഗത്തെ ഭിത്തി ആത്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മടക്ക് പോലെ തള്ളിനിൽക്കുന്നു. ഈ മടക്കു ആത്രത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയുടെ തലത്തിനു വിസ്താരം കൂട്ടാനുതകുന്നു. ഇതിന് ആത്രതടം എന്നു പേർ പറയും. ആത്രത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിലൂടെയാണ് ദീപനം വന്ന ഭക്ഷണം രക്തത്തിൽ ലയിക്കുക. ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുക്കുന്ന തലത്തിനു പരപ്പുകൂട്ടാൻ ആത്രതടം ഉപകരിക്കുന്നു. ആത്രം അവസാനത്തെ ഖണ്ഡത്തിന്റെ അറ്റത്തു ഗുദഭാഗം വഴി പുറത്തേക്കു തുറക്കുന്നു.

അന്നകല്പ്യയുടെ ഭിത്തിയിലും പല അട്ടികളുണ്ട്. പുറത്തെ അട്ടി അധിതലിയമാണ്. പിന്നെ അന്താദർശ്യപേശികളും അതിന്നടിയിൽ വത്തുളപേശികളും കാണാം. ഇവെല്ലാം മധ്യധാരത്തിൽ നിന്നു രൂപം കൊള്ളുന്ന അട്ടികളാണ്. ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ അട്ടി അന്തർധാരമാണ്. ആത്രത്തിനുപരിയായി മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള കണികകളുണ്ടാകാം കാണാം. വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കണികകളെ ഫ്ലോറോഗോജൻ കോശങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഞാഞ്ഞൂൽ നനവുള്ള മണ്ണു കഴിച്ചു് മാളമുണ്ടാക്കി കീഴോട്ടിറങ്ങുന്നതു് ഏവരും കണ്ടിരിക്കാം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ജീർണിച്ച ശരീരാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മണ്ണു ഞാഞ്ഞൂൽ അകത്താക്കും. അതായതു് മാളം തുറക്കലും തിറയും ഒന്നിച്ചു നടക്കുന്നു. എന്നാൽ മാളമുണ്ടാക്കുമ്പോഴെല്ലാം തിറ നടത്താറില്ല. പലപ്പോഴും ശരീരം കൊണ്ടു മണ്ണു തുളച്ചു കയറുക




ചിത്രം 81. രോമൻ അക്കങ്ങൾ ദേഹവണ്ഡത്തിന്റെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറബിക് അക്കങ്ങൾ വിവിധ ഘടകങ്ങളെയും.
 1. മൂലധാര 2. ഗ്രസനി 3. ഗ്രസനിഗ്രന്ഥികൾ 4. ഗുളം 5. ഗിസ്സാർഡ് 6. ഗ്രസനിവൃക്കകൾ 7. അപാക്ഷരക്തക്കുഴൽ 8. പാർശ്വപുറയങ്ങൾ 9. ആന്തം 10. സൂക്ഷ്മവൃക്കകൾ 11. ക്ലൈറ്ററല്ലം 12. അധ്യാന്ത്രവിസർജനക്കുഴൽ 13. വൻവൃക്കകൾ 14. സെപ്റ്റിയവിസർജനക്കുഴൽ

യാണു പതിവു്. ഗുളം പുറത്തേക്കു് തള്ളിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണു് മണ്ണു് ഉള്ളിലേക്കു് വലിക്കുക. ജീർണിച്ച ഇലകളും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഞാഞ്ഞൂൽ മാളത്തിലേക്കു് തള്ളിക്കയറ്റി പിന്നീടു് തിന്നുന്നതായും കാണാം. ഏതായാലും മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന സസ്യശുഭാഭിക്ഷകളുടെ ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടമാണു് അതിന്റെ ആഹാരം. ഗുളഗ്രന്ഥികൾ സ്രവിക്കുന്ന ദ്രവം ആഹാരത്തോടു് ചേർന്നു് അതിനെ ദഹനപ്രായമാക്കുന്നു. അന്നമർഭിയിൽ വെച്ചു് ഭക്ഷണം മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു്, അതിനുശേഷം അരയ്ക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആന്ത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെയുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ദീപനരസം ഭക്ഷണത്തെ ദീപനം വരുത്തുന്നു. ദീപനം വന്ന പദാർഥങ്ങളെ ആന്ത്രഭിത്തിയിലുള്ള രക്തസിരകളിലെ രക്തം വലിച്ചെടുത്തു് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കും. അന്നകലുയിൽനിന്നു മണ്ണും ദീപനം വരാത്ത മറ്റു പദാർഥങ്ങളും ഗുദോദാരം വഴി പുറം തള്ളപ്പെട്ടു്. അങ്ങിനെ പുറത്തു വരുന്ന വസ്തുവാണു് ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ മാളോദാരത്തിൽ നാം കാണുന്ന 'പുറുട്ടു'.

കർഷകബന്ധ

മണ്ണിൽ തുളച്ചുകയറി അടിയിലുള്ള മണ്ണു് പുറംതൊഴുതിൽ പുറത്തുകൊണ്ടു വരുന്നതു കൊണ്ടു് ഞാഞ്ഞൂൽ മണ്ണിനെ ഇളക്കി മാറ്റിക്കുന്നു. അനവധി ഞാഞ്ഞൂലുകൾ ഒരോ സ്ഥലത്തു് ഇങ്ങിനെ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ സ്ഥലത്തെ മണ്ണു് കിളിച്ചിളക്കിയ മട്ടിലാകുന്നു. ഇളക്കിയ മണ്ണിൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾക്കു എളുപ്പം വളരാനു് കഴിയും. ഞാഞ്ഞൂലുകളുണ്ടാക്കുന്ന കുഴലുകൾ വഴി മണ്ണിനടിയിലേക്കു വായുവും വെള്ളവും എളുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും. ഇങ്ങനെ ചെന്നു പാറുന്ന വായുവും വെള്ളവും സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾക്കു ലഭ്യം.




ചിത്രം 82. ഞാഞ്ഞൂൽ: വിലങ്ങനെ ഭാഗികമായി മുറിച്ചത്. 1. പാർപ്പി കഴുഭയം 2. അപാക്ഷരക്തക്കുഴൽ 3. ഉപനാഡീരക്തക്കുഴൽ 4. പാർപ്പരക്തക്കുഴൽ. ദോമൻ അക്കങ്ങൾ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ കാണിക്കുന്നു.

മാവുകയും ചെയ്യും. ഇതു മാത്രമല്ല ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ അനുകല്പയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന മണ്ണിൽ ഞെടജനങ്ങളെന്ന കുറേ പദാർത്ഥങ്ങൾ കലന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അതു വളപ്പുറുള്ളതായിത്തീരും. അങ്ങിനെ മണ്ണിലൂടെയും അതിന്റെ പശ്ചാദ് കൂട്ടുകയും ഞാഞ്ഞൂൽ സഭാ ചെയ്യ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളായാൽ അതു തീർച്ചയായും ഒരു കർഷകബന്ധുവാണു്. ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തു നിന്നു ഏക ദേശം 50 ഓളം ടൺ മണ്ണു് ഞാഞ്ഞൂലുകൾ ആണ്ടുതോറും പുറാറിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തുകൊണ്ടു വരുമെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

പരിവർത്തനവ്യവസ്ഥ

രക്തം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴലുകൾ ആദ്യമായി രൂപം പൂണ്ടതു് അനലിഡയിലാണു്. ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുകല്പയുടെ മേൽവശത്തും അടിവശത്തും സിലോമിൽ നെട്ടിറിച്ചെ കിടക്കുന്ന ഓരോ പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടു്. ഇവ തലയറ്റം മുതൽ മറ്റോ അറ്റം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കും. മേലേയുള്ള കഴലിനു് അപാക്ഷരക്തവാഹിനി (dorsal blood vessel) എന്നും അടിവശത്തുള്ളതിനെ അഭ്യക്ഷരക്തവാഹിനി (ventral blood vessel) എന്നും പറയുന്നു. അപാക്ഷരക്തവാഹിനിക്ക് പേശികളടങ്ങുന്ന ഭിത്തിയാണുള്ളതു്. അതിനുള്ളിൽ ജോഡിയായി വാൽവുകളും ഉണ്ടാകും. ഇവ രക്തത്തെ ഒരു വശത്തേക്കു മാത്രം പ്രവഹിക്കാനേ അനുവദിക്കൂ. ഈ കഴലിലൂടെ രക്തം പിന്നിൽ നിന്നു മുൻപോട്ടുണ്ടാകുക. ഇതിന്റെ ഭിത്തിക്കു സ്പന്ദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടു്. ക്രമാനുഗതമായി നടക്കുന്ന ഈ സ്പന്ദനം പിന്നിൽ നിന്നു മുൻപോട്ടുകയാൽ രക്തവും അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അഭ്യക്ഷരക്തവാഹി



ചിത്രം 83. രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം.

1. ദേഹഭിത്തി 2. പാർശ്വഗുര്യം 3. അപാക്ഷരക്തക്കുഴൽ
4. അഭ്യക്ഷരക്തക്കുഴൽ 5. ആന്തം 6. വൃക്കകം.

നിയിൽ വാൽവുകളില്ല. അതിന്റെ ഭിത്തിക്കു സ്പന്ദിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇല്ല. ഇതിലൂടെ രക്തം മുന്നിൽ നിന്നു പിറകോട്ടാണൊഴുകുക. രണ്ടു രക്തക്കുഴലുകളേയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്നതും അനുകല്പ്യയെ വലയം ചെയ്യുകയെന്നതുമായ 8 ജോഡി രക്തക്കുഴലുകൾ 6 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ദേഹഖണ്ഡങ്ങളിലായി കിടക്കുന്നു. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ജോഡി കുഴലുകളാണ് കാണുക. ഇവയ്ക്ക് പാർശ്വഗുര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പേർ. ഇവയ്ക്കു പുറയെത്തേപ്പോലെ സങ്കോചിക്കുവാനും വികസിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെ സങ്കോചം വഴി രക്തത്തെ അപാക്ഷരക്തവാഹിനിയിൽ നിന്നും അഭ്യക്ഷരക്തവാഹിനിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ഈ പാർശ്വഗുര്യങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നു.

അപാക്ഷരക്തവാഹിനി ശരീരത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നും രക്തം വഹിച്ചുവരുന്ന രക്തക്കുഴലുകളെ സ്വീകരിക്കും. അതുപോലെ അഭ്യക്ഷരക്തവാ

ഹിനിയീൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കഴലുകൾ നാനാ അവയവങ്ങളിലേക്കും രക്തമെത്തിക്കും. അപ്പോൾ അപാക്ഷരക്തവാഹിനി നാനാഭാഗത്തുനിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കുകയും ആ രക്തം പാർശ്വപുഴയങ്ങൾ വഴി അഭ്യക്ഷരക്തവാഹിനിയീലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രക്തം പിറകോട്ടൊഴുകി അവയവങ്ങളിലേക്കു പോകുന്ന കഴൽവഴി ഒഴുകി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗത്തും ചെന്നുചേരുന്നു. അപാക്ഷരക്തവാഹിനിയീൽ അനുകൂലയിൽ നിന്നു, പോഷകവസ്തുക്കളും തപക്കിൽനിന്നു ഓക്സിജനും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന രക്തമാണ് വന്നുചേരുന്നത്. ആ രക്തം അവയവങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ ആ അവയവങ്ങൾക്കു പോഷകദ്രവ്യങ്ങളും ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നു. തപക്കിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്നു കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും വൃക്കകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്നു നൈട്രജനടങ്ങുന്ന വിസർജനവസ്തുക്കളും വേർപിരിഞ്ഞു രക്തം ശുദ്ധമാവും. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ രക്തമാണ് അപാക്ഷരക്തവാഹിനിയീൽ എത്തുന്നത്. ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ രക്തത്തിനു ചുക്ചുവർണ്ണമാണ്. ചുക്ചു നിറം കൊടുക്കുന്ന വസ്തു ഹീമോഗ്ലോബിനെന്ന് ഇതനു കലർന്നു പ്രോട്ടീനാണ്. ഈ പദാർത്ഥം രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കും. ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവു് രക്തത്തിനുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാകുന്നു. രക്തത്തിൽ നിറമില്ലാത്ത ചില കോശങ്ങൾ (രക്താണുക്കൾ) ഉണ്ടാവും.

പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം അതിപ്രധാനമായ പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു മേൽകൊടുത്ത വിവരണത്തിൽ നിന്നു തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആഗിരണം, ശ്വാസനം, വിസർജനം എന്നീ ക്രിയകളെല്ലാം ഈ വ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


ശ്വാസനം

പ്രവർത്തനശക്തിയുണ്ടാവാൻ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം ഞാഞ്ഞൂലിനുണ്ട്. എന്നാൽ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേക അവയവവ്യൂഹം അതിനില്ല. എപ്പോഴും നനവുള്ള തപക്കിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡു് പുറത്തു വിടുന്നതും. തപക്കിലുള്ള രക്തസിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ നിന്നു ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും രക്തത്തിൽ കലർന്നിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡു് അവിടെ നിന്നു പുറത്തുള്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ വാതകങ്ങൾ തപക്കിലൂടെ കടന്നുപോകണമെങ്കിൽ തപക്ക് നനവുള്ളതായിരിക്കണം. തപക്കിലെ ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രാവവും സിലോമിൽ നിന്നു ശരീരത്തിന്റെ നടുപുറത്തുള്ള സുഷിരങ്ങൾ വഴി പുറത്തുവരുന്ന ദ്രവവും തപക്കിനു നനവും വഴുവഴുപ്പും കൊടുക്കുന്നു. തപക്കിലൂടെ വലിച്ചെടുത്ത ഓക്സിജൻ രക്തം വഴി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തി കോശങ്ങൾക്കു വേണ്ട പ്രവർത്തനശേഷി നൽകുവാൻ ഉപയുക്തമായിത്തീരുന്നു.

വിസർജനം

നൈട്രജനടങ്ങുന്ന വിസർജനവസ്തുക്കളും ശരീരത്തിൽ ഭ്രവശൃത്തിൽ കവി

ഞുളെ വെള്ളവും പുറത്തു കളയാൻ പ്രത്യേകം ഒരു തരം അവയവങ്ങൾ ഞാഞ്ഞു ലിൻണ്ടു്. വൃക്കകളെന്തെ പറയുന്ന കഴലുകളാണി അവയവങ്ങൾ. ഖണ്ഡത്തിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ജോഡി വൃക്കകൾ ഉണ്ടാകാം. അന്നകല്പയുടെ ഇരുവശത്തും അതിനടിയിലുമാണിവ കിടക്കുന്നതു്. ആദ്യത്തെ കുറച്ചു ഖണ്ഡങ്ങളിലും അവസാനത്തേതിലുമൊഴിച്ചു് മറ്റൊല്ലാ ഖണ്ഡങ്ങളിലും വൃക്കകൾ കാണാം.



ചിത്രം 84. ഞാഞ്ഞൂൽ: വൃക്കകൾ


1. നെഫ്രോസ്റ്റോം. 2. രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾക്കു് തമ്മിലുള്ള സെപ്റ്റം. 3. രണ്ടു് സമീപസ്ഥഖണ്ഡങ്ങൾ. 4. വൃക്ക.

ഓരോ വൃക്കയും നിണ്ടു ചുരുൾപോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഴലാണു്. അതിന്റെ ഒരറ്റം ഒരു ഫണൽവഴി സിലോമിലേക്കു തുറക്കും. ഫണലിന്റെ ചുറ്റും ചെറു സിലിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫണലിനു വൃക്കകാസ്യം എന്നു പറയും. വൃക്കകം കിടക്കുന്ന ഖണ്ഡത്തിന്റെ മുകളിലെ ഖണ്ഡത്തിലേക്കാണ് വൃക്കകാസ്യം തുറക്കുന്നതു്. ഖണ്ഡങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇടഭിത്തിയെ ഭേദിച്ചു് അതു് മുന്തിലുള്ള ഖണ്ഡത്തിലേക്കു തുറക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. വൃക്കകത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ശരീരഭിത്തിയെ ഭേദിച്ചു് വെളിയിലേക്കു തുറക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിനു വൃക്കകരസ്ത്രം എന്നാണു് പേർ. ചുരുണ്ടുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വൃക്കകത്തിന്റെ ഭാഗത്തു് ഗ്രന്ഥികളടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗവും സിലിയങ്ങളുള്ള കോശങ്ങളടങ്ങുന്നൊരു വിഭാഗവുമുണ്ടു്. വൃക്കകഭിത്തിയിൽ രക്തസിരകൾ ധാരാളം ഉണ്ടു്. അവയിലൂടെ പോകുന്ന രക്തത്തിൽനിന്നു മാലിന്യങ്ങളും വെള്ളവും വൃക്കകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥികളടങ്ങുന്ന ഭാഗം വേർതിരിച്ചെടുക്കും. വൃക്കകത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിലുള്ള സിലിയങ്ങളുടെ ചലനം വഴിയുണ്ടാകുന്ന പ്രവാഹത്തിൽ ആ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളി പുറത്തുള്ളപ്പോൾ. സിലോമിൽ നിന്നു മാലിന്യം വൃക്കകൾ വഴി പുറത്തു പോകാറുണ്ടു്. ശരീരത്തിൽ നിന്നു പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന മുഖ്യമാലിന്യങ്ങൾ യൂറിയയും യൂറിക്കുറ്റുമാണ്. വൃക്കകങ്ങളിലൂടെ സിലോമിലെ ദ്രാവകം പുറത്തുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതൽ പ്രകൃതി എടുത്തിട്ടുണ്ടു്. വൃക്കകരസ്ത്രം വേണ്ടപ്പോൾ മാത്രമേ തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. വരൾച്ചക്കു വിധേയമായാൽ ഞാഞ്ഞൂൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നു വെള്ളം പുറത്തുവിടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ അവസരങ്ങളിൽ വിസർജ്ജിതവസ്തുവിൽ ജലാംശം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

രക്തത്തിൽ നിന്ന ചില മലിനപദാർത്ഥങ്ങളെ—തുവാനിൻ തുടങ്ങിയവ— ആന്ത്രത്തിന്നു പുറമെ പാറികൂടിക്കിടക്കുന്ന വിസർജനകോശങ്ങൾ വേർപെടുത്തിയെടുക്കും. മലിനവസ്തുക്കളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ക്ലോറഗോജൻകോശങ്ങൾ സിലോമിലേക്കു പതിക്കുകയും ജീർണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഈ കോശങ്ങളെ സിലോമിലുള്ള ദ്രവത്തിൽ കാണുന്ന ഫേഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന ഒരു തരം കോശങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് ശിഥിലീകരിക്കും. അവയിലെ വിസർജിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കൾ സിലോമിൽ ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന വൃക്കകൾ വഴി പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൃക്കകളുടെ സാമാന്യരൂപമാണ് മുകളിൽ വിവരിച്ചത്. എന്നാൽ ചില ജീനസ് ഞാഞ്ഞൂലുകളിൽ രണ്ടു മൂന്നു തരം വൃക്കകൾ കാണാം. തരമേതായാലും കാര്യത്തിൽ ഒന്നു തന്നെ. മെഗാസ്കോലക്സ് എന്ന ജീനസ്സിൽ മൂന്നുതരം വൃക്കകൾ കാണാം.

1. മഹാവൃക്കകൾ: ഇത് മുൻ വിവരിച്ച തരത്തിൽ പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നേരെ പുറത്തേക്കു തുറക്കില്ല. അതിനു പകരം അന്നകലുക്കപരിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു കഴലിലേക്കാണ് തുറക്കുക. ഈ കഴൽ ഓരോ കോശത്തിലും ഓരോ ജോഡി ചെറുകഴലുകൾ വഴി അന്നകലുയിലേക്കു തുറക്കും. ഈ ഏർപ്പാടു മൂലം വിസർജനവസ്തുക്കൾ അന്നകലു വഴിയാണ് പുറത്തുപോകുന്നത്. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഒരു ജോഡി വൃക്കകളാണുണ്ടാവുക.



ചിത്രം 85. ഞാഞ്ഞൂൽ: വിവിധതരം വൃക്കകൾ.

A. ഗ്രസനിവൃക്കകൾ. B. സൂക്ഷ്മവൃക്കകൾ. C. വൻ വൃക്കകൾ.

1. ഹെഫ്റ്റോസ്റ്റോം. 2. രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള സെപ്റ്റം. 3. രണ്ടു സമീപസ്ഥഖണ്ഡങ്ങൾ. 4. വൃക്കകൾ. 5. സവിശേഷ വിസർജനക്കഴൽ. 6. വൃക്കകൾക്കു മുമ്പുള്ള.

2. സൂക്ഷ്യവൃക്കകൾ: നന്നേ ചെറിയ കഴലുകളാണിവ. കൂട്ടം കൂട്ടമായാണു കിടക്കുന്നതു്. ഇവയ്ക്കു അകത്തേക്കു ദ്വാരങ്ങളില്ല. ഓരോന്നും വെവ്വേറെ പുറത്തേക്കു തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ കൂട്ടത്തിലും 100-150 വരെ കഴലുകൾ കാണും. 14-ാം ഖണ്ഡം മുതൽ പുറകോട്ടാണിവ ഉണ്ടാകുക. അന്ന കലയുടെ ഇരുവശത്തുമായി കിടക്കുന്നു.

3. ഗളവൃക്കകൾ: 5-9 വരെയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ വൃക്കകളുടെ അന്നാളത്തിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നതു്; സിലോമിലേക്കല്ല. **നാഡീവ്യൂഹം**


ഗളത്തിനു മുകളിലായി കിടക്കുന്ന രണ്ടു നാഡീഗാംഗ്ലിയോണുകളാണ് ഇതിന്റെ മണ്ഡിഷ്കം. ഇവയ്ക്കു ഉത്സാധഗളഗാംഗ്ലിയോണുകൾ എന്നു പേർ പറയാം. ഗളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജോഡി ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഇവയ്ക്കു ഉപഗളകന്ദങ്ങൾ എന്നും പറയാം. ഈ രണ്ടു ഗാംഗ്ലിയോൺജോഡികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ജോഡി പാർശ്വനാഡികൾ ഗളത്തെ വലയം ചെയ്തു കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു ജോഡി ഗാംഗ്ലിയോണുകളും ഒരു ജോഡി പാർശ്വനാഡികളും ചേർന്നു ഗളത്തിനു ചുറ്റും ഒരു വളയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു നാഡീവളയം എന്നു പേർ. ഉപഗളഗാംഗ്ലിയോണുകളിൽ നിന്നു രണ്ടു നീണ്ട നാഡികൾ അന്നകലുക്കിയിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരറ്റം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു ഒരാനാഡിയാണെന്നു തോന്നത്തക്കവണ്ണമാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുക. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ജോഡി ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ ഈ നാഡികളിൽ ഉണ്ട്. നാഡികൾ ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതോടെ അവയിലെ ഗാംഗ്ലിയോണുകളും ഒന്നിച്ചു ചേരുകയാൽ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ഗാംഗ്ലിയോൺ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. മണ്ഡിഷ്കത്തിൽ നിന്നു ശരീരത്തിന്റെ തലയറ്റത്തേക്കും, ഉടലിലെ ഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഗാംഗ്ലിയോണുകളിൽ നിന്നു അതതു ഖണ്ഡങ്ങളിലെ അവയവങ്ങളിലേക്കും ചെറു നാഡികൾ പോകുന്നു.

സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

സങ്കീർണമായ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഞാഞ്ഞൂലിനില്ല. എന്നാൽ മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളും രാസാവസ്ഥയും ചൂടും വെളിച്ചവും ഞാഞ്ഞൂലിൽ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുതകുന്ന ലഘുതരങ്ങളായ സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഞാഞ്ഞൂലിനുമുണ്ട്. തലക്കിൽ ഒരൊക്കം കൂട്ടായും കിടക്കുന്ന ചില ബോധനകോശങ്ങൾ (sensory cells) ഉണ്ട്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ കോശങ്ങൾ നാഡീവ്യൂഹവുമായി നാഡീതന്തുക്കളാൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ബോധനകോശങ്ങൾ വഴി കിട്ടുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾ (stimuli) നാഡീതന്തുക്കൾ വഴി നാഡീവ്യൂഹത്തിലെത്തും. അവിടെനിന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവയവങ്ങൾക്കു നാഡികൾ വഴി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ സന്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഞാഞ്ഞൂലിനെ ഉഭയലിംഗി എന്നു വിളിക്കുന്നു. പത്തു പതിനൊന്നും ഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു ജോഡി വൃഷണങ്ങളാണ് പുരുഷേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പുരുഷബീജങ്ങളായ ശുക്ലാണുക്കളെ വിഭജനം വഴി



ചിത്രം 86. ഞാഞ്ഞൂൽ: പ്രത്യുൽപാദനാധിവൃഹങ്ങൾ.

1. മസ്തിഷ്കം. 2. പരിഗ്രസനി കമ്മീഷർ. 3. ഉപഗ്രസനി ഗാംഗ്ളിയൻ. 5. അഭ്യക്ഷനാഡി. 6. സ്പർശിതരിക്കർ. 7. ശുക്ലാശയം. 8. ശുക്ലീയനളി. 9. അണ്ഡാശയം. 10. ശുക്ലവാഹകം. 11. ശുക്ലാശയം. 12. അണ്ഡാശയം. 13. അണ്ഡവാഹകം. 14. പ്രോസറോറ ഗ്രന്ഥി. 15. പ്രോസറോറനളി.

റോമൻ അക്കങ്ങൾ ദേഹഖണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശുക്ലമാതൃകോശങ്ങൾ വൃഷണങ്ങളിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും ശരീരവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള സഞ്ചിപോലുള്ള രണ്ടു ജോഡി ശുക്ലാശയങ്ങളിൽ ശുക്ലമാതൃകോശങ്ങൾ ചെന്നു പറ്റി അവയുടെ വെച്ചു അവയിൽ നിന്നു പുരുഷബീജങ്ങളായ ശുക്ലാണുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വൃഷണങ്ങളുടെ അടുത്തായി പത്തും പതിനൊന്നും ശരീരവർണ്ണങ്ങളിൽ ഓരോ ജോഡി സിലിയാമയമായ ഫണലുകൾ കാണാം. ഇവയ്ക്ക് ശുക്ലഫണലുകളെന്നാണ് പേര്. ഇവ ഓരോന്നും ഓരോ നാളങ്ങളായി കീഴ്പ്പോട്ടുപോകും. ഒരു വശത്തുള്ള ഒരു നാളങ്ങളും ഒന്നിച്ചുചേർന്നു ഓരോനാളമായി അത് 18-ാമത്തെ ശരീരവർണ്ണം വരെ പോകും. ഈ നാളത്തിന് ശുക്ലനാളമെന്നു പറയുന്നു. ശുക്ലനാളങ്ങൾ രണ്ടും 18-ാം വർണ്ണത്തിൽ വെച്ചു ശരീരത്തിന്റെ അഭ്യക്ഷഭാഗത്തുള്ള ഒരു ജോഡി തുളകൾ വഴി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നു. പുരുഷബീജങ്ങൾ ശുക്ലാശയങ്ങളിൽ നിന്നു സിലോമിലേക്ക് വരികയും അവയുടെനിന്നു ശുക്ലഫണലുകളിൽ കടന്നു ശുക്ലനാളങ്ങൾ വഴി പുറത്തേക്കുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ശുക്ലഫണലുകളിലെ സിലിയങ്ങൾ ശുക്ലാണുക്കളെ അവയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 18-ാം വർണ്ണത്തിൽ ശുക്ലനാളങ്ങളുടെ ചുറ്റുമായി ഓരോ വശത്തും ഓരോ ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്. ഇവയാണ് പ്രോട്ടേറ്റോർ ഗ്രന്ഥികൾ (protate glands). ഇവയുടെ നാളങ്ങൾ ശുക്ലനാളങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രവം പുറംബീജങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തും. 18-ാം വർണ്ണത്തിലുള്ള ശുക്ലനാളഭാഗങ്ങളുടെ അടുത്തായി രണ്ടു ജോഡി ശുക്ലങ്ങൾ ശുക്ലസഞ്ചികളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവ ഇണചേരുന്ന അവസരത്തിൽ ശുക്ലാണുക്കളെ ഒരു ഞാഞ്ഞൂലിൽനിന്നു മറേറതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ശുക്ലങ്ങൾക്ക് ശിശ്നശുക്ലങ്ങൾ (penial setae) എന്നു പറയുന്നു.

ഒന്നുനേരൂറിയങ്ങളായ അണ്ഡാശയങ്ങൾ പതിമൂന്നാം വണ്ണത്തിലാണു കിടക്കുന്നത്. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ് അണ്ഡാശയങ്ങൾ. ഇവയിൽ അണ്ഡങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. മുപ്പെത്തിയ അണ്ഡങ്ങൾ സിലോമിലേക്ക് പതിക്കും. അണ്ഡാശയങ്ങൾക്കു തൊട്ട് ഒരു ജോഡി ഫണലുകൾ 13-ാം വണ്ണത്തിന്റെ സിലോമിലേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ വാൽഭാഗം 14-ാം വണ്ണത്തിൽ കടന്നു പുറത്തേക്കു തുറക്കും. ഇവയാണ് അണ്ഡനാളങ്ങൾ. ഈ നാളങ്ങൾ വഴിയാണ് അണ്ഡങ്ങൾ പുറത്തു കടക്കുന്നത്.

മേൽ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങൾക്കു പുറമെ 7, 8, 9 എന്നീ വണ്ണങ്ങളിൽ ഗദയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ജോഡി ശുക്ലസഞ്ചികൾ ഉണ്ട്. ഇവ ശരീരത്തിന്റെ അഭ്യക്ഷഭാഗത്തു് ആറ്, ഏഴ് എന്നീ വണ്ണങ്ങൾക്കും ഏഴ്, എട്ട് എന്നീ വണ്ണങ്ങൾക്കും എട്ട്, ഒമ്പത് എന്നീ വണ്ണങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള സുഷിരങ്ങൾ വഴി പുറത്തേക്കു തുറക്കുന്നു. ഈ സഞ്ചികളിലാണ് ഇണചേരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ഞാഞ്ഞൂലിനു മറേറതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ശുക്ലാണുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇണചേരൽ

ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ പുരുഷബീജവും സ്ത്രീബീജവും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ആബീജങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാറില്ല. പുരുഷാവയവങ്ങൾക്കു വേരം മുറുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പുരുഷബീജങ്ങളാണു ഞാഞ്ഞൂൽ ആദ്യം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇണചേരൽ അണ്ഡത്തിന്റെ സേകത്തിനു അത്യാവശ്യമാണ്. ഇണചേരുമ്പോൾ രണ്ടു ഞാഞ്ഞൂലുകൾ അന്യോന്യം പുരുഷബീജങ്ങൾ കൈമാറും. ഇണചേരാൻ മുതിരുന്ന രണ്ടു ജീവികളും ആദ്യമായി അടുത്തുകൂടും. പിന്നെ തലകൾ എതിർവശത്താക്കി അവ അഭ്യക്ഷവശങ്ങൾ ചേർത്തു പറ്റിക്കിടക്കും. ഒരു ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ പര്യാണം (clitellum) മറോതിന്റെ ശുക്ലസഞ്ചികളുടെ ദ്വാരങ്ങൾക്കെതിരെ വരത്തക്കവണ്ണമാണ് അവ കിടക്കുക. അവയുടെ പറ്റിച്ചേർന്ന വശങ്ങൾക്കു ചുറ്റും പര്യാണം സ്രവിക്കുന്ന ഒരു ദ്രവം കൊണ്ടു മൂടപ്പെടും. പറ്റിപ്പിടിച്ച് സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന രണ്ടു ചാലുകളിലൂടെ ഓരോ ഞാഞ്ഞൂലിന്റെയും പുംബീജങ്ങൾ ഇണയുടെ ശുക്ലസഞ്ചികളിലേക്കെത്തും. ഇങ്ങനെ ശുക്ലാണുക്കളെ കൈമാറിയ ശേഷം അവ വേർപിരിയും. അതിനു



ചിത്രം 87. A. ഞാഞ്ഞൂലിൽ ശുക്ലനീക്കം. B. ഞാഞ്ഞൂലിൽ മൈറ്റോസിസ്. 1. ശുക്ലാശയം. 2. വൃഷണം. 3. ശുക്ലീയഫണൽ 4. സ്വർമാത്തിക്കയുടെ ദ്വാരം. 5. ക്ലൈറ്റാല്ലം. 6. ആൻഡോറം.

ശേഷം പര്യാണം അതിനു ചുറ്റും ഒരു ഉറ നിർമ്മിക്കും. ഇതിനു കൊള്ളുൻ എന്നു പേർ. ക്രമേണ ഈ ഉറ ശരീരത്തിൽ നിന്നു ഉയർന്നുപോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതു അണ്ഡനാളദ്വാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൽ അണ്ഡങ്ങൾ

നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്ന ശുക്തസഞ്ചികളുടെ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ ശുക്താണുക്കളും അതിലേക്കു പതിക്കും. കൊക്കുൺ ശരീരത്തിൽ നിന്ന ഉതിർന്നു വീഴുന്നതോടെ അതിന്റെ രണ്ടറ്റവും അടഞ്ഞു് അതൊരു അണ്ഡസഞ്ചിയാവും. ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചാണു ബീജങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിക്കുക. ഈ ക്രിയക്കാണ് സേകം എന്നു പറയുക. അണ്ഡസഞ്ചി നനവുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതു്. സേകത്തിന്നു ശേഷമുണ്ടാകുന്ന സിക്താണഡം വിഭജിച്ചു് പല ദശകർ പിന്നിട്ടു് ഭൂണമായിത്തീരും. അങ്ങനെ അനവധി ഭൂണങ്ങൾ അണ്ഡസഞ്ചിയിൽ വളരും. ഭൂണം ചെറു പുഴുവായിത്തീരുമ്പോൾ അണ്ഡസഞ്ചി പിളർന്നു് അതു് പുറത്തേക്കു ഇഴഞ്ഞിറങ്ങിവരും. സഞ്ചിക്കകത്തു നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ കഞ്ഞുങ്ങളാവാറില്ല, മിക്ക അണ്ഡങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നു. കറച്ചു് അണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമാണു് ഞാഞ്ഞുമുക്തമായി വികസിക്കുന്നതു്.

വർഗീകരണം

അനലിഡ

ഈ ജനുഫൈലത്തിൽ മൂന്നു വർഗങ്ങളുണ്ടു്. അവയെക്കുറിച്ചു് ഒരു ലഘുവിവരണം താഴെ ചേക്കാം.

വർഗം 1. കീറോപ്റ്റോഡ

ഇതിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്കു് ശരീരത്തിൽ ശുക്തങ്ങൾ (setae) ഉണ്ടായിരിക്കും. സിലോം പല ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിസഞ്ചരണ വ്യൂഹം സാമാന്യം വികസിതമായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കും. അന്നകല്യക്കു മുകളിലും താഴെയുമായി ഓരോ കഴലുകളാണു് പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകൾ. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ജോഡി വൃക്കകളുണ്ടു്. ഇവയാണ് വിസർജനവ്യൂഹം. നാഡീവ്യൂഹം ഗളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വളയവും അന്നകല്യക്കു താഴെ നെട്ടുനിളെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ട നാഡീയും കൊണ്ടു നിർമ്മിതമാണു്. നാഡീവളയത്തിനു് ഉപരിഭാഗത്തു് മസ്തിഷ്കവും ഇരട്ടനാഡിയിൽ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ഗാംഗ്ലിയണും ഉണ്ടു്.

ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പല ജീവികളും ഉഭയലിംഗികളാണു്. ചിലവയുടെ ജീവിതചക്രത്തിൽ ഒരു ലാർവദശ കാണാം. അതിന്നു ട്രോക്കോഫോർ (Trochophore) എന്നാണു് പേർ.

കടലിലും ശുദ്ധജലാശയത്തിലും കരയിലും ഇവയെ കാണാം.

ഈ വർഗത്തെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.


ഗോത്രം—1 പോളിക്കീറ്റ (polychaeta) പൂഴിപ്പുഴുക്കൾ.

ഗോത്രം—2 ഒളിഗോക്കീറ്റ (oligochaeta) ഞാഞ്ഞുമുക്തകൾ.

ഗോത്രം പോളിക്കീറ്റ

കടലിലാണു് ഇവ കാണപ്പെടുന്നതു്. കടലിനടിയിൽ മണ്ണിൽ പൂഴുന്ന കിടക്കുന്നവയും ശരീരത്തിനു ചുറ്റും കഴലുണ്ടാക്കി അതിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവയും വെള്ളത്തിൽ നിന്നി പായലിലും മറ്റും പററിപ്പിടിച്ചു കഴിയുന്നവയും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. നന്നേ ചെറിയവ തൊട്ടു എട്ടുപത്തടി വരെ നീളമുള്ള പൂഴു

ക്കളെയും ഈ ഗോത്രത്തിൽ കാണാം. മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവികുന്ന പരോപജീവികളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.



ചിത്രം 88.
നിറീസ്: 1. ശിരസ്സ് 2. പരോപോഡിയങ്ങൾ 3. പിന്നറ്റം

സിലിയഗണം (tuff of cilia) ഉണ്ട്. ഈ സിലിയങ്ങൾ സ്പർശനേന്ദ്രിയങ്ങളായി വർത്തിക്കും. ശരീരത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് സിലിയവലയം കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന് വായ്ക്ക് ഉപരിയും മറ്റൊന്ന് അതിന് താഴെയും മൂന്നാമത്തേത് പ്രഷുഭാഗത്തു് ഗുദഭാഗത്തിന് ചുറ്റുമാണ്. ഈ ലാർവ രൂപാന്തരഭവിച്ച് പുഴുരൂപത്തിലുള്ള നിറീസ്സായിത്തീരും. ലാർവയുടെ പ്രഷുഭാഗം വളർന്നാണ് ശരീരത്തിലെ ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ടാവുക.

അരെനികോള


അരെനികോള (Arenicola) കടലോരത്തിലെ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ പുഴുന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പുഴുവാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. പൂർവഭാഗത്തു് (anterior) ശുക്ലങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഖണ്ഡങ്ങളാണുള്ളതു്. തുടർന്നുള്ള മധ്യഭാഗത്തിൽ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഇരു പാർശ്വങ്ങളിൽ ശുക്ലങ്ങളും ശ്വാസനം നടത്താനുള്ള ഗില്ലുകളും ഉണ്ട്. അവസാനത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ശുക്ലങ്ങളും ശ്വാസനം നടത്താനുള്ള ഗില്ലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

കേയ്റോപ്റ്ററസ് (Chaetopterus): ഈ പുഴുവും കടലിൽ കാണപ്പെടുന്നു. കടലിൽ വസിക്കുന്ന പുഴുപുഴുവാണ്. ഇതു വസിക്കുന്ന കടലിനു U



ചിത്രം 89. അരണിക്കോള

എന്ന ആകൃതിയാണുണ്ടാവുക. കഴലിന്റെ രണ്ടാറും തുറന്നിരിക്കും. പുഴുവിന്റെ തല ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്കു തുറിച്ചുനിൽക്കും. പുഴു എല്ലായ്പ്പോഴും കഴലിനുള്ളിൽ തന്നെയാണു് വസിക്കുക. അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർവഭാഗത്തു് 9 ജോഡി പാർശ്വപാദങ്ങളുണ്ടു്. തുടന്നുള്ള മധ്യഭാഗത്തു് ഒരു ജോഡി ചിറകുകൾ കാണാം. കരോളസി കീഴ്വശത്തായി ശരീരത്തിൽ മൂന്നു ജോഡി വലിയ പാർശ്വപാദങ്ങളുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു വിശദമായ ആകൃതിയാണു്. ഈ വിശദീകരണ പ്രവർത്തനം മൂലം കഴലിനുള്ളിലേക്കു വെള്ളം പ്രവഹിച്ചു



ചിത്രം 90. കേരോറാപ് ടിറസ്

1. ടെൻറക്കിൾ 2. വായ 3. ചിറക് 4. സക്കർ 5. ഫാനകൾ.

കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴലിനുള്ളിലെത്തുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളുമാണു് ഈ പുഴുവിന്റെ ആഹാരം. ജൈവപ്രസരണശേഷിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണു് കേയ്റോറാപ് ടിറസ്.

പുഴുപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യുൽപാദനം രണ്ടുവിധത്തിൽ നടക്കുന്നു. ലൈംഗികജനനമാണു് മിക്കവയിലും നടക്കുന്നതെങ്കിലും പലതിലും അലൈംഗികജനനം നടക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു പുഴു രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു് ഓരോ ഖണ്ഡവും ഓരോ പുഴുവായിത്തീരുന്ന പതിവു് ചിലവയിൽ ഉണ്ടു്. ഇങ്ങനെ മുറിയുന്നതിനു മുമ്പു് മുറിയാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു തല വളരും. ആ തല പുതിയ പുഴുവിന്റെ തലയായിത്തീരും. ഈ തലയുടെ തൊട്ടു മുകളിൽ വെച്ചാണു് മാതൃപുഴു രണ്ടായി മുറിയുക. ഓട്ടോലിറാസ്സു് എന്ന പുഴുവിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക പതിവാണ്.

മിറിയാനിഡ (Myrianida) എന്ന പുഴുവിൽ ഒന്നിനു പുറകിൽ മറ്റൊന്നായി അമ്പവധി സന്താനങ്ങൾ വളരും. മാതൃപുഴുവിന്റെ ഗുരും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖണ്ഡത്തിന്നു തൊട്ടു മുമ്പിലെ ഖണ്ഡമാണു് സന്തതികളുടെ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനം. ഗോത്രം 2 ഒളിഗോക്കിറാ

ഈ പുഴുക്കളിൽ ശുക്ലങ്ങൾ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ എല്ലാവശത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ പാർശ്വപാദങ്ങളിൽ അല്ല. തലയോ ശിരോവയവങ്ങളോ പ്രകടമല്ല. ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉണ്ടായിരി

കൊ. ഈ ഗോത്രത്തിലെ ജീവികളെല്ലാം ഉഭയലിംഗികൾ (hermaphrodites) ആണ്. ലാർവദശയില്ല. പോളിക്കീറ്ററയിലെ പുഴുക്കളെ അധികവും കടലിലാണു കാണുക. എന്നാൽ ഒളിഗോക്കീറ്ററയിലെ പുഴുക്കൾ കരയിലും ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു.

എയിലോസോമ: വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറു പുഴുവാണിത്. (10 മി. മി. നീളം.) ശരീരത്തിനു പുറത്ത് ഖണ്ഡനത്തിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണുകയില്ല. അലിംഗജനനം വഴി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു.

നമുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഞാഞ്ഞൂലുകളാണ് *ട്രവിയയും മെഗാസംകോലക്സും*. *ട്രവിയ*യെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലാണു കാണുന്നത്. അവ ഒരു മീറ്ററിലധികം നീളം വെക്കാറുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്തു മണ്ണിനടിയിൽ വളരെ ആഴത്തിലാണു ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. മഴക്കാലത്തു പുറത്തുവരും. *മെഗാസംകോലക്സും* നമുടെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നു. സാധാരണ രാത്രിയാണു മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നു ഇവ പുറത്തു വരിക.

വർഗം-2. ആക്ടി അനലിഡ - ആദിവളയൻപുഴുക്കൾ


അനലിഡ ഫൈലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗ്-രൂപവിഭാഗമാണിത്. കടലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചെറിയ ചില പുഴുക്കളാണിതിൽ അടങ്ങുന്നത്. പത്തു സെ.മീറ്ററിലധികം ഇവ വളരാറില്ല. കടൽക്കരയിൽ ചേരിലും പുഴിയിലും പൂഴ്ന്നു കിടക്കുക ഇവയുടെ പതിവാണ്. ഇവക്ക് പാർപ്പാദങ്ങളും ശുക്ലങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

പോളിഗോർഡിയസും, *പ്രോട്ടോ ഡ്രൈലസും* എന്നീ ജീനസുകളാണ് മുഖ്യ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇവയെ സാധാരണയായി മധ്യധരണ്യാഴിപ്രദേശത്തു കണ്ടുവരുന്നു. മദ്രാസ് കടപ്പുറത്തും അപൂർവമായി കാണാം.

പോളിഗോർഡിയസും: മൂന്നു മുതൽ പത്തു സെ. മീറ്റർ വരെ നീളം കാണും ഈ പുഴുവിനു. ശരീരം ഉരുണ്ടതും വളരെ മെലിഞ്ഞു നീണ്ടതാണു്. തലയറ്റത്തു വായയെ മൂടിക്കൊണ്ടു് ഒരു മുഖപിയാനം (prostomium) കാണാം. അതിൽ രണ്ടു ഗ്രാഹികൾ ഉണ്ടു്. ശരീരത്തിൽ പാർപ്പാദങ്ങളോ ശുക്ലങ്ങളോ ഇല്ല. ഖണ്ഡങ്ങൾ നേർത്ത വരകളാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ പുഴുക്കളിൽ ആണു പെണ്ണും വേറെ വേറെയുണ്ടു്. മുട്ട വിരിഞ്ഞു പേരുകാ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ലാർവ പുറത്തു വരും. ഇതിനു ലോവൻസ് ലാർവ (Loven's larva) എന്നാണു പേർ. ഇതു് നിറീസ്സിന്റെ ടോക്കോഫോർ ലാർവയോട് സമൂഹമാണു്.

പ്രോട്ടോഡ്രൈലസ്: ഈ പുഴുവിനു മൂന്നോ നാലോ മി. മീറ്റർ നീളമേ ഉണ്ടാകൂ. ശരീരത്തിന്റെ അടിവശത്തു് നെട്ടുകെ ഒരു ചാൽ കാണാം. ഇതിൽ നിരക്കെ ചെറു സിലിഡങ്ങളുണ്ടു്. മദ്രാസുകടപ്പുറത്തു് ഈ പുഴുവിനെ കാണാം. ഇതിനു ലാർവദശയില്ല. മുട്ടവിരിഞ്ഞു പുറത്തുവരുന്നതു് പുഴുരൂപത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാണു്.

ഡൈടനാഫിലസ്സ് രണ്ടു മി. മീറ്റർ നീളമേ ഇതിനുണ്ടാകൂ. ശരീരം പരന്നിരിക്കും. 5 മുതൽ 8 വരെ ഖണ്ഡങ്ങളേ കാണൂ. മുഖപിയാനത്തിൽ രണ്ടു കണ്ണുകളും, ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും രണ്ടു വരി സിലിയാവലയങ്ങളും




ചിത്രം 91. പോളിതോർഡിയസ്. A. മുന്നറ്റം. B. പിന്നറ്റം C. അനുപ്രസ്ഥപരിച്ഛേദം.

1. ശിരീഷഭേദനാക്ഷികൾ. 2. ന്യൂക്കൽ അവയവം 3. ഗ്രസനീ. 4. ഗ്രസനീപ്രദേശം. 5. അപാക്ഷ-പാർശ്വപേരികൾ. 6. ആന്തരക്കുഴൽ. 7. തിര്യക്പേരി. 8. അഭ്യക്ഷ-പാർശ്വപേരികൾ 9. നാഡീതന്തു.

ഇതിനുണ്ട്. ആണം പെണ്ണു വെട്ടുവരെ തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടു തരം മുട്ടകളിൽ- വലിയതും ചെറിയതും. വലിയ മുട്ടയിൽ നിന്നു പെണ്ണു ചെറുതിൽ നിന്നു ആണം പിറക്കും.

വർഗം 3 ഹിമഡീനിയ (അടുകൾ)



ചിത്രം 92. അടുകൾ.

1. മുൻസക്കർ 2. അഭ്യക്ഷതലം.
3. അപാക്ഷതലം 4. പിൻസക്കർ.

പോലെ ഒരു പാറാണ (clitellum) മുണ്ട്. അടയും ഉടയലിംഗിയാണ്.

മറ്റു ജീവികളുടെ ചോരകുടിച്ചാണ് പരജീവികളായ അടുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. ചുഷകങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്യജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇവ ഒട്ടിച്ചിടിക്കാം. വദനത്തിൽ ഉള്ള അണുകൾ (jaws) കൊണ്ട് ആതിഥേയജീവിയിൽ മുറിയുണ്ടാക്കി, അതിലൂടെ രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് അട ചെയ്യുക. അടയുടെ കലുക്കം അനവധി പാർവസഞ്ചികളുണ്ട്. അതിലെല്ലാം കുടിക്കുന്ന രക്തം സാഭിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അടക്ക് ഒരിക്കൽ അതിന്റെ മുന്നിരട്ടി തൂക്കം രക്തം കുടിക്കാൻ കഴിയും. ചോര കുടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മെല്ലെ

അടകളെ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് ശുദ്ധജലത്തിലാണ്. എന്നാൽ കറയിലും കടലിലും ജീവിക്കുന്ന അടകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുളങ്ങളിലും തോട്ടുകളിലും കാണുന്ന അടയ്ക്കു ഹിമഡീനേറിയ അഥവാ പോത്തട്ട എന്നാണ് പേര്. ഇത് കന്നുകാലികളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും ദേഹത്തിൽ കടിച്ചുതുങ്ങി രക്തം കുടിക്കും. കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന അടയാണ് മലയട്ട അഥവാ ഹിമഡീപ്സ.

അടയുടെ ശരീരം നീണ്ട പരന്നിരിക്കും. ശരീരത്തിൽ 33 ഖണ്ഡങ്ങളും ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും പൊതുവെ അയ്യഞ്ച് നേർത്ത വളയൻ രേഖകളും കാണാം. തലയറ്റത്തു് വായും അതിനുചുറ്റും ഒരു ചുഷകവും (sucker) ഉണ്ട്. മറ്റോ അറ്റത്തു് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ചുഷകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു് പശ്ചാച്ചുഷകം (posterior sucker) എന്നും വായ്ക്കു ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുഷകത്തെ മുഖീയചുഷകം (oral sucker) എന്നും വിവരിക്കുന്നു. അടയ്ക്കു് പാർവപാദങ്ങളോ തൂകങ്ങളോ ഇല്ല. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഞാണുളളിലെന്ന

ത്തിരിക്കുന്ന ആ ചോര കടിച്ചു വിത്തുവരുന്നതു കാണാം. ഒരിക്കൽ രക്തം കടിച്ചാൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ അതിനു രക്തം കടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എല്ലാ അടകളും രക്തപ്രിയരല്ല. ചെറുജീവികളെ തിന്നുന്ന അടകളും ഉണ്ട്. ഹിമോപിസ് (Haemopis) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ആ പരോപജീവിയല്ല. അത് ജന്തുക്കളെ പിടിച്ചുതിന്ന ജീവിക്കുന്നു.

സന്തതപാദനം ഞാഞ്ഞൂലിന്റെതീനോട് സമാനമാണ്. അത് ഡം വിരിഞ്ഞു. ലാർവയല്ലാ കഞ്ഞാണു പുറത്തുവരിക.

പോത്തട്ട കന്നുകാലികൾക്കും മനുഷ്യനും ശല്യമാണ്. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോത്തുകളുടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ ഈ അടകൾ കടിച്ചു തുങ്ങി രക്തം ഉഗ്രറിക്കടിക്കും. മലയട്ടയെക്കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കാട്ടിൽക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. ഇതിന്റെ കടിയേറ്റാൽ അതുണങ്ങാൻ കുറേകാലം പിടിക്കും.

ശരീരത്തിൽ പ്രണങ്ങളും മറ്റും ഉള്ള ഭാഗത്തുനിന്നു ദുഷിച്ച രക്തം കളയാൻ അട്ടയെക്കൊണ്ടു കടിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടു ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പുണ്ട്. പാശ്ചാത്യന്മാർക്കുള്ളിലും അടുത്തകാലം വരെ ഈ സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.


ഫൈലം മൊളസ്ക

നമുക്ക് സുപരിചിതമായ കക്ക, നൊച്ച്, പച്ചച്ചിപ്പി, മുത്തച്ചിപ്പി, നീരാളി, കണവ തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളെല്ലാം മൊളസ്കുകളാണ്. ദേഹം ദൃഢമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കട്ടിയുള്ള കവചത്താൽ ആവൃതമാണ്. കടലിലും ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിലും കായിലും ഒരു പോലെ സുലഭമായ മൊളസ്കുകൾ പരിണാമപരമായി അത്യധികം വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു അകശേര ജന്തു വിഭാഗമാണ്. സമമിതി ഉള്ള ദേഹം ഖണ്ഡിതമല്ല. എങ്കിലും ഇവ അനലിഡയുടെ പൂർവികരിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് പരിണമിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ദേഹത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന കവചം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ബഹുദൂരഭാഗം മൊളസ്കുകളും 'പാദം' എന്ന അവയവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ചലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ചിപ്പികളെപ്പോലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഒരിടത്തുതന്നെ വാസമുറപ്പിച്ചു കഴിയുന്നുമുണ്ട്. തല, ആന്തരാവയവം (viscera), പാദം എന്നിങ്ങനെ ദേഹത്തെ പൊതുവെ മൂന്നു ഭാഗമായി തിരിക്കുന്നു. ആന്തരാവയവം വൃതി (മാൻറിൽ) എന്ന നേർത്ത പടലത്താൽ ആവൃതമാണ്. ശ്വാസനം നിർവഹിക്കുവാൻ ഗില്ലുകളുണ്ട്. അറകളുള്ള ഹൃദയവും നിരവധി രക്തകോടരങ്ങളും കൂടിയതാണ് പരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം. വൃക്കകൾ വിസർജനം നിർവഹിക്കുന്നു. വികസനവേളയിൽ ഭ്രൂഭാഗം മൊളസ്കുകളിലും ലാർവാദശകൾ സാധാരണമാണ്.

ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സ്പീഷീസുകളുള്ള മൊളസ്ക അകശേരകികളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലമാണ്. സുപ്രധാന ഫൈലമായ ആർത്രോപോഡയെപ്പോലെ മൊളസ്കയും അനലിഡയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഈ ഫൈലങ്ങൾ തമ്മിൽ ശരീരഘടനയിൽ വലിയ സാമ്യമില്ലെങ്കിലും വികസനത്തിൽ ട്രോക്കോഫോർ ലാർവാദശ രണ്ടിനും പൊതുവാണ്. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ മൊളസ്കുകളിൽ ഖണ്ഡനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. മിക്ക മൊളസ്കുകളും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ചു മാത്രമേ

വലുപ്പം വസ്തുക്കളുളളവെങ്കിലും, കൂനലു (squids) കളിൽ ചിലവ 15 മീറ്റർ മുതൽ 20 മീറ്റർ വരെ വലുതാണ്. മൊളസ്കയിൽപ്പെട്ട ഒച്ചകർ, കക്കർ, നീരാളി (octopus) എന്നിവയുടെ ശരീരഘടന തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ഒരു മൂലശരീരഘടനയുടെ വകഭേദങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് സൂക്ഷ്മപഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫൈലം മൊളസ്കയിലെ വിവിധ വർഗങ്ങൾ (ചിത്രം-91) ഒരേ പൂർവിക ജന്തുവിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വിവിധ വർഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണപ്പെടുന്ന ഘടകവിശേഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആദിമമൊളസ്കയിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നുവെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. മൊളസ്കിന്റെ ഭേദഘടനാപ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരികൽപിതമൊളസ്കിനെ ആദ്യമെന്നു പരിശോധിക്കാം.

പരികൽപിതമൊളസ്കിന് താഴെ പറയുന്ന ശരീരഘടനയുളളതായി കരുതപ്പെടുന്നു. തല, ഉടൽ എന്നിവ സുവ്യക്തമായിരുന്നു. തലയിൽ സംവേദക ഗ്രാഹികളുണ്ടായിരുന്നു. അഭ്യക്ഷഭാഗത്ത് ഒരു പാദമുണ്ടായിരുന്നു. വതിയുളളതും പരന്നതും മാംസളവുമായ പാദം ഇഴഞ്ഞു നടക്കുവാൻ ഉപകരിച്ചിരുന്നു. മുതുകിലുണ്ടായിരുന്ന അന്തരായവമുഴയിലായിരുന്നു മിക്ക പ്രധാന അവയവവ്യൂഹങ്ങളും. ഈ മുഴയെ വൃതി കൊണ്ടു മുടിയിരുന്നു. പ്രഷ്ടഭാഗത്ത് വൃതി ശരീരത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഒരു വളയമായി തുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. പ്രഷ്ടഭാഗത്തിനടിയിലെ സ്ഥലത്തിന് വൃതിഗഹപം (mantle cavity) എന്നു പറയും. വൃതിയുടെ



ചിത്രം 93. ആദിമമൊളസ്ക.

1. രോതിജിഹ്വ 2. ലാലാഗ്രന്ഥി. 3. ആമാശയം 4. ഹെന്തഗ്രന്ഥി. 5. കവചം. 6. ജന്തന്ത്രീയഗ്രന്ഥി. 7. ഹൃദയം. 8. വൃക്കകം. 9. ടെനിഡിയം. 10. വൃതിഗഹപം. 11. പാദം.

അന്തരീയം ചുണ്ണമ്പുള്ളികൾ (spicules) ഉൾപാടിപ്പിിച്ചിരുന്നു. വൃതിഗഹപരത്തിലേയ്ക്ക്, രണ്ടു തുവൽ പോലെയോ, ഇല പോലെയോ ഉള്ള ടെനിഡിയം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഗില്ലുകൾ ഉന്തിനിന്നിരുന്നു. ഗ്രസനിയിലേക്കാണ് വായനയിച്ചിരുന്നത്. ഗ്രസനിയിൽ രേതിജിഹവ (radula) എന്ന വളഞ്ഞ പല്ലോട്ടു കൂടിയ ദന്തനിർമ്മിതമായ ഒരു നാടയുണ്ടായിരുന്നു. മാംസപേശികൾ കൊണ്ടു ഈ നാടയെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിക്കാം. രേതിജിഹവയെ വായയുടെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്ന് സസ്യമോ മാംസമോ ആയ ഭക്ഷണം രാകിയെടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഭക്ഷണം ഗ്രസനിയിൽ നിന്ന് അന്നനാളം വഴി ആമാശയത്തിലെത്തും. ആമാശയം ഒരു യകൃത്-അഗ്ന്യാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ദഹനം കടലിലാണ് നടക്കുന്നത്. കടൽ വൃതിഗഹപരത്തിലേക്കു തുറക്കുന്നു.

നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ അന്നനാളത്തിനു ചുറ്റുമൊരു നാഡീവളയമുണ്ടായിരുന്നു. പുറംഭാഗത്തു ഈ വളയം രണ്ടു മസ്തിഷ്കഗാംഗ്ലിയോണുകളായി വിന്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ ചുവടെ രണ്ടു പാർശ്വഗാംഗ്ലിയോണുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. പാർശ്വഗാംഗ്ലിയോണുകളിൽനിന്ന് നെട്ടുകെ രണ്ടു നാഡീചരട്ടുകൾ ചുവട്ടിലേക്കു പോയിരുന്നു. അവിടെ ഇവ രണ്ടും പാദഗാംഗ്ലിയോണുകളിൽ അവസാനിക്കാം. ഇതുപോലെ പാർശ്വഗാംഗ്ലിയോണുകളിൽ നിന്ന് ആന്തരാവയവനാഡികൾ എന്ന വേറെ രണ്ടു നാഡികൾ ആന്തരാവയവങ്ങളിലേക്കും പോയിരുന്നു. അവിടെ ഇവ രണ്ടു ആന്തരാവയവഗാംഗ്ലിയോണുകളായി മാറുന്നു. ആദിമൊളസ്കിനു രണ്ടു മേലറകളും ഒരു കീഴറയും ഉള്ള ഹൃദയവും ധമനികളും സിരകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ദേഹത്തിൽ പല ഭാഗത്തും രക്തകോടരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ദേഹഗുഹ വളരെ ചുരുങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനം ഹൃദയാവരണഗുഹയായിരുന്നു. ഇതിലേക്കാണ് മുൻഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലൈംഗികാവയവ (gonads) ങ്ങളുടെ കഴലുകൾ തുറന്നിരുന്നത്. പിൻഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ടു വൃക്കകവാഹിനി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവ പാർശ്വവൃക്കകളാണ്. ഇവ ഹൃദയാവരണഗഹപരത്തെ വൃതിഗഹപരത്തിലെ വിസർജനസുഷിരങ്ങൾ വഴി പുറംഭാഗവുമായി ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഗുദഭാഗത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമാണ് ഇവ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. ബീജങ്ങളെ ഹൃദയാവരണഗഹപരത്തിലേക്കാണ് വിമോചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും വിസർജനദോരങ്ങൾ വഴി ഇവ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വികസനത്തിൽ ട്രാക്കോമോർ എന്നൊരു ലാർവാദശയുണ്ടായിരുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ചപോലുള്ള ഒരു ആദിമൊളസ്കയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച അന്തരൂപന വികിരണ (adaptive radiation) ത്തിലൂടെ വൈവിധ്യമാർജിച്ചതാണ് ഇന്നു കാണുന്ന പ്രധാന മൊളസ്കകളിൽ കാണുന്നത്. മൊളസ്കയുടെ ഒരു പൊതുവർഗീകരണം താഴെ ചേർക്കാം.

ക്ലാസ്സ് i. മോണോപ്ലാക്കോമോർ: കടലിൽ വസിക്കുന്നു; ഒരാപ്പാളിയുള്ള കവചം; വൃക്കകൾ, ഗില്ലുകൾ, മാംസപേശികൾ എന്നിവയിൽ ഖണ്ഡനം കാണാം.

ക്ലാസ് ii. അംഫിനൂറ: കടലിൽ വസിക്കുന്നു. തല ചുരുങ്ങിയത്, കണ്ണുകളും ഗ്രാഹികളും ഇല്ല. നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ ഗാംഗ്ലിയോൺകളില്ല.

ക്ലാസ് iii. ഗാസ്ത്രോപോഡ (ചെങ്കൾ): കടലിലും ശുദ്ധജലത്തിലും കരയിലും വസിക്കുന്നു. അന്താവയവമുഴു സാധാരണയായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിരിയലും (torsion) പിരിഅഴിയലും വിവിധ ദശകളിൽ പ്രകടമാണ്. തലയിൽ കണ്ണുകളും ഗ്രാഹികളും കാണാം.


ക്ലാസ് iv. സ്കാഫോപോഡ (കൊമ്പുകക്കൾ): കടലിൽ വസിക്കുന്നു. കഴൽ പോലെയുള്ള കവചം, രണ്ടുവശത്തും തുറന്നത്, പാദം കഴിക്കുവാനുള്ള അവയവം.

ക്ലാസ് v. പെലിസിപോഡ (കക്ക, എരുന്ത്): മിക്കവാറും കടലിൽ; ഇരുവശങ്ങളും പരന്നത്, പാളികൾ മുകളിൽ വിജാഗിരി കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഘടിപ്പിച്ചത്, തല അൽപവർധിതം, നാവുപോലുള്ള പാദം കഴിക്കുവാൻപയോഗിക്കുന്നു, രേതിജിഹ്വ ഇല്ല. ഗില്ലുകൾ ഭക്ഷണം തേടുവാനുള്ള ഉപകരണം കൂടി ആണ്.

ക്ലാസ് vi. സെഫലോപോഡ (കണവ, തിരാച്ചി): കടലിൽ വസിക്കുന്നു; തലയിൽ ഗ്രാഹികളുണ്ട്, പാദം ഗ്രാഹികളായും ഫണലായും മാറിയിരിക്കുന്നു; കവചം ദേഹത്തിന് പുറമെ അറകളോടുകൂടിയതോ, ചുരുങ്ങിയ ദേഹത്തിനകത്തു മാത്രമുള്ളതോ ആവാം; നാഡീവ്യൂഹം നല്ലപോലെ വികസിച്ചത്; തണുത്താശ്മികൊണ്ടുള്ള ആന്തരാശ്മിയുണ്ട്.

മോണോപ്ലാക്കോഫോം

ഇന്നു കാണുന്ന പ്രധാന മൊളസ്കുകൾക്കൊന്നും ഖണ്ഡനത്തിന്റെയോ ദ്വിപാർശ്വസമമിതിയുടെയോ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ




ചിത്രം 94. മോണോപ്ലാക്കോഫോം.

1. രേതിജിഹ്വ 2. ലാലാഗ്രന്ഥി 3. ഹേതഗ്രന്ഥി 4. കവചം.
5. ജനനേന്ദ്രിയഗ്രന്ഥി 6. ഹൃദയം. 7. ട്രൈഡിയം 8. വൃതിഗന്ധരം. 9. പാദം

മൊളസ്കുകൾ ഞാഞ്ഞൂലുകളുമായി ബന്ധമുള്ളവയാണെന്നും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. വളരെക്കാലം മുമ്പു തന്നെ സൈലൂറിയൻ (44 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്) പാറകളിൽ കണ്ട പൈലീന എന്ന ഫോസിൽ ആദിമമൊളസ്കുയോടു് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണെന്നും കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ കവചത്തിന്റെ അരികിലായി ഒരു നിറ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവ നിറയായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന മാംസപേശികളുടെതാണെന്നും കരുതപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിക്കുവാനോ ഇതിന്റെ ആന്തരാവയവങ്ങളെ കുറിച്ചു് മനസ്സിലാക്കുവാനോ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു ഡച്ച് സമുദ്രപഠനക്കപ്പൽ സമുദ്രഗർഭത്തിൽ നിന്നും പൈലീനയുടെ ആധുനിക അനന്തരാഗാമിയെ കണ്ടെടുത്തതോടെ ആദിമമൊളസ്കിനെ പറ്റി പലതും പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉദാ: നിയോപൈലീന—ഇത് ജീവിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോസിലാണെന്നും പറയാം.

ഇതിന്റെ കവചം ചെറിയതും ഏതാണ്ടു് അൺഡാക്രയിയലോ വട്ടത്തിലോ നട്ടവിൽ ഒരു കോണിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ശിഖരത്തോടു കൂടിയതോ ആണു്. ഫോസിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ ഇതിന്റെ മാംസപേശികൾ അഞ്ചു കാമ്പങ്ങളുള്ള നിറയായി ക്രമീകരിച്ചതായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അഞ്ചു ജോഡി കഴലുകൾ വഴിയാണു് വൃക്കകൾക്കു പുറത്തേയ്ക്കു തുറന്നിരുന്നതു്. ശകലങ്ങളും അഞ്ചു ജോഡിയാണു്. രക്തക്കുഴലുകളും അഞ്ചു നിറയായ ഒരു ക്രമീകരണമാണു് കാണിക്കുന്നതു്. തീർച്ചയായും ഈ ജന്തു മൊളസ്കുയുടെ വളരെ പുരാതനമായ ഘടനയാണു് കാണിക്കുന്നതു്.





ചിത്രം 95. പോളിപ്പാക്കോഫോ

1. രേതിജിഫ. 2. ലാലാഗ്രന്ഥി 3. ഹെന്റനാമികൾ
4. ജനനേന്ദ്രിയം. 5. വൃക്കകൾ 6. ഹൃദയം. 7. ദന്തിഡിയം
8. പാദം.

ആഫിനപ്പാ

ആദിമഘടനയുടെ പല ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമായിരിക്കുന്ന ഒരു മൊളസ്ക വർഗമാണ് ഇത്. കൈറോണകൾ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടക്കക്കളാണിതിലെ അംഗങ്ങൾ. തല നന്നെ ചെറുതാണ്. കണ്ണും ഗ്രാഹികളും ഇല്ല. ബാഹ്യക വചം ആദിമമൊളസ്കിന്റെതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. മേൽക്കുമേലായി (overlapping) എട്ടു തട്ടുകളാണ് കവചത്തിനുള്ളത്. ഇതുവിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും വൃതിയുടെ അരികിന്നു കീഴിലുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ ചാലാണ് വൃതിഗ ഫപരം. ഈ ചാലിലേക്ക് നിരവധി ഗില്ലുകൾ ഉതിനിൽക്കുന്നു. തലച്ചരങ്ങിയതിനാൽ നാഡിവ്യൂഹവും വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ്. അതായത് വ്യക്തമായ ഗാംഗ്ലിയോണുകളില്ല. അന്നാളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള നാഡിവളയത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു ജോഡി നാഡികൾ വെറുതെ പുറകിലേക്കു പോകുന്നു. ആന്തരവയവചരട്ടുകൾ പുറകിൽ അന്യോന്യം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. ആദിമമൊളസ്കിലെ വൃക്കകനാളങ്ങൾ ഇതിൽ സങ്കീർണ്ണതയാർജിച്ച വൃക്കകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.




ചിത്രം 96. കൈറോൺ. (a) അപാക്ഷവീക്ഷണം (b) അഭ്യക്ഷവീക്ഷണം

1. വായ 2. ഗില്ലുകൾ. 3. പാദം. 4. ഗുരം

കൈറോണകൾ ആഴം കുറഞ്ഞ കടലിൽ പാറകളോടൊട്ടിപ്പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്നതു കാണാം. തൊട്ടാൽ ഇവ തോട്ടായ പോലെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്കാഫോപോഡ

മൊളസ്കയുടെ ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ് കൊമ്പൻകക്കുകൾ അഥവാ ടസ്കുഷ്യൂലകൾ. ആനക്കൊമ്പു പോലെ ഒരറ്റത്തേക്ക് കൂർത്തുവരുന്ന കഴലു പോലുള്ളതാണ് കൊമ്പൻകക്കയുടെ ആകൃതി. കവചത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗം വട്ടം



ചിത്രം 97. സുകാമോപോഡ.

1. പരിഗ്രാഹഗ്രാഹികൾ. 2. ജനതേന്ദ്രിയഗ്രന്ഥി. 3. വൃക്ക
കം 4. ദഹനഗ്രന്ഥി. 5. ഹൃദയം. 6. പാദം



കൂടിയതാണ്. ഇതിൽകൂടി കോണാകൃതിയിലുള്ള പാദം പുറത്തു വരുന്നു. ആ ദിമമൊളസ്കിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇത് കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു പകരണമാണ്. അദ്വൈതഭാഗത്തു നിന്നു തന്നെ തുമ്പിക്കെ പോലുള്ള തലയും പുറത്തേക്കു നീളുന്നതു കാണാം. ഇതിനോടു ചേർന്നിട്ട് ധാരാളം പരിഗ്രാഹഗ്രാഹികൾ

ഉണ്ട്. വൃതിഗഹപരം ജന്തുവിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റോ അറ്റം വരെ ചാലുപോലെ കിടക്കുന്നു. കവചത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ട്. വെള്ളം സദാസമയവും വൃതിഗഹപരത്തിലേക്ക് അഭ്യക്ഷഭാഗത്തു-നിന്നും കയറി അപാക്ഷഭാഗത്തിലെ ദ്വാരം വഴി പുറത്തേയ്ക്കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജന്തു മണ്ണിൽ പുണ്ടാണം ജീവിക്കുന്നത്.

ഗാസ്ട്രോപോഡ

മൊളസ്കയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മിക്ക ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിലും കാണാം. രക്ഷയ്ക്കായുള്ള കവചം, വൃതി (mantle), വലിയ മാംസളമായ പാദം, മുതുകിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അന്തരാവയവപിണ്ഡം, രേതിജീഹവ എന്നിവയെല്ലാം ഇവയ്ക്കുണ്ട് ആദിമമൊളസ്കിനെപ്പോലെ ഇവയ്ക്കും. കണ്ണുകളും സ്പർശകഗ്രാഹികളുമുള്ള വളർച്ച പ്രാപിച്ചൊരു തലയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റൊല്ലാ മൊളസ്കുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുണ്ട്: ഒരു അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ പിരിച്ചു വച്ചതു പോലെയാണു് കവചം. ഇതിനും പുറമെ അന്തരാവയവങ്ങളെ അസമമിതമായിട്ടാണു് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പിരിച്ചുവച്ച കവചം യാതൊരു അനുപാതവുമില്ലാതെ വളർച്ച പ്രാപിച്ച അന്തരാവയവപിണ്ഡത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റിയതാണു്. അന്തരാവയവങ്ങളും കവചവും നീണ്ട കോണിന്റെ ആകൃതിയിലായിരുന്നു കിൽ ജീവിയ്ക്കു് ഗമനത്തിനു തന്നെ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകുമായിരുന്നു.

നത്തയ്ക്ക, ഞെണിക്ക എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന പൈല (pila)യുടെ ഘടനാശാരിരം (anatomy) പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വർഗത്തിന്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും പഠിക്കാം. വൃതിഗഹപരത്തിനകത്തു് ഒരൊറ്റ ശകലം (ctenidium) മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇതു് നീണ്ട അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ അടുപ്പിച്ചു് നിരത്തിയതു പോലെയാരിക്കും. വൃതിഗഹപരത്തിന്റെ അരികിൽ ടെനീഡിയത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ രണ്ടു സുഷിരങ്ങൾ കാണാം. ഇതിലൊന്നു് ഗുദവും മറ്റൊതു് വൃക്കദ്വാരവുമാണു്. വൃക്കകൾ മറ്റു മൊളസ്കുകളിലെപ്പോലെ രണ്ടില്ല; ഒന്നേയുള്ളൂ. വൃതിഗഹപരത്തിനകത്തു് നീണ്ട ഒരു പിളർപ്പു് കാണാം. ഇതു് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ദ്വാരമാണു്. മേൽപ്പറഞ്ഞതു് എല്ലാ ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിലും കാണുകയില്ല. അതു് ഉഭയജീവിതം നയിക്കുവാൻ പൈല പോലെയുള്ളവയുടെ ഒരു അനുവർത്തനമാണു്. ശ്വാസകോശവും ടെനീഡിയവും ഉള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ പരിസഞ്ചാര വ്യൂഹം (circulatory system) സങ്കീർണമാണു്. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ടെനീഡിയവും കരയ്ക്കു കയറുമ്പോഴും വെള്ളം വാറ്റുമ്പോഴും (വയലുകളിലും കളങ്ങളിലുമാണിവയെ കാണുക) ശ്വാസകോശവുമാണു് ശ്വാസനത്തിനുപയോഗിക്കുന്നതു്. നാഡീവ്യൂഹവും സാമാന്യം വളർച്ച പ്രാപിച്ചതാണു്. മുഖിൽ തലച്ഛാരിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രണ്ടു ഗാംഗ്ലിയോണുകളുണ്ടു്. കൂടാതെ പാദഗാംഗ്ലിയോണുകൾ (pedal ganglia), പാർശ്വ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ (pleural ganglia) എന്നിവ വേറെയുമുണ്ടു്. ഇവ രണ്ടു വിതമുണ്ടു്. ഈ ഗാംഗ്ലിയോണുകളെല്ലാം നാഡീസൂത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു് അന്യോന്യം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ രാസ




ചിത്രം 98. ഞാൻ. A. മുട്ടുജീവി. B. പെർകലം, ബാഹ്യവീക്ഷണം. C. പെർകലം, അന്തർവീക്ഷണം.


1. ശിഖരം 2. സന്ധിരേഖ. 3. വാറിക്സ് 4. ദേഹ വരകൾ. 5. പെർകലം. 6. അങ്കം ചുണ്ട്. 7. പുറം ചുണ്ട്. 8. അമ്പിലിക്കസ്.

സംവേദകാവയവമായി ഒസഫ്രാഡിയം (osphradium) എന്നൊരു ബോധേന്ദ്രിയമുണ്ട്. നത്തത്തിൽ ആണം, പെണ്ണും വെമ്പുരായാണ്. ശിശുനമെന്നൊ

വയവമുള്ളതിനാൽ ആണിനെ ബാഹ്യമായിത്തന്നെ തിരിച്ചറിയാം. നത്തക്കയുടെ വികസനദശകളിൽ ലാർവയില്ല. മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ കഞ്ഞിൻ പ്രൗഢദശയുടെ ആകൃതി തന്നെയായിരിക്കും.



ചിത്രം 99. ചെപ്പ്: ശിരസ്സും പാദവും വെളിയിലാക്കി നിങ്ങളനത്ത്.




ചിത്രം 100. ചെപ്പ്: ആന്തരാവയവങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ വിലങ്ങനെ മുറിച്ചത്.

1. രേതിജിഹ്വ. 3. ലാലാഗ്രന്ഥി. 3. സ്ത്രീഗന്ധപരം. 4. ടെനിഡിയം. 5. തോട്. 6. ഹൃദയം. 7. ജനനേന്ദ്രിയഗ്രന്ഥി. 9. ആമാശയം. 10. വൃക്കകം. 11. പാദം.

മിക്ക ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിലും രണ്ടു ലാർവദശകളുണ്ട്. ട്രോക്കോഫോർ ലാർവ വെലിജർലാർവയായി വളരുന്നു. വെലിജറിന് വീലം അല്ലെങ്കിൽ വിതാനം എന്ന ഒരു സിലിയാനിർമിതമായ അറപ്പുതൂണുണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ലാർവ നീന്തുന്നത്. അടുക്കുഭാഗത്തു വായ്ക്കും ഗുദത്തിനുമിടയിലായി പാദം

വളരുന്നു. തൽസമയം മുതുകുവശത്തു് ക്രമാതീതമായ വളർച്ച മൂലം ആന്തരാവയവ മൂഴ മുകളിലേക്കു പൊങ്ങും. ഈ വളർച്ച ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാകുന്നു. തന്മൂലം ആന്തരാവയവമൂഴയ്ക്കു് പിരിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെ തന്നെ ഫലമാണു് കവചത്തിന്റെ പിരിച്ചിലും. അതേസമയം അനുകല്പ്യ U എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലായിത്തീരുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ചതിൽ നിന്നു് വളരെ വ്യത്യസ്തവും സുപ്രധാനവുമായൊരു പ്രക്രിയയാണു് പിരിയൽ (torsion). ഗാസ്ട്രോപോഡുകളെല്ലാം പിരിച്ചിലുള്ളവയാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ഗാസ്ട്രോപോഡുകളുടെയും വംശചരിത്രത്തിലേപ്പോഴെങ്കിലും പിരിച്ചിൽ നടന്നിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക അസമമിത മാംസപേശിയുടെ സങ്കോചമാണിതിനു പ്രധാന കേതു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടു് സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി വെലിജറിയന്റെ ആന്തരാവയവമൂഴ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 180 ഡിഗ്രിയിൽ അപ്രദക്ഷിണ(counter clockwise) മായി തിരിയുന്നു. പിരിച്ചിലിന്റെ ഫലമായിട്ടാണു് വൃതിഗഹപരം മുൻഭാഗത്തു്, തലയുടെ മിതയായി വരുന്നതു്. ടെനിഡിയങ്ങളും ഗുദവും വൃക്കകളുടെ സുഷിരങ്ങളും ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ സുഷിരവുമെല്ലാം ഇതോടെ മുൻവശത്താകുന്നു. U-പോലെയുള്ള അനുകല്പ്യ വ




ചിത്രം 101. ചില ഗാസ്ട്രോപോഡുകൾ.

1. ഹാലിയോട്ടസ്. 2. ഫിഷറേല്ല. 3. പാററല്ല.
4. എമാർജിനല.

ഉയരായിത്തീരുന്നു. ഏതും നേരെ തിരിഞ്ഞ് മേലുകൾ മുനിലും കീഴുകൾ പിറകിലുമായി വർത്തിക്കുന്നു. ആന്തരാവയവനാഡി പിരിഞ്ഞ് 8 ന്റെ ആകൃതി പ്രാപിക്കുന്നു.

പിരിച്ചിലിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഒരേ മാതിരിയല്ല നടന്നിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ പല പരിണാമഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള ഗാസ്ട്രോപോഡുകളെ കാണാം. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ഒച്ചുകളിൽ ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ അസമമിതി അധികം വികസിച്ചിട്ടില്ല. ഇവയിൽ പിരിച്ചിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക ആന്തരാവയവങ്ങളും ഇരട്ടയായിട്ടു തന്നെയുണ്ട്. ഇതിനുദാഹരണമാണ് കവചത്തിൽ ധാരാളം സുഷിരങ്ങളുള്ള ഹാലിയോട്ടസും തുറന്ന വർണക്കടയുടെ ആകൃതിയോടു കൂടിയ ഫിഷറേല്ലയും. ഇതിന്റെ കവചത്തിന്റെ മുകളിലൊരു ദ്വാരമുണ്ട്. മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഇടതുവശത്തെ അവയവങ്ങളൊന്നും വളരുകയില്ല. പെരിവിക്ലിക്സ്കൾ, വെൽക്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽപ്പെട്ടവയാണ്. പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കവചത്തോടു കൂടിയ ട്രോക്കസ്സിനെ കടൽപ്പുറത്തു സാധാരണ കാണാം. കോണസ് എന്ന സാങ്കേതികനാമത്താൽ




ചിത്രം 102. രണ്ടു ഗാസ്ട്രോപോഡുകൾ കൂടി.

1. ട്രോക്കസ്. 2. ക്സാങ്കസ് (ശംഖ്)

അറിയപ്പെടുന്ന കവിടികളും ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റു ചില ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിൽ കവചം നേർത്തും ചെറിയതുമായകയോ, തിരെ അപ്രത്യക്ഷമായകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പല ദശകളിൽ പിരിഞ്ഞയ്ക്കൽ (detorsion) നടന്നിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി ആന്തരാവയവങ്ങൾ പാർശ്വത്തിലേക്കോ വീണ്ടും പുറകിലേക്കോ തിരിച്ചുപോയിരിക്കും.

കാട്ടയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിൽപ്പെട്ടവയാണ് കവചം മിക്കവാറുമോ തിരെയോ അപ്രത്യക്ഷമായ ന്യൂഡിബ്രാങ്കുകൾ. ന്യൂഡിബ്രാങ്കുകളെ കടലിലെ പ്ലവജിവിസമൂഹത്തിലാണ് മുഖ്യമായി കാണുന്നത്.

ഗാസ്ട്രോപോഡുകളിൽ കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവയായി പരിണമിച്ചവയുണ്ട്. കരച്ചുകളിൽ ടെനിഡിയങ്ങൾക്ക് പകരം ശ്വാസകോശമാണുള്ളത്.



ചിത്രം 103. സവിശേഷ ഗാസ്ട്രോപോഡുകൾ.

1. ഇയോളിസ് (ന്യൂഡിബ്രാൻക്) 2. ഐസിസ് (പ്ലവകമൊളസ്ക്)


പെലിസിപോഡ

ഇവ സ്ഥിരജീവിതം നയിച്ച് അരിപ്പഭക്ഷണം (filter feeding) നേടുവാൻ ആവർത്തനങ്ങളുള്ള മൊളസ്കുകളാണ്. ആദിമൊളസ്കിന്റെ ദേഹം വൃത്തിയിൽ പാർശ്വമായി സമർപ്പിതമായിരിക്കുകയാണ്. തല നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗില്ലുകളാണെങ്കിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഭക്ഷണം അറിക്കുന്ന അവയവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം അവ ശ്വാസനേന്ദ്രിയമായും ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്.

എരുന്തിന്റെ ശരീരഘടന നോക്കിയാൽ പെലിസിപ്പോഡയുടെ ഘടനയെ പറ്റി സാമാന്യം പരിജ്ഞാനം കിട്ടും. എരുന്തിനെ (കക്കെരുത്ത്, കക്ക) കളത്തിലും തോട്ടിലും മാറ്റം പൂഴിയിലോ ചളിയിലോ പൂണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. കവചത്തിന് രണ്ടു പരന്ന പാളികളുണ്ട്. ഈ പാളികളുടെ ഒരു ഭാഗം വിതി കൂടിയതും മറ്റൊരു ഭാഗം വിതി കുറഞ്ഞതുമാണ്. വിതി കൂടിയ ഭാഗം മുമ്പോട്ടു നിങ്ങളുന്നതിനാൽ മുൻഭാഗം ആയി കരുതപ്പെടുന്നു. പാളികൾ വിജാഗിരി കൊണ്ടെന്നപോലെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാളികളിൽ മുഴുപോലെ കാണുന്ന ഭാഗം കവചത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ഭാഗമാണ്. കവചത്തിലുള്ള ഒരു മധ്യരേഖയിൽ നിന്നു തുക്കിയിട്ടതു പോലെ ആന്തരാവയവപിണ്ഡം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

യൂന. അഭ്യക്ഷഭാഗത്തു് ഇതിനോടു് തുടർച്ചയായി പാദം കാണാം. കലപ്പ കൊഴുവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇതിനെ പുറത്തേക്കു നീട്ടുവാനും അകത്തേക്കു വലിക്കുവാനും കഴിയും. ഇതിനും കവചത്തിന്റെ പാളികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും വിടർത്തുവാനും പ്രത്യേകം മാംസപേശികളുണ്ടു്. വൃതികൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്തു് വൃതികൾ രണ്ടും കൂടി വെള്ളം അകത്തേക്കു വരുവാൻ ഒരു വായുചാലും (inhalant siphon) പുറത്തേക്കു പോകുവാൻ ഒരു പോഷചാലും (exhalant siphon) നിർമ്മിക്കുന്നു. രണ്ടു ജോഡി ഗില്ലുകൾ ദേഹത്തിന്റെ ഇടതും വലതും വശങ്ങളിലായി തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

വിതി കൂടിയ ഭാഗത്തു് രണ്ടു് അധാസപർശകങ്ങൾ (labial palps) കിടയിലാണു് വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ഗില്ലുകളിലെ സിലികളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി വരവുചാലിൽ കൂടി ഭക്ഷണവും കൊണ്ടു് വെള്ളം അകത്തേക്കു വരുന്നു. ശക്തങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മ (mucus)ത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം (ചെറു ജീവികളും മറ്റും) അധാസപർശികൾ വഴി വായിലെത്തുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികൾ തേജിജീവിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അനുകല്യ ഹൃദയാവാണുഹൃദയിൽ കൂടി കടന്നു് ആന്തരാവയവവിണ്ഡത്തിൽ ചുറ്റി വളഞ്ഞു് അവസാനം പോഷചാലിലേക്കു തുറക്കുന്നു.




ചിത്രം 104. പെലിസിപോഡ.

- A മുഴുജീവി. B ആന്തരഘടന 1. സൈഫൻ. 2. സെറിയം. 3. വൃക്കകൾ. 4. ജനനേന്ദ്രിയം. 5. പാദം. 6. ആമാശയം 7. ദഹനഗ്രന്ഥി. 8. ഹൃദയം.

തലയില്ലാത്തതിനാൽ ആ ഭാഗത്തെ നാഡിവൃഹവും ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഗളത്തിനെ ചുറ്റിയുള്ള നാഡിവലയത്തിൽ കൂടി യോജിച്ച മസ്തിഷ്കപ്പാർശ്വ

ഗാംഗ്ലിയോണുകളുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നാഡീതന്തുക്കൾ പാദത്തിലുള്ള ഗാംഗ്ലിയോൺ, ആന്തരാവയവ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരജീവിയായതിനാൽ ബോധേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. വൃക്കകൾ ഹൃദയത്തിനടിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബൊജാനസ്സിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ചെറുകുടലിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കിഴായിൽ (ventricle) നിന്നും ധമനികൾ വഴി രക്തം (ഇതിനു നിറമില്ല) ദേഹത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള കോട്ര(sinus)ങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെ നിന്നും സിരകൾ വഴി വൃക്കകളും ഗില്ലുകളും കടന്ന് രക്തം മടങ്ങി ഹൃദയത്തിലെത്തും.

ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ പ്രത്യേക ആകൃതിയുമൊന്നുമില്ലാതെ ചെറുകുടലിന്റെ വലയങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നു. എന്തതിൽ അണ്ഡങ്ങൾ ഗില്ലുകൾക്കിടയിൽ വിഭാചിതമാവുന്നു. വാവുചാൽ വഴി ഷൽജലം ജന്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കൂടി വരുന്ന പുറംബീജങ്ങൾ സേകം ന



1



2



ചിത്രം 105.

രണ്ടു പെലിസിപോഡുകൾ. 1.പച്ചപ്പി (കല്ലിന്മേൽ കായ) 2. പെക്ടൻ.

ടത്തുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലോക്കിഡിയം ലാർവ എന്ന വളരെയേറെ മാറ്റംവന്ന പെലിജർ ആണ്. ഇവയ്ക്ക് ശുക്ലങ്ങളുള്ള രണ്ടു പാളി കവചങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി ബൈസസ്സ് ചരട് പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നതു കാണാം. പുറംചാലിൽ കൂടി ഇവ പുറത്തു വരുന്നു. താമസിയാതെ മൽസ്യങ്ങളുടെ ഗില്ലിലോ ചിറകിലോ ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഇവ മരിക്കും. മത്സ്യത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ കറച്ച കാലത്തേയ്ക്കിവ പരജീവി(parasite)ആയി കഴിയും. വളർച്ച പ്രാപിച്ചശേഷം മൽസ്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് താഴെ വീണ് അത് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നു.

കക്കുകൾ മിക്കവാറും സ്ഥിരജീവികളാണ്. പെക്ടൻ എന്ന കക്കയ്ക്ക് കവചത്തിന്റെ പാളികൾ അടച്ചും തുറന്നും നിറുവാൻ കഴിയും. കല്ലിന്മേൽ കായ (മൈറ്റാലസ്) കല്ലിന്മേൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്നു. പാദത്തിന്മേൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബലമുള്ള ബൈസസ്സ് നാരുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണിവ കല്ലിലും പാറകളിലും ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിയിരിക്കുന്നത്. മുത അല്ലെങ്കിൽ തിൻചിപ്പി മറ്റൊരു പെലിസിപോഡാണ്. മുതവിന്റെ ഒരു കവചപ്പാളി പാറയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും. മറ്റൊരു പാളി ഒരുപ്പു പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുത്ത

ച്ചിപ്പിയും ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ്. വളർച്ചശേഷിയിൽ വല്ല മണൽതറിയോ മറ്റോ വൃത്തിയിൽ പെട്ടാൽ മുത്തച്ചിപ്പി അതിനു ചുറ്റും ഒരു തരം ചുണ്ണാമ്പു



ചിത്രം 106. സെഫലോപോഡ.

1. കണവ. 2. നിരാളി.

രസം സ്രവിക്കുന്നു. ഈ ചുണ്ണാമ്പ്, കട്ടപിടിച്ചാണ് മുത്തായി മാറുന്നത്. മിക്ക പെലിസിപോഡുകളും വളരെ വലുപ്പമുള്ളവയല്ലെങ്കിലും ട്രൈഡാക്നസ്സ് ഉദ്ദേശം 2 മീറ്റർ വീതിയുണ്ട്. ഇതിനുകാൽ 5൯ തൂക്കവുമുണ്ടാകാം. എന്ത്, തീർച്ചിപ്പി, കല്ലിൻമേൽ കായ മുതലായവയെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. “കപ്പൽപ്പുഴ” എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ടെറഡോജെട്ടി, തോണി മുതലായവയിൽ തുളച്ചു കയറി വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നു.

സെഫലോപോഡുകൾ


ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ശരീരഘടനയുള്ള മൊളസ്കകളാണ് നോട്ടിലസ്, കണവ, നിരാളി എന്നിവ അടങ്ങിയ സെഫലോപോഡുകൾ. ശിരോപാദി എന്നർത്ഥമുള്ള ഈ പേരു വരുവാൻ കാരണം അവയുടെ ‘പാദം’ അനേകം ശാഖകളായി മുറിഞ്ഞ് തലയ്ക്കു ചുറ്റും നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത്യധികം പരിണാമോന്നതി കൈവരിച്ച അകശേതകികൾ ആണ് ഇവയെന്നു പറയാം.

പൂർവികഘടനയിൽ നിന്ന് ഇവയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കളിലെപ്പോലെ ഇവയുടെ ആന്തരാവയവമുഴയും മുകളിലേക്കു വലുതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയിൽ രണ്ടു വശങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലാണ് വളർന്നത്, അല്ലാതെ

അസമമിതമായിട്ടല്ല. തൽഫലമായി ഇവയുടെ ദേഹം പരന്നതും പിരിഞ്ഞതുമായിത്തീർന്നു. ദേഹമുൾക്കൊള്ളുന്ന കവചമാകട്ടെ ദേഹം വളരുന്നതോടെ തുടർച്ചയായി വലുതാകുന്ന അറകളായി മുറിക്കപ്പെട്ടു. ഇതു വഴി ആദ്യകാല സെഫലോപോഡുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്ലവനക്ഷമത കിട്ടുകയും നിന്തിനടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയും ചെയ്തു. ഈ പുതിയ ജീവിതരീതിയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി പാദം മാംസളമായ ഗ്രാഹികളായി മാറി. ഇതോടെ ഇവ ഓടിനടന്നു. ഇരപിടിക്കുന്ന മാംസളങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു. സെഫലോപോഡയുടെ പരിണാമത്തിലെ ഈ ആദ്യദശയാണ് 'നോട്ടിലസ്' കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചില സെഫലോപോഡുകളിൽ കവചം ചെറുതാവുകയും മറ്റു ചിലവയിൽ തീരെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. ഈ പരിണാമപ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായുണ്ടാവുകയാണ് ഇന്നത്തെ കണവകളും നിരാളികളും.

ആദ്യം കറഞ്ഞ കടലിലാണ് കണവയെ സാധാരണ കാണുക. കക്കൾ, ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം. ദേഹം പരന്നു കോർപ്പി ഡോവിന്റെ ആകൃതിയിലിരിക്കും. ഇരുവശത്തും മാംസളമായ ചിരകൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും മുമ്പിലായി, ഇരുവശത്തും ഗ്രാഹികൾ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ തലയാണുള്ളത്. ഗ്രാഹികളിൽ കണ്ണുകൾ കാണാം. കണവയ്ക്ക് പത്തു ഗ്രാഹികളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ജോഡി മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് നീളം കൂടിയതും അഗ്രത്തിൽ മാത്രം ശ്ലേഷണികളുള്ളവയുമാണ്. വേണ്ടി വന്നാൽ ഇവയെ ചുരുട്ടി വൃതിഗഹപരത്തിനകത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയും. മറ്റു ഗ്രാഹികളെല്ലാം നീളം കറഞ്ഞവയും ഒരു വശം മുഴുവൻ കപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ശ്ലേഷണികൾ നിറഞ്ഞവയുമാണ്. ഇവയുടെ മധ്യത്തിലാണ് വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വായക്കകത്തു തന്തയുടെ കൊക്കിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള "താടികൾ" ഇറയെ കണ്ണുകളായി മുറിച്ചെടുക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നു. ഗ്രാഹികൾ ഇറയെ വായയുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു രേതിജിഹ്വ ഉണ്ടെങ്കിലും വലുതായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. U-ന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള അനുകല്പയിൽ ആമാശയവും അതിനോടു ബന്ധമുള്ള വലിയൊരു ദഹനഗ്രന്ഥിയുമുണ്ട്. ഗുദം വൃതിഗഹപരത്തിലേക്കു തുറക്കുന്നു. ഒരു മഷിസഞ്ചിയും ഗുദം വഴി വൃതിഗഹപരത്തിലേക്കു തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഷി പുറത്തേയ്ക്കു വിസർജിച്ചു കണവയ്ക്ക് ശത്രുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും.

കണികയിൽ ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും മാംസളമായ വൃതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ചുവടെ മാത്രമാണ് വൃതിഗഹപരം. മുകളിൽ വൃതിയുടെ കീഴിൽ കവചത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം (കടൽ നാക്ക്-cuttle bone)കാണാം. കണവയിൽ ഇത് ദന്തനിർമ്മിതവും (horny) ഇലപോലെ പരന്നതുമാണ്. ദന്തവശത്തു കോളർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗികമായി സ്വതന്ത്രമായ റെയവയുമുണ്ട്. ഇത് അഭ്യക്ഷഭാഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണലിനോടു കൂടിച്ചേരും. ഫണലിനകത്തെ ചാലു വൃതിഗഹപരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ വെള്ളം കോളറിന്റെയും ഫണലിന്റെയും ഇടയിൽ കൂടി അകത്തേയ്ക്കും



ചിത്രം 107. കണവ-ആന്തരഘടന.

1. ജനനേന്ദ്രിയഗ്രന്ഥി. 2. ഹൃദയം.
3. ആമാശയം. 4. ദഹനഗ്രന്ഥി.
5. ലാലാഗ്രന്ഥി. 6. രേതിജിഹ്വ.
7. വൃക്കകം 8. ടെനിഡിയം.

ന പുറമെ ഗില്ലുകളുടെ അടിയിൽ "ഗിൽഹൃദയങ്ങൾ" ഉണ്ട്. ഇവ രക്തം കൂട്ടൽ ശക്തിയായി ഗില്ലുകളിൽ കൂടി ഒഴുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അന്തരാവയവ പീണ്ഡത്തിന്റെ പുറകു വശത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദേഹഗുഹ വളരെ വിസ്തൃ

പുറത്തേയ്ക്കും പോകാം. പക്ഷേ പെട്ടെന്നു വൃതിമാംസപേശികൾ സങ്കോചിച്ചാൽ കോളർ ഫണലി നോടമർന്നു ചേരുകയും വൃതിഗഹപരത്തിലെ വെള്ളം ജെററു പോലെ ഫണലിൽക്കൂടി പുറത്തേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്തു കണവ വളരെ വേഗത്തിൽ പുറകിലേയ്ക്കു തെറിച്ച് നീങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കണവ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നു ഓടി രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത്. ഫണൽ പലവശത്തേയ്ക്കും തിരിച്ച് ഇതിന്നു നിന്തലിന്റെ ഗതി മാറുവാൻ കഴിയും.

വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ച നാഡീവ്യൂഹം സെഫലോപോഡുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അനവധി ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്നു അന്നനാളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തലച്ചോറുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതു ഒരു നാഡീവലയത്തിന്റെ മുകൾവശമാണ്. ഈ വലയത്തിൽ നിന്നു വിപുലമായ തോതിൽ നാഡികൾ ദേഹത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ജന്തുലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ നാഡീതന്തുക്കൾ ഇവയ്ക്കാണ്. കണ്ണുകളാണെങ്കിൽ കശേരുദേഹികളുടേതു പോലെ സങ്കീർണ്ണമാണ്. തുവൽ പോലുള്ള രണ്ടു ഗില്ലുകൾ വൃതിഗഹപരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മറ്റു മൊളസ്കുകളെപ്പോലെ പരിസഞ്ചാരണവ്യൂഹം തുറന്നതല്ല. രക്തം ഒരിക്കലും കഴലുകൾക്കു പുറത്തേക്കു പോകുന്നില്ല. ഹൃദയത്തി

രമ്യമാണ്. ഇതിൽ ഒരേയൊരു ലൈംഗികാവയവവും ഒരു ജോഡി വൃക്കകളാണുള്ളത്. ഇവ വെമ്പുവെ നാളികർ വഴിയാണ് വൃതിഗർഭപരത്തിലേക്കു തുറക്കുന്നത്. ആണ്ഡം പെണ്ണും കണവകൾ വെമ്പുവെയാണ്. വികാസഘട്ടങ്ങളിൽ ലാർവദശയില്ല. സിക്താണുങ്ങൾ ബീജസഞ്ചികളിലാണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന കഞ്ഞുങ്ങൾ മുതിർന്ന കണവകളെപ്പോലെ തന്നെയിരിക്കും. കണവകൾ പൊതുവെ വലുപ്പമുള്ളവയല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പീപ്പിസിനു ഏകാണ്ടു 20 മീറ്ററോളം നീളം (ഗ്രാഹികളുൾപ്പെടെ) വരും.

നീരാളി (ചിത്രം 106 നോക്കുക) കണവയെപ്പോലെ നീന്തിനടക്കുന്നവയല്ല. ഇത് ഒരുതരം അർധസ്ഥിതജീവിയാണ്. കടലിനടിയിലാണ് ഇവ താമസിക്കുന്നത്. ഗ്രാഹികൾ എട്ടേയുള്ളൂ. ഏതാണ്ടു ഉരുങ്ങോ ചാക്കുപോലെയോ ആണ് ദേഹത്തിന്റെ ആകൃതി. കവചം തീരെ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. മിക്ക നീരാളികളും വളരെ ചെറിയവയാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പീപ്പിസിനു 10 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഗ്രാഹികളുണ്ട്.

ഫൈലം ആർത്രോപോഡ

ജന്തുലോകത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആർത്രോപോഡ. ജന്തുഫൈലങ്ങളിൽ സ്പീഷിസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതും ആർത്രോപോഡ തന്നെ. ഈ വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങളെ എങ്ങും കാണാം. കടലിലും ശുദ്ധജലാശയത്തിലും കരയിലും വായുവിലും മറ്റു ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ പരഭോജികളായും ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നു.

ഞെട്ട്, ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ചു്, പഴുതാര, തേട, പാറ, കൊതുക്, ഉറുമ്പ്, തേനീച്ച, ശലഭം, തേൾ, എട്ടുകാലി തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ പെടുന്നു. തന്നിമിത്തം മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതവുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജന്തുവിഭാഗമാണ് ആർത്രോപോഡ.

പ്രത്യേകതകൾ

അനലിയയെപ്പോലെ ഖണ്ഡിതശരീരമാണ് ആർത്രോപോഡയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഖണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം സമാനമല്ല. മുന്നറ്റത്തെ ഖണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തലയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഭൂണാവസ്ഥയിൽ തലഭാഗത്തു് ആരോഴ് ഖണ്ഡങ്ങൾ കാണാം. ക്രമേണ ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തലയ്ക്കു് വ്യക്തമായ രൂപം കൊടുക്കും. തലയ്ക്കു് പിറകിൽ ഉരസ്സും പിന്നെ ഉദരവും ആണുള്ളത്. ചിലവയിൽ ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിലെ ഖണ്ഡങ്ങളും ഒരുപോലിരിക്കുമെങ്കിലും മറ്റു ചിലവയിൽ അവ വ്യത്യസ്തമാണ്.

ശരീരത്തിന്നു കട്ടിയുള്ളൊരു പുറം ചട്ട, ബാഹ്യാസ്ഥി (exoskeleton) ഉണ്ടു്. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും മേൽഭാഗത്തും അടിവശത്തും കൈകാറിൽ കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായ, ഓരോ പ്ലോറൂണ്ടു്. ഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നിടത്തു് ഉടുവായ ചർമ്മാണുള്ളതു്. ഇങ്ങനെയുള്ള പുറം കവചം ഈ ഫൈലത്തിലെ ജീവികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്.

സാധാരണയായി ഓരോ ശരീരഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ജോഡി ഉപാംഗങ്ങൾ (appendages) ഉണ്ടായിരിക്കും. അവ ഖണ്ഡിതപാദങ്ങളാണ്. ഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ ചലിപ്പിക്കത്തവിധം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീര


ത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഖണ്ഡിതാവയവങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ രൂപാന്തരം വരിച്ചതു് കാണാം.

ആർത്രോപോഡയിൽ ശരീരഗഹവര (body cavity) ത്തിനു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടു്. അതു് സിലോമല്ല. രക്തം നിറഞ്ഞ ആർത്രോപോഡിന്റെ ശരീരഗഹവരത്തിനു ഹിമോസീൽ (haemocoel) എന്നാണു് പേർ. ശരീരക്കുള്ള സിലോം സങ്കോചിച്ച് വിസർജ്ജനരൂപങ്ങളാൽ, ഉത്പാദനരൂപങ്ങളാൽ എന്നിവയായി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലൊരിടത്തും സിലിയ (cilia) കാണുകയില്ലെന്നതും ആർത്രോപോഡയുടെ പ്രത്യേകതയാണു്.

ആർത്രോപോഡയെ അഞ്ചു വർഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.


1. ക്രസ്റ്റേഷ്യ
2. ഒളൈക്കോപോഡ
3. മിറിയാപോഡ
4. ഇൻസെക്ട
5. അരാക്നീഡ

ക്രസ്റ്റേഷ്യ: ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ചു്, ഞെങ്ങ് തുടങ്ങിയ അനവധി ജലജന്തു



ചിത്രം 108. കൊഞ്ചു് - ബാഹ്യഘടന.

- 1—6. ഉദരഖണ്ഡങ്ങൾ. 7. രോസ്ട്രം 8. കണ്ണ്. 9. ശിരോവക്ഷസ്സ് 10. ആന്തര്യൂർ 11. ആന്തരന 12. മാക്സില്ലീപീഡുകൾ 13. പെരൈപോഡുകൾ 14. പ്ലിയോപോഡുകൾ 15. യൂറോപോഡ് 16. ടെൽസൻ



ചിത്രം 109. കൊഞ്ചിന്റെ ശിരോവയവങ്ങൾ. A. ആൻറർ B. ആൻറർ C. മാൻഡിബൾ D. മാക്സില്ല E. മാക്സില്ല. 1. സ്റ്റാറോസിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം 2. പ്രോട്ടോപോഡൈറ്റ്. 3. ഫ്ലാജല്ലം 4. എൻറോപോഡൈറ്റ് 5. എക്സോപോഡൈറ്റ്, 6. വിസർജനക്ഷലിന്റെ ഭാഗം.

കൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. മിക്കവയും കടലിലാണ് വാസം. ചിലവ ശുദ്ധ ജലാശയത്തിലും ജീവിക്കുന്നു.

ഈ വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായ പുറംവയവും അനവധി ജോഡി കാലുകളും ഉണ്ട്. ഗില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശ്വാസനം നടത്തുക. പാദങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് മിക്കവയിലും ഈ ഗില്ലുകൾ കാണുക. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറംതള്ളുന്നതും ഗില്ലുകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന രക്തമാണ്.

തലയിൽ രണ്ടു ജോഡി സ്പർശികളും വായ്ക്കു ചുറ്റുമായി മൂന്നോ അതിലധികമോ ജോഡി അണുകളും ഇവയുണ്ട്. ശരീരത്തിലുള്ള കാലുകളുടെ എണ്ണം വിവിധ സ്പീഷീസുകളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയത് നാല് ജോഡികളെങ്കിലും കാണാം.

ഏവക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്രസ്റ്റേഷ്യനാണ് ചെമ്മീൻ. കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ പെനേയസ് എന്നും ശുദ്ധജലത്തിലെ ചെമ്മീൻ പെലിമോൺ എന്നുമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ പേര്. ചെമ്മീന്റെ തലയും ഉറപ്പും ഒറ്റ പുറംപട്ട കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ തലയും ഉറപ്പും ചേർന്ന ഭാഗത്തിന് ശിരോവക്ഷസ്സ് (cephalothorax) എന്ന പര്യയനം.

തല അഞ്ച് വണ്ഡങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. ഉരസ്സിൽ എട്ടു വണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശരീരഭാഗമായ ഉദരത്തിൽ ആറു വണ്ഡങ്ങൾ കാണാം. ഉദരത്തിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ത്രികോണരൂപത്തിലുള്ള പുച്ഛം (teslon) എന്നൊരു ഗുരുവുണ്ട്. 19 വണ്ഡങ്ങളിലും ഓരോ ജോഡി ഉപാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. തലയിൽ രണ്ടു ജോഡി സ്റ്റാർകളും ഒരു ജോഡി ഹനക്കളും (mandibles) രണ്ടു ജോഡി ചിബുകങ്ങളും (maxillae) ആണുള്ളത്. സ്റ്റാർകൾ സ്വർഗ്ഗനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഹനക്കളും ചിബുകങ്ങളും ഭക്ഷണം വായിലേക്കെത്തിക്കുന്നു.

ഉരസ്സിൽ (വക്ഷസ്സിൽ) എട്ടു ജോഡി ഉപാംഗങ്ങളുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ജോഡി ഹനപാദങ്ങൾ (maxillipedes) ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇവ ആഹാരസമ്പാദനത്തിനുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു ജോഡി കാലുകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ജോഡിയിൽ അറ്റം കൊടി (forceps) പോലെയായിരിക്കും. ഇവ ഇരപിടിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു.


ഉദരത്തിൽ ഓരോ വണ്ഡത്തിലും ഓരോ ജോഡി പാദങ്ങളുണ്ട്. തുടയുടെ മട്ടിലുള്ള ഈ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെമ്മീൻ നീന്തുന്നു. വക്ഷസ്സിലെ ഉപാംഗങ്ങളോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ശ്വാസനേന്ദ്രിയങ്ങളായ ഗില്ലകൾ കാണാം.

അനുകല്പ ശരീരത്തിലുടനീളം നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഇതിനു വരണഗോചരം അന്നാളും, ആമാശയം, കടൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അനുകല്പയോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥി ശിരോവക്ഷസ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രസങ്ങൾ ദീപനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ആസ്രവങ്ങൾ പിത്തനിരീനം കണയനിരീനം സമമായിരിക്കും. ആമാശയത്തിൽ കൈററിൻ കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായ പല്ലുകളുണ്ട്. ഇവ ഭക്ഷണം ചവച്ചുകൊണ്ട് ഉപകരിക്കുന്നു.


അനുകല്പക്കുപരിയായി ശിരോവക്ഷസ്സിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഹൃദയത്തിനു ഏകദേശം ത്രികോണാകൃതിയാണുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ വിവിധാവയവങ്ങൾക്കു രക്തം എത്തിക്കുന്നു. രക്തത്തിൽ ഹിമോസയാനിൻ എന്നൊരു പദാർത്ഥം അടങ്ങുന്നു. ഇത് പ്രാണവായു വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. രക്തം പ്രാണവായു വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സഹായത്താലാകുന്നു.

ശ്വാസനേന്ദ്രിയങ്ങളായ ഗില്ലകൾ വക്ഷസ്സിലെ ഉപാംഗങ്ങളിൽ നിന്നു വളരുന്ന തുവൽ രൂപത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ രക്തവാഹിനികൾ ധാരാളം കാണാം. വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഓക്സിജൻ സമൃദ്ധമായ ഈ രക്തവാഹിനികളിലെ രക്തം വലിച്ചെടുക്കുന്നു.

വിസർജനം നടത്തുന്ന അവയവങ്ങൾ സ്റ്റാർകളുടെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഡി ഹരിതഗ്രന്ഥികളാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥികൾ വിസർജന വസ്തുക്കളെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി പുറത്തു വിടുന്നു.




ചിത്രം 110. കൊഞ്ചിന്റെ വക്രോവയവങ്ങൾ
A- മെംസിലിപിഡുകൾ D-F കിലോർ പാങ്ങർ G-H കീ
ലോർഗ്ഗാത്ത പാങ്ങർ. 1. എൻറോപോഡ് 2. പ്രോട്ടോപോഡ്.
3. എക്സോപോഡ് 4. എപ്പിപോഡൈറ്റ്.



ചിത്രം 111. കൊഞ്ചിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.

A. ആന്റിന്റെ ആഭ്യുജ്ജ്വലോപോധം. B ഒരു ഭാഗത്തെ ഗിൽച്ചേമ്പർ തുറന്ന കാണിക്കുന്നത്. C-G പെണ്ണിന്റെ പ്ലിയോപോഡുകൾ. H. യുറോപോഡ്. 1. എന്റോപോഡ്. 2. എക്സോപോഡ്. 3. പ്രോട്ടോപോഡ്. 4. ഗിൽകൾ. 5. ഗിൽച്ചേമ്പർ.



ചിത്രം 112. കൊഞ്ചിനെ വിലങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ.

1. ഉദരം 2. മാംസപേശി
3. പാദം 4. പാദത്തിന്റെ ബാഹ്യശാഖ
5. പാദത്തിന്റെ അന്തർശാഖ.

മ്മീൻ മുട്ടയിടും. മുട്ടവിരിഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്ന ലാർവയെ നോപ്പിയസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതു പല ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് ചെമ്മീനായിത്തീരും.

ചെമ്മീനുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ഞെങ്ങ്. ഇതിന് നീളം കുറഞ്ഞു വീതി കൂടിയ ശരീരമാണ് ഉള്ളതു്. ശീരോവക്ഷസ്സിനേക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞിരിക്കും ഉദരത്തിന്; എന്നല്ല ഉദരം ശീരോവക്ഷസ്സിനടിയിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് വന്തിക്കുന്നത്. പല ഞെണ്ടുകൾക്കും വെള്ളത്തിനു പുറത്തു ജീവിക്കാനൊക്കും. ഞെണ്ടുകൾ കരയിൽ നടക്കുന്നതു കാണാൻ സാധ്യമുണ്ട്. കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ആണ് ഞെങ്ങ് നീങ്ങുക. മൊളസ്ക വർഗത്തിൽ പെട്ട ജീവികളുടെ ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടുകളിൽ കടന്നു കൂടി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഞെണ്ടുകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു സന്യാസിഞെണ്ടുകളെന്നു പറയുന്നു.


ചെമ്മീനും ഞെങ്ങ് മനുഷ്യൻ തിന്നുന്ന കൂട്ടുകാലികളാണ്. ചെമ്മീൻ വ്യവസായം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു മികച്ച വ്യവസായമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കടലിലും പച്ചവെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന അനവധി ചെറുജീവികൾ കൂടി ഈ വിഭാഗത്തിലുണ്ട്. ജലചെളികളും (ഡ്രാഫ്നിയ, സൈക്ലോപ്സ്) ലീഹസ്, സേക്കലസ് എന്നിവയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലവ മാത്രമാണ്. സേക്കലസ് ഞെണ്ടിന്റെ ഉദരത്തിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പരജീവിയാണ്. സൈമത്തോവ, നിരോസില എന്നിവ മത്സ്യങ്ങളുടെ ദേഹത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് പരഭോജികളായി ജീവിക്കുന്നു. ബത്തിനിമസ് എന്ന ജീവി ഏകദേശം ഒരു വരെ വളരും. നാലിഞ്ചു വണ്ണവും കാണും.

നാഡിവ്യൂഹം ഞാഞ്ഞൂലിൽ കാണുന്നതിനോട് സമമാണ്. അന്നനാളത്തിനു ചുറ്റും ഒരു നാഡിവളയും (ഇതു മസ്തിഷ്കവും ഉപാനാളീഗാംഗ്ലിയോണും ചേർന്നതാണ്) അനുകല്പകടിയിൽ ഉടനീളം കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നാഡിയും ആണ് മുഖ്യഘടകങ്ങൾ. പ്രധാന നാഡിയിൽ വക്ഷസ്സിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ഗാംഗ്ലിയോൺ (മൂന്നാമത്തേതു മുതൽ) ഉദരത്തിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ഗാംഗ്ലിയോണും കാണാം.

പാറയുടെ കണ്ണുകൾ മാതിരി രണ്ടു കണ്ണുകൾ ചെമ്മീനിനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ണുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ കൺത്തെട്ടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ചെമ്മീനിൽ ആണ് പെണ്ണും വേറെ വേറെയാണ്. ആണിന് വക്ഷസ്സിൽ ഒരു ജോഡി വൃഷണങ്ങളുണ്ട്; പെണ്ണിന് ഒരു ജോഡി അണ്ഡാശയങ്ങളും. ഇണചേർന്ന ശേഷം പെൺ ചെമ്മീൻ മുട്ടയിടും. മുട്ടവിരിഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്ന ലാർവയെ നോപ്പിയസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതു പല ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്ത് ചെമ്മീനായിത്തീരും.



ചിത്രം 113. ഞണ്ട്. 1. മേൽ ഭാഗത്തു നിന്നും 2. അടിഭാഗത്തു നിന്നും 3. ഉദരം വേറെ കാണിച്ചതു്.

ഒരഞ്ഞക്കോമോറ: ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെരിപ്പാറസ് എന്ന ഒരൊറ്റ ജീനസ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെട്ടുള്ളൂ. അനലിഡയുടെയും ആർത്രോപോഡയുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതിനുള്ളതിനാൽ, അവയ്ക്ക് രണ്ടിനമിടയിലെ കണ്ണിയാലി ഈ ജീവി എണ്ണപ്പെടുന്നു. അനലിഡയിൽ നിന്നും ആർത്രോപോഡയുടെ പരിണാമം തെളിയിക്കാൻ പെരിപ്പാറസ് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.




ചിത്രം 114. സന്യാസിണസ്
ഗാസ്‌ട്രോപോഡ് തോടിനകത്തു്

42 വരെ ജോഡി പാദങ്ങൾ കാണാം. ഈ പാദങ്ങൾ അനലിഡയുടെ പരേച്ഛാഡിയയോടാണ് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ പാദവും ഓരോ കറിയ കററിയാണ്. തലയിൽ ഓരോ ജോഡി സ്റ്റർഗികളും ആർത്രോപോഡയുടേതു പോലുള്ള ഹനക്കളും (വായയുടെ പാർശ്വങ്ങളിലായി), വദനപാപ്പവില്ലുകളും ഉണ്ട്. ശരീരത്തിന് ആർത്രോപോഡയ്ക്കുള്ള മാതിരി വിപുലമായ പുറംകവചമില്ല. കൂട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ് ശരീരാവരണം. ശരീരത്തിനകത്തു് ഹിമോസിലാണുള്ളതു്. അങ്ങിനെ ചില അനലിഡൻ സ്വഭാവങ്ങളും ചില ആർത്രോപോഡൻ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്ന പെരിപ്പാറാസ് പരിണാമപരമായി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

മിറിയാപോഡ: പഴുതാര (Scolopendra), തോട്ട (Spirosceptus), തൊട്ടാടി എന്നീ ജന്തുക്കൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഇവ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാലികളാണ്. വായുവിൽ നിന്ന ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ശ്വാസനേന്ദ്രിയങ്ങളാണിവക്കുള്ളതു്. തലയും അതിനെത്തുടർന്ന് അനവധി ഖണ്ഡങ്ങളും ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്. വക്ഷസ്സും ഉദരവും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു കാണുകയില്ല. പഴുതാരക്കു ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോജോഡിയും, തോട്ടക്കു ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും ഈരണ്ടു ജോഡിയും കാലുകൾ ഉണ്ട്. തലയിൽ ഒരു ജോഡി സ്പർശി, ഒരു ജോഡി കണ്ണുകൾ, ഒരു ജോഡി ഹനക്കൾ, രണ്ടു ജോഡി ചിബുക്കുകൾ എന്നിവ കാണാം.

ആസ്ട്രേലിയ, മലയ, തെ.അമേരിക്ക, തെ.ആഫ്രിക്ക എന്നീ വീടങ്ങളിൽ പെരിപ്പാറാസ് കാണപ്പെടുന്നു. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലിനും മരത്തടികൾക്കും അടിയിൽ ഈ ജീവി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.

പെരിപ്പാറാസിനു ഏകദേശം കാരാർപില്ലറിന്റെ രൂപമാണുള്ളതു്. ശരീരത്തിൽ ഖണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. തലയും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളുമായി ദേഹം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പുറമെ ഖണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഖണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാദങ്ങളുണ്ട്. 14 മുതൽ




ചിത്രം 115. ഒരൈക്കോമോറ.

A. മുഴുത്തു. B. മുൻഭാഗം മാത്രം വലുതാക്കിയതു്.

1. ആൻററന 2. മുഖീയപാപ്പിൾ. 3. പല്ലു്. 4. വായയ്ക്കു് ചുറ്റുമുള്ള പാപ്പിൾകൾ.


പഴുതാരയുടെ ശരീരം പരന്നതാണ്. ഉടലിലെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡത്തിലെ പാദങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു് ഹരപാദമായിത്തീർന്നിരിക്കും. ഇവയാണ് വിഷഗ്രന്ഥികളെ വഹിക്കുന്നതു്. ഈ ഹരപാദങ്ങളുടെ കൂത്തു മുന കൊണ്ടാണ് പഴുതാര മറ്റു ജീവികളെ കത്തി വിഷമേൽപ്പിക്കുന്നതു്.

പഴുതാരയുടെ വാസം കല്ലിനടിയിലോ ചുമരിലും മറ്റുമുള്ള വിടവുകളിലോ ആണ്. ചെറുപ്രാണികളെ പിടിച്ചു തിന്നാണ് അവ ജീവിക്കുന്നതു്. തേരടയുടെ ശരീരം ഉരണ്ടിരിക്കും. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും നന്നാലു കാലുകളു



ചിത്രം 116. പഴുതാര.

ഒരു ഷട്‌പദത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ തലയും മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളുള്ള വക്ഷസ്സും പത്തു ഖണ്ഡങ്ങളുള്ള ഉദരവും ഉണ്ട്. തല ആറു ഖണ്ഡങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്. തലയിൽ ഒരു ജോഡി സ്പർശികളും രണ്ടു സങ്കീർണാക്ഷികളും വായയും അതിനു ചുറ്റും ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച് അകത്തേക്കു തള്ളാനുതകുന്ന വദനാവയവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. വദനാവയവങ്ങൾ ജീവിയുടെ ജീവിതരീതിക്കനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കും.



ചിത്രം 117. തോട്ട.

വക്ഷസ്സിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും അടിവശത്തായി ഓരോ ജോഡി കാലുകൾ കാണാം. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഖണ്ഡത്തിൽ ഓരോ ജോഡി ചിറകുകളും ഉണ്ടാവും. ചില ഷട്‌പദങ്ങളിൽ ഒരു ജോഡി ചിറകുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. മറ്റു ചിലവയിൽ രണ്ടു ജോഡിയും കാണുകയില്ല. ഉദരഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഉപാഗങ്ങളില്ല. ജീവിതദശയിൽ രൂപാന്തരീകരണം

ഇതിനാൽ ഇതിനു പഴുതാരയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലുകൾ കാണുന്നു. അനവധി കാലുകളുള്ളതിനാൽ തോട്ടയെ ആയിരംകാലി (millipede) എന്നും വിളിക്കുന്നു. പഴുതാരക്കുള്ള വിഷഗ്രന്ഥി തോട്ടയിൽ കാണുന്നില്ല. ഇതു സസ്യഭുക്കാണ്. തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണു വാസം.

മിറിയോപോഡയിൽ എന്താണു് 9000 സ്പീഷീസുകൾ അടങ്ങുന്നതു് എന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇൻസെക്ട (ഷട്‌പദങ്ങൾ:) ഈ വകുപ്പിൽ പെട്ട എട്ടുകാലികൾക്കു് മൂന്നു ജോഡി കാലുകളാണുള്ളതെന്നതിനാൽ അവയെ ഷട്‌പദങ്ങളെന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇൻസെക്ട വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ജന്തുവിഭാഗമാണ്. മനുഷ്യനെ വളരെയേറെ ബാധിക്കുന്ന വിഭാഗമെന്ന നിലക്കു് ഇൻസെക്ടയെപ്പറ്റി ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠന വിഭാഗത്തിനു് എന്റമോളജി എന്നാണു പറയുക.

(metamorphosis) സാധാരണയായി കാണാം. മിക്കവയിലും ഒരു “ലാർവ്വ” ദശയുണ്ടാവും; തുടന്ന് പൂപ്പാദശയും. വളർച്ച നടക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം കൈററിൽ കൊണ്ടു നിർമ്മിതമായ പുറം ചട്ട പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങിനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കവചം ഉറഞ്ഞുപോവുകയും തൽസ്ഥാനത്തു കറച്ച കൂടി വലിയ കവചം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്രിയക്ക് “മോർട്ടിങ്ങ്” അഥവാ “മോർട്ടിസിംഗ്” എന്നു പറയുന്നു.

എഴുപ്പം പെരുകുന്ന ജീവികളാണിവ. പരിതഃസ്ഥിതിക്കൊത്തു ഇണങ്ങി ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ഷട്പദങ്ങൾക്ക് വളരെ കഴിവുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കളായ പല ജീവികളും ഇതിലുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ചാഴി, ചെള്ളി തുടങ്ങിയവയും ദോഹം പറയുന്ന കൊതുക്, ഈച്ച മുതലായവയും വസ്തുവും മനുഷ്യാമാനങ്ങളും തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ചിതൽ, വെള്ളി എന്നിവയും അജ്ഞാതയിൽ ചിലവ മാത്രമാണ്.

ഉപകാരികളായ ഷട്പദങ്ങളും കറവല്ല. തേൻ തരുന്ന തേനീച്ച, പട്ടു നുൽ തരുന്ന പുഴു (ഒരു ശലഭത്തിന്റെ ലാർവ്വ) കോലാക്ഷൽപാടിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണി എന്നിവ അത്തരക്കാലാണ്.



ഷട്പദവർഗ്ഗത്തിൽ സാമൂഹ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട്. ഉദാഹരണം ചിതലും തേനീച്ചയും കോളണികളായിട്ടാണ് താമസിക്കുക. ഓരോ കോളണിയിലും ഒരു മേധാവിരാണിയും കുറേ വേലക്കാരും പട്ടാളക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി താങ്ങങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യും. രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഉടയ്ക്കും. ആളങ്ങൾക്കു രാണിയായി ഇണചേരുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. വേലക്കാരെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണ്. ഇവ മുട്ടയിടുന്നില്ല. ആഹാരശേഖരണത്തിലും കോളണിയുടെ പരിരക്ഷയിലുമാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

പാറ


നമ്മുടെ വിട്ടുകളിൽ സാധാരണയായി ധാരാളം കണ്ടു വരുന്ന ഒരു ഷട്പദമാണ് പാറ അഥവാ കൂര. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം പെരിപ്ലേനാറാ എന്നാണ്. കലവറയിലും അലമാരികളിലും ചുമരിലെ വിള്ളലുകളിലും പോടുകളിലുമാണ് ഇവയുടെ വാസം.

പാറയുടെ ശരീരം തല, വക്ഷസ്സ്, ഉദരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. ശരീരം മുഴുവൻ കൈററിൽ എന്ന വസ്തു അടങ്ങുന്ന ബാഹ്യകവചം കൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കും. ശരീരത്തിലെ ഖണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കവചവും പ്ലോറുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കും. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും അടിയ്ക്കലും മുക്കലിലും ഓരോ പ്ലോറുകൾ ഉണ്ട്. അടിയ്ക്കലിലെ പ്ലോറിന് സ്റ്റേർണം എന്നും മുക്കലിലെതിന് ടെർഗം എന്നും പറയുന്നു. ഇതു രണ്ടും പാർശ്വഭാഗത്തു മുദ്രവായ ചർമ്മം കൊണ്ട് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.

തല: മൂന്നുദശയിൽ തല ഖണ്ഡങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഖണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ആഖണ്ഡിതമായിത്തീരുന്നു. തല ശുദ്ധീകരണ



ചിത്രം 118. പാറ (കൂ) A. മേൽഭാഗത്തു നിന്ന B. പാർശ്വഭാഗത്തു നിന്ന
 1. ആന്തരന 2. കണ്ണു 3. മാക്സില്ലറി പാൽപ് 4. ലേ
 ബിയൽ പാൽപ് 5. കഴുത്തു 6. മുൻവക്ഷം 7. മുൻചിറകു
 8. ഉദരഖണ്ഡങ്ങൾ 9. ഒരു പാദത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ
 10. പിൻചിറകു.



ചിത്രം 119. പാറയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ.

A. ശിരസ്സ്-മുൻവീക്ഷണം B. ഒരു പാദം വലുതാക്കിയത് C. വിവിധ മുഖഭാഗങ്ങൾ. 1. മാക്സില്ലറി പാൽപ്പ് 2. ട്രൈപ്പിസ് 3. കാർഡോ 4. മാൻഡിബിൾ 5. ലേബിയം 6. ഗാലിയ 7. ലസനിയി 8. പ്രീ മെൻറം 9. ലേബിയൽ പാൽപ്പ് 10. പാൽപ്പിഗർ 11. മെൻറം 12. ഉപമെൻറം 13. എപിക്രേനിയം 14. കണ്ണ് 15. ആന്റേന 16. ഫെനേസ് 17. കോക്സ 18. ട്രോക്കൻറർ 19. ഫീമർ 20. ടിബിയ 21. ടാർസസ് 22. നഖരങ്ങൾ.

സിനിയയും നട്ടുവിൽ ഒരു ഉദാഹരണ ഗാലിയയും പുറംവശത്തു് അഞ്ചു ഖണ്ഡങ്ങൾ ചേർന്നുവെച്ച ഹനസ് പാലിയം (maxillary palp) ഉണ്ടു്. വക്ത്രത്തിന്റെ അടിവശത്തു് കിഴ്ച്ചുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ലേബിയം എന്ന ഉപാംഗം കാണുന്നു. ഇതിന്നു് രണ്ടാം ചിബുകങ്ങൾ എന്നും പറയും. രണ്ടു ചിബുകങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നുവെച്ചതാണിതു്. പിറഭാഗങ്ങളാണു് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുക. അങ്ങിനെ ഉണ്ടായ

ത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തു് ശരീരത്തിന്നു ലംബമായിട്ടാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. തലയെ ആവരണം ചെയ്യുകൊണ്ടു് ചില പൂറ്റുകൾ ഉണ്ടു്. ഉപരിഭാഗം മുടിക്കൊണ്ടു് രണ്ടു് എപിക്രേനിയൽ പൂറ്റുകളും മുൻവശത്തു് ക്ലൈപിയസ് എന്ന പൂറ്റും പാർശ്വങ്ങളിൽ ഗീന എന്ന ഓരോ പൂറ്റും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

തലയിൽ ഇരുവശത്തും നിരവധി ഖണ്ഡങ്ങൾ ചേർന്ന ഓരോ നീണ്ടുമലിഞ്ഞ സ്പർശികൾ (ആന്റേന) കാണാം. വായക്കു ചുറ്റും ചില ഉപാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ക്ലൈപിയസ്സിനോടു് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ലേബിയം എന്ന പരന്ന ഉപാംഗം മേൽച്ചുണ്ടാണു്. അതിന്നു താഴെ ഇരു പാർശ്വങ്ങളിലും ഓരോ ഹനവും ഉണ്ടു്. ഈ ഹന കെററിൻ എന്ന വസ്തുവാൽ നിർമ്മിതമാണു്. അതിന്റെ ഉൾപാർശ്വത്തിൽ കററ പല്ലുകൾ കാണാം. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ കടിച്ചു മുറിക്കാനാണീ ഹനക്കൾ. ഇവയ്ക്കു് പിറകിലായി ഒരു ജോഡി ചിബുകങ്ങൾ (maxillae) ഉണ്ടു്. ഓരോന്നിന്നും ഒരു പിറഭാഗവും അതിനോടു് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട മൂന്നു പ്രവർത്തങ്ങളും കാണാം. പിറഭാഗത്തിന്നു കാർഡോ, ട്രൈപ്പിസ് എന്നീ ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ടു്. ട്രൈപ്പിസിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു് ഉൾവശത്തായി ദന്താപുതമായ ല

പ്ലോറിൻ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ കാണാം; സബ്മെൻറവും മെൻറവും. മെൻറത്തിന്റെ അറ്റത്തു് ഒരു ജോഡി ഹൻസ്പർകിളുണ്ട്. ഓരോന്നിനും മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളും ഇവയ്ക്കിടയിൽ മധ്യത്തിലായി ഒരു ജോഡി ലസിനിയകളും അവയുടെ പാർപ്പങ്ങളിലായി ഓരോ ഗാലിയയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപാംഗങ്ങളുടെ അടിവശം ട്രിച്ച്സസ് മെൻറത്തിനുപരിയായി പ്രീമെൻറം എന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കും. ലേബിയത്തിന്റെ ഉൾവശത്തു് കൈററിൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറി കാണാം. ഇതാണ് ഹൈപോഫാരിങ്സ് (ഗുഡായം). പാറയുടെ ഭക്ഷണം ജന്തുക്കളുടെ ശരീരവും സസ്യാംശവും ആണ്. വക്ത്രാവയവങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു് മുറിച്ചു് വായയിലേക്കു് തള്ളപ്പെടും.

തലയുടെ ഇരുവശത്തും ഓരോ വലിയ കീർണാക്ഷികൾ (compound eyes) ഉണ്ടു്. ഈ കണ്ണുകളോരോന്നും അനവധി യൂനിറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന സങ്കീർണാവയവമാണ്. ഓരോ യൂനിറ്റും ഓരോ ലംഘക്ഷിയാകുന്നു.

തലയെയും വക്ഷസ്സിനെയും ബന്ധിക്കുന്ന നേർത്ത കഴുത്തും പാറകളുണ്ടു്. വക്ഷസ്സിൽ മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളാണുള്ളതു്. ആദ്യത്തേതു് പൂർവവക്ഷസ്സ്, രണ്ടാമത്തേതു് മധ്യവക്ഷസ്സ്, മൂന്നാമത്തേതു് ഉത്തരവക്ഷസ്സ്. പൂർവവക്ഷസ്സിനുപരിയുള്ള പ്ലോറിൻ വലിപ്പം കൂടും. ഇതു് കഴുത്തിനേക്കുടി മുടിയിരിക്കും. മധ്യവക്ഷസ്സിന്റെയും പൂർവവക്ഷസ്സിന്റെയും പാർശ്വങ്ങളിൽ നിന്നു് ഓരോ ജോഡി ചിരകകൾ പുറപ്പെട്ടുണ്ടു്. ആദ്യത്തെ ജോഡി ചിരകകൾക്കു് ഉറപ്പു കൂടും. അതിനു് അണ്ഡാകൃതിയാണുള്ളതു്. പരക്കുവാൻ ഈ ചിരകപയോഗിക്കാറില്ല. മറ്റോ ജോഡി ചിരകിനെ മുടി കാത്തു രക്ഷിക്കലാണിവയുടെ ജോലി. പിൻ ചിരകകൾ നേർത്തും നിരയെ വാരികൾ (ridges) ഉള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ വിശദി പോലെ മടക്കിവെക്കാവുന്നവയും ആണ്. പരക്കുവാൻ ഈ ചിരകകൾ ഉപകരിക്കുന്നു. പരക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പിൻചിരകകൾ വിടരും.


വക്ഷസ്സിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിന്റെയും അടിവശത്തു് ഓരോ ജോഡി കാലുകൾ ഉണ്ടു്. ഓരോ കാലിലും ഒമ്പതു ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ടു്. ഈ ഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിൽ ചലിപ്പിക്കത്തക്ക വിധം സന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡത്തിനു വീതി കൂടും. ഇതിനു കോക്സ എന്നു പറയും. തുടർന്നുള്ള ഭാഗം ചെറിയ ട്രാക്കൻറർ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡമാണ് നീണ്ടുതടിച്ചു് കുററുദോമങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഫീമർ. പിന്നത്തെ നീണ്ടുമെലിഞ്ഞ ഭാഗത്തിനു ടിബിയ എന്നാണ് പേർ. അവസാനമായി അഞ്ചു ചെറുഖണ്ഡങ്ങളടങ്ങുന്ന ടാർസസ് ആണ്. അതിന്റെ അറ്റത്തു് ഒരു ജോഡി വളഞ്ഞ മുളുകൾ കാണാം. അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ദൃഢമായ മുഴയും. ഈ മുളുകൾ ചുമരിലും മറ്റും കയറുമ്പോൾ പിടത്തം കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്നു. കാലുകളിലെ ദോമങ്ങൾ കൊണ്ടു പാറ സപരശീരം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കും.

ഉദരത്തിൽ പതിനൊന്നു ഖണ്ഡങ്ങളാണുള്ളതെങ്കിലും ഏഴെണ്ണമേ വ്യക്തമായി കാണൂ. അവസാനത്തെ നാലെണ്ണവും ഏഴാമത്തെ ഖണ്ഡത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും.

ഗുദഭാഗം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ ഖണ്ഡത്തിന്റെ അടിവശത്താണ്. അതിന്നിരുവശത്തുമായി ഒരു ജോഡി കറാകൾ കാണാം. ഇവ ഓരോന്നും അനവധി ഖണ്ഡങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. ഇവയെ ഗുദങ്കരങ്ങൾ (anal cerci) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ അങ്കരങ്ങൾ ശ്രവണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണെന്നു അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുദത്തിനു താഴെയാണ് ജനനേന്ദ്രിയഭാഗം. ആണിനു് ഒമ്പതാമത്തെ ഉദരഖണ്ഡത്തിൽ അടിവശത്തു് ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ സൂചി പോലുള്ള അംഗം ഉണ്ടു്. പെണ്ണിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ അടിവശത്തിനു പരപ്പു കൂടും. ഏഴാമത്തെ ഉദരഖണ്ഡത്തിന്റെ അടിയിലെ പ്ലേറ്റു് വീതി കൂടിയതും രണ്ടായി പിളർന്നതുമാകുന്നു. ഇതിലാണ് ജനനേന്ദ്രിയഭാഗമായ ഗോം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

പാറായുടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ

കവചത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഗഹപരത്തിനു രക്തദോം (haemocoel) എന്നാണു പേർ. ഇതിൽ എല്ലാ ആന്തരാവയവങ്ങളും രക്തവും കരാ മേദഃപിണ്ഡവും അടങ്ങുന്നു. രക്തം നിറഞ്ഞതാണ് പാറായുടെ ശരീരഗഹപരം. അതിനാൽ അതിനു് രക്തദോം എന്നു പേർ വന്നു.



ചിത്രം 120. പാറായുടെ ആന്തരഘടന.

1. റെക്റ്റം 2. അണ്ഡാശയം 3. വലിയകടൽ 4. മാൽ പിള്ളിയൻ കഴലുകൾ 5. ഇലിയം 6. മിസെൻററോൺ 7. ഫിപാറാക് സിക്കുകൾ 8. ഗിസാർഡ് 9. അഭ്യക്ഷനാഡി 10. ക്രോപ്പ് 11. ഉമിനിർസഞ്ചി 12. ഉമിനിർഗ്രന്ഥി 13. ഗുദം.

പചനവ്യൂഹം


പചനവ്യൂഹത്തിൽ അന്നകലു
യും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്ര
ന്ഥികളും ഉണ്ട്. അന്നകലുയുടെ
ആദ്യഭാഗം നീളമുള്ള അന്നനാള
മാണ്. ഇത് വദനഗർഭത്തി
ലേക്കു തുറക്കുന്നു. അന്നനാളം ഉദ
സ്ഥിയിൽ പ്രവേശിച്ചു വികസിച്ചു
അന്നസഞ്ചിയാകുന്നതിനും. ഇതി
ന്റെ അറ്റത്തു കട്ടിയുള്ള ഭിത്തി
യോട് കൂടിയ കോണാകൃതിയിലു
ള്ള അന്നമർദി കാണാം. ഇതി
ന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ ആറു ദന്തങ്ങ
ളും കറു കറുവോടങ്ങളും ഉണ്ട്.
അന്നമർദിയെത്തുടർന്ന് കറിയ മ
ധ്യാന്തം (mesenteron) ആണ്.

ഇതിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ നിറ
യെ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. അന്നമർദിയും
മധ്യാന്തവും ചേരുന്നിടത്തു് അന്ന
കലുയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന വിൽ രൂ
പത്തിലുള്ള എട്ട് പ്രവർധങ്ങൾ
കാണാം. ഇവയ്ക്ക് യകൃത്ഭസ്യക

ങ്ങൾ എന്നാണ് പേര്. മധ്യാന്തത്തിന്റെ മറ്റോ അറ്റത്തു് അതിലേക്ക് തുറക്കുന്ന
നേരിയതും നിങ്ങളുമായ അനവധി നൂലുപോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാം. ഇ
വയാണ് വിസർജനേന്ദ്രിയങ്ങളായ മാൽപീജിയൻ നളികകൾ. മധ്യാന്തത്തെ
തുടർന്ന് കറിയതും വസ്തു കറഞ്ഞതുമായ ഉണ്യകാന്തവും അതിനെത്തുടർന്ന് കറച്ചു
കൂടി തടിച്ചതും ചുരുണ്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായ കോളനം അവസാനമായി
മലാശയവും കാണാം. അത് ഗുദം വഴി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നു.

അന്നസഞ്ചികീരവശത്തുമായി ഒരു ജോഡി ലാലാഗ്രന്ഥികളും ഓരോന്നി
നോട്ടം ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. ബലുക്ക് രൂപത്തിലുള്ള ഓരോ ലാലാസഞ്ചിയുമാണ്. ഓരോ
ലാലാഗ്രന്ഥിയും അനവധി ചെറുഗ്രന്ഥികൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്. ചെറുഗ്രന്ഥിക
ളിൽ നിന്നു വരുന്ന ചെറുകുഴലുകൾ ചേർന്ന് ലാലാനാളമായിത്തീരുന്നു. രണ്ടു
ലാലാനാളങ്ങൾ (salivary ducts) ചേർന്ന് ഒരു പൊതുനാളമാവും. ലാലാ
സഞ്ചികളിൽ നിന്നു വരുന്ന നാളങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പൊതുനാളവും മേൽ
പറഞ്ഞ പൊതു ലാലാനാളവും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ നാളമായിത്തീർന്ന് അത്
വദനഗർഭത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ലാലാശയം വദനഗർഭത്തിലാണു ചെന്നു
ചേരുക.

ഹനക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഭക്ഷണം വായിലേക്കു തള്ളപ്പെടും. വായിൽ
വെച്ചു് ഉമിനിറിലടങ്ങിയ ദീപനരസം ഭക്ഷണത്തിലെ അന്നജത്തെ ദഹിപ്പി



ചിത്രം 121. ഉമിനിർ ഉപകരണം
1. ഉമിനിർ ഉപകരണം 2. പൊതുക്കുഴൽ
3. ദന്തഭാഗത്തെ സഞ്ചിയുടെ കഴൽ
4. രണ്ടു സഞ്ചികളുടെയും കുഴലുകൾ
ഒന്നിക്കുന്നതു് 5. ഉമിനിർഗ്രന്ഥി
6. ഉമിനിർഗ്രന്ഥി
7. ദന്തഭാഗത്തെ ഉമിനിർഗ്രന്ഥി.

ക്കും. പിന്നീടു ഭക്ഷണം അന്നമർദിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ദീപനക്രിയ നടക്കുക. അവിടെ വെച്ച് അത് നല്ലവണ്ണം മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും യകൃതംദണ്ഡുകളിൽ നിന്നു വരുന്ന രസത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രോട്ടിനും കൊഴുപ്പും ദീപനം സാഭവിച്ച് ശരീരത്തിൽ ചോത്തക്കവിധമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. മധ്യാന്ത്രത്തിൽ വെച്ച് ദീപനം വന്ന ഭക്ഷ്യാംശങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലരും. അതായത് അവിടെ വെച്ച് ആഗിരണം നടക്കുന്നു. ദീപനം വരാത്ത ഭക്ഷണം ശം മലാശയത്തിൽ ചെന്നു കൂടി ഗുദഭാഗം വഴി പുറം തള്ളപ്പെടും.

ശ്വാസനവ്യൂഹം




ചിത്രം 122.
ശ്വാസനവ്യൂഹം ഒരു
ദൃശ്യത്തെ ക്രമീ
യാവ്യൂഹം.

ജീവാസ്തികനളികകളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് പാറായുടെ ശ്വാസനവ്യൂഹം. ഈ നളികകൾക്കു ക്ലോമങ്ങൾ എന്നാണ് പേര്. അവ ചേർന്നുണ്ടായ ക്ലോമവ്യൂഹം ശരീരത്തിൽ നാനാ ഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കും. ഇതിലെ ചെറുനളികകൾ വായുവിനെ ശരീരത്തിലെ കലകൾക്കു നേരിട്ടെത്തിക്കും. രക്തത്തിന് ശ്വാസനക്രിയയിൽ പങ്കില്ലെന്നത് ഷട്പദങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ലോമവ്യൂഹം പുറത്തേക്കു തുറക്കുന്നത് പത്തു ജോഡി ക്ലോമരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ്. ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽ രണ്ടു ജോഡി വക്ഷസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഖണ്ഡങ്ങളിലും ബാക്കി ഉദരഭാഗത്തെ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ പള്ളയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും സ്റ്റേർണത്തിനും ടെർഗത്തിനും ഇടയിലാണ് ക്ലോമരന്ധ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലോമരന്ധ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കറിയ ക്ലോമം ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നു മേൽഭാഗത്തേക്കും പൂർവ്വവശത്തേക്കും പാർവ്വങ്ങളിലേക്കും നിളമുള്ള ക്ലോമങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. പൂർവ്വഭാഗത്തു വിലങ്ങനെയുള്ള കഴലുകൾ ക്ലോമവ്യൂഹത്തിലെ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. പ്രധാന ക്ലോമങ്ങളിൽ നിന്നു ചെറു കഴലുകൾ പുറപ്പെട്ടു ശാഖോപശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു, ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിലും ചെന്നെത്തും. ക്ലോമരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് വായു അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തേക്കു തള്ളപ്പെടുന്നതും. ക്ലോമങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിൽ കൈററിൻ നിർമ്മിതമായ വളയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും. അതിനാൽ വായുവിന് എളുപ്പത്തിൽ ആ കഴലുകളിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. കോശങ്ങളിൽ ചെന്നു പാറുന്ന ചെറുനളികകളുടെ (tracheoles) ഭിത്തി നേർത്തതായിരിക്കും. അതിനാൽ അതിലൂടെ വാതകങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകും. ക്ലോമരന്ധ്രങ്ങളെ ചുരുക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അവയുടെ വശങ്ങളിൽ വാൽവുകളുണ്ട്. അവയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചെറുരോമങ്ങൾ പൊടിപടലത്തെ ക്ലോമവ്യൂഹത്തിൽ കടക്കാനനുവദിക്കാറില്ല. ഉദരഭിത്തിയുടെ ഇടവിട്ടുള്ള വികാസവും സങ്കോചവും അനുസരിച്ചാണ് വായു ക്ലോമവ്യൂഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തേക്കു പോകുന്നതും. ക്ലോമവ്യൂഹം വഴി കോശങ്ങളിലെ

ഇന്നു വായുവിൽ നിന്നു ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറംതള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. രക്തത്തിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുകയും കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് പുറത്തു കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലോമവ്യൂഹം ഒരു പ്രത്യേകതരം ശ്വാസനവ്യൂഹം തന്നെയാണ്. ഇതുവഴി പാറാക്കു വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്.

പര്യന്തവ്യൂഹം

പാറായുടെ രക്തത്തിനു നിറമില്ല. ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള പദാർത്ഥം അതിലില്ലത്തതിനാലാണ് രക്തത്തിനു നിറമില്ലാതായത്. ഓക്സിജൻ രക്തത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കു നേരിട്ടു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവെല്ലാം.



ചിത്രം 123. പാറായുടെ ഹൃദയം 1. ഏലറിവേശികൾ 2. ഹൃദയം 3—13. വിവിധ ഖണ്ഡങ്ങളിലെ അറകൾ.

കുതറത്തിലേത്തുകയും ചെയ്യും. അവിടെ നിന്നു പെരികാർഡിയൽ ഗഹ്വരത്തിലേക്ക് അതിനു താഴെയുള്ള ധാത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ വഴി രക്തം കടന്നു ചെല്ലും. പിന്നെ ഓസ്റ്റിയ വഴി ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിലേക്കും അതു പ്രവേശിക്കും. ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഓസ്റ്റിയ അടഞ്ഞു പോകും. അതിനാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു രക്തം ചുറ്റുമുള്ള പെരികാർഡിയൽ ഗഹ്വരത്തിലേക്കു വരില്ല. ഓസ്റ്റിയകളിൽ വാൽവുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പെരികാർഡിയത്തിലേക്ക് പോകാതെ തടയുന്നു. രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ കിടപ്പ്. അന്നകല്പയിൽ നിന്നു പോഷകദ്രവ്യങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലരും. രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ നാ

ശരീരഭിത്തിക്കു താഴെ അന്നകല്പക്കു മുകളിലായി നീണ്ടു കഴൽരൂപത്തിലുള്ള ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു 13 അറകളുണ്ട്. ഓരോ അറയും തൊട്ടടുത്ത അറയിലേക്കു തുറക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഓരോ അറയുടെയും പാർശ്വഭാഗത്തു് ഓരോ കവാടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ കവാടങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിയ എന്ന പേർ. ഹൃദയത്തിന്റെ മുൻവശം (തലയറ്റം) അടഞ്ഞും മറ്റോരറ്റം തുറന്നുമിരിക്കും. ഹൃദയത്തിന്നു ചുറ്റും പെരികാർഡിയൽ ഗഹ്വരം നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതിന്നു ചുറ്റും ശരീരഗഹ്വരമായ ഹിമോസിലാണുള്ളതു്. ശരീരഗഹ്വരത്തിൽ അന്നകല്പക്കും ഹൃദയത്തിന്നുമിടയിലുള്ള ഒരു ധാരമാണ് പെരികാർഡിയൽ ഗഹ്വരത്തെ രക്തദാത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതു്. ഹൃദയത്തിന്നു സങ്കോചവികാസശക്തിയുണ്ടു്. അതു സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ രക്തം പിറകിൽ നിന്നു മുന്നോട്ടു പ്രവഹിക്കുകയും മുന്നിലുള്ള കഴൽ വഴി ര


നാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നു. അതുപോലെ വിസർജനവസ്തുക്കളെ സ്വീകരിച്ച് വിസർജനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതും രക്തമാണ്.

വിസർജനവ്യൂഹം

മധ്യാത്രത്തിന്റെയും ചെറുകുടലിന്റെയും ഇടയിൽ അന്നകലുയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന നേരിയ നാളപോലുള്ള മാൽപീജിയൻ നൂൽക്കുഴലുകളാണ് വിസർജനം നടത്തുക. ഇവ ഏകദേശം 80 എണ്ണം വീതം ഓരോ പാറായിലും കാണാം. ഈ കുഴലുകൾ രക്തദാർശനത്തിൽ രക്തത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വിസർജിക്കേണ്ട പദാർഥങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇവയ്ക്കു കഴിയുന്നു. രക്തത്തിൽ നിന്ന് മേൽ പറഞ്ഞ കുഴലുകളുടെ അപാനഭാഗം (distal part) നൈരജനങ്ങളെ ലവണങ്ങളെ വെള്ളത്തോടു കൂടി വലിച്ചെടുക്കും. വെള്ളം പുറത്തു കളയാതെ സൂക്ഷിത്തേണ്ടതുകരയിൽ ജീവിക്കുന്ന പാറായുടെ ഓവശ്യമായതിനാൽ മാൽപീജിയൻ നൂൽക്കുഴലുകളുടെ ഉപാനഭാഗത്ത് (proximal part) വെച്ച് വിസർജനവസ്തുവിലെ ജലാംശത്തെ വീണ്ടും വലിച്ചെടുത്തു രക്തത്തിലേക്ക് അയക്കും. ശേഷിക്കുന്ന യൂറിക്ക് അമ്ലം അന്നകലു വഴി വിസർജിക്കപ്പെടും. മാൽപീജിയൻ നൂൽക്കുഴലുകളുടെ പ്രത്യേക കുഴിവു കാരണം ജലനഷ്ടം കൂടാതെ വിസർജനം നടത്താൻ പാറാക്കു സാധിക്കുന്നു.

നാഡീവ്യൂഹം

ഞാഞ്ഞൂലിന്റെ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് പാറായുടെ നാഡീവ്യൂഹവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നനാളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നാഡീവളയവും അതിൽ നിന്ന് അന്നനാളിയിലൂടെ പിറകോട്ടു ശരീരത്തിന്റെ പശ്ചാദ്ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന ഒരു ജോഡി നാഡികളുമാണ് പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ. നാഡീവളയത്തിൽ അന്നനാളത്തിനുപരിയായി തലയിൽ ഒരു ജോഡി ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ ഉണ്ട്; ഇതാണ് മസ്തിഷ്കം. ഈ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾക്ക് ഉൾപ്രധാനനാളീഗാംഗ്ലിയോണുകൾ എന്ന പരയും. ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കാം. ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ പാർശ്വനാഡി അന്നനാളത്തെ ചുറ്റി അടിവശത്തുള്ള ഉപാനനാളീഗാംഗ്ലിയോണുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ മസ്തിഷ്കവും പാർശ്വനാഡികളും ഉപാനനാഡീഗാംഗ്ലിയോണും ചേർന്ന് അന്നനാളത്തിനു ചുറ്റും, തലയിൽ ഒരു വളയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതാണ് പാറായുടെ നാഡീവളയം. ഉപാനനാഡീഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടു നീണ്ട അഭ്യക്ഷനാഡികൾ അന്നകലുക്കടിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ അടിഭിത്തിക്ക് ഉപരിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഉദാസ്യത്തിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും നാഡികൾക്ക് മധ്യത്തിലായി ഓരോ വലിയ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഉണ്ടാവും. ഈ ഗാംഗ്ലിയോണുകളിൽ നിന്ന് കാലുകൾക്കിടയിലേക്കും ചിറകുകൾക്കിടയിലേക്കും നാഡികൾ പോകുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളിലേക്കും സ്വപ്നകളിലേക്കും നാഡികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഉപാനനാഡീഗാംഗ്ലിയോണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നാഡികൾ വായക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഉപാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കാം. ഉദാഹരണി



ചിത്രം 124. പാറയുടെ നാഡിവ്യൂഹം

1.മസ്തിഷ്കം 2.ഉപഗുള ഗാംഗ്ലിയോൺ 3—5.വക്ഷസ്സിലെ ഗാംഗ്ലിയോൺ 6.ഉദരത്തിലെ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ 7.കമ്മീഷർ. ബമെന്നു പറയും. സ്പർശികൾ സ്പർശനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടിയതാണ്. ഹനസ്സർശികളിൽ സപാദിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഉൽപ്പാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

ആണം പെണ്ണും വെവ്വേറേയുണ്ട്. ആണിനും പെണ്ണിനും തമ്മിൽ ബാഹ്യമായിത്തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ആണിന്റെ ഉദരം പെണ്ണിന്റെ നെന്തിനേക്കാൾ മെലിഞ്ഞതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു ജോഡി സൂചി പോലുള്ള ഗുദസ്തൈലുകൾ ഉണ്ട്. പെണ്ണിന് ഇതുണ്ടാവില്ല. പെണ്ണിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഉദരഖണ്ഡം വീതിയ്ക്ക് ബോട്ടിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഇതിലാണ് പാറ അണ്ഡങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുക. ഇതിന് അണ്ഡസഞ്ചിയെന്നു പറയാം.


പുരുഷേന്ദ്രിയങ്ങൾ

ഉദരത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ടെർഗൽ പ്ലേറ്റുകൾക്കടിയിലായി ഒരു ജോഡി വൃഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇവയാണ് പുരുഷ ബീജങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. ഓരോ വൃഷണവും കുറേ സഞ്ചികകൾ (vesicles) ചേർന്നതാണ്. ഓരോ വൃഷണത്തിൽ നിന്നും നേരിയ ശുക്ലനാളം പുറപ്പെടുന്നു. അത് ഉദരത്തിന്റെ പിൻവശത്തു വച്ച് വികസിച്ചു

ലെ ആദ്യത്തെ ആറു ഖണ്ഡങ്ങളിലും ഓരോ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ കാണാം. അവസാനത്തേതു വലുതും ബാക്കിയുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു ഉണ്ടായതുമാണ്.

സ്പർശികളും സങ്കീർണാക്ഷികളുമാണ് പ്രധാന സംവേദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഓരോ കണ്ണും അനവധി യൂനിറ്റുകൾ ചേർന്ന രൂപം കൊണ്ടതാണ്. ഈ യൂനിറ്റുകൾക്ക് ഒമ്മറീഡിയം എന്ന പേര്. ഓരോ ഒമ്മറീഡിയത്തിലും ഒരു കാചവും നേത്രപടലവും (തൃതീയ പടലം-retina) അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട നാഡിയും ഉണ്ട്. ഓരോ ഒമ്മറീഡിയവും തമ്മിൽ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വർണകം കൊണ്ടു വേർതിരിച്ചിരിക്കും. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഓരോ ശകലങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബമാണ് ഓരോ ഒമ്മറീഡിയത്തിലും പതിയുക. അങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്ന അനവധി പ്രതിബിംബങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നു വസ്തുവിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ പ്രതിബിംബമായിത്തീരും. ഇങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിനു മൊസായിക് പ്രതിബിംബം

ശുക്രസഞ്ചി (seminal vesicle) ആയിത്തീരും. ഇവയെക്കൂടി ശുക്രസഞ്ചികളും ശരീരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചു കെട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങിനെ കെട്ടിച്ച ചേർന്നിടത്തിനു ചുറ്റുമായി അനവധി ദണ്ഡുകൾ (diverticula) ഉള്ളതിനാൽ ആ വശത്തിനു കമിളിന്റെ ആകൃതിയാണുണ്ടാവുക. ഇതിൽ നിന്നു പിന്നീലോട്ടു സ്പെർമവാഹിനി എന്നു പേരായ ഒരു നാളം പുറപ്പെടുന്നു. അതു ഗുദത്തിന്നു താഴെയായി ജനനേന്ദ്രിയഭാഗം വഴി പുറത്തേക്കു തുറക്കും. ഈ നാളം



ചിത്രം 125. പെൺപാറയുടെ പ്രജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ



A. പാർശ്വവീക്ഷണം B. അപാക്ഷവീക്ഷണം.

1. സ്റ്റെർമാറ്റൈക്. 2. പ്രജനനസഞ്ചി 3. കൊലാറ്ററിയിൽ ഗ്രന്ഥി 4. കൊലാറ്ററിയിൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഭാഗം 5. ഗർഭാശയം 6. അണ്ഡാശയക്കുഴൽ 7. അണ്ഡാശയം 8. ഗൊണാപോഫൈസസ് 9. സ്റ്റെർണം 10. വലിയ കടൽ 11. ഗുദീയ സെർകസ് 12. ഗുദം.

ത്തിനടിയിൽ ഇലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കോംഗ്ലോമേററ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ നാളവും ജനനേന്ദ്രിയസഞ്ചിയിലേക്കു തുറക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനമെന്താണെന്ന് അറിവാതിട്ടില്ല. ജനനേന്ദ്രിയഭാഗത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മുളളുകൾ ഇണചേരൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഗോണപ്പോമൈസിസ് എന്ന പേർ പറയുന്നു.

ഐസനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

പെണ്ണിന്റെ ഉദരത്തിൽ അഭ്യക്ഷഭാഗത്തായി ഒരു ജോഡി അണ്ഡാശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോ അണ്ഡാശയവും എട്ട് അണ്ഡാശയനാളങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതും വാഴയ്ക്കപ്പടലയുടെ രൂപത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഓരോ നാളത്തിന്റെയും അടിഭാഗം വിർത്തതും മറ്റോ അറാം നേന്ത്ത് ഒരു നാരിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതും ആണ്. ഒരു അണ്ഡാശയത്തിലെ എല്ലാ നാളികളുടെയും അറ്റത്തുള്ള നാളുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സ്പിൻഡിൽ രൂപമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. നാളങ്ങളുടെ മറ്റോ അറാം ഒന്നിച്ച ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ അണ്ഡനാളം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടു ഭാഗത്തെയും അണ്ഡനാളങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഗർഭാശയമായിത്തീരുന്നത്. ഗർഭാശയം പിറകോട്ടു ഭാഗം (vagina) ആയി തുടരുന്നു. ഇത് അണ്ഡസഞ്ചിയിലേക്കു തുറക്കുന്നു. ഭഗത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു് ഒരു ജോഡി ശുക്ലഗ്രാഹികൾ (spermathecae) ഉണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് വിത്തു് സഞ്ചി പോലെയും മറ്റേതു് കുറിയ ഒരു നാളപോലെയും ആണ് കാണപ്പെടുക. ഇണ ചേരുമ്പോൾ പുരുഷബീജങ്ങൾ ശുക്ലഗ്രാഹികളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടും. ഭഗത്തിനുപരിയായി അതിലേക്കു തുറക്കുന്ന വളരെ യേറെ ശാഖകളുള്ള രണ്ടു ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് കൊളെററിനിയൽ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നാണ് പേർ. മുട്ടയ്ക്കു പുറമെയുള്ള കടുത്ത തോട്ടുണ്ടാക്കുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രവണമാണുപയോഗിക്കുക.



അണ്ഡകോശത്തിൽ നിന്നു മുപ്പെത്തിയ അണ്ഡം അണ്ഡനാളം വഴി ഗർഭകോശത്തിലും തുടർന്ന് ഭഗത്തിലും എത്തും. അവിടെ വെച്ച് ശുക്ലഗ്രാഹി


ചിത്രം 126. ആൺപാറയുടെ പ്രജനനേന്ദ്രിയം.

A. പാർശ്വവീക്ഷണം. B. അപാക്ഷവീക്ഷണം.

1. വാസ്ഡഫറസ് 2. കമിൾ-രൂപ ഗ്രന്ഥി 3. വൃഷണം
4. കൺഗ്ലോമേററ് ഗ്രന്ഥി 5. പ്രജനനസഞ്ചി 6. സ്പൈനിയ വാഹിനി
7. കൺഗ്ലോമേററ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വാഹിനി 8. വലിയ കടൽ
9. ഗുദം 10. ഗോണപ്പോമൈസിസ് 11. ഗുദീയസെർകസ്
12. ഗുദീയ ട്രൈൽ

യിൽ നിന്നു വരുന്ന ശുക്ലാണുവുമായി ചേർന്ന് അത് സിക്താണുവുമായിത്തീരും. ഇങ്ങനത്തെ സിക്താണുങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഭംഗ വഴി അണുസഞ്ചിയിൽ എത്തുന്നു. കോളെററിയിൽ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം ദ്രാവകം ഇവയ്ക്കു ചുറ്റും സ്രവിക്കപ്പെടുകയും അത് കട്ടിപിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു സഞ്ചിക്കകത്തായി ഈ മുട്ടകൾ അടക്കി വയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സഞ്ചിയിൽ 16 അണുങ്ങളാണ് അടക്കിവെക്കപ്പെടുക: എട്ടെണ്ണം വിതമുള്ള രണ്ടു വരികൾ. ഈ അണ്ഡപേടകം അണ്ഡസഞ്ചിയിൽ പോറി പെൺപാറ്റാ സഞ്ചരിക്കാം. സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടാൽ അതവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും.

മുട്ട വിരിഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന പാറ്റായോട് രൂപ സാമ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ചിറകുകളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം പൂണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. ഏഴു പ്രാവശ്യം പാറ്റാക്കണ്ണു പുറം തൊലിയുരിക്കാം. ചിറകുകൾ വളരുകയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. പാറ്റായുടെ കണ്ണു മുതിർന്ന പാറ്റായിൽ നിന്നു വളരെയൊന്നും വ്യത്യാ



സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതിനാൽ അതൊരു ലാർവയല്ല. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിംഫ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ജീവിതചക്രത്തിൽ ചിത്രശലഭത്തിന്നു ണ്ടു പോലെ ലാർവ, പൂപ്പ എന്നീ ദശകളില്ല. നിംഫ് ക്രമേണ വളർന്ന് പൂർണത പ്രാപിക്കും. ശരിയായ രൂപാന്തരീകരണം ഇല്ല എന്നു സാരം. മറിച്ചു ചിത്രശലഭത്തിന് പൂപ്പദശയും ആ ദശയിൽ പൂർണമായ രൂപാന്തരീകരണവുമുണ്ട്. അതിന്റെ കണ്ണു വളർച്ചയെത്തിയ ശലഭത്തിൽ നിന്നു പാടേ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത്തരം കുഞ്ഞിനാണു ലാർവ എന്നു പറയുക.

മറ്റുദാഹരണങ്ങൾ:

ചീവീട് (മണ്ണുട-gryllotalpa), വീടിൽ(പച്ചത്തുള്ളൻ), തുമ്പി, പൂമ്പാറ്റ, വണ്ടു്, ഉറുമ്പു്, ഈച്ച, കൊതുക്, മുട്ട, പേൻ തുടങ്ങിയ ജീവികളെല്ലാം ഷട്പദങ്ങളാണ്.

ചിത്രം 127. ഈടവാലൻ ഷട്പദങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. (വെള്ളിജാ-*Ctenolepisma*) ചിറകില്ലാത്ത വർഗത്തിനു എടറിഗോട്ട എന്നും ചിറകുള്ളതിനു ടെറിഗോട്ട എന്നും പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ചിറകില്ലാത്തവയുടെ ഒരുദാഹരണമാണു് വെള്ളിമീൻ(രാമബാണം)എന്ന ജീവി. ഇതു് പുസ്തകങ്ങളുടെ താളുകൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രാണിയാണ്.

ചിറകുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് മേൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും പെടുക.


മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലവയെപ്പറ്റി മാത്രം അൽപം പറയാം.

ഉപകാരികൾ

പട്ടന്തൽ പുഴ: ബോമ്പാക്സ് മൊറി എന്ന പേരായ നിശാശലഭത്തിന്റെ ലാർവയാണ് പട്ടന്തൽപുഴ. ഇത് പൂച്ചദശയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും പട്ടന്തൽ കൊണ്ടൊരാവരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ നൂല്പുഴ തന്നെ വിസർജിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഈ നൂലാണ് പട്ടവ്യവസായത്തിൽ പട്ടന്തലുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

തേനീച്ച: തേൻ സംഭരിക്കുകയും മെഴുകു കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേനീച്ച നമുക്കു തേനും മെഴുകും തരുന്നു.


കോലാക്കുതുന്ന അറക്കപ്രാണി (Lac insect) മധ്യപ്രദേശിലും ബംഗാളിലും




ചിത്രം 128. തേനീച്ച—ജീവനചത്രം

1—5. വികസനദശകൾ 6. ജോലിക്കാരൻ 7. ആൺതേനീച്ച
8. റാണി.

ആസ്സാമീലും ധാരാളമുണ്ട്. ഇവയെ വളർത്തി ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു സ്രവിച്ചുണ്ടാകുന്ന അരക്കു ദേശചാരിക്കുന്നത് അവിടങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല വ്യവസായമാണ്.



1



2


3

ചിത്രം 129. അരക്കുകിടത്തിന്റെ ജീവിതദശകൾ

1. കമ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കു 2. നിറം 3. പെൺ പ്രൗഢകീടം

കേന്ദ്രീയീൻ എന്ന ജന്തുക്കൾ കേന്ദ്രീയീൻ എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവ, തൊപ്പിപ്പ്രാണി, കഴിയാത്തതുമായി, വണ്ടുകൾ, വേട്ടാവെളിയൻ എന്നീ പ്രാണികൾ ഉപദ്രവകാരികളായ പ്രാണികളെ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു. ഉറുമ്പും തേനിച്ചുവും അടങ്ങുന്ന ഹൈമനോപ്സിറ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട ഷട്പദങ്ങൾ പലതും ഇതുപോലെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഉപദ്രവകാരികൾ:- വെട്ടുകിളി (Locust) കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. കൂടാകൂടമായി വന്ന പാടങ്ങളിൽ നിന്നു നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും




ചിത്രം 130. വെട്ടുകിളി: ഷിസ്ടോസെർക്സിനേറ്റിയ

മറ്റും ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാണികൾ കൃഷിക്കാർക്കു നഷ്ടം നേർത്ത ശത്രുവാണ്. പലതരം വണ്ടുകളും മുട്ടകളും ചെടികളെ ബാധിച്ചു നശിപ്പിക്കും. സ്റ്റോഡോപ്സിറ എന്ന ശലഭത്തിന്റെ ലാർവ (പുഴു) നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബാധയാണ്. ഈ പുഴുക്കൾ ഇളം ചെടികൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കും. നെല്ലിലെ മണി ഉറയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പു പാലൂറിക്കിടക്കുന്ന ചാഴി (Leptorissa) മറ്റൊരു കർഷകശത്രുവാണ്. തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന നെഫന്തസ് (Nephanthus), കൊമ്പൻ ചെളി (ഓക്സിസ്, Oryctis) എന്നിവ കേരളത്തിലെ തെങ്ങുകൃഷിക്കു വലിയ നാശം വരുത്തുന്നു.

ധാന്യസംഭരണത്തിൽ കടന്നുകൂടി ധാന്യം കത്തി ഉപയോഗമുട്ടാക്കുന്ന പ്രാണിയാണ് കറുഞ്ചത്തൻ (Rice weevil). പല ശലഭങ്ങളും വൃഷ്ടങ്ങളും മറ്റും കേടുവരുത്തും.

ചിത്രം വരുത്തുന്ന വിന ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കൊതുക്, മുട്ട, പേൻ എന്നിവ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ബാഹ്യപരജീവികളാണ്. കൊതുക് നാശം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഫൈലോമിയയും പരത്തുന്നു.

ഇപ്പോൾ വഴി പറക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, ക്ഷയം, അതിസാരം എന്നിവ. സിനോസില്ല (Xenopsylla) എന്നു പേരായ എലി



ചിത്രം 131. ചിതൽ.


A. ചിതൽ ആൺ. B. വേലക്കാർ B. പടയാളി.

യുടെ ശരീരത്തിൽ പരജീവിയാൽ കഴിയുന്ന ചെമ്മുക്കൻ പട്ടാളം പടയാളം പരത്തുക.

ചില ശലഭങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം


പൂമ്പാറ്റ(ചിത്രശലഭം): നിരവധി ജാതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗോത്രമാണ് പൂമ്പാറ്റയുടെത്. പൂമ്പാറ്റകൾ പകൽസമയങ്ങളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂക്കളിൽ നിന്ന് തൂമ്പിക്കെ പോലുള്ള ഒരു വസ്തുവായതും കൊണ്ട് തേൻ നുകരുന്നതും സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. ഇത് വിശദീകരണങ്ങൾ ചിതൽകൾ അടുപ്പിച്ചു കത്തനെ മേലോട്ടു പിടിക്കും. തലയിലെ സ്പർശിയിൽ അറഞ്ഞായി ഒരു മുഴ കാണാം.

പെൺശലഭം ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ പിൻവശത്തായിട്ടാണ് മുട്ടകൾ ഇടുക. ശലഭത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പര കൊണ്ടാണ് മുട്ടകൾ ഇലയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക. മുട്ട വിരിഞ്ഞു പുഴുപത്തിലുള്ള 'കാറ്റർപില്ലർ' എന്ന ലാർവ പുറത്തു വരും. ഇതിനു വ്യക്തമായ തലയും 13 ഖണ്ഡങ്ങളടങ്ങുന്ന ശരീരവും കാണാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വക്ഷസ്സും ബാക്കി ഉദരവും ആണ്. തലയിൽ ഒരു ജോഡി സ്പർശികളും ഒരു ജോഡി ലംഘകങ്ങളും വായയും അതിനു ചുറ്റുമായി വസ്തുവായവങ്ങളും ഉണ്ട്. രണ്ടു ഹിനങ്ങളും രണ്ടു ജോഡി ചിബുക്കുകളുമാണ് വസ്തുവായവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ജോഡി ചിബു



ചിത്രം 132. ഈച്ചയുടെ ജീവനചക്രം


1. മുട്ടകൾ 2. മാഗ്സ് 3. മാഗ്സിന്റെ മുൻഭാഗം വലുതാക്കിയതു്.
4. പൂപ്പ 5. ഇമാഗോ



ചിത്രം 133. മുട്ട: സൈമാക്സ്
ലെക്ടലേറിയസ്

കണ്ടർ ചേസ് കീഴ്ചുണ്ടായി
ത്തീരും. ഇതിനടുത്തായി ഒരു പ്ര
ത്യേകഗ്രന്ഥിയുടെ നാളം പുറത്തേ
ക്കു തുറക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന പശ കൊണ്ടാണ്
പുഴു അടുത്ത ദശയിൽ ശരീരത്തി
നു ചുറ്റും കൂട്ട കെട്ടുക. വക്ഷ
സ്സിലെ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലും
അഞ്ചു സന്ധികളുള്ള ഓരോ ജോ
ഡി കാലുകൾ ഉണ്ടു്. ഉദരത്തി
ലെ മൂന്നു നാലും അഞ്ചും ആറും
ഖണ്ഡങ്ങളിലും അവസാനത്തെ
ഖണ്ഡത്തിലും ഓരോ ജോഡി
കരിയ കാലുകൾ കാണാം. ശരീ
രത്തിന്റെ പിന്നിലെ അറ്റത്താ
ണു ഗുദഭാഗം.

പച്ചില തിന്നു് ഈ പുഴു അതിവേഗം വളരും. അതിനു ശേഷം തീരാ നിർ
ത്തി ഒരിടത്തു വിശ്രമം തുടങ്ങും. ശരീരം മുൻ പാഞ്ഞ സ്വശരീരത്തിൽ നി



ചിത്രം 134. പുമ്പാറയുടെ ജീവനചത്രം.

A. ഇമാഗോ. B. കാരാർവില്ലർ C. പൂവ D. ശിരസ്സ്.


1. തല 2. വക്ഷ:പാദങ്ങൾ 3. സ്റ്റീഗ്മാറ്റ. 4. മുൻപാദങ്ങൾ 5. ക്ലാസ്പർ 6. ആന്തരിക 7. കണ്ണ് 8. ലേബിയം 9. അധിഗ്രന്ഥി. 10. ലേബിയൽ പാൽപ്പ് 11. മാക്സില്ലറി പാൽപ്പ് 12. ശുണ്ഡം.

ന്നു വരുന്ന പശ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഓരോവണ്ണത്താൽ മുട്ടകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് കൂട്ടപ്പുഴു (pupa). ഈ ദശയിൽ ലാർവയുടെ സ്വഭാവം മാറി ജീവി ശലഭ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ക്രിയക്കാണ് രൂപാന്തരീകരണം എന്നു പറയുക. ശലഭം പൂർണ്ണമായി രൂപം പൂണ്ടാൽ കൂട്ട പിളർന്നു പുറത്തു വരും.

ചിത്രശലഭത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ആരോഗ്യം സമയമെടുക്കും. ഓരോ ചുട്ടയായും ഒരു മാസത്തോളം പുഴുവായും ബാക്കി പട്ടുപുഴുവായും കഴിയും.

പട്ടുനൂൽശലഭം: ഇതാണ് നിശാശലഭമാണ്. രാത്രിയാണ് പറന്നു കളിക്കുക. വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിരകൾ വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കും. സ്വർഗ്ഗികൾക്കു ഇവയിന്റെ ആകൃതിയാണുണ്ടാവുക. നിശാശലഭങ്ങൾ പലജാതിയുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് പട്ടുനൂൽശലഭം. പെൺശലഭം മറുബറിപ്പെടിയുടെ ഇലകളിൽ

മുട്ടയിടും. മുട്ടവിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുഴു മറുബറിയില തിന്നു വളരും. പുഴു നാലു പ്രാവശ്യം തോട്ടരിക്കും. അതിനു ശേഷം അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ചില ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നു വരുന്ന പദാർത്ഥം കൊണ്ട് സിതക്കുന്തുലകൾ ഉണ്ടാക്കി അതു കൊണ്ട് ശരീരത്തിനു ചുറ്റും ഒരാവരണം നിർമ്മിക്കും. ഇതിനു കൊക്കൂൺ എന്നാണു പറയുക. ശലഭകോശം എന്നും ഇതിനു പേർ പറയാം. ഈ




ചിത്രം 135. പട്ടന്തൽപുഴുവിന്റെ ജീവനചക്രം

1. പട്ടന്തൽശലഭം 2. പട്ടന്തൽപുഴു. 3. പട്ടന്തൽപുഴുവിന്റെ കൊക്കൂൺ

കോശത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചു പട്ടന്തൽപുഴു രൂപാന്തരീകരണം വാിച്ചു ശലഭമായിത്തീരും. അതു കോശം പിളർന്നു പുറത്തു വരും. പട്ടുവ്യവസായികൾ ശലഭകോശം പിളരുന്നതിനു മുൻപെയാണ് അതിലെ പട്ടന്തൽ അടത്തി പട്ടണ്ടാക്കുന്നത്.

കൊതുക്: വെള്ളത്തിലാണു മുട്ടയിടുക. ഒരു കൊതുക് ഒരിക്കൽ. ഇരുന്നൂറോളം മുട്ടയിടും. മുട്ടകൾ ഒന്നിച്ചു ഒട്ടിച്ചേർന്നു കിടക്കും. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം മുട്ട വിരിഞ്ഞു ലാർവ പുറത്തു വരും. ലാർവക്ക് തല, വക്ഷസ്സ്, ഉദരം എന്നീ മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. തല വലിയതാണ്. അതിൽ ഒരു ജോഡി സ്റ്റാർകളും വായയും അതിനു ചുറ്റുമായി വരണാവയവങ്ങളായ ഹനക്കളും ചിബുകങ്ങളും കാണാം. വെള്ളത്തിലുള്ള ചെറുസസ്യങ്ങളും പ്രാണികളുമാണു ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം. വക്ഷസ്സിനു തലയേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടും. ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ഖണ്ഡം വെണ്ഡം കാണു. ഉദരത്തിൽ 9 ഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ ഖണ്ഡങ്ങളിലും രോമമുള്ളതുകാണാം. എട്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തായി ശ്വാസനനാളം പുറത്തേക്കു തുറക്കും. ഈ ഭാഗം ജലനിരപ്പിനുപരിയായി വെച്ചാണു ലാർവ വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക. ഒരാഴ്ചക്കാലം ലാർവദശ




ചിത്രം 136. കൊതുക്കിന്റെ ജീവനചക്രം-ഇടത്തു അനോഫിലിസ് കൊതുക്കും വലത്തു ക്യൂലക്സ് കൊതുക്കും

1. മുട്ടകൾ 2. ലാർവ 3. പൂപ്പ 4. മുതിർന്ന കൊതുക്.

നിലനിൽക്കും. അതിനു ശേഷം അത് പൂപ്പദശയിലേക്കു കടക്കും. ഈ ദശയിൽ പുഴുവിനു വലിയൊരു ശിരോവക്ഷസ്സും പരന്ന ഉദാവും ആണുണ്ടാവുക. ഉദരം ശിരോവക്ഷസ്സിനടിയിലേക്കു മടക്കി വെച്ചിരിക്കും. ശിരോവക്ഷസ്സിന്റെ ഉപരിതലത്തിലായി രണ്ടു ശ്വാസനാളങ്ങൾ പുറത്തേക്കു തുറക്കുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിനു ശേഷം പൂപ്പയുടെ പുറം തൊലി പിളർന്നു കൊതുക്കിന്റെ കണ്ണു പുറത്തു വരുന്നു.

കഴിയാന: തുമ്പിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഏൻഡയൺ എന്നു പേരായ ഒരു പ്രാണിയുടെ ലാർവയാണു കഴിയാന. ഈ പ്രാണി മണ്ണിലാണു മുട്ടയിടുക. മുട്ട



ചിത്രം 137. കഴിയാന.

1. ലാർവ 2. മുതിർന്ന പ്രാണി.


വിവിധങ്ങളാകുന്ന കണ്ടൂ കഴിയാനയായിത്തീരുന്നു. ഇരയെ പിടിച്ചു അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന രസം വലിച്ചു കുടിച്ചാണു കഴിയാന വളരുക. അതിനു പറ്റിയ വദനാവയവങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. തുമ്പിക്കൈ പോലെ കാണുന്ന അവയവമാണിതിനുപയോഗിക്കുക. ലാർവദശ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയാന പറക്കുന്ന പ്രാണിയായിത്തീരും. രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ലാർവ മൺതരികൾ ഒട്ടിച്ചു ചേത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരാവരണം നിർമിക്കും. പിന്നീടുള്ള ദശയിൽ അതിനെ പൂപ്പ എന്നു വിളിക്കുന്നു. പൂപ്പദശയിലാണു രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുക.

അരാക്ക്നീഡ: തേൾ, എട്ടുകാലി (ചിലന്തി), ചെള്ള (തെള്ള), ഉണ്ണി എന്നീ ജീവികൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. ഇവ പ്രധാനമായി കരയിലാണു ജീവിക്കുന്നത്. മിക്ക ചെള്ളുകളും ഉണ്ണികളും പശു, നായ മുതലായ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പരാജീവികളായി കഴിയുന്നു. മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നവയും ഉണ്ടു്. അരളുണ്ടു് (*Limulus*) എന്ന ജീവിയും എട്ടുകാലിവർഗത്തിൽ തന്നെ യാണു പെടുന്നത്. ഇതു് കടലിലാണു വാസം.

ഈ വർഗത്തിലെ ജീവികൾക്കു് എട്ടു കാലുകളാണുണ്ടാവുക. സ്പർശികൾ കാണുകയില്ല. ശരീരത്തിൽ ശിരസ്സും ഉദരവും ഉണ്ടു്. തേളിന്റെ ഉദരഭാഗത്തിന്റെ പിൻവശം മെലിഞ്ഞു നീണ്ടു് വാൽ പോലെയിരിക്കും. ഈ ഭാഗം വാലാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മെലിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ അറ്റത്താണു വിഷഗ്രന്ഥിയും വിഷം കത്തിവെക്കാനുള്ള മുളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

തലയുടെ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള കൊടിൽ പോലത്തെ ഇടക്കികൾ കൊണ്ടാണു് ഇരപിടിക്കുക. ഈ അവയവങ്ങൾക്കു പാദസ്പർശികൾ എന്നും പറയാം. ഇരയുടെ രസം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണു് തേൾ ചെയ്യുന്നത്.


തേളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതു് മുട്ടയിടുന്നതിനു പകരം കണ്ടൂക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന എന്നതാണു്. കണ്ടൂക്കൾ തള്ളയുടെ പുറത്തു പററിങ്ങും.



ചിത്രം 138. തേൾ.

1. അംഗുലി 2. പ്രോസോമ 3. മെറാസോമ 4. പാദം
5. പശ്ചാത്തദദംശനം 6. മിസോസോമ.


ചിലന്തിവർഗത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. ചില നിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനകാര്യം അവ കെട്ടുന്ന വലയാണ്. ഓരോ തരക്കാരും ഓരോ പ്രത്യേക മാതൃകയിലാണ് വല നെയ്യുക. ശരീരത്തിലെ ഉദാഹരണമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടു മൂന്നു ജോഡി നെയ്ത്തുകളുണ്ടാകാം വല നെയ്യുന്നത്. ഓരോ കണ്ണിക്കുമിടയിൽ ഓരോ ഗ്രന്ഥിയുണ്ടാകും. ഇതിൽ



ചിത്രം 139. എട്ടുകാലി.

ഇണചേരൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെൺചിലന്തി ആണിനെ തിന്നും. ഒരണ്ഡസഞ്ചി നെയ്യുണ്ടാക്കി അതിലാണ് പെണ്ണു മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കുക. മിക്ക ചിലന്തികളും ഈ അൺഡസഞ്ചി പോറി നടക്കാറുണ്ട്. ചിലവ അൺഡസഞ്ചി എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചുപോകുന്നു.

ചെള്ളം ഉണ്ണിയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. അവ പരജീവികളെന്ന നിലയ്ക്കു വളത്തുമുഗങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയും ശല്യം ചെയ്യുന്നു. അവയുടെ വദനാവയവങ്ങൾ തുളയ്ക്കാനും രസം വലിച്ചു കടിക്കാനും പാറുന്ന വിധത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കും. ശരീരം ചെറുതാണ്. കണ്ണുകളില്ല.



ചിത്രം 140. ചൊറിച്ചെള്ളം

1. മനുഷ്യദേഹത്തിൽ പെൺചെള്ളം ഇട്ടുന മുട്ട 2. മുട്ട വലുതാക്കിയതു് 3. ലാർവ 4. മുതിർന്ന പെൺ. (അഭ്യക്ഷവിക്ഷണം) 5. മുതിർന്ന ആൺ 6. മുതിർന്ന പെൺ (അപാക്ഷവിക്ഷണം)

സാർക്കോപ് ടെസ് സ്കേബി (Sarcoptes scabiei) എന്ന പേരായ ഉണ്ണി (mite) മനുഷ്യന്റെ തൊലിയിൽ തുളച്ചു കയറി ണലുണ്ടാക്കി അവിടെ വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണിയുടെ ബാധകൊണ്ടാണ് ചൊറി (itch) എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പ്രാണി നന്നേ ചെറുതായിരിക്കും. തപക്കിനടിയിലുണ്ടാകുന്ന ണലിലാണു മുട്ടയിടുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന രോമകൂപങ്ങളിലേക്കു പോകും. ലാർവ്വക്ക് ആറു കാലുകളുണ്ടു കാണൂ. അതു മോറാട്ട് ചെയ്തു എട്ടു കാലുകളുള്ള ഉണ്ണിയായിത്തീരും.

മററു ചെറുമെലങ്ങൾ

(a) മൈലം എക്റോപ്രോക്റ്ററ

സൂക്ഷ്മവും സ്ഥാനബദ്ധവുമായ ഒരു സമൂഹജന്തുവിഭാഗമാണ് എക്റോപ്രോക്റ്ററ. ദേഹത്തിൽ വൃത്തഖണ്ഡങ്ങളോ വൃക്കകളോ രക്തചംക്രമണവ്യൂഹമോ ഇവയ്ക്കില്ല. സ്വയം ഉരറിയുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പശിമയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിച്ച ബാഹ്യാവരണത്തിലാണ് ശരീരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വൃത്താകാരത്തിൽ ഒരു ചൂഡാഗ്രാഹി (lephophore) ഈ മൈലത്തിൽ പെട്ട ജന്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വായയും ഗുദവും തൊട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരത്തടികളിലും പാറമേലും വളരുന്ന ഒരു എക്റോപ്രോക്റ്ററയുടെ പടം 1558-ൽ റോൻഡെലെ വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ ഒരു സസ്യപ്രാണിവർഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ജന്തുസ്വഭാവങ്ങൾ 1599-ൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. 1830-ൽ ജെ. ബി. തോംസൺ ഈ വർഗത്തിന് പോളിസോവ എന്ന് പേർ നൽകി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം എറൻബർഗ് ഇവയെ ബ്രൂയോസോവ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് ബ്രൂയോസോവ എന്ന പേർ ഏറെക്കുറെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പകരം എക്റോപ്രോക്റ്ററ എന്ന പേരാണ് ഈ ജന്തുവിഭാഗത്തിന് ഇന്ന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.


സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ

1. ദ്വിപാർശ്വസമമിതി, 2. വൃത്തഖണ്ഡത്തിന്റെ അഭാവം, 3. മൂന്ന് ആവരണപാളികൾ, 4. സമൂഹസ്വഭാവം, 5. അചലമായ സമൂഹങ്ങൾ, 6. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും പ്രത്യേകമായ ദേഹങ്ങൾ, 7. U-ആകൃതിയിലുള്ള ഫേനതാളം, 8. വായയ്ക്കുചുറ്റും ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിക്കാവുന്ന ഒരു ചൂഡാഗ്രാഹി, 9. ചൂഡാഗ്രാഹിക്ക് പുറത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗുദപാദം, 10. ശരീരഭാരം, 11. രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം, ശ്വാസനേന്ദ്രിയം, വൃക്കകൾ എന്നിവയുടെ അഭാവം, 12. വായയ്ക്കും ഗുദപാദത്തിനുമിടയ്ക്ക് ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺ.

13. സാധാരണയായി ഏകസ്ഥവ്യഞ്ജനജീവികൾ (monoecious), 14. ജീവിതശൈലിൽ ട്രാക്കോഫോറിനോട്ട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ലാർവ, 15. അലൈംഗികമുകളനം വഴിയുള്ള സമുഹത്തിന്റെ വളർച്ച.

ബ്രൂല പെറ്റുവ

ബ്രൂല ലോകമാട്ടുക്കും കണ്ടുവരുന്നു. കടൽക്കരയിലെ പാറകളിലും ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടൽപ്പായലുകളിലും മരത്തടികളിലും പാറിപ്പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഇവയുടെ സമൂഹങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചു മാത്രം നീളംവെക്കുന്നു. തവിട്ടോ ഊതനിറമോ ഉള്ള ഇവ ഒരുപിടി നെൽക്കതിര പോലെയിരിക്കുന്നു. ദ്വിശാഖ (dichotomous) മാത്രമാണ് ബ്രൂലയുടെ സമൂഹം. സമൂഹത്തിന്റെ തണ്ട് വൃക്തിത്വമുള്ള ഒട്ടനവധി ചെറുജീവികളാകാറുള്ളതാണ്. ഇവയെ സുവോയ്ഡുകൾ എന്നു പറയുന്നു. ഓരോ സുവോയ്ഡിനും കഴലുപോലെയുള്ള ഒരു ദഹോവരണവും (zoecium) അതിനകത്ത് പോളിപ്പൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചുവരുന്ന ഉദലമായ ജൈവാവയവങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു പുറം തോട്ടം അതിനുള്ളിലായി കോശനിർമ്മിതമായ ഒരു ബാഹ്യ ചർമ്മപാളിയും ചേർന്നാണ് സുവേഷ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സുവേഷ്യത്തിന്റെയും അടിഭാഗം വണ്ണം കുറഞ്ഞും അഗ്രം വീതി കൂടിയതുമാണ്.



ചിത്രം 141. എക്ടോപ്രോക്റ്ററ

A. മുഴുവൻ കോളനി B. കോളനിയുടെ ഒരു ഭാഗം C. രണ്ടു വൃക്തികൾ

1. ഗാംഗ്ളിയോൺ 2. ഗുദം 3. കൂട്ടിക്കിൾ 4. അധിചർമ്മം
5. അബ്സോൾയം 6. ആന്ത്രാചർമ്മം 7. ഫ്യൂണിക്കുലസ് 8. വൃഷണം
9. ഭ്രൂണം 10. ഭ്രൂണധാനി 11. പേശി 12. ഏവിക്യുലാറിയം
13. ജീവകധാനി 14. സിലോം 15. വായ 16. ടെൻറാക്കിൾ
17. ഗുസനി.

വണ്ണത്തേക്കാൾ നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടി നീളം സുവേഷ്യത്തിനുണ്ട്. ഈ സുവേഷ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ അറ്റം പുറത്തേയ്ക്ക് തുറന്നായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലായി രണ്ടു മുളകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സുവേഷ്യത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ പക്ഷിത്തല പോലുള്ള അവികലേറിയം എന്ന ഒരവയവം കാണാം. തുറക്കുവാനും അടയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്ന അവികലേറിയത്തിന്റെ കൊക്കുകൾ, ദേഹത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കയ്യാനിയുള്ള ബാഹ്യ വസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പോളിപ്പെഡിന്റെ മുൻഭാഗം പുറത്തേയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ ഒരു ഇൻട്രാവേർട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇൻട്രാവേർട്ടിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിയ്ക്കുമ്പോൾ അനുബന്ധിതമായ സുവേഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തു് പുറം തോട്ട് നേരിയതാണ്.

ഇൻട്രാവേർട്ടിന്റെ അറ്റത്തു് ഒരു ഉരുണ്ട വരമ്പുണ്ട്. വായയ്ക്കു ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ വരമ്പിന്മേൽ സിലിയങ്ങളോടുകൂടിയ ഗ്രാഹികളും (tentacle) കാണാം. ഈ വരമ്പാണ് ലോഫോഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂഡാഗ്രാഹി. ശ്വാസിയ്ക്കുവാനും ഇരയെ പിടിയ്ക്കുവാനും ഉപകരിക്കുന്ന ഈ അവയവം ഒരു സ്പർശനേന്ദ്രിയം കൂടിയാണ്. ചൂഡാഗ്രാഹിയ്ക്കും അതിനു പുറത്തു്, തൊട്ടടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുദഭാഗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ ജന്തുവിന്റെ മുതുകു്. ഒരു ശ്വാവ്സിന്റെ വിരലുകൾ ഉള്ളിലോട്ടു് തള്ളുന്നതുപോലെ, പേശികളുടെ സഹായത്താൽ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഹികൾ ഒരു പ്രത്യേക അറയിൽ വിശ്രമിയ്ക്കുന്നു.

വളർച്ചയുടെ ഒരു ദശയിൽ സൈഫോണ്ടിസ് (syphonautes) എന്നു് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, സ്വതന്ത്രമായി നിന്നി ജീവിയ്ക്കുന്ന ഒരു ലാർവയുണ്ട്. മണിയുടെ ആകൃതിയാണ് ഈ ലാർവയ്ക്കുള്ളതു്. പാർശ്വങ്ങൾ ഒട്ടിയ ഇതിനു് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള രണ്ടു് പുറത്തോട്ടുകളുണ്ട്. മണിയുടെ ചുവടു് ലാർവയുടെ ഉദരഭാഗമാണ്.

(b) ഫൈലം ഫെറോണിഡ

കടൽജീവികളായ ഫെറോണിഡുകൾക്കു് പൂങ്കുളുടെ ആകാരമാണുള്ളതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ വൃത്തഖണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ല. വായയ്ക്കു ചുറ്റും കതിരലാടാകൃതിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ചൂഡാഗ്രാഹിയും വളഞ്ഞ ദേഹനാളവും രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ അഭാവവും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

മുളുർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1845-ൽ ഒട്ടേറെ ചെറുജീവികൾ കടൽപ്പുറപ്പിൽ നിന്നിറക്കിയെന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇവ പൂർണ്ണവർളച്ചയെത്തിയ ജന്തുക്കളാണെന്നു് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ജന്തുവിന്റെ ലാർവകൾ മാത്രമായിരുന്നു അവ. വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ ഫെറോണിഡുകളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതു് പിന്നെയും പതിമൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്. 1867-ൽ മാത്രമേ, മുളുർ നേരത്തേ കണ്ടെ


ത്തിയ ലാർവകൾ ഫൊറോണിഡുകളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതായി മനസ്സിലായുള്ള.

സാമാന്യവ്യവസ്ഥകൾ

1. ചിലിപാർശ്വസമമിതി; 2. മൂന്നു ശരീരപാളികൾ; 3. വൃത്തഖണ്ഡത്തിന്റെ അഭാവം; 4. ഉരുണ്ട ദേഹത്തിന്റെ അറ്റത്തു് കുതിരലാടാകൃതിയിൽ രണ്ടു വരിയുള്ള ചുഡാഗ്രാഹി; 5. U-ആകൃതിയിലുള്ള ഹൈനനാളം; തന്മൂലം വായ ചുഡാഗ്രാഹിക്കു് നടുവിലും ഗുദഭാഗം അതിന്നുപുറത്തും; 6. പുറത്തേക്കു് തുറക്കാത്ത രക്തചംക്രമണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് രണ്ടു പ്രധാനരക്തക്കുഴലുകളും അതിൽ നിന്നുള്ള ശാഖകളും; 7. ഹിമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയ രക്താണുക്കൾ; 8. ശ്വാസനാവയവങ്ങളുടെ അഭാവം; 9. ബാഹ്യചർമ്മത്തിന്നടിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാഡികൾ; 10. വായയ്ക്കു ചുറ്റും ഒരു നാഡിവളയവും ശരീരാവയവങ്ങളിലേക്കു് നാഡികളും; 11. ഉഭയലിംഗി; 12. രക്തക്കുഴലിന്റെ പരിസരത്തു് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജനനഗ്രന്ഥി; 13. ജീവിതദശയിൽ ട്രോക്കോഫോർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആക്റ്റിനോടോക്ക ലാർവ.

പ്രരൂപം ഫൊറോണിഡ്

കടൽനിവാസിയായ ഫൊറോണിഡ് 1 മി.മീ. മുതൽ 1.5 മി.മീ. വരെ നീളം വെക്കുന്നു. സാധാരണയായി, കറുത്ത കൂട്ടതൽ എണ്ണം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവ തമ്മിൽ ഒന്നിനോടൊന്നു് ശാരീരികബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോൾ കടലിന്നടിയിൽ കഴലുകൾ ചേരിൽ പുതി, ചുഡാഗ്രാഹി മാത്രം പുറത്തേക്കിട്ടിരിക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിൽ ഫൊറോണിഡുകൾ കൂട്ടം ചേർന്നു് കടലിന്നടിയിലെ മണൽത്തട്ടിൽ കുന്നു കൂടിയതായും കാണാം. ഓരോ ജന്തുവും തുകൽ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കഴലിനുള്ളിൽ



ചിത്രം 142. ഫൊറോണിഡ.

A ഏതാനും വ്യക്തികൾ. B ആന്തരഘടന.

1. ടെൻറക്കിളുകൾ 2. ലോഫോഫോർ 3. വായ 4. ഗുദം 5. വൃക്കകൾ 6. വൃക്ക 7. റെക്റ്റം 8. ഗുദം 9. മെസൻട്രി 10. ആത്രം 11. ദേഹഭിത്തി 12. സിലോം 13. അണ്ഡാശയം 14. രക്തക്കുഴലുകൾ 15. ആമാശയം 16. വൃഷണം

വസിക്കുന്നു. ഈ തുകയ്ക്കുവേണ്ടി പലപ്പോഴും മണൽതരികളും സ്പഞ്ചിന്റെ ചെറുക്കുളകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള തപക് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് ഉറവിടം കഴൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ദേഹം വൃത്തവണ്ണങ്ങളിലാത്തതും ഉരുണ്ടതാണ്. കഴലിനുള്ളിൽ അയഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗം പുറത്തേക്ക് നീട്ടാൻ കഴിവുള്ളതാണ്.

ചുഡാഗ്രാഹി

ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് കതിരലാടത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു വരമ്പുണ്ട്. ഈ വരമ്പിന്റെ രണ്ടറ്റവും സർപ്പിലാകൃതിയിൽ ഉള്ളിലോട്ടു് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടയായ ഈ വരമ്പിലാണ് ഗ്രാഹികൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു വരി ഗ്രാഹികളാണ് ഉള്ളതെന്നർത്ഥം. രണ്ടു വരി ഗ്രാഹികളുള്ളതിൽ ഉള്ളിലത്തേതു് മധ്യഭാഗത്തു് അപൂർണ്ണമാണ്. ഉൾപൊള്ളയായ ഗ്രാഹികൾ ഭക്ഷണസമ്പാദനത്തിനു് സഹായിക്കുന്നു. ഗ്രാഹികളും അവയുടെ വരമ്പും ചേർന്നിതെയാണ് ചുഡാഗ്രാഹി എന്നു് ചരയുന്നത്.

രണ്ടു വരി ഗ്രാഹികളുടെ ഇടയിലുള്ള ചാലിലാണ് വായയുടെ സ്ഥാനം. വായയ്ക്കു് മുകളിൽ തുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എപ്പിസ്റ്റോ എന്ന അവയവം, വായക്കും ഉൾവരഗ്രാഹികൾക്കും ഇടയിലാണ്. ചുഡാഗ്രാഹിയ്ക്കു് വെളിയിലാണ് ഗുദഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗുദഭാഗത്തിനും വായക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ഫൊറോണിസിന്റെ മുതുകു്. ഉൾം മുഖ്യദേഹഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ചുഡാഗ്രാഹിക്ക് ചുരുങ്ങുവാനും വികസിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവില്ലെന്നിരിക്കിലും അവയെ ഭാഗികമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഗുദഭാഗത്തിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലായി, രണ്ടു വൃക്കകളും അവയുടെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള പോരങ്ങളും ദൃശ്യമാണ്.

ജീവിതദശയിൽ ആക്റ്റീവനോടോക്ക എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലാർവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കടൽപ്പുറപ്പിൽ കുറച്ചു നേരം സ്വതന്ത്രമായി നീന്തിക്കഴിച്ച ശേഷം ഈ ലാർവ, വെള്ളത്തിനടിയിലേക്കു് താഴുകയും സാവകാശത്തിൽ രൂപാന്തരീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

(c) ഫൈലം ബ്രാക്കിയോപോഡ

“വിളക്കുകക്കൾ” എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാക്കിയോപോഡുകൾ കടലിൽ വ്യത്യസ്ത ആഴത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോടു് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിയുന്ന ജന്തുക്കളാണ്. മൊളസ്കയിലെ ഇരട്ടത്തോട്ടുള്ള കക്കുകളോടു് ഇവയ്ക്കു് ബാഹ്യമായ സാദൃശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയിൽ തോടുകൾ പാർശ്വങ്ങളല്ല; മേൽക്കിഴയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുറത്തോടുകളും ഒരു ചുഡാഗ്രാഹിയും ചേർന്നാൽ, പുറത്തുകാലത്തെ റോമാരാജ്യത്തു് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എണ്ണ വിളക്കുകളോടു് സാമ്യതയുണ്ട്. ‘വിളക്കുകക്കൾ’ എന്ന പേർ വിശാൻ കാണും ഇതായിരിക്കും.

ഭൂചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പൗരാണികമായ കാംബ്രിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവൻ കാണപ്പെട്ടവൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ പുരാജീവിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

ബ്രാഹ്മിയോപോധകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രോൽപ്പത്തിയുള്ള പാറയുടെ നിരകളിൽ ഇവയുടെ ഫോസിലുകൾ സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്നു.

വളരെക്കാലം ഇവയെ മൊളസ്ക എന്ന ഫൈലത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തി വന്നിരുന്നത്. ലോമങ്ങളോടുകൂടിയ ഗ്രാഹികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ പിന്നീട് പോളിസോവ തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളോടൊന്നിച്ചു മൊളസ്കോയ്ക്കായി എന്ന ഫൈലത്തിലും പിന്നെ കരക്കാലം ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഫൈലമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.


സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ

1. ദ്വിപാർശ്വസമമിതി; 2. മൂന്ന് ആവരണപാളികൾ; 3. വൃത്തഖണ്ഡത്തിന്റെ അഭാവം; 4. മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ട് പുറത്തോട്ടുകൾ; 5. പാറിപ്പിടിക്കുവാനായി ദൃഢമായ ഒരു ഞെട്ടി; 6. ചുഡാഗ്രാഹി; 7. ഗുദഭാഗത്തോടു കൂടിയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ദഹനനാളം; 8. ശരീരരംഗം; 9. ഒരു ചെറിയ ഹൃദയം; 10. ഒന്നോ രണ്ടോ ജോഡി വൃക്കകളുടെ സഹായത്താൽ വിസർജനം; 11. തൊണ്ടയ്ക്കു ചുറ്റും ഒരു നാഡിവളയം; 12. ലൈംഗികപ്രജനനം മാത്രം; 13. ജീവിതദശയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നീന്തിക്കളിക്കുന്ന ഒരു ലാർവ്വ.

പ്രവൃത്തികൾ: 1. മാതൃലോകീയ 2. ലിങ്ക്സ്കൂല

ദൃഢമായ ശരീരഭാഗം രണ്ട് പുറത്തോട്ടുകൾക്കിടയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ മുകളിലത്തേത് സാധാരണയായി, സ്വൽപ്പം ചെറുതാണ്. ഷെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഭാഗം ജീവിയുടെ പിൻഭാഗമാണ്; തുറക്കുന്നതു മുൻഭാഗവും. കീഴ്ത്തോട്ട് ഒരു കഴലുമാതിരി നില്ക്കിരിക്കും. പിറകുവശത്ത് ശരീരം, പേശിനിർമ്മിതമായ ഒരു ഞെട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഞെട്ടി കഴലുമാതിരിയുള്ള അഗ്രഭാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് പുറത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ ജീവി പാറകളിലും മാറ്റം പാറിപ്പിടിക്കുന്നത്. ചില സ്പീഷിസുകളിൽ ഞെട്ടികൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ജീവി കീഴ്ഭാഗത്തെ ഷെല്ലു കൊണ്ടു തന്നെ കല്ലുകൾ മുതലായവയോട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.

അടിയിലെ ഷെല്ലിന്റെ കഴലുപോലുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ മുൻവശം കൊക്ക പോലെ വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വിജാവരിരേഖ. ഈ രേഖയിൽ കൂടിയാണ് പുറത്തോട്ടുകൾ രണ്ടും കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിജാവരിരേഖയുടെ മുന്നിലായി ഉള്ളിൽ ഒരു ജോഡി പല്ലുകളുണ്ട്. ഷെല്ലിന്റെ ഉൾവശത്ത് ചില കഴികൾ കാണാം. തോട്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന വിവിധതരം പേശികൾ ഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ പാടുകളാണ് ഇവ.



ചിത്രം 143. ബ്രാക്കിയോപോഡ.

A—B. മുഴുജന്തുവിന്റെ രണ്ടുവീക്ഷണം. C. ആന്തരഘടന.

1.മുനഗു. 2.ലോഫോഫോർ 3.ടെൻറാക്കിളുകൾ 4.വാ. 5.സെപ്റ്റം 6.“കരൾ” 7.ആമാശയം 8.സിലോ 9.പെഡൻകൾ 10.പിന്നഗു 11.ആന്തം 12.പേശികൾ 13.അഭ്യക്ഷവാൽവ് 14.അഭ്യക്ഷജനനഗ്രന്ഥി. 15.വൃതി

മേൽനോട്ടിന് കഴലില്ല. എന്നാൽ വിജാവരിരേഖയിൽ ചില പ്രലംബങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഷെല്ലുകൾ അടയുമ്പോൾ ഇവ അടിയിലെ ഷെല്ലിലെ പല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവിൽ ചെന്നുപറുന്നു. ഈ ഷെല്ലിലും ഉൾഭാഗത്തെ പേശികൾ ഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ പാടുകൾ കാണാവുന്നതാണു്.

ഓരോ ഷെല്ലിനോടും ചേർന്നു് ശരീരഭിത്തിയുടെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഓരോ മാന്റിൽളും കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കിടയിലാണു് മാന്റിൽ കഹരം.

ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഓരോനോട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതു് സർപ്പിലാകൃതിയിലുള്ള രണ്ടു ചുഡാഗ്രാഹികളാണു്. ഈ ചുഡാഗ്രാഹി, ഉൾപൊള്ളയായവയാണു്. ഇതിനകത്തെ കഹരത്തിനെ സൈനസ് എന്നു് വിളിക്കുന്നു.

വളർച്ചയ്ക്കിടയ്ക്കു് സ്ഥിരതയുമായി നിന്നു് ഒരു ലാർവ കാണപ്പെടുന്നു. അൽപസമയത്തെ സ്വാശ്രയജീവിതത്തിനു ശേഷം ഈ ലാർവ വെള്ളത്തിനടിയിലേയ്ക്കു് താഴുകയും പിന്നീടു് അതിന്റെ പാദഗാത്രം കൊണ്ടു് കടലിനടിയിലെ പാറകളിൽ വാറിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(d) മൈലം സൈപസ്കലിഡ

ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘പിനട്ടുവോ’ (Peanut worm = കടലപ്പുഴു) എന്നു് വിളിച്ചുവരുന്ന, വൃത്തവണ്ണമില്ലാത്ത നിണ്ടുരുണ്ട ഒരുതരം ജീവികളെ കടലോരങ്ങളിലെ മണ്ണിൽ പുതിയ നിലയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ടു്. മഞ്ഞയോ ചാരനിറമോ ഉള്ള ഈ പുഴുക്കൾ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചളിയിൽ U-ആകൃതിയിലുള്ള കഴലുകളിലാണു് ജീവിക്കാറു്. ഇവയെ പൊതുവെ ‘സൈപസ്കലോ

യംശുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നു. ഈ ജന്തുക്കൾക്ക് ശരീരരോമ ഉണ്ട്. മുൻഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വായ, ഗ്രാഹികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


സാമാനപ്രലക്ഷണങ്ങൾ

1. ദ്വിപാർശ്വസമമിതി; 2. ശരീരത്തിന് മുമ്പ് ആവരണപാളികൾ; 3. മുന്നിൽ, ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞുവന്ന ഒരു ഇൻട്രാവേർട്ട്, 4. വായക്കു ചുറ്റും ഗ്രാഹികൾ; 5. വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശരീരരോമം; 6. മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ട് രക്തക്കുഴലുകളും അവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാഹികൾക്കിടയിൽ ഒരു കഴൽവളയവും ഗുദോരത്തിനടുത്തു തുറക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വൃക്കയും 7. ദ്വിഷ്വവൃഞ്ജനാവസ്ഥ; 8. ടോക്കോഫോർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ലാർവ്വ.

സൈപൻക്ലിഡുകൾ വളരെ പുരാതനകാലം മുതൽക്കു തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും 1555-ൽ റോൻഡെലെ (Rondelet) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി രണ്ട് സൈപൻക്ലിഡായ്ക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി വിവരിച്ചത്. പിന്നെ കറേക്കാലം ഇവയെ പൂക്കൾ (vermer) എന്ന ഒരു പൊതുവിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

പ്രത്യേകം സൈപൻക്ലിഡ്സ്

സൈപൻക്ലിഡ്സ് ആഴം കുറഞ്ഞ കടലോരങ്ങളിൽ മണ്ണിലോ പാറകളിലുള്ള വിള്ളലുകളിലോ ആണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. നീണ്ട



ചിത്രം 144. സൈപൻക്ലിഡായ്ക്കിടയിൽ.

A. ആന്തരഘടന. B. ഇൻട്രാവേർട്ട് ഭാഗത്തിനകത്തേക്കു വലിച്ചത്. C. മുഴുജന്തു-ബാഹ്യവീക്ഷണം.

1. ടെൻറാക്കിളുകൾ 2. വായ. 3. മണ്ണിപ്പാ 4. ഗുദം 5. വൃക്കകൾ 6. നാഡിത്തന്തു 7. ആകാശകപേശി 8. ഗോണാഡ്. 9. ഭാഗികഭാഗം 10. ഭാഗികഭാഗം 11. പേശികൾ 12. സിലോം 13. ഇൻട്രാവേർട്ട് 14. ഭാഗം.

ശരീരം ഉണ്ടെന്നും മുൻവശം വണ്ണം കറഞ്ഞതുമാണ്. അത്ര ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട്. അകത്തേയ്ക്ക് വലിക്കാവുന്ന ഭാഗത്തെ ഇൻട്രാവർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അഗ്രശിഖരത്തിലാണ് ഈ ജന്തുവിന്റെ വായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വായയ്ക്കു ചുറ്റും ഉള്ള അധിരോഹം ഗ്രാഹികളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം കൈററിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒട്ടേറെ പാപ്പില്ലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ തലക്കിൽ നിരയെ ദീർഘചതുരങ്ങൾ കാണാം. ഗുദഭാഗം വായയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ശരീരത്തിന്റെ പുറകിലായി തുറക്കുന്നു. തന്മൂലം ദഹനനാളം U-ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞതാണ്.

(c) ഫൈലം എക്സിയറോയ്ഡിയ


ഏകദേശം 60 സ്പീഷിസുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമാന്യേന ചെറിയ ഒരു ഫൈലമാണ് എക്സിയറോയ്ഡിയ. ചുവപ്പോ മഞ്ഞയോ ചാര നിറമോ ഉള്ള ഇവ കടലിലെ ചെളിയിലും പുഴിയിലും പാറകൾക്കിടയിലും വസിക്കുന്നു. ആഴം കറഞ്ഞ കടലോരങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്.

സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ

1. ദ്വിപാർശ്വസമമിതി; 2. മൂന്ന് ശരീരപാളികൾ; 3. വൃത്തഖണ്ഡങ്ങളുടെ അഭാവം; 4. ഉണ്ടെ ശരീരത്തിന്റെ മുൻവശത്തു വളയുന്നതിനും ചുരുക്കുന്നതിനും കഴിവുള്ളതും എന്നാൽ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒരു തുമ്പി (ഹൂബ്സ്-proboscis); 5. പ്രൊബോസിസ്സിനടിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വായയും മറ്റേ അറ്റത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗുദഭാഗവും; 6. മുൻഭാഗത്തു ശരീരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ജോഡി ശൂക (seta); 7. വിന്യതമായ ശരീരരേഖ; 8. മുതുകിലും ഉദരഭാഗത്തും ഓരോ രക്തക്കുഴലുകൾ; 9. ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ജോഡി വൃക്കകൾ; 10. ദ്വിഷുവൃഞ്ചനാവസ്ഥ; 11. ടോക്കോഫോർ ലാർവ്.

വ്യവസ്ഥ: 1. എക്സിയറോസ് 2. ബോണെല്ലിയ

സാമാന്യം വ്യാപകമായ വിതരണമുള്ള എക്സിയറോസ് ചളിയിലും മണ്ണിലും ചെറുമാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ജീവിക്കുന്നു. ശരീരം ഉണ്ടെന്നും. മുൻവശത്തുള്ള വായയുടെ മുകളിൽ തുണിനിൽക്കുന്ന ഒരു തുമ്പിയുണ്ട്. ഇതിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് വലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ തുമ്പിയുടെ അടിഭാഗത്തു, നീളത്തിൽ വായ വരെ എത്തുന്ന ഒരു ചാലുണ്ട്. ഇതിൽ നിരയെ ലോമങ്ങളും കാണാം. ശ്ലേഷ്മാപുതമായ ഈ തുമ്പിയുടെ സഹായത്താലാണ് എക്സിയറോസ് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നത്. ഉപദ്രവിയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ തുമ്പിയെ കൈവിട്ടുകയെന്നതാണ് ജന്തു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം. നഷ്ടപ്പെട്ട തുമ്പികളുടെ പുനർവൃദ്ധി സാധ്യവുമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ തലഭാഗത്തായി, അടിയിൽ ചുണ്ടലിന്റെ രൂപമുള്ള രണ്ട് ശൂകങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗുദഭാഗത്തിന് ചുറ്റും രണ്ടു വരിയായി ഗുദശൂകങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്.



ചിത്രം 145. എക്കിയറോയ്ഡിയ.

A. പുഴു പുഴിയിലുണ്ടാക്കിയ കഴിയിൽ, B. അഭ്യക്ഷവിക്ഷണം, C. ആന്തരഘടന.

1. ആവരണം 2. പുഴി 3. ജലം 4. സിറാ 5. വൃക്കകുപാരം 6. ഗുദീയസിറാ 7. തുണു 8. രക്തക്കുഴൽ 9. നാഡി 10. വായ 11. സിറാസഞ്ചി 12. വൃക്ക 13. അഭ്യക്ഷരക്തക്കുഴൽ 14. നാഡിതന്തു 15. ഗൊണാഡ് 16. ഗുദീയഗ്രന്ഥി 17. ഗുദം 18. സിറാ 19. ആന്തരം 20. ദേഹഭിത്തി 21. സുലോ 22. ആന്ത്രാപുതസൈനസ് 23. ആമാശയം.

ശരീരരേഖ വിശദമാണ്. എക്കിയറോയിൽ ആൺപെൺ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവയുടെ ജീവിതദശയിൽ ഒരു ടോക്കോഫോർ ലാർവയും കണ്ടുവരുന്നു. ബോണെല്ലിയ വളരെ രസികതയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. ലൈംഗികചിത്ര പതലമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിൽ 'സ്ത്രീവർഗ്ഗ'ത്തിന് ഹരിതനിറമുള്ള ദീർഘവൃത്താകാരശരീരമാണുള്ളത്. ഇതിന്റെ നീളം കൂടിയ തുമ്പി, അറ്റത്തു് രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കും. എന്നാൽ ആൺബോണെല്ലിയ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വീടുന്നമാണ്. തുമ്പിയോ വായയോ ഗുദഭാഗമോ അവയില്ല. ശരീരം ചെറുതും ലോമങ്ങളാൽ ആവൃതവുമാണ്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ അവൻ പെൺബോണെല്ലിയയുടെ ഗളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് ഒടുവിൽ വൃക്കകത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ഒരു പാദോജിയെപ്പോലെ കാലയാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ഫൈലത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം കടലിൽ ആഴം കുറഞ്ഞ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ V-ആകൃതിയിൽ മാളങ്ങളുണ്ടാക്കി അതിൽ കുടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. വലിയ എക്കിയറോയ്ഡുകളെ ബെൽജിയം, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(f) ഫൈലം കിറോഗ്നാത്ത


ഒരാപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളാണ് കിറോഗ്നാത്തകൾ. വർഗീകരണത്തിൽ ഇവയുടെ സ്ഥാനം ഇനിയും കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആറ് ജനസുകളും ഏതാനും സ്പീഷീസുകളും മാത്രമേ ഈ ഫൈലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ശരീരപ്രകൃതിക്ക് ഒരു അവിനോട്ട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ശരപ്പുഴുക്കൾ (arrow worms) എന്നും ഇവയെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ശരീരം ഏകദേശം സുതാര്യമാണ്. സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നീന്തിക്കളിച്ചു് ഇവ ജീവിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. ഉരുണ്ട് ദീർഘാകാരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ജോഡി പാർശ്വപത്രങ്ങളും ഒരു പുച്ഛപത്രവും (caudal fin) ഉണ്ടായിരിക്കും.

സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ

1. ദ്വിലാർശ്വസമമിതി; 2. ശരീരഭിത്തിയിൽ മൂന്ന് പാളികൾ; 3. വൃത്തവണ്ഡത്തിന്റെ അഭാവം; 4. മെലിഞ്ഞ ശരീരവും പാർശ്വപത്രങ്ങളും 5. പൂർണ്ണമായ ദഹനനാളം; 6. മൂന്ന് ജോഡിയായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശരീരദോരം; 7. രക്തചംക്രമണം, ശ്വാസനം, വിസർജനം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അവയവങ്ങളുടെ അഭാവം; 8. മുതുകിലൂടെ ഉദരഭാഗത്തു് ഓരോ ഗാംഗ്ലിയോണും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടങ്ങിയ നാഡീവ്യൂഹം; 9. ദ്വിലിംഗാവസ്ഥ; 10. ലാർവയില്ലാതെയുള്ള വളർച്ച.

പ്രകൃപം സാജിറാ

കടലിൽ ഉപരിതലത്തിൽ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന സാജിറാ, സെലോഫൈൻ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ അമ്പുകളാണെന്നേ തോന്നൂ. ചില കാലങ്ങളിൽ ഇവ കടലിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുകയും മൽസ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. കടൽപ്പുഴു(marine plankton) ങ്ങളിൽ ഇവയെ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട്. സാജിറാ 20 മുതൽ 70 വരെ മി. മീ. നീളം വെക്കുന്നു.



ചിത്രം 146. കിറോഗ്നാത്ത: ആന്തരഘടന.

1.തലപ്പാവ് 2.വായ 3.മുള്ളുകൾ 4.അഭ്യക്ഷഗാംഗ്ളിയൻ 5.സംവേദപ്രദേശങ്ങൾ 6.ആന്തരം 7.അണ്ഡാശയം 8. അണ്ഡവാഹിനി 9.യോനി 10.വൃഷണം 11.ശുക്രിയസഞ്ചി 12.പുഷ്പിയചിരക് 13.പാർശ്വചിരക്.

ദീർഘാകൃതിയുള്ളതും ഉരുണ്ടതുമായ ശരീരം മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; തല, ഉടൽ, വാൽ. തല ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതാണ്. ഉടലിനെയും വാലിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് അടിഭാഗത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗുദദോരമാണ്. തലയുടെ അടിയിലുള്ള വായയുടെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും ഓരോ ഭലവും അതിന്മേൽ അറിവാൻ രൂപത്തിലുള്ള ധാരാളം ചെറുതുള്ളികളുണ്ട്. ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നതിലും അതിനെ പിന്നീടു് വായിലേക്കു് നയിക്കുന്നതിലും ഇവയ്ക്കു് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. ഒരു ജോഡി കണ്ണുകളും സാജിററയുണ്ട്.

ഉടലിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലായി രണ്ടു ജോഡി പത്ത്(fins)ങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വാലിനു ചുറ്റുമായി ഒരു പുല്ലുപതുവുണ്ട്.

ഋജുവായ ഭവനനാളം ഒരു ഗളവും കടലും ചേർന്നതാണ്. ശരീരദൂരം മൂന്നു ജോഡി അറകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കിരോറഗ്നാത്തുകൾ ഉഭയലിംഗികളാണ് (hermaphrodites). സേകം ശരീരത്തിനകത്തുവെച്ചു് നടക്കുന്നു. വളർച്ചയിൽ ലാർവകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല. മുട്ടകളിൽ നിന്നു് വിരിയുന്ന കൊച്ചു കിരോറഗ്നാത്തുകൾ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയവയിൽ നിന്നു് ഒട്ടും വ്യത്യാസമുള്ളവയല്ല.

(g) ഫൈലം പൊഗോനോഫോറ

പൊഗോനോഫോറുകൾ കടലിനടിയിൽ സ്വയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കഴലുകളിൽ ഒരായായി ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യയുടെ പസിഫിക് തീരത്തു നിന്നും ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ കടലുകളിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതലായും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു് തുടങ്ങിയതു് പൊഗോനോഫോറയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തോടെയാണെന്നു് പറയാം. 'സിബോഗ' എന്ന ഡച്ചുകപ്പൽ 1900-ാം മാണ്ടിൽ ഇൻഡോനേഷ്യൻ തീരത്തു നിന്നു് ആദ്യമായി ഒരു പുതിയ ജീവി വർഗത്തെ കണ്ടെത്തി. സിബോഗ-ജെനം വിബറി എന്നു് ഇവയ്ക്കു് പേർ നൽകിയ മോറിസു് കോളറി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനു് ഇവയെ വർഗീകരണത്തിലെ കൃത്യമായ സ്ഥാനത്തു് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1933-ൽ ഉഷക്കോവു് റഷ്യയുടെ തീരത്തു നിന്നു് ലാമെല്ലിസാവല്ല സാക്സി എന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീഷിസു കൂടി കണ്ടെത്തി. മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു ജീവികളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതു് 1951-ൽ ഐവനോവു് ആയിരുന്നു. 1939-ൽ പൊഗോനോഫോറ എന്ന പേർ ഇവയ്ക്കു് നൽകിയതു് ജോഹാൻസൺ ആണ്. അങ്ങനെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ ഫൈലം തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതു്, നാമാവശേഷമായിക്കഴിഞ്ഞെന്നു് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സിലിക്കാൻ എന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം പോലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അത്യാശ്ചര്യകരമായ ഒരു നേട്ടമായിരുന്നെന്നതിന്നു് സംശയമില്ല.


സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ

- 1.മെലിഞ്ഞു് നിളം കൂട്ടിയ ശരീരം;
- 2.സ്വയം നിർമ്മിതമായ കഴൽ;
- 3.മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ശരീരം;
- 4.ഒന്നോ ഒരു കൂട്ടമോ ഗ്രാഹികൾ;
- 5.വാ

യ, ഭേദനേന്ദ്രിയം, ഗുദോദാരം എന്നിവയുടെ അഭാവം; 6. ശരീരഭരണിന് അഞ്ചു ഭാഗങ്ങൾ; 7. മുൻ ഭേദനത്തിൽ, മുതുകിലായി ഒരു നാഡികേന്ദ്രം; 8. മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ടു രക്തക്കുഴലുകൾ; 9. മുൻഭേദനത്തിൽ ഒരു ഹൃദയം; 10. രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ; 11. ദ്വിഷുവുണ്ടുമാവസ്ഥ.

മെലിഞ്ഞു അത്യധികം ദീർഘമുള്ള ഉരുളൻ ശരീരമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. നിളം 10 മുതൽ 35 സെ. മീ. വരെയുണ്ടായിരിക്കാം. ഓരോ പുഴുവും ശരീരത്തോടു ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്വയം ഉരറിയുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഴലിലാണ് വസിക്കുന്നത്. കഴലിന് മിക്കപ്പോഴും ഒന്നിടവിട്ട് ഇരുണ്ടതും മങ്ങിയതുമായ നിറങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. പലപ്പോഴും കഴലിന് ജീവിയേക്കാൾ നിളം കൂടുതലായിരിക്കും.

ശരീരത്തിന് ഒരു മുൻവണ്ഡവും ഒരു ഉടലും ഉണ്ട്. മുൻവണ്ഡത്തിൽ മുൻഭേദനമെന്നും മധ്യഭേദനമെന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിക്കാണാം. മുൻഭേദനത്തിന്റെ അടിവശത്തു നിന്ന് ഒട്ടനവധി ഗ്രാഹികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം കൂടി അവയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നായിച്ചേർന്നിരിക്കും. ഗ്രാഹികളുടെ



ചിത്രം 147. പൊഗോണോഫോറ

1. ടെൻറാക്കിളുകൾ 2. പ്രോട്ടോമിനോസോം 3. അഭ്യക്ഷചാൽ
4. ആസംജകപാപ്പില്ല 5. വലയങ്ങൾ.

ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും അഗ്രത്തിലും നിറയെ ചെറുനാരികൾ ദൃശ്യമാണ്. ദീർഘാകാരത്തിലുള്ള ഉടലിൽ (പിൻശരീരം) വരിവരിയായി ധാരാളം ആസംജകത്തകിട്ടുകൾ നിറത്തിയിരിക്കുന്നു. പിൻശരീരത്തിൽ പകുതിയിലേത്തിയാൽ അവിടെ ചില പട്ടകൾ കാണാവുന്നതാണ്. പട്ടകളുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഉടലിന്റെ ഭാഗത്തിനെ മുൻവലയഭാഗമെന്നും അതിനു പിന്നിലുള്ളതിനെ പിൻവലയഭാഗമെന്നും വേർതിരിക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേതിന് കറച്ചുദൂരം, അടിവശത്തു, മധ്യത്തിൽ, നെട്ടനീളെ ഒരു ചാലുണ്ട്. ഈ ചാലിന്റെ വക്കുകളിൽ വ്യക്തമായിക്കാണുന്ന ഒരു വരി പാപ്പില്ലുകൾ ഉണ്ട്.

പൊഗോണോഫോറുകളുടെ ആന്തരാവയവങ്ങളെപ്പറ്റി നിർഭാഗ്യവശാൽ വളരെ കുറച്ചേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.

ആൺ പെൺവ്യത്യാസം പൊഗോണോഫോറയ്ക്കുണ്ട്. സംയോഗം ഇവയിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മിക്ക സ്ത്രീയിനുകളിലും അണ്ഡം ഭേദനത്തിനകത്തു തന്നെ വളർച്ച തേടുന്നു. പൊഗോണോഫോറിന്റെ കണ്ഠങ്ങൾക്ക് വളച്ചുർപ്പത്തിയാക്കിയവയുടേതുമായി ശരീരസാദൃശ്യം കാവാം.

ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമാറ്റ


കടൽ നക്ഷത്രം, സി അർച്ചിൻ, ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ, സാൻഡ് ഡോളർ, കടൽ വെള്ളാിസ്സ് എന്നീ ജന്തുവർഗങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് എക്കൈനോഡെർമാറ്റ. ഇവയെല്ലാം കടലിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവയാണ്. ത്രിജ്യാസമമിതി പരിണാമത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ജന്തുസമൂഹത്തിലാണ്. മിക്കവയ്ക്കും ചുണ്ണാമ്പു കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഒരു പുറംതോട്ണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ പുറംതോടിൽ നിറയെ മുളകളുമുണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണയായി അവ കടലോരങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ 12,000 അടി താഴെ വരെയും കാണപ്പെടുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും കറച്ചെണ്ണത്തെ മാത്രമേ കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ചലനം മാത്രമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്.

സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ

1.ദ്രിതിജ്യാസമമിതി; 2.വൃത്തഖണ്ഡം, തല എന്നിവയുടെ അഭാവം; 3.ഒട്ടേറെ ഫലകങ്ങളാൽ നിർമിക്കപ്പെട്ടതും ഏറെക്കുറെ നിശ്ചിതമായി അടക്കിയതുമായ പുറംതോട്; 4.മിക്കപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ മുളകൾ; 5.സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്ത ഒരു ദഹനനാളം; 6.ഒട്ടേറെ ചെറിയ നാളികൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ചതും ചലിക്കുവാനും ശ്വാസനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ജലനാളിവ്യൂഹം; 7.അന്നനാളത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാഡിവളവും അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതദിശയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള നാഡികളും ചേർന്ന ഒരു നാഡിവ്യൂഹം; 8.ലിംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തജീവികളിൽ; 9.ലാർവ സാർവത്രികം.

പ്രത്യേകം: ആസ്മാറ്റിഡിയസ് (കടൽ നക്ഷത്രം)


താരമീൻ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ നക്ഷത്രം, മണലോ പാറകളോ ഉള്ള കടൽ തീരങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നു. പരന്ന ശരീരത്തിന് പഞ്ചകോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രഫലകവും അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ദിശയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കൂർത്ത ബാഹുക്കളും ഉണ്ട്. കവിഭാവനയിലെ നക്ഷത്രത്തോടുള്ള സാദൃശ്യം കൊണ്ടാവാം ഇതിനെ താരമീൻ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ നക്ഷത്രം എന്ന് വിളി



ചിത്രം 148. താരമീൻ.

യ്ക്കുന്നത്. പഞ്ചബാഹുക്കളുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ രേഖിതയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ഇൻറർരേഡിയയെ എന്ന് വിളിക്കാം. കേന്ദ്ര ഫലകത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്താണ് ഗുദഭാഗം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തെ അപവക്ത്രഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒട്ടനവധി ചെറിയ മുളകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മുളകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ പതകളും (papulae-dermal branchiae) ഉണ്ട്. ഇവ ശ്വാസനകേന്ദ്രങ്ങളായും വിസർജ്ജനാവയവങ്ങളായും വർത്തിക്കുന്നു. മുളകൾക്കു ചുറ്റും പതകൾക്കിടയിലായി ഒട്ടനവധി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഒരു തരം ചവണ പോലുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ട്. ഇവയുടെ പേ

രാണ് പെഡിസല്ലേറിയ എന്നത്.



ചിത്രം 149. താരമീൻ ചിപ്പിയെ തിന്നുന്നത്.

ക്കടി സമുദ്രജലം ദേഹത്തിനുള്ളിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.


രണ്ടു ചുണ്ടുകളുള്ള ഈ പെഡിസല്ലേറിയ സ്പർശമേൽക്കുമ്പോൾ പേശി പ്രവർത്തനത്താൽ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിൽ വന്ന വിഴാറിയെടുക്കുന്ന ബാഹ്യവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുവാനാണ് ഇവ ഉപകരിയ്ക്കുന്നത്. ഇൻറർരേഡിയസ്സുകളിലൊന്നിൽ കനമുള്ള ഒരു ചെറിയ വൃത്തഫലകം (madreporite) കാണാം. ഇതിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സുഷിരങ്ങളിൽ

വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അടിവശത്താണ്. ഈ ഭാഗത്തെ വക്രഭാഗം എന്ന് വിളിക്കാം. വായയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബാഹ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ചാലിനെയാണ് ആംബുലാക്രൽ ചാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ചാലിന്റെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും നീളം കൂടിയ മുളളുകളും ചാലിൽ രണ്ടോ നാലോ വരി നാളിപാദങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്. ബാഹ്യങ്ങളുടെ അറ്റത്തു് ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാഹിയും (tentacle) നേത്രബിന്ദുവും (eyespot) ഉണ്ടായിരിക്കും.

ചർമ്മത്തിനടിയിൽ വലിയ ഒരു ശരീരഭരമുണ്ട്. എല്ലാ ആന്തരാവയങ്ങളും ഇതിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അമീബകൾ (amoebocytes) അടങ്ങിയ ലസിക പോലുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഇതിലുണ്ട്. ഈ അമീബകൾ ശ്വാസനം, വിസർജനം, ഓസ്മോസനം എന്നിവയെ സഹായിക്കുന്നു.

ജലസംവഹനവ്യൂഹം

എക്കൈനോഡെർമുകളുടെ പ്രത്യേകതയായ ജലവാഹകവ്യൂഹം ശരീരഭരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുസുഷിരങ്ങളുള്ള മാഡ്രിപൊറൈറ്റിൽക്കൂടി സമുദ്രജലം ശരീരത്തിനകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് കത്തനെയുള്ള സ്റ്റോൺകനാൽ എന്ന



ചിത്രം 150. താരമിനിന്റെ ജലസംവഹനവ്യൂഹം

1. മാഡ്രിപൊറൈറ്റ്. 2. അശ്മനാളം 3. വലയനാളം 4. ആംപുല 5. അരിയനാളം 6. ട്രിഡ്ജന്റെ കായം 7. നാളിപാദം, 8. പാർശ്വനാളം.

കഴലിൽക്കൂടി ഒരു വളയനാളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ വളയനാളിയുടെ പുറമെയായി ഓരോ ഭുജത്തിലും ഈരണ്ടു ടീഡ്മാൻ ബോഡികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റോൺകനാൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഭുജത്തിൽ മാത്രം ഇവയില്ല. പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഓരോ കോണിൽ നിന്നും ഓരോ ബാഹുക്കളിലേയ്ക്കും രേഡിയൽ കനാലുകൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഓരോ രേഡിയൽ കനാലിലും ജോഡികളായ ധാരാളം പാർശ്വനാളികളും അവയുടെ അറ്റത്തു് നാളിപാദങ്ങളും കാണാം. നാളിപാദങ്ങൾക്ക് ബർബു പോലുള്ള ഓരോ ആംപുലയും ഉണ്ട്. ഈ ആംപുലകൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം നാളിപാദങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. കടലിനടിയിലെ പദാർത്ഥങ്ങളോടു് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ നാളിപാദങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവയുടെ സങ്കോചവും വികാസവും കൊണ്ടാണ്.

ഭവനേന്ദ്രിയങ്ങൾ

ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തു് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വായ അന്നനാളത്തിലേയ്ക്കു് നയിക്കുന്നു. അന്നനാളത്തെ തുടർന്നു് ആമാശയവും ഉണ്ട്. ആമാശയത്തെ കാർഡിയാക്, പൈലോറിക് എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിയ്ക്കാം. ഈ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്നു് ഓരോ ബാഹുവിലേയ്ക്കും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഓരോ ജോഡി പൈലോറിക് സീക്ക (pyloric caeca) ങ്ങളുമുണ്ട്. ആമാശയത്തെ തുടർന്നു് വളരെ ചെറുതായ ഒരു കടലും ഒരു റെക്ടവും കാണാം. റെക്ടത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു് ഒരു ജോഡി റെക്ടൽ സീക്കവും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ റെക്ടം ഗുദഭാഗം വഴി ജന്തുവിന്റെ മുകളിലായി പുറത്തേയ്ക്കു് തുറക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പരക്കളിലേയ്ക്കു് ശരീരദരം പ്രവേശിയ്ക്കുന്നു. ഈ പരക്കളിൽ വെച്ചാണ് ശ്വാസനം നിർവഹിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.

രക്തപരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം അവ്യക്തമാണ്. വായയ്ക്കു ചുറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു കടലും അവയിൽ നിന്നുത്ഭവിയ്ക്കുന്നതും ബാഹുക്കളിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിക്കുന്നതുമായ അഞ്ചു് രേഡിയൽ വെസ്സലുകളും ചേർന്നതാണ് രക്തപരിസഞ്ചരണവ്യൂഹം.

ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥ. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഞരമ്പു് വായയ്ക്കു ചുറ്റും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു് ഓരോ ഞരമ്പുകൾ ബാഹുക്കളിലേയ്ക്കും പോകുന്നു. അവയുടെ ശാഖകൾ നാളിപാദങ്ങളിലേയ്ക്കും നേത്രബിന്ദുവിലേയ്ക്കും എത്തുന്നു. വളരെ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ നാഡീവ്യൂഹം അധിതലിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ഒരു ജോഡി ഞരമ്പുകൾ അധിതലിയത്തിനകത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിന്നും അതിന്റേതായ ഒരു ഈടനാഡിവളയം വായയ്ക്കു ചുറ്റും ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ നാഡീവളയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിനു മുകൾഭാഗത്തു് ഗുദത്തിനു ചുറ്റുമാണ്. ഇതിൽ നിന്നു് ഓരോ ഞരമ്പുകൾ ബാഹുക്കളിലേക്ക് അവയുടെ മുകൾഭാഗത്തു കൂടി പോകുന്നു.

കടൽനക്ഷത്രത്തിൽ സാധാരണയായി ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലായി കാണപ്പെടുന്നു. ഓരോ ബാഹുവിലും ഓരോ ജോഡി ലൈം

ഗികാവയവങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നുതന്നെ വികസന സൂക്ഷ്മതകൾ ശരീരത്തിന്റെ മുക്തഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഫലകത്തിൽ തുറക്കുന്നു. പുറംബീജവും അണ്ഡവും കടൽവെള്ളത്തിലേയ്ക്ക് വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. അവ വെള്ളത്തിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും സേകം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ലാർവയുടെ പേരാണ് ബൈപിന്നേരിയ. സ്വതന്ത്രമായി നീന്തിക്കളിക്കുന്ന ഈ ലാർവ കുറച്ചു നാൾ കടലിൽ വിഹരിച്ചശേഷം മറ്റൊരു ലാർവയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഒട്ടിപ്പിടിയിറങ്ങുവാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നു കൈകൾ കൂടുതലായുള്ള ഈ ബ്രാക്കിയോലേറിയ എന്ന ലാർവ ഏകദേശം താമസിയാതെ കടൽത്തട്ടിലേക്ക് താഴുകയും അവിടെത്തന്നെ പാറകൾ മുതലായവയോടു പാറിപ്പിടിച്ച് രൂപാന്തരീകരണം നടത്തിയശേഷം വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ താരമൽസ്യങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിസരവും വിതരണവും

എക്കൈനോഡെർമുകളെല്ലാം തന്നെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മാത്രം അധിവസിക്കുന്നവയാണ്. ക്രൈനോയ്ഡിയയിലെ ആൻറിലോൺ സാധാരണയായി അവയുടെ ബാഹ്യക്കൾ അടിത്തട്ടിലെ പാറകൾക്ക് സമാന്തരമായി വിടർത്തി ബാഹ്യക്കളിലുള്ള തന്തുക്കൾ മൂലം അവയോടു പാറിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കടൽ വെള്ളരിക്കുകൾ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. കടൽക്കര മുതൽ ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടു വരെയുള്ള വിവിധ വിതാനങ്ങളിൽ അവയെ കാണാം. പൂർണ്ണമായും അധഃസമുദ്രജീവികളാണ് കടൽനക്ഷത്രങ്ങൾ. അവ പല ആഴത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമായി കടലോരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണാറ് പതിവ്. ഇതേ പരിതസ്ഥിതികളിൽത്തന്നെയാണ് സിഅർച്ചിനും കാണപ്പെടുന്നത്. 5000 മീറ്റർ ആഴം വരെ ഇവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ആഴക്കടലിൽ ഇവ കാണപ്പെടാറില്ല. ഫീലിയറോയ്ഡുകളാകട്ടെ, മറ്റു എലിയത്തൈറോസോവൻ എക്കൈനോഡെർമുകളെപ്പോലെ കടലോരപ്രദേശത്തിൽ സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ വലുപ്പക്കാരും പാറകളുടെയും കോറലുകളുടെയും വിള്ളലുകളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവാനുള്ള കഴിവും മൂലം ദുർലഭമായേ സാധാരണക്കാരന്റെ കാഴ്ചയിൽ പെടാറുള്ളൂ.

ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുറുത്തു കഴിവു മിക്കവാറും എല്ലാ എക്കൈനോഡെർമുകൾക്കുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവയവഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വളർന്ന് അവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാഹ്യവിന്റെ സ്ഥാനത്തു ഒന്നിലധികം ബാഹ്യക്കൾ വളരുന്നതായും കാണാറുണ്ട്. ഫോളോത്തൂറിയനിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവ വീണ്ടും വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ്.

ബന്ധുത്വം

അനപാരസമയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ഏകദേശം സിലെൻററോറുകളോടൊന്നിച്ചാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അനപാര

സമത അനുജാതമായതാണെന്നും (secondary) ഉഭയസമതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ജീവികളുടെ അനപാദസമത ഉത്ഭവിച്ചതെന്നും സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എക്കൈനോഡെർമാറ്റയിൽ പെട്ട ജീവികളിൽ മാത്രം കാണുന്ന മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അവയുടെ ചുണ്ണാമ്പു കൊണ്ടുള്ള പുറത്തോട്ടും ജലസംവഹനവ്യൂഹവും, ശരീരഭരത്തിന്റെ മുന്നറ്റകളായുള്ള വിഭജനവും വളർച്ചയിലെ മറ്റു പ്രത്യേകതകളും കാരണം ഇവയെ കോർഡാറയിൽ പെട്ട ജന്തുക്കളുടെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായി പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം കശേരുജന്തുക്കളോടടുപ്പമുള്ളതും ശരീരത്തിൽ വൃത്തഖണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളോടു കൂടിയ ശരീരഭരവും ഉള്ള അകശേരുജീവിവർഗ്ഗത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഫൈലമായി ഇവയെ പരിഗണിക്കാം.

ഫൈലം ഹെമികോർഡേററ

വളരെയധികം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജന്തുക്കളാണ് ഈ ഫൈലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ദൃഢമായ ശരീരമുള്ളവയും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അധിവസിക്കുന്നവയുമായ ഈ ജന്തുക്കൾ രണ്ടു തരമുണ്ട്. പുഴുക്കളെപ്പോലെ ഉരുണ്ട നീണ്ട ശരീരത്തോടു കൂടിയ ഒരു വിഭാഗവും ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി, കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പാറിപ്പിടിച്ചു കഴിയുന്ന രണ്ടാമതൊരു തരവും. അൽപം ചിലതൊഴിച്ചു മറ്റൊല്ലാ സ്പിഷിസിനും ശ്വാസനരസ്യങ്ങളുണ്ട്. മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ടു നാഡികലകളും “പ്രാക് കശേരു”വാണെന്നും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവയവവും ഇവയുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രാക് കശേരുവായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ പലരും എതിരഭിപ്രായക്കാരാണ്. അന്നനാളത്തിന്റെ അധിരോഹമാണ് ഇതെന്നാണ് ഹൈമൻ മുതലായവർ കരുതുന്നത്. തന്മൂലം ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫൈലത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൽപിച്ചു, അകശേരുജീവികളോടൊത്തു ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഹെമികോർഡേററയെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാമാന്യലക്ഷണങ്ങൾ


1. ദ്വിലാർശ്വാശ്വമിതി, 2. മൂന്നു ശരീരപാളികൾ, 3. പൂർണ്ണമായ ദഹനനാളം, 4. ശരീരഭരം, 5. മുതുകിലും ഉദരഭാഗത്തുമായി രണ്ടു നാഡികലകൾ, 6. ശ്വാസനരസ്യങ്ങൾ. 7. പ്രാക് കശേരു അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയാധിരോഹം.

പ്രൗഢം: ബലന്തോംഗോസ്സസ് (കരുവാലിപ്പുഴു-Acorn worm)

ഹെമികോർഡേററയിൽ പെട്ട ഒരു ജീവിതെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതു എഷോർട്ട്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്- 1825-ൽ. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പല ഹെമികോർഡേററുകളെയും കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 15 ജീനസുകളും 70-ഓളം സ്പിഷിസുകളുമാണ് ഈ ഫൈലത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതു്.

ബലനോസ്റ്റോസ്സ് 2സെ.മീ. മുതൽ 2.മീറ്റർ വരെ വളരുന്നു. മിക്ക വയു ആഴം കുറഞ്ഞ കടലോരങ്ങളിൽ മണലിൽ പുഞ്ച് തലഭാഗം മാത്രം പുറത്തേയ്ക്ക് നീട്ടി കഴിയുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം മണലും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായിച്ചേർന്ന് ശരീരത്തിനു ചുറ്റും ഒരു കഴൽ നിർമ്മിക്കുന്നു.

ദേഹം മൂന്നു ഭാഗമായി വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു: പ്രൊബോസിസ്, കഴുത്തുപട്ട, ഉടൽ.



ചിത്രം 151. ഹെമികോർഡേറാ

1.തൂണ്ഡം 2.കോളർ 3.ഗില്ലുകൾ 4.പ്രജനനവരമ്പ്. 5.ഹിപാറക്സിക്കുകൾ 6.ദേഹം 7.വായ 8.ഗുദം.

ഒരു ഗദയുടെ ആകൃതിയാണ് പ്രൊബോസിസിനുള്ളത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, എന്നാൽ പ്രൊബോസിസിന്റെ അടിഭാഗത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് കഴുത്തുപട്ടയുടെ സ്ഥാനം. ഉടലിൽ കഴുത്തുപട്ടയുടെ പിന്നിലായി ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും ധാരാളം ശ്വാസനരസ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്ന ഓരോ പാർശ്വനീരകളുമുണ്ട്. ചില സ്ത്രീഷിസുകളിൽ ഇതേപോലെ യകുതൃണ്ഡുകളും (hepatic caeca) സ്ഥാനനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വായ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കഴുത്തുപട്ടയുടെ മുൻവശത്തായി, അതിന്റെ അടിയിലാണ്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് വിസ്താരമേറിയ ഒരു വദനഗുഹവും ഒരു ഗുളവും ഉണ്ട്. കടൽ വളവില്ലാത്തതാണ്. ഗുദഭാഗം ഉടലിന്റെ ഏറ്റവും പിന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

പ്രൊബോസിസിന്റെ മുകളിലായി ഒന്നും കോളറിന്റെ മുകളിലായി ഒരു ജോഡിയും ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ജീവനുള്ളപ്പോൾ ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി ജലം അകത്തേയ്ക്ക് കടക്കുകയും പ്രൊബോസിസ്സും കോളറും വിത്തു ബലമുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് മണ്ണിലും മണലിലും തുളച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ഇവയുടെയും പേശികളുടെയും സഹായത്താൽ ഈ ജന്തു മണ്ണിലും മണലിലും തുളച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. വായ തുറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണലും ജീവപദാർത്ഥങ്ങളും കൂടിക്കലർന്ന കടൽ ജലം വക്രഗുഹപരത്തിലേയ്ക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്നു. ജൈവപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചശേഷം വെള്ളം ശ്വാസനരസ്യങ്ങളിൽ കൂടി പുറത്തേയ്ക്ക് വിട്ടുമ്പോൾ ശ്വാസനം നടക്കുകയും ചെയ്യും. മണലും മറ്റു മലിനവസ്തുക്കളും ഗുദഭാഗത്തിൽ കൂടി പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു.

പും-സ്ത്രീകോശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലായി കാണുന്നു. ബലനോംഗ്ളോസ്കൂറിന്റെ ജീവിതദശയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുളള ഒരു ലാർവ്വ വിമുക്തമാവുന്നു. ഇത് ടോർണേറിയ എന്ന പോലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആകാരത്തിലും ലോമവിന്യാസത്തിലും ഇതിന് കണ്ടകചർമികളുടെ ലാർവയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്.

ബലനോംഗ്ളോസ്കൂസ് എൻററോന്യൂസ്റ്റാ (enteropneusta) എന്ന വർഗത്തിലെ അംഗമാണ്. ടിറോബ്രാങ്ക്വിയ (pterobranchia) എന്ന രണ്ടാമത്തെ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ജന്തുക്കൾ സമൂഹജീവികളാണ്. ഇവയിൽ ശ്വാസനാസ്രങ്ങൾ തിരെയില്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരേയൊരു ജോഡി ശ്വാസനാസ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഉദാ: (1) റാബ്ഡോപ്ലൂറ (Rhabdopleura) - ശ്വാസനാസ്രങ്ങൾ ഇല്ല ഉദാ: (2) സിഫ്ലോഡിസ്കസ് (Cephalodiscus) - ഒരു ജോഡി ശ്വാസനാസ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.

ബന്ധുത്വം: അടുത്തകാലം വരെ ഹെമികോർഡേറായെ കോർഡേറായിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ചില പ്രാഥമിക ജന്തുശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ രീതി തുടരുന്നതായിക്കാണാം. എന്നാൽ ഹൈമൻ തൊട്ട് ഇഷോട്ട് പലരും ഈ വർഗീകരണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഹെമികോർഡേറായെ അകശേഷജന്തുക്കളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഫൈലമായി പരിഗണിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ കണ്ടകചർമികളുമായി ഇവയ്ക്ക് ബാഹ്യമായ സാദൃശ്യം തിരെയില്ലതന്നെ. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു ഫൈലത്തിലെയും ലാർവകൾ വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. തന്മൂലം ഇവയ്ക്ക് എക്കൈനോഡെയാറായുമായോ ബന്ധമുണ്ടെന്നത് നിസ്തർക്കമായ് സാഗതിയാണ്.

ശബ്ദാവലിയും സൂചികയും

അംഗശാരിരം	Anatomy	2,3
അധിതലീയകല	Epithelial Tissue	35
അനലിഡ	Annelida	169, 185
അന്തഃപ്ലാസ്മികജാലിക	Endoplasmic reticulum	16,17
അപചയം	Katabolism	6
അമിനോ അമ്ളം	Amino acid	9
അമീബ പ്രോട്ടീയസ്	<i>Amoeba proteus</i>	53
അരക്കപ്രാണി	Lac insect	235,236
അശ്വത്തമം	King crab (<i>Limulus</i>)	243
അരാക്കനിഡ	Arachnida	212,243
അരണി	<i>Arenicola</i>	186,187
അരേഖിതപേശി (ഇച്ഛാനുസൃത പേശി)	Non-striated muscle (involuntary muscle)	39,40
അസ്കാരിഡ ലംബ്രികോയഡസ്	<i>Ascaris lumbricoides</i>	134, 135,136,137,138,139,140
അസ്ഥി	Bone	38
അസ്ഥിപഞ്ജരം (കൊളാജ് വ്യൂഹം)	Skeletal system	49
ആംഫിനൂറ	Amphineura	195
(പോളിപ്ലാക്കോമോറ)		
ആദിമമൊളസ്ക്	Ancestral mollusc (hypothetical mollusc)	193,194
(പരികൽപിതമൊളസ്ക്)		
ആധാരകല	Supporting tissue	36
ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഡ്യുഡോലെ നേൽ (കൊക്കപ്പുഴ)	<i>Ancylostoma duodenale</i>	145, 146,147

ആന്തോസോവ	Anthozoa	95,99
ആഷ്കെൽമിൻതസ്	Aschelminthes	133
ആർക്കീ അനലിഡ	Archi annelida	188
ഇൻസെക്ട (ഷഡ്പദങ്ങൾ)	Insecta	212,221,222
ഇന്ത്യവാലൻ (വെള്ളിക്കുറ)	Etenolepisma	234
ഇയോളിസ്	Eolis	204
ഇഴച്ച	House fly	234,239
ഉണ്ണി	Tick (<i>Sarcoptes scabie</i>)	245,246
ഉപചയം	Anabolism	6
ഉപാപചയം	Metabolism	6
ഉറുമ്പ് (എറുമ്പ്)	Ant	234
എക്കിയൂറസ്	Echiurus	255
എൻറോറോബിയസ് വെർമികുലാറിസ് (കൃമി)	Enterobius vermicularis	143,144
എൻറമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക	Entamoeba hystolitica	62
എമാർജിനല	Emarginula	202
എയിരോസോമ	Aelosoma	188
ഒന്നൈക്കോഫോറ	Onychophora	212,218,220
ഒപാലിന റാണേറിയം	Opalina ranarium	79,80
ഒബീലിയ	Obelia	93,95
ഒളിഗോക്ടാറ്റ	Oligochaeta	187
അറ്റിലിയ	Aurelia	95,98,99
കടൽപ്പൂവ് (കടൽ ആനിമോൺ)	Sea anemone	95,100,102,103
കണവ (കൂന്തൽ)	Sepia	207,208,209
കപടദോഹി	Pseudocoel	107
കാവർണലാരിയ	Cavernularia	103
കാർക്കീസിയം	Carchesium	79,80
കാർബണിക യുഗികം	Organic compound	6

കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ	Carbohydrates	13
കിരോറോനോട്ടസ്	Chaetonotus	162
കിരോറാപോഡ	Chaetopoda	185
കിരോറാപ്റ്ററോസ്	Chaetopterus	187
കുഞ്ചാത്തൻ	Riceweevil	237
കഴിയാനത്തുവ	Antlion	237, 242, 243
കേന്ദ്രകായം	Central body	14, 16
കൈനോറിങ്ക	Kinorhyncha	133, 162, 164
കൈറോറാൻ	Chiton	197
കൊതുക്	Mosquito (<i>Anopheles & Culex</i>)	234, 241, 242
കൊഞ്ച് (ചെമ്മീൻ)	Prawn	212, 213, 214, 215, 216, 217
കൊമ്പൻചെള്ളി	Oryctes	237
കൊഴുപ്പുകൾ	Fats	13
കോശം	Cell	6, 11, 13
കോശമെംബ്രേൻ	Cell membrane	15
കോശവീജ്ഞാനം	Cytology	2, 3
കോരലുകൾ (പവിഴപ്പുറ്റുകൾ)	Corals	95, 101, 102, 103
ക്സാൻകസ് (ശംഖ്)	Xanchus	203
ക്രമഭംഗം	Mitosis	27
ക്രമാർധഭംഗം	Meiosis	31
ക്രസ്റ്റേറേഷ്യ	Crustacea	212
ക്രൈസിസ്	Creseis	204
ക്രോമസോം	Chromosome	15, 20, 21
ഗണിതം	Mathematics	1
ഗാസ്ട്രോട്രിക്ക	Gastrotricha	133, 161
ഗാസ്ട്രോപോഡ (ഒച്ചുകൾ)	Gastropoda	195, 199, 200, 201, 202, 203, 204
ഗിയാർഡിയ ഇൻറസ്റ്റിനാലിസ്	<i>Giardia intestinalis</i>	66, 67
ഗോൾഗികായങ്ങൾ	Golgi bodies	15, 19
ലാലി	Leptorissa	237

ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ	Red blood corpuscles	40,41
ചെമ്മു (തെമ്മു)	Mite	243,245
ചിതൽ	White ant	238
ചിലന്തി (എട്ടുകാലി)	Spider	243,245
ചീവീട് (മണ്ണട്ട)	Gryllotalpa	234
ജനിതകവിജ്ഞാനം	Genetics	3,4
ജന്തുഭൂമിശാസ്ത്രം	Zoogeography	3,4
ജന്തുശാസ്ത്രം	Zoology	2
ജീവഭൗതികം	Biophysics	3,4
ജീവരസതന്ത്രം	Biochemistry	3,4
ജീവശാസ്ത്രം	Biology	1
ഞാഞ്ഞൂൽ (മണ്ണേര)	Earth worm	170,171,172, 173,174,175,176, 177, 178, 179,180,181,182,183,184
ടർബല്ലേറിയ	Turbellaria	120
ട്രെമറ്റോഡ	Trematoda	120,127
ട്രൈകോനിംഫ	Tryconympha	66,67
ട്രൈകോമോണാസ്	Trycomonas	66,67
ട്രൈക്കിനെല്ല (ട്രൈക്കിനാപ്പുഴ)	Trichinella	154,155
ട്രൈക്റ്ററിസ് ട്രൈക്റ്റർ (ചുരൽപ്പുഴ)	Trichiuris trichiura	152,153
ട്രൈപാനോസോമ	Trypanosoma	63,64,65
ട്രോക്കസ്	Trochus	203
ഡീഓക്സി റൈബോന്യൂക്ലിയീക് അമ്ളം	Deoxyribo Nucleic Acid	21,22,23
ഡ്രാകൻകലസ് മെഡിനൻസിസ് (ഗിനിപ്പുഴ)	Dracunculus medinensis	156,157
തന്തുശാസ്ത്രം	Cartilage	37
തലമുറകളുടെ ഏകാന്തരണം	Alternation of generations	82,95
താരമീൻ	Starfish	261,262,263
തുമ്പി	Ephemeropteran	234,237
തേന്തിച്ച	Honey bee	235

തേരട്ട	<i>Spirostreptus</i>	219,221
തേരൾ	Scorpion	243,244
ഭേഹഗുഹ	Coelome	107,108
ധർമശാസ്ത്രം	Physiology	2,3
(ശരീരക്രിയാവിജ്ഞാനം)		
നാടപ്പുഴ (നാടവീര, നാടകമ)	Tapeworm (<i>Taenia solia</i>)	110, 111,112,113,114,115
നാഡീടിഷ്ക	Nervous tissue	42,43
നാഡീവ്യൂഹം	Nervous system	11,49
നാരു-തരുണാസ്ഥി	Fibro cartilage	
(ഇലാസ്തികതരുണാസ്ഥി)	(Elastic cartilage)	37
നീക്ടോത്തീറസ്	<i>Nyctotherus</i>	79,80
നീർമോചനം	Moulting	50
നീരാളി	Octopus	207,210
നീറിസ്	<i>Nereis</i>	186
നെഫാൻതസ്	<i>Nephanthus</i>	237
നൈമറ്റോഡ	Nematoda	133,114
നൈമറ്റോമോർഫ	Nematomorpha	134,166,167
നോക്ടിലൂക്ക	<i>Noctiluca</i>	66,67
നോട്ടിലസ്	<i>Nautilus</i>	208
ന്യൂക്ലിയസ്	Nucleus	15,20
ന്യൂക്ലിയീക് അമ്ളങ്ങൾ	Nucleic acids	13
ന്യൂക്ലിയോലസ്	Nucleolus	
പചനവ്യൂഹം	Digestive system	11,45
പച്ചചിപ്പി (കല്ലിൻമേൽകായ)	Mytilus	206
പട്ടന്തൽശലഭം	Silkworm moth (<i>Bombyx mori</i>)	235,241
പരിണാമം	Evolution	3,4
പരിസഞ്ചരവ്യൂഹം	Circulatory system	47
പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം	Ecology	3,4
പര്യയനകല	Circulatory tissue (blood and lymph)	50,41

പഴുതാര	<i>Scolopendra</i>	219, 220, 221
പാരമീസിയം	<i>Paramecium</i>	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
പാറ (കൂറ)	Cockroach	222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
പാറല്ല	<i>Patella</i>	202
പുരാജീവിവിജ്ഞാനം	Palaentology	2, 3
പൂമ്പാറ	Butterfly	224, 238, 240
പെക്ടൻ	Pecten	206
പെന്നാറുല	<i>Pennatula</i>	103, 104
പെരിപേറ്റസ്	<i>Peripatus</i>	219
പെരുമാറ്റശാസ്ത്രം	Ethology	3, 4
പെലിസിലോഡ (കുരു, എരുത്ത)	Pelecypoda	195, 204, 205, 206
പേൻ	Head louse	234
പോളിക്കീറ്റ	Polychaeta	185
പോളിഗോർഡിയസ്	<i>Poligordius</i>	188, 189
പ്ലാനേറിയ	<i>Planaria</i>	121, 122, 124, 125, 126
പ്ലാസ്മോഡിയം	<i>Plasmodium</i>	68, 69, 70, 71, 72
പ്ലാറ്റീഹെൽമിന്തസ്	Platyhelminthes	107, 108
പ്രകാശസംശ്ലേഷണം	Photosynthesis	11
പ്രത്യുൽപ്പാദനം	Reproduction	1
പ്രത്യുൽപ്പാദനവ്യൂഹം	Reproductory system	50
പ്രഥമഭേദ	Prophase	28
പ്രയാപുലിഡ	<i>Priapulida</i>	134, 165, 166
പ്രോട്ടീനകൾ	Proteins	12
പ്രോട്ടോസെല്ലുലസ്	<i>Protodrilus</i>	188
പ്രോട്ടോപ്ലാസം	Protoplasm	6
പ്രോട്ടോസോവ	Protozoa	52
ഫലകാധിതലിയം	Squamous epithelium	35
ഫാസിയോള ജൈജാൻറിക്ക	<i>Fasciola gigantica</i>	130

ഫാസിയോള ഹിപാറ്റിക	<i>Fasciola hepatica</i>	128, 129
ഫിഷ്റെല്ല	<i>Fissurella</i>	202
ഫൊറാമിനിഫെറ	<i>Foraminifera</i>	63
ഫൊറോണിസ്	<i>Phoronis</i>	250
ഫൈലം ആർത്രോപോഡ	<i>Phylum Arthropoda</i>	211
ഫൈലം എക്ടോഗ്രോക്ട	<i>Phylum Ectoprocta</i>	247, 248
ഫൈലം എക്ചിയൂറോയ്ഡിയ	<i>Phylum Echiuroidia</i>	255, 256
ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമാറ്റ	<i>Phylum Echinodermata</i>	260 261, 262, 263, 264, 265
ഫൈലം ക്ഷീറോഗ്നാത്ത	<i>Phylum Chaetognatha</i>	257
ഫൈലം പോഗോണോഫോറ	<i>Phylum Pogonophora</i>	258, 259
ഫൈലം ഫൊറോണിഡ	<i>Phylum Phoronida</i>	249, 250
ഫൈലം ബ്രാങ്കിയോപോഡ	<i>Phylum Brachiopoda</i>	251, 252, 253
ഫൈലം സൈപൻക്ലിയ	<i>Phylum Sipunculida</i>	253, 254
ഫൈലം ഹെമികോർഡാറ്റ	<i>Phylum Hemichordata</i>	266, 267
ഫൈസലിയ	<i>Physalia</i>	95, 96
ഫ്ലാജല്ലാറ്റ	<i>Flagellata</i>	63
ബലനോഗ്ലോസസ് (കരുവാലിപ്പുഴ)	<i>Balanoglossus</i> (Acorn worm)	266, 267, 268
ബാലന്റിഡിയം കോലി	<i>Balantidium coli</i>	79, 80
ബൈപാലിയം	<i>Bipalium</i>	127
ബൊണെല്ലിയ	<i>Bonnelia</i>	255, 256
ബ്രൂഗിയ മലായി	<i>Brugia malai</i>	149, 151
ഭഗ്നദശ	<i>Telophase</i>	30
ഭിന്നതദ്യമോദ്ധ്യേൻ	<i>Differentially permeable membrane</i>	16
ഭൗതികം	<i>Physics</i>	1
ഭൂശാസ്ത്രം	<i>Embryology</i>	3, 4
മഗെല്ലാനിയ	<i>Magallania</i>	252

മധ്യഭ്രമ	Metaphase	30
മാംസപേശി	Muscle (contractile tissue)	38
മിറിയാനിഡ	Myrianida	187
മിറിയാപോഡ	Myriapoda	212, 219
മുള്ളൂടെ ലാർവ	Muller's larva	127
മൂട്ട	Bed bug (<i>Cymax lectularius</i>)	234, 239
മേദഃകല	Adipose tissue	38
മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ	Mitochondria	15, 17, 18
മോണോപ്ലാക്കോഫോറ	Monoplacophora	194, 195
രക്തപ്ലേറ്റാലറ്റുകൾ	Blood platelets	42
രസതന്ത്രം	Chemistry	1
രീകതീക	Vacuole	15
രൂപശാസ്ത്രം	Morphology	2, 3
രേഖിതപേശി	Striated muscle	
(ഇച്ഛാസമുദായപേശി)	(Voluntary muscle)	38, 39
രോഗാവസ്ഥാവിജ്ഞാനം	Pathology	3, 5
ലഘുഭംഗം	Direct division, amitosis	26
ലസിക	Lymph	42
ലാമല്ലിസാബല്ല സർസി	<i>Lamelisabella sarsi</i>	258
ലിങ്ഗുല	<i>Lingula</i>	252
ലൈസോസോം	Lysosome	17, 19
വണ്ടു	Beetle	234, 237
വർഗീകരണവിജ്ഞാനം	Taxonomy	2, 3
വിട്ടിൽ (പച്ചത്തുള്ളൻ)	Grass hopper	234
വിസർജനവ്യൂഹം	Excretory system	11, 48
വിലെല്ല	<i>Veilella</i>	95, 97
വൂച്ചറേറിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി	<i>Wuchereria bancrofti</i>	148, 149, 150, 151
(മയ്ക്കപ്പുഴ)		
വെട്ടുകിളി	Locust	237
വോർട്ടിസെല്ല	<i>Vorticella</i>	79, 80

ശ്വാസനം	Respiration	1
ശ്വാസനവ്യൂഹം	Respiratory system	11
ശ്വേതരക്താണുക്കൾ	White blood corpuscles (Leucocytes)	41, 42
ഷിസ്റ്റോസോമ	Schistosoma	130
ഷിസ്റ്റോസോമ ഹീമറ്റോറോ ബീയം	Schistosoma haematobium	130, 131
സംയോജക കല	Connective tissue	36
സന്യാസിഞ്ഞു്	Hermit crab	219
സമപാർശ്വധീതലീയം	Cubical Epithelium	35
സസ്യശാസ്ത്രം	Botany	2
സാജിറ	Sagitta	257
സാഹചര്യാനുപ്രതികരണം	Irritability	8, 42
(ഉത്തേജനശീലത)		
സിബോഗ്ലിനം വെബറി	Siboglinum weberi	258
സിലൻററോ	Coelenterata	81
സിലോം	Coelom	107, 108, 169, 172
സിലിയോഫോറ	Ciliophora	72, 79
സുതാര്യതണുണാസ്ഥി	Hyaline cartilage	37
സൂക്ഷ്മശാരിരം	Histology	2, 3
സെൻട്രിയോൾ	Centricle	15, 16
സെൻട്രോസോം	Centrosome	15, 16
സെഫലോപോഡ	Cephalopoda	195, 207
(കണവ, നീരാളി)		
സെസ്റ്റോഡ	Cestoda	130, 132
സൈഗോട്ട് (സിക്കാൺഡം)	Zygote	26, 31
സൈപൻകലസ്	Sipunculus	254
സൈറ്റോപ്ലാസം	Cytoplasm	15
സ്കാഫോപോഡ	Scaphopoda	195, 198
(കൊമ്പുകക്കൾ)		
സ്കൈഫോസോവ	Scyphozoa	95, 97
സ്തംഭണാധിതലീയം	Columnar Epithelium	35

സ്പൈറോസ്റ്റോമ	<i>Spirostoma</i>	79,80
സ്പോറോസോവ	Sporozoa	67
ഹാലിയോട്ടസ്	<i>Haliotus</i>	202
ഹിറുഡിനിയ	Hirudinia	190
ഹൃദ്പേശി	Cardiac muscle	39,40
ഹൈഡ്ര വർത്താരിസ്	<i>Hydra vulgaris</i>	82,83,84,85, 86,87,88,89,90,91,92
ഹൈഡ്രോസോവ	Hydrozoa	95
റേഡിയോലേറിയ	Radiolaria	63
റൈബോനൂക്ലിയീക് അമ്ളം	Ribo Nucleic Acid	16,22
റൈബോസോം	Ribosome	16,17
റൈസോപോഡ	Rhizopoda	61
റോട്ടീഫെറ	Rotifera	133,157,158
ററീനോഫോറ	Ctenophora	105,106

തിരുത്തു


പേജ് 118

ചിത്രവിവരണത്തിൽ, “ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നത് “മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും “മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നത് “ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും തിരുത്തി വായിക്കുക.

പേജ് 127

ചിത്രം 57 ഇടത്തും വലത്തും അന്തോനാട്ടം മാറിയും, കിഴക്കൻതൂക്കായും ആണ് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബൈപാലിയമാണ് ഇടത്തും; മുളളുടെ ലാർവ വലത്തും.


6288



കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

മററു ജൈവശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

1. നവഭാരതവിനിമയം	5. 00
2. പരിണാമം	14. 50
3. സമുദ്രജന്തുവിജ്ഞാനം	10. 00
4. കാർഷികവിളകൾ	35. 00
5. വിളപരിപാലനം	7. 50
6. മൃഗസംരക്ഷണം	4. 50
7. ഉദ്യാനകൃഷി	3. 25
8. സസ്യസംരക്ഷണം	5. 00
9. കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം	5. 00
10. പ്രാഥമികകൃഷിതരീപങ്ങൾ	4. 00
11. മണ്ണും സസ്യപോഷണവും	5. 75
12. ഗ്രാമവികസനം	5. 75
13. കാർഷികകീടവിജ്ഞാനം	8. 25
14. മൽസ്യകൃഷി	3. 25
15. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ചരിത്രം	2. 25
16. പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം	9. 00
17. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ	3. 75
18. സാമാന്യശാസ്ത്രം (പ്രീഡിഗ്രി)	7. 50
19. കൃഷിശബ്ദാവലി	7. 00
20. വിജ്ഞാനശബ്ദാവലി (ഒന്നാംഭാഗം)	12. 00
21. വിജ്ഞാനശബ്ദാവലി (രണ്ടാംഭാഗം)	9. 00





കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

മറ്റു ജൈവശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

1. നവഡാർവിനിസം	5.00
2. പരിണാമം	14.50
3. സമുദ്രജന്തുവിജ്ഞാനം	10.00
4. കാർഷികവിളകൾ	35.00
5. വിളപംപിപാലനം	7.50
6. മൃഗസംരക്ഷണം	4.50
7. ഉദ്യാനകൃഷി	3.25
8. സസ്യസംരക്ഷണം	5.00
9. കാർഷികവിജ്ഞാനവ്യാപനം	5.00
10. പ്രാഥമികകൃഷിതത്വങ്ങൾ	4.00
11. മണ്ണും സസ്യപോഷണവും	5.75
12. ഗ്രാമവികസനം	5.75
13. കാർഷികവിജ്ഞാനം	8.25
14. മൽസ്യകൃഷി	3.25
15. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ചരിത്രം	2.25
16. പരിസ്ഥിതിവിജ്ഞാനം	9.00
17. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ	3.75
18. സാമാന്യശാസ്ത്രം (പ്രീഡിഗ്രി)	7.50
19. ഉത്തികാസൂക്ഷ്മജീവിവിജ്ഞാനം	11.25
20. സസ്യവർഗീകരണതത്വങ്ങൾ	7.50
21. അനാവൃതബീജികൾ	6.00
22. ഗവ്യശാസ്ത്രം	7.75
23. ഫിസിയോളജി	5.25
24. കൃഷിശബ്ദാവലി	7.00
25. വിജ്ഞാനശബ്ദാവലി (ഒന്നാംഭാഗം)	12.00
26. വിജ്ഞാനശബ്ദാവലി (രണ്ടാംഭാഗം)	9.00

6288.



ജന്തുശാസ്ത്രപ്രവേശം

(ഒന്നാം ഭാഗം)

629

പ്രിന്റിംഗ് സുവോളജി

39



കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്