



സതതം

TEACHERS' HANDBOOK

സ്റ്റാൻഡാർഡ് ആറ്

വില 1 രൂപ

കേരളാ ഗവണ്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം

വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്

1971



രസതന്ത്രം

TEACHERS' HANDBOOK

സ്റ്റാൻഡാർഡ് ആറ്

കേരള ഗവണ്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്

1971



THE GOVERNMENT OF KERALA

1971

വിഷയവിവരം

ആമുഖക്കുറിപ്പ്

1. പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ പരിണാമങ്ങളും
2. പദാർത്ഥവും അതിന്റെ ഘടനയും സംഘടനയും
3. വായു, ഓക്സിജൻ, ഓക്സൈഡുകൾ

ആമുഖം

രസതന്ത്രം ഒരു പ്രത്യേകശാസ്ത്ര ശാഖ എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് 6-ാം സ്റ്റാൻഡാർഡ് മുതലാണ്. പദാർത്ഥ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തോടെയാണ് അതരംഭിക്കുക. പരീക്ഷണങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് രസതന്ത്രമെന്ന ബോധം ആദ്യം മുതൽക്കു കട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളൊഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള പഠന സാധ്യത കുറവാണ് രസതന്ത്രത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതുവഴി വസ്തുതകൾ വിശദമാക്കാനുള്ള ശ്രമം അല്പാപകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവുന്നതും കട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പരീക്ഷണശാലയ്ക്കു ഉപകരണങ്ങളുമായി ആരംഭത്തിലേ അവർക്ക് പരിചയം നൽകുന്നത് ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാകുന്നു ഉപകരണങ്ങളുടെ സങ്കീർ്ണത, രാസ വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കൂടുതൽ, അപകട സാധ്യത എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ നടത്താൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം അല്പാപകൻ നേരിട്ടുനിർവ്വഹിച്ചാൽ മതി; അതും കട്ടികളുടെ ക്രിയാത്മക സഹകരണത്തോടെ മാത്രം. എന്തായാലും പരീക്ഷണഘടകങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചറിയാനുള്ള അവസരവും പരിശീലനവും കട്ടികൾക്കുണ്ടാകണം.

നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരേണ്ടതു് കട്ടികളാണ്. യുക്തിയുക്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളും നിദ്ദേശങ്ങളും വഴി ഇതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു് അല്പാപകൻ വിരമിക്കണം. നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ അതു അല്പാപകൻ നേരിട്ടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവൂ. കട്ടികൾക്കുണ്ടാണി അല്പാപകൻ ചന്തിക്കേണ്ടതു്, ആജോലി അവർക്ക് തന്നെ വീട്ടുകൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വസ്തുത പ്രത്യേകം ഉണർപ്പുണ്ടേ യരിക്കുന്നു. നിഗമനങ്ങളും സാമാന്യവൽക്കരണങ്ങളും ആദ്യമേ വിവരിച്ചു് അവ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന രീതി ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. തിക

ഉം ആ ശാസ്ത്രീയമെന്നു വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഏർപ്പാട് വർദ്ധി-
തമികളുടെ ജിജ്ഞാസ ആര ഭേദിച്ച് കെട്ടത്തക്കതായ. സഭ
വിക്കാറുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദർശ ഇടത്തുവർത്തമാൻ പാഠ്യങ്ങളാ-
കഴിയുന്നതു വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ ആകാശം ക്ഷായമുണ്ടാവുക.
കുട്ടികൾ സ്വയം പരീക്ഷണം നടത്താൻ വസ്തുതയ്ക്കും നിരീ-
ക്ഷിച്ചിട്ട് സ്വയം നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേർന്നു. അതിനുവ-
ണ്ടസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ
അവർ വഴിതെറ്റി പാകത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത അ-
ദ്ധ്യാപകന്റെ കടമ അതിലപ്പു മിട്ടു.

രസതന്ത്രത്തിലേ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നഭിപ്രായമില്ല. പരീക്ഷണ-
ങ്ങൾക്കു സാധ്യമായ ല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചാർട്ടുകൾ മോഡലുകൾ
എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കു-
ന്നു. ഇവിടേയും വസ്തുതകൾ നേരിട്ടു വിവരിക്കാതെ സൂചനകൾ
നൽകി കുട്ടികളെ സഹായിച്ചേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതാണ് അഭികാർഷ്ടം.

ഏതൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയുടെയും ജയാപജയങ്ങൾ ഒരു
വലിയവശത്തായ വരെ അദ്ധ്യാപകനെയാശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന
തു്. ഇത്തരവു വസ്തുതയായതികാലത്തു തയ്യാറാകണം. ഇക്കാര്യ-
ത്തിൽ മറ്റു അപ്രധാനല്ലാത്ത മറ്റു ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടു്. അസമ-
തമെന്നു ചർച്ചാപകന്റെ കയ്യിൽ എത്രനല്ലപരീക്ഷണശാലയും
ഫലശാലിയായും വേർതിരിച്ചു വെക്കുകയും ഉള്ളു. സരകാശങ്ങൾ തെല്ലു കുറവാ-
യാലും സമത്വമായ ചർച്ചാപകൻ ബോധനം വിജയകരമാക്കു-
ന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനഘടകം അദ്ധ്യാപകനോ ഉപകരണങ്ങ-
ളോ? അദ്ധ്യാപകനാണു്. ക്ലിസ്സിന്റെ ചൈതന്യം, ഉപകരണങ്ങ-
ളല്ല.

പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയനുസരിച്ചു് രസതന്ത്രം പഠിപ്പി-
ക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്റെ മുന്നിൽ അവഗണിക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത ഏ-
താനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടു്. ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ഓരോ
പരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഉപക-
രണങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യണം.
കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അന്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും
കരണങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും മാത്രമേ അവരെ ഏല്പിക്കാവൂ പദം

തിരുക്കുളം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പുറം പാതാ ദേശമാകാം
 ന. ഇതുപകരിക്കും. പുതിയ പാതാപലതിയനുസരിച്ചു തയ്യാറാ
 ക്കിയ വിവരങ്ങളുമായി അദ്ധ്യ പകൻ സ്വയം ഒന്നിടപഴകേ
 ണ്ടതുണ്ട്. തൊട്ടുമുമ്പുള്ള പാതാപലതിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്
 സാമാന്യ വിജ്ഞാനബോധനമായിരുന്നു. അതു, ഇതു, തമ്മിൽ
 ഉള്ളടക്കത്തിലും അവതരണ രീതിയിലും അടിസ്ഥാന പരമായ
 വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഓരോശാസ്ത്രശാഖയും പ്രത്യേകമായൊരു
 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പലതിയിൽ ഉള്ളടക്കം കുറെക്കൂടി
 ഘനപ്പെട്ടതും സാങ്കേതിക സ്വഭാവമുള്ളതുമായിരിക്കും. പാഠ്യ
 ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധപെടുത്തണം. അ
 ധ്യ പകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണിത്.

പുതിയ പാഠങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ചേർന്നുപോകുന്ന സാഹിത്യകർത്താക്കൾ എന്തെങ്കിലും നവീനതകൾ അവസരം അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പലതിലും അതുവരെയുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു പരീക്ഷണശാല പോലമല്ലെന്നതു വാസ്തവം തന്നെ. അതല്ലാത്തതായിട്ടുമാത്രം പഠനവും പരീക്ഷണവും മാത്രമാണെന്നു പറയാൻ നിമിത്തമായിട്ടു നമുക്കു് അതുകൊണ്ടു് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ മിക്കതും ഗുണമന്യരീകൃതങ്ങളാകുന്നു. ചേർന്നുമാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നതുള്ള പരീക്ഷണശാലയിലോ വെച്ചു നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന വിധം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ അദ്ധ്യാപകൻ തയ്യാറാണെന്നു് പരീക്ഷണത്തിനു് ചേർന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പലതും നിസ്സാരവസ്തുക്കളുപയോഗിച്ചു് "ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്" ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റിനു് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഗൈഡിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണമില്ലെന്നു് അദ്ധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്.

അപസ്മരമായി ഒരു വസ്തു കൂടി. അപ്പോഴു ത്തിന്റെ
കാര്യത്തിന്റെ പറ്റി അന്വേഷത്തിലും "നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു"
എന്നപോൾ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി
കളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. പാഠശാലയിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ചെലുത്ത
കഴിയും. കാര്യത്തിന്റെ പറ്റി ചർച്ചയ്ക്കുന്നതിനായി താഴെ

കാടത്തു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നൽകേണ്ടതെന്ന നിലപാടു് അദ്ധ്യാപകൻ സ്വീകരിക്കാതെന്നു മതി. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു്, എന്നവിഭാഗത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും ഫലവത്തായി നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും നിദ്ദേശങ്ങളും കൂട്ടികൾക്കു നൽകുവാൻമതി, അദ്ധ്യാപകൻ. ബാക്കിയെല്ലാവരുടെ ജാലിയായാണു്. കരകൂടി ഉയർന്നിലവാരത്തിലുള്ള 'പ്രശ്നങ്ങൾ' അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ളതെന്തിൽ. ഓരോഉപവിഭാഗത്തിന്നു് അനുസാരത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അതുപോലെ പാല പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണു് പഠനംവേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുപകരം ഇത്തരം പ്രയോജനിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതു്. ഇവയെല്ലാം തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താവുന്ന തലത്തിലേയ്ക്കു വാല്യംതന്നെയും വളരുകയാണെങ്കിൽ അതുനമ്മുടെ ശാസ്ത്രാഭ്യാസനാംഗത്തു് സ്ഥായിയായ സൽഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുമെന്നുമാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ആറാം സ്റ്റാൻഡർഡിലെ രസതന്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനാരുമില്ലെന്ന അദ്ധ്യാപകനെ നേരിടുന്ന ഏതാനും പ്രശ്നങ്ങളാണു് മുകളിൽ പറഞ്ഞതു്. അവയോരോന്നും പരിഹരിച്ചു് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഓരോപാഠവും എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നതാണുപ്രശ്നം. സ്വാമാന്യം കഴിവുള്ള ഒരു അദ്ധ്യാപകനു് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണു് ഈ ഗൈഡു്. ഇതു് പരിപൂർണ്ണമാണെന്നോ ഇതില്ലാത്തതിരിക്കുന്ന നിദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അപ്പാടെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നോ ആരും പറയുകയില്ല. ശരിയായ അതേനിയ ഒരുരീതി നിദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. പക്ഷപാതകരം പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ കരകൂടി ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു രീതി മനസ്സിലുണ്ടാകാം. അപ്പാഴതു സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്. ഓരോ അദ്ധ്യാപകനും അവനാത്രം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു പ്രത്യേകരീതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നിടത്തുവെച്ചു് അദ്ധ്യാപനം ഒരു കലയായി ഉത്തമം. ഏതു രീതി അവലംബിച്ചാലും ഫലവത്തായ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നയാൾരിക്കണമെന്നു്.

പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുടെ പരിണാമങ്ങളും

അവലോകനം:—

പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തോടെയാണ് ആറാം സ്കാൻഡാർഡിൽ രസതന്ത്രപഠനം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഭിന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പദാർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കണം രസതന്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ. കാരണം ഈ വിഷയം തന്നെ, പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവശേഷതകളും അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പ്രത്യേകമായെടുത്ത് പഠനം നടത്തുന്ന വിജ്ഞാനശാഖയാണല്ലോ. പദാർത്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ശുദ്ധവസ്തുക്കളും മിശ്രിതങ്ങളും, മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കാനുള്ള ഏതാനും മാർഗ്ഗങ്ങൾ, രാസപ്രതിഭാസവും ഭൗതികപ്രതിഭാസവും, രാസക്രിയയുടെ ലക്ഷണവും സാഹചര്യങ്ങളും എന്നിവയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ അടിസ്ഥാനവിഷയങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം പരീക്ഷണശാലയിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട സാമാന്യനിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥി ബോധവാനാകേണ്ടതുണ്ട്. തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പരീക്ഷണംനടത്താനുള്ള അവശ്യോപകരണങ്ങളുമായി രസതന്ത്രവിദ്യാർത്ഥി പരിചയം സമ്പാദിയ്ക്കണം. അവ ഏതു രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ പഠിക്കുന്നു. അനേകം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് രസതന്ത്രം എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പുസ്തകം വായിച്ചോ, അദ്ധ്യാപകൻ ചെയ്യുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ വഴിയോ ആയിരിക്കരുത്. രസതന്ത്രത്തിന്റെ, പൊതുവേ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയോ അതല്ലല്ലോ.

രൂപം വലിപ്പം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല രസതന്ത്രജ്ഞൻ പദാർത്ഥങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണാത്മകപരണം, അതായത് മിശ്രിതമാണോ, ശുദ്ധവസ്തുവോ, ദ്രവമാണോ, ഖരവസ്തുവോ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായാൽപോരാ. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവുംചെറിയ സ്വതന്ത്രകണികയായ തന്മാത്രയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം മേല്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. തന്മാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇതേ ക്ലാസിലുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയംകോണിൽ കൂടിയാണ് രസതന്ത്രജ്ഞൻ തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സവിശേഷഗുണങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമായ ഏകദൈർഘ്യം ഘടകമെന്നനിലയിൽ. തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്പാപകൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി അറിയേണ്ട വസ്തുതകളെ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഒറ്റയടിയ്ക്കുണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. രസതന്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ സാമ്പന്ധ്യിച്ചിടത്തോളം ഏറെക്കുറെ അധികമാകാനിടയുള്ള ഈ വിശദീകരണം അയാൾക്ക് രസതന്ത്രത്തോടു് വൈമുഖ്യം ഉണ്ടാകാനേ ഉപകരിയ്ക്കൂ. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വതന്ത്രകണികയാണ് തന്മാത്ര. വിഭിന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ, അവയുടെഭാരം, ചലനം തുടങ്ങിയഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം. ഇത്രയേ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. തന്മാത്രയെസാമ്പന്ധ്യിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ വരുന്നതാണ്.

താഴെപറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്പാപകൻ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേയ്ക്കുകൂട്ടികളേ നയിക്കേണ്ടതു്.

1. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള പരിശീലനം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധ്വനിയുക്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവു്.

2. യുക്തിസഹജമായ നിഗമനങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള പരികല്പന രൂപീകരണം.

3. സ്വന്തമായി ലഘുപരീക്ഷണങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും തന്റേടവും.

4. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് പരികല്പനകളെ സിദ്ധാന്തങ്ങളായിവികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്.

5. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അവ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവ്.

സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ:—

ദ്രവ്യം	പദാർത്ഥം	തന്മാത്ര
സംഘടന	അന്തർവ്യാപനം	ശുദ്ധപദാർത്ഥം
മിശ്രിതം	തെളിയുറൽ	അരിക്ക്
ബാഷ്പീകരണം	സേചനം	ഭൗതികപ്രതിഭാസം
രാസപ്രതിഭാസം	രാസക്രിയ	കപടനാങ്കം
ദ്രവണാങ്കം	വിശിഷ്ടഘനത	ചാലകം
സുചാലകം	ഏകാത്മകം	ഭിന്നാത്മകം
സംഭരണവാഹി	അവസ്ഥാഭേദം	പ്രഭാകലനം
താപനില	ക്രിസ്റ്റൽ	

പൊതുധാരണകൾ

1. പദാർത്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ സംഘടന, അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രത്യേകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് രസതന്ത്രം.

2. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലും രസതന്ത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

3. പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ദ്രവ്യനിമിതമാണ്.

4. വിഭിന്നപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.
5. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്.
6. വിഭിന്ന വസ്തുക്കളുടെ തന്മാത്രകൾ വിഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്.
7. തന്മാത്രകളെല്ലാം ചലന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്.
8. തന്മാത്രകൾക്കിടയിൽ ധാരാളം ഇടമുള്ള വിധത്തിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അവ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
9. തന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരം ആകർഷണവും വികർഷണവും ഉണ്ട്.
10. ഭാരം കുറഞ്ഞ തന്മാത്രകൾക്ക് ഭാരംകൂടിയ തന്മാത്രകളേക്കാൾ ചലനവേഗതയുണ്ട്.
11. തന്മാത്രകളുടെ ഭാരവ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അവ പരസ്പരം കലരുന്നു.
12. ഗുണങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാം.
13. പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നുണ്ടാക്കാതെ വസ്തുവിന്റെ രൂപത്തിനോ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്കോ മാത്രമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഭൗതിക പ്രതിഭാസം.
14. ഒന്നോ അതികമോ പദാർത്ഥങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന വിധം പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് രാസ പ്രതിഭാസം.
15. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ രാസക്രിയകൾ നടക്കുകയുള്ളൂ.
16. രാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുകയോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ —

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന ധാരണകൾ കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരേണ്ടവയാണ്. ഇതിനു പുറമെ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്ന വസ്തുതകൾ കൂടി അവർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം.

1. പദാർത്ഥവും ഭൗതികവസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
- 2 പദാർത്ഥം തന്മാത്രകളെന്ന സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. പലതരം തന്മാത്രകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
- 3 അവസ്ഥാ ഭേദമടക്കം പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു ചൂടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വികാസത്തിന്റെ കാരണം തന്മാത്രാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു.
- 4 ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗന്ധം നാലുപാടും വ്യാപിയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നു.
- 5 കമ്പികളും തകിടുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- 6 കപടനാങ്ക നിർണ്ണയം വഴി ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി പരിശോധിയ്ക്കുന്നു.
- 7 ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ ഘടക വസ്തുക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഘടകവസ്തുക്കൾ വേർതിരിയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയുന്നു.
- 8 രാസപ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു.
- 9 രാസക്രിയകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പലതരം പരിതസ്ഥിതികളെക്കുറിച്ചും കുട്ടി ബോധവാന്മാകുന്നു.

10 രാസക്രിയകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയുന്നു.

പ്രയോഗം

1 പരസ്പരം ലയിച്ചു ചേരാത്ത ദ്രാവക മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിദ്ദേശിക്കുന്നു.

2 സേചനംവഴി ജലം ശുദ്ധീകരണം നടത്താനുള്ള അവശ്യോപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

3 ജലത്തിന്റെ ക്വഥനാങ്കം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഉപകരണ സജ്ജീകരണത്തിലെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

4 ഇഞ്ചിപ്പല്ല്, തുളസി, തുടങ്ങി മണമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി നിദ്ദേശിക്കുന്നു.

5 ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുക, മെഴുകു് ഉരുക്കുക, കടലാസ് കത്തുക എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

6 മുറക്കിയടയ്ക്കാത്ത കുപ്പിയിൽ നിന്ന് സ്പിരിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

7 രാത്രിയിൽ പ്രഭാകലനം നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യകാരണ ബന്ധം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നു.

8 മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോഴും നിറുകക്കയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോഴും ചൂടുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

9. ഖരവസ്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ദ്രാവകങ്ങളിൽ കലരുന്ന വർണ്ണ വസ്തുക്കൾ വേഗം വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

നൈപുണ്യം

1. പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നൈപുണ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

2. ഒരേ ആകൃതിയിലുള്ള പലതരം പദാർത്ഥങ്ങളും ഒരേ പദാർത്ഥംകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച പല ആകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളും സംഭരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു.

3. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു.

4. പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ, നിഗമനങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവു ഉണ്ടാകുന്നു.

5. നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ച് ചില ലഘു ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യം നേടുന്നു.

അവശ്യോപകരണങ്ങൾ

ഗ്ലാസ്സ് കഴൽ, പരീക്ഷണനാളികൾ, ബീക്കർ, സ്പടികപ്പലക, റബ്ബർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്സ്, ഇരുമ്പ് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കഴലുകൾ, ഇരുമ്പുകമ്പികൾ, ഹോൾഡർ, ഫ്ലാസ്ക്ക്, ഒറ്റ ലാഭമുള്ളതും ഇരുപാലുള്ളതുമായ കോർക്കുകൾ, സ്റ്റാൻഡ്, സ്ക്വിംഗ് ലാമ്പ്, ചൈനാഡിഷുകൾ, ഫൈബ്രജൻ വാതകജാർ, ചോർപ്പ്, റബ്ബർക്കുഴലും ക്ലിപ്പും, മണ്ണെണ്ണ, ആൽക്കഹോൾ, കറിയപ്പ്, തരിശ്, പഞ്ചസാര, സർഫ്ക്ടറിക്കാസിഡ്, തെർമോമീറ്റർ; മെഴുകു, കരിങ്കൽച്ചീല്ല്, ലെൻസ്, മോർട്ടാറും പെസിളും, അരിപ്പകടലാസ്, ചോക്കുപൊടി, സ്പടികഭണ്ഡം, പാൽ, മൈക്രോസ്ക്കോപ്പ്, സ്പെക്ട്രം ഫ്ലൂറൈഡ്, ലിബ്രിഗ്, സാഗ്രകാരി, കമ്പിവല, ഫേം, ചെമ്പുതകിട്, മെഗ്നീഷ്യം കമ്പി, പിച്ചാത്തി, അണുജം, മാർബിൾ, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡ്, ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം, കോപ്പർസൾഫേറ്റ്.

രസതന്ത്രം നിത്യജീവിതത്തിൽ

അവതരണം: —

പരീക്ഷണ ശാലയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രസതന്ത്രപഠനം ആരംഭിക്കാം. പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശേഷസാഹചര്യങ്ങളിൽ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് രസതന്ത്രം.

പരീക്ഷണശാലയിൽ പല ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ, ബീക്കറുകൾ, പരീക്ഷണ നാളി, നിർഗ്ഗമനക്കുഴൽ, ഫ്ലാസ്കുകൾ, സിലിണ്ടറുകൾ, ഇവയെല്ലാം ഒരു സംഘം കട്ടികൾക്ക് നൽകുക. മറ്റൊരു സംഘം, കട്ടികൾക്ക് ഒരേ വലിപ്പവും ആകൃതിയുമുള്ള അഞ്ചു കട്ടകൾ നൽകുക. അഞ്ചു അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം ഉദാ:—ചെമ്പ്, തടി, പ്ലാസ്റ്റിക്, അലൂമിനിയം, ഇരുമ്പ്, എന്നിവ. പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം രണ്ടു സംഘങ്ങളും അവരവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യട്ടെ. ഈ രണ്ടു സെറ്റു ഉപകരണങ്ങളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ അവരോട് പറയുക. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരം പറയട്ടെ.

1. ഒന്നാത്തെ സെറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ളവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്.

ആദ്യത്തെ സെറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവയാണെങ്കിലും അവ ഒരേപദാർത്ഥത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ളവ ഒരേ ആകൃതിയുള്ളവയെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബീക്കർ പരീക്ഷണ നാളി, കുഴൽ എന്നിവയെ ഭൗതിക

വസ്തുക്കളെന്നും അവ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിച്ച ഗ്ലാസ്, തടി, പ്ലാസ്റ്റിക്; അലൂമിനിയം, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, എന്നിവയെ പദാർത്ഥങ്ങളെന്നും പറയുന്നുവെന്ന് അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കണം. പലതരം സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക. അതിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെന്നും പദാർത്ഥങ്ങളെന്നും തരം തിരിച്ച് അവർ നോട്ടുബുക്കിൽ എഴുതട്ടെ.

ഉടഞ്ഞ പരീക്ഷണ നാളി കണ്ണാടിച്ചിലിന്, കുപ്പിക്കുപ്പണങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു മോർട്ടാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചു പൊടിച്ചു കൈ. പൊടിച്ചപ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം എന്തു സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചു പറയട്ടെ. പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവയുടെ ഭൗതികരൂപം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഗ്ലാസ് എന്ന പദാർത്ഥമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ പല ആതൃതീയലുള്ള സാധനങ്ങളല്ല, രസതന്ത്രത്തിന്റെ പഠനവിഷയമെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം.

ഏതാനും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭേദപരയാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അവർ പറയാത്ത ഏതാനും പദാർത്ഥങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കൾ മുതലായവ പരീക്ഷണശാലയിൽനിന്നെടുത്ത് അവരെ കാണിക്കുക. ഇതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവരെ ധരിപ്പിക്കണം. ധാരാളം പദാർത്ഥങ്ങൾ നാം പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നു. മനുഷ്യനുപയോഗമുള്ള അനേകം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിത്യേനയെന്നോണം രസതന്ത്രജ്ഞന്മാർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം വഴി മനുഷ്യർക്കുപയോഗമുള്ള പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് രസതന്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. രസതന്ത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ ചിലതരം ധാതുക്കൾ, കൃത്രിമമായ കറുപ്പ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കറുപ്പ് എന്നിവ കുട്ടികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ. അവയുടെ ഉപയോഗവും അവർ പറയണം.

രസതന്ത്രത്തിന് നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള സാധനവും പ്രാധാന്യവും വിശദമാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ അല്പാപകർ കുട്ടികൾക്കു നൽകും. പലതരം സാമ്പിളുകൾ, ചാർട്ടുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഇതു സാധിക്കാം. സരകയ്ക്കപ്പുറ മെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വളനിർമ്മാണശാല, സോപ്പ് ഫാക്ടറിലോ ഹ വ്യവസായശാല, എന്നിങ്ങനെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറികൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള സരകയ്ക്കവും സന്ദർഭവും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. മുരുങ്ങിയപക്ഷം ഒരു സോഡാഫാക്ടറിയെങ്കിലും കുട്ടികൾ സന്ദർശിക്കട്ടെ. നിത്യജീവിതത്തിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്ന കാരോകുറിപ്പുകൾ അവർ തയ്യാറാക്കട്ടെ.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായശാല സന്ദർശിച്ച അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടേയും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക.

2. അഞ്ചു ഭൗതികവസ്തുക്കൾ പരിശോധിച്ചു അവയുടെ പേരും അവ ഓരോന്നിലും അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ പേരും കുറിയ്ക്കുക.

3. നെൽ കൃഷിയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ചു രാസ വളങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവയുടെ പേര് കുറിച്ചെടുക്കുക.

2. പരീക്ഷണശാലയിൽ

അവതരണം:—

പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണല്ലോ രസതന്ത്രം. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംഘടന, അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നൂതന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവയെ

ല്ലാം രസതന്ത്രപഠന വിഷയങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞവ സ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ. അതിനാൽ രസതന്ത്രപഠനത്തിൽ പരീക്ഷണശാലയും ഉപകരണങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തവയാണ്. ഈ രീതിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആവശ്യകത അദ്ധ്യാപകൻ കുട്ടികൾക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണം.

നാം ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ മിക്കതും സ്പെട്രികനിർമ്മിതമാണ്. ഇവയെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവയാണ്. പരീക്ഷകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അല്പം അശ്രദ്ധയോ സൂക്ഷ്മക്കുറവോ അനിയന്ത്രിതമായ ആപത്തിന് കാരണമായേക്കാം. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്. കാരണമെന്തെന്നിനേയും തൊടുന്നതിനോ മണപ്പിക്കുന്നതിനോ, തുച്ഛിച്ചുനോക്കുന്നതിനോ ഒക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം കുട്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പരീക്ഷണശാലയിലുള്ള ഏതൊരു ബീക്കറുകളും ഫ്ലാസ്കുകളും മറ്റും സ്വന്താവശ്യങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇതെല്ലാം ആപത്തിനെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്നുള്ള ധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണം. അതിനാൽ ക്ലാസ്സുമുറിയിലോ, വീട്ടിലോ പെരുമാറുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പരീക്ഷണശാലയിൽ അനുസരിക്കേണ്ട ചില ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തണം. ഈ ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നിപറയേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയെ സ്വാഭാവികമാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടറുപതിലാക്കി ലാബറട്ടറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാധാന്യകൂടിയ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഈ നിയമങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

എന്തെങ്കിലുമൊരു ദ്രാവകം തട്ടിത്തുകിയാൽ നാശനാശമാണ് ചെയ്യാനുള്ളതുപോലെ കുട്ടികൾ അത് തുടച്ചു മാറണം. ശ്രമിക്കും. ഈ ശ്രമത്തിൽ അവരുടെ കൈകളിൽ ആ ദ്രാവകം പറ്റിയെന്നുവരാം. തുകിച്ചത് ഒരു ആസിഡോ, ക്ഷാരമോ ആകാം. കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ അത് പൊള്ളലേല്പിക്കും. അതിനാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്യോപകരണ മേൽ നോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിക്കാവൂ. അപരിചിതമായ ഒരു പദാർത്ഥം മണപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും അല്യോപകരണ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊടുക്കണം. ഇതു കാണിക്കുന്ന ചിത്രവും നിരീക്ഷിക്കും പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ക്ലോറിൻ വാതകം ഈ പ്രദർശനത്തിനു പയോഗിക്കാം.

പരീക്ഷണശാലയിൽ സാധാരണ കൈകാഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും സ്വഭാവവും ഉപയോഗവും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണമായി:—

പരീക്ഷണശാലയിൽ അല്പംവെള്ളം ചൂടാക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ. സൗകര്യമായി ചൂടാക്കാനുപയോഗിക്കാവുന്ന പാത്രമേതെന്ന് അല്യോപകരണ കുട്ടികളോടു ചോദിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ പരീക്ഷണ നാളി, ബീക്കർ, കോണിക്സ്ഫ്ലാസ്ക് എന്നിവ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പരീക്ഷണനാളിനേരിട്ട് തീജ്വാലയിൽ പിടിച്ചാൽ കൈപൊള്ളുകയില്ലേ? അതിന് എന്തു ഉപകരണമുപയോഗിക്കാം? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഒരു ഹോൾഡർ തല്ക്കാലം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസ് നെടുക്കെ മടക്കി ഹോൾഡറായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാം.

സ്റ്റിരിട്ട് ലാമ്പ് സ്വല്പം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകരണമാണ്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെലീനിയം റീട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ്. അതുകൊണ്ട്

സംപിരിട്ട് ലാമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. കരുതിക്കത്തക്കവണ്ണം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്പിരിറ്റുലാമ്പ് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളെ ശുപ്തകളായി തിരിച്ച് ഓരോ ശുപ്തിനെക്കൊണ്ടും ഒരു സംപിരിട്ട് ലാമ്പ് സജ്ജീകരിപ്പിക്കുക. തിരിന്നനശ്ശേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്നും നല്ല ജ്വാല കിട്ടത്തക്കവണ്ണം തിരി എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്നും കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക. സംപിരിട്ടിനടുത്തു് തീജ്വാല കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്ന വസ്തുത കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണം. കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംപിരിട്ട് ലാമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കും കൊണ്ടുപോയാൽ കലക്കം കാരണം സംപിരിട്ട് കപ്പിയുടെ കഴുത്തിന് വെളിയിൽ പാക്കുമെന്നും പെട്ടെന്നു് തീ പിടുത്തമുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. അതുപോലെ സംപിരിട്ട് ലാമ്പ് ഉറപ്പി കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപകടമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. മുടിക്കൊണ്ടെടുത്താൽ സംപിരിട്ട് ലാമ്പ് കെടുത്താൽ ശ്രമിക്കാവൂ. സംപിരിട്ട് ലാമ്പിന്റെ ജ്വാലയുടെ ഏറ്റവും ചൂടു കൂടിയ ഭാഗം മുകളറ്റമാണെന്നു് പരീക്ഷണത്താൽ കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. കുട്ടികൾ ബുക്കിൽ സംപിരിട്ട് ലാമ്പിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കട്ടെ.

വിപരീതരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ലഘു പരീക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണു്. താഴെ പറയുന്നവ ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്.

a പരീക്ഷണനാളിയിൽ ജലം തിളപ്പിക്കുക.

b ബീക്കറിൽ ജലം തിളപ്പിക്കുക.

c ഒരു സംപിരിട്ട് ലാമ്പിൽ നല്ല ജ്വാല കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ക്രമീകരിക്കുക.

പദാർത്ഥം—പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ—ഗുണങ്ങൾ

നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഏതാനും മാർഗ്ഗങ്ങൾ

അവതരണം

എന്താണു പദാർത്ഥമെന്നു ക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പദാർത്ഥങ്ങളെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കട്ടികളുടെ കഴിവു് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾമൂലം അദ്ധ്യാപകൻ പരിശോധിക്കണം. ഇനി വിഭിന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഏതാനും മാർഗ്ഗങ്ങളുമായി കട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ചില ലഘു പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയായ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടിയാ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു് കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

രണ്ടു് പരീക്ഷണ നാളികളിൽ, ഒന്നിൽ പഞ്ചസാരയും മററതിൽ വെള്ള മണലും എടുത്തു് കട്ടികളെ കാണിക്കുക. രണ്ടു് തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവശ്യപ്പെടുക. പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ലായനിയ്ക്കു് താഴെയുണ്ടു്. മണൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടു് പദാർത്ഥങ്ങളെയും വേർ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും എന്നു് അദ്ധ്യാപകൻ കട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

രണ്ടു് പരീക്ഷണ നാളിയിൽ ഒന്നിൽ എണ്ണയും മററതിൽ തേനും എടുത്തു് അവയെ തിരിച്ചറിയുവാനാവശ്യപ്പെടുക. ഒരു അലുമിനിയം കരണ്ടിയും സുറോയിൻലസുറാൽ കരണ്ടിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാനാവശ്യപ്പെടുക. ഇവ ഓരോന്നും കട്ടികൾ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതു് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു് അവരെക്കൊണ്ടു് പറയിക്കുക. ഇങ്ങനെ പദാർത്ഥങ്ങളെ സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അവയ്ക്കു് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതു് അവയ്ക്കുള്ള ചില സവിശേഷതകളാണെന്നു കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. എന്തെല്ലാമാണീ സവിശേഷതകൾ?

തേനിനെ മണം തചി മുതലായവകൊണ്ടു് എണ്ണയിൽ നിന്നു് വേർതിരിച്ചറിയാം. അദ്ധ്യമിനിയം കരണ്ടിയു് സ്തീൽ കരണ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ചു് തിളക്കവും ഭാരവും കുറവാണു്. മണ്ണെണ്ണയെ ഗന്ധംകൊണ്ടു് മറ്റു് എണ്ണകളിൽ നിന്നു് വെളുത്തതിൽ നിന്നു് വേർതിരിച്ചറിയാം. ഇങ്ങനെ നിറം, ഭാരം, തിളക്കം, ഗന്ധം, അകൃതി എന്നീ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു പദാർത്ഥത്തെ മറ്റൊരു പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നു് വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നു് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

ഒരു കഷണം ചെമ്പും ഒരു കരിക്കട്ടയും കുട്ടികളെ കാണിക്കുക. നിറത്തെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയല്ല അവയെ വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നു് അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കുന്നു. കരിയെ തല്ലിയാൽ അതു് പൊടിത്തൂപ്പാകുന്നു. എന്നാൽ ചെമ്പിനെ തല്ലി പരത്താൻ കമ്പികളാക്കാനു് സാധിക്കുന്നുവെന്നു് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഇതു പോലെ തല്ലിച്ചത്തോന്നു് കമ്പിയാക്കാനു് കഴിയുന്ന മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പേരു് കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു് പറയിക്കുക. ഇവയെ പൊതുവേ ലോഹങ്ങൾ എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നുവെന്നു് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്നു് മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി സാദൃശ്യമോ അപര്യയ്ക്കു് നിന്നു് വ്യത്യാസമോ ഉള്ളവയെന്നതിന്നു് അടിസ്ഥാനമായ ഏതെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ആ പ്രത്യേകതകളെക്കൂടെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതെന്നു് അദ്ധ്യാപകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളായ രുചി, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നിവ സ്ഥലം; നിറം, മണം തിളക്കം, കാഠിന്യം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെടുന്നുവെന്നു് അദ്ധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗുണനിർണ്ണയംകൊണ്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താരതമ്യപഠന അപൂർണ്ണമാണു്. ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണപഠനം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു് പരീക്ഷണരീതിയാശ്രയനകൾ നടത്തേണ്ടതാണു്

അങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഭ്രവണാങ്കം, കപമ
ണാങ്കം, വിശിഷ്ടഘനതപം മുതലായവ.

വിപുലീകരണം:—

1. കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന പേനയുടെ ഓരോ ഭാഗവും എന്തു പ
ദാർത്ഥംകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു വെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ.

2. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ് ബോക്സിനകത്തുള്ള വിവിധഉപക
രണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തെ
ല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചറിയട്ടെ.

3. ഒരു സഞ്ചിയിലുൾക്കൊള്ളിച്ച് പേന, ചീപ്പ്, പേൻസിൽ, ബി
സ്കററ്റ്, റെട്ടിക്കുഷണ പലതരം കായ്കൾ ഗോലി, വള
(പ്ലാസ്റ്റിക് ഓഗ്സ്) എന്നിങ്ങനെയെല്ലാപദാർത്ഥം വസ്തു
ക്കൾ ഇട്ടതിനുശേഷം ഓരോകുട്ടിയും സഞ്ചിയിലുൾക്കൊള്ളി
ച്ച് സ്പർശിച്ച് നോക്കിയശേഷം അതിനകത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ
പേരുകൾ എഴുതട്ടെ.

പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാം:—

ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ചില ഗുണവിശേഷങ്ങളുണ്ടെ
ന്നു ഇവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള താരതമ്യപഠനം അപൂർണ്ണ
മാണെന്നു കുട്ടികൾക്കറിയാ ചില ഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന
തിനു ചില ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ആരീതിയിൽ
കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ചിലഗുണങ്ങളായ വിശിഷ്ടഘനതപം, കപ
മനാങ്കം, ഭ്രവണാങ്കം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തു്
പ്രതിപാദിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതു്.

പദാർത്ഥത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഘനതപം എന്നാലെന്തു്?
ഏകക വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തെ അതിന്റെ വി
ശിഷ്ട ഘനതപമെന്നു പറയുന്നു. തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള പലതരം പദാ
ർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കുക. ഉദാഹരണമായി 1 cc വ്യാപ്തമുള്ള പലക

കുറു ചെമ്പ്, ഇരട്ട, ഇരുമ്പ്, തടി മെഴുകു മുതലായവ കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എടുക്കുക. ഓരോന്നിന്റെയും പിണ്ഡം നിർണ്ണയിക്കുക. പിണ്ഡം തുല്യമായിരിക്കുമോ? ഓരോന്നിന്റെയും പിണ്ഡം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിയുന്നു. കുട്ടികളുടെ വ്യാപ്തം തുല്യമാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ പിണ്ഡം തുല്യമല്ല. ഇതിന് കാരണമെന്താണ്. ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട്. അതായത് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ഘടന പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോന്നിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തെളിയും. ഈ കാരണത്താലാണ് അവയുടെ പിണ്ഡവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിശ്ചിതവ്യാപ്തത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിണ്ഡം തുല്യമായിരിക്കുകയില്ല.

ഭാവകങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണമാണല്ലോ അവയ്ക്ക് നിശ്ചിത ക്വട്ടന്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഈ പാഠികളാണ് നടത്തേണ്ടവിധവും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും പാഠപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്വട്ടന്റം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് സെർസിയസ് (സെന്റിഗ്രേഡ്) തെർമോമീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ തെർമോമീറ്റർ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കണം.

ശുദ്ധജലം തിളയ്ക്കുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ (760 mm മർദ്ദത്തിൽ) 100° സെന്റിഗ്രേഡിലാണല്ലോ. മറ്റും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഭാവകത്തിന്റെ ക്വട്ടന്റം വ്യത്യാസപ്പെടും. മറ്റു കാരണങ്ങൾ ക്വട്ടന്റം കുറയും. മർദ്ദം കൂടിയാൽ ക്വട്ടന്റം കൂടും എന്ന വസ്തുതകളും അദ്ധ്യാപകൻ കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കണം.

ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഗുണമാണ് അവയ്ക്കോ ഓരോന്നിനുമുള്ള ഭവണങ്കാ. ഖരപദാർത്ഥം ഉരുകുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിലാണ്. ഓരോ പദാർത്ഥവും ഒരു നിശ്ചിത

താപനിലയിൽ മാത്രമേ ഉരുക്കുകയുള്ളൂ എന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണം പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. പരീക്ഷണത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത് മെഴുകു ഗന്ധകവുമാണ്. പരീക്ഷണനാളികളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരു ബീക്കറിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒന്നിച്ചു താഴ്ത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൂടാക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. പരീക്ഷണത്തിൽ മെഴുകു ഗന്ധകവും ഒരു സമയത്തു തന്നെയാണോ ഉരുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കുട്ടികളോട് നിർദ്ദേശിക്കണം. വെള്ളം തിളയുന്നതിന് മുൻപ് മെഴുകു ഉരുക്കുന്നു എന്നു കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അതേതാപനിലയിൽ ഗന്ധകം ഉരുക്കുന്നില്ല. തിളയുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഏതുമയം മുങ്ങിയിരുന്നാലും ഗന്ധകം ഉരുക്കുന്നില്ലെന്നു അവർ നിരീക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അല്പാപകൻ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്നോ, മെഴുകു ഗന്ധകവും ഉരുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടാ ഒരു താപനിലയിലല്ല ഉരുക്കുന്നതെന്നു്. വെള്ളത്തിന്റെ ക്വഥനാങ്കത്തിലും താഴ്ന്നതാപനിലയിൽ മെഴുകു ഉരുക്കുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വഥനാങ്കത്തിലും ഉയർന്നതാപനിലയിലാണ് ഗന്ധകം ഉരുക്കുന്നത്. മെഴുകിന്റെയും ഗന്ധകത്തിന്റെയും ദ്രവണാങ്കങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്നു അല്പാപകൻ മേല്പറഞ്ഞ താരതമ്യപഠനംകൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കണം.

ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ഒരു നിശ്ചിതദ്രവണാങ്കമുണ്ട്. ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം 0°C ആണ്. മെഴുകിന്റെ ദ്രവണാങ്കം 53°C ആണ്. ഒരു പദാർത്ഥം ശുദ്ധമാകുന്നതാൽ മാത്രമേ അതിനു നിശ്ചിത ദ്രവണാങ്കം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പദാർത്ഥത്തിൽ കലർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ഖാസായനങ്ങളും ചൂടാക്കിയാൽ ഉരുക്കുന്നില്ല. സ്റ്റാർച്ച്, തടി, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, എന്നിവ ചൂടാക്കിയാൽ കരിഞ്ഞുപോകുകയോ പൊടിഞ്ഞുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നു.

വിപുലീകരണം:—

1. വെണ്ണയുടെയും മെഴുകിന്റെയും ഭൂവണാങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് താരതമ്യപഠനം നടത്തുക.

2. സീലിംഗ് വാക്സിന്റെ ഭൂവണാങ്കം ഒരു തെർമോമീറ്റർ രൂപയോഗിച്ച് കാണുക.

തന്മാത്രകളും പദാർത്ഥങ്ങളും

അവതരണം:—

പദാർത്ഥമെന്നാൽ എന്താണെന്നും അതു ഗുണങ്ങളിൽ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദാർത്ഥമെന്ന പദയെന്നതിന്റെ ഘടനയെന്താണെന്നും അത് എന്തിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ ധരിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പദാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മഘടകമാണ് തന്മാത്രയെന്ന് കട്ടികളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം.

കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ അതിന്റെ നിറം, ക്രിസ്റ്റലൈസൽ ലേയതപം എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ കട്ടികൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക. മോർട്ടറിയിട്ട് അത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ച് ചെറുതരികളാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരു തരി സൂക്ഷ്മതയോടെ പുറത്തെടുക്കുക. ഈ തരിയെ വീണ്ടും അനേകം ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാറ്റിപ്പ, എത്രയുണ്ടാകുമെന്ന് കട്ടികൾ ആലോചിക്കട്ടെ. ഈ തരിയെ അനേകായിരം അംശം ചെറുതാക്കിയാലും അതിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെറിയ കണികയെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ തന്മാത്രയെന്നു പറയാം. തന്മാത്രയെന്നാൽ നമുക്ക് നോട്ട് കാണാനോ കണ്ണിലെടക്കാനോ പറയാത്തവിധം അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണെന്നും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ

കൂടി കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം 33, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ആണ്. മിനിറ്റിൽ ആയിരം എന്ന തോതിൽ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽപോലും ഒരു ഗ്രാം വെള്ളത്തിലെ തന്മാത്രകൾ മുഴുവൻ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ അറുപതു കോടി വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്ന വസ്തുത കുട്ടികൾ അറിയട്ടെ.

എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഇതുപോലെ - തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അവയുടെ തന്മാത്രകൾക്കും വ്യത്യാസം കാണുമെന്നും അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കണം. തന്മാത്രകൾക്കിടയിൽ ധാരാളം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ള രീതിയിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അവ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 100 മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളമെടുത്തു അതിൽ 10 മില്ലി ലിറ്റർ പഞ്ചസാരലായനിയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ. അതിന് 110 മില്ലിലിറ്റർ വ്യാപ്തം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലെന്ന് തെളിയും. പഞ്ചസാരയുടെ തന്മാത്രകളെല്ലാം ജലതന്മാത്രകൾക്കിടയിലെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ലായനിയുടെ വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കാതിരുന്നത്. ഖരവസ്തുക്കളിൽ ദ്രാവകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തന്മാത്രകൾക്കിടയിലെ ഒഴിഞ്ഞസ്ഥലം കുറവായെന്നും വാതകങ്ങളിൽ അത് കൂടുതലാണെന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾവഴി കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ചൂട് തട്ടുന്നോടോ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം വർദ്ധിക്കുന്നു. ചൂട് തട്ടിയാൽ വെള്ളം വികസിക്കുന്നുവെന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തന്മാത്രകൾക്ക് ചലനസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പനിനിർ പൂവിന്റെ ഗന്ധം അല്ല അകലെനില്ക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം കുട്ടികൾ പറയട്ടെ. സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിലെ തന്മാത്രകൾ പൂവിൽനിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നാസാമന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മണം നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നത്. എല്ലാതന്മാത്രകൾക്കും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് പരീക്ഷണം കാണിച്ച് വിശദമാക്കുക. ഫൈബ്രജൻ ജാറിന മുകളിൽ

ളിൽ വായുവുള്ള ജാൻ കമഴ്ത്തിയാൽ ഫൈബ്രജൻ തന്മാത്രകൾ മുകളിലെ ജാറിൽ എത്തുന്നു. മുകളിലെ ജാറിലെ ഫൈബ്രജന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, വാതകം കത്തിച്ചു കാണിക്കുന്നതുവഴി അലോപകൻ തെളിയിച്ചുകൊടുക്കണം. ഫൈബ്രജൻ പണികൾ ജാറിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെത്തിയതിന് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

വാതകങ്ങളെപ്പോലെ ദ്രാവകങ്ങളുടെയും ചെറുവസ്തുക്കളുടേയും തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴി തെളിയിക്കുക. പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ). ചലനം വഴി ഒരു പദാത്മത്തിന്റെ തന്മാത്രകൾ മറ്റൊന്നിന്റെ തന്മാത്രകളുമായി ഇടകലരുന്ന പ്രവൃത്തിയെ അന്തർവ്യാപനമെന്ന് പറയുന്നുവെന്ന് അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.

തന്മാത്രകളുടെ ഗുണമാണ് അതടങ്ങുന്ന പദാത്മത്തിന്റെ ഗുണം. ഒരു പദാത്മം ഗുണങ്ങളിൽ മറ്റൊരു പദാത്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് കുട്ടികൾ ആലോചിച്ചു കണ്ടുപിടിയ്ക്കട്ടെ. പദാത്മങ്ങളിലടങ്ങുന്ന തന്മാത്രകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അവയുടെ ഗുണങ്ങളിലുള്ള വിഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമെന്ന നിഗമനത്തിലേയ്ക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുക. കാർബണിന്റെ തന്മാത്രകൾ ഓക്സിജന്റെ തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് ഭാരം, ഗുണം എന്നിവയിൽ വിഭിന്നമായിരിക്കും.

വിവചരിക്കണം:-

1. ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ അപ്പാർമഷി വീഴ്ത്തുക. മഷിയുടെ നിറം ജലത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം തന്മാത്രകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമാക്കുക?

2. ഓക്സിജൻ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന കർപ്പൂരം അപ്പനോടുകൂടിത്താൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നാൽ അടുത്തുള്ള വാക്ക് കർപ്പൂരഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാതെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഗമനം വിശദമാക്കുക?

ശുദ്ധപദാർത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും

നാം പ്രകൃതിയിൽ പല പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ നിസ്സാരമായ തോതിലെങ്കിലും അവയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണം. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയിൽ കലർപ്പുണ്ടെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര മുതലായവ, കടിയുണ്ടാക്കുന്ന ജലം ശ്വസിക്കുന്ന വായു എന്നിവയൊന്നും ശുദ്ധമായതല്ല എന്ന അറിവും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

അവതരണം:—

കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ കരിങ്കൽക്കഷണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. അതിൽ അവർ കാണുന്നതെന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. ബാഹ്യമായി കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ പദാർത്ഥം മാത്രമാണെന്ന് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കുട്ടികളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താം. പാറ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ കരിങ്കൽ കഷണത്തെ നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചു ആ പൊടിയെ ലെൻസിൽകൂടി കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് നിരീക്ഷിപ്പിക്കുക എന്തു കാണുന്നുവെന്ന് അവർ തന്നെ പറയട്ടെ. തിളക്കമുള്ള അഭൂതതരികൾ, നിറമുള്ള വെള്ളാരങ്കൽ തരികൾ, വെളുത്തതോ പിങ്ക്നിറത്തിലോ ഉള്ള ഫെൽസ്പാർ തരികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് കരിങ്കല്ല്. എങ്കിലും കഴ്ചയിൽ ഒരു സാധാരണ പദാർത്ഥമായിട്ടാണ് കരിങ്കൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ധ്യപകൻ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കണം.

അല്പം പഞ്ചസാര, ഇരുമ്പുപൊടി എന്നിവ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി കുട്ടികൾ ഒരു ലെൻസിൽകൂടി നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. കറുപ്പു

ണന്നതെന്താണെന്ന് അവർ പറയട്ടെ. പഞ്ചസാരയെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെയുള്ള കണികകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇരുമ്പുതരികൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഇതേ അനുഭവം തന്നെ. ഒരേ തരത്തിലുള്ള കണികകൾ മാത്രമേ ഓരോ പദാർത്ഥത്തിലും അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കരിങ്കൽ പൊടി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള കണികകൾ അവർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് എന്താണ് കൂട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പഞ്ചസാര, ഇരുമ്പുപൊടി എന്നീ ഓരോന്നിലും ഒരേപോലെയുള്ള (തുല്യസ്വഭാവമുള്ള) കണികകളാണുള്ളത് എന്നാൽ കരിങ്കല്ലിൽ വിഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാണുള്ളത്. അതായത് കരിങ്കൽ ഒന്നിലധികം പദാർത്ഥങ്ങൾ കലന്ന് ഒരു മിശ്രിതമാണെന്ന് കൂട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. പഞ്ചസാര, ഇരുമ്പുപൊടി മുതലായ ഒരേതരം കണികകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ഏകാത്മകമെന്ന് പറയുന്നതായി അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. കരിങ്കൽ പോലെ വിഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ള കണികകൾ കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥത്തെ ഭിന്നാത്മകമെന്ന് പറയുന്നു എന്നും പറയണം.

ഇനി, പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക. ഒരു മോർട്ടാറിൽ അപ്പം പഞ്ചസാരയും വെള്ളമുണ്ടാകുമെത്തു് നല്ലവണ്ണം പൊടിയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പൊടിയിൽ എന്തെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂട്ടികൾ പറയട്ടെ. ഉൺതരിയേയും പഞ്ചസാരത്തരിയേയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കൂട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? കാഴ്ചയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂട്ടികൾ കാണുന്നില്ല. പഞ്ചസാരത്തരികളും മണൽ തരികളും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ മിശ്രിതത്തെ ഒരു ബിക്ക്കറിലിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചു് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക. കുറച്ചു് തരികൾ അലിയാതെ ശേഷിക്കുന്നത് കൂട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചു് ഈ ദ്രാവകത്തെ അടിയ്ക്കുക. അടിച്ചു കിട്ടുന്ന ദ്രാവകം അപ്പം

കുട്ടികൾ രചിച്ചു നൽകട്ടെ. അതിനു മധുരമുണ്ട്. പഞ്ചസാരയുടെ ഗുണമാണല്ലോ മധുരം. അതു് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നതുമാണല്ലോ. ഇനി, തുണിയിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്താണെന്നു് കുട്ടികൾക്കു് പറയട്ടെ.

ഈ മിശ്രിതത്തിൽ ഓരോ ഘടകവസ്തുവും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായതു് പഞ്ചസാരയുടെയും മണലിന്റെയും തന്മാത്രകൾ വിഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ളവയാണെന്നു് കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചറിയുന്നു. എന്നാൽ കാഴ്ചയിലോ? അവയെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണു്. ഇങ്ങനെ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തസ്വഭാവമുള്ള തന്മാത്രകൾ ചേർന്നതായ പദാർത്ഥത്തെ (ഭിന്നാത്മകം) മിശ്രിതം എന്നു പറയുന്നുവെന്നു് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഗുണങ്ങളിൽ ഉല്യസ്വഭാവമുള്ള (ഏകാത്മകം) തന്മാത്രകൾ ചേർന്നതായ പദാർത്ഥത്തെ ശുദ്ധപദാർത്ഥമെന്നു് പറയുന്നുവെന്നും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു പരീക്ഷണം (ഉപ്പു ചാക്കും ഉപയോഗിച്ചു്) പാഠ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷണം കുട്ടികൾ തന്നെ നടത്തി ഉപ്പു ചാക്കും ഭിന്നാത്മക സ്വഭാവമുള്ള തന്മാത്രകൾ കലർത്താണെന്നു് മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

പഞ്ചസാര, ഇഞ്ചമ്പു്, ഗന്ധകം എന്നിങ്ങനെ ഏകാത്മകമായ തന്മാത്രകളുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധവസ്തുക്കളെന്നു് പറയുന്നുവെന്നു് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഒന്നിലധികം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കലർപ്പാണു് മിശ്രിതം എന്നും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

നാം കടയിൽ നിന്നു് വാങ്ങുന്ന ഉപ്പു് ശുദ്ധമാണോ? വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചാൽ ലായനിയുടെ അടിയിൽ എത്ര കാണുന്നുവെന്നു കുട്ടികൾ അനുഭവത്തിൽനിന്നു് പറയട്ടെ. കുറച്ചു കിണറു വെള്ളമെടുത്തു് ചൂടാക്കി വററിക്കുക. പാത്രത്തിനിടയിൽ എത്ര ശേഷിക്കുന്നുവെന്നു് കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതു്

പോലെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ മിക്കതും ശുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം ശുദ്ധമല്ല. അവയിൽ കലർപ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നാ കടിയുണ്ടെന്നതിന് പൈപ്പിൽനിന്നുപോന്ന ജലം, ശ്വസിക്കുന്ന വായു എന്നിവയെല്ലാം മിശ്രിതങ്ങളാണ്. ചില ഉപദ്രവങ്ങളുള്ള വെള്ളത്തിന് രാസധനം കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം കട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ. പ്രകൃതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു ശുദ്ധമായ ജലം മഴവെള്ളമാണല്ലോ. ഇത് പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധമല്ല. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ, അമോണിയ എന്നീ വാതകങ്ങൾ ലയിപ്പിച്ചു പൊടിപടലങ്ങൾ ലയിക്കുകയും മഴവെള്ളത്തിന് കാണപ്പെടുന്നു.

ഒരു പദാർത്ഥം ശുദ്ധമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും നിശ്ചിത ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഈ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പദാർത്ഥം ശുദ്ധമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു ഉചിതമായ ചോദ്യങ്ങളിൽകൂടി കട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക.

വിപരീതരണവും മുമ്പുനിർണ്ണയവും

1. തന്നിരിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ നാദംപിൻ ശുദ്ധമാണോ എന്ന് പരീക്ഷാധികൃത.

2. കടയിൽനിന്നു വാങ്ങിയ ഉപ്പിൽനിന്ന് അപ്പു ശുദ്ധമായ ഉപ്പു തയ്യാറാക്കുക.

3. കുറച്ചു വെള്ളം തന്നിരിക്കുന്നു. അത് ശുദ്ധപദാർത്ഥമാണോ മിശ്രിതമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. ഇതിനു അടിസ്ഥാനമായി അവലംബിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏവ? (വെടിമരുന്നു പൂട്ടാക്കാൻ പാടില്ല.)

പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം

ശുദ്ധപദാർത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും എന്താണെന്ന് കട്ടികൾക്കറിയാം. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ കലർപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന്

അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമുണ്ടെന്നാകുന്നു അതിനാൽ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണെന്നും ഉള്ള ധാരണ അവർക്കുണ്ടാകണം. ഊതെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ കലർപ്പുണ്ടായിരുന്നാലുള്ള ദോഷമെന്തെന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ധ്യാപകന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാം. ഉദാ:- പഞ്ചസാരയിൽ ഉപ്പ്, പെട്രോളിൽ ജലം മുതലായവ.

ഒരു വസ്തുവിലുള്ള അന്യവസ്തുക്കളെ മാറ്റാനവലംബിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെ ശുദ്ധീകരണം എന്നു പറയുന്നുവെന്ന് അദ്ധ്യാപകന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന് താഴെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പറയിക്കുക. അരിയും കല്ലും, ഉപ്പും മല്ലിയും, ഉപ്പും മണലും, ചാക്കു പൊടിയും വെള്ളവും, നെല്ല് പതിരും, വെളിച്ചെണ്ണയും വെള്ളവും മുതലായ മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിയ്ക്കാനവലംബിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരോന്നും പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ഏതേതു ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും കുട്ടികൾതന്നെ പറയട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഘടകവസ്തുക്കളുടെ ഗുണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അവയെ വേർതിരിയ്ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം.

ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കാനവലംബിക്കുന്ന ഏതാനും ലഘുപ്രയോഗങ്ങളുകായി കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് അടുത്തഘട്ടം. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലഘുപ്രയോഗങ്ങൾ തെളിയുററൽ അരക്കൽ ബാഷ്പീകരണം, സേചനം എന്നിവയാണ്.

തെളിയുററൽ:-

കറച്ച് ചെളികുലങ്ങിയ വെള്ളം കുട്ടികളെ കാണിക്കുക അതിൽ നീന്ത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന് ചേർക്കുക. തെളിയുററൽ രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കുട്ടികൾതന്നെ ശേഖരിക്കട്ടെ.

ചെളി, വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമോ? പഞ്ചസാരലായിനി പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആ ലായിനിയിൽ നിന്നു പഞ്ചസാരയെ ഈ രീതിയിൽ വേർതിരിയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. എന്നാൽ ചാക്കുപൊടി കലർന്ന വെള്ളം തെളിയുററൽ രീതിയിൽ വേർതിരിയ്ക്കാമെന്നും കുട്ടികൾ കാണട്ടെ. ഇതിൽനിന്നു വെള്ളത്തിലുള്ള അലേയമായ ഒരു പദാർത്ഥം ഘടകമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ തെളിയുററൽ രീതിയിൽ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്നു അദ്ധ്യാപകനു വ്യക്തമാക്കാം. കൂടാതെ ഈ രീതിയിൽ പരിപൂർണ്ണമായും രണ്ടു ഘടകങ്ങളേയും വേർതിരിയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

കറച്ചു എണ്ണയും വെള്ളവും കലർന്ന മിശ്രിതം കുട്ടികളെ കാണിക്കുക. നല്ലവണ്ണം കലക്കിയശേഷം അനക്കാതെ വയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. കുട്ടികൾ കാണുന്നതെന്താണ്? വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രണ്ടു അടുക്കു ദ്രാവകങ്ങൾ. ഇവയെ ഏതു രീതിയിൽ വേർതിരിക്കാമെന്നു കുട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ. അവർ വേർതിരിച്ചെടുക്കട്ടെ. പാറപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കുന്ന വിധം ക്ലാസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. തമ്മിൽ കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ വേർതിരിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കാം. ചാരായവും വെള്ളവും, പെട്രോളും വെള്ളവും കലർന്ന മിശ്രിതങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും.

അരികൽ:—

ചെളികലർന്ന വെള്ളത്തിൽനിന്നു ചെളിയും വെള്ളവും പൂർണ്ണമായി വേർതിരിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. പൂർണ്ണമായും വേർതിരിക്കുന്നതിനു എന്തു മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കാം? കുട്ടികൾ അവരെ വിട്ടിട്ട് ചായ അരികൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കാണു് പൂർണ്ണമായും

വേർതിരിയ്ക്കാമെന്നു കട്ടികൾ പറയുന്നു. ചായ അരിയ്ക്കുന്നതിനു തുണിയോ അരിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പരീക്ഷണശാലയിൽ അരിപ്പുകടലാസ്സു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.

ഒരു അരിപ്പുകടലാസ്സു എങ്ങനെയാണു് ഫലമായിൽ ചേർത്തുവയ്ക്കേണ്ടതെന്നു് അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കടലാസ്സു മടക്കുന്നവിധം, ചോർപ്പിൽ ചേർത്തു വയ്ക്കേണ്ട രീതി ലായനി അരിപ്പുകടലാസ്സിലേയ്ക്കു് ഒഴിയ്ക്കേണ്ട രീതി എന്നിവയെല്ലാം കട്ടികളെ ശുപ്തകളായി തിരിച്ചു് അവരെക്കൊണ്ടു് ചെയ്യിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സു രണ്ടു് ശുപ്തകളായി തിരിച്ചു് ഒരു ശുപ്തിനെക്കൊണ്ടു് ചാക്കുപൊടി വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങിയ ദ്രാവകം അരിപ്പിക്കുക. മറ്റേ ശുപ്തിനെക്കൊണ്ടു് കറിയുപ്പലായനിയാ അരിപ്പിക്കുക. രണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങളിലും അരിച്ചുകിട്ടുന്ന ദ്രാവകങ്ങളെ അവർ താരതമ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. ദ്രവേകത്തിൽ ലയിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രമേ അരിക്കൽകൊണ്ടു് വേർതിരിയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു എന്ന് അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാനജലം ശുദ്ധമെന്ന വിധം ഇതിനുശേഷം അദ്ധ്യാപകൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണു്. ഒരു ഫിൽട്ടർ ഹെഴസിനിലേയ്ക്കു് ഒരു പാനശാത്രനടുത്തി ഇഴപ്രവർത്തനം കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

ബാഷ്പീകരണം:—

കറിച്ചു് ഗന്ധകം കാർബൺഡൈ സൾഫയിഡിലിട്ടു് ലയിപ്പിച്ചശേഷം ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലൊഴിച്ചുവയ്ക്കുക. അപ്പോ കഴിഞ്ഞു് പരന്ന പാത്രത്തിൽ എത്ര ശേഷിക്കുന്നുവെന്നു് കട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ.

കറിയുപ്പലായിനിയിൽ നിന്നു് ശുദ്ധമായ കറിയുപ്പു് വേർതിരിയ്ക്കുന്ന പരീക്ഷണം പാറപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അദ്ധ്യാപകന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പരീക്ഷണം നാത്തി ശുദ്ധമായ ഉപ്പു് ശേഖരിക്കട്ടെ. ലായിനിയി

ലുള്ള ദ്രാവകം ബാഷ്പീകരിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിയ്ക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണിത്. എന്നു അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കണം.

സ്പേദനം:—

കുട്ടികൾക്കു് ബാഷ്പീകരണം എന്താണെന്നറിയാം. ബാഷ്പീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു് ബാഷ്പമായിപ്പോയ ദ്രാവകത്തെ ശേഖരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ. ബാഷ്പം മുകളിലോട്ടു് നഷ്ടപ്പെടാതെ ശേഖരിക്കാൻ ഉപകരണത്തിൽ എന്തു മാറ്റം ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ബാഷ്പത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതിനു് എന്തുപകരണം ഉപയോഗിക്കാം? ബാഷ്പം ഘനീഭവിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകം എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം? ഈവക പ്രധാന സംഗതികൾ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ വഴി കുട്ടികളിൽ നിന്നു് വരുത്താനാണു്.

അതിനുശേഷം അദ്ധ്യാപകൻ സ്പേദന ഫുളാസുകും ലീബിഗ് സാറുകാരിയും അവതരിപ്പിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും ഉപയോഗം വ്യക്തമാക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷണം പ്രദർശിപ്പിക്കുക. തുരിശുലായിറയാണു് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്. പരീക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാഗതികൾ കുട്ടികൾക്കു് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ സ്പേദന ഫുളാസുകും ലീബിഗ് സാറുകാരിയും ലഭ്യമാല്ലങ്കിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

ഒരു സാധാരണ ഫുളാസുകു് ഒറ്റദാരുമുള്ള ഒരു കോക്ഷു് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുക. കേർക്കിന്റെ ദാരുത്തിൽകൂടി ഒരു വളഞ്ഞ കണ്ണാടിക്കുഴൽ കടത്തുക. ഒരു മുക്കുപ്പണത്തിന്റെ രണ്ടു മുട്ടകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തു് അതിൽ ദാരുമിടുക. ഈ ദാരുങ്ങളിൽകൂടി കണ്ണാടിക്കുഴൽ കടത്തുക. മുക്കുപ്പണത്തിന്റെ വശങ്ങളിലും, മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ദാരുമിട്ടു് വശക്കുഴലുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക. (ഇതന്നുകമ്പി പഴുപ്പിച്ചുവെച്ച് ദാരുമുണ്ടാക്കാം.) താഴെയുള്ള കുഴലിൽകൂടി ജലം അകത്തു് പ്രവേ

ശിപ്പിക്കുകയും മുകളറ്റത്തുള്ള വശക്കുഴൽവഴി ജലം പുറത്തെയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. കണ്ണാടിക്കുഴലിന്റെ അറ്റത്തിനടിയിലായി ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക. ഇതിൽ സ്വേദനദ്രാവകം ശേഖരിക്കാം.

ചില ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലോഹനിർമ്മിതമായ ബോയിലറാ തണുപ്പിക്കാനുള്ള സ്വേദന സാമഗ്രികളും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഇഞ്ചിപ്പുല്ലിൽ നിന്ന് പുൽതൈലം ലഭിക്കുന്നതും മറ്റും ഇപ്രകാരമാണെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. വൻതോതിൽ വാറ്റുമ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്; കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പാനജലം സാദരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം മുതലായവ ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായി അദ്ധ്യാപകന് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്വേദനജലം ശുദ്ധമായതാണെങ്കിലും കുടിയ്ക്കാൻ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് അറിവും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണം. കിണറ്റിൽനിന്നും ഊറ്റുകളിൽനിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിൽ ഔഷധമൂല്യമുള്ള പലതരം ലവണങ്ങൾ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യദായകമാണ്. കാർബോറികളിൽ, മരുന്നുകൾ കത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്വേദന ജലത്തിന്റെ ആവശ്യവും അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കണം.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1 ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ചിമ്മിനി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ കൂടി കുറെ ചെറിയ വെള്ളം കടത്തി വിട്ട് അരിയ്ക്കുക.

2 'യക്കാലിപററസ്' ഇലാസ്റ്റിക്സ് അതിൽ നിന്ന് 'യക്കാലിപററസ്' സൂത്തു നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശിക്കുക. (തുള്ളിയിലുപയോഗിച്ച്, തുള്ളിപ്പത്തായാലും മതി)

രാസപ്രതിഭാസവും ഭൗതികപ്രതിഭാസവും.

ഉപ്പു, പഞ്ചസാര എന്നിവയെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നുവെന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയാം. വിറകുകത്തിലാമ്പലാകുന്നത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ളതല്ല എന്നുകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് വിവേചിച്ചുറിയുന്നതിനുള്ള കഴിവും മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏവയെന്നും അറിയുവാനുള്ള കഴിവും കുട്ടിക്കുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യം.

അവതരണം:—

പ്രകൃതിയിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് പലതരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടി കുട്ടികളുടെ ഈ മുന്നറിവ് അല്പംപകൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തു മാറ്റം കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അല്പംപകൽ പരിശോധിക്കുക.

- 1 കടലാസ്സ് കത്തുമ്പോൾ
- 2 ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ
- 3 കളിമണ്ണ് ചൂടാക്കി ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ
- 4 വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ

മേൽപറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പദാർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരമാണോ താൽക്കാലികമാണോ എന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ.

ഒരു മെഗ്നീഷ്യം കമ്പി കത്തിച്ചു കാണിക്കുക.

കത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ വെളുത്ത പൊടി കുട്ടികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ. മെഗ്നീഷ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാ

ഒരു പരാർത്ഥമാണിതെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് മേശീഷ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ കുറച്ചുമെഴുകെടുത്തു ചൂടാക്കുക മെഴുകിനുള്ളേമാറ്റം കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. ഉതകിയ മെഴുകു തണുക്കാനനുവദിക്കുക. ലഭിക്കുന്ന പരാർത്ഥമെന്തെന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ. ഇതുപോലെ താഴെപറയുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾ ശുപ്തകളായി ചെയ്ത് ഫലം നിരീക്ഷിക്കട്ടെ.

- 1 തീപ്പെട്ടിക്കോൽ കുത്തിച്ചാൽ
- 2 മെഴുകുതിരി കുത്തിച്ചാൽ
- 3 ഗന്ധകം ചൂടാക്കിയാൽ
- 4 സ്പടികദണ്ഡ് ചൂടാക്കിയാൽ

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടുതരം മാറ്റങ്ങൾ പരാത്ഥിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു

1. പരാത്ഥിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

ഉദാ.- മേശീഷ്യം കവി, തീപ്പെട്ടിക്കോൽ എന്നിവ കത്തുമ്പോൾ. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുതിയ പരാത്ഥിങ്ങളുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അവർ നിരീക്ഷിച്ചറിയുന്നു. ഇത്തരം മാറ്റത്തെ രാസപ്രതിഭാസമെന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കണം.

2. ചില പരാത്ഥിങ്ങൾക്ക് താല്ക്കാലിക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. പുതിയ പരാത്ഥിങ്ങളെന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉദാ.- മെഴുകു, സ്പടികം, എന്നിവ ചൂടാക്കുമ്പോൾ, വേളം തിളയുമ്പോൾ ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ

ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം പരാത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം താല്ക്കാലികമാണെന്നും പുതിയ പരാത്ഥിങ്ങളെന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

എന്നും കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരിയുന്നു. ഇത്തരം മാറ്റത്തെ ഭൗതിക പ്രതിഭാസമെന്നു പറയുന്നു.

പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റ രാസപ്രതിഭാസങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. പ്രകൃതിയിൽ സാധാരണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രാസമാറ്റമാണ് ഇരുമ്പു തുരുമ്പിക്കുന്നതെന്നു അദ്ധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാം.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ കുറച്ചു ചെഡ് പെർ ഓക്സൈഡ് എടുത്തു് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഈ പദാർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളോരോന്നും നിരീക്ഷിച്ചു് ഒരു കുറിപ്പു് തയ്യാറാക്കുക.

2. നല്ലവണ്ണം തേച്ചു മിനുസമാക്കിയ ഒരു ചെമ്പുപാത്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ഇതെന്തുതരം മാറ്റമാണെന്നു് പരീശോധിക്കുക

രാസക്രിയകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും

ഒരു പദാർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം രാസപ്രതിഭാസമാണോ, ഭൗതികപ്രതിഭാസമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്ങനെയാണു് കുട്ടികൾക്കറിയാം. ഒരു രാസമാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങളാൽ അതിനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലെന്തെല്ലാമാണെന്നു് കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണു് ഈ പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തെ അനുക്രമിച്ചു് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലെന്തെല്ലാമാണെന്നു കുട്ടികൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണു് ഈ പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തെ അനുക്രമിച്ചു് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലെന്തെല്ലാമാണെന്നു് കുട്ടികൾ അറിയാം. ഈ അറിവു് ഭാവിജീവിതത്തിൽ അവക്കു്

പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ളതും ഒരു ഉദ്ദേശ്യമാണ്.

(1) താപം:—

കറച്ചു നിറമുള്ള ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലെടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം തളിക്കുക, ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. പാത്രം കുട്ടികൾ സ്പർശിച്ചുനോക്കട്ടെ. താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതായത് നല്ല ചൂടുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് കുട്ടികൾ അനുഭവിച്ചറിയട്ടെ.

ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ അല്പം ഗാഢ നൈട്രിക് ആസിഡ് എടുത്ത് അതിലൊരു കഷണം ചെമ്പിടുക. ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. പരീക്ഷണനാളിയുടെ വശം തൊട്ടുനോക്കി താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസവും അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങളിലും രാസപ്രതിഭാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയാം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൂടുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അവർ നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു.

ചില രാസപ്രതിഭാസങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ചൂടുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും ചൂടിന്റെ അളവ് എല്ലാ രാസപ്രതിഭാസങ്ങളിലും ഇലുമാണെന്നും അദ്ധ്യാപകൻ ഉദാഹരണങ്ങളിൽകൂടി വ്യക്തമാക്കാം.

2. പ്രകാശം —

ഒരു ഏറ്റുപടക്ക പൊട്ടുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നതു കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കരിക്കട്ട കയ്യിൽ ചാമ്പലാകുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നു. ഒരു കടലാസ് നല്ലവണ്ണം ചൂടായാൽ കരിഞ്ഞു കത്തുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നല്ലാ, കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്താണ്? ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നാണ്.

3. ശബ്ദം:—

ഹൈന്ദവജൻ വാതകം നിറച്ച ഒരു ജാറും, ക്ലോറിൻ വാതകം നിറച്ച ഒരു ജാറും വാവട്ടം തമ്മിൽ ചേർത്തുവെച്ചശേഷം ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് മിശ്രിതത്തിൽ കാണിക്കുക. ഒരു പൊട്ടൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഒരു നീലലിറാംമസ് കടലാസ് ഈ വാതകത്തിൽ കാണിച്ചാൽ ചുവപ്പാകുന്നതിൽ നിന്നും ഈ വാതകം ഹൈന്ദവജൻ ക്ലോറൈഡാണെന്ന് തെളിയുന്നു. ഹൈന്ദവജൻ ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണുണ്ടായത്? പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടായതെന്തുകൊണ്ട്?

ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ പകുതിഭാഗം ഹൈന്ദവജൻവാതകമെടുത്തു് ഒരു കത്തിച്ച തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി പരീക്ഷണനാളിയിലേക്ക് കടത്തുക. ഒരു പൊട്ടൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പരീക്ഷണനാളിയിൽ പകുതിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈന്ദവജൻവാതകം വായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കത്തുകയാണുണ്ടായത്. ഇവിടേയും ഒരു രാസമാറ്റം സംഭവിച്ചുവെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടായതൊക്കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

4. വൈദ്യുതി:—

ഒരു ബീക്കറിൽ പകുതിഭാഗം നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂറിക് അസിഡ് എടുത്തു് അതിൽ ഒരു നാകതകിടം ചെമ്പു തകിടം തമ്മിൽ തൊടാത്തവിധം നിറത്തുക. തകിടുകളെ പുറമേ ഒരു ചെമ്പുകമ്പി കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക. നാകതകിടിന് എന്തു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ഈ കമ്പിയിൽ ഒരു ചെറിയ ബൾബ് ഘടിപ്പിച്ച് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. ബൾബ് കത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി എങ്ങനെയാണുണ്ടായത്? ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി രാസപ്രതിഭാസം മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഇതിനായി ഒരു ഡ്രൈസെൽ കട്ടികൾ പരിശോധിച്ച് അതിനകത്തുള്ള രാസവസ്തുക്കളെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ.

ഒരു ഉപയോഗഗുണമായ ഡ്രൈസെൽ പരിശോധിക്കുക. നാകപ്പാത്രത്തിനടുത്തുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന് രാസമാറ്റം സംഭവിച്ച് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ മലു ഭാഗത്തോടുള്ളതിനെയും ഭാഗത്തെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തെളിയും. ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത് വൃത്തിയുള്ള ഒരു ചിരട്ടയ്ക്കുകത്തിടുക. കറച്ച അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് (നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വിലയും കറവാണു്) കൂടെചേർത്ത് വെള്ളവും ചേർത്ത് കഴമ്പുപരുവത്തിലാക്കുക. ഡ്രൈസെല്ലിന്റെ മലുത്ത് ഒരു കാർബൺദണ്ഡുണ്ടല്ലോ. ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞ് കറുത്ത പദാർത്ഥം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുണി പൊതിയുമണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് ഇളകാതെയെടുത്ത് ചിരട്ടയിലുള്ള അമോണിയംക്ലോറൈഡ് കഴമ്പിന്റെ മലുഭാഗത്തു് നിറത്തുക ഒരു നാകത്തകിടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിറത്തുക. കാർബൺദണ്ഡും നാകത്തകിടും തമ്മിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. ഈ രണ്ടു ദണ്ഡുകളുടെ പുറമേ ഒരു കനകറുത്ത ചെമ്പുകമ്പികൊണ്ടു് യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു ചെറിയ ബൾബ് ഈ കമ്പിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാൽ അതു കത്തുന്നുവെന്ന് കാണാം. കുട്ടികൾക്കു് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണിതു്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു രാസപ്രതിഭാസം നടന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉൾജ്ജ്വലനം ഉണ്ടാകുകയും അതു് ചിലപ്പോൾ ആപത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ രാസക്രിയയുടെ തുടക്കത്തെയും പുരോഗതിയേയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവു് നമുക്കുണ്ടാകണം. ഇതിനു് രാസക്രിയകളെ അനുക്രമിയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെന്തല്ലാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രാസക്രിയാഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഉൾജ്ജ്വലനമു് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയണം. ഈ അറിവു് പ്രായോഗികരസതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണെന്നും, ഇതായിരിക്കണം ഈ ഭാഗം അവസരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

രാസക്രിയയെ അനുകൂലിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ

1. സമ്പർക്കം—

ഒരു ഇരമ്പുസ്ഫാി എണ്ണയിലിട്ടിരുന്നാൽ തുരുമ്പിക്കു
ന്നില്ല. വായുസമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് തുരുമ്പി
യ്ക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ലവണ്ണം തേച്ചുമിനുക്കിയ ഒരു ചെമ്പുപാത്രം രണ്ടു ദി
വസം കഴിയുമ്പോൾ കറുത്തുപോകുന്നത് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ വെള്ളിക്കുരണ്ടി കൊണ്ട് മുട്ട ഇളക്കിയാൽ കറുത്തു
പോകുന്നതും കുട്ടികൾ കണ്ടിരിക്കാ. തേച്ചുമിനുക്കിയ ചെമ്പു
പാത്രം വായുസമ്പർക്കത്തിൽ ഇരിയ്ക്കുമ്പോൾ രാസപ്രതിഭാസം
നടക്കുന്നതാണ് അത് കറുത്തുപോകുന്നതിന് കാരണമെന്നു്
കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

മുട്ടയിൽ ഗന്ധകത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ട്. അതിനാൽ
വെള്ളിക്കുരണ്ടികൊണ്ട് മുട്ട ഇളക്കിയാൽ വെള്ളിയുടെ ഗന്ധകവും
തമ്മിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടായി രാസപ്രതിഭാസം നടക്കുന്നതാണ്
വെള്ളിക്കുരണ്ടി കറുത്തുപോകുന്നതിന് കാരണമെന്നു് അവർ ധരി
ക്കട്ടെ. മറ്റു് ഉദാഹരണങ്ങളും അദ്ധ്യാപകനു് കാണിച്ചുകൊടു
ക്കാ. ഫോസ്ഫറസ് വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തു്
കൊണ്ടാണ് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളെപ്പോലെ വെറുതേ കുപ്പിയിൽ
സൂക്ഷിക്കാത്തതു്? കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നു് ഫോസ്ഫ
റസ് വെളിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത പുക കാണുന്നതിനു്
കാരണമെന്താണു്? വെള്ളത്തിൽ നിന്നു് വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ
ഫോസ്ഫറസ് വായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെട്ടു് രാസക്രി
യയുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. മറ്റൊരു ഉദാഹ
രണമാണു് സോഡിയം. മറ്റു ലോഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് സോ
ഡിയത്തിനും പൊട്ടാസ്യത്തിനുമുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണു്? വള
രെ ചെറിയ ഒരു കഷണം സോഡിയം വെള്ളത്തിലിട്ടു കാണിച്ചു
കൊടുക്കുക. എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നു് കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ.
വായുവിൽ നീരാവിയിലുണ്ടെന്നും കുട്ടികൾക്കറിയാം. ഈ അറിവുക
ളിൽ നിന്നു് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷി
ക്കുന്നു.

കണത്തിന്റെ കാരണം അർത്ഥത്തെ പറയട്ടെ. സോഡിയം, പൊട്ടസ്യം എന്നീ ലോഹങ്ങൾക്ക് മണ്ണെണ്ണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം.

മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം ഒരു രാസക്രിയ നടക്കുന്നതിന് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടാവുകയാണെന്ന് തെളിയിക്കാം.

ഒരു കഷണം തടികുത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മരപ്പുളകൾ കുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഒരു കഷണം ചെമ്പ്, നൈട്രിക്കാസിഡിലിട്ടാൽ രാസക്രിയ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചെമ്പുപുളകൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ രാസക്രിയ നടക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയും. ഇതിൽനിന്ന് തെളിയുന്നതെന്താണ്? രാസക്രിയയിൽ ഏപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കമെത്രയും വർദ്ധിച്ചാൽ രാസക്രിയയുടെ വേഗതയും വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ്.

2. താപം:—

കുറി വെറുതേയിരുന്നാൽ കത്തുന്നില്ല. കത്തുന്നതിന് ചൂട് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം കമ്പി തീയിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ കത്തുന്നുള്ളൂ. ഗന്ധകവും ഇരുമ്പും തമ്മിൽ ചേർത്തു ചൂടിത്തന്നാൽ അവയുടെ ഒരു മിശ്രിതമായിത്തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യും. എന്നാൽ അവയെ ചൂടാക്കിയാൽ രണ്ടുതമ്മിൽ സായോജിച്ച് അയേൺ സൾഫയിഡ് എന്ന യൗഗികം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾവഴി ഒരു രാസക്രിയ നടക്കുന്നതിന് താപം ആവശ്യമാണെന്ന് അധ്യാപകൻ വ്യക്തമാക്കാം.

3. പ്രകാശം:—

പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.) ഇലകളിൽ ഭക്ഷണനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിന് പ്രകാശം ആവശ്യമാണെന്നും സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഫോട്ടോ കൾ വെയിലത്തിരുന്നാൽ വെളുത്തുപോകുന്നതിനു കാരണം കുട്ടികൾ പറയട്ടെ. മേല്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളുടെ അറിവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാസക്രിയകൾ വേണ്ടുവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രായോഗികജ്ഞാനവും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകാൻ അദ്ധ്യാപകൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിൽ കുറച്ചു ചെളിച്ചെണ്ണയെടുത്ത് അതിൽ കുറെ കാസ്റ്റിക് സോഡാലായനി ഒഴിച്ചു ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുക. പാത്രത്തിലെ മിശ്രിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിച്ചു ഏതു തരത്തിലുള്ള രാസപ്രതിഭാസമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുക.

2. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയെടുത്ത് അതിന്റെ തോടിൽ രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കുക. ഒരു ദ്വാരത്തിൽകൂടി ഒരു ചെമ്പുകിടം മറേറ ദ്വാരത്തിൽകൂടി ഒരു നാകത്തകിടം ഇറക്കുക. ഈ തകിടകൾ പരസ്പരം തൊടാൻ പാടില്ല. രണ്ടു തകിടുകളെയും കൂട്ടിക്കുറുത്ത ഒരു ചെമ്പു കമ്പികൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ചെമ്പുകമ്പി നാക്കിൽ തൊടിച്ചാൽ എന്തെന്തവപ്പെടുന്നുവെന്നു നിരീക്ഷിക്കുക.

ഒരു പഴുത്ത പേരയ്യെടുത്ത് മേല്പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം നടത്തി അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫലം നിരീക്ഷിച്ചു രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യപഠനം നടത്തുക.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

പദാർത്ഥവും അതിന്റെ ഘടനയും സംഘടനവും

അവലോകനം:—

സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പദാർത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണല്ലോ രസതന്ത്രം. അതുകൊണ്ടു് പെരുമാറുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മബോധമായിരിക്കും ഒരു രസതന്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ശൈമുതത്ത്.

ഭൂമിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു പദാർത്ഥമുണ്ടുണ്ടു് അവയിൽ ചിലതെല്ലാം നമുക്കു പരിചിതമാണു്. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒരു പോലെയാകൂ. തുണങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി പദാർത്ഥങ്ങളെ നാല് വേർതിരിച്ചറിയുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിരവും താല്പ്ലാവികവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങളാണു് രാസക്രിയകൾ. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളെന്ന സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണു്. ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ തന്മാത്രകളെല്ലാം ഒരുപോലിരിക്കും. വിഭിന്നസ്വഭാവമുള്ള തന്മാത്രകളുള്ള പദാർത്ഥമാണു് മിശ്രിതം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പദാർത്ഥപരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന മുന്നദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കട്ടികൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

പദാർത്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തത പുലർത്താനുള്ള കാരണം എന്താണു്? എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകൾക്കൊണ്ടാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ നിറത്തിലും സാന്ദ്രതയിലും രാസഗുണങ്ങളിലുമൊക്കെ വിഭിന്നത പുലർത്താനെന്നേ കാരണം? ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും പദാർത്ഥഘട

നയെക്കുറിച്ചു ഭൂദാലിഹനുള്ള താല്പര്യം ഉണർത്തിവിടും. എന്തെന്നു തന്മാത്രകളെന്നു? പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾക്കനുസരമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതു?

ആറുങ്ങളേയും തന്മാത്രകളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പദാർത്ഥപഠനം വഴി ഈ ചോദ്യം പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണു നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമുള്ള സൂക്ഷ്മഘടകമാണു് തന്മാത്ര അതിനു സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ടു് തന്മാത്രകളെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രമെ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രഹിക്കാനിടയുള്ളു. തന്മാത്രയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ചിലതു മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടു്. പദാർത്ഥപഠനം തന്മാത്രയിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഓരോ തന്മാത്രയും ആറുങ്ങളാലുള്ള ചെറുകണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നു പലതരം ആറുങ്ങളുണ്ടു്. ഒരേതരത്തിലുള്ള ആറുങ്ങളുടേങ്ങുന്ന പദാർത്ഥമാണു് മൂലകം. ധൈര്യഗതികളുടെ തന്മാത്രയിൽ പലതരം ആറുങ്ങളുടേങ്ങുന്നു. രാസക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറുങ്ങൾ നഗ്നങ്ങളായി. എന്നാൽ ആറു തന്നെ പദാർത്ഥഘടനയുടെ അവസാന വാക്കല്ല. അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ പലതരം കണങ്ങൾ ചേർന്നാണു് ആറുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. ആറുത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ അളവറ്റ ഉൾജ്വാ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതാണു് അറോമിക് ഉൾജ്വാ. ആറുങ്ങളേയും തന്മാത്രകളേയും അവ പങ്കെടുക്കുന്ന രാസക്രിയകളെയും വിവരിക്കാൻ രസതന്ത്രത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഭാഷയുണ്ടു്. ഈ ഭാഷയുപയോഗിച്ച് സമീകരണങ്ങൾ വഴി രാസക്രിയകളെ സംക്ഷിപ്തവും സൗകര്യപ്രദവുമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാം.

പദാർത്ഥഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമെന്നനിലയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കട്ടികൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടുന്നങ്ങോട്ടുള്ള രസതന്ത്രപഠനം ആറുങ്ങളേയും തന്മാത്രകളേയും ആസ്പദമാക്കിയാണു്. പ്രതികങ്ങളും, സൂത്രങ്ങളും സമീകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും രാസക്രിയകൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുക. അപ്പോഴാണ് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഉറി

യൂതകുട്ടി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഴങ്ങിപ്പോവുകയേ ഉള്ളൂ. ദുര്യമാനസംരക്ഷണ നിയമം തക്കടറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സമീകരണം സംതുലിതമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പദാത്മപടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആറ്റങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും അടിത്തറയിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെയുള്ള നീക്കം പ്രയോജനമറ്റതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പാഠപത്രഗുണനം

സാങ്കേതികപദങ്ങൾ:—

ഘടന, സംഘടനാ, വിഘടനക്രിയ, ആറ്റം, അറോമിക് ഭാരം, മൂലകം, ഡൈഗ്രിക്, കാബൺ ഏകകം, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, അറോമിക് ഉൾജ്ജം, സുചാലകം, കചാലകം, പ്രതീകം, രാസസൂത്രം, തന്മാത്രാഭാരം, നിശ്ചിതപാതനിയമം, രാസസമീകരണം, ദുര്യമാനസംരക്ഷണ നിയമം.

ധാരണകൾ (സങ്കല്പനങ്ങൾ)

1. തന്മാത്രയിലെ, രാസികമായി വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കണികയാണ് ആറ്റം.
2. ഒരേ തരത്തിലോ വിഭിന്നതലത്തിലോ ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് തന്മാത്രകളുണ്ടാകുന്നു.
3. ആറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയാണ്.
4. അറോമിക് ഭാരമെന്നത് കേവലം ആപേക്ഷിക ഭാരമാണ്.
5. ഒരേ തരം ആറ്റങ്ങളുള്ള പദാത്മമാണ് മൂലകം.



6. യേശുഗിരത്തിലെ ആറാടുകൾ വിളിന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ്.

7. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഹൃസ്വവും സൗകര്യപ്രദമായ ചിത്രീകരണമാണ് പ്രതികം.

8. മൂലകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് യേശുഗിരങ്ങളാകുമ്പോൾ അവ ഒരു നിശ്ചിതമായ അനുപാതത്തിൽ മാത്രമേ യോജിക്കുന്നുള്ളൂ.

9. ഒരു രാസക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറാടുകൾ നശിക്കുന്നില്ല.

10. ഘടകങ്ങളായ ആറാടുകളുടെ ഭാരത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ് തന്മാത്രാഭാരം.

ഉദേശ്യങ്ങൾ:-

മുഖ്യമായ ഉദേശ്യം പദാർത്ഥഘടനയെക്കുറിച്ചു മുകളിൽ പറഞ്ഞ ധാരണകൾ വളർത്തിയെടുക്കലാകുന്നു. പുറമെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കൂടി കട്ടികൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1. അറോമിക് ഭാരമെന്നത് ആറാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാരമല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം.

2. വാതകങ്ങളുടെ തന്മാത്രകളും യേശുഗിരങ്ങളുടെ തന്മാത്രകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

3. ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു ദ്രാവകങ്ങളെപ്പോലെ ചലനസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം.

4. ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

5. ദ്രവ്യമാന സാരം ജ്ഞ നിയമവും രാസ സമീകരണവു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

6. പ്രതികങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനവും പ്രാധാന്യവും.

7. ദ്രാവകം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥം ലയിക്കാനുള്ള കാരണം.

8. ഭാവകം വാതകമാകുമ്പോൾ അതിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണ്ടിവരുന്നതിന്നു കാരണം

9. സമീകരണം സാതുചിതമക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത..

പ്രയോഗം

1. രാസസൂത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്മാത്രാഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

2. അപരിചിതമായ ലഘു സമീകരണങ്ങൾ മൂലം ചെയ്യുന്നു

3. ഭൂവ്യമാനസംരക്ഷണ നിയമം തെളിയിക്കാൻ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

4. നിശ്ചിതാനുപാതനിയമം തെളിയിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

5. മെഴുകുതിരി വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ ഒന്നാം ശേഷിക്കു നില്പു, മഗ്നീഷ്യം കത്തുമ്പോൾ ഭാരം കൂടുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രതിഭാസങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

നൈപുണ്യം :-

1 ആറ്റങ്ങളുടേയും ലഘുയേശഗികളുടേയും മാതൃകകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവു നേടുന്നു.

2. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, അറോറിക ഭാരം എന്നിവയെക്കുറിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നു.

അവശ്യോപകരണങ്ങൾ :-

പരീക്ഷണ നാളികൾ, സ്റ്റാൻഡ്, നിർദ്ദിതമാളിപ്പൽ ഭംഗം പ്രെസ്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാതിത്ത കമ്പി, കാൽ ആറ്റങ്ങളു

ഭേദം തന്മാത്രകളുടേയും മാത്രകൾ, ഫ്ലോസ്ക്, റബ്ബറപ്പ്, കൊടി, ത്രാസ്, സ്റ്റീരിറോലാമ്പ്.

രാസവസ്തുക്കൾ :- ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്, മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ്, ഗന്ധകം, ഇന്ത്യപൊടി, ചുവന്നക്രോം ഫറസ്സ്, ലെഡ് നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ്.

പഠാവതരണം

രാസവിഘടനം:-

ശുദ്ധപദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ അവയെക്കാൾ ചെറിയ തന്മാത്രകളായി വിഘടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് രാസവിഘടനം. ഒന്നോ രണ്ടോ ധൗമികങ്ങളുടെ വിഘടനം പരീക്ഷണം വഴി കട്ടികൾക്കു ബേലൂപ്പെടുത്തിക്കാടുകണം. എന്താണ് രാസപ്രതിഭാസം, ഒരു രാസക്രിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ത്, ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന്റെ തന്മാത്രകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ത്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരീക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഘാടകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവയെക്കുറിച്ചു കട്ടികൾക്കുള്ള മുന്നറിവ് പരിശോധിക്കണം.

പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിഘടനക്രിയ കാണിച്ചാൽ മതി. അവയിൽ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ്, കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് എന്നിവ ചൂടുകൊണ്ടും ജലം വൈദ്യുതിയാലും വിഘടിക്കുന്നു ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അല്പാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. കട്ടികൾ തനിച്ചോ, ചെറുസംഘങ്ങളായോ ഇതു ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാരം ഘട്ടത്തിലോ പദാർത്ഥത്തിനോടുകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കടമയാണ്.

നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവസാനം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരേണ്ടതും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ. എന്തെല്ലാമാണുണ്ടാകുന്നതെ

നോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ ആദ്യം അല്യാപകൻ പറയരുത്. അവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൂചന നൽകിയാൽ മാത്രം മതി. പരീക്ഷണം 1

മെർക്കൂറിക് ഓക്സൈഡ് ചൂടാക്കുന്നത്, ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുക, തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തതാതിരി മെർക്കൂറിക് ഓക്സൈഡിന്റെ നിറം കട്ടികൾ പരിശോധിക്കണം. മണം, ക്രിസ്റ്റലാകൃതിയാണോ അല്ലയോ എന്നിവയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും വാതകമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം കട്ടികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്താണ് 'വാതകമെന്ന്' പരീക്ഷിച്ചറിയാനുള്ള സൂചന അല്യാപകൻ നൽകിയാൽ മതി. വാതകം ഓക്സിജനാണെന്നറിയാൻ എറിയുന്ന കനൽ പരീക്ഷണനാളിയിലിറക്കി നോക്കാൻ കട്ടികളോടാവശ്യപ്പെടുക. ചൂടാക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളിപ്പോലെ തിളങ്ങുന്ന വസ്തു രസമാണെന്നു പറയാൻ, തെർമോമീറ്ററിലെ രസം കണ്ടുപരിചയമുള്ള കട്ടികൾക്കു കഴിയും. പരീക്ഷണത്തിനുശേഷം രാസവസ്തുവിൻറെയും ആതു വിഘടിച്ചുകിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും പേർ കട്ടികൾ സമീകരണ രൂപത്തിൽ പുസ്തകത്തിലെഴുതട്ടെ
→ മെർക്കൂറിക് ഓക്സൈഡ് → മെർക്കൂറി + ഓക്സിജൻ.

പരീക്ഷണം 2

ചെമ്പുപാത്രങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പച്ചനിറമുള്ള പാട് ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്ററാണ്. കോപ്പർ കാർബണേറ്ററിന്റെ നിറം കട്ടികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ.

പരീക്ഷണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചതാതിരി സജ്ജീകരിക്കുക. ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളത്തെ പാൽനിറമാക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. കറുത്തപൊടി കോപ്പർ ഓക്സൈഡാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. പരീക്ഷണനാളി

യുടെ വശങ്ങളിൽപ്പറ്റിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഭാരതമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. കോപ്പർ കാർബണേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ സമവാക്യരൂപത്തിൽ കട്ടികൾ നോട്ടപുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തട്ടെ.

ബേസിക്കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് → കോപ്പർ ഓക്സയിഡ് + ജലം + കാർബൺഡൈ ഓക്സയിഡ്.

പരീക്ഷണം 3

വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ജലം വിഘടിച്ചു ഫൈബ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടതു്. ഉപകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കുക. (ചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അതു നോക്കി വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക) ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളമെടുക്കണം. അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി കറിയുപ്പലായനി ചേർക്കണം. ശുദ്ധജലത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതിപ്രവഹിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പുചേർക്കേണ്ടതു്. രണ്ടു പരീക്ഷണ നാളികളിലോ ചെറിയ കുപ്പികളിലോ വെള്ളം നിറച്ച് പിഞ്ഞാണത്തിൽ കുമിഴ്ത്തുക. രണ്ടുകഷണം ഇൻസുലേഷനുള്ള ചെമ്പുകമ്പിയുടെ അഗ്രങ്ങൾ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞു് ഓരോന്നും ഓരോ നിബിന്റെ പൊരത്തോടു ബന്ധിക്കുക. പരീക്ഷണനാളിയുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു നിമ്പുകൾ കടത്തിവയ്ക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതിഞ്ഞ കമ്പികളുടെ മറ്റേ അറ്റം ബാറ്ററിയുടെ ഗ്രൂവുകളുമായി ബന്ധിക്കുക. പത്തിരുപതു മിന്നിട്ടുനേരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കട്ടെ. വാതകം പരീക്ഷണനാളികളിൽ കുമിളകളായി ഉയരുന്നതു് കട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കണം. ആവശ്യമായ അളവിൽ വാതകങ്ങളുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണ നാളികൾ പുറത്തെടുത്തു് കത്തുന്ന ഒരു കമ്പൽ ഓരോന്നിനടുത്തു കൊണ്ടുവരിക. കമ്പൽ ആളിക്കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജനാണെന്നു് കട്ടികൾ പറയൂ. മറ്റേ നാളിയിലെ വാതകം ഒരു പെട്ടിലോടുകൂടി

കുത്തുന്നു. അതു ഫൈഡ്രജനാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. സമവാക്യരൂപത്തിൽ പരീക്ഷണഫലം കുട്ടികൾ നോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

ജലം → ഫൈഡ്രജൻ + ഓക്സിജൻ.

പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം കുട്ടികൾ പറയട്ടെ.

1. മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

2. കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ ഈ സംഭവിച്ചു? ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളേവ?

3. ജലത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വാതകങ്ങളേവ? അവ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി?

4. ഈ മൂന്നു രാസക്രിയകളിലും പൊതുവായിക്കാണുന്ന സവിശേഷതയെന്തു്?

ഉത്തരം. — ഒരു പദാർത്ഥം വിഘടിച്ചു് ഒന്നിലേറെ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി ഇവിടെ വിഘടനം സംഭവിച്ചതു് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിഡ്, കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്, ജലം എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകൾക്കാണ്. ഈ തന്മാത്രകളിൽനിന്നാണ് ഘടകങ്ങളായ മെർക്കുറി, ഓക്സിജൻ, ഫൈഡ്രജൻ തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രകളുണ്ടായതെന്നും അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ തന്മാത്ര വിഘടിച്ചു് ഒന്നിലേറെ ഘടകവസ്തുക്കളുടെ തന്മാത്രകളുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ വിഘടനക്രിയ എന്നു പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക. നിർവ്വചനം അവർ നോട്ടുപുസ്തകത്തിലെഴുതട്ടെ.

വിഘടനപരീക്ഷണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ് ചൂടാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക. ചൂടു തട്ടുമ്പോൾ ബേ

ക്കിംഗ് സോഡയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റത്തെ തിരുത്തുവാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഇന്ന് രാസക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ?

2. ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ അല്പം പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുക. ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനം രാസവിഘടനത്തിനുദാഹരണമായി എടുത്തു പറയുവാൻ പറയുമോ? എന്തുകൊണ്ട്?

3. മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് ചൂടാക്കിയാൽ മെർക്കുറി ലഭിക്കുന്നു. മെർക്കുറിയിൽ നിന്ന് രാസപ്രവർത്തനം വഴി പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനുള്ള കാരണം കൂടി വിശദമാക്കുക.

ആറ്റവും അറോമികഭാരവും

അവതരണം:-

പദാർത്ഥ ഘടനയെക്കുറിച്ചു ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബോധം തന്മാത്രയോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളെന്നറിയാപ്പെടുന്ന ചെറു കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് അവർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലം, മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ശുദ്ധപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥാനഗുണങ്ങളുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും അവർക്കറിയാം. ഒരു തന്മാത്രപദാർത്ഥത്തിന്റെ മഴുവൻ ഗുണങ്ങളും നിലനിറുത്തി സ്വതന്ത്രമായി നില നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ തന്മാത്രയേക്കാൾ ചെറിയ ഘടകം പദാർത്ഥത്തിനുണ്ടോ? ജലം മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകൾ അവയെക്കാൾ ചെറിയ കണികകളായി വിഘടിച്ചതു് കുട്ടികൾക്കു ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയിൽ പ്രേരണ നൽകുന്നു.

ജലത്തിന്റെ രാസവിഘടനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആറ്റവും എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കണം. ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രയുടെ മാത്രം

കയും അതു വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ മാതൃകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഡാർട്ടന്റെ ആറ്റം മാതൃക അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനുപകരം അല്പം വലിയ ഒരു ഗോളവും ഫൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുൾക്കൊള്ളുകയും രണ്ടു ചെറിയ ഗോളങ്ങളും മെഴുകോ കളിമണ്ണോ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുക. അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നതും കൊള്ളാം. ഇതുപോലെ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രയുടെ മാതൃകയും നിർമ്മിക്കുക. തന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ചു് അവയെക്കാരും ചെറിയ കണങ്ങളാകുന്നതിന്റെ പ്രതീകചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രയെ ഫൈഡ്രജനും, ഓക്സിജനുമായി ചേർതിരിക്കാം. വിഘടന ക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്മാത്രകളായതുകൊണ്ട് അവ വിഘടിച്ചുണ്ടാകുന്ന കണികകൾ തന്മാത്രകളെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണമല്ലോ. അതായത് ജലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ വാതകങ്ങളുടെ കണികകൾക്ക് ജലതന്മാത്രയെക്കാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നത്മാ. ഈ കണികകളെ രാസപ്രവർത്തനംകൊണ്ട് അവയെക്കാൾ ചെറിയ കണികകളാക്കി മറ്റൊരു സാധ്യമല്ല. ഇനി ഫൈഡ്രജനിൽ നിന്നോ, ഓക്സിജനിൽ നിന്നോ, മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിൽ നിന്നോ ജലത്തിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചതുപോലെ രാസപ്രവർത്തനംകൊണ്ട് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥത്തിന്റെ തന്മാത്രയിലും, രാസികമായി വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത സൂക്ഷ്മകണികയെ ആറ്റം എന്നു പറയുന്നു.

മാതൃക ചിത്രങ്ങൾ (ചിത്രം 2-1-ാം ചിത്രം 2-5-ാം) പാഠപുസ്തകത്തിൽ നോക്കി ആറ്റങ്ങളും തന്മാത്രകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ജലം വിഘടിച്ചുണ്ടായ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ തൽക്ഷണം സംയോജിച്ച് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയായിത്തീരുന്നു ഇതുപോലെ ഫൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഫൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയുണ്ടാകുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണം

വ്യക്തമാകുന്നതുവഴി ആററങ്ങുളേറവും ചെറിയ കണങ്ങളാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്പില്ലെന്നും തന്മാത്രയ്ക്കു തുണ്ട് എന്നും തെളിയിയ്ക്കാം.

ആററത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഒരേകദേശജ്ഞാനം കട്ടികൾക്കു നൽകണം. ഒരു ഭൂസ്തരരിയോളം വലിപ്പമുള്ള വസ്തുവിൽപോലും കോടിക്കണക്കിനാററങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണശക്തിയുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനികളുകൊണ്ടൊന്നും ആററങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ പലാത്മാത്ത അതിന്റെ 10 ലക്ഷം ഇരട്ടി വലുതാക്കി കാണിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ആധുനികസൂക്ഷ്മദർശിനികളുമുണ്ട്. — ഫീൽഡ് അയൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ആററത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്കു കഴിയൂ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ, താരതമ്യപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവ വഴി ആററത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കട്ടികളിൽ വളർത്തുക.

ഉദാഹരണം—1. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആററങ്ങളുടെ എണ്ണം 6.0×10^{21} അതായത് 6000,000,000,000,000,000,000. ആററങ്ങൾ.

2. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പേനയുടെ ക്യാപ്പിൽ ഒരുങ്ങുന്ന തിന്റെ പകുതിയോളം വായുവിനെ ഭൂഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പത്തോളം വികസിപ്പിക്കാമെന്നു കരുതുക. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ തന്മാത്രയ്ക്കും ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ചിന്റെ വലിപ്പമാകാൻ. കണികകൾക്ക് പരസ്പരമുള്ള അകലമോ, ശാരീരിക പത്തടിയിലധികവും.

3. കരയും കടലുമടങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മുഴുവനും ആറിഞ്ചുകുന്നത്തിൽ മണൽ വിരിയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടിവരുന്ന ആകെ മണൽത്തരികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടു 'ഔൺസ്' ജലത്തിലടങ്ങുന്ന ആററങ്ങളുടെ സംഖ്യയോളമേ വരൂ.

ആറങ്ങളുടെ ഭാരത്തേക്കു ചു് പായുന്നതിനു മുൻപു് പലാത്മങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ താതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭാരത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വിശദമാക്കണം. മേലേ വലിപ്പമുള്ള ഉരുക്കുകളും അലൂമിനിയ കട്ടയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭാരവ്യത്യാസത്തിനുള്ള സ്ഥാനം പ്രധാനമാണ്. ആറങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനു് അവയുടെ ഭാരവും അറിയേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഓരോ തരം ആററത്തിനും ഓരോ ഭാരമാണ്. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ആററത്തിനുള്ള ഭാരമല്ല ഇരുമ്പിന്റെ ആററത്തിനുള്ളതു്. എന്നാൽ ഇത്രയും ചെറിയ ആററത്തിന്റെ ഭാരം സാധാരണ മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചു് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുക. ഇനി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ യാതൊരാവശ്യത്തിനുമുതകാത്തരട്ടിൽ അത്രയും ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും ഓററത്തിന്റെ ഭാരം. ഉദാഹരണമായി ഭാരം കൂടിയ ലോഹങ്ങളായ യൂറേനിയം, കറത്തിയും, ആററങ്ങളുടെ ഭാരം. യൂറേനിയം: 0.000,000,000,000,000,000,000,336—ഗ്രാം. കറത്തിയും:—0.000,000,000,000,000,000,000 336 ഗ്രാം.

പ്രമാണമായുംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓററത്തിന്റെ ഭാരത്തോടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ള ആററങ്ങളുടെ ഭാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമിതാണെന്നു് വ്യക്തമാക്കണം. ന്യൂക്ലിയസിൽ ആറു് പ്രോട്ടോണും, ആറു് ന്യൂട്രോണും അടങ്ങുന്ന കാർബൺ ആററത്തിന്റെ ഭാരമാണ് പ്രമാണമായെടുത്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതിന്റെ ഭാരം 12 - ആണ്. ഇതിന്റെ എത്രയരിട്ടിയാണോ അഥവാ എത്ര അംശമാണോ എന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് മറ്റുള്ള ആററങ്ങളുടെ ഭാരം നിർണ്ണയിക്കുക. കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക ഭാരത്തിന്റെ 12ൽ ഒരംശത്തെ കാർബൺമാത്രായന്ന പായുന്നു കാർബൺമാത്രയുടെ 16 ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമികഭാരം 16, കാർബൺ യൂണിറ്റിന്റെ 32 ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള ഗന്ധകത്തിന്റെ അറ്റോമികഭാരം 32. ഇതേ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല മൂലകങ്ങളുടേയും അറ്റോമിക ഭാരം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ലഭി

ഒന്നു അറോമികഭാരം ആററത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരമല്ലെന്നും അതൊരു താരതമ്യ സഖ്യമാത്രമാണെന്നുമുള്ള ധാരണ കുട്ടികളിലുണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും.

1. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ആററവും രണ്ടു ഓക്സിജൻ ആററവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മച്ചിങ്ങ (കൊച്ചുങ്ങ) ഇവയിലേതെങ്കിലുമുപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു തന്മാത്രാ മോഡൽ നിർമ്മിക്കുക.

2. കുട്ടികൾക്കു പരിചയമുള്ള പത്തു മൂലകങ്ങളുടെ പേരെഴുതി അവയുടെ അറോമികഭാരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കുക.

3. മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ തന്മാത്രകൾ രാസവിഘടനം വഴി വിഭജനം ഘടകങ്ങളാക്കി വേർതിരിക്കാനാവില്ലെന്നു തെളിയിക്കുക.

4. പദാർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ആററമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്? ആററത്തെക്കാൾ ചെറിയ ഘടകങ്ങളായി പദാർത്ഥത്തെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അന്വേഷിച്ചറിയാതെ.

5. ക്യൂപ്രിക് ഓക്സൈഡ്, അയേൺ സൾഫൈഡ്, മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകളോരോന്നും ഏതെല്ലാം ആററങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

6. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒരാററത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന ആററങ്ങളുടെതിനേക്കാൾ എത്ര ഇരട്ടി ഭാരമുള്ളതല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ.


a) കാർബൺ (b) ഹൈഡ്രജൻ

പദാർത്ഥപഠനം. ആറ്റം തന്മാത്രാടിസ്ഥാനത്തിൽ

അവതരണം: —

പദാർത്ഥത്തെ രാസികമായി വിഭജിച്ചാൽ അവസാനം ലഭിക്കുന്ന ഘടകം ആറ്റമാണെന്നു കൂട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മപഠനം ആറ്റത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ആറ്റം തന്നെ അനേക സൂക്ഷ്മകണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും അവരെ ധരിപ്പിക്കണം. ചിത്രങ്ങളുടെയും കഴിയുമെങ്കിൽ മോഡലുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ഇതു സാധിയ്ക്കാം. ഒരാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന ചിത്രം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മോഡലിന്റെ
മോഡലിന്റെ
മോഡലിന്റെ
മോഡലിന്റെ



+ പ്രോട്ടോൺ ● ന്യൂട്രോൺ — ഇലക്ട്രോൺ
ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന (ചിത്രം 1)

ചില സങ്കീർണ്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തോടെ ആററു ഞ്ഞ അതിനെക്കുറിച്ചു ചെയ്ത ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഉപഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയാണ്. ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട്. പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രത്തെച്ചുറ്റി പ്രത്യേക ഭ്രമണ പഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ. ആറ്റത്തിന്റെ ആകെ വലിപ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്രം വളരെ ചെറുതാണ്. എന്നാൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മിക്കവാറും ഭാരമില്ലെന്നു പറയാവുന്ന കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ. ആറ്റത്തിൽ ഉപഘടകങ്ങളുടെ സംവിധാനക്രമം, ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നിവ ചിത്രം നോക്കി കട്ട്കൾ ഗ്രഹിക്കുക. ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അളവാൻ ഉൾജ്ജത്തിനിശ്ചിതമാണെന്നു കട്ടികളെ ധരിപ്പിക്കുക. കേന്ദ്രം പിളരുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഉൾജ്ജത്തെ അറ്റോമിക ഉൾജ്ജം എന്നു പറയുന്നു. ആറ്റം ബോംബിന്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നതാണ്. അറ്റോമിക ഉൾജ്ജം സ്ഥാപനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒന്നരണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടെന്നും അവരോട് പറയുക:— ടോബോയിലും താരാപ്പൂരിലുമുള്ള അറ്റം ശക്തി സ്ഥാപനങ്ങൾ.

അവസാനം പദാർത്ഥഘടനയെക്കുറിച്ച് കട്ടികൾ ഇതേവരെ ധരിച്ചുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ സംക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ചർച്ചകളിൽകൂടി ഇത്രയും നിഗമനങ്ങളെടുക്കുക.

1. എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്.
2. എല്ലാ തന്മാത്രകളും ഒന്നോ അധികമാം ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നു.

3. പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ഇലക്ട്രോൺ എന്നീ ഉപഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഓരോ ആറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

നിഗമനങ്ങൾ കട്ടികൾ അവയുടെ നോട്ടപ്പുസ്തകത്തിൽ പകർത്തിയെടുക്കട്ടെ. ആററമാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന ആശയം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി ഏകദേശം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നതു കൊള്ളാം.

സൂചനകൾ:—

1. കണാദന്റെ പരമാൺവാദം.
2. ഡെമോക്രിറ്റസിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകം - ആററ.
3. തന്മാത്രയുടെ ഘടകങ്ങളായ ചെറുകണങ്ങളാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണം നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന, 'ലോഭാനോ സോവി'ന്റെ അഭിപ്രായം.
4. സാൽട്ടന്റെ ആററം സിദ്ധാന്തം.
5. ആററത്തേയും വിഭജിക്കാമെന്നു് തെളിഞ്ഞതു്.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. എല്ലാ ആററങ്ങളും, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയിൽ നിർമ്മിതമാണ്. എന്നിട്ടാ വിഭിന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ആററങ്ങൾ അവയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുക.

തന്മാത്രകളും ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂന്നവസ്ഥകളും

അവതരണം:—

ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ 2 C C. വെള്ളമെടുത്തു് കോർക്കുകൊണ്ടടയ്ക്കുക. തിളയ്ക്കുന്നതുവരെ ചൂടാക്കുക. നീരാവി ഉയർന്നു് ഫ്ലാസ്കു് നിറയുന്നതു കാണാം. ഫ്ലാസ്കു് തണുക്കുന്നതോടെ നീരാവി തണുത്തു് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അളവു വെള്ളമായി മാറുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളും കട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കണം. അപ്പോ ഇല

ത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നീരാവി ഫ്ലാസ്ക് മുഴുവൻ നിറയുവാൻ കാണുന്നു? അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാസ്കു നിറയെ ഉള്ള നീരാവി തണുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിനാൽ വളരെക്കുറഞ്ഞ ഒരു ശതമാനം മാത്രമുണ്ടായതെന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഉഷ്മിച്ഛ പരയാൻ കട്ടികൾ ശ്രമിക്കട്ടെ. പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു ചൂടു തട്ടുമ്പോൾ അവസ്ഥാഭേദമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. ദ്രാവകം ബാഷ്പമാകുമ്പോൾ വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുന്നത് ചൂടു തട്ടുമ്പോൾ അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടാണോ? വാതകം ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടോ? ഒരു നിശ്ചിത പിണ്ഡം പദാർത്ഥത്തിന് ഏതവസ്ഥയിലായാലും അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സ്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസ്ഥാഭേദമുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയോ കുറയുകയോ എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ദ്രാവകം ബാഷ്പമായപ്പോൾ അതിലെ തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം അകന്ന് മാറിയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സ്ഥലം എടുത്തത്. വാതകം ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നു? ഉദാഹരണമായി ചൂടു കട്ടയാകുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയുന്നതിന് കാരണം മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉഷ്മിച്ഛ പരയാൻ കട്ടികൾക്കു കഴിയണം. തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം, അവ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്നിവയാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ മൂന്നവസ്ഥകൾക്കു കാരണമെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾവഴി അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പരീക്ഷണം:—

100 C. C. വെള്ളത്തിൽ 5 C. C. സോഡിയംബൈകാർബണേറ്റ് ഇട്ട് കലക്കുക. ലായനിയുടെ വ്യാപ്തം കട്ടികൾ അളക്കട്ടെ. അത് 100 C. C. മാത്രമേയുള്ളുവെന്ന് കാണാം. വെള്ളത്തിലിട്ട വസ്തു എവിടെപ്പോയി? ജലത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്തുവിന്റെ കണികകൾ ചെന്നു

ക്രിയതുകൊണ്ടാണ് വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കാത്തത്. ഖരവസ്തുക്കളിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ, മറ്റു വസ്തുക്കൾ ലയിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം കുട്ടികൾ പറയട്ടെ. അപൂർവ്വം ചില ഖരവസ്തുക്കൾ അന്യോന്യം ലയിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കൂടാതെ കുറയാനുള്ള കാരണമെന്നെന്ന് ചർച്ചചെയ്യുക. ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ പാസ്റ്ററം കൈകോർത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞവിധം നില്ക്കുക. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തലയൊന്നി ഉക്കാം. കൈകൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയോണം നിൽക്കണമെന്ന വിചാരിച്ചാലും ഫലമില്ല. ഇതുപോലെയാണ് ഖരവസ്തു ചില തന്മാത്രകളുടെ നില. അവ പാസ്റ്ററം ആകർഷണബന്ധത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോർത്തുപിടിച്ച കൈവിട്ട് കുട്ടികൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ പതുക്കെ ഓടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ; അതിനെ ഭ്രാവകത്തിലെ തന്മാത്രകളിലെ സ്ഥിതിയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താം. അവസാനം അക്ഷമരായ കുട്ടികൾ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് യഥേഷ്ടം തോന്നിയ സ്ഥലത്തേയ്ക്കോടിപ്പോവുകയാണെന്നു കരുതുക. അതുപോലെയാണ് വാതകത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ നില. ക്ലാസ്സിൽവെച്ചോ, കളിസ്ഥലത്തുവെച്ചോ ഈ പ്രവർത്തനം കുട്ടികളെക്കൊണ്ടുചെയ്യിച്ച് ഖരഭ്രാവകവാതകങ്ങളിലെ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാം.

തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ആകർഷണവും, വികർഷണവുമുണ്ടെന്ന് ഒന്നാമലുറയത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖരവസ്തുവിൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ആകർഷണബലവും അടുപ്പവും കൂടുതലാണ്. ചൂടു തട്ടുമ്പോൾ ആകർഷണബലത്തെ അതിജീവിച്ച് തന്മാത്രകൾ ഒരു പാർശ്വീകാരം അകന്നു പോകുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കു വഴുതിമാറാൻ ഭ്രാവകത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്കുള്ള കഴിവാണത്. അതിന്റെ ചലനാത്മകതയ്ക്കു കാരണം. കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നതോടെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെടുകയും

അവ അകന്നുമാറി യ്പോഴോ ന ബാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് വാത കുറവു.

വിപുല'കരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും.

1. 20 C.C. വെള്ളത്തിൽ 5 C.C സ്റ്റീരിറൈസിച്ച നല്ല പൊലെ കുലുക്കുക. ദ്രാവകമിത്രീതത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അളക്കുക. വ്യാപ്തത്തിൽ എന്തു വ്യത്യാസം ദർശിക്കുന്നു? കുട്ടികളുടെ നിഗമനമെന്തു?

2. ഏത് ഉരുകി വെള്ളമാകുമ്പോൾ ചലനസംഭരണവും ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും വ്യക്തം പറയണം. കാരണമെന്താണെന്ന് കുട്ടികൾ വിശദമാക്കട്ടെ

3. ഭാവകങ്ങൾ അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. കാരണം പറയിപ്പിക?

മൂലകങ്ങളും യന്ത്രഗതികളും

അവതരണം

അതും, തന്മാത്ര എന്നീ പദങ്ങൾ കൂട്ടികൾക്കു പരിചിതമാണ്. ചോദ്യങ്ങൾവഴി ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർവ്വജ്ഞാനം പരിശോധിക്കുക. ചൂടു തട്ടുമ്പോൾ മെർക്കുറിയിൽ ഓക്സയിഡ് തന്മാത്രയുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമെന്താണെന്നവർക്കറിയാം. ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രയുണ്ടാകുന്ന രാസവിഘടനവും പരിശോധിക്കുക. ജലം മെർക്കുറിയിൽ ഓക്സയിഡ് എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകളും, ഫൈബ്രജൻ, ഓക്സിജൻ ഇവയുടെ തന്മാത്രകളും പ്രതീകചിത്രങ്ങൾ വഴി ബോർഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. ജലത്തിന്റെ ഒരു തന്മാത്രയും ജലത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫൈബ്രജന്റെ ഒരു തന്മാത്രയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുട്ടികൾ കണ്ടുപറിക്കട്ടെ.

താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അമ്പ് ഉത്തരം പറയൂ.

1. ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രയിൽ എത്ര തരം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്?

2. ഫൈബ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകളിലെത്രത്തരം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഇതുപോലെ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഫൈബ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകളിൽ ഒരുതരം ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രയിൽ രണ്ടുതരം ആറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിന്റെ തന്മാത്രയിലും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്, ഗ്ലോറിൻ, നൈട്രജൻ, കാർബൺ എന്നിവയുടെ തന്മാത്രകളേയും ചിത്രം വഴി ഈ രീതിയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. ഇതിൽ നിന്ന്, ഫൈബ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഗ്ലോറിൻ, കാർബൺ എന്നീ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരേതരം ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും, ജലം, മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലെന്ന ആറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നും കട്ടികൾ ഗ്രഹിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരേതരം ആറ്റങ്ങളുടങ്ങുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ. വിഭിന്നതരം ആറ്റങ്ങളുള്ള പദാർത്ഥം യൗഗികമാണ്.

മൂലകങ്ങൾക്കും, യൗഗികങ്ങൾക്കുമുള്ള ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ കട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇരുമ്പ് ഒരു മൂലകമാണെന്നു പറയാൻ കാരണം അതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുക. ഗന്ധകവും ഒരു മൂലകമാണ്. യൗഗികമായ അയേൺ നൾഫൈഡിൽ ഗന്ധകത്തിന്റേയും ഇരുമ്പിന്റേയും ആറ്റങ്ങളുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ഘടനയും, മൂലകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദമാക്കുക. നാം കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മൂലകങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഉദാഹരണമായി പഞ്ചസാര, കറിയപ്പ്, മണൽ എന്നീ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുക. ഏതാനും മൂലകങ്ങൾ സംയോജിച്ചാണ് ഇവയോടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നേവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം 104 ആണ്. അവയുടെ

സംഖ്യ ഇനിയും വർദ്ധിക്കാം. ഇവയിൽ 92 മൂലകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്ഥിരമായിക്കാണുന്നവയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ അതുകണ്ടു സ്ഥിരമല്ലാത്തതിനാൽ ദീർഘകാലം നിലനില്ക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടായി സെക്കന്ററൈസേഷൻ തന്നെ മറ്റൊന്നായി മാറുന്ന മൂലകങ്ങളുണ്ട്, ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ഫൈബ്രജൻ മുതൽ യുറേനിയം വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് നാം പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവ. അവയിൽ പരിചയമുള്ള ചില മൂലകങ്ങളുടെ പേർ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ. ഹോഡ്രജൻ വഴി ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നീ മൂന്നുവസ്തുക്കളിലുമുള്ള മൂലകങ്ങളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഒരുപോലെ നമുക്ക് സുപരിചിതമല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക. അവയെല്ലാം ഒരേ തോതിലല്ല ചിതരണം ചെയ്തു പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലവ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. മറ്റു ചിലവ പേരിനുമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചാർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ വിതരണക്രമം കുട്ടികൾക്കു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.

പരീക്ഷണം:—

ഇരുമ്പും ഗന്ധകവും വെച്ചേറൊടുത്തു അവയുടെ തിളക്കം, നിറം എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ കുട്ടികളെ നിയോഗിക്കുക. രണ്ടു പേർ ഒരു മിശ്രിതം (7:4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പരീക്ഷണനാളിയിലെടുത്തു) ചൂടാക്കട്ടെ. ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി ഒരു രാസപ്രവർത്തന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥം തണുപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഒരു മോർട്ടാറില് പാടിടുക. പുതിയ പദാർത്ഥത്തിന്റെ നിറം, ആകർഷണസ്വഭാവം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് അത് ഇരുമ്പിന്റേയും ഗന്ധകത്തിന്റേയും മിശ്രിതമാണോ, അതോ മറ്റുവസ്തുവുമാണോ എന്ന് കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. പദാർത്ഥം അയേൺ സർഫൈഡ് എന്ന യന്ത്രികമാണെന്നു വീശദമാക്കുക. ഇരുമ്പ്, ഗന്ധകം എന്നീ മൂലകങ്ങൾ സംയോജിച്ചാണ് അയേൺ സർഫൈഡ് ഉണ്ടായതെ

ന്നു കട്ടികൾ കണ്ടതാണല്ലോ. ജലം, മർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് എന്നീ യന്ത്രികങ്ങൾ ഏതേതു മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണെന്ന് അറിയുക.

ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടേയും യന്ത്രികങ്ങളുടേയും പേരുകൾ പറയുന്നതുവഴി ഇവയിൽ ഏതാണ് പ്രകൃതിയിൽ കൂടുതലുള്ളതെന്നു പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാം. യന്ത്രികങ്ങളാണോ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ളതെന്നു കാര്യം വ്യക്തമാക്കണം. മൂലകങ്ങൾ 104 എണ്ണം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ യന്ത്രികങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഇരുപതുലക്ഷമാണ്. അവയുടെ എണ്ണം നിത്യേന വർദ്ധിക്കുകയാണിരിക്കുന്നു.

വിപുലീകരണവും മൂലധനീകരണവും

1. ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടേയും യന്ത്രികങ്ങളുടേയും സാമ്പിളുകൾ കട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നത്ര ശേഖരിക്കട്ടെ. ഓരോന്നും ഓരോ ഒഴിഞ്ഞ തീപ്പെട്ടിയിലാക്കി പേരെഴുതി വയ്ക്കുക.

2. ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടെ പേരും, അവയുടെ ഓരോ ഉപയോഗവും മനസ്സിലാക്കി, പേരിന്നെതിരെ ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കുക.

3. പരിചയമുള്ള ഏതാനും മൂലകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യട്ടെ. ഗുണങ്ങളിലുള്ള സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലകങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇന്നും തിരിയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു പറയിപ്പിക്കുക.

ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും

അവതരണം -

എന്താണ് മൂലകമെന്ന് കട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു. ആകെ എത്ര മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടു

ണ്ടെന്നവർക്കാറിയാം മൂലകങ്ങൾ യന്ത്രഗതികളിൽ നിന്നെങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പരിശോധിക്കുക. ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ കുട്ടികൾ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കാം. മൂലകങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയിൽ ഇനം തിരിക്കാൻ പറയുക എന്നു ചോദിക്കുക. അവർ ശ്രമിക്കട്ടെ.

പരീക്ഷണം:—

ഇരുമ്പാണി ഗന്ധകം, കരികട്ട, ചെമ്പുതകിട് എന്നിവ കുട്ടികൾക്കു നൽകുക. അവർ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവയെ രണ്ടു വിഭാഗമാക്കിത്തിരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുക അവയിൽ രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങൾ മാതൃകയായെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള താരതമ്യപഠനത്തിലേക്കു് അദ്ധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ നയിക്കണം. ഉദാഹരണമായി ചെമ്പുകഷണവും ഗന്ധകവും നിറം, ഭാരം, താപം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവു, ദ്രവണാങ്കം എന്നീ ഗുണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി കുട്ടികൾ ഇവയെ പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുണവും താരതമ്യം ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ഫലം ഒരു പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ചെമ്പു

ഗന്ധകം

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. തിളങ്ങുന്നു | തിളങ്ങുന്നില്ല |
| 2. സാമാന്യം സാന്ദ്രതയുണ്ട് | സാന്ദ്രത കുറവാണ് |
| 3. താപം വഹിക്കുന്നു | താപം വഹിക്കുന്നില്ല |
| 4. വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു | വൈദ്യുതി പ്രവാഹം അനുവദിക്കുന്നില്ല |
| 5. അടിച്ചപറത്താൻ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയും | അടിച്ചപറത്താൻ കഴിയുന്നില്ല |

പട്ടികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെമ്പു ഗന്ധകം എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ലോഹം. ഏതാണ് അലോഹം എന്നു കുട്ടികൾക്കു പറയാൻ കഴിയും. ചെമ്പിന്റേതെന്നോടു സാദൃശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങൾ ലോഹങ്ങളാണ്. ഗന്ധകത്തിന്റേതു പൊതു ഗുണം

ങ്ങളോടു സംദൃശ്യമുള്ള മറുഭൂതവയെ അലോഹങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. അദ്യം കൊടുത്ത പദാന്തങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണെന്നും ഏതെല്ലാം അലോഹങ്ങളാണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു കുട്ടികൾ ഇന്നു തിരിക്കട്ടെ. അലോഹങ്ങൾക്കും ലോഹങ്ങൾക്കുമേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

വിചലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. പരിചയമുള്ള പത്തു വസ്തുക്കളുടെ പേരെഴുതിച്ചു അവയിൽ ഏതെല്ലാം ലോഹനിർമ്മിതമാണെന്നും ഏതെല്ലാം അലോഹവസ്തുക്കളാണെന്നും തരംതിരിപ്പിക്കുക.

2. മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നു് പത്തു ലോഹങ്ങളുടെയും പത്തു അലോഹങ്ങളുടെയും പേർ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.

3. ഒരു മൂലകം ലോഹമാണോ അലോഹമാണോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു സ്പദമായ തെളിവുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നറിയട്ടെ.

പ്രതീകങ്ങൾ

അവതരണം.—

രാസക്രിയകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ പേർ എപ്പോഴും നീട്ടിവലിച്ചെഴുതുന്നത് അസൗകര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ചില പ്രതീകങ്ങളിൽ കൂടി അവയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു്. ഒരു മൂലകത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ചിത്രീകരണമാണു് പ്രതീകം.

പ്രതീകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികൾക്കു് അപരിചിതമല്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠം മുതൽക്കു് അവർ പല പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. +, —, X, ÷ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ യഥാക്രമം അധികം, ന്യൂനം, ഗുണനം, ഹരണം എന്നിവയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുക. ഈ നാലു പ്രതീകങ്ങളെ സ്വർശിച്ചു

കൊണ്ടുപോന്ന രസതന്ത്രത്തിലെ പ്രതീകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇവ പരിചയമില്ലാത്ത ഏതാനും പുതിയ സംഗതികളാണെന്ന തോന്നലിനവകാശമില്ല.

മൂലകങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ആദ്യകാലത്തു വൃത്തങ്ങൾ അല്പ ചന്ദ്രചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡാൽട്ടൻ പലേ നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ഗോളങ്ങളെയാണ് ആറ്റങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. പുതിയ പുതിയ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് അവയുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതോടെ ഈ ഏർപ്പാടുകൾ അപര്യാപ്തങ്ങളായിത്തീർന്നു 1814-ൽ സ്വീഡനിൽ രസതന്ത്രജ്ഞനായ ബെർസീലിയസ്സ് മൂലകങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരു പുതിയ മാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിച്ചു. മൂലകങ്ങളുടെ ലത്തീനിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഉള്ള പേരിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ അക്ഷരങ്ങൾ അവയ്ക്കു പകരമായി എഴുതാമെന്നായിരുന്നു ബെർസീലിയസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശം അതനുസരിച്ച് മൂലകങ്ങളുടെ ലാറ്റിനിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഉള്ള പേരിന്റെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ അവയ്ക്കു പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

മൂലകം

പ്രതീകം

ഹൈഡ്രജൻ..... H

ഓക്സിജൻ..... O

കാർബൺ..... C

നൈട്രജൻ..... N

ഗന്ധകം (സൾഫർ)..... S

ഒന്നിലേറെ മൂലകങ്ങളുടെ പേർ ഒരേ അക്ഷരംകൊണ്ടാരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ അക്ഷരം അവയ്ക്കെല്ലാവറിനും പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകത്തിന് പ്രതീകമായി ആദ്യക്ഷരവും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പേരിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അക്ഷരവും നൽകുന്നു. ചിലതിന് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അക്ഷരമാണ് പ്രതീകം. ഉദാഹരണം

മൂലകം

പ്രതീകം

കാത്സ്യം.....	Ca
കോപ്പർ (കുപ്പം).....	Cu
ക്ലോറിൻ.....	Cl
മഗ്നീഷ്യം.....	Mg
മാംഗനീസ്.....	Mn

ചില മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ അവയുടെ ലത്തീൻ പേരിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചതാണ്. ഉദാഹരണം.

മൂലകം	ലത്തീൻ നാമം	പ്രതീകം
ഇരുമ്പ്	ഫെറം	Fe
സോഡിയം	നാട്രിയം	Na
പൊട്ടാസ്യം	കാലിയം	K.
വെള്ളി	ആർജന്റം	Ag
സ്വർണം	ആറം	Au

ഉദാഹരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ അക്ഷരം മാത്രമുള്ള ചിഹ്നം വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതണം. രണ്ടക്ഷരമുള്ള ചിഹ്നത്തിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വലിയ അക്ഷരവും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ചെറിയ അക്ഷരവുമായിരിക്കണം.

മുകളിൽ കൊടുത്ത മൂന്നിനും പ്രതീകങ്ങളുടേയും ആഗമം എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കണം. പ്രതീകങ്ങൾ എങ്ങനെ, ഏതടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞാൽ കട്ടികൾക്ക് അതോ മിക്കാൻ എളുപ്പം കഴിയും.


പ്രതീകങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടി വിലകൊള്ളുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഉണർപ്പറയണം. കേവലം ചുരുക്കെഴുത്തിനുള്ള സൂചകര്യം മാത്രമല്ല, രസതന്ത്രത്തിന്റെ സാർവ്വലൗകികഭാഷയാണ് പ്രതീകം. ഓരോ പ്രതീകവും ഒരുമൂലകത്തെ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഒരാറ്റത്തെക്കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി 'C' എന്നെഴുതിയാൽ കാർബൺ എന്നതിനു പുറമെ അതിന്റെ ഒരറ്റമെന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. നിങ്ങൾക്കു പരിചയമുള്ള മൂപ്പതു മൂലകങ്ങളുടെ പേർ, പ്രതീകം, അറ്റോമികഭാരം എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക.

2. ഏതാനും യുഗലികളുടെ രാസസൂത്രം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിലുമുള്ള മൂലകങ്ങളേതെല്ലാമാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക.



രാസസൂത്രവും തന്മാത്രഭാരവും

അവതരണം :-

മൂലകത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഒരറ്റത്തിന് പകരമാണ് പ്രതീകം. മൂലകങ്ങളുടേയോ, യുഗലികളുടേയോ, തന്മാത്രകളെ എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാം? 'H' എന്നെഴുതിയാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരറ്റമെന്നാണർത്ഥമെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയുടെ പ്രതീകം എന്തായിരിക്കും? പ്രശ്നം ഈ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. H_2 ആണെന്നു കൂട്ടികൾ പറയും. ഇതുപോലെ 'O' എന്നതു് ഓക്സിജന്റെ ഒരറ്റം. രണ്ടാറ്റങ്ങളുള്ള ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെ ചിത്രീകരണം O_2 . രണ്ടാറ്റങ്ങൾ വീതമുള്ള ക്ലോറിൻ, നൈട്രജൻ എന്നീ തന്മാത്രകൾ എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാമെന്നു കൂട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ. ഈ രീതിയിൽ തന്മാത്രകളെ പ്രതീകങ്ങളിൽകൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് രാസസൂത്രമെന്നു പറയുക. H_2 , () എന്നിവ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ തന്മാത്രകളുടെ രാസസൂത്രങ്ങളാകുന്നു.

രാസസൂത്രത്തിന്റെ വലതു വശത്തായി അപ്പു താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ

സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു കട്ടികൾ പറയും. മെർക്കുറി ഓക്സൈഡിന്റെ തന്മാത്രയിൽ ഒരു മെർക്കുറി ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക ഉപയോഗിച്ച് മെർക്കുറി ഓക്സൈഡിന്റെ രാസസൂത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണം അവർ പറയും. ഇതുപോലെ ഘടകമലങ്ങളുടെ ഓരോ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമുള്ള യഥാർത്ഥ തന്മാത്രകളോ രാസസൂത്രങ്ങൾ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ജലം, കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ആറ്റങ്ങൾ വീതമുള്ള തന്മാത്രകളുടെ രാസസൂത്രം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നു അദ്ധ്യാപകന്റെ നേതൃത്വത്തോടെ കട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ തന്മാത്രകളിൽ ഓരോ ഘടകമലത്തിനും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ സംഖ്യയോ അദ്ധ്യാപകൻ നൽകിയത് മതി. പലതരം തന്മാത്രകളുടെ രാസസൂത്രങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങളെന്ന നിലയിൽ നൽകണം.

ജലത്തിന്റെ ഒരു തന്മാത്രയുടെ രാസസൂത്രമാണല്ലോ H_2O . രണ്ടു തന്മാത്രകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാം? ഉത്തരം കാണാൻ കട്ടികൾ ശ്രമിക്കട്ടെ. മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംഖ്യാചിഹ്നം കാണിക്കാനെന്നപോലെ രാസസൂത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തു് നമ്പരുകാണിക്കുക. $2H_2O$, $3CO_2$ എന്നിങ്ങനെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിക്കുന്ന മറ്റുദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ കട്ടികൾക്കു പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല.

രാസസൂത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരേതരം ആറ്റങ്ങളുള്ള തന്മാത്രകൾ O_2 , N_2 എന്നിവയാദ്യം അവതരിപ്പിക്കുക. പിന്നീടു് രണ്ടുതരം ആറ്റങ്ങളുള്ളവ H_2O , HCl ആവാം. തുടർന്ന് മൂന്നോ അധികമോ ആറ്റങ്ങളുള്ള തന്മാത്രകൾ അവതരിപ്പിക്കണം.


ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്മാത്രയുടെ രാസസൂത്രം അറിയാനാകാത്ത രാസസൂത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കുക. ഉദാഹരണമായി H_2O എന്ന സൂത്രാനുക്തി തന്മാത്രയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്നു കട്ടികളോടു ചോദിക്കുക.

അവശ്യമായ സൂചനകൾ അല്പാപകൻ നൽകുന്നു. അതിൽ ഫൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നു കൂടിയതിനാലാണ്, ഫൈഡ്രജന്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളോടുകൂടി ഓക്സിജന്റെ ഒരു ആറ്റം സായോജിച്ചിരിക്കയാണെന്നു പറയാൻ കഴികൾക്കു കഴിയുന്നു.

തന്മാത്രകളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണെങ്കിൽ തന്മാത്രാഭാരം അത് ലഭിക്കിയ ആറ്റങ്ങളുടെ ഭാരത്തിന്റെ ആകെ തുകയായിരിക്കണമല്ലോ. ഈ ഒരുടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളോടു പറയുക. ഫൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക ഭാരങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണു് ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം. അതായതു് $(2 \times 1) + (1 \times 16) = 18$. ഇതുപോലെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ്, മെർക്കുറിക്ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെ തന്മാത്രാഭാരങ്ങളും കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. അറ്റോമിക ഭാരത്തെപ്പോലെ തന്മാത്രാഭാരവും ഒരുപേക്കുക സംഖ്യയുമാണെന്നു് കുട്ടികളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. താഴെപ്പറയുന്ന ധൂതകങ്ങളുടെ തന്മാത്രാഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുക



2. ഒരു ധൂതകത്തിന്റെ രാസസൂത്രമാണു് PbO_2 . ഇതു പരിശോധിച്ചു് ധൂതകത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും? പ്രകൃത ധൂതകത്തിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം കണക്കാക്കുക. ധൂതകം ഏതു്.?

പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാമ്യഭേദസ്ഥിതി.

അറുതരണം:—

മൂലകങ്ങൾ സംയോജിച്ചു് ധൂതകങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിശ്ചിതമായ ഒരു പാതകൂടാതെ മാത്രമേ അവ കൂടിച്ചേരുക

യുള്ളു. ജലം, കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ പരിചിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടി ഇതു തെളിയിക്കാം. കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പലതരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെ നിദ്ദേശിക്കാം. മെഴുകുതിരി, പെട്രോൾ, വിറക്, കരി എന്നിവയുടെ ജ്വലനം, കാർബണേറ്റുകൾ ചൂടാക്കൽ, ശ്വാസനം എന്നിങ്ങനെ പല മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടികാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ലഭിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ടാകാൻ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് ധാരാളം അതെത്തരം പശ്ചാത്താപം കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ഭാരപരമായ അനുപാതം 3:8 ആയിരിക്കും.

പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയേൺസൾഫൈഡ് ന്റെ പരീക്ഷണം വഴിയും യന്ത്രികങ്ങളുടെ സംഘടനയിലുള്ള സ്ഥിരത തെളിയിക്കാം. ഘടകമൂലകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കലർത്തിയാലും അവ 7:4 എന്നതോതിൽ മാത്രമേ സംയോജിക്കൂ. കൂടുതലുള്ള ഇരുമ്പോ ഗന്ധകമോ കൂടിച്ചേരാതെ അവശേഷിക്കും. ഉല്പന്നമായ അയേൺസൾഫൈഡ് ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്, ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കിയതിനുശേഷമേ, യന്ത്രികങ്ങളുടെ സംഘടനസ്ഥിരത തെളിയിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാവൂ. അവശേഷിക്കുന്ന ഗന്ധകത്തിന്റെ ഭാരം കൂടുതലല്ലാത്ത ഗന്ധകത്തിന്റേതിനോടു തുല്യമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കൂടുതലുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ കാര്യവും യന്ത്രികങ്ങൾക്കു മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഘടകമൂലകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംയോജനാനുപാതമാണെന്നു തെളിയിക്കണം. രണ്ടുകട്ടികളോടു ഇരുമ്പും ഗന്ധകവും ഇഷ്ടമുള്ള തോതിൽ കലർത്തി ഓരോ സാമ്പിൾ മിശ്രിതമുണ്ടാക്കാൻ പറയുക. അവർ രണ്ടുപേരും എടുത്ത ഘടകമൂലകങ്ങളുടെ തോത് രണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇരുമ്പും ഗന്ധകവും ചേർന്ന് അയേൺസൾഫൈഡ് യന്ത്രികമാവണമെങ്കിൽ അവ 7:4 എന്ന കൂലത്തിൽത്തന്നെ യോജിക്കണമെന്നു അവ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

വിപുലീകാണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. ഏഴു ഗ്രാമ വീതം ഇന്ത്യ ഗന്ധകവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം തവിപ്പിച്ചാൽ എത്ര ഗ്രാമ അമേൺസൾ ഫൈഡു ലഭിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുക.

2. ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഈമ്പിന്റേയും ഗന്ധകത്തിന്റേയും ഭാരം, ഉണ്ടാകുന്ന അമേൺസൾഫൈഡിന്റെ ഭാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. താരതമ്യപഠനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന നിഗമനം എന്ത്?


3. ജലം ഉദാഹരണമായെടുത്ത് നശിതാനുപാതനിയമം തെളിയിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ദ്രവ്യമാനസംരക്ഷണ നിയമം

അവതരണം:—

ജലമെന്ന ഒരു രാസപ്രതിഭാസമാണെന്ന് കട്ടികൾക്കറിയാം. പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. മെഴുകുതിരികത്തുമ്പോൾ മൂന്നു അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? കത്തുമ്പോൾ മെഴുകുതിരിയിലെ പദാർത്ഥത്തിനുള്ള സംഭവിക്കുന്നു? രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിണ്ഡത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രശ്നം ഈ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പിണ്ഡവും ഉണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പിണ്ഡവും സമമായിരിക്കും. കാരണം, രാസപ്രവർത്തനം മൂലം പദാർത്ഥത്തിലെ ആറ്റങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല. അവ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. ദ്രവ്യമാനസംരക്ഷണ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വസ്തുത മുറിക്കിടച്ച ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ അല്പം ചൂടുന്ന ഫോസ്ഫറസ്സ് കത്തിച്ചു തെളിയിക്കാം. ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഭാരം അതിലെ ഫോസ്ഫറസ്സ് കത്തുന്നതിനു മുൻപും അതിനു ശേഷവും തുല്യമായിരിക്കും.

അപ്പം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ലായനി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയുമായി കലർത്തിയും ദ്രവ്യമാനസംരക്ഷണനിയമം തെളിയിക്കാം. ഉപകരണങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നവിധം സജ്ജീകരിക്കുക. ഫ്ലാസ്കിൽ തുരിശുലായനിയും പരീക്ഷണനാളിയിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ലായനിയും ഏടുക്കുക. പരീക്ഷ



ചിത്രം 2

ദ്രവ്യമാന സംരക്ഷണ നിയമം
തെളിയിക്കുന്ന പരീക്ഷണം

ണനാളിയിലെ ലായനി ഫ്ലാസ്കിലേതിൽ കലരാത്തവിധം അതു ഫ്ലാസ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഫ്ലാസ്ക് മറക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കുക. ഫ്ലാസ്ക് ചരിച്ച ലായനികൾ തമ്മിൽ കലർത്തുക. കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു.

കോപ്പർ കാർബണേറ്റിന്റെ പച്ചനിറം നോക്കി രാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. പ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷവും ഫ്ലൂവോസ്കിന്റെ ഭാരം നിർണ്ണയിക്കുക. രണ്ടാം സമമാണെന്ന് കാണാം.

ഫ്ലൂവോസ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് കത്തിയ രാസപ്രവർത്തനവും അതു വഴി ഫ്ലൂവോസ്കിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ വിതരണ ക്രമത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കണം.

ഫോസ്ഫറസ് + ഓക്സിജൻ → ഫോസ്ഫറസ് പെന്റാക്സൈഡ്

ജലനത്തിനു മുൻപ് ഫ്ലൂവോസ്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റങ്ങളുമായി സംയോജിച്ചുവെന്നല്ലാതെ അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫ്ലൂവോസ്കിലെ ഫോസ്ഫറസിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് പെന്റാക്സൈഡിന്റെ രൂപത്തിൽ സംയോജിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണവും ഇതേ രീതിയിൽ വിവരിക്കുക. ഈ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പദാർത്ഥം അവശേഷിക്കുന്നതായിക്കണ്ടാത്തതിന്റെ കാരണം കുട്ടികൾ ആലോചിച്ചു പറയട്ടെ.

ദ്രവ്യമാന സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസായിക പ്രാധാന്യം അദ്ധ്യാപകൻ വിശദമാക്കണം.

വിപുലീകരണവും മൂല്യനിർണ്ണയവും

1. 4:32 ഗ്രാം മെർക്കുറികാക്സൈഡ് മുടക്കിയപ്പോൾ 4 ഗ്രാം മെർക്കുറി ലഭിച്ചു. എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജനായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? എന്തുകൊണ്ട്?
2. ഒരു നിശ്ചിത തൂക്കം മഗ്നീഷ്യം കമ്പി വായുവിൽ കത്തിക്കുക. കത്തിയുണ്ടാകുന്ന ഭസ്മത്തിന്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം.

മണ്ണിഷ്ടം കമ്പയുടെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? നിരീക്ഷണഫലം ദ്രവമാന സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക.



3. അടച്ചുള്ള ഒരു ജാറും ഒരു കഷണം കടലാസും ഉപയോഗിച്ച് ദ്രവമാന സംരക്ഷണ നിയമം തെളിയിക്കുക.

രാസസമീകരണം


അവതരണം:-

പ്രതീകങ്ങൾ, രസസൂത്രം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് രാസസമീകരണമെന്നു പറയുന്നത്. രാസക്രിയയുടെ സംക്ഷിപ്തവും സൗകര്യപ്രദവുമായ വിശദീകരണമാണ് രാസസമീകരണം. ദ്രവ്യസംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ച്, ഒരു രാസക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതാണ് രാസസമീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

കാർബൺ, ഗന്ധകം എന്നിവ വായുവിൽ കത്തുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമീകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാരംഭിക്കുക. അവ പ്രായേണ ലളിതമാണ്.




ഇരുവശത്തുമുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ സംഖ്യ സമമാണോ എന്നു കുട്ടികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഇരുമ്പും ഗന്ധകവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് അയേൺ സൾഫൈഡുണ്ടാകുന്ന രാസക്രിയയുടെ സമീകരണം കുട്ടികൾ പറയട്ടെ. കുട്ടികൾ മുമ്പു പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ്, ജലം എന്നിവയുടെ രാസ വിഘടനം ഉദാഹരണമാക്കി സമീകരണം സംതുലിതമാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കണം.





ഇവിടെ രണ്ടു മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നത്, രണ്ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ലഭിക്കാനാണ്. ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾക്കു ആറ്റങ്ങളെന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്രമായ നിലനില്പില്ലെന്നു കട്ടികൾക്കറിയാം. ഒരു മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രയുടെ വിഘടനത്തിൽ നിന്നു ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. രണ്ടു മെർക്കുറി ആറ്റങ്ങളും ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയും ലഭിക്കുന്നു. ഇതു പോലെ ജലത്തിന്റെ രാസവിഘടനം സമീകരണ രൂപത്തിൽ എഴുതി അതു സംതുലിതമാക്കാൻ കട്ടികളോടാവശ്യപ്പെടണം.



ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഈ രണ്ടു ആറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു തന്മാത്രകളായി മാത്രമേ നിലനില്ക്കുകയുള്ളുവെന്ന സൂചന അല്പാപകൻ നൽകുന്നു. ജലത്തിന്റെ ഒരു തന്മാത്രയിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം മാത്രമേയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ലഭിക്കാൻ എത്ര ജല തന്മാത്രകൾ വിഘടിക്കണം ഉത്തരം കട്ടികൾ പറയും. രണ്ടു ജലതന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ചാൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ടാകും? ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും അതുകൊണ്ടു ജലത്തിന്റെ വിഘടനം കാണിക്കുന്ന സമീകരണം ഇങ്ങനെ സംതുലിതമാക്കാം.






ഇതുപോലെ പൊട്ടാസ്യംക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യംനൈട്രേറ്റ് എന്നീ യൗഗികങ്ങളുടെ വിഘടനക്രിയയും സമീകരണ രീതിയിൽ കട്ടികൾ ചിത്രീകരിക്കട്ടെ. ആവശ്യമുള്ള മറ്റുദാഹരണങ്ങളും നൽകാം. സമീകരണങ്ങൾ, ആവുന്നതും ക്ലാസിൽ വച്ചുതന്നെ കട്ടികളെക്കൊണ്ടു സംതുലനം ചെയ്യിക്കണം.



രാസസമീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന്യത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അദ്ധ്യാപകൻ നൽകണം.

വിപുലീകരണവും മൂലധൂനിർണ്ണയവും

1. താഴെപ്പറയുന്ന സമീകരണങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യുക.



പശ്ചാത്തല വീജ്ഞാനം

പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ലോകം.

ഏതാനും ചില അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ പദാർത്ഥങ്ങളും കേവലം 92 അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. മൂലകങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ ഇന്നേവരെ 104 മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ടുണ്ട്. യൂറേനിയത്തിനു ശേഷമുള്ള പന്ത്രണ്ടു മൂലകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ മിക്കവാറും ഇല്ലെന്നു പറയാം. അവയിൽ മിക്കതും അപ്പോസ്തോളികളത്രേ. എന്നാലും പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളെന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഫൈറ്റൺ മുതൽ യൂറേനിയം വരെയുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഘടകങ്ങളാണ്. ആ കേന്ദ്രീകൃത 14 മൂലകങ്ങളുണ്ടെന്നു വെച്ചു അവയെല്ലാം ഒരേ തോതിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെവിടേയും കണ്ടാമെന്നു ധരിക്കരുത്. പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വാതകമൂലകമായ ഹൈഡ്രജനാണ്. ഭൂമിയെ പ്രത്യേകം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ളവയുള്ള മൂലകം ഓക്സിജനായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ വിവരണം താഴെ കാണാം വിധമാണ്.

കോക്സിജൻ 49 ശതമാനം കാത്സ്യം- 3 ശതമാനം.
 സിലിക്കൺ 26 ശതമാനം സോഡിയം-3 ശതമാനം
 അലൂമിനിയം 8 ശതമാനം പോട്ടാസ്യം-2 ശതമാനം
 ഇരുമ്പ് 5 ശതമാനം മെഗ്നീഷ്യം-2 ശതമാനം

ഭൂമിയുടെ പുറത്തോടിൽ 98 ശതമാനവും മുകളിൽപറഞ്ഞ
 8 മൂലകങ്ങളാണെന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ എല്ലാം കൂടികേവലം
 രണ്ടുശതമാനമാത്രം! നമുക്കു നിത്യപരിചയമുള്ള ചെമ്പ് ഭൂമി
 യുടെ പുറത്തോടിൽ കേവലം 0.51 ശതമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ.
 ഭൂകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധികാ
 രികമായ അറിവുകളൊന്നുമില്ല. അതിസാന്ദ്രത ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ
 കൂടുതലും ഉരുകിയ ഇനായിരിക്കാതെ വഴിയുള്ളവെന്ന്
 ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

ഭൂമിയുടെ — പൊതുവേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും — അടി
 സ്ഥാന ഘടകം മൂലകമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ
 മൂലകത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? മൂലക
 ങ്ങളും യന്ത്രീകങ്ങളുമായി നാം പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷക്ക
 ണക്കിനു പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അവയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന
 യെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ആലോചിക്കാൻ
 തുടങ്ങിയതല്ല. പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെയും ഗ്രീസിലെയും ചിന്ത
 കർത്താക്കൾ സ്വന്തമായുള്ള രീതികളിൽ കൂടി പദാർത്ഥ ഘട
 നയുടെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിലെത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിച്ചു. അവസാ
 നം രണ്ടു കൂട്ടരും ചെന്നെത്തിയതോ ഒരു ചെറുവിജ്ഞാന
 ആയിരുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആകാശം, ഭൂമി
 വായു, അഗ്നി, ജലം എന്നിവയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടി
 സ്ഥാന ഘടകങ്ങളെന്ന് വേദങ്ങളുടെ കാലത്തെ ഭാരതീയ ചിന്ത
 കന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ചതുർമൂല സിദ്ധ
 ന്തത്തിനു ഇതുമായി സാമ്യം കാണാം. ദൈവശാക്തീകദർശന
 ത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ കാണാദൻ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ടു കട
 ന്ന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പുനർവിഭജനം സാധ്യമല്ലാത്ത അനേ

ചെറുകുറുത്തുമാർ നിർമ്മിതമാണെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചു. കണ്ണൂർ ഭാഗം കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡെമോക്രിറ്റസ് ഇതേരീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു. ഈ ചെറുകുറുത്തുമാർക്കു ആറാം എന്ന പേർ കൊടുത്തു. വിഭജിക്കാനാവാത്തതു എന്നാണല്ലോ ആറാം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം. ഡെമോക്രിറ്റസ്സിനു ശേഷം ഏറെക്കാലം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ആറാം സിദ്ധാന്തത്തെ വിസ്മൃതിയിൽ നിന്നുയർത്തിയതു വിചലീകരിച്ചതു ഡാൽട്ടനാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആറത്തിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചു സവിസ്തരപഠനം നടത്തിയിട്ടും അതവിഭാജ്യമാണെന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു മുന്തോട്ടു നീങ്ങാൻ ഡാൽട്ടനു കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടെയാണ് ആറാം, പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസാന ചാക്കാണെന്ന വിശ്വാസത്തിനു ഇളക്കം തട്ടിയതു. ആറാം സയൻസിന്റെ യുഗമാണല്ലോ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവ്വാലം. ആറത്തിന്റെ ഘടന അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ സംഭാവന ഇംഗ്ലീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെ. ജെ. തോംസനിൽനിന്നാണുണ്ടായതു. കാഥോഡ് രശ്മിക്കുഴച്ചുപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൽ കലാശിച്ചു. ആറത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള കണികയാണ് ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു മൂലകം—അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഘടകമായ ആറം—വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസിനമാണ്. അതിനു യാതൊരു ചാർജ്ജുമില്ല ആറത്തിലാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള കണികകളുണ്ടുതാനും. അപ്പോൾ അവയെ നിർവ്വീര്യമാക്കാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള കണികകൾ കൂടി അതിലുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. ഇതൊരു ചിന്താഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ആറത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള കണികയായ പ്രോട്ടോണിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചു. പെറിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള കണികയ്ക്കു പ്രോട്ടോൺ എന്ന പേരു കൊടുത്തതു. ഒരു

ററത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും സംഖ്യ തുല്യമായിരിക്കും. ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ആസ്ഥാനം. ന്യൂക്ലിയസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ പ്രോട്ടോണുകളെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട്.

ഈ കണികയെ ന്യൂട്രോൺ എന്നു പറയുന്നു. ന്യൂട്രോണിനു യാതൊരു ചാർജ്ജുമില്ല. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ജുള്ള പ്രോട്ടോൺ, ഒരു ചാർജ്ജുമില്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഇവയാണ് ആറ്റത്തിന്റെ മുഖ്യ ഘടകങ്ങൾ. ആറ്റത്തിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും ഭാരം സമമാണ്. ഇവയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഭാരം അവഗണിക്കാവുന്നവധി നിസ്സാരമാണ്. ആറ്റത്തിന്റെ ആകെ വലിപ്പത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ വലിപ്പം നിസ്സാരമത്രെ. ആറ്റം തന്നെ സൂക്ഷ്മമാണ്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെറുതായ ന്യൂക്ലിയസ്സിനെ 'അതിസൂക്ഷ്മ'മെന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? കേന്ദ്രത്തിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ്സ് അതിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും. ന്യൂക്ലിയസ്സിനു ചുറ്റുമുള്ള അനേകം ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ. ഇതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ചിത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂര്യനും സൂര്യനുചുറ്റും പ്രത്യേക ഭ്രമണമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുമടങ്ങിയ സൗരയൂഥത്തോടാണ് പ്രൊഫസർ നീൽസ് ബോർ ആറ്റത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും കുറുമാറതല്ല ഈ താരതമ്യപ്പെടുത്തലെങ്കിലും ആറ്റത്തിന്റെ പൊതുചിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതു കൊള്ളാം. ഫൈസുജൻ മുതൽ ഡ്യൂബ്നിയം വരെയുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും

ഈ പൊതുഘടന ഈ പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് അവയിലെ ലാമുള്ള ഘടകങ്ങളും ഒന്നുതന്നെ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ മുതലായ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് ആറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് മൂലകങ്ങളും. മൂലകങ്ങൾ ചേർന്ന് അനുപാതത്തിൽ യോജിച്ചാണ് യുഗികൾക്കും രൂപം കൊള്ളുക. ഇത്തരം യുഗികളുണ്ടാണപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും.

എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഏകദേശം അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവതമ്മിലുള്ള പലതരം വൈജാത്യങ്ങൾക്കു നിദാനമെന്തു്? ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ ഞെക്കളുടെ — അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുടേയും — എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒരാറ്റത്തെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾവഴി ഇതു വ്യക്തമാക്കാം. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ. ഏറ്റവും ലളിതമായ ഘടനയുള്ളതും ഹൈഡ്രജനാണ്. ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനെ ചുറ്റി ഭ്രമണ പഥത്തിൽ കൂടി കറങ്ങുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ്. ഇത്രയുമാവാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമായി. ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല. ഹൈഡ്രജനെക്കാൾ അപ്പു ഭാരാകൂടിയ മൂലകമാണ് ഹീലിയം. ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ രണ്ടു പ്രോട്ടോണുകളും, അതനുസരിച്ച് ഭ്രമണപഥത്തിൽ രണ്ടു ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടു്. പ്രോട്ടോണുകൾക്കു പുറമേ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ രണ്ടു ന്യൂട്രോണുകൾ കൂടി അടങ്ങിയ രിക്കുന്നു.


ഹീലിയത്തെക്കാൾ അപ്പു കൂടി ഭാരമുള്ള ലിത്തിയം ആറ്റത്തെന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ മൂന്നു പ്രോട്ടോണും നാലു ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടു്. ഇവയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു് രണ്ടു ഭ്രമണ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി മൂന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലും മൂന്നാമത്തേതു് രണ്ടാമത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലുമാണുള്ളതു്. ഒരു കാർബൺ ആറ്റം

ത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ആറു പ്രോട്ടോൺ ആറു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനു തുല്യമായ ഇലക്ട്രോൺ കൾ ഭ്രമണപഥത്തിലുണ്ട്. നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ കളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ്. സോഡിയം ആറ്റത്തിൽ പതിനൊന്നും ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൽ പതിനേഴും വിതം പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട്. (ചിത്രം 3 A, B, C നോക്കുക)

കാർബൺ ആറ്റവും നൈട്രജൻ ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ രണ്ടു മൂലകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനം. ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമോ അവയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അഥവാ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് കാർബൺ ആറ്റവും നൈട്രജൻ ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഒന്നിനെ കാർബണാക്കുന്നതും മറ്റൊന്നിനെ നൈട്രജനാക്കുന്നതും. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ആറ്റത്തിൽ 79 പ്രോട്ടോൺ ചുറ്റിയത്തിന്റെ തീൽ 82 പ്രോട്ടോൺമാണുള്ളത്. വല്ല വിധത്തിലും കരുത്തിയത്തിന്റെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നു പ്രോട്ടോണുകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുവന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാരണം കരുത്തിയം സ്വർണ്ണമായി മാറുന്നത്.

ഒരാറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ സംഖ്യയെ അതിന്റെ ആറ്റോമിക സാഖ്യ എന്നു പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക സാഖ്യ ഒന്നും യൂറേനിയത്തിന്റേതു് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടുമാണ്. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക ഭാരം അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിലുടങ്ങുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ന്യൂട്രോണുകളുടേയും ആകെ തുകയാണ്. അതായത് കാർബണിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ ആറു പ്രോട്ടോൺ ആറു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ആറ്റോമികഭാരം 12. ന്യൂക്ലിയസ്സിൽ 17 പ്രോട്ടോൺ 18 ന്യൂട്രോണുള്ള ക്ലോറിന്റെ ആറ്റോമിക ഭാരം 35 ആണ്. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന 92 മൂലകങ്ങളുടേയും ആറ്റോ





മിക സഖ്യം, അറോമിക ഭാരം, പ്രതീകം എന്നിവ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.



ചിത്രം 3 A

പലതരം ആറ്റങ്ങൾ

A ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം B ഹീലിയം ആറ്റം C ലിത്വിയം ആറ്റം



ചിത്രം 3 B

ചിത്രം 3 C



അറോമിക സംഖ്യ	മൂലകം	പ്രതീകം	അറോമിക ഭാരം
1	ഹൈഡ്രജൻ	H	1.00797
2	ഹീലിയം	He	4.0026
3	ലിതിയം	Li	6.939
4	ബെരിലിയം	Be	9.0122
5	ബോറോൺ	B	10.811
6	കാർബൺ	C	12.0115
7	നൈട്രജൻ	N	14.0067
8	ഓക്സിജൻ	O	15.9994
9	ഫ്ലൂറിൻ	F	18.9984
10	നിയോൺ	Ne	20.183
11	സോഡിയം	Na	22.9898
12	മഗ്നീഷ്യം	Mg	24.312
13	അലൂമിനിയം	Al	26.9815
14	സിലിക്കോൺ	Si	28.086
15	ഫോസ്ഫറസ്	P	30.9738
16	ഗന്ധകം	S	32.064
17	ക്ലോറിൻ	Cl	35.453
18	ആർഗോൺ	Ar	39.948
19	പൊട്ടാസ്യം	K	39.102
20	കാത്സ്യം	Ca	40.08
21	സ്കാൻഡിയം	Sc	44.956
22	ടൈറ്റാനിയം	Ti	47.90
23	വാനേഡിയം	V	50.942
24	ക്രോമിയം	Cr	51.996
25	മാംഗനീസ്	Mn	54.938
26	ഇരുമ്പ്	Fe	55.847

അറോമിക സംഖ്യ	മൂലകം	പ്രതീകം	അറോമിക ഭാരം
27	കൊബാൾട്ട്	Co	58.9332
28	നിക്കൽ	Ni	58.71
29	ചെമ്പ്	Cu	63.54
30	നാകം	Zn	65.37
31	ഗാലിയം	Ga	69.72
32	ജർമേനിയം	Ge	72.59
33	ആർസെനികം	As	74.9216
34	സെലീനിയം	Se	78.96
35	ബ്രോമിൻ	Br	79.909
36	ക്രിപ്റ്റോൺ	Kr	83.80
37	റൂബീഡിയം	Rb	85.47
38	സ്ട്രോന്ത്യം	Sr	87.62
39	ഇട്രിയം	Y	88.905
40	സീർക്കോണിയം	Zr	91.22
41	നിയോബിയം	Nb	92.906
42	മോളിബ്ഡിനം	Mo	95.94
43	ടെക്നീഷ്യം	Te	99.00
44	റൂഥേനിയം	Ru	101.07
45	റോഡിയം	Rh	102.905
46	പാലേഡിയം	Pd	106.4
47	വെള്ളി	Ag	107.870
48	കാഡ്മിയം	Cd	112.40
49	ഇൻഡിയം	In	114.82
50	വെളുത്തീയം	Sn	118.69
51	ആന്റിമണി	Sb	121.75
52	റെൻഡ്രിയം	Te	127.60
53	അയഡിൻ	I	126.9044
54	സീനോൺ	Xe	131.30

അറോമിക് സംഖ്യ	മൂലകം	പ്രതീകം	അറോമിക് ഭാരം
55	സീസിയം	Cs	132.905
56	ബേറിയം	Ba	137.34
57	ലാന്താനം	La	138.91
58	സീറിയം	Ce	140.12
59	പ്രോസോഡീമിയം	Pr	140.907
60	നിയോഡീമിയം	Nd	144.24
61	പ്രൊമീത്തിയം	Pm	145
62	സ്മേറിയം	Sm	150.35
63	യൂറോപ്യം	Eu	151.96
64	ഗഡോലിനിയം	Gd	157.25
65	ടെർബിയം	Tb	158.924
66	ഡിസ്മോസിയം	Dy	162.50
67	ഹോൾമിയം	Ho	164.93
68	എർബിയം	Er	167.26
69	തുമിയം	Tm	168.934
70	ഇർബിയം	Yb	173.04
71	ലൂത്സീജ്യം	Lu	174.97
72	ഹാഫ്നിയം	Hf	178.49
73	ടാൻറലം	Ta	180.948
74	ടങ്സ്റ്റൺ	W	183.85
75	റിനിയം	Re	186.2
76	ഓസ്മിയം	Os	190.2
77	ഇറിഡിയം	Ir	192.2
78	പ്ലാറ്റിനം	Pt	195.09
79	സെർക്കോം	Au	196.967
80	മെർക്കുറി	Hg	200.59
81	താലിയം	Tl	204.37

അറോമിക സംഖ്യ	മൂലകം	പ്രതീകം	അറോമിക ഭാരം
82	കുറുത്തീയം	Pb	207.19
83	ബിസ്മത്	Bi	208.98
84	പൊളോനിയം	Po	209
85	ആസ്റ്ററൈൻ	At	211
86	റേഡോൺ	Rn	222
87	ഫ്രാൻസ്യം	Fr	223
88	റേഡിയം	Ra	226
89	ആക്ടിനിയം	Ac	227
90	തോറിയം	Th	232.038
91	പ്രൊട്ടോക്റ്റിനിയം	Pa	231
92	യുറേനിയം	U	238.03

അദ്ധ്യായം മൂന്നു്



വായു, ഓക്സിജൻ, ഓക്സൈഡുകൾ

അവലോകനം:

ജീവന്റെ നിലനില്പിന്നും ഓക്സിജന്റെ ജലനത്തിന്നും നിദാനമായ, വായുവിന്റെ ഒരു ഘടകമായ ഓക്സിജനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വാതകത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു രസതന്ത്രവിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സീകരണപരമായ തീവ്രതയുള്ള തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു് ഒരു കാരണാ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പഠനം കൊണ്ടു് കഴിയാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഓക്സിജന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വാതകം എങ്ങനെയാവാൻ സാധിച്ചു വയ്ക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്ലാസനത്തിന്നും ജലനത്തിന്നും ഉപയുക്തമായ ഓക്സിജൻ വായുവിന്റെ ഏകദേശം ഭാഗം മാത്രമാണെന്നു് അവർ ഗ്രഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശ്ലാസനത്തിന്നു് സഹായകമായ ഈ ഘടകത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാതെ വായു മലിനമാകുന്നുണ്ടെന്നും അതു് എപ്രകാരമാണെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ വെച്ചേററവും കൂടിയ അളവിലുള്ളതു് ഓക്സിജനാണു്. വായുവിൽ ഇതു് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളായി കാണപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ പുറത്താടിലുള്ള മറ്റു മൂലകങ്ങളോടു് സംയോജിച്ച അവസ്ഥയിലും ഓക്സിജൻ കാണപ്പെടുന്നു. വായുവിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വായു മലിനമാകുന്നതു്

ഏകദേശം വിധത്തിൽ നമുക്കു കണ്ടുമാക്കെ നിയന്ത്രണക്കാരൻ സാധിക്കുമെന്നു നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുന്നവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അപഗ്രഥനം

a സാങ്കേതികപദങ്ങൾ:—

ഓക്സീകരണം, ഓക്സീകാരകം, ജ്വലനം, ഓക്സൈഡ്, ഉൽപ്പ്രേരകം, ഉൽപ്പ്രേരണം

b ധാരണകൾ

i) ഓക്സീജൻ പല മൂലകങ്ങളുമായും രേഖിച്ച് സായോജിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് - സമത്വമുഖകമാണ്.

ii) പദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള ഓക്സീജന്റെ സായോജന ക്രിയയാണ് ഓക്സീകരണം.

iii) വേഗതയിലുള്ള ഓക്സീകരണമാണ് ജ്വലനം

iv) ശ്വാസനം. തുടങ്ങിയവ എന്തിനാണു നടത്തുന്നതെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു.

v) ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡുകൾക്കു വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമാണുള്ളത്

vi) ചായ ഒരു മിശ്രിതമാണ്

vii) ഓക്സീജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങളിൽ ചൂടാക്കിയാൽ ഓക്സീജൻ കിട്ടുന്നു

viii) രാസികമായി സ്വയം തീർത്താൽ മാത്രമേ വിശദമായ യഥാർത്ഥ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു രാസക്രിയകളുടെ വേഗം വ്യത്യസ്ത വരുത്താൻ കഴിയുന്നു.

ix) രാസക്രിയകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മോഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു

x) ജപലനം, ത്ത സഹായിക്കുന്നതും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഘടകങ്ങൾ വായുവിനുണ്ട്.

ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ —

ഗ്രഹണം

i) വായുചിലു ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ജപലനം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ii) ലോഹഓക്സൈഡുകളേയും അലോഹഓക്സൈഡുകളേയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

iii) ഓക്സീകരണക്രിയ എന്ന നിലയിൽ ശ്വാസനം, തരവിപ്പിക്കൽ എന്നിവയും ജപലനം തന്നെയാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയകളിൽ അത്യധികമായ താപം ചർമ്മത്തിൽ തീർക്കാനുള്ള കാരണ വിശദമാക്കാനും കഴിയുന്നു.

iv) ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ വേർപെടുത്തിയെടുക്കാനെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നു.

v) ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വയം രാസികമായ മാറ്റത്തിനു വിധേയമാകാതെ രാസക്രിയകളുടെ ചെറുതയുടെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്നു വിശദമാക്കുന്നു.

vi) മിശ്രിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കുറിച്ചു് ഉള്ള മുന്നറിവു പ്രയോഗിച്ചു് വായു ഒരു മിശ്രിതമാണെന്നു അനുമാനിക്കുന്നു.

പ്രയോഗം:

i) അവിചാരിതമായുണ്ടാകാവുന്ന അപീടിതങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കു കഴിയുന്നു.

ii) ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുറികളുടെ ജനപ്രകാരം, അതിലുകൾ എന്നിവ തുറന്നു വെക്കുവാൻ അവർ മുതിരുന്നു.

iii) ഇരുമ്പു സാധനങ്ങൾ; മണ്ണു വാസ ലേരിൻ എന്നിവ പുരട്ടിയൊ പെയിൻറടിച്ചോ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

iv) ഗൃഹം, പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയവയുടെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

നൈപുണ്യം:

i) ഉപകരണങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി അവ രേഖപ്പെടുത്താനും നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു.

ii) പരീക്ഷണശാലയിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്കു പകരം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നിഷ്പ്രയാസം സ്വയംഭരിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളുപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും അവ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാനും നൈപുണ്യം നേടുന്നു.

iii) ഉപകരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു.

അവശ്യ ഉപകരണങ്ങളും രാസപദാർത്ഥങ്ങളും

ഉപകരണങ്ങൾ:

ജലലതകരണികൾ 4 വീതം, ടേബിൾ, കോക്ക്, പോഴ്സ്ലയിൻ ഡിഷ് (പിത്താണം) ഫണൽ, അരിപ്പുകടലാസ്സ്, വാച്ചഗ്ലാസ്സ്, സ്പിരിറ്റുലാമ്പ്, പരീക്ഷണ നാളികൾ ഇറയ്ക്കു ചേരുന്ന ഒറ്റ ലോരമുള്ള കോക്ക്, നിർഗ്ഗമനക്കുഴലുകൾ, വാതക സമ്മേദി ഉണ്ടാക്കാൻ പററിയ വലിയ സ്ഫടിക ഭരണി, ഇരുമ്പ് കമ്പി ഇരുട്ടലോരമുള്ള കോക്ക്, നിണ്ട സ്ഫടിക കുഴൽ റബ്ബർ കുഴൽ, ക്ലിപ്പ്, ക്രൂസിബ്, ഫേം, നീളമുള്ള പമ്പി.

രാസപദാർത്ഥം —

കരിക്കട്ട തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം, ഗന്ധകം, ചുവന്ന ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം കമ്പി, തലനാരിഴവണ്ണമുള്ള ഉരുക്കു കമ്പി, ലിറാമസ്സ് ലായിനി, നീറുകക്കു, കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്, അയോൺ ഓക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ്, മാംഗനീസ് ഡൈഓക്സൈഡ്, മഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ്.

ഓക്സിജന്റെ ഗുണങ്ങൾ

അ പരമണം:—

ഓക്സിജൻ ജലനത്തിനും ശ്വാസനത്തിനും അത്യാവശ്യമായ വായുവിന്റെ ഒരു ഘടകമാണെന്നുള്ള കട്ടികളാട് മുന്നറിവു പരിശോധിക്കുക.

ഓക്സിജനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ, അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്നുള്ളതല്ല; നേരെമറിച്ച് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വായു കമ്പോളത്തിൽ ഓക്സിജൻ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സൗകര്യമായ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ അവർക്കു കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപകരണങ്ങളും രാസപദാർത്ഥങ്ങളും വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം അദ്ധ്യാപകന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രേതിക ഗുണങ്ങൾ അവർ നിരീക്ഷിച്ച് നോട്ടബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ രാസഗുണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നായി അവർ ചെയ്ത് നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുൻപോലെ രേഖപ്പെടുത്താനായി പൂർപ്പെടണം.

പരീക്ഷണം 1-1

ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി സാമാന്യം വലിയ പരീക്ഷണനാളികൾ കുട്ടികൾക്കു കൊടുക്കണം കാർബൺ, ഗന്ധകം, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക.

പരീക്ഷണശാലയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ജലവനക്കരണ്ടികൾ പകരം ഏകദേശം 1 സെ.മീ വീതിയിലും 20 സെ.മീ. നീളത്തിലും തകരക്കുഴലുണ്ടാകുന്ന മുറിപ്പെടുത്തു് അഗ്രങ്ങൾ വളച്ചെടുത്തു് ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ തകരക്കുഴലുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വളച്ച ഒരുഗ്രഭാഗത്തു് മൂടാക്കേണ്ട പദാർത്ഥം വെച്ചു് മറ്റേ അറ്റത്തു പിടിച്ച് മൂടാക്കാം. ഓരോ പദാർത്ഥം മൂടാക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഭാഗത്തിലുള്ള ഇത്തരം ജലവനക്കരണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണം.

ഓരോ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും വായുവിലും ഓക്സിജനിലുമുള്ള ജലവനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കുട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

മുട്ടപഴുപ്പിച്ച, തലനാരിഴവണ്ണമുള്ള ഉരുക്കുകമ്പിയും ഓക്സിജനുമായുള്ള പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു വാതകജാരിലോ, ജാം ജാരിലോ ഓക്സിജൻ നിറച്ചു് ഈ പരീക്ഷണം അദ്ധ്യാപകൻ കുട്ടികളുടെ ധ്വനികളാൽ തോർക്കു ചെയ്യാൻ മതിയാകും. ജാരിന്റെ അടിയിൽ കുറെ മണൽ വിരിക്കാൻ മറക്കരുതു്.

പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പേരുൾ കുട്ടികൾക്കു നിശ്ചയമില്ലായിരിക്കും. അവ പറഞ്ഞു കേൾക്കുക. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും താപം പ്രകാശം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തെയും സമീകരണ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി, ഓക്സിജൻ മറ്റു ഹല
മൂലകങ്ങളുമായും നേരിട്ടു സംയോജിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ക്രിയ
ശീലമൂലകമാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ കൂട്ടികൾ എത്തിച്ചേർന്നു.

വായുവിൽ സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ കത്താത്ത
ഇരുമ്പുപോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾപോലും ഓക്സിജനാൽ
ജ്വലിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ.
ഓക്സിജൻ ഒരു ജ്വലനസഹായികമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.

മൂലധൂനിർണ്ണയവും വിപുലീകരണവും

ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും
കൂട്ടികൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ധാരണകൾ അവരിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടു
ണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാനുപകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകൻ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂട്ടികൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതു്

ഒരു ചെറിയ കഷണം മെഗ്നീഷ്യം കമ്പ് കത്തിച്ചു് ഓക്സിജൻ നിറച്ച ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ ഇറക്കി ജ്വാലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. കത്തിക്കഴിഞ്ഞു് ശേഷിക്കുന്ന ഉല്പന്നം പരിശോധിക്കുക. ഉല്പന്നത്തെങ്ങനെ അനുമാനിച്ചു് രാസസമീകരണം വഴി പ്രവർത്തനം നോട്ടുചെയ്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഓക്സീകരണം

അവതരണം

പദാർത്ഥങ്ങൾ വായുവിലെ ഓക്സിജനിലോ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തഗുണങ്ങളുള്ള ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലം ജ്വലനം ഒരു രാസക്രിയയാണെന്ന് കൂട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. രാസക്രിയയുടെ ഫലമായി

ഉള്ള പലപ്പോഴും തപം, പ്രകാശം എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്നും കട്ടികൾക്കറിയാം.

ഓക്സിജനമായുള്ള സ യോജന ക്രിയയാണ് ഓക്സീകരണം എന്നു കട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കണം അദ്ധ്യാപകൻ ഈ ഭാഗത്തു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്. ഓക്സീകരണം എന്ന രാസക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാപവും പ്രകാശവുമാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു് ചൂടും പ്രകാശവും തരാൻ കാരണമെന്നു കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൈ പൊള്ളിക്കത്തക്ക ചൂടാണു് ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക. മുൻപാർത്തിൽ നിന്നു് പററിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ കട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇത്തരം മന്ദഗതിയിലുള്ള ഓക്സീകരണത്തിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മന്ദഗതിയിലുള്ള ഓക്സീകരണത്തേയും വേഗത്തിലുള്ള ഓക്സീകരണത്തേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ജ്വലനം ഗ്രീശ്രഗതിയിലുള്ള ഓക്സീകരണവും, ഗ്ലാസനാ, തുരുമ്പിക്കൽ മുതലായവ സാവധാനത്തിലുള്ള ഓക്സീകരണവുമാണെന്നു് കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഓക്സീകരണത്തിനു് കാരണമായ ഓക്സിജനേയോ ഓക്സിജൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളേയോ ഓക്സീകാരകം എന്നു വിളിക്കാമെന്നു് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക.

മൂല്യനിർണ്ണയവും വിപുലീകരണവും.—

കട്ടികൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:—

i) നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു്, ഓക്സിജന്റെ ചില പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.

ii) മഗ്നീഷ്യം കമ്പി ചൂടാക്കി കത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപു് അതിന്റെ ഉപരിതലം മണൽക്കടലാസുപയോഗിച്ചു് തേച്ചു മിനുക്കുന്നതിനു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക.

ഓക്സൈഡുകൾ

അവതരണം:—

പദാർത്ഥങ്ങൾ വായുവിൽ കത്തുമ്പോഴും ചില ലോഹങ്ങൾ വായുസമ്പർക്കത്തിൽ ശക്തിയായി ചൂടാക്കുമ്പോഴും, ഇരുമ്പിനെ പോലെ ചില ലോഹങ്ങൾ വായുസമ്പർക്കത്തിൽ വെറുതെ വെച്ചിരുന്നാലും അവയെല്ലാം ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നെന്നു കട്ടികൾക്കറിയാം. യന്ത്രികങ്ങളിലും ചിലതു കത്തുമ്പോൾ അവയുടെ ഘടകമൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകളുടെ രൂപീകരണമുണ്ടാകുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ഓക്സജൻ സായോജിക്കുന്ന രാസക്രിയയാണ് ഓക്സീകരണം എന്നും കട്ടികൾക്കറിയാമല്ലോ.

ഓക്സൈഡുകളുടെ പേരുകൾ അവയുടെ ഘടകമൂലകങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൂട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ചില മൂലകങ്ങൾ ഓക്സിജനുമായി സായോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഓക്സൈഡുകളുടെ പേരുകൾ പറയാൻ കട്ടികൾ ശ്രമിക്കട്ടെ. ഉദാ.— മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, സോഡിയം ഓക്സൈഡ് മുതലായവ. തെരുകൾ വരുന്നതിൽ അത് അപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റു കട്ടികളുടെ സഹായത്താൽ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ, പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഓക്സൈഡുകളുടെ പേരുകളെപ്പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ കട്ടികളെ ധരിപ്പിക്കുക പിന്നീട് എല്ലാ ഓക്സൈഡുകളും ഗുണങ്ങളിൽ ഒരുപാലെയങ്ങോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരീക്ഷണം 3-2 കട്ടികൾ ചെയ്തു ശരിയായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുക.

അലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകൾ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ലായനികളെല്ലാം പൊതു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഈ പരീക്ഷണം കട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രമേ ഈ പരീക്ഷണംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

പരീക്ഷണം 3-3 — ഈ പരീക്ഷണവും അദ്ധ്യാപകന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ചെറുസംഘങ്ങൾ ചെയ്യാൽ മതിയാകും. ചില ലോഹ ഓക്സൈഡുകളുടെ ലായനികൾക്ക് അലോഹ ഓക്സൈഡുകളുടെ ലായനികളുടേതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്ന നിഗമനം മാത്രമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

മുഖ്യനിർണ്ണയവും വിപുലീകരണവും:—

കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

! അലോഹ ഓക്സൈഡുകളുടെ ലായനികളിൽ ലിറ്റ്മസ് ചുവപ്പായി മാറാനുള്ള കാരണമെന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

അലോഹ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു ലായനിയിൽ ലോഹ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു ലായനി അല്പാല്പമായി തമ്മിൽ കലർത്തി, അതിന്റെ ഗുണത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോയെന്ന് ലിറ്റ്മസ് സിന്ററയോ, ഈ യൂണിറ്റിന്റെ അവസാനം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ചായത്തിന്റേയോ സഹായത്താൽ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ.

ഓക്സിജൻ തത്വഗാക്കൽ

അവതരണം:—

ഓക്സിജന്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാം കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയും ഈ വാതകം എങ്ങനെ തത്വഗാക്കി ശേഖരം ചൂടുകമെന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യം കുട്ടികളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്സൈഡുകൾ എന്ന യൗഗികങ്ങളുടെയും, ജലത്തിന്റെയും, വായുവിന്റെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഓക്സിജനാണെന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയാം. വായുവിൽ സ്വതന്ത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്ന് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ

വളരെ സൗകര്യമായും നിഷ്പ്രയാസമായും ഓക്സിജൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ അംശിയിട്ടുള്ള ചില യന്ത്രഗതികളിൽ നിന്നാണ് അതു മനസ്സിലാക്കുക. മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് ചൂടാക്കിയാൽ അതിലുള്ള ഓക്സിജൻ ചേർപെട്ടു കിട്ടുമെന്ന് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സൗകര്യമായി, അതായത് ചൂടാക്കൽകൊണ്ടു മാത്രം തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ അംശിയിട്ടുള്ള ചില യന്ത്രഗതികളിൽ നിന്നാണ് സാധാരണയായി ഓക്സിജൻ തയ്യാറാക്കാറുള്ളതെന്ന് കുട്ടികളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുക.

പരീക്ഷണം 3-5

അദ്ധ്യാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിലും കുട്ടികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെയോ ചെയ്യാൽ മതിയാകും. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതു കുട്ടികൾ പരിശോധിക്കട്ടെ. ജലം നിറച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ പരീക്ഷണനാളികളിൽ ജലത്തെ വിസ്ഥാപനം ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ ശേഖരിച്ചെടുക്കുമെന്നു കുട്ടികളെ കാണിക്കുക. ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി വാതകം തയ്യാറാക്കുന്നത് സൗകര്യമാണെന്ന് കുട്ടികൾക്കു ബോദ്ധ്യമാകും. കൂടാതെ ഓക്സിജന്റെ ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിച്ച ഓക്സിജൻ അവർക്കു കിട്ടിയത് വാതകസംഭരണിയിൽ നിന്നുമാണല്ലോ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ സംഭരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അവരെ കാണിക്കുക. വാതകസംഭരണി ഉണ്ടാക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം ലഭ്യമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഫടിക ഭരണി (സാമാന്യം വലുത്) ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. ഭരണിയിൽ വാതകം നിറയുമ്പോൾ ജലത്തിനടിയിൽ വച്ചുതന്നെ കൈകൊണ്ടു പുറത്തെടുത്തശേഷം നിർഗ്ഗമനക്കഴലും ജലം നിറച്ച ഫണലും കടത്തിയിട്ടുള്ള കോക്കെടുത്ത് പെട്ടെന്നടയ്ക്കണം. അപ്പു ശേഷം ഫണലിനടിയിലുള്ള ക്ലിപ്പ് തുറക്കാം. നിർഗ്ഗമനക്കഴൽ ക്ലിപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ അടച്ചുതന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഭരണിക്കു മേലെന്ന ഇരട്ടലോരമുള്ള ഒരു കോക്കെടുത്ത് ക്ലിപ്പോടുകൂടിയാറഞ്ചർ

ക്കുഴൽ ഖേടിപ്പിച്ച ഒരു നിർദ്ദയനും ലംസാശാസ്ത്രവാദിയായ ഒരു ഫണലിന്റെ വാലിനോട് റബ്ബർക്കുഴൽമൂലം യോജിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നിങ്ങളുടെ സഹകർത്താക്കൾ കടത്തി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഫണലിന്റെ അടിയിലെ ക്ലിപ്പ് മറക്കിയശേഷം അതു നിറയെ ജലവും ഒഴിച്ചിരിക്കണം. ഫണലിനോട് ചേർത്ത സഹകർത്താക്കളുടെ അഗ്രം ഭരണിയുടെ ഏകദേശം അടിക്കട്ടവരെ എത്തിയിരിക്കണം.

പരീക്ഷണം 3-6

ഈ പരീക്ഷണവും അദ്ധ്യാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു കട്ടികളെ കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് മാത്രം ചൂടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ധീരമായ സമയം ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം വളരെ സാധാരണ ഓക്സിജൻ വേർപെടുന്ന കാര്യം കനൽ പരിശോധന കൊണ്ട് കട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കരുതണം. ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ വേർപെട്ടശേഷം പരീക്ഷണനാളിയിൽ ശേഷിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് (KCl) ആണെന്നു പറയുക. പ്രവർത്തനത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് റിൻഡറാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പ്രവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമീകരണവും അവർ നോട്ടബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.

ഉരുക്കിയ അദ്ധ്വാനത്തിലിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ വിയോജനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ അദ്ധ്വാനത്തിൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയ അളവ് മാഗ്നീസിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചേർക്കണം. [കാർബൺ പോലെ ജലന സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മാഗ്നീസിയം ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കലർത്തിയതാൽ സഹോടനസാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തേതന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മാഗ്നീസിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് (MnO₂) അദ്ധ്വാനം ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി അടുത്തുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വേർപെടുത്തി എടുക്കണം.]

പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ വിയോജനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ സൂചനയായി പരീക്ഷണനാളിയിൽ നടക്കുന്ന ശക്തിയായ

പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ ഫലമായി കൊക്സിജൻ ധാരാളമായി പുറത്തു വരുന്നതു കണ്ട് പരംശോധനമൂലം കുട്ടികളെ ബോധ്യമാക്കണം. മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡ് ചേർത്തപ്പോൾ കൊക്സിജൻ കിട്ടിയതു മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡിൽ നിന്നും ആയിരിക്കാമെന്ന് കുട്ടികൾ ന്യായമായി ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ യല്ലസ് ബൈബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പരീക്ഷണനാളിതങ്ങൾ ശ്രദ്ധം അതിൽ കറെ ജലമൊഴുച്ച് നന്നായി കലക്കി അരിക്കുക. അരിപ്പുകടലാസ്സിൽ തങ്ങിനൽക്കുന്ന കറുത്ത പദാർത്ഥം ഉണക്കിയെടുത്ത് കുട്ടികൾ കാണിച്ച് അത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റിനോടു ആദ്യം ചേർത്ത മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡാണെന്നും അതിന്റെ അളവിനോ ഗുണങ്ങൾക്കോ വ്യത്യാസമുണ്ടായട്ടില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. കൂടെ കറെ മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡുമായ ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിൽ ചെറുതായി ചൂടാക്കി (ശക്തിപ്രാപ്തി ചൂടാക്കിയാൽ അതിനു വിരുദ്ധമാണെന്നുണ്ടാകും.) കൊക്സിജൻ അതിൽനിന്നു നിർഗ്ഗമിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണിക്കണം.

മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡിനു യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റിൽ നിന്നുതന്നെയാണെന്നും മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റിന്റെ വിരുദ്ധമാണെന്നു കൂട്ടുകയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവനും കുട്ടികൾ ന്യായമായും ഉൾക്കൊള്ളും. മാഗ്നീസ്യം ഡൈകാക്സൈഡിനെപ്പോലെ വർത്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്രേരകങ്ങളെന്നും ഉൽപ്രേരകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉൽപ്രേണാ എന്നും പരാമർശം അവരോടു പറയുക. ഉൽപ്രേരകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

മൂല്യനിർണ്ണയവും വിപുലീകരണവും

കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

1. ചൂടാക്കിയാൽ കൊക്സിജൻ വിട്ടുതന്നു വേറെകറെ പദാ

ത്മങ്ങളുടെ പേരുകൾ കട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നോട്ടുബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം സമീകരണരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും അവർ ശ്രമിക്കട്ടെ.

2 ഉൽപ്പ്രേരകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കട്ടെ.

3 കട്ടികളുടെ ഗുഹങ്ങളിൽ നിന്നോ അവയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ ശേഖരിക്കാവുന്ന കപ്പി, കോഷ്, മുളക്കുഴലുകൾ, മണ്ണെണ്ണ, ചോർപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വാതകസാദരണികളുണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കട്ടെ.

4 പൊട്ടാസ്യ ക്ലോറൈഡ് മാഗ്നീസിയം ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം പരീക്ഷണനാളിയിൽ ശേഷിപ്പുതൂ, ജലം ഒഴിച്ചു കലക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ചതുമായ പദാർത്ഥം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിൽനിന്നും വിഭിന്നമായെന്നാണെന്നു തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുക.

ഓക്സിജൻ—ഉപയോഗങ്ങൾ

അവതരണം:—

ഓക്സിജനെക്കുറിച്ച് മുൻപാങ്ങളിൽ കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയ സാഗതികൾ ചോദ്യങ്ങൾമൂലം അവരെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുക. ജീവന്റെ നിലനില്പിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ പറയട്ടെ. ശ്വാസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണെന്നും സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ശ്വാസനം കൂടാതെ കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർ പറയും. പെട്ടെന്നുള്ള ഓക്സീകരണമാണ് ജ്വലനമെന്ന് കട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജ്വലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന താപവും പ്രകാശവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് അവർ ആലോചിക്കട്ടെ. ഓക്സീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന താപത്തെ ലോഹങ്ങളുടെ അയിര

കളിൽ നിന്ന് ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഉൾജ്ജമായും വിളക്കു കത്തിക്കാനും മറ്റുമുള്ള വൈദ്യുതിയായാ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ചചെയ്യുക. ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ഓക്സിജൻസെറിലിൻ ബർണറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. അവശതയിലെത്തിയ ചില രോഗികൾക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനായും വളരെ ഉയരത്തിൽ പോകുന്ന വൈമനികനാടും പർവ്വതാരോഹകൾക്കും ബാഹ്യാകാശസഞ്ചാരികൾക്കും ശ്വാസനത്തിനായി ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നും വിശദീകരിക്കണം.

ജലനത്തിനും, ജീവജാലങ്ങളുടെയെല്ലാം ശ്വാസനത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടത്തക്കവണ്ണം സ്വതന്ത്രമായി, മറ്റു വാതകങ്ങളുമായി കലർന്ന് വായുവിന്റെ ഏകദേശം 21 ശതമാനം ഓക്സിജൻ കാണാറുണ്ട്. ജലജന്തുക്കൾ ശ്വാസനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, അതു ജലത്തിൽ ചയ്ച്ച വായുവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അവർ ആലോചിച്ചു പറയാൻ പ്രേരണ നൽകണം.

സ്വതന്ത്രമായി ഇപ്രകാരമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതു കൂടാതെ പാറ, മണൽ, ധാതുക്കൾ, ജലം എന്നീ ധർമ്മഗുണങ്ങളുടെ ഘടകമായും ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി അവരെ മനസ്സിലാക്കുക. സസ്യജന്തു അവാശിഷ്ടങ്ങൾ ചീയുന്നതിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്ന പക്ഷിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചചെയ്യുക. ഈ പ്രക്രിയ സസ്യങ്ങൾക്ക് എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു? ഇക്കാരണമുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി ഭൂമിയുടെ പുറത്തോടിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഏറിയ ഭാഗവും ഓക്സിജനാണെന്ന് (സ്വതന്ത്രമായോ, ധർമ്മഗുണങ്ങളുടെ ഘടകമായോ) കുട്ടികൾ ധരിക്കാനിടയാകുന്നു. ജീവജാലങ്ങളുടെ (സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും) ശരീരഘടനയിലും വലിയ ഒരു ഘടകം ഓക്സിജനാണെന്നു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക.

മൂല്യനിർണ്ണയവും വിപുലീകരണവും

കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കണ്ടതു്:-

1 വലിയ വിറകു കഷണങ്ങൾ അടുപ്പിൽ തിങ്ങിയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വെച്ചു തീക്കത്തിച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ കത്തുമോ എന്നു പരീശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനു കാരണമെന്താണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു വിശദമാക്കുക.

2 ഒരു സ്വീരിട്ട് ലാമ്പിന്റെയൊ മെഴുകുതിരി ജ്വാലയുടേയൊ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തിനു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടു കാണുന്നതിനു കാരണാ എന്തെന്നു നിർണ്ണയിക്കുക.

3 മോട്ടോർകാർ, തീവണ്ടി എന്നിവയുടെ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഓക്സിജൻ എന്തു പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്നു് വിശദമാക്കുക.

വായുവിന്റെ സംഘടന—മാലിന്യങ്ങൾ

അവതരണം:-

ജലനത്തിനും ശ്വാസനത്തിനും മറ്റും സഹായകമായ ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകം അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണെന്നും, പദാർത്ഥങ്ങൾ വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ ഈ ഘടകം പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുട്ടികൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ ഘടകം വായുവിന്റെ എത്ര ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് അറിവില്ലാത്തതിനാൽ അതു മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കു താല്പര്യമുണ്ടാകും. ഈ സമയം പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണം 3-7 ചെയ്തു കാണിക്കാൻ പററിയതാണ്.

ബൽജാറിനു പകരം മൂട്ടു പൊട്ടിച്ച സാമാന്യം വലിയ ഒരു കുപ്പി ഉപയോഗിക്കാം. ഫെിച്ചുള്ള ജലത്തിൽ കുപ്പി നിർത്തിയ ശേഷം അതു് അടയ്ക്കുക. കുപ്പിയിൽ ജലചിതാനത്തിനു മുകളിൽ എന്താണുള്ളതെന്നു കുട്ടികൾ പറയട്ടെ. ജലചിതാനത്തിനു

മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ പദഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് കപ്പിയുടെ പുറത്തു് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഫോസ്ഫറസ് ജലവിച്ച് കറേക്കുഴിഞ്ഞു് അണയുന്നു. കറേ ഫോസ്ഫറസ് കത്താതെ ശേഷിക്കത്തക്കവിധം ചെറിയ ഒരു കഷണം ഫോസ്ഫറസ് ഈ പരീക്ഷണത്തിനുപയോഗിക്കണം. ബൽജാറിലെ പുക ജലത്തിൽ ലയിച്ചു് ജലവിതാനം ഉയരാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നു് കുട്ടികൾ പറയട്ടെ. പരീക്ഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബൽജാറിലുണ്ടായിരുന്ന വായുവിന്റെ $\frac{1}{5}$ ഭാഗം, ഫോസ്ഫറസ് കത്താനുപയോഗിച്ചുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ട്രഫിൽ ജലമൊഴിച്ചു് ബൽജാറിനകത്തെയും പുറത്തെയും ജലനിരപ്പുകൾ തുല്യമാക്കിയ ശേഷമേ പത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൗർക്കിൽ ബൽജാറിൽ ഇറക്കാവൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടമേനിന്നു വായു ബൽജാറിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിലെ ജലനിരപ്പു താഴുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ജലലിക്കുന്ന ഇൗർക്കിൽ ബൽജാറിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നു ചട്ടികൾ നിരീക്ഷിക്കട്ടെ. നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു കുട്ടികളുടെ അനുഭവമെന്തെന്നു് മനസ്സിലാക്കുക.

കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമായ ഓക്സിജൻ വായുവിൽ $\frac{1}{5}$ ഭാഗമാണെന്നു ശേഷിക്കുന്നു. $\frac{4}{5}$ ഭാഗം കത്താൻ സഹായിക്കാത്ത ഒരു ഘടകമാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കൂ. പദാർത്ഥങ്ങളുമായി എളുപ്പം സംയോജിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓക്സിജൻ വായുവിന്റെ ക്രിയാശീലഘടകമെന്നു, മറ്റുള്ളവസ്തുക്കളുമായി വലിയ പ്രവർത്തനമൊന്നാറില്ലാത്ത, ശേഷിക്കുന്ന $\frac{4}{5}$ ഭാഗം നിഷ്ക്രിയഘടകം എന്നും, നിഷ്ക്രിയഘടകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പകുതി നൈട്രജൻ എന്നു വാതകമാണെന്നു കുട്ടികളോടു പറയുക. ഈ രണ്ടു വാതകങ്ങളും കൂടാതെ ചെറിയ അളവിൽ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡും നിരാവിധം വായുവിൽ ഉണ്ടെന്നു് കുട്ടികൾ താഴത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽയാതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായി ഒരുപ്രവർത്തനവും നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത ആർഗോൺ, നിയോൺ, ഹീലിയം മുതലായ കറു വാതകങ്ങളും വളരെ ചെറിയ തോതിൽ അത്ത

രക്ഷയായുവിലുണ്ടെന്നും അവ അപൂർവ്വ വാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവയിൽ ആർഗോൺ വൈദ്യുതബാഷ്പകൂട്ടിൽ നിറയ്ക്കാനും, നിയോൺ ചുവന്ന പ്രകാശം തന്നെ വൈദ്യുതബാഷ്പകൾ നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

വായുവിൽ പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ടെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയും വായു ഒരു മിശ്രിതമാണെന്നു യുഗികമാണെന്നു് അവർ ചിന്തിക്കട്ടെ. മിശ്രിതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തല്ലാമെന്നു അവർക്കു് അറിയാമല്ലോ. ഈ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചന്തിക്കുമ്പോൾ വായു ഒരു മിശ്രിതമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനു അവർക്കു പ്രയാസമുണ്ടാകുകയില്ല. വായുവിൽ പ്രത്യേക ഉള്ള വാതകങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റു വല്ലതും കാണപ്പെടാറുണ്ടോ എന്നു കുട്ടികളോടു ആരായുക.

പൊടി, രോഗാണുക്കൾ, സസ്യങ്ങളുടേയും ജന്തുക്കളുടേയും മറ്റും അംശങ്ങൾ കൂടും ചീത്തയുടേതെന്നു മുലമുണ്ടാകുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധമുള്ള വാതകങ്ങൾ എന്നിവയും ചിലപ്പോൾ കാണപ്പെടാറുണ്ടെന്നു അവർ പറയാനിടയുണ്ടു്. ഇങ്ങനെയുള്ള വായു ശ്വാസനയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വായു മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുട്ടികൾക്കു ബോദ്ധ്യമാകുന്നു. വായു മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചർച്ചകൾ മൂലം കുട്ടികൾ നിർദ്ദേശിക്കട്ടെ.

മൂല്യനിർണ്ണയ വിപുലീകരണവും

i) ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ശീശിച്ചപാനീയമൊഴിച്ചപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന്റെ പുറം മങ്ങിക്കണ്ടു്. കാരണ വിശദമാക്കുക. എന്താണു് ഇതിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതു്?

ii) പല പലങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനിൽ കത്തുന്നതു പോലെ ശോഭയോടെ വായുവിൽ കത്താത്തതിനു കാരണമെന്തായിരിക്കും?

iii) ശ്വസനം മൂലവും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വായുവിൽ കലരാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ വായുവിലുള്ള ശതമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കാത്ത തെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം?

iv) തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളവുമായി യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു വാതകം ഒരു മെഴുകുതിരിജ്വാലയെ പെട്ടെന്ന് അണയ്ക്കാനിടയാക്കി. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതായിരിക്കണം ആ വാതകം?

- a) വായു
- b) നൈട്രജൻ
- c) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
- d) ഓക്സിജൻ

പശ്ചാത്തല വിജ്ഞാനം

ചോദ്യ: —

താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ വായു ഒരു മിശ്രിതമാണ് യുഗികമല്ല എന്നു തീരുമാനിക്കാം.

i) വായുവിലെ നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, (മറ്റു വാതകങ്ങൾ) എന്നിവയെ ഭൗതിക മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ച് പാസ്തരും വേർപെടുത്താം. ഉദാഹരണമായി:—

a) വായുവിനെ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷം ദ്രാവക വായുവിന്റെ അംശിക സ്പന്ദനം മൂലം, ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എന്നീ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാം.

b) വായു ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജലത്തെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാതകത്തിൽ വായുവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മേപ്പറഞ്ഞ രണ്ടുദാഹാരങ്ങളിലും ഭൗതിക മാർഗ്ഗങ്ങളെ പയോഗിച്ച് ഭൗതികമായി നൈട്രജനേയും ഓക്സിജനേയും വേർതിരിക്കുന്നു. വായു ഒരു യൗഗികമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതു സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.

ii) വായു അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നൈട്രജനേയും ഓക്സിജനേയും ഗുണങ്ങളുടെ മദ്ധ്യ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഉദാ:— വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത (14.4), നൈട്രജനേയും (14) ഓക്സിജനേയും (16) സാന്ദ്രതകൾക്കിടയ്ക്കാണ്.

ഓക്സിജൻ വളരെ നല്ല ഒരു ജ്വലന സഹായിയാണ്. നൈട്രജൻ ജ്വലന സഹായിയേ അല്ല. അതേ സമയം വായു മിതമായി ജ്വലനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

iii) നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ മറ്റു വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വായുവിലുള്ള അനുപാതം എല്ലായിടത്തും സ്ഥിരമല്ല. എന്നാൽ യൗഗികങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്ഥിരമായ അനുപാതമുണ്ട്.

iv) നൈട്രജനും ഓക്സിജനും (ചെറിയ അളവിൽ മറ്റു വാതകങ്ങളും) തമ്മിൽ കലർത്തി വായു നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ താപമോ പ്രകാശമോ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമോ നിർഗ്ഗമിക്കുകയോ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു യൗഗികമുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഊർജ്ജം നിർഗ്ഗമിക്കുകയോ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു.

വായുവിലെ ഘടകങ്ങളുടെ ശതമാനക്കണക്കിലുള്ള അളവ്:—

നൈട്രജൻ 78%

ഓക്സിജൻ 21%

കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് 0.4%

അപൂർവ്വവാതകങ്ങൾ 0.96%

കുറിപ്പ്:—

മേൽക്കണിയിച്ചിരിക്കുന്നവ കൂടതെ വായുവിൽ ചെറിയ

അളവിൽ നീരാവിയും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അളവ് വായുവിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫൈഡ്രജൻ സർഫെയ്ഡ്, സർഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, പൊടി, അണുജീവികൾ തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങളും വായുവിൽ കാണുന്നു.

കാക്സിജൻ:—

രാസപ്രതീകം O	ആറ്റോമിക ഭാരം 16
തന്മാത്രാസൂത്രം O ₂	തന്മാത്രാ ഭാരം 32

1771 ൽ ഷീലേ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും പിന്നീട് പ്രിസ്റ്റ്ലിയും ഈ വാതകം സ്വതന്ത്രമായി കണ്ടുപിടിച്ചു. 'അമ്ലജനകം, എന്നതും വരത്തക്ക 'കാക്സിജൻ' എന്ന പേര് ഈ വാതകത്തിനു നൽകിയത് ലഃവായ്സിയർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്.

കാക്സീകരണം:—

പല വസ്തുക്കളും കാക്സിജനിൽ കത്തുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് തുടക്കത്തിൽ, കാക്സീകരണം എന്ന പേരു നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാക്ക് കാക്സിജന്റെയോ ക്ലോറിൻ, അയഡിൻ എന്നിവയെപ്പോലുള്ള മൂലകങ്ങളുടേയോ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള സംയോജനമെന്നോ, ഫൈഡ്രജനേയോ ഒരു ലോഹ മൂലകത്തിനെയോ വേർപെടുത്തുന്ന ക്രിയയെന്നോ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇലക്ട്രോണികസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെയോ അയോണിന്റെയോ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നഷ്ടമാണ് കാക്സീകരണം.

നിഃരാക്സീകരണം:—

ഫൈഡ്രജന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ലോഹ മൂലകത്തിന്റെയോ സംയോജനമോ; കാക്സിജന്റെയോ, ക്ലോറിൻ, അയഡിൻ എന്നിവയെപ്പോലെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടേയോ വേർ

പെട്ടത്തൽ ക്രിയയോ നിരോക്സീകരണം എന്ന പ്രക്രിയയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഒരു ആറ്റമിനോ അയോണിനോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നോ അധികമോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ലാഭമാണ് നിരോക്സീകരണം.

ഒരു ആറ്റമിനോ അയോണിനോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ മറ്റൊരു ആറ്റമിനോ അയോണിനോ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ഓക്സീകരണം നിരോക്സീകരണം എന്നീ പ്രക്രിയകൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഓക്സീകരണം:—

ഓക്സീകരണത്തിന് നിമിത്തമായതും ആ പ്രക്രിയയിൽ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഓക്സീകാരകം.

ഓക്സിജൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ എന്നീ മൂലകങ്ങളും, നൈട്രിക് അസിഡ്, പൊട്ടാസ്യംഡൈക്രോമേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്നിവയും പല പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഓക്സീകാരകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

നിരോക്സീകരണം:—

നിരോക്സീകരണത്തിന് നിമിത്തമായതും ആ പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പദാർത്ഥമാണ് നിരോക്സീകാരകം.

ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാത്സ്യം മുതലായ മൂലകങ്ങളും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ അയഡയിഡ്, കാർബൺമോണോക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ക്ലോറൈഡ് മുതലായ യന്ത്രികങ്ങളും നിരോക്സീകാരകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ജപലനം —

താപവും ചിലപ്പോൾ പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാസക്രിയയാണ് ജപലനം എന്നു നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്വസനവും തുരുമ്പിക്കലും മനുഗതിയിലുള്ള ജപലനപ്രക്രിയകളാണ്. ജപലനത്തിൽ ഓക്സിജൻ പങ്കെടുക്കുകയോ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഫൈബ്രജൻ ക്ലോറിനിൽ കത്തുമ്പോൾ ജപലനമാണുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ പങ്കെടുക്കുന്നേയില്ലല്ലോ. ഫൈബ്രജൻ കത്തുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു 'അന്തരീക്ഷ'മായാണ് ക്ലോറിൻ വർത്തിക്കുന്നത്.

ജപലനത്തിന്റെ വേഗത താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

1 പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വലുപ്പം

2 ലഭ്യമായ ഓക്സിജന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയോ അളവ്

3 പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രകൃതം

ഉൽപ്രേരണം:—

അപ്പം മാംഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിനോട് ചേർക്കുന്നതോടെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും താരതമ്യേന താണ താപനിലയിലും (ഏകദേശം 200°C -ൽ) ഓക്സിജൻ പേർപെടുമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ മാംഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് രാസികമായ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ ശേഷിക്കുന്നു. മാംഗനീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡിനെപ്പോലെ സ്വയം രാസികമായ യാതൊരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാകാതെ ഒരു രാസക്രിയയുടെ വേഗത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന പദാർത്ഥത്തെ ഉൽപ്രേരണം എന്നു പറയുന്നു.

സർഫർ ടൈ ഓക്സൈഡ് ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ സർഫർ ടൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള സംയോജനത്തിന് നേർമ്മയായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട പ്ലാറ്റിനവും സർഫ്റ്ററിക്കാസിഡ് ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ സർഫർ ടൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ നീരാവി എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിൽ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡുകളും വനസ്സഭി നിമ്നിക്കാൻ നിക്ഷേപം ഉൽപ്രേരകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു ഉൽപ്രേരകം, രാസക്രിയയിലുണ്ടാകുന്ന ഉപ്പുനങ്ങളുടെ മൊത്തം അളവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. രാസ ക്രിയയുടെ വേഗതയുടെ വ്യത്യാസം വരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാസക്രിയയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വേഗത കൂട്ടാനുള്ളവയാണ് താരതമ്യേന കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളത്.

സൂചകങ്ങൾ (ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ)

നിറമാറ്റംമൂലം ഒരു ലായനി അമ്ലമുണ്ടാകുമ്പോഴോ ക്ഷാരമുണ്ടാകുമ്പോഴോ എന്നും, അമ്ലങ്ങളും ക്ഷാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം (ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിയ പൂർത്തിയാകാ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ചായങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ (ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ) എന്ന പേരിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

പരീക്ഷണശാലയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ചില സൂചകങ്ങളാണ് ലിറ്റ്മസ്, മീതൈൽറോഷ്യം, ഫിനോൾഫ്തലിൻ എന്നിവ. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കു പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും നിഷ്പ്രയാസം നിമ്നിക്കാവുന്നതുമായ ചില ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉണ്ട്.

a) H. R. Blue. ചെമ്പരത്തി (*Hibiscus Posavinsensis*) പ്ലൂവിന്റെ ഭൂഷണം അടർത്തിയെടുത്ത് ചതച്ച് സാധാരണ കടലാസ്സിൽ ഉരച്ച് അതിന്റെ നിൽ അതിൽ പടിപ്പിക്കുക. കടലാസ്സിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ നിറമുള്ളതായിത്തീരുമ്പോൾ ഉണക്കിയെടുത്തു.

വായു കയറാത്തവിധം അടയ്ക്കാവുന്ന ഒരു കപ്പിയിലിട്ടത് സൂക്ഷിക്കാം. ഇതാണ് H. R. Blue paper

H. R. Blue paper ഒരു പരീക്ഷണനാളിയിലുള്ള ജലത്തിലിട്ട് കലക്കിയാൽ നീലനിറമുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ലഭിക്കും. ഇത് H. R. Blue ലായനിയാണ് H. R. Blue Paper അല്ലങ്കിൽ ലായനി ആസിഡിൽ ചുമപ്പുനീറവും ക്ഷാരലായനിയിൽ നീല നിറവും കാണിക്കുന്നു.

b) C. T. Blue:- നീല ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ (*Clitoria ternatea*) ലൂക്കളുടെ നീലനിറമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തു് അത് ഇഴയടുപ്പമുള്ള ഒരു കഷണം തുണിയിൽ ഇട്ട് ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു് നിരോധകക ഇത ദ്രാവകം പരീക്ഷണനാളിയിലൊഴിച്ചു് തിളപ്പിച്ചശേഷം പരന്ന സ്പടികപ്പാത്രത്തിലൊ പോഴ്സ് ലയിൻ പാത്രത്തിലൊ ഒഴിച്ചു് തണുപ്പിക്കുക. ഇതിൽ കടലാസ്സുകഷണങ്ങൾ മുക്കിയെടുത്തു് ഉണക്കി C. T. Blue paper ആയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ലായനിയായിത്തന്നെയൊ ഉപയോഗിക്കാം.


ഇതിനു് അമൃതത്തിൽ കട്ടം പിങ്കുനിറവും ക്ഷാരത്തിൽ നീല നിറവുമാണുള്ളതു്.

അപൂർവ്വ വാതകങ്ങൾ.

ആർഗോൺ നിയോൺ, ഫീലിയം, ക്രിപ്റ്റോൺ, ക്ലിനോൺ, റെഡോൺ എന്നീ വാതകങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽമാത്ര വായുവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ മറ്റു മൂലകങ്ങളോടൊന്നും സംയോജിക്കുകയോ അവയുമായി പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുകയോ ജ്വലിക്കുന്നു അടുത്ത കാലംവരെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഇക്കാരണത്താൽ അവ അക്രിയവാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തു് ആർഗോൺ നിയോൺ എന്നിവയെ ഓക്സിജൻ, ഫ്ലൂറിൻ എന്നീ മൂലകങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു് യുഗീകങ്ങളുണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

The Mahatma Printing Works, Tvm. 14.

COVER PRINTED BY THE S. G. P. AT THE GOVERNMENT PRESS,
SHORANUR, 1970



സതതം

TEACHERS' HANDBOOK

സ്വാമി സാർവ്വ

വില 1 രൂപ

കേരള ഗവണ്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്

1971