




കേരളത്തിലെ
നാരവിളകൾ



കേരള ഹാൻഡ്‌സ്ക്രിപ്റ്റ്



13422

കേരളത്തിലെ

നാരവിളകൾ

Malayalam

KERALATHILE NARU VILAKAL

(Fibre Crops of Kerala)

Prepared by

A group of Authors

First published, December 1979

Copies : 5,000

Printed at:

Manasasaras Printers Peroorkada.

Price: Rs. 3

Published by:

State Institute of Languages, Kerala, Trivandrum 1979.

© *State Institute of Languages, Kerala, Trivandrum 1979.*

*Published by the State Institute of Languages, Kerala, Trivandrum,
under the centrally sponsored scheme for production of books and
literature in regional languages at the University level, of
the Government of India, Ministry of Education and
Social Welfare [Department of Culture], New Delhi.*

കേരളത്തിലെ
നാരുവിളകൾ

സി. കെ. പീതാംബരൻ

പി. ചന്ദ്രശേഖരൻ

യു. മൊഹമ്മദ് കുഞ്ഞു്



കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

തിരുവനന്തപുരം

ജനറൽ എഡിറ്റർ

ഡോ. എ. എൻ. പി. ഉമ്മർകുട്ടി

നിർവഹക എഡിറ്റർ.

ഡോ. കെ. എൻ. ശ്രീനിവാസൻ.

സാങ്കേതിക എഡിറ്റർ

എം. സി. ഇൽഡഫോൺസ്

General Editor

Dr. A. N. P. Ummerkutty

Executive Editor

Dr. K. N. Sreenivasan

Technical Editor

M. C. Ildephonse

ഒന്നാംപതിപ്പ്: ഡിസംബർ 1979

First Edition: December 1979

അച്ചടി: മാനസ്സസരസ് പ്രിന്റേഴ്സ്
പേരൂർക്കട

Printed at: Manasasaras
Printers Peroorkada

വില. ക. 3

Price. Rs. 3

വിദഗ്ദ്ധോപദേശകർ

1. സി. എം. ജോർജ്ജ്

അഗ്രോണമി പ്രൊഫസർ, കാർഷികകോളേജ്
കേരളകാർഷിക സർവകലാശാല,
വെള്ളായണി, തിരുവനന്തപുരം.

2. ഏ. ജി. ജി. മേനോൻ

എക്സ്ട്രാണിസ് പ്രൊഫസർ, കാർഷികകോളേജ്
കേരളകാർഷിക സർവകലാശാല
വെള്ളായണി, തിരുവനന്തപുരം.

ഭൂമി

കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് വിജ്ഞാനം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി “കൃഷി പുസ്തക കോർണർ” അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് കൃഷിക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറു ചെറു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. കൃഷി പുസ്തക കോർണർ ഉപഭോഗക സമിതി അംഗീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം കൃഷിപുസ്തക കോർണർ പരമ്പരയിൽ പെട്ടതാണ്.

പ്രൊഫ. ആർ. ഗോപീമണി പരിശോധിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “കാർഷിക വിളകൾ” എന്ന ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചില ശീർഷകങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ച് കേരള കർഷകർക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് “കേരളത്തിലെ നാരുവിളകൾ” എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

ഈ വിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷകർക്കും ഈ വിളകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവർക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപകരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ കർഷക ജനതയ്ക്ക് ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ സാദരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ:

ഡോ. എ. എൻ. പി. ഉമ്മർകുട്ടി

ഡോ. കെ. എൻ. ശ്രീനിവാസൻ

കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

തിരുവനന്തപുരം

ഡിസംബർ 6, 1979.

കൃഷി പുസ്തക കോർണർ

ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ

1. ഡോ. എ. എൻ. പി. ഉമ്മർകുട്ടി (ചെയർമാൻ)
2. പ്രൊഫ. സി. കെ. മുസത്
3. ഡോ. കെ. എൻ. ശ്രീനിവാസൻ
4. ശ്രീ എൻ. വേലപ്പൻ നായർ
5. മെമ്പർ സെക്രട്ടറി കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം
6. ശ്രീ വി. മുരളീധരൻ നായർ
7. ശ്രീ കെ. കെ. ജോസഫ്
8. അല്ലത്തു രാജഗോപാലൻ
9. ഡോ. സി. പി. മുരളീധരൻ നായർ
10. ശ്രീ എൻ. അച്ചുതൻ നായർ
11. ഡോ. കെ. പി. രാജഗോപാലൻ നായർ
12. ശ്രീ ആർ. ഫേലി (ക്ലർക്കിൻ)

കേരളത്തിലെ നാരുവിളകൾ

ഉള്ളടക്കം

1.	പണം	1	—	19
2.	പരുത്തി	20	—	79
3.	കുറുപ്പണം	80	—	89

കേരളത്തിലെ നാരുവിളകൾ

നാരുവിളകൾ 1

ചണം

[ശാസ്ത്രീയനാമം: കോർക്കോറസ് സ്പീഷീസ്. ഇംഗ്ലീഷ്—ജൂട്ട്; ആസാമീയ—മാപ്പാട്ട്: ബംഗാളി—ഷാഡാപ്പാട്ട്; ഒറിയ—ഹോട്ടാ; തെലുങ്ക്—ജന്മ; തമിഴ് — ചണപ്പായ്; കന്നട -- സൈനാബ; മറാഠി— ജൂട്ട്; ഗുജറാത്തി—മോടി; ഹിന്ദി — ജൂട്ട്; പഞ്ചാബി . പട്സാൻ].

നമ്മുടെ കാർഷിക-വ്യാവസായികരംഗങ്ങളിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള നാരുവിളയാണ് ചണം. ഇത് പാക്കിങ്ങിനുള്ള ചെലവു കുറഞ്ഞ നാരായി വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ചണകൃഷി അവിഭേദഭാരതത്തിന്റെ ഒരു കരുതകയായിരുന്നു. ഇന്നും നമ്മുടെ വിദേശനാണ്യ സമ്പാദനത്തിൽ ചണത്തിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ട്.

ചരിത്രവും ഉത്ഭവവും

ചണം ആദ്യമായി എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ചണനാരിനെപ്പറ്റി വേണ്ടിലും മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റും പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഭാരതത്തിൽ ചണം വിപുലമായി കൃഷിചെയ്തിരുന്നു എന്നും ചണനാൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുമുള്ളതിന് വേണ്ടത്ര തെളിവുകളുണ്ട്. 1590-ൽ അബുൾ ഫാസൽ ഏഴുതിയ എയിൻ-ഇ-അക്ബാരി എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചണനാരു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തുണിയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചുകാണ

നൂൺ. റംഫിയസ് (1743) എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ 'കാപ്സുളാരിസ്' എന്ന ഒരിനം ചണച്ചെടിയെ പഠിപ്പിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചെടി ബംഗാളിൽ ഒരു ഇലക്കുറിയെന്ന നിലയിൽ വളരെയധികം പ്രചാരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ചണത്തെക്കുറിക്കുന്ന 'ജ്യൂട്ട്' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഏതു ഭാഷയിൽ നിന്നാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒറിയഭാഷയിൽ ചണത്തിന് പരഞ്ഞുവരുന്ന ജെട്ട്, ജൂട്ട് എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോപിച്ച് ഉണ്ടായതായിരിക്കണം ഇത്.

ചണച്ചെടിയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ സന്ദൃശാസ്യജ്ഞന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പല രാജ്യങ്ങളെയാണ് ചണത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ചണത്തിന്റെ ജീനസ് നാമമായ കോർക്കോറസ് എന്ന പദം ഈജിപ്ഷ്യൻ പദമായ 'കോർക്കോറസ്സിൽ' നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ചണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ ഈജിപ്തിലാണെന്നുമാണ് റോയ്ലി (1858) ന്റെ അഭിപ്രായം. ബെൻതാം, മുളൂർ (1863) എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ചണത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥലം ഏഷ്യയോ ആഫ്രിക്കയോ ആണെന്നാണ്, ഒരു ചെടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസുകൾ എവിടെയാണോ കണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും ആ ചെടിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥലം എന്ന് പ്രസിദ്ധ സന്ദൃശാസ്യജ്ഞനായ വാവിലോവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒളിറ്റോരിയസ് ചണത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ആഫ്രിക്കയാണെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കാപ്സുളാരിസ് ചണം ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം കാപ്സുളാരിസ് ചണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ചൈനയിലാണെന്നാണ്. വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിനു ശേഷം കണ്ടു (1957) അനുമാനിക്കുന്നത്, ഒളിറ്റോരിയസ് ചണത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആഫ്രിക്കയാണെന്നും കാപ്സുളാരിസ് ചണത്തിന്റേത് ഇന്തോ-ബർമിസ് പ്രദേശങ്ങൾ

ആണെന്നുമാണ്, കണ്ടുവിന്റെ ഈ അനുമാനത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നത്.

സസ്യശാസ്ത്രവശം

കേർക്കോറസ് കാപ്സുളാരിസ്, കോർക്കോറസ് ഒളിടോറിയസ് എന്നീ രണ്ടു സ്പീഷീസുകളാണ് ചണനാരിനു വേണ്ടി കൃഷിചെയ്യുവരുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ടീലിയേസീ എന്ന സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇതു കൂടാതെ കോർക്കോറസ് ജീനസ്സിൽപ്പെട്ട വേറെ നാല്പതിൽപ്പരം സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഒന്നും തന്നെ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കോ. കാപ്സുളാരിസും കോ. ഒളിറ്റാരിസും തമ്മിൽ പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽ സാദൃശ്യമുള്ളതായിത്തോന്നാമെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ അവ തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

വിതരണം, വിസ്തൃതി, ഉൽപാദനം

ചണം പ്രധാനമായി കൃഷിചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, ചൈന. ഫൊർമോസ, ഭാരതം, സിലോൺ, ജപ്പാൻ, ജാവ, മലയ, ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമായും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചണകൃഷിക്ക് പറ്റിയതാണെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ തീരെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. 1960-67-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ എട്ടുലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ചണം കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 54 ലക്ഷത്തോളം കെട്ട് (1 കെട്ട് = 180 കി.ഗ്രാം) ചണം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാനം	വിസ്തീർണം (ഹെക്ടർ)	ഉല്പാദനം (കെട്ടുകളിൽ)
ആസ്സാം	136,196	991,393
ബീഹാർ	160,677	973,403
ഒറീസ്സ	43,147	237,460

സംസ്ഥാനം	വിസ്തീർണ്ണം (ഹെക്ടർ)	ഉല്പാദനം (കെട്ടകളിൽ)
ഉത്തരപ്രദേശ്	21,311	163,200
പശ്ചിമബംഗാൾ	423,423	2,875,364
തൃപുര	13,355	170,250
ആകെ	800,109	5,411,120

കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും

ചൂടും ഇരുപ്പും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ചണം കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്. 16°C മുതൽ 38°C വരെ ചൂടനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചണം നല്ല പോലെ വളരുന്നത്. ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഓീസ്സ്, ഉത്തരപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചൂട് ചിലപ്പോൾ 43°C വരെ ഉയരാറുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ശരാശരി ചൂട് 22.5°C ആയതുകൊണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ ചണം നന്നായി വളരുന്നു. മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചണം കൃഷി ചെയ്തു വരാറുള്ളത്. ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആണ്ടിൽ ഏകദേശം 150 സെ.മീ. മഴയെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. അതിൽ ചുരുങ്ങിയത് 25 സെ. മീ. എങ്കിലും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ, മേയ് എന്നീ മാസങ്ങളിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം. ആകെ കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അളവിനെക്കാൾ പ്രധാനം, അത് എപ്പോഴെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മഴയും സൂര്യപ്രകാശവും ഇടവിട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കൃഷി ആദായകരമായ രീതിയിൽ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വിധേയമാകാറുണ്ട്. ഇത് ചണനാരിന്റെ ഗുണത്തെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും മൊത്തവിളവിനെ സാരമായി കുറയ്ക്കാറില്ല.

ഫലഭൂയിഷമായ പശിമരാശിമണ്ണുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചണം സാധാരണ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത്. ചരലും കല്ലും നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൊഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും ചണം കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണ് അധികവും പുളിരസമുള്ളതാണ്. ചില ഇനം ചണം 5 pH അമ്ളക്ഷാര സൂചികയുള്ള മണ്ണിൽപ്പോലും വളരാറുണ്ട്.

വിത്തും വിതയും

ചണവിത്തും വിതറിവിതയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. കാപ്സുളാരിസ് ഇനം ചണം ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തും വിതയ്ക്കുവാൻ 10 കി. ഗ്രാം വിത്തും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒളിറോറിയസ് ഇനം വിതയ്ക്കുവാൻ ഹെക്ടറിന് 6 കി. ഗ്രാം വിത്തും മതിയാകും. വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്തിനോടു കൂടി മണൽ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് വിത്തും വിതയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വീഴുവാൻ ഇടയാകുന്നു. കൂടാതെ വിത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഇതു മൂലം കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ട്. വിതച്ചുകഴിഞ്ഞ് മണ്ണിന് ഹാരോ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കിയശേഷം നിരപ്പുപലക കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ മുളയ്ക്കാൻ സഹായകമായ ആഴത്തിൽ വിത്തും വീണ് കിട്ടുന്നു. വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്തിന്റെ കിളിർപ്പ് പരിശോധിച്ചുനോക്കി 90 ശതമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ കിളിർപ്പുള്ള വിത്തും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിത്തും വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫംഗസ്സ് രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന്മേൽ മരുന്നു പുരട്ടണം.

പശ്ചിമബംഗാളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ചണകൃഷി ഗവേഷണാലയത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ചണം വരിവരിയായി വിതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളവുകൂട്ടാമെന്നും കൃഷിചെലവ് കുറയ്ക്കാമെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി ഒരു വിത്തിടീൽയറും ഈ ഗവേഷണകേന്ദ്രം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിത്തിടീൽയറും ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധാരണവേണ്ടതിന്റെ പകുതിവിത്തും മതിയാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ കൃഷിചെലവ് ഏകദേശം 20 ശതമാനം കുറച്ച് കാജുവാനും കഴിയും. വരിവരിയായി നടുന്നതുകൊണ്ട് കാപ്സുളാരിസ് ഇനം ചണത്തിൽ 25-30 ശതമാനവും ഒളിറോറിയസ് ഇനത്തിൽ 10-15 ശതമാനവും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതായി പരീക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ഈ വിത്തിടീൽയറും അഞ്ചഞ്ചര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ഏകദേശം അര ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തും വിത്തിടാൻ സാധിക്കും.

കൃഷിപ്പണികൾ

കാലവർഷാരംഭത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇടമഴയോടും കൂടി കൃഷിപ്പണി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ഫെബ്രുവരി അവസാനമോ മാർച്ച് ആദ്യമോ ആയിരിക്കും ഇത്. ചണച്ചെടിയുടെ വേരും 30 സെ.മീ. വരെ താഴോട്ട് പോകാറുള്ളതുകൊണ്ട് ചണകൃഷിക്കു വേണ്ടിയൊരുക്കുന്നമണ്ണ് നല്ല പോലെ ആഴത്തിൽ ഉഴേണ്ടതാണ്. ചണവിത്തു വളരെ ചെറുതാകയാൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലം പൊടിപ്പരുവത്തിൽ ആക്കണം. ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നിലമൊരുക്കുന്ന രീതിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷിയായുധങ്ങൾക്കും വളരെ അധികം വ്യത്യാസം കാണാം. സാധാരണയായി നിലം അഞ്ചോ ആറോ തവണ ഉഴുത ശേഷം കളടച്ച് നിരപ്പുപലക ഉപയോഗിച്ച് നിറത്തുന്നു. കളിമൺപ്രദേശത്താണ് കൃഷിചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിലം പൊടിപ്പരുവമാകുവാൻ സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതൽ തവണ ഉഴേണ്ടിവരും.

അനന്തരശുഷികൾ

വിതച്ച വിത്തു 80 ശതമാനത്തോളം മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഏകദേശം ഇരുപതു ലക്ഷത്തിൽപ്പരം തൈകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ചെടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ വളരണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെക്ടറിൽ രണ്ടു ലക്ഷം മുതൽ നാലു ലക്ഷം വരെ തൈകളെ പാടുകളിൽ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലുള്ള തൈകൾ പഠിച്ചുകുളയ്ക്കുക (വിരട്ടനം)എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃഷിപ്പണിയാകുന്നു. എന്നാലും വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിത്തു ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വിവരിക്കാം: 1. ചിലപ്പോൾ ആകെ വിതച്ച വിത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും മുളയ്ക്കുന്നത്. 2. കാലവർഷം വൈകിയാൽ വളർച്ചയുടെ ആദ്യശേഷിൽ ചിലപ്പോൾ വരച്ചു ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ കുറെ ചെടികൾ നശിച്ചുപോകുവാൻ ഇടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പഠിച്ചു നടപ്പാൻ തൈകളുടെ ആവശ്യം വരും. 3. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചെടികൾ അടുത്തു വളരുന്ന പക്ഷം കളകളുടെ വളർച്ച സാരമായി കുറയും.

ചണ്ടച്ചെടിക്കു് ഒന്നര-രണ്ടു മാസം മൂപ്പെത്തിയാൽ ഹാരോ കൊണ്ടു് ഉഴുതു് കൂടുതലുള്ള ചണ്ടത്തൈകളെ നശിപ്പിക്കണം. ഇതു് രണ്ടുതവണയായി 15 ദിവസം ഇടവിട്ടാണ് ചെയ്യുക. മണ്ണു് ഇളക്കു വാനും ചണാച്ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ക്രമീകരിക്കുവാനും ഇതു് സഹായിക്കുന്നു. ഈ കൃഷിപ്പണി എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ചണ്ടച്ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 12-15 സെ. മീ. ആയിരിക്കും. ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 15 സെ. മീറ്ററിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപയ്ക്കു് ശാഖകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതു് ചണ്ടത്തിന്റെ മേന്മയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

വളങ്ങളും വളപ്രയോഗവും

ചണ്ടത്തിനു വളം ചേർക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ്. ചാണകം, ചാരം, കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വളങ്ങൾ. ഒരു ഹെക്ടറിനു 4-8 ടൺ ചാണകത്തിനു പുറമെ കളവാഴയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കമ്പോസ്റ്റോ അതു കത്തിച്ച ചാരമോ കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്. കളവാഴയുടെ ചാരത്തിൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം ക്ഷാരം അടങ്ങിട്ടുള്ളതിനാൽ അതു് ചണ്ടകൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായ വളമാണു്. കടുകുപിണ്ണാക്കും ആവണക്കുപിണ്ണാക്കും സൗകര്യമുള്ള പക്ഷം എക്കൽമണ്ണും വളമായി ചേർക്കാറുണ്ടു്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിനുശേഷം വിളപരിക്രാന്തിലുൾപ്പെട്ടതിനു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ (ഉദാ: ഇറ്റി) ചണ്ടത്തിനു് സാധാരണ യാതൊരു വളവും പ്രയോഗിക്കാറില്ല. അതു പോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു വിധേയമാകാറുള്ള എല്ലാ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വളം ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാറില്ല.

അടുത്ത കാലം വരെ ചണ്ടകൃഷിക്ക് രാസവളങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. രാസവളങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു് ചണം തഴച്ചുവളരാനാവശ്യമായ നൈട്രജൻ അടങ്ങുന്ന വളങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളവു് വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നു് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രചണഗവേഷണാലയത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു്, ഒന്നാന്നര മാസം വരെ പ്രായമായ ചണ്ടത്തിനു് ഒരു ഹെക്ടറിൽ 100 കി. ഗ്രാം അമോണിയം

സംഹോറും (20% നൈട്രജൻ) എന്ന തോതിൽ വളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ 16-കി. ഗ്രാം നാരു കൂടുതലായി ഉണ്ടാകും എന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചണം പ്രധാനമായും മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിള ആയതിനാൽ നൈട്രജൻ അടിവളമായി ചേർത്താൽ അത് ഒലിച്ചു പോകുവാൻ ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൈകൾക്ക് ഒന്നു മാത്രം പ്രായമെത്തുമ്പോൾ മേൽവളമായിവേണം നൈട്രജൻ നൽകുക. അമോണിയം സംഹോറും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനോടു കൂടി നാലിരട്ടി മുതൽ അഞ്ചിരട്ടി വരെ മണ്ണ് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളം എപ്പോഴും സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാകുകയും വളം ഇലകളിൽ വീണു കരിച്ചിരിക്കുകയെന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. മണൽപ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന ചണത്തിനു മേൽവളം രണ്ടു തവണകളായിട്ടാണ് ചേർക്കാറുള്ളത്. ഈ തവണകൾ തമ്മിൽ 15-20 ദിവസത്തെ ഇട വേണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടു തവണകളായി മേൽവളം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിളവ് വർദ്ധിക്കും എന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫോസ്ഫറും പൊട്ടാഷും ചണത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സ്തംഭിപ്പിച്ച് സഹായിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വതവേ ഫോസ്ഫറും കാവായ മണ്ണിൽ അത്ര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളവിൽ വർദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഫോസ്ഫറും ചണനാരിന്റെ ഗുണം കൂട്ടുകയും ചണച്ചെടികൾ ചാഞ്ഞുവീഴാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊട്ടാഷ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചണത്തിനു രോഗപ്രതിരോധശക്തി കൂടുമെന്നു ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുളിരസം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ കുമ്പായം ചേർക്കണം. പുളിരസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഹെക്ടറിന് 250 കി. ഗ്രാം മുതൽ 500 കി. ഗ്രാം വരെ കുമ്പായം ചേർത്താൽ വിളവു ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. കുമ്പായം നിലമൊരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് കുമ്പായം. ചേർത്ത് മൂന്നു നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ വിത്തു വിതയ്ക്കാവൂ.

വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും

വിത്തുവിതച്ചു അഞ്ചാറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചണം വെട്ടാവുന്നതാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സമയത്താണ് ചണം വെട്ടുക: ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ വിതച്ച ചണം ജൂലായിൽ വെട്ടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ആഗസ്റ്റ് വരെ നീണ്ടുനില്ക്കും. വൈകി വിതച്ച ചണം ആഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് വെട്ടാറുള്ളത്. ചണം പുവിട്ടതിന് ശേഷമേ വെട്ടാറുള്ളൂ. കൃഷിസ്ഥലത്തു് വെള്ളം കയറുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂമൊട്ട് വിരിയുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ചണം വെട്ടേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ഇപ്രകാരം വെട്ടിയാൽ ചണനാരിന്റെ തൂക്കം വളരെ കുറയും. ചണം വെട്ടാൻ പഠിച്ച സന്ദർഭം ചെടികൾ കാക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. ഹൂററവും അധികം നല്ല നാൽ ലഭിക്കുന്നതും ഈ സമയത്തു് വെട്ടിയാലാണ്. കായ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് വെട്ടിയാൽ നാൽ കുറഞ്ഞുപോകും. കായ്കൾ മുത്ത ശേഷം ചണം വെട്ടുന്നപക്ഷം വിളവ് വർധിക്കുമെങ്കിലും നാരിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞുപോകും.

ചണം വെട്ടുന്നതു്, നിലത്തോടു ചേർത്തു് അരിവാരം കൊണ്ടു് മുറിച്ചാണ്. വെള്ളം കയറാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു് ഉത്തരപ്രദേശത്തു്, ചിലയിടങ്ങളിൽ, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് ചണം വെട്ടാറുള്ളതു്. വെള്ളം വളരെ അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ വേരോടെ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവു്.

ചണം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതു് ചെറിയ കെട്ടുകളാക്കി ഉയർന്ന സ്ഥലത്തു് കുത്തനെ വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് തണ്ടിൽ നിന്നു് ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു. ഇലകൾ എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞശേഷമാണു് തണ്ടു് അഴുക്കുന്നതു്. ചെമ്പ് സ്കൗസ് കനാബിനിസ് എന്ന നാരുചെടിയാക്കുന്ന പോലെ ചണത്തിനും നാൽ വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ തണ്ടു് അഴുക്കണം. അഴുക്കുന്നതുകൊണ്ടു് നാരിലുള്ള പെട്ടിനും മറ്റു പൾകളും നീങ്ങിപ്പോവുകയും തന്മൂലം നാൽ, തണ്ടിൽ നിന്നു് വേഗം വേർപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും വെള്ളവും ചേർന്നുള്ള ചില ജൈവരാസപ്രവർത്തന

ങ്ങൾ മൂലമാണ് ചണം അഴുകുന്നത്.

അഴുകുന്നതിനു വേണ്ടി ചണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിവയ്ക്കണം. അഴുകുന്ന സ്ഥലത്തിന് നല്ല ആഴമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അടക്കമായി ചണക്കെട്ടുകൾ വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അടക്കിന്റെ കുറുകെയാണ് രണ്ടാമതു വയ്ക്കുന്ന കെട്ട് നിറത്തേണ്ടത്. അധികം ഒഴുക്കില്ലാത്തതും കലക്കമില്ലാത്തതുമായ വെള്ളമാണ് ചണം അഴുകുവാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയത്. ചണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ താങ്ങുകിടക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ ഭാരം കയറ്റിവയ്ക്കുന്നു. വലിയ കല്ലുകളോ മരത്തടിയോ കളവാഴയുടെ കെട്ടുകളോ വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ, ഇതിനായി പച്ച മാവിൻതടി, വാഴ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാരണം, ഇവയിലുള്ള ടാനിൻ വെള്ളത്തിലെ ഇരുമ്പുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ചണനാരിന്റെ മേന്മ കുറയ്ക്കും. ഭാരം വയ്ക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം കളവാഴ പോലെ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെടികൾ നിരത്തി അതിനു മുകളിൽ കല്ലോ ഉണങ്ങിയ തടിയോ വയ്ക്കുന്നതാണ്.

ചണനാരിന്റെ നിറവും ബലവും അഴുകുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തെയും അഴുകുന്ന രീതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. തണ്ടിന്റെ എല്ലാവശവും ഒരുപോലെ അഴുകേണ്ടതാവശ്യമാണ്. തണ്ടിന്റെ മേൽഭാഗം അഴുകുവാൻ കീഴ്ഭാഗത്തിനു വേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറച്ചുസമയം മതിയാകും. അതുകൊണ്ട് കീഴ്വശം നല്ല പോലെ അഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേൽഭാഗം കൂടുതൽ അഴുകിയിരിക്കും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ചണക്കെട്ടുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുത്തനെ നിർത്തണം. പിന്നീടുമാത്രമേ മുഴുവൻ ഭാഗവും അഴുകുവാൻ പാടുള്ളൂ. ചണം നല്ലപോലെ അഴുകിക്കിട്ടുവാൻ ഒരാഴ്ച മുതൽ ഒരു മാസംവരെ എടുക്കും. ചെടിയുടെ വളർച്ച, അഴുകുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അഴുകുവാനെടുക്കുന്ന സമയം. ചൂടുകാലങ്ങളിൽ അഴുകുവാൻ താരതമ്യേന കുറച്ചുദിവസം മാത്രം മതി (ഏഴുപത്തുദിവസം). ചൂടുകാലത്തു വെള്ളത്തിന്

ഏകദേശം 30°C ചൂട് ഉണ്ടായിരിക്കും. തണുപ്പ് കൂടുന്തോറും അഴുകവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയവും കൂടിവരും. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അഴുകവാൻ ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച മുതൽ അഞ്ചാഴ്ച വരെ സമയം എടുക്കും. തണുപ്പുകാലത്തു് ചണക്കെട്ടുകളിൽ, കുറച്ച് അമോണിയംസൾഫേറ്റോ എപ്പുപൊടിയോ ചേർത്താൽ വളരെ വേഗം അഴുകിക്കിട്ടും.

ചെറിയ ഒഴുക്കുള്ള നല്ല വെള്ളത്തിലാണ് അഴുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാരിന് നല്ല ഉറപ്പും നിറവും കിട്ടും. മണ്ണു കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ അഴുക്കിയാൽ നാരിന്റെ നിറം മങ്ങിപ്പോകും. ചണത്തിൽ വളരെ അധികം ടാനിൻ ഉണ്ട്. വിശേഷിച്ചു് ജീരോറിയസ് ഇനത്തിൽ ഇതു് വളരെക്കൂടുതലാണ്. ചണം അഴുകുമ്പോൾ ഈ ടാനിൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കുറപ്പനറം പരത്തുന്നു. ഒരേ സ്ഥലത്തു് പല തവണ അഴുക്കുവാനിട്ടാൽ നാരിനും ഈ കുറപ്പനറം ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്.

നിറം മങ്ങിയ ചണനാരിനു് വില വളരെ കുറവാണ്. നിറമില്ലാത്ത ചണനാരു് ശക്തികുറഞ്ഞ അമ്ലത്തിൽ മുക്കിയാൽ നല്ല നിറം കിട്ടും.

നാരു വേർതിരിക്കൽ. ചണനാരു് വേർതിരിക്കുക പ്രയാസമേറിയ ഒരു പണിയാണ്. ഇതിനു് പ്രത്യേക പരിചയം ആവശ്യമാണ്. ജോലിക്കാർ സാധാരണ അരയോളം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാണ് നാരു് വേർപെടുത്തുന്നത്. ചിത്ത തന്മു് ഇടത്തു് കൈകൊണ്ടു് എടുത്തു് അതിന്റെ കിഴ്ഭാഗത്തു് ഉരുണ്ട ഒരു വടികൊണ്ടു് അടിച്ചു ചതയ്ക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം അപ്പു വേർപെട്ട നാരു് വലത്തു് കൈകൊണ്ടു് പിടിച്ച് തന്മു് ശക്തിയായി കടഞ്ഞു് നാരു് മുഴുവൻ വേർപെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ തണ്ടിൽ നിന്നു് മുഴുവൻ നാരും പെട്ടെന്നു് വേർപെട്ടുകിട്ടും. വേർപെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാരു് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ഉലച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കഴുകിയ നാരു് വെള്ളത്തിൽ മീതേ പരത്തി അരിലുള്ള എപ്പാ കേട്പാടുകളും തീർത്തശേഷം നാരിൽ നിന്നു് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞുകളയുന്നു. വെള്ളം കളഞ്ഞശേഷം

നാരു ഉണക്കണം. ഇതിന് മുളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക അയകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം ഉണങ്ങിയാൽ നാരു വില്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാകും. സാധാരണ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ നാരിന് 2 മീറ്റർ മുതൽ 3.5 മീറ്റർ വരെ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ജോലിക്കാരന് ഒരു ദിവസം 20 കി.ഗ്രാം മുതൽ 40 കി.ഗ്രാം വരെ നാരു വേർപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനിലും ആസ്സാമിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അഴുകിയ ചണത്തണ്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് കരയ്ക്കിട്ട്, വെള്ളം മുഴുവൻ വാർന്നുപോയ ശേഷമേ നാരു വേർപെടുത്താറുള്ളൂ. മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചണം വെട്ടുന്നത് വയലിൽ വെള്ളം കയറിയ സമയത്താണെങ്കിൽ, വെട്ടിയശേഷം ചണം ചെറിയ കെട്ടുകളാക്കി അവിടെത്തന്നെ അഴുകുവാൻ ഇടയുമാണ് പതിവ്. അഴുകിയ ശേഷം തണ്ടുകൾ ചങ്ങാടങ്ങളിലോ തോണികളിലോ കയറ്റി കരയിൽ കൊണ്ടുപന്നശേഷം നാരു വേർപെടുത്തുന്നു.

ചണനാരു യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു വേർതിരിക്കാവുന്നതാണ്. യന്ത്രം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തീരെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രധാനമായ കാരണം ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട നാരു പരുപരുത്തതും ഉറപ്പ് കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കുമെന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ നാരു യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വേർപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല.

വിളവ്. ചണനാരിന്റെ വിളവ് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി, കൃഷി ചെയ്യുന്നതും, വെട്ടുന്ന സമയം, രോഗങ്ങളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആക്രമണം മുതലായവയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

ചണനാരു ചെടിയുടെ തൂക്കത്തിന്റെ 4.5% മുതൽ 7.5% വരെ വരും. ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെക്ടറിന് 2500 കി.ഗ്രാം വരെ നാരു കിട്ടുവാൻ പ്രയാസമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി ഉല്പാദനം ഹെക്ടറിന് 1050-1150 കി.ഗ്രാം ആണ്.

സസ്യസംരക്ഷണം

രോഗങ്ങൾ

മറ്റു വിളകളെയെന്ന പോലെ ചണ്ഡകൃഷിയെയും പല രോഗങ്ങളും ബാധിക്കാറുണ്ട്. ചണ്ഡകൃഷിയിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ട രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്, വിത്തു്, വേരുകൾ, തണ്ടുകൾ, ഇല എന്നീ ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം രോഗം ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇതു് ചണ്ഡന്നാരിന്റെ മേന്മയേയും വിളവിലിനേയും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. ചണ്ഡത്തിൽ പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത് കമീരരോഗങ്ങളാണ്.

തണ്ടുചീയൽ. (മാക്രോഫോമിയ ഫാസിയോളെ). ബാധിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ രോഗത്തെ റൈബ്റ്റ് റോട്ട് എന്നും തണ്ടുചീയൽ എന്നും വേരുകൾ ചീയൽ എന്നും (root rot) വിളിക്കാറുണ്ട്. രോഗകാരിയായ ഫംഗസ്സ് വിത്തിൽ കൂടിയോ മണ്ണിൽ കൂടിയോ ആണ് സംക്രമിക്കുന്നത്.

പല പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഗുരു ഫംഗസ്സ് രോഗം പ്രധാനമായും പരക്കുന്നത്, രോഗം ബാധിച്ച വിത്തു് വിതയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതു് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, കൂടുതൽ മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന വിത്തു് മിക്കവാറും ഈ രോഗം ബാധിച്ചതായിരിക്കും. മാക്രോഫോമിയയുടെ ആക്രമണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണപ്പെടുന്നത് മഴ കഴിഞ്ഞു് നല്ല ഹൂർപ്പവും ചൂടും ഉള്ളപ്പോഴാണ്. മേയ്-ജൂൺ-ജൂലായ് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ രോഗം പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത്. മുപ്പത്തിയ ചണ്ഡത്തിനു് ഈ രോഗത്തെ ചെറുത്തുനില്പുവാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടു് ഇതിന്റെ കൃഷി നേരത്തേയ്ക്കായിവാൽ രോഗത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.

ചെടിയുടെ ആദ്യദശയിൽത്തന്നെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ ചെടി വാടിയുണങ്ങുന്നു. പിലുകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം മൂലം തണ്ടുകളിൽ നെടുകെയോ കുറുകെയോ ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും, തന്മൂലം തണ്ടു് ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മാറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തണ്ടിൽ നിന്നു് നാൽ ഉരിഞ്ഞുപോകാറുണ്ടു്. ചിലപ്പോൾ മാക്രോഫോമിയ കായ്കളേയും ബാധിക്കാറുണ്ടു്. രോഗം

ബാധിച്ച കായ്കളിലെ വിത്തിന്റെ നിറം മങ്ങുകയും തൂങ്ങുകയും ചെയ്യും.

നിവാരണമാർഗങ്ങൾ. രോഗബാധയില്ലാത്ത വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്നത് ഈ രോഗം കുറെയാക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. രോഗമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമേ വിത്തു ശേഖരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച വിത്തുകൾ മരുന്ന് പുരട്ടി ശുദ്ധീയാക്കേണ്ടതാണ്. ഹെക്ടറിനു് 800 കി.ഗ്രാം വീതം കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർത്താൽ മൂടചിയലും തണ്ടുചിയലും ഫലപ്രദമായി തടയാമെന്നു കാണിച്ചുപറ്റി. മറു കുമ്മായനാശിനികളായ കുമ്മായം-ഗന്ധകം 0.2%, പെറിനോക്സ് 0.5%, ബോർഡോമിശ്രിതം 5:5:40 എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തളിച്ചാലും രോഗത്തിന്നു വളരെയധികം ശമനം കിട്ടും.

മൂടചിയൽ (സ്ക്ലിറോഷിയം റോഫ്സി). ഈ രോഗം രണ്ടിനം ചേർന്നുള്ളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രോഗം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ജലായ് മാസം മുതൽക്കാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തണ്ടുചിയൽ രോഗത്തിന്റേതിനോടു് സാമ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ തണ്ട് അളിഞ്ഞു് തത്തുക്കൾ ശിഥിലമായിപ്പോകുമെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

രോഗം പകരുന്നത് പ്രധാനമായും മണ്ണിൽ വീണുകിടക്കുന്ന രോഗം ബാധിച്ച ഇലകളിൽ കൂടിയാണ്. രോഗനിവാരണത്തിനു് കാര്യമായി ചെയ്യേണ്ടതു് രോഗം ബാധിച്ച ഇലകളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. വിളവെടുപ്പിനും മൂലവും രോഗബാധയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതുക്സനോസ് (കോളിറ്റോയ്ക്കൈക്കം കോർക്കോറി). ചൂടും ഈർപ്പവും കൂടിയ കാലങ്ങളിലാണ് ഈ രോഗം ഏറെയും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത് തണ്ടുകളിലാണ്. തണ്ടുകളിൽ ഫംഗസ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പുള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ക്രമേണ ഇവ ഒന്നിച്ചുചേർന്നു് വലിയ ക്ഷതങ്ങളാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകാരണം തണ്ടിന്റെ ശക്തി കുറയുകയും കാരാത്തു് ഒടിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യും.

കാപ്സുളാരിസ്സിലെ ചില ഇനങ്ങൾക്കും ഒളിറോറിയസ്സിലെ എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും ഈ രോഗത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്.

നിവാരണമാർഗങ്ങൾ. സൈറാം, ഫെർബാം എന്നീ ജൈവ-രാസകമിത നാശിനികൾ തളിക്കുക. ഒന്നു രണ്ടു കി. ഗ്രാം കമിതനാശിനി 1000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാൽ ഒരു ഹെക്ടറിൽ തളിക്കാൻ മതിയാകും. കഴിയുന്നതും രോഗപ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യുകയാണു് പ്രതിരോധനപടി. കീടങ്ങൾ

രോഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ, ചണത്തെ പല കീടങ്ങളും ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. കീടങ്ങൾ ചെടിയുടെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ദശയിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതു ചണത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗത്തെയും ആക്രമിക്കുകയും തന്മൂലം വീളുപിന്നെയും നാരിന്റെ ഗുണത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചണച്ചെല്ലി (എപിയോൺ കോർക്കോറി). ഈ കീടത്തിന്റെ ആക്രമണം ചണത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ദശയിലും കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ആക്രമണം മൂലം ചണകൃഷിക്ക് ഭീമമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ ചെല്ലി തണിന്മേൽ മുട്ടയിടുന്നു. ചിലപ്പോൾ വീത്തിന്റെ പുറത്താലിയിലും ഇത് മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ദിവസത്തിൽ ഒരു ചെല്ലി 13 മുട്ടവരെ ഇടും. ഒരു ചെല്ലിയുടെ ജീവിതദശയിൽ അതിനു് 675 മുട്ടവരെ ഇടാൻ കഴിയും എന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. മുട്ടകൾ വിരിയുവാൻ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസവും തണുപ്പുകാലത്താണെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസവും വേണം. ഗ്രബിന്റെ ജീവദശ 8 ദിവസം മുതൽ 18 ദിവസം വരെയും പ്യൂപ്പയുടേതു് 4 ദിവസം വരെയും നിന്ദ്രനിൽക്കും. പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ ചെല്ലിപ്രായേണ നിരൂപദ്രവിയായ്. ഗ്രബ്ബ് ആണു് എല്ലാവിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതു്. ഇതു് നാരിൽ കെട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നു. തന്മൂലം നാരിന്റെ ഗുണം തീരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു.

കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ അരികിലുള്ള ചെടികളെയാണ് നട്ടു കള്ള ചെടികളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഗ്രൂപ്പ് ആക്രമിക്കുന്നത്. നൈഷാദ് ധാരാളമുള്ള രാസവളങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കൂടുതലും ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്രമണം കുറയുമെന്നും കണ്ടിരീക്കുന്നു. ചണച്ചെല്ലി കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് കാലേകൂട്ടി വിതച്ച കൃഷിയിലാണെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിവാരണമാർഗങ്ങൾ

1. അകാലത്തും വയലിനു വെളിയിലും കളകളായി വളരുന്ന ചണച്ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുക
2. ചണത്തണ്ടുകൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അഴുക്കുക.
3. 5% മുതൽ 10 വരെ വീര്യമുള്ള ബി. എച്ച്.സി. പൊടി വിതരണം.
4. 0.01% പാരത്തയോൺ തളിക്കുക.

തണ്ടുതറപ്പൻ (സ്ട്രെർഫം ബൈകോളർ) അടുത്ത കാലത്തു കണ്ടെത്തിയ ഒരു കീടമാണിത്. ഇത് പ്രധാനമായും ആക്രമിക്കുന്നത് ഒളിറോറിയസ് ചണത്തെയാണ്. പശ്ചിമബംഗാളിൽ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്ന ഈ കീടം ഓീസ്സ, ബീഹാർ, ഉത്തര പ്രദേശ് എന്നീ അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലാർവദശയിൽ ഈ കീടത്തിന് കാപ്സുളാരിസ് ചണത്തെ ആക്രമിക്കാമെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

തണ്ടിന്റെ നീളത്തിൽ 10-26 സെ.മീ തുരന്നു നശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ കീടത്തിനു കഴിയും. 0.2-0.4 സെ. മീ വ്യാസമുള്ള തണ്ടുകളെയാണ് ഇതു കൂടുതൽ ആക്രമിക്കുന്നത്. സാധാരണ ചണത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന മറ്റു കീടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കീടം. എന്തെന്നാൽ ഈ കീടത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന പെണ്ണാണ് നാശം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു യാതൊരു ദശയിലും ഈ കീടം ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല. പെൺകീടം തണ്ടുകളിൽ ഭാരങ്ങളുണ്ടാക്കി

അതിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. മുട്ടയുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ഇന്റർപ്പം കിട്ടുവാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ശീതകാലസമയമായിട്ടുള്ളപ്പോൾ മുറിയായി ഇതിന്റെ ലാർവ് ഒരു കഷണം തണ്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിലത്തു വീഴുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇതിനു ശൈത്യകാലത്തെയും മറ്റു പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയ്ക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു. ലാർവ് ഇത് സ്ഥിതിയിൽ രണ്ടു കൊല്ലം വരെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഈ കീടം, ചെടിയുടെ 200 സെ. മീറ്ററിന് മീതെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കാറില്ല. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, വരിവരിയായി നട്ട ചെടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിതറി വിതച്ച ചെടികളെയാണ് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

നിവാരണമാർഗങ്ങൾ

1. 0.05% എക്കാലക്സ്, 0.5% സെവിൻ, 0.7% ബി. എച്ച്.സി. ഇവയിലൊന്ന് തളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ കീടത്തെ നശിപ്പിക്കാമെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.
2. കാർബൺ ബൈസൾഫൈഡ് കൊണ്ട് പുകയ്ക്കുക
3. സമാധിശയയിലുള്ള പൂപ്പുകളെ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കുക.
4. നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ കാപ്സുളാരിസ് ഇനം മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുക.

ഇലതീനിപ്പൂഴ് (ലാഫിഗ് എക്സിഗ്വ). ഇത് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് കാലേകൂട്ടി വിതച്ച ചണത്തിലാണ്. ചണച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യശയയിലാണ് ഇത് മുഖ്യമായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ പൂഴ് ചെടിയുടെ ഇലകൾ മുഴുവനും തിന്ന് ചെടിയുടെ വളർച്ച കാര്യുന്നു.

നിവാരണമാർഗങ്ങൾ. സെസാമം ഒറിയൻറാലിസ് എന്ന ചെടി ഒരു കെണിവിളയായി ചണകൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ അരികിൽ നട്ടാൽ ഈ പൂഴ്വിന്റെ ശല്യം വളരെ അധികം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. 0.5% സെവിൻ, 5% ബി.എച്ച്.സി. പൊടി, 0.3% എക്കാലക്സ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കീടത്തിന്റെ ആക്രമണം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും.

സുഡോകോക്കസ് ഫിലമെന്റോസസ്സ് ഇനം കോറിംബററസ്; ഇതുകീടം കാപ്സുളാരിസ്, ഒളിറോറിയസ് എന്നീ രണ്ടിനം ചെന്നെളിലും കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ആക്രമണം മൂലം ചണത്തിന്റെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു. പർവസന്ധികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുന്നു. ക്രമേണ മുരടിച്ച പർവസന്ധികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ നിറം കടുപ്പിച്ചയാവുകയും അതിന് കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകാത്ത ചണത്തിന്റെ പർവസന്ധികൾക്കിടയിലുള്ള ശരാശരി അകലം 3.74 സെ. മീ. ആണെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായ ചണത്തിന്റെ പർവസന്ധികൾ തമ്മിലുള്ള ശരാശരി അകലം 0.5 സെ. മീ. ആയിരിക്കും. ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായ ചെടികളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഇലകൾ ന്യൂനം ഉലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരിക്കും.

നിവാരണമാർഗങ്ങൾ. 1.5% വീര്യമുള്ള നിക്കോട്ടിൻ സൾഫേറ്റും 0.005% പാരത്തയോണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ കീടത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും.

മേൽ വിവരിച്ചവ കൂടാതെ മറ്റു പല കീടങ്ങളും ചണത്തെ ആക്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവ കൊണ്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ തുലോംകുറവത്രേ.

ഉപയോഗവും സാമ്പത്തികപ്രാധാന്യവും

ചണനാൽ, ചാക്കകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പരുത്തിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കാർപ്പറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചണനാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തുണി കാറ്റുമറയായും ചെടികൾക്ക് വെയിൽ മറയായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങൾ ബന്ധിച്ച് ചെയ്യുവാനും ചണനാൽ ആവശ്യമാണ്. സ്കീത്ചിനും പൈപ്പുവീണു പകരം ഉപയോഗിക്കാം. പരുത്തി, ചണം, രോമം എന്നിവ പല അനുപാതത്തിൽ ചേർത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള നാരുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. തുണിയുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലെ ചണം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു. ഇതിന് പ്രധാനകാരണം ചണം നെയ്യുവാനും വെളുപ്പിക്കുവാനും വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നതത്രേ. യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചെറിയ സഞ്ചി യുണ്ടാക്കാനും മറ്റും ചണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ബംഗാളിലും ആഫ്രിക്കയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ചണം തണിന്റെ ഇളം തണ്ടു് പച്ചക്കുറിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉണക്കി ഹുക്കയിൽ നിറച്ചു് വലിക്കുന്ന ഒരു ധൂമകപദാർഥമായും ചണം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

- Kandu B., C., Jute, World's most important Bastfiber crop. Econ. Bot. 1656, Vol. 10:No. 2. 103—133 and Vol 10: No. 3. 203—240. 1956.
- Kandu, B.C., Basak, K C. and Sarcar, P. B.(1959), Jute in India, The Central Jute Committee, Calcutta.
- Lefroy, H.M., Insect pests of Jute. Agric. J. India, 2:109—115. 1907
- Royle, J F., Fibrous plants of India (1855).
- Yegna Narayana Aiyer, A. K., Field crops of India, (1954). The Bangalore Printing and Publishing Co.Ltd, Bangalore.
- Indian Agricultural Situation Vol. XXIII. Feb. 1969.No. 11.
- The Wealth of India Vol. II. C. S. I. R. New Delhi(1950)
- Yegna Narayana Aiyer A. K. A Hand Book of Agriculture, I. C. A. R., New Delhi.
- Indian Central Jute Committee—Control measures for some major jute pests, stem-rot disease and suggestions for improvement of rotting technique. Agric. Res. Brochure No. I, 1946.

പരുത്തി

[ശാസ്ത്രീയനാമം: ഗോസിപ്പിയം സ്പീഷീസ്. ഇംഗ്ലീഷ്—കോട്ടൺ. ആസാമിയ—കപ്പാ; ബംഗാളി—കർപാസ്, ടലാ; ഓറിയ—കപ്പാ; തെലുങ്ക്—പ്രാട്ടി; തമിഴ്—പരുത്തി; കർണാടകം—ഹാട്ടി; മറാഠി—കാപസ്; ഗുജറാത്തി—കപ്പാസ്; പഞ്ചാബി—കപ്പാ]

ഇന്നു കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ് പരുത്തി. പരിശ്രാതീതകാലം മുതൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും പരുത്തിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതീൻ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്.

പരുത്തിയുടെ ഉല്പത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൃത്യമായ രേഖകൾ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. 'മോഹൻജൊദാരോ'വിൽ നിന്ന് വന്നു ചെറുത്തുണ്ടാക്കിയ പുരാവസ്തുക്കളുടെ പഴയ കണക്കിലെടുത്താൽ ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് 300 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു തന്നെ ഭാരതീയർ പരുത്തിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗുരുവേലിൽ പരുത്തിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 'മനു'വിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും പരുത്തി ഒരു പരാമർശ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതും പരുത്തിത്തുണി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതം സന്ദർശിച്ചിരുന്ന 'മാർക്കോപോളോ' എന്ന വിദേശസഞ്ചാരി തന്റെ യാത്രാക്കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേൽ ഉദ്ധരിച്ച സംഗതികളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭാരതം പൗരാണികാലം മുതൽ വസ്ത്രനിർമ്മാണത്തിനായി പരുത്തികൃഷി നടത്തിവന്നിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ, കൈവശമുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതമാണ് പരുത്തിയുടെയും പരുത്തിവസ്ത്രത്തിന്റെയും ജന്മദേശമെന്നു കാണാവുന്നതാണ്.

എതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാംശതകത്തിന്റെ പൂർവാർദ്ധം വരെ പരമിയിൽ കൃഷിയിലും പണി വ്യവസായത്തിലും ഭാരതം നായകത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലുണ്ടായ വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തോടു കൂടി ഭാരതത്തിന് ഈ പദവി നഷ്ടപ്പെടുകയും വെറും അസംസ്കൃത പരമിയിലേക്ക് വേങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉല്പാദകരാജ്യമെന്ന നിലയിലേക്ക് പിൻതള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സസ്യശാസ്ത്രവശം

പരമിയിലെ 'മാൽവേസി' എന്ന സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാന പരമിയിനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഗോസിപ്പിയം ജീനസിൽപ്പെട്ട 4 പ്രധാന സ്പീഷീസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ സ്പീഷീസുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

1. ഗോസിപ്പിയം ആർബോറിയം
2. ഗോസിപ്പിയം ഹെർബേസിയം
3. ഗോസിപ്പിയം ഹിർസ്യം
4. ഗോസിപ്പിയം ബാർബഡൻസ്

ആദ്യത്തെ രണ്ടു സ്പീഷീസുകൾ 'ഏഷ്യൻപരമി', പഴയ ലോകത്തിലെ പരമി, 'ഗോസിപ്പിയം' എന്നീ പേരുകളിലും ഒടുവിലത്തെ രണ്ടു സ്പീഷീസുകൾ "നവലോകപ്പരമി" എന്ന പേരിലുമാണ് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗോസിപ്പിയം ആർബോറിയത്തിന്റെ ജനദേശം ഭാരതമാണ്. ഗോസിപ്പിയം ഹെർബേസിയം ആകട്ടെ, മധ്യേഷ്യയിൽനിന്ന് ഭാരതത്തിൽ അറുവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ്. ഗോ. ആർബോറിയം സ്പീഷീസിന്റെ പരമി നാൽക്കുറഞ്ഞതാണ്. ഗോ. ഹെർബേസിയം സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ നാരിന് താർതന്ത്ര്യ കൂടുതൽ നീളവും മിനുസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗോ. ഹിർസ്യം സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ടവ അമേരിക്കൻപരമി എന്ന പേരിലാണ് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇനങ്ങളുടെ നാൽക്കും ഇത്തരം

നീളമുള്ളതോ നല്ല നീളമുള്ളതോ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ നാരിൻ്റെ മറ്റു സ്പീഷീസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മിനുസക്കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനിയുടെ വരവോടു കൂടിയാണ് “ഹിർസുട്ടം” പരുത്തി ഭാരതത്തിൽ എത്തിയത്. പരുത്തിനാരുക്കൾക്ക് അസാധാരണ നീളവും നല്ല മിനുസവുമുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഗോ. ബാർബഡൻസ്.

വിതരണം, വിസ്തൃതി, ഉല്പാദനം

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഭാരതത്തിലാണ്. 1966-67-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ 78.3 ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. വിസ്തൃതിയിൽ ഭാരതത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളതെങ്കിലും മൊത്തം പണി ഉല്പാദനത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം മാത്രമേയുള്ളൂ. പണിയുടെ മൊത്തം ആഗോളഉല്പാദനത്തിന്റെ 30 ശതമാനം അമേരിക്ക വിളയിക്കുമ്പോൾ ഭാരതം വെറും 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ 1966-67-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 6625 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് പരുത്തികൃഷി നടത്തിയതായിക്കാണുന്നു. കേരളത്തിൽ പരുത്തി പ്രധാനമായും കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ്.

വിവിധസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും ഉല്പാദനവും

[1966-67-ലെ കണക്ക്]

സംസ്ഥാനം	പണിയുടെ ഉല്പാദനം	
	വിസ്തൃതി (ഹെക്ടർ)	(180 കിലോ വീതമുള്ള കെട്ടുകൾ)
ആന്ധ്രപ്രദേശ്	3,21,402	1,57,363
ആസ്സാം	16,688	6,755
ബീഹാർ	2,136	2,023

പരത്തിയുടെ ഉല്പാദനം

സംസ്ഥാനം	വിസ്തൃതി (ഹെക്ടർ)	180 കിലോവീതമുള്ള കെട്ടുകൾ
ഗുജറാത്ത്	17,39,473	14,37,941
ജമ്മു-കാശ്മീർ	1,048	1,604
കേരളം	6,625	6,458
മധ്യപ്രദേശ്	8,18,100	2,78,900
തമിഴ്നാട്	4,07,410	4,46,900
മഹാരാഷ്ട്രം	25,99,900	10,69,700
കർണാടകം	9,83,406	2,64,710
ഒറീസ്സ	735	947
ഹരിയാന	1,83,000	2,89,000
പഞ്ചാബ്	4,32,000	7,31,000
രാജസ്ഥാൻ	2,50,208	1,84,367
ഉത്തരപ്രദേശ്	67,335	49,005
ഹിമാചൽപ്രദേശ്	764	920
ഡൽഹി	283	203
ത്രിപുര	3,157	2,600
പോണ്ടിച്ചേരി	475	789

ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയും ഉല്പാദനവും.

[1960-61-ലെ കണക്കു]

രാജ്യം/മേഖല	വസ്തുതി പണതിയുടെ ഉല്പാദനം (ആയിരം ഹെക്ടറിൽ)	വീതമുള്ള 1000 കെട്ടുകൾ)	ശരാശരി (ക്വിന്റാൽ)
മെക്സിക്കോ	902.5	2,100	493
അമേരിക്ക	6185.8	14,555	500
അർജന്റീന	505.0	500	214
ബ്രസീൽ	2020.0	1800	193
പെറു	249.6	580	516
റഷ്യ	2188.0	6,800	673
പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്	449.2	658	317
കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ്	119.1	125	227
ചൈന	5938.8	7,500	274
ഇന്ത്യ	7595.2	4,650	132
പാക്കിസ്ഥാൻ	1307.3	1,340	222
ടർക്കി	619.7	810	283
കോംഗോ	202.0	150	160
മുസാമ്പി	303.0	175	126
സുഡാൻ	879.7	525	299
ഐക്യ അറബി റിപ്പബ്ലിക്	75.7	2,202	608
ഉഗാണ്ട	612.4	305	108

ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന പരുത്തികൃഷി മേഖലകൾ

മണ്ണു്, കാലാവസ്ഥ, കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരുത്തിസ്പീഷീസ് ഇവയെ ആസ്പദമാക്കി ഭാരതത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ 6 മേഖലകളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഉത്തിരഹിർസുട്ടം ആർബോറിയം മേഖല. പഞ്ചാബ് പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തരപ്രദേശ്, ഡൽഹി, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാൻ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണിതേമേഖല.

മധ്യആർബോറിയം മേഖല. മധ്യപ്രദേശ്, ദക്ഷിണരാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്തിലെ തെക്കൻ സൗരാഷ്ട്രം, ഖർദ്ദേശ്, മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ മറാത്തവാഡ, വിദർഭ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടും.

ദക്ഷിണഹിർസുട്ടം ആർബോറിയം മേഖല. തമിഴ് നാട്ടിലും കേരളത്തിലും പരുത്തികൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഈ മേഖലയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്നു.

മധ്യഹെർബേസിയം ആർബോറിയം ഹിർസുട്ടം മേഖല. ആന്ധ്രപ്രദേശത്തും കർണാടകങ്ങളിലും പരുത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണിതേമേഖല.

പശ്ചിമഹെർബേസിയം മേഖല. ഈ മേഖലയിൽ ഗുജറാത്തും കർണാടകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പൂർവ്വ മേഖല. ആന്ധ്രം, ത്രിപുര, മണിപ്പൂർ-ഓറീസ്സ, ബീഹാർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണിതേമേഖല.

കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും

പ്രതിവർഷം 500 മില്ലി മീറ്ററിൽ കുറയാതെ മഴയും 15°C-ൽ കുറയാതെ ചൂടും ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. പഞ്ഞിക്കായ് വിളയുന്ന സമയത്തും വിളവെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരുത്തിക്ക് ശീതപാതം താങ്ങാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആണ്ടിൽ ഏതാണ്ട് 180 മുതൽ 240 വരെ ദിവസം ശീതപാതമില്ലാത്ത കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ചെടിയുടെ സുഗമമായ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശീതപാതവിമുക്തമായ കാലാവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ പരുത്തി നല്ല വിളവുതരുന്നു. സമതലങ്ങളിലും ചരിവുഭൂമികളിലുമാണ് പരുത്തി സാധാരണയായി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, അനുകൂലമായ

സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 900 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കൃഷിചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വിവിധ കാലാവസ്ഥാഘടകങ്ങളിൽ മഴയും താപനിലയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഭാരതത്തിലെ പരുത്തി കൃഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ചെടി വളരുന്ന ഏറ്റവും ഘട്ടങ്ങളിലും മണ്ണിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജലാംശത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കും. വിത്തു സുഗമമായി മുളയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15°C താപനിലയെങ്കിലും വേണം.

പരുത്തിയുടെ ശരിയായ കായികവളർച്ചയ്ക്ക് 21°C -നും 26°C -നും ഇടയിൽ ഉള്ള അന്തരീക്ഷതാപനില ആവശ്യമാണ്. പരുത്തി കാക്കുന്ന കാലത്ത് 26°C -നും 32°C -നും ഇടയ്ക്കുള്ള പകൽ ചൂടും രാത്രി നല്ല തണുപ്പുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നാണ്. പരുത്തി പൂക്കുമ്പോഴും കാക്കുമ്പോഴും അതിവൃഷ്ടിയോ ഇടതടവില്ലാത്ത വൻകാറ്റോ അധികമായ വരച്ചയോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പൂമൊട്ടുകളും മൂപ്പെത്താത്ത പണതിക്കായും അടർന്നുവീഴാൻ ഇടയാകും. വിളവെടുപ്പുകാലത്ത് അകാലികമായ മഴയോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത്യധികമായ ഈർപ്പമോ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല നൂൽകിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനു പുറമേ, കൃമികീടങ്ങളുടെ ആക്രമണസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മണ്ണ്. നല്ല ജലഗ്രഹണശക്തിയുള്ള മണ്ണാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം. ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മണ്ണിന് നല്ല നീർവാർച്ചയും ഇളക്കവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതും പരുത്തിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

സാമാന്യം ഫലപുഷ്പിയുള്ള മണ്ണിൽ പരുത്തി നന്നായി വളരുന്നു. വെറും പൂഴിമണ്ണിൽ മുതൽ തനികളിമണ്ണിൽ വരെ പരുത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അമ്ലക്ഷാരസൂചിക 5.5 മുതൽ 8.5 വരെയുള്ള മണ്ണിൽ പരുത്തി നന്നായി വളരും. സാമാന്യമായ തോതിൽ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസ്സും പൊട്ടാഷും തൃപ്തികരമായതോതിൽ

ജൈവാംശവും കലർന്ന മണൽലോംമണ്ണാണ് പരത്തികൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഗുരുതമണ്ണിൽ പരത്തി കൃഷി ചെയ്താൽ കായ്കൾ പാകമാകാൻ വൈകും. മാത്രമല്ല, ഇതു മൂലം കായികവളർച്ച അമിതമായി വർധിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ വിളവു കുറയുന്നതിനുമിടയുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കീടബാധയും ഏറിയിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ ലവണാംശമുള്ള മണ്ണിലും പരത്തി വളരമെങ്കിലും വിളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. മുഖ്യമായി താഴെപ്പറയുന്ന മണ്ണുകളിലാണ് ഭാരതത്തിൽ പരത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

അലുവിയൽ മണ്ണ് (എക്കൽമണ്ണ്). അലുവിയൽമണ്ണിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സിന്ധു-ഗംഗാസമതലപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിനെ സിന്ധു-ഗംഗാസമതല എക്കൽമണ്ണ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഈ മണ്ണ് പ്രധാനമായും ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ചു നദീമുഖങ്ങളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അലുവിയൽ മണ്ണിന്റെ ഘടനയും ഗാഢതയും ആഴവും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. സാധാരണ അലുവിയൽമണ്ണിന് ചാരനിറമോ ഇളം തവിട്ടു നിറമോ മഞ്ഞനിറമോ ആണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിന് നല്ല കറുപ്പു നിറവും കാണാറുണ്ട്. അലുവിയൽ മണ്ണിന്റെ പരിച്ഛേദികയിൽ മിക്കപ്പോഴും നൂറവിന്യാസം കണ്ടെത്താവുന്നവരികയില്ല. അലുവിയൽമണ്ണിൽ സാധാരണയായി നൈട്രജനും ഹ്യൂമസും കാവായിരിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോസ്ഫറസും കമ്മി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം അലുവിയൽമണ്ണിലും വേണ്ടത്ര പൊട്ടാഷ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അലുവിയൽമണ്ണിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ചും ജലസേചനം നടത്തിയും പരത്തി കൃഷിചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്.

പരത്തിക്കരിമണ്ണ്. പരത്തികൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതുകൊണ്ടും നിറം കറുപ്പായതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ മണ്ണിനെ പരത്തിക്കരിമണ്ണ് എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനെ റെഗർമണ്ണ് എന്നും വിളിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിന്റെ മധ്യപശ്ചിമഭാഗങ്ങൾ, രാജസ്ഥാനിലെയും ഉത്തര

പ്രദേശത്തെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ, ബോംബെ, റീസ്സയുടെ തെക്കൻ ജില്ലകൾ, ആന്ധ്രയുടെ തീരദേശജില്ലകളും തെക്കൻജില്ലകളും, കർണാടകത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകൾ, തമിഴ്നാടിന്റെ മധ്യ-ദക്ഷിണജില്ലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായി പരുത്തിക്കരിമണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ മണ്ണിന്റെ ഉല്പത്തിഭേദമനുസരിച്ച് ബാഹ്യരൂപത്തിലും രാസഘടനയിലും പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാം. പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ പരുത്തിക്കരിമണ്ണിൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ജൈവാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് അപര്യാപ്തമാണ്. എന്നാൽ, പൊട്ടാഷും കുമ്മായവും ആവശ്യാനുസരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പരുത്തിക്കരിമണ്ണിന് ജലഗ്രഹണശക്തി താരതമ്യേന കൂടുതലാകയാൽ ഇതിൽ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പരുത്തികൃഷി നടത്താൻ സാധിക്കും.

ചുവന്ന മണ്ണ്. തമിഴ്നാട്, കർണാടകം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചുവന്ന മണ്ണിലും പരുത്തികൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശ്, റീസ്സ, ബീഹാർ, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം മണ്ണിൽ പരുത്തി നന്നായി വളരുന്നു. ലാഘവമുള്ളതും എളുപ്പം പരുവപ്പെടുത്താൻ തക്ക തരിഘടനയുള്ളതുമായ (സൂഷിരതമായ) ചുവന്ന മണ്ണിൽ കുമ്മായത്തിന്റെ അഭാവം കാണാം. ഈ മണ്ണ് സാധാരണയായി അസ്തരമുള്ളതോ ഉദാസിനമോ ആയിരിക്കും. നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ഹ്യൂമസ് എന്നീ അംശങ്ങൾ ചുവന്ന മണ്ണിൽ വേണ്ടത്രയില്ല. ആഴത്തിലും ഫലപ്രാപ്തിയിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചുവന്ന മൺപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയെ മാത്രമാശ്രയിച്ചും ജലസേചനം നടത്തിയും പരുത്തികൃഷിചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ലാറൊറൊറാമണ്ണ് ലാറൊറൊറാകമണ്ണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മണ്ണ് ഡെക്കാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, പൂർവ്വഘട്ടങ്ങൾ, റീസയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും, ആസ്സാം, കർണാടകം, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുന്നിൻമുകളിലും മലഞ്ചരിവിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഔന്നത്യമേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മണ്ണ് തീരെ ആഴം കാണാതും ചരലംശം കൂടിയുമിരിക്കും. എന്നാൽ താണപ്രദേശങ്ങളിലും

നലഞ്ചെരിവുകളിലും ഈ മണ്ണിന് സാമാന്യം ആഴവും ധാരാളം കളിയാംശവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുവെ വെട്ടുകൽമണ്ണിൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്, കുമ്മായം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ സസ്യപോഷകാംശങ്ങൾ തുലോം കുറവാണ്. ഏകിലും ആവശ്യാനുസരണം വളം ചെയ്യുകയും നല്ല കൃഷിരീതികൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കും.

വിത്തും വിതയും

വിത്തുവഴി വംശവർധനവ് സാധിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് പരുത്തി. വിതയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിത്തു് മുപ്പത്തിയതും മുഴുത്തതും 12%ത്തിൽ കൂടതൽ ജലാംശമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. പത്തു് ശതമാനത്തിൽ കവിയാത്ത ജലാംശമുള്ള വിത്തു് ആരോഗ്യമാസം വരെ ജീവനക്ഷമതയോടെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

വിത്തിന്റെ പുറത്തു് ആകമാനം പരുത്ത ഫസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. തൽഫലമായി വിത്തു് ഒന്നിച്ചു കൂടി ഇരിക്കുകയും വിതയ്ക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുകയും ചെയ്യും. ഇതു് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പരുത്തിവിത്തു് മണ്ണും ചാണകവും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ കഷമ്പിൽ നല്ല പോലെ തിരച്ചി ഉണക്കി ഏടക്കണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്സ് പരുത്തി അരിയുടെ തോടിനോടു് പറ്റിച്ചേരുകയും വിത ഏല്പുമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചും ഫസ്സ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഗാഢ സംഹൃദിക്കുത്തിൽ പരുത്തിക്കുരു രണ്ടു മിനിട്ടുനേരം ഇടു വച്ചിരുന്നാൽ ഫസ്സ് മുഴുവൻ ദഹിച്ചുപോകും. അതീന്ദ്ര ശേഷം പരുത്തിക്കുരു വെള്ളത്തിൽ കഴുകി തണലിലുണക്കി വിതയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സിങ്ക്ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ ഉദ്ദേശം 15 മിനിട്ടുനേരം വിത്തു് താഴ്ന്നു വച്ചിരുന്നാലും ഫസ്സ് ഇല്ലാതാകും. മേൽ വിവരിച്ച പ്രക്രിയകൾ മൂലം 'ഫസ്സ്' ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിനു പുറമെ വിത്തിന്റെ കിളിർപ്പ് നന്നാവുമെന്നു കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അഞ്ചു മിനിട്ടു മുതൽ പതിനഞ്ചു മിനിട്ടു വരെ അംശാവയലറു് രശ്മികൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടും പരുത്തി

വിത്തു വേഗത്തിലും ഔഷകാലത്തും മുളയ്ക്കുന്നതായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീജോഘോഷമായ രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മെർക്കറി യന്ത്രികങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തു സംസ്കരണം നടത്താവുന്നതാണ്.

നല്ല വിളവ് തരുന്നതും മേന്മയേറിയ നാരുള്ളതുമായ പരുത്തി ഇനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലു ദശാബ്ദങ്ങളായി ഭാരതത്തിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. തൽഫലമായി ഇന്ന് കൂടുതൽ ഉല്പാദനശേഷിയുള്ളതും മേന്മയേറിയതും വിവിധ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും വിവിധ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ പല പല പരുത്തിനാരകളും പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവയിൽ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇനങ്ങൾ താഴെയും അടുത്ത പേജുകളിലും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


റഷ്യൻ പരുത്തിയിനങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകാലവീളുകളായ സി. എസ്. 72/2, സി. എസ്. 84/4, പി. ആർ. എസ്. 72, പി. ആർ. എസ്. 84 എന്നീ “ഹിർസുട്ട” ജാതിയിൽപ്പെട്ട റഷ്യൻ പരുത്തിയിനങ്ങൾ തമിഴ് നാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽ, നെൽകൃഷിക്കുശേഷം നിലം തരിശിടുന്ന സമയത്തു കൃഷിചെയ്യാൻ യോജിച്ചതാണെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇനം	പഞ്ഞിനാരിന്റെ നീളം (മില്ലീമീറ്റർ)	ജിന്നിങ്ങ് (ശതമാനം)	കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
1 കല്ലാൺ	20.6-21.4	40-43	ഉത്തരഗുജറാത്ത്
2 വിജയ്	19.05-22.22	37-50	മധ്യഗുജറാത്ത്
3 സുയോഗ്	22.22	36.5	സുറാത്ത്
4 വിജൽപ്പാ	23.01	36.5	ദക്ഷിണഗുജറാത്ത്
5 വിർണാർ	22.22	38.41	ഖൻദേശ് (ഗുജറാത്ത്)
6 ജാറിലാ	22.22	35-36	

ഇനം	പണിനാരി ഒരു നീളം (മില്ലിമീറ്റർ)	ജിന്നിങ്ങ് (ശതമാനം)	കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
7 ജയധർ	22.22-23.01	33-34	കർണാടകം
8 ലക്ഷ്മി	21.4-23.0	34-35	ഉത്തരകർണാടകം
9 പ്രതാപ്	23.01	32-33	സൗരാഷ്ട്രം
10 സി. ഒ. 2	23.8	34-35	കോയമ്പത്തൂർ, സേലം, മധുര, രാമ നാഥപുരം, തിരുച്ചി റപ്പള്ളി
11 എം. സി. യു-1	24.58-25.4	35	തമിഴ്നാട്ടിൽ മഞ്ഞ കാലത്തു കമ്പോഡി യപ്പുരുത്തി കൃഷിചെ യ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥല ങ്ങൾ
12 എം. സി. യു-2	26.98-28.57	32	തമിഴ്നാട്ടിൽ വേന ൽക്കാലത്തു കമ്പോ ഡിയപ്പുരുത്തി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥല ങ്ങൾ
13 എം. സി. യു-3	26.98	36	തമിഴ്നാട്ടിൽ മഞ്ഞ കാലത്തു ജലസേച നം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക മ്പോഡിയപ്പുരുത്തി കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ
14 എം. സി. യു-4	30.1	37	വേനക്കാലത്തു തമി ഴ് നാട്ടിൽ കമ്പോ ഡിയപ്പുരുത്തി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥല ങ്ങൾ

ഇനം	പഞ്ഞിനാരി ന്റെ നീളം (മില്ലിമീറ്റർ)	ജിന്നിങ്ങ് (ശതമാനം)	കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
15 എം. സി. യു-5	30.14	36	ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുകാല കമ്പോഡിയൻപുരയിൽ പ്രദേശങ്ങൾ
16 കെ-2	22.22-23.01	29-30	മധുര, രാമനാഥപുരം, തിരുനെൽവേലി
17 കെ-5	22.22-23.01	29-30	കോയമ്പട്ടം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, മധുര, സേലം
18 കെ-6	25.4	33.9	തമിഴ്നാട്ടിലെ പരുത്തിക്കരിമൺ പ്രദേശങ്ങൾ
19 കെ-7	26.1	35.2	തമിഴ്നാട്ടിൽ കരുക്കണ്ണിപ്പുരയിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
20 എൻ-14	22.22-23.8	24.0	കർണ്ണാടക
21 വെസ്റ്റേൺ സ്-1	19.05-20.6	30.0	ബെല്ലാറി അനന്തപുർ, കർണ്ണാടക, കടപ്പ
22 സി-1	17.44-20.6	28.0	ഗുണ്ടൂരം സമീപജില്ലകളും
23 സി-2	17.44-20.6	30.0	
24, 881-എഫ്	17.44	32-33	കർണ്ണാടക, കടപ്പ, ബെല്ലാറി




ഒരു സങ്കരയിനം പരുത്തി (റഷ്യൻ X ഇന്ത്യൻ)
ഫോട്ടോ ഐ. സി. റ്റു. ആർ.



എം. സി. യു-5 എന്ന പരത്തിയിനം
ഫോട്ടോ-മൂർത്തി, കോയമ്പത്തൂർ

മൂന്നു മേത്തരം പരത്തിയിനങ്ങളുടെ ഇഴനീളം
കാണിക്കുന്ന ചിത്രം.
ഫോട്ടോ-മൂർത്തി, കോയമ്പത്തൂർ



ഇനം	പത്തതിനാരി ന്റെ നീളം (മില്ലിമീറ്റർ)	ജി.നീ.ഇസ് (ശതമാനം)	കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
25. 216-എഫ്	22.22-23.8	32-33	ഹരിയാന, ആലി ഗാർ, ബിക്കാനീർ, തഞ്ചാവൂർ
26. 320-എഫ്	23.01	33-34	പഞ്ചാബ്
27. 231.ആർ	17.44	42-43	„
28. എച്ച് 420	22.22	32-33	വിദർഭ
29. ബുരി-0394	22.22-23.01	33-34	„
30. പാർഭാനി അമേരിക്കൻ	22.22	30-31	അടിലാബാദ്, ഓറഗ ബാദ്
31. ഗോറാണി-6	22.22-23.8	31-32	മറാത്തവാഡ, അടിലാബാദ്
32. ഗോറാണി-12	22.22-23.8	31-32	പാർഭാനി, ഓറഗ ബാദ്
33. 35/1	20.6	34-35	ഉത്തര പ്രദേശത്തിന്റെ പൂർവഭാഗത്തിൽ ജില്ലകൾ
24. എം.എ-5	26.98	34-35	വിന്ധ്യയിൽ ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം
35. മാൽവി-9	17.44-20.6	34-35	മാൽവ പ്രദേശം
36. ഇൻഡോർ-1	19.05-20.6	30	മേവാ, രാജസ്ഥാൻ
37. ഇൻഡോർ-2	19.05-20.6	31-2	മാൽവാ പ്രദേശം

ഇനം	പത്തിനാരി ന്റെ നീളം (മില്ലമീറ്റർ)	ജിന്നിങ്ങ് (ശതമാനം)	കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
38. സി.520	19.05	35-36	ജയപ്പൂർ
39. സിഐലൻ്റ്	34.5	32-33	കേരളം, കർണാടകം
40. കൃഷ്ണ	23.0	33	ഗുണ്ടൂർ-കൃഷ്ണ ജില്ല കര
41. നർബദാ	23.0	35	വാണ്ടുവ, വർ ഗോൺ
42. വാണ്ടുവ-1	24.6	37	"
43. വാണ്ടുവ-2	24.0	36	മധ്യപ്രദേശിലെ നി മാർ പ്രദേശം
44. ജി.27 (പ്രഭാത്)	16.0	37	പഞ്ചാബ്, ഹരി യാന
45. സുജാത	31.7	30	തമിഴ്നാട്
46. ഭാരതി (എം.സി.യു-6	20.0	37	തമിഴ്നാട്ടിൽ കരുക്ക ണ്ണി വളരുന്ന സ്ഥലം. മഹാരാഷ്ട്രം
47. ഗുജറാത്ത്-67	30.1	33	ഗുജറാത്ത്
48. ഹൈ ബ്രിഡ്-4	29.4	34	ഗുജറാത്ത്, മഹാരാ ഷ്ട്രം, കർണാടകം
49. ദിഗ്വിജയ്	23.0	40	ഗുജറാത്ത്, രാജ സ്ഥാൻ
50. സുജയ്	23.0	40	"

ഇനം	പഞ്ഞിനാരി ന്റെ നീളം (മില്ലിമീറ്റർ)	ജിന്നിങ്ങ് (ശതമാനം)	കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
51. മാൽജരി	22.3	36	ഉജ്ജയിൻ, ഇൻടോർ
52. എം.സി.യു-7	26.2	36	തമിഴ്നാട്
53. കെ. ൮	26.2	35	തമിഴ്നാട്
54. ആർ.എസ്. 89	27.7	33	രാജസ്ഥാൻ
55. വരലക്ഷ്മി	29.4	35	കർണാടകം
56. ജി.എസ് 23	23.0	40	കർണാടകം
57. സി.ബി. എസ്. 156	32.0	32	തമിഴ്നാട്
58. സുവിൻ	33.7	34	„

ഈ റഷ്യൻ ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, അവയുടെ ശിഖരങ്ങൾ വളരെ കുറിയതാണെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെക്റ്ററിൽ വളർത്താവുന്ന റഷ്യൻ പരുത്തി ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കൂടുതലായിരിക്കും; മാത്രമല്ല ഇതു മൂലം കൂടുതൽ വിളവു ലഭിക്കും. ഒരു ഹെക്റ്ററിൽ 1,00,000 മുതൽ 1,20,000 വരെ ചെടി കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഗ്രന്ഥകാല റഷ്യൻ ഇനങ്ങളുടെ കാലദൈർഘ്യം സാധാരണ 120-128 ദിവസമായിരിക്കും. ഇവ വിതച്ചു 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂക്കുന്നു. കായ്കൾ പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ 35-40 ദിവസത്തിനകം വിളവെടുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിയും. പഞ്ഞിക്കായ്കൾക്ക് നല്ല വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയുടെ ശരാശരി വിളവ് ഹെക്റ്ററിന് 1,900 കി. ഗ്രാം 'കപ്പാസ്' ആണ്. ജിന്നിങ്ങ് ശതമാനം 36-ഉം ശരാശരി ഇഴനീളം 27.1 മില്ലിമീറ്ററും ആയിരിക്കും.

പരുത്തിയുടെ നാരുനീളത്തെയും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, ഭാരതത്തിലെ പരുത്തിയിനങ്ങളെ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം 13 വാണിജ്യഗ്രൂപ്പുകളായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാണിജ്യഗ്രൂപ്പ്

കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം

1. ബംഗാൾസ് പഞ്ചാബ്, ഉത്തരപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ
2. അമേരിക്കൻസ് പഞ്ചാബ്, ഉത്തരപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ
കർണാടകം, മധ്യപ്രദേശ്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ബോംബെ
3. ഓഗ്രാസ് മധ്യപ്രദേശ്, വിദർഭ, മറാത്തവാഡ, ഖൻദേശ്
4. ഗോരാണി മറാത്തവാഡ
5. മധേന്ത്യ മധ്യപ്രദേശ്
6. സുർത്തി സുറത്ത്, ബറോഡ, ബ്രോച്ച്
7. ധോല്ലേരാസ് വടക്കൻ ഗുജറാത്ത്, സൗരാഷ്ട്രം, കച്ച
8. സതേൺസ് കർണാടകം, കർണ്ണാട, ഗുണ്ടൂർ
9. റിന്നവേലിസ് മധുര, രാമനാഥപുരം, തിരുനെൽവേലി
10. കമ്പോഡിയാസ് കോയമ്പത്തൂർ, സേലം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി,
മധുര രാമനാഥപുരം തിരുനെൽവേലി
11. മദ്രാസ് ഉൾപ്പെടെ മധുര, രാമനാഥപുരം, തിരുനെൽവേലി
ചിങ്കൽപെട്ട്, തെക്കൻ ആർക്കട്ട്,
ചിററ്റൂർ(ആത്ംറ), നെല്ലൂർ.
12. സേലംസ് സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി
13. കോരില്ലാസ് ആസ്സാമിലെ കന്നിൻപ്രദേശങ്ങൾ

വിതസമയം. കാലാവസ്ഥ, മണ്ണ്, പരുത്തിയുടെ ഇനം, മഴയെ ആശ്രയിച്ച് വളർത്തുന്നതോ, ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ ഏതും തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്ന സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

പഞ്ചാബ്, ഉത്തരപ്രദേശ് ബീഹാർ, ഒറീസ്സ, ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ

ആന്ത്രപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ, മഴയെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി, (ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ) പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നു. ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളപ്പിൽ-മേയ് മാസങ്ങളിലാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്.

പിൻവാങ്ങുന്ന കാലവർഷപ്പകർച്ചയും തുലാവർഷവും ലഭിക്കുന്ന വടക്കൻ കർണാടകത്തിലെയും തെക്കൻ ആന്ത്രപ്രദേശത്തെയും ആഴമുള്ള പരുത്തിക്കരിമണ്ണിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനത്തിലോ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യമോ, ആണ് പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ താമസിച്ച് വിതയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചുണ്ടാകുന്ന മഴയിൽ നിന്ന് മുപ്പെത്തിത്തുടങ്ങുന്ന പരുത്തിക്കായ്കൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ കാലവർഷവും തുലാവർഷവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളയുടെ ഏറിയ പങ്കും സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്. മഞ്ഞുകാലത്തു് പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ രണ്ടാംപകുതി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലത്തു് വിതയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളവ് വർധിക്കുന്നതായും ഗുണമേറിയ ഉല്പന്നം ലഭിക്കുന്നതായും പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹേന്തൽക്കാലത്തു് കമ്പോഡിയപ്പരുത്തികൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളതു്.

ഓരോ സ്ഥലത്തും പരുത്തിക്കുരു വിതയ്ക്കുന്നതിനു് പറ്റിയ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കാലാവസ്ഥയുടെ അസ്ഥിരതമൂലം കൃത്യമായ ദിവസം നിശ്ചയിക്കുക ഇന്നും പ്രയാസമാണ്. നല്ല കിളിർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനു് മണ്ണിൽ ആവസ്യാനുസരണം ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വർഷപാതത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം നിമിത്തം, ഒരു നിശ്ചിതസ്ഥലത്തു് ഓരോ കൊല്ലവും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരേ

അളവിലുള്ള മഴയോ അന്തരസരിച്ച് മണ്ണിൽ ഈർപ്പമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കാലേക്കൂട്ടി പാകമാകുന്നതുകൊണ്ട് താമസിച്ച് പാകുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടാണു പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേന്മയേറിയ ഉല്പന്നം കിട്ടുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാണ്.

ചെടിയുടെ കാലദൈർഘ്യം അന്തരസരിച്ച് പരുത്തിയെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം: എട്ടൊമ്പതുമാസം കാലയളവുള്ളതും അഞ്ചാറുമാസം കാലയളവുള്ളതും. കാലദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള പരുത്തി ജലസേചനസൗകര്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലോ ജലഗുഹണശേഷിയുള്ള മണ്ണിലോ ആണ് സാധാരണ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വിളവുകാലം കറഞ്ഞ ഇനം ശീതപാതമുള്ള ഇടങ്ങളിലും ലഘുമണ്ണിലും സാധാരണ കൃഷിചെയ്യുന്നു. കറഞ്ഞ താരിലുള്ള മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും രണ്ടാമത്തെ ഇനം പരുത്തിയാണ് കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നത് ഇന്ന് കൃഷിചെയ്തുവരുന്ന പല ഇനങ്ങളും ഗുരുബലമാണ്. ശ്രീ. ഹെർബേസിയം സ്പീഷിസിൽപ്പെട്ട പരുത്തി എല്ലായിടത്തും ആഗസ്റ്റ്-സെപ്തംബർ മാസങ്ങളിൽ വിതച്ച് ജനുവരി-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇവ നേരത്തേ വിതച്ചാൽത്തന്നെയും ജനുവരി തൊട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിനകമായിട്ടേ വിളവെടുപ്പിന് പരുവമാകുകയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ചില 'ഹിർസുട്ടം' പരുത്തികൾ സാമാന്യം വിപുലമായ അനുകൂലനശീലം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അവ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാർച്ച്-മേയ് മാസങ്ങളിലാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകട്ടെ ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലും, മണ്ണിന്റെ താപനില 16°C-ൽ കാര്യമായിരിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും എക്കാലത്തും പരുത്തി വിതയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പവും ചൂടുമുണ്ടെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണവും അതിനു ശേഷമുള്ള ചെടിയുടെ വളർച്ചയും ശരിയായി നടക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും താപനില എല്ലാക്കാലവും പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമാം വിധം ഉയർന്നതായിരിക്കും.

വിതരണരീതികൾ. സാധാരണയായി രണ്ടു രീതിയിൽ പരത്തി വിതരണമുണ്ട്; വിത്തു വിതറി വിതരണവും. ആവശ്യാനുസരണം അകലം നൽകി വരികളായി വിതരണവും. പരത്തിക്കുരു നൽകിയതിനാൽ സർവസാധാരണമല്ലെങ്കിലും ആസ്സാം, തമിഴ്നാട് കർണാടകം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് അനുവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചാബിലും ഉത്തർപ്രദേശത്തും വിത്തു വിതറി വിതരണമാണ് പതിവ്. അതിനു ശേഷം നിലം ഉഴുത്ത് മരം അടിച്ചു നിർപ്പാക്കുന്നു. ഈ ഏർപ്പാട് ഒട്ടും ഗുണകരമല്ല. കാരണം, ഈ രീതിയിൽ വിതരണമെന്നതുകൊണ്ട് വിത്തു കാലപ്പഴക്കം മണ്ണിനടിയിൽ ഒരേ താഴ്ചയിൽ വീഴാത്തതുകൊണ്ട് കിളിർപ്പിന് ഐക്യരൂപം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കൂടാതെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയും നിലയും ക്രമീകൃതമായിരിക്കുകയുമില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇടയിളക്കൽ, കളപറിക്ക് തുടങ്ങിയ അനന്തര പരിപരണനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് ചെടികളുടെ വളർച്ച കുറയുകയും വിളവ് മോശമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ഒരു പോംവഴി, വരിയായി വിത്തു വിതരണമാണ്. വരിയായി വിത്തു പാകുന്നതിന് സീഡ് ഡ്രിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. സീഡ് ഡ്രിൾ ഉപയോഗിച്ച് വരിയായി വിതരണമെന്നതുകൊണ്ട് വിത്തു ശരിയായ ആഴത്തിൽ പതിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഒരുമിച്ച് കിളിർത്തു വളർന്നു നിലത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഐക്യരൂപം കൈവരുന്നു. കൂടാതെ ഈ രീതിയിൽ വരിയായി ചെടികൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്, കാള വലിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഇടയിളക്കാനും സാധിക്കുന്നു. പണി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനും കൃഷിചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.

ദക്ഷിണഭാരതത്തിലും മധ്യഭാരതത്തിലുമുള്ള പരത്തിക്കുരി മണ്ണിലും ചുവന്ന മണ്ണിലും പരത്തി സാധാരണയായി വരികളിലാണ് വിതരണമുണ്ട്. കുറുത്ത മണ്ണുള്ള, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ

കലപ്പകൊണ്ടു് പൊഴിയുണ്ടാക്കിയോ ബ്ലേഡ് ഹാരോ ഉപയോഗിച്ചു് ചാലുകൾ കീറിയോ ആണ് വരികളായി പരുത്തിക്കുരുവിതയ്ക്കുന്നത്. വിതയ്ക്കുശേഷം ബ്ലേഡ് ഹാരോയുടെ തടിവശം ഉപയോഗിച്ചോ 'മരം' ഉപയോഗിച്ചോ വിത്തു് മുടുന്നു. ഏകദന്തിസീഡ്ഡ്രിൽ, കലപ്പയ്ക്കു പിന്നിലോ ബ്ലേഡ് ഹാരോയുടെ പിന്നിലോ ചേർത്തു പിടിച്ചു വിത്തു് വരിയായി വിതയ്ക്കാറുണ്ടു്. രണ്ടോ മൂന്നോദന്തങ്ങൾ ഉള്ള സീഡ്ഡ്രിൽ ഉപയോഗിച്ചു്, വിത്തു് വിതയ്ക്കുന്നതും സാധാരണമാണു്. ഈ രീതിയിൽ ദന്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമായിരിക്കും നട്ടിൽവരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം.

തമിഴ്നാട്ടിൽ ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പോഡിയപ്പരുത്തി തിണ്ടുകളിൽ വിതച്ചാണു് വളർത്താറു്. തിണ്ടുകളിൽ വിതയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു് വിത്തും വെള്ളവും ലാഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. കേരളത്തിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ചു് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന സീഐലൻറ് പരുത്തിയും തിണ്ടുകളിലാണു് വിതയ്ക്കുന്നതു്.

വിത്തുനിരക്കും വിതയകലവും. മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി, മണ്ണിലെ ഊർപ്പം, പരുത്തിച്ചെടിയുടെ സഹജമായ വളർച്ചയുടെ സ്വഭാവം, പരിചരണവേലകൾ തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചാണു് വിത്തുനിരക്കും വിതയകലവും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്. കൂടുതൽ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകാക്ഷിരൂപപ്പരുത്തിയിനങ്ങൾക്കു് അധികം ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത സന്ധിതാക്ഷിരൂപത്തുണ്ടാകാത്ത കൂടുതൽ വിതയകലം നല്കേണ്ടിവരും. അതുപോലെ നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണിലും ജലസേചനസൗകര്യമുള്ളിടത്തും ചെടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിത്തിന്റെ അളവു് നിശ്ചയിക്കുന്നതു്. കൂടാതെ വിത്തിന്റെ വലിപ്പം, ബീജാങ്കുരണശേഷി, കീടരോഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, കാലാവസ്ഥയുടെ അനിശ്ചിതത്വം, ഫിസിയോളജിയതകരാറുകൾ തുടങ്ങിയവ കൂടി കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടാണു് വിത്തുനിരക്കു് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്.

മേലുദ്ധരിച്ച കാരണങ്ങളാൽ പരത്തിയുടെ വിത്തുനിരക്ക് ഹെക്ടറിന് 9 കി. ഗ്രാം മുതൽ 18 കി. ഗ്രാം വരെയാകാൻ ചിലപ്പോൾ 28 കി ഗ്രാം വരെയും ആകാറുണ്ട്. പെതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സന്ധിതാഷിരൂപിയും മഴയെ ആശ്രയിച്ചു വരിയായി കൃഷിചെയ്യുന്നതുമായ ദേശീയരത്തിയ്ക്ക് 13 കി. ഗ്രാം മുതൽ 18 കി. ഗ്രാം വരെ വിത്തു് ഒരു ഹെക്ടറിന് ആവശ്യമായി വരും. 30 സെ. മീ. മുതൽ 45 സെ. മീ. വരെ വരികൾ തമ്മിൽ അകലം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ഏകാക്ഷിരൂപികളായ ദേശീയനങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് തഴച്ചു വളരുന്ന അമേരിക്കൻ ഇനങ്ങൾക്കും ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇനങ്ങൾക്കും 90 സെ. മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ അകലം വരികൾ തമ്മിൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. തിണ്ടുകളിൽ വിതയ്ക്കുന്നതും ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ അമേരിക്കൻ ഇനം പരത്തിക്ക് തിണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 75 സെ. മീ. ആയിരിക്കണം. തിണ്ടിൽ വിതയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നരിയിട്ടായിരിക്കും. നാലഞ്ച് വിത്തു വീതം ഓരോ കഴിയിലും വിതച്ച് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി പഠിച്ചു മാറ്റുന്ന പക്ഷം കൂടുതൽ വിളവു കിട്ടുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

കൃഷിപ്പണികൾ

നിലമൊരുക്കൽ. മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം, കൃഷിചെയ്യാനുള്ള ശീക്കുന്ന പരത്തിയിനം, മുൻവിള, പരത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ, വിതയ്ക്കുന്ന കാലം തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ച് നിലമൊരുക്കുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. പരത്തികൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന നിലമൊരുക്കരീതി നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൃഷിക്കാരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങളെ അവലംബമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽക്കൂടി, തലമുറകളായി നടത്തിവരുന്ന നിലമൊരുക്കരീതി അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലെ പരിതസ്ഥിതിക്ക് മിക്കവാറും യോജിച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പരത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാസ്ഥലങ്ങളിലെയും ഒരു പ്രത്യേകത, നിലമൊരുക്കൽ ഏറ്റവും തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതി

നുള്ള ഒരു കാരണം, വിളപരിക്രമത്തിലെ മുൻവിളയുടെ കൈയ്ക്കായി. പിൻ വിളയായ പരുത്തിയുടെ വിത്തും ഇടയിലുള്ള കാലം വളരെ ഹ്രസ്വമായിരിക്കും എന്നതാണ്. പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മഴയ്ക്കു ശേഷമേ നിലമൊരുക്കാൻ തരപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തൽഫലമായി വിത്തുവിതയ്ക്കുന്ന തീയതിയും നിലമൊരുക്കലും തമ്മിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഇടവേളയേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചുരുപാടിൽ പൊടിഞ്ഞുപരവം വന്ന മേൽമണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ തിടുക്കപ്പെടേണ്ടിവരും. അതുപോലെ വിത്തുവാൻ അനുയോജ്യമായ ദിവസങ്ങളും ചുരുക്കമായതിനാൽ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ നിലമൊരുക്കി തീർക്കേണ്ടിവരുന്നു. പരുത്തികൃഷിക്ക് ലഘുവായ നിലമൊരുക്കലേ വേണ്ടൂ. മൂന്നു നാലിഞ്ചു താഴ്ചയിൽ മണ്ണിളക്കി കളകളില്ലാതെ പരുവപ്പടുത്തിയാൽ ധാരാളം മതിയാകും. മണ്ണ് കൂടുതലിളക്കി പരുവപ്പെടുത്തുന്നതു കൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല.

ഗോതമ്പിനു ശേഷം പരുത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പിനും മേയ് മാസത്തിൽ കൃഷിയിറക്കുന്ന ജലസേചിതപരുത്തി വിളയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലം വളരെ ഹ്രസ്വമായിരിക്കും. ഈ ചുരുങ്ങിയ വേളയിൽ പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂലമായ കാലം പാഴാക്കാതെ തിടുക്കത്തിൽ നിലമൊരുക്കേണ്ടിവരുന്നു. മണ്ണ് നല്ല പോലെ നനച്ചിട്ട് നാടൻ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉഴുന്നു. പിന്നീട് ലഘുവായി ഒന്നുകൂടി നനച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉഴുത്ത് പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 'മറ' മൂപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. നിലമൊരുക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ ഇടയിളക്കൽ കൊണ്ട് പിന്നീട് നികത്താവുന്നതേയുള്ളൂ.

രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടകം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരുത്തിക്കുറിമണ്ണിൽ കളകളെ നശിപ്പിക്കാനായി മൂന്നുനാലു കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വലിയ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ആഴത്തിൽ ഉഴാറുണ്ട്. ചോളമോ, ബജറയോ കൃഷിചെയ്ത സ്ഥലത്തു് പരുത്തി കൃഷി

ചെയ്യുമ്പോൾ ചോളത്തിന്റെയും ബജറയുടെയും കച്ചിക്കറികൾ, രണ്ടു മൂന്നു തവണ ബ്ലേഡ് ഹാരോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു, ഇളക്കി മാറ്റുന്നു. ഇളക്കി മാറ്റിയ കച്ചിക്കറികൾ തീയിട്ടു ചൂടണം. മുൻധാന്യവിള കൊയ്തതിനുശേഷം പരത്തിക്കരിമണ്ണ് ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിവെടിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉഴാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. ഉഷ്ണകാലത്തെ ചൂടുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണ് നന്നായുണങ്ങി വെടിച്ചു, ഇളകിപ്പൊടിഞ്ഞു, ഏതാണ്ട് ഉഴതാലെന്ന് പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. അതു കൊണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ ആണ്ടുതോറും ഉഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരത്തിക്കുമ്പ് നിലക്കടല കൃഷിചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ വിളവെടുക്കുന്നതിന് 'ബ്ലേഡ് ഹാരോ'യോ കലപ്പയോ ഉപയോഗിച്ചു നിലം ഇളക്കുന്നത് ഈ വിളയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കളകൾ നശിച്ചുപോകുമെന്ന മെച്ചവും ഈ രീതിക്കുണ്ട്. പന്നീട്ട് രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം കൂടി ഹാരോ ചെയ്യുമ്പോൾ പരത്തി കൃഷിയിറക്കാനുള്ള പരുവം കിട്ടുന്നു.

മഴയെ ആശ്രയിച്ച കൃഷിചെയ്യുന്ന പരത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിന് നിലമൊരുക്കാൻ ബ്ലേഡ് ഹാരോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മണ്ണിൽ മൂന്നു നാലിഞ്ച് ആഴത്തിൽ കടന്ന്, വേണ്ട പോലെ മണ്ണിളക്കി, പരത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട പരുവം മണ്ണിന് കൈവരുത്തുന്നു.

ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവന്ന മണ്ണിന് ജലഗ്രാഹണശക്തി കുറവായതിനാൽ, മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ വർഷക്കാലത്തു വളരുന്ന വിളകൾ മാത്രമേ വിളപരിക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ. സാധാരണയായി ചോളം, ബജ്റ, പയറുവർഗങ്ങൾ, നിലക്കടല. എള്ള് തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒക്ടോബർ-നവമ്പർ മാസങ്ങളിൽ മേല്പറഞ്ഞ വിളകളുടെ കൊയ്ത്തിനുശേഷം മണ്ണിൽ ഒട്ടും ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ചുരുപാടിൽ നിലമൊരുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതു കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നല്ല മഴ കിട്ടിയശേഷം രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം നിലം ഹാരോ ഉപയോഗിച്ചു ലഘുവായി ഉഴുത്ത് മറിക്കുന്നു. നേരത്തേ മഴ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിലമുഴുതിടാറുമുണ്ട്. ജല

സേചനകൃഷിയാണെങ്കിൽ നിലം നനച്ചു് ഒരു ചാലു് ഉഴുതിടുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം ഹാരോ ഉപയോഗിച്ചു് നിലം പരുവപ്പെടുത്തുന്നു. തമിഴ് നാട്ടിൽ നാലു പ്രാവശ്യം നിലമുഴുതു് മണ്ണിനു് നല്ല പരുവം വരുത്താറുണ്ടു്.

ഇടയിളക്കൽ. പൊതുവെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരുത്തികൃഷി മഴയെ ആശ്രയിച്ചു് വർഷാരംഭത്തോടു കൂടി നടത്തുകയാണല്ലോ പതിവു്. വിത്തു് മുളച്ചു് ചെടി വളർന്നുതുടങ്ങുമ്പോൾ ഒപ്പം ധാരാളം കളകളും വളർന്നുവരുന്നു. വെളിച്ചം, വെള്ളം, സസ്യ പോഷകമൂലകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് ഭേദം കളകൾ പരുത്തിച്ചെടിയോടു് മത്സരിക്കുന്നു. ഈ മത്സരം യഥാകാലം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ചെറുപ്രായത്തിൽ വളരെ മുഴുവായ പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചുപോകാൻ ഇടയുണ്ടു്. പരുത്തി വിതച്ചതിനു ശേഷം തോരാതെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കളയുടെ വളർച്ച ഉഗ്രമായിരിക്കും. പിന്നീടു് അവയെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുക മിക്കവാറും അസാധ്യമായിത്തീരും. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ പരുത്തിച്ചെടി വളരാനിട കിട്ടാതെ അമർന്നുപോകുന്നതും സാധാരണമാണു്.

ഏകവർഷികളായ കളകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ഇടയിളക്കു് നടത്തി അവയെ പെറുക്കിമാറ്റിയാൽ മതി. ഇടയിളക്കിനു് കാളകൾ വലിക്കുന്ന തരം ഇടയിളക്കികളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു്. നിലമൊരുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പല തവണ ഇടയിളക്കി ആ പോരായ്മ പരിഹരിക്കുന്നു.

പഞ്ചാബിൽ ജലസേചനം നടത്തി, വിതറിവിതച്ചു വളർത്തുന്ന പരുത്തി വിളക്കു് ഒന്നു രണ്ടു് പ്രാവശ്യം ചെറുതുവകൾ ഉപയോഗിച്ചു് മണ്ണു് കൊത്താറുണ്ടു്. വരിയായി വിതയ്ക്കുന്ന പരുത്തിക്കിടയിൽ, ചെടിയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ, ഒരു തവണ കൈകൊണ്ടു് കള നീക്കുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നു് രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം 'ത്രിദന്തിഹൊ' ഉപയോഗിച്ചു് ഇടയിളക്കുന്നു.

മധ്യഭാരതത്തിലും ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പരുത്തിച്ചെടി അഞ്ചാറിഞ്ചു് വളരുമ്പോൾ കൈകൊണ്ടു് കള എടുക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം മൂന്നു നാലു പ്രാവശ്യം കാളകൾ

വലിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഇടയിളക്കുന്നു. തമിഴ് നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും മഴയെ ആശ്രയിച്ച കൃഷിചെയ്യുന്ന പരുത്തിക്കിടയിൽ ചെറിയ 'ഗുണ്ടക' ഉപയോഗിച്ച് നാലഞ്ചു തവണ ഇടയിളക്കുന്നു. വരികൾ തമ്മിലും ചെടികൾ തമ്മിലും തുല്യഅകലത്തിൽ പരുത്തി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നീട്ടത്തിലും കുറുകെയും ഇടയിളക്കി നടത്താം. ഇടകൊത്തുന്നതിനു മുമ്പ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഊറുമുണ്ടു്. ഇത് കൂട്ടകളെ ശരിക്കും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു. ജലസേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരുത്തിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ മിക്കവാറും കയ്യുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടയിളക്കി നടത്തുകയാണ് പതിവു്. കാരണം ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനു് നിലം ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു് കാളകൾ വലിക്കുന്ന കൃഷിഉപകരണങ്ങൾ അവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബല്ലാറി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പരുത്തിക്കരിമണ്ണിൽ ആഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റമ്പർ മാസങ്ങളിൽ കാലവർഷാവസാനത്തോടുകൂടിയാണ് പരുത്തി കൃഷിയിറക്കുന്നത്. വിതച്ചതിനു ശേഷം ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ അതിന്റെ വിളവെടുക്കുന്നതു വരെ പാലത്തക്ക മഴയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. മണ്ണിൽ സംഗ്രഹിച്ച വച്ചിട്ടുള്ള ഇർപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച മാത്രമാണ് ചെടി വലുതായി പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തുന്നത്. നവമ്പർ മാസത്തോടുകൂടി പരുത്തിക്കരിമണ്ണു് വെടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതു കാരണം ബാഷ്പീകരണം വഴി ഇർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്നതു കൂടാതെ, വേരുകൾ വലിഞ്ഞ് ചെടികൾക്കു തന്നെ ക്ഷതം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ ഇടയിളക്കി ഒരു "മറച്ചു" ഉണ്ടാക്കുകയും വെടിച്ച ചാലുകൾ നികത്തുകയും അങ്ങനെ ഇർപ്പനഷ്ടം വളരെ പരിമിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ആറ്-എട്ടു് പ്രാവശ്യം ഇതിനു വേണ്ടി ഇടയിളക്കി നടത്താറുണ്ടു്.

സാധാരണവർഷങ്ങളിൽ ഇടയിളക്കി നടത്തുന്നതു കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം കൂട്ടകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതു് എന്നുള്ളതാണ്. പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്ന കാലങ്ങളിൽ അസാധാരണമായി നിന്നു

മഴ ഉണ്ടാകാത്തപക്ഷം കള പറിച്ച് മാറുന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ കളപറിക്കലും 'ഇടയിളക്കലും' ഒന്നിച്ചു നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതു വിളവുകിട്ടും എന്ന് മറാത്തവായയിലും മറ്റും നടത്തിയ ദീർഘകാലപരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടു മഴ കിട്ടുന്നതിനിടയിലുള്ള കാലം വളരെ നീണ്ടുപോകുന്ന പക്ഷം കളപറിക്കലും ഇടയിളക്കലും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. മഴയുടെ കാര്യം അനിശ്ചിതമാകയാൽ, കൃഷിക്കാർ സാധാരണയായി ഒരു പ്രാവശ്യം കളപറിച്ച് തിനുശേഷം മൂന്നു നാല് ഇടകൊത്തു് അനയോജ്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടത്തുകയാണ് പതിവ്.

വിരളനം. കിളിർപ്പിലും വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ട് ആവശ്യമായതിന്റെ രണ്ട് മൂന്നിരട്ടി കൂടുതൽ വിത്തു് പരുത്തി കൃഷിക്ക് വിതയ്ക്കാറുണ്ട്. മുളച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത തഴപ്പു പോരാത്ത തൈകൾ പരിച്ചുകളയുന്നു. ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികൾ മാത്രമേ ഈ വിരളത്തിനു ശേഷം വയലിൽ നിർത്തുകയുള്ളൂ. ഇളം പ്രായത്തിൽതന്നെ വിരളനം നടത്തുന്ന പക്ഷം വൃമാവിലുള്ള പോഷകനഷ്ടം മണ്ണിനുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ചെടികൾ തിങ്ങികൂടി വളർന്നാൽ അവ കാഴ്ചയെ പോകും. വൈകി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വിള പാകമാകാൻ വൈകുമെന്നും ഉല്പാദനം കുറയുമെന്നും പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തലപ്പുകോൽ. പരുത്തി പുഷ്പിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപു തലപ്പുകോതുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് ചെടിയുടെ കായികവളർച്ച നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും തൽഫലമായി കൂടുതൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുകയും അവ വേഗത്തിൽ പാകമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നല്ല വളർച്ചയില്ലാത്ത പരുത്തിവിളയിൽ തലപ്പുകോൽ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിപുഷ്പനം. പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ദശയിൽ അതിൽനിന്നു പൂക്കളെയോ പൂമൊട്ടുകളെയോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് വിപുഷ്പനം എന്നു പറയുന്നത്. പൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നാൾ തൊട്ട് 25 ദിവസം വരെ പൂക്കളോ പൂമൊ

ട്ടുകളോ പഠിച്ചു മാറുന്നതു കൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവം. അതു പോലെ പുഷ്പി കാൽ തുടങ്ങി 14 ദിവസം മുതൽ 28 ദിവസം വരെ പൂക്കൾ പഠിച്ചുമാറിയ പശുക്കളുടെയിടയിൽ കൂടുതൽ ഫലദായകങ്ങളായ ശി വരങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും അങ്ങനെ വിളവ് വർദ്ധിച്ചതായും കണ്ടി ട്ടുണ്ട്.

വിപർണനം (ഇലകൊഴിക്കൽ). പശുക്കളുടെ ഇലകൾ നിഴലുണ്ടാക്കി പണിക്കായ്ക്കുള്ള മറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരത് കാല ത്തും അത് പൊട്ടിവിടരാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നു. പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ പണിക്കായ്ക്ക് വിടുന്നതിന് അനുകൂലമായ പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. വിപർണനം മൂലം പണിക്കായുടെ ചുറ്റും നല്ല കാര്യം സൂര്യപ്രകാശവും കിട്ടാനിടയാകുന്നു ഇതു പണിക്കായ്ക്ക് പൊട്ടിവിടരാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതു പോലെ വിളവെടുപ്പ് അനായാസമാക്കുന്നതിനും വിപർണനം സഹായിക്കും. യന്ത്രമുപയോഗിച്ച് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. സാവധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിപർണനം നടത്തുന്നത്. ഇല പൊഴിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന രാസ വസ്തുക്കൾ പൊടിയാക്കിട്ടും ദ്രാവകരൂപത്തിലും ഉണ്ട്. ഇലയിൽ കൂടുതൽ ജലകണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പൊടി രൂപം. ഇലയിൽ ജലകണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ തളിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ താഴെത്തന്ന പേജിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയാണ്.

കാൽസിയം സയനാമൈഡ് (പൊടി)	ഹെക്ടറിന് 22.5 കിലോഗ്രാം മുതൽ 45 കി.ഗ്രാം വരെ പൊടി ആവശ്യമാണ്.
മോണോസോഡിയം സയനാമൈഡ് (പൊടി)	ഹെക്ടറിന് 45 കി. ഗ്രാം മുതൽ 50 കി. ഗ്രാം വരെ പൊടി ആവശ്യമാണ്.
അമോണിയം തയോസയനയിററ്	ഹെക്ടറിന് ഏകദേശം 11 കി. ഗ്രാം വീതം ആവശ്യമാണ്.

(ദ്രാവകരൂപത്തിൽ തളിക്കാവുന്നതും)	വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കാവുന്നതും.
പൊട്ടാസിയം സയനേറ്റ് (ദ്രാവകരൂപം)	ഹെക്ടറിന് 5.6 കി.ഗ്രാം മുതൽ 11.2 കി.ഗ്രാം വരെ ഉപയോഗിക്കാം.
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പെ ൻറാ ബോറേറ്റ്	ഹെക്ടറിൽ 6.75 കി.ഗ്രാം മുതൽ 9 കി. ഗ്രാം വരെ തളിക്കണം.
(ദ്രാവകരൂപം)	
സോഡിയം മോണോക്ലോറോ അസിനേറ്റ്	ഹെക്ടറിന് 4.5 കി.ഗ്രാം മുതൽ 11.25 കി.ഗ്രാം വരെ തളി ക്കണം.
(ദ്രാവകരൂപം)	
അമിനോ ട്രൈസോൾ	ഹെക്ടറിന് 2.50 കി.ഗ്രാം മുതൽ 3.75 കി.ഗ്രാം വരെ ഉപയോഗിക്കാം.
(ദ്രാവകരൂപം)	

ജലസേചനവും ജലനിർഗമനവും

മണ്ണിലെ ഈർപ്പനില പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ജലാംശം തീരെകുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. വർധിച്ച വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം ചെടി വളരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മണ്ണിലെ അനുയോജ്യമായ ഈർപ്പനിലയാണ്.

ഗുരുത്വമണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതിവൃഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് പരുത്തിച്ചെടിക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒറ്റ ദിവസത്തെ വെള്ളക്കെട്ടു പോലും പരുത്തിച്ചെടിക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതു കൊണ്ട് അതിവൃഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീർവാർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ചാലുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കീരേണതോവശ്യമാണ്.

ഭാരതത്തിൽ മൊത്തം പരത്തിസ്ഥലത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 13 ശതമാനത്തോളം ജലസേചനസൗകര്യമുള്ളതാണ്. പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പരത്തി ജലസേചിതവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഉപരിതലജലസേചനമാണ് മിക്കവാറും ചെയ്യാറുള്ളത്. ഭൂമി സാമാന്യം നിരപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് പരത്തി വിതയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാസ്ഥലത്തും ഒരു പോലെ നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വയൽ നിറഞ്ഞു കവിയത്തക്ക വണ്ണം വെള്ളം കയറ്റിയാണ് ഉപരിതലജലസേചനം ചെയ്യുന്നത്. ചാലുകൾ വഴിയുള്ള ജലസേചനം തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. വെള്ളം കയറ്റിയുള്ള നനയ്ക്കൽ കൂടുതൽ ജലം ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ജലസേചനം പ്രായംകുറഞ്ഞ ചെടികൾക്ക് നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചാലുകൾ വഴി ജലസേചനം ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ, ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അന്തഃസ്രവണം വഴിയാണ്. ആകയാൽ മണ്ണിൽ വായുപ്രവേശം ശരിക്കും നടക്കുന്നു. യഥാവിധി ജലസേചനം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് കായികവളർച്ച വർധിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ പണതിക്കായ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവ പൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ നില്ക്കുമെന്നുമാണ് അനുഭവം.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന പരത്തി, മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നരണ്ടു മാസം മുമ്പ്, അതായത് ഏപ്രിൽ-മേയ് മാസങ്ങളിൽ തന്നെ, വിതയ്ക്കുന്നു. കൃഷിയിറക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നിലം ഒരുവട്ടം നന്നായി നനയ്ക്കണം. പിന്നീടുള്ള ജലസേചനം മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പനില, കാലാവസ്ഥ, ചെടിയുടെ പ്രായം തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി, കൃഷിയിറക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ജലസേചനം അഞ്ചാറാഴ്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അത് അവയുടെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്നാൽ, ആവശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞു കൂടെക്കൂടെയുള്ള ജലസേചനം—പ്രത്യേകിച്ചു പൂക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ—ഒഴിവാക്കേണ്ട

താണ്. പൂക്കുന്ന കാലമാണ് പരുത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജലാവശ്യത്തിന്റെ നിർണായകഘട്ടം. പരുത്തിച്ചെടി ഉച്ചകോടിയിൽ പൂക്കുന്ന കാലത്ത് ജലദുർലഭ്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പൂക്കളും മൊട്ടുകളും ഇളം പഞ്ഞിക്കായും പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാകും. ഈ ദശയിൽ പത്തു പന്ത്രണ്ടു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ജലസേചനം നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കോയമ്പത്തൂരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും, മൂന്നാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പരുത്തി നനച്ചാൽ മതിയാകുമെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു.

പഞ്ഞിക്കായ് പൊട്ടിവിടരുന്നതോടു കൂടി ചെടിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം കുറയുന്നു. അതോടെ നനക്കൽ തമ്മിലുള്ള ഇടവേളകളുടെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. താമസിച്ചുണ്ടാകുന്ന പഞ്ഞിക്കായ് പാകമാകുന്നതിനും ചെടിയുടെ നിലനില്പിനും വേണ്ടത്ര ജലാംശം മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. ഈ ഘട്ടത്തിനു ശേഷം കൂടുതൽ ജലസേചനം നടത്തിയാൽ ചെടിയുടെ വളർച്ച നീണ്ടുപോകുന്നതും കീടങ്ങളുടെയും ശീതപാതത്തിന്റെയും ഉപദ്രവം കൂടുതലാകുന്നതുമാണ്.

പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ 1940 മുതൽ 1947 വരെ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ലോം മണ്ണിൽ (പശിമരാശിമണ്ണ്) പരുത്തിച്ചെടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണവളർച്ചയ്ക്ക് ആകെ 34 ഏക്കർ ഇഞ്ച് വെള്ളം ആവശ്യമായിക്കണ്ടു, ചെടി വളരുന്ന കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയും പരുത്തി വിതയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നൽകുന്ന ജലസേചനവും കൂടി കണക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള അളവാണ് മേലുദ്ധരിച്ചത്. ഇതേ പാനത്തിൽ നിന്നു തന്നെ, നടുനത്തിനു മുമ്പ് 4 ഏക്കറിഞ്ച് വെള്ളവും പിന്നീടുള്ള ഓരോ ജലസേചനത്തിനും 3 ഏക്കറിഞ്ച് വെള്ളവും പരുത്തിയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്നു കണ്ടു. വിതച്ചതിനു ശേഷം 6 പ്രാവശ്യമേ ജലസേചനം നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും ഈ പാനം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകിലും ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്നു അളവിൽ ജലസേചനം ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിക്കുക സാധ്യമല്ല. കൃഷി ചെയ്യുന്ന പരുത്തിയിനു

ഞ്ഞെയും അതു വളരുന്ന മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും, സർവ്വോപരി കാലാവസ്ഥയെയും ആസ്പദമാക്കിയാണ് ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്,

വിളപരിക്രമം

വിളപരിക്രമം അനുവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരുത്തിയുടെ വിളവ് വർധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. വിവിധസ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം, കാലാവസ്ഥ, ജലസേചനസൗകര്യം, കൃഷിക്കാരുടെ അഭിരുചി ഇവയനുസരിച്ച് വിളപരിക്രമത്തിലും ഏകദേശമായ മറ്റു വിളകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരപ്രദേശ്, ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വിളപരിക്രമങ്ങൾ പരുത്തി-ഗോതമ്പ്, പരുത്തി-ചോളം, പരുത്തി-ഗോതമ്പ്-കടുകുവർഗങ്ങൾ, ഇവയാണ്. ഉത്തരപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളവെടുപ്പിന് മുമ്പായി പയറുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിള വീതയ്ക്കു പതിവാണ്. ഈ വിള കൊയ്തതിനു ശേഷം ഗോതമ്പ് കൃഷിയിറക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു പരിക്രമവ്യവസ്ഥയാണ് ഈ രീതി ആദായം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപകാലത്തായിട്ട് ഉത്തരപ്രദേശ് പരുത്തി-പയർ-ഗോതമ്പ് എന്ന വിളപരിക്രമരീതി വളരെ പ്രചാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരുത്തി-നിലക്കടല, പരുത്തി-പരുത്തി, പരുത്തി-ചോളം, പരുത്തി-ചോളം-നിലക്കടല തുടങ്ങിയ വിളപരിക്രമരീതികളിൽ, പരുത്തി-നിലക്കടല എന്ന രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ “കപ്പാസ്” കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു.

പഞ്ചാബിൽ പരുത്തികൃഷി ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി ആ സ്ഥലത്തു് ഈജിപ്ഷ്യൻക്ലോവർ എന്ന കാലിത്തീറ്റ കൃഷിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പരുത്തിയുടെ വിളവ് വളരെമെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഗോതമ്പ്-പയർ-പരുത്തി എന്ന വിളപരിക്രമം ഇവിടെ ഫലപ്രദമായി നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്.

രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബോംബെ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കരി മണ്ണിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്ന പരുത്തിവിളയെത്തുടർന്ന് ചോളം കൃഷിചെയ്യുന്നു.

ബജറ കൃഷിചെയ്തതിനു ശേഷം പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിളവാണ് ചോളം കൃഷിചെയ്തതിനു ശേഷം പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ചോളം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ സോഡിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ദോഷത്തിന്റെ കാരണമത്രേ. ബജറ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. ചോളത്തിന്റെ ഈ ദോഷഫലം കറുത്തുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു, ഈ വിളയ്ക്ക് യന്ത്രമല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അടിക്കണപ്രായത്തിൽ മുറിച്ചുകളഞ്ഞാൽമതി. മണ്ണിലെ പോഷകധാതുക്കളുടെ നഷ്ടം, ചോളത്തിന്റെ വേരിൽ നിന്ന് വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന വിഷവസ്തു, ജൈവവസ്തുക്കൾ അഴുകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ, മണ്ണിലെ അണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ടും ഈ ദോഷഫലം ഉണ്ടാകാമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

ചുവന്ന മണ്ണിൽ പരുത്തി-ചോളം, പരുത്തി-ബജറ, പരുത്തി-നിലക്കടല, പരുത്തി-എളുത്ത്, പരുത്തി-അവണക്ക് പരുത്തി-കുവരക് എന്നീ വിളപരിക്രമരീതികളാണ് അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലസേചിത പരുത്തി ജലസേചിത കൂവരകമായിട്ടോ നിലക്കടല, മുളക്, പുകയില, കരിമ്പ്, മക്കച്ചോളം, പച്ചക്കറിവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായിട്ടോ പരിക്രമത്തിലുൾപ്പെടുത്തിയാണ് കൃഷിചെയ്യുന്നത്.

സമീപകാലത്തായി ബോംബെ, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടകം, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, നിലവിലുള്ള ദിവർഷ വിളപരിക്രമരീതികളായ, പരുത്തി-ചോളം, പരുത്തി-ഗോതമ്പ് എന്നിവയിൽ നിലക്കടല കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ത്രിവത്സരവിളപരിക്രമരീതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശത്തും ബോംബെയിലും ദീർഘ

കാലം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലക്കടലകൃഷിക്ക് ശേഷം പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഗോതമ്പുകൃഷിക്ക് ശേഷമോ ചോളകൃഷിക്കുശേഷമോ നടത്തുന്ന കൃഷിയിലേതിനേക്കാൾ 15% മുതൽ 20% വരെ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. പരുത്തിക്കും ധാന്യവിളയ്ക്കും ഇടയ്ക്കും പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിള കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കളകളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ പരുത്തിവിളയ്ക്കു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും പയറുവർഗവിളയും അതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ധാന്യവർഗവും കൃഷിചെയ്യുന്ന പരിശ്രമരീതിയാണ് ഏറ്റവും സഹകാര്യമായിട്ടുള്ളത്.

മിശ്രകൃഷി

ഭാരതത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യാപ്പറ്റുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ചു മഴ കുറവായ ഭാഗങ്ങളിൽ, പരുത്തിയോടൊപ്പം മറ്റു വിളകളും കൃഷി ചെയ്യുക സാധാരണമാണ്. മധ്യ പ്രദേശത്തും മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും പരുത്തിക്കുറി മണ്ണിൽ, പരുത്തിയുമായി മക്കച്ചോളം കലർത്തി കൃഷിചെയ്യാറുണ്ട്. പരുത്തിയുടെയും മക്കച്ചോളത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ തമ്മിൽ 3:1 എന്ന ക്രമത്തിൽ കലർത്തി ഒരു ഹെക്ടറിന് 27 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ വിതയ്ക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശത്തെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്ന പരുത്തിയോട് ചോളം, മുതിര, എള്ള്, മല്ലി, വെണ്ട തുടങ്ങിയവ കലർത്തി കൃഷിചെയ്യുന്നു.

ആസ്സാമിലെ കുന്നിൻ ചരിവുകളിൽ, പരുത്തിയുമായി നെല്ല്, വെണ്ട, മറ്റു പച്ചക്കറികൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കലർത്തിയാണ് കൃഷിചെയ്യുന്നത്. മരച്ചീനിനും കൈച്ചക്കയും പരുത്തിയുമായി ഇടകലർത്തി നടന്നതും അപൂർവമല്ല.

മധ്യഭാരതത്തിലും മറ്റും പരുത്തി ഒരു ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ തുവരയുമായി ചേർത്തു് രണ്ടു വരി തുവരയ്ക്ക് പതുവരി പരുത്തി എന്ന തോതിലാണ് ഈ

ഇടവിളയെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഉത്തരകർണാടകത്തിൽ പരുത്തിയുമായി നിലക്കടല ഇടകലർത്തി കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്രയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പരുത്തി, നിലക്കടലയുമായും കൂവരകമായും ഇടകലർത്തി വിതയ്ക്കാറുണ്ട്. പത്തുവരി നിലക്കടലയും ഒരുവരി പരുത്തിയും എന്ന ക്രമത്തിൽ നടന്നു കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞ ഭൂമിയിലെ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ കഴിയും. അതു പോലെ മഴ കുറവായ ആന്ധ്രജില്ലകളിൽ രണ്ടു വരി തിനയും, ഒരുവരി പരുത്തിയും ഇടകലർത്തിയുള്ള കൃഷിരീതി പണ്ടുതൊട്ടേ നടപ്പുള്ളതാണ്. ഇതിന് “കൊറ-പത്തി” മിശ്രിതമെന്നു പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം കൃഷിചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മഴയില്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള വിളനാശം മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

വളങ്ങളും വിളപ്രയോഗവും

ഭാരതത്തിൽ മഴയെ ആശ്രിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ പരുത്തിവിള ഒരു ഹെക്ടർ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25.75 കി.ഗ്രാം നൈട്രജനും 20 കി.ഗ്രാം ഫോസ്ഫറും 87.50 കി.ഗ്രാം പൊട്ടാഷും വലിച്ചെടുക്കുന്നതായി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന വിളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം രണ്ടു മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് കിട്ടത്തക്കവണ്ണം മൂലകങ്ങൾ വേണ്ട അളവിൽ യഥാകാലം മണ്ണിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സസ്യ മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി കൃഷിചെയ്യുന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ സമ്പന്നമാണല്ലോ ആദ്യമായി കൃഷിയിറക്കുന്ന കന്നി മണ്ണ്. തുടർച്ചയായി കൃഷിയിറക്കുന്നത് കൊണ്ട് മണ്ണിലെ വളം ശങ്ങൾ വർഷം പ്രതി നശിച്ചു, ഉല്പാദനക്ഷമത തീരെ കുറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ വർഷം തോറുമുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ നഷ്ടവും മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവികമായുള്ള ഫലപുഷ്ടി വീണ്ടെടുക്കലും തമ്മിലൊരു സന്തുലന കൈവരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണതിയുടെ ശരാശരി വിളവുവച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മേൽ ഉദ്ധരിച്ച സന്തുലന എത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി ശങ്കിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏകിലും ശരിയായ അളവിൽ വളം ചേർക്കുകയും മണ്ണിൽ ആവ

ശ്യാമസാന്നം. ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും, ചെച്ചപ്പൊട്ടി വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും, സർവ്വോപരി യഥാകാലം സസ്യസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരാശരി പണത്തിവിളവ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേതിനോടൊപ്പമെത്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

പൊതുവെ ഭാരതത്തിൽ പരുത്തികൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിക്ക മണ്ണുകളിലും ഫോസ്ഫറസ്സ്, പൊട്ടാഷ്യം ഉയർന്ന തോതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നൈട്രജനും ജൈവാംശങ്ങളും തുലോം പരിമിതമാണ്. പരുത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും വളപ്രയോഗം നടത്താറില്ല. കാലിവളം സാധാരണ ഭക്ഷ്യവിളകൾക്കും പരുത്തിയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു വാണിജ്യവിളകൾക്കും ചേർക്കുകയാണ് പതിവ്. വിളപരിക്രമത്തിലൂടെ പ്പെടുത്തി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന ധാന്യവിളകൾക്കു ചേർക്കുന്ന വളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രമേ പലപ്പോഴും പരുത്തിക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ.

വടക്കൻ 'ഹിർസൂട്ടം-ആർബോറിയം' മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഹെക്ടറിന് 13൪ കി.ഗ്രാം നൈട്രജൻ നൽകുന്നപക്ഷം ആദായകരമായ വിളവ് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടു. പകുതി നൈട്രജൻ വളം വിതളനസമയത്തും ബാക്കി പൂക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പും നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം. 1956-ൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്, 56 കി.ഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ്സ് സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് രൂപത്തിൽ പരുത്തിക്കു മുൻപും കൃഷിചെയ്യുന്ന 'ഈജിപ്ഷ്യൻ കേളാവറിസ്' നൽകുന്നതു കൊണ്ടു പ്രസ്തുത പയറുവർഗ്ഗകാലിത്തീറായുടെ വിളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനു പുറമേ പിന്നീട് വരുന്ന പരുത്തിയ്ക്കു കൂടി അതിന്റെ അവശിഷ്ടം ലഭിക്കുമെന്നും വെളിപ്പെട്ടു.

മധ്യ ആർബോറിയം മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ജലസേചനം ചെയ്യുന്നതും മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്നതുമായ പരുത്തി ഇനങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻവളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കൂടുതൽ വിളവ് ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടു.

അമോണിയം സൾഫേറ്റും നിലക്കടലപ്പിണ്ണാക്കുമാണ് ഏറാവും ഫലപ്രദമായ നൈട്രജൻ വളം, പിന്നീടുള്ള പാമ്പത്തളിൽ നിന്നും, ഇനിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വളപ്രയോഗരീതികൾ അഭികാമ്യമാണെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. മഴ കറവാണെങ്കിൽ മഴ കിട്ടുമെന്നുറപ്പിക്കാവുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല വിളവു കിട്ടുന്നതിന് ഫെക്റ്ററോനിൻ 22.25 കി.ഗ്രാം നൈട്രജൻ നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മഴ താരതമ്യേന കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫെക്റ്ററിൻ 44.5 കി.ഗ്രാം വരെ നൈട്രജൻ നൽകാവുന്നതാണ്. വിളപരിക്രമത്തിൽ ഒരു പയറുവർഗവിള ഉൾപ്പെടുത്തി അതിന് 33.5 കി.ഗ്രാം 'ഫോസ്ഫറസ്' നൽകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെത്തുടർന്നുവരുന്ന പരുത്തിച്ചെടിയുടെ വിളവു വർദ്ധിക്കുന്നതായ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രാസവളങ്ങൾക്കു പുറമെ ഫെക്റ്ററിൻ 10 ടൺ കാലിവളമോ കമ്പോസ്റ്റോ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.

'തെക്കൻ ഹിർസുട്ടം-ആർബോറിയം' മേഖലയിൽ സാധാരണയായി പരുത്തിയ്ക്ക് വളം ചേർക്കാറില്ല. മുൻയാന്യവിളയ്ക്ക് ധാരാളം കാലിവളം ചേർക്കുന്നതിനാൽ അവശിഷ്ടവളം പരുത്തിക്ക് കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പരുത്തിക്ക് കാലിവളവും ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന വിളയ്ക്ക് രാസവളങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. 44.5 കി.ഗ്രാം നൈട്രജൻ രണ്ടു ഗഡുക്കളിലായി-പകുതി വിത്ത് പിതയ്ക്കുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളത് പൂക്കുമ്പോഴും-അമോണിയം സൾഫേറ്റായോ നിലക്കടലപ്പിണ്ണാക്കായോ നിലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന കമ്പോഡിയ പരുത്തിയുടെ വിളവു വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ആടുതറയിൽ' നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ, 68 കി.ഗ്രാം നൈട്രജൻ പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരുത്തിയുടെ വിളവു പരമാവധി ലാഭകരമായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണ്ടു. എന്നാൽ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷും നൽകുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രയോജനമൊന്നുമുള്ളതായിക്കണ്ടില്ല.

കോവിൽപ്പട്ടിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്ന പരുത്തിക്ക് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് എന്നിവ നൽകുന്നത് കൊണ്ടും വിളവു

വർധിക്കുമെന്നു ഐ. റെളിറ്റേറ്റു. ഭാവാനി സാഗറിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ജലസേചനമുള്ള പരുത്തിയുടെ വിളവു, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് എന്നിവ നൽകുന്നതു കൊണ്ടു വർധിക്കുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടതു്.

രാസവളം ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ജലസേചനവും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടുകയില്ല. വളം ചേർക്കാതെ ജലസേചനം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടും വലിയ പ്രയോജനമില്ല. നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന പക്ഷം 'കായികവളർച്ച' അമിതമാകും. ഇതു് ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ലല്ലോ. മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പരുത്തിക്കു് ഹെക്ടറിനു് 22.25 കി.ഗ്രാം നൈട്രജനും ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന പരുത്തിക്കു് 44.5-66.75 കി.ഗ്രാം നൈട്രജനും സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അനുയോജ്യമാത്രകളാണു്. മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്ന പരുത്തിക്കു് ജൈവവളങ്ങളായ കാലിവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, പിണ്ണാക്കു് തുടങ്ങിയവ വിതയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ അഴുകിചെടിക്കു് ലഭ്യമാകത്തക്കവിധം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. വിത്തു് വിതയ്ക്കുന്നതിനും ചെടി പൂക്കുന്നതിനും മുമ്പായിട്ടു്, രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി നൈട്രജൻ വളം നൽകുന്നതാണു് സന്ധ്യവളർച്ചയ്ക്കും കായറയ്ക്കുന്നതിനും നല്ലതു്. നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ സ്പ്രേ രൂപത്തിൽ പരുത്തച്ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ തളിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് വളത്തിന്റെ അളവു് കുറയ്ക്കാമെന്നു് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 കിലോഗ്രാം നൈട്രജൻ അടിവളമായി മണ്ണിലും 10കിലോഗ്രാം നൈട്രജൻ (ഒരു ഹെക്ടറിനു്) നട്ടു് 45-ാം ദിവസത്തിനടുപ്പിച്ചു് ചെടികളുടെ ഇലകളിലും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു്, 70 കിലോഗ്രാം നൈട്രജൻ ചെടികൾക്കു മണ്ണിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനു തുല്യമായ വിളവു് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. രാസവളങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പർണപോഷണം (foliar nutrition) പ്രത്യേകം പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നു.

പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോസ്ഫറസ് പ്രയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടു് പ്രത്യേക പ്രയോജനം ഉള്ളതായി കണ്ടില്ല. എന്നാൽ വിളപരിക്രമത്തിലുൾപ്പെട്ട മുൻ പയറുവർഗവിളയ്ക്കു് ഫോസ്ഫറസ്

നൽകുന്നപക്ഷം തുടർന്നുവരുന്ന പരുത്തിക്ക് അതു വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് പല പരീക്ഷണങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും

പരുത്തി പൂക്കുന്ന കാലം കററ നീണ്ടതാണ്. ഒരു വയലിൽ നിലുക്കുന്ന എല്ലാ ചെടികളും ഒന്നിച്ചു പൂക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഓരോ ചെടിയിലും പൂക്കളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സാധാരണയായി പരുത്തിക്കുരുവിതച്ചു രണ്ടുരണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ചെടി പൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പൂക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എടുപത്തു ആഴ്ച വരെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യത്തെ എടുപത്തു ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാനും പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ധാരാളം പൂക്കൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഘട്ടം മൂന്നുനാലാഴ്ച നീണ്ടുനില്ക്കും. പിന്നീട് പൂക്കൾ ക്രമേണ കുറയുന്നു. ഈ പ്രത്യേക സ്വഭാവം മൂലം വിളവെടുപ്പുകാലം ഏതാണ്ട് മൂന്നുനാലുമാസം നീണ്ടുനില്ക്കും. സാധാരണയായി മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് വിളവെടുക്കുന്നത്. ചിലയിനങ്ങളിൽ കായ് പ്രായമാകുമ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇടയുള്ളതു കൊണ്ട് കൂടുതൽ തവണ വിളവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിവരും.

പരുത്തിയുടെ ഇനം, പാകമാകുന്ന കാലം, വർഷകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, കൃഷിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പരുത്തിവിതയ്ക്കുന്ന കാലം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വിളവെടുക്കുന്ന സമയവും കാലദൈർഘ്യവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പഞ്ചാംബു, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തരപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്ന പരുത്തിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ പരുത്തിയിൽ വിളവെടുപ്പുകാലം ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരിവരെയോ, ശീതപാതം ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതുവരെയോ നീണ്ടുനിൽക്കും. മഴ താരതമ്യേന നേരത്തേ നിലയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങി നവംബർ മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. സാധാ

രണ മൂന്നാഴ്ച ഇടവിട്ട്, നാലു മുതൽ ആറു വരെ ഗഡുക്കളിലായി വിളവെടുപ്പു പൂർത്തിയാക്കും. ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട്, കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോക്കനാടൻ പരത്തി ആഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ വിതച്ചു ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കുന്നു. കമ്പോടിയപരത്തി സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ വിതച്ചു ഫെബ്രുവരി മുതൽ മേയ്-ജൂൺ മാസങ്ങൾ വരെ വിളവെടുക്കുന്നു. നേരത്തേ പാകമാകുന്ന, ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ പരത്തി തഞ്ചാവൂർ ഡെൽറ്റയിൽ നെൽകൃഷിക്കുശേഷം ഡിസംബറിലോ ജനുവരിയിലോ കൃഷിയിറക്കുന്നു. മാർച്ച് മാസം മുതൽ മേയ് മാസം വരെ ഈ വിളയിൽ നിന്ന് പഞ്ഞി പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. ക്ഷീണേന്ത്യയിൽ ശീതപാതം അനുഭവപ്പെടാത്തതു കൊണ്ട്, മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാക്കാലവും പരത്തി കൃഷിചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് എക്കാലവും വിളവെടുപ്പും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പാകമായ പഞ്ഞിക്കായിൽ നിന്ന് പഞ്ഞി ശേഖരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതേ സ്ഥലത്തു വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്.

ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കൈകൊണ്ടാണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 'ഏഷ്യാറിക്ക' ഇനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വിസ്തൃതിയിൽ താരതമ്യേന കൂടുതൽ ചെടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടും അവയുടെ പഞ്ഞിക്കായ്കൾ താരതമ്യേന ചെറുതായതു കൊണ്ടും വിളവെടുപ്പ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ, വേനൽക്കാലത്തു കൃഷിയിറക്കിയിട്ടുള്ള പരത്തിയുടെ വിളവെടുപ്പു സമയത്തു തോരാത്ത മഴയുണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണവളർച്ച എത്തിയ പച്ച പഞ്ഞിക്കായ് പഠിച്ചെടുത്തു വീട്ടിൽ വച്ചു കായ് പിളർന്ന് പഞ്ഞിയും കരുവും വെച്ചേറെയാക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ പഞ്ഞി ശരിക്കും പാകമായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അതിന് നനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പഞ്ഞി വീടുകളുടെ വരാന്തയിലും മറ്റും നിരത്തി ഉണക്കി എടുക്കുന്നു. ഉത്തരഘോഷത്തിലും മറ്റും പരത്തി വിളവെടുക്കുന്ന മാർച്ച്

ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നല്ല വരണ്ട കാറ്റു വിശുദ്ധത കൊണ്ടു, പാകമാകുമ്പോൾ ഭാഗികമായി മാത്രം പൊട്ടിവിടുന്ന കായുള്ള ഇനം പരുത്തിയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നത്. ഈ പഞ്ഞിക്കായ് പഠിച്ചു കൃഷിക്കാരുടെ താമസസ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ പഞ്ഞി എടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ “ജിന്നിങ്ങ് ഫാക്ടറി” കളിൽ വെച്ചു പഞ്ഞി എടുക്കുന്നു. മധ്യഗന്ധവിലുള്ള വിളവെടുപ്പിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ഞി കിട്ടുന്നത്. ഇതു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ആന്ധ്ര, കർണാടകം തമിഴ് നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന ‘ഫെർണെഡിയം’ പരുത്തിയുടെ കാക്കുളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒന്നിച്ചു പാകമാകുന്നതു കൊണ്ടു, ഇവിടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പഠിച്ചെടുക്കലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പന്നിടുള്ള പഠിച്ചെടുക്കലിൽ നിന്നും കറഞ്ഞ അളവിലേ പഞ്ഞി കിട്ടുന്നുള്ളു.

കൈകൊണ്ടു പഞ്ഞി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ശുദ്ധമായ പഞ്ഞി പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചെലവേറിയ ഒരു പണിയാണിതു്. വിദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ, യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിളവെടുക്കുന്നത്. സ്പിൻഡിൽ മാതൃകയിലുള്ള വിളവെടുപ്പു യന്ത്രത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചാരം. ഒറ്റ നിരയിലും ഇരട്ട നിരയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന യന്ത്രങ്ങളുണ്ടു്. ഒറ്റ നിരയത്രം സാധാരണയായി ദിവസത്തിൽ 3/4 സ്വയിൽ പഞ്ഞിയോളം പഠിച്ചെടുക്കുന്നു.

സംസ്കരണം

ജിന്നിങ്ങ് (പഞ്ഞികടയൽ). പരുത്തിയിൽ നിന്നു പഠിച്ചെടുത്ത അസംസ്കൃതമല്ലുന്നതെ “കപ്പാസ്” എന്നു പറയുന്നു. പഞ്ഞിനാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു്, അതിനെ പരുത്തിഅരിയിൽ നിന്നു് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം, പരുത്തിക്കുരു പഞ്ഞിയിൽ നിന്നു് വേർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തിയെ “ജിന്നിങ്ങ്” എന്നു പറയുന്നു പഞ്ഞിനാൽ കുരുവും ദൃഢമായി ചേർന്നി

രിക്കും, കരുവിൽ നിന്ന് നാൽപ്പേർപെട്ടത്താൽ സാമാന്യം ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന. ശരിയായ രീതിയിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കരുവിൽ നിന്നു പഞ്ഞി മാറിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, പഞ്ഞി വല്ലാതെ മുറിഞ്ഞു അതിന്റെ ഇഴഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് 'ജിന്നിങ്ങ്' അതീവശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ജിന്നിങ്ങ് സമയത്തു പഞ്ഞിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേട് സംഭവിച്ചാൽ അതു പിന്നീട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൈ കൊണ്ടാണ് ജിന്നിങ്ങ് ചെയ്തിരുന്നതും. പിന്നീട് ഇരുമ്പു കൊണ്ടുള്ള റോളർ ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പായ കല്ലിൽ നിരത്തിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിന്റെ പുറത്തു ചവിട്ടി ഉരുട്ടി കരു തെറിച്ച് കളഞ്ഞ് 'ജിന്നിങ്ങ്' നടത്തിയിരുന്നു. ജിന്നിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രിക്ക് 'ജിൻ' എന്നു പറയുന്നു. 'ചർക്ക്'ജിൻ ആണ് ആദ്യമായി പഞ്ഞി കടയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട യന്ത്രം. ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു തന്നെ ഭാരതത്തിൽ 'ചർക്ക്'ജിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടം വരെ ഭാരതത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പഞ്ഞിയുടെ സിംഹഭാഗവും ചർക്ക്ജിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കടഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും, വിശേഷിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ, 'ചർക്ക്'ജിൻ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 'ചർക്ക്' ജിന്നിൽ പിൽക്കാലത്തു പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ കൈകൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 'ജിന്നുകൾ' വൻതോതിലുള്ള പഞ്ഞികടയലിനു പ്രയോജനപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടു് യന്ത്രവൽകൃതജിന്നുകളാണ് ഇന്ന് വൻതോതിൽ പഞ്ഞികടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 'റോളർ ജിൻ' ആണ്.

ജിന്നിങ്ങ് ശതമാനം പഞ്ഞിക്കായിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കരു കലർന്ന പഞ്ഞിക്ക് 'കപ്പാസ്' എന്നാണല്ലോ പറയു

നൂത്ത്. കരുവില്ലാത്ത പഞ്ഞിക്ക് 'ലിൻറ' എന്നു പറയുന്നു. ശുദ്ധ പഞ്ഞിയും കരുവുള്ളപഞ്ഞിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ശതമാനകണക്കിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് 'ജിന്നിങ്ങ്' ശതമാനം. അതായത് 'ജിന്നി'ലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന നിശ്ചിത അളവിലുള്ള 'കപ്പാസ്' കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശുദ്ധപഞ്ഞിയുടെ ശതമാനക്കണക്കിലുള്ള അളവിനെ 'ജിന്നിങ്ങ്' ശതമാനം' എന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ശുദ്ധപഞ്ഞിയുടെ ഉൽപാദനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

കൗണ്ടു. പഞ്ഞിനാരിന്റെ നേർമ വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് കൗണ്ടു. അര കി. ഗ്രാം ഭാരത്തിന് സമമായ നൂൽക്കഴികളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു കൗണ്ടു എന്നു പറയുന്നു. ഒരു കഴിയിൽ 840 വാര നൂൽ കാണം. നൂലിന്റെ നേർമ വർധിക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടും വർധിക്കും. ഭാരതത്തിൽ സാധാരണ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ഞി 22 കൗണ്ടുകളിൽ കൂടുതൽ നൂൽ നൂൽക്കാറില്ല. എന്നാൽ നല്ലയിനം പരുത്തി കൊണ്ടു 80 കൗണ്ടുകൾ മുതൽ ചിലപ്പോൾ 400 കൗണ്ടുകൾ വരെ നൂൽ നൂൽക്കാൻ കഴിയും.

പ്രസ്സിങ്ങ്. പഞ്ഞി ഒരു സ്ഥൂല ഉൽപന്നമായതു കൊണ്ടു സംഭരിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി അതു യാന്ത്രികമായി പ്രസ്സ് ചെയ്ത് കെട്ടുക എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ പതുരക്കെട്ടുകളാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടു് ഈ പ്രവൃത്തിക്കാണ് പ്രസ്സിങ്ങ് എന്നു പറയുന്നത്.

പരുത്തിക്കുരു. പഞ്ഞിയോടൊപ്പം പരുത്തിയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനമായ ഉല്പന്നമാണ് പരുത്തിക്കുരു. ഇതു ശുദ്ധപഞ്ഞിയുടെ രണ്ടു മൂന്നിരട്ടി വരും. പരുത്തിക്കുരു ഗുണമേറിയ ഒരു കാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കാം. ചിലപ്പോൾ പരുത്തിക്കുരുവിൽ നിന്നു എണ്ണയും എടുക്കാറുണ്ടു്.

പഞ്ഞിയുടെ വിപണനം. നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ 'കപ്പാസുകൾ' ചെറുകിട വ്യപാരികൾക്കോ ജിന്നിങ്ങ് മില്ലുകളുടെ ഏജൻ്റമാർക്കോ വില്പനയ്ക്കാണ് പതിവു്. ജിന്നിങ്ങ് നടത്തിയതിനുശേഷം ശുദ്ധമായ പഞ്ഞി അയഞ്ഞ കെട്ടുകളായോ പ്രസ്സ് ചെയ്ത

കെട്ടുകുളായോ തയ്യാറാക്കുന്നു. അയഞ്ഞ കെട്ടുകൾക്ക് 90 കി. ഗ്രാം മുതൽ 135 കി. ഗ്രാം വരെ ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ അയഞ്ഞ കെട്ടുകളെ 'ബോറ' അഥവാ 'ഡോക്ര' എന്ന പറയുന്നു. പഞ്ഞിയെ പ്രാദേശിക നീക്കത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് 'ബോറ' യാക്കുന്നത്. പ്രസ്സ് ചെയ്ത കെട്ടുകൾക്ക് 180 കി. ഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള കെട്ടുകൾ ബഹുദൂരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പാണ്ടികൾക്കിടയിൽ നുകുപ്പിക്കുന്നതിനും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണുണ്ടാക്കുന്നത്. പഞ്ഞി കൃഷിക്കാരനിൽ നിന്ന് തുണിമില്ലിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പായി അനേകം ഇടനിലക്കാരുടെയും ചെറിയ കച്ചവടക്കാരുടെയും ഹസ്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ പഞ്ഞിയിൽ ധാരാളം മായം ചേർക്കൽ നടക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. സാധാരണ ഈർപ്പം കടത്തിയും താഴ്ന്നതരം പഞ്ഞി കൂട്ടിക്കലർത്തിയും ആണ് മായം ചേക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഉള്ള മായം ചേർക്കലിനെ തടയാനായി സഹകരണവിപണനസംഘങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിയന്ത്രിതവിപണികൾ സ്ഥാപിക്കാനും പഞ്ഞി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുവാനും ഓരോ മേഖലയിലും പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമങ്ങളും നടപടികളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷീണമേഖലയിലെ പ്രധാന പരത്തി ഇനങ്ങളുടെ കൃഷിരീതികൾ. മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ, കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഭാരതത്തിൽ പരത്തി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ വിവിധ മേഖലകളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണമേഖലയിൽ തമിഴ്നാടും കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊതുവിൽ ഭാരതത്തിലെ പരത്തികൃഷിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചവല്ലോ. ക്ഷീണമേഖലയിലെ പ്രധാന പരത്തിഇനങ്ങളുടെ കൃഷിരീതിയെപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി താഴെ വിവരിക്കാം. പരത്തിക്ക് തമിഴ് നാട്ടിൽ കാർഷികമായും വ്യാവസായികമായും ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം. ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരു അപ്രധാന വിളയാണ്.

വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുള്ള പരുത്തിവിളകളിൽ ദേശീ ഇനങ്ങളും വിദേശീ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദേശീപ്പരുത്തിയിനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് “മദ്രാസ് അമേരിക്കൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പോഡിയപ്പരുത്തിയാണ്. ഇടത്തരം നീളമുള്ള മേത്തരം ഈ കളോട കൂടിയ ഈ ഇനം ഗോസിപ്പിയം ഫിർസൂം സ്പീഷീസിൽപ്പെടുന്നു. വിപണിയിൽ ‘കരു.കണ്ണി’, ‘തിന്നവേലീസ്’ ‘സേലം.സ്’, ‘നാടം’ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേശീപ്പരുത്തികൾ കറിയത്തോ ഇടത്തരം നീളമുള്ളതോ ആയ ഈ കളോട കൂടിയവയും ഗോ. ആർബോറിയം, ഗോ. ഫെർബേസിയം എന്നീ സ്പീഷീസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയുമാണ്.

കമ്പോഡിയപ്പരുത്തികൃഷി. കമ്പോഡിയപ്പരുത്തി, പ്രതിവർഷം 75 സെ.മീ. മഴ കിട്ടുന്നതോ ജലസേചനസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതോ ആയ ചുവന്നതും ചുവപ്പ് കലർന്നതുമായ ‘ലോം’ മണ്ണിൽ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

കമ്പോഡിയപ്പരുത്തി ശീതകാലവിളയായും വേനൽക്കാലവിളയായും കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വിള സെപ്തംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ജലസേചനസൗകര്യമുള്ളിടത്ത് ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിലും മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യുന്നിടത്ത് ഡിസംബർ മാസത്തിലും വിതയ്ക്കുന്നു.

മണ്ണിന് നല്ല പരുവം വരുത്തുന്നതിന് ഏകദേശം നാലു പ്രാവശ്യം ഉഴണം. ‘വിക്റ്ററി’ കലപ്പ പോലുള്ള ഇരുമ്പുകലപ്പ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചാൽ ഉഴാൽ മതിയാകും. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ നിലത്തിൽ “വരമ്പുകോരിക്കലപ്പ അല്ലെങ്കിൽ “പ്ലാനററ് ജൂനിയർ ഹോ” ഉപയോഗിച്ച് 75 സെ.മീ. അകലത്തിൽ രിണ്ടും ചാലും ഉണ്ടാക്കി തിണ്ടിന്റെ ഒരു വശത്തു് പരുത്തിക്കുരു നുരി വയ്ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം തിണ്ടിൽ വിതയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാള വലിയ്ക്കുന്ന പണി ആശുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടയിളക്കാനും ജലസേചനത്തിന് വേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വളരെ പുരിമിതപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു. സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ കൂവരക വിളവെടുത്തശേഷം വൈകി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കമ്പോഡിയ

പരുത്തി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നിലം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരിൽ ഏറിയകൂറും, പരുത്തി വിത്തു വിതറി വിതച്ചതിനുശേഷം നാടൻകലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തുമുടിയിട്ട് പണകൾ കേരറി ജലസേചനയോഗ്യമാക്കുകയാണ് പതിവ്. മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിക്ക് ഇങ്ങനെ പണകൾ കോരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

തിണ്ടിൽ വിതയ്ക്കുന്നതിന് 11.25 കി.ഗ്രാം മുതൽ 13.50 കി.ഗ്രാം വരെ വിത്തു് ഒരു ഹെക്ടറിന് വേണ്ടിവരും. വരികൾ തമ്മിൽ 75 സെ.മീറ്റർ അകലവും ചെടികൾ തമ്മിൽ 23 സെ. മീറ്റർ അകലവും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിതറി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 15 കി. ഗ്രാം മുതൽ 28 കി.ഗ്രാം വരെ വിത്തു് വേണ്ടിവരുന്നു.

സാധാരണ വിതറി വിതയ്ക്കുന്ന വിളയുടെ കളകൾ കൈ കൊണ്ട് പഠിച്ചുമാറ്റുകയാണ് പതിവ്. അതുപോലെ ഇടയിളക്കുന്നതും കൈയുപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. രണ്ടുപ്രാവശ്യം മൺവെട്ടി കൊണ്ട് കിളയ്ക്കുകയും ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രാവശ്യം കൈകൊണ്ട് കളപഠിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ്. നിരയായി നട്ടിട്ടുള്ള ചെടികളുടെ ഇടയിൽ കാള വലിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടയിളക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വിരളനം സാധാരണ നടത്താറില്ല. വിരളനം അത്യാവശ്യമാകുന്നപക്ഷം നാടൻകലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ചാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്.

സാധാരണ പരുത്തിക്ക് നേരിട്ട് വളം ചേർക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇല്ല. എന്നാൽ പരുത്തിക്കു മുമ്പുള്ള ധാന്യവിളയ്ക്ക് ധാരാളം കാലിവളവും എങ്കിലും 1:3 എന്ന അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട്. കടുംകൃഷിചെയ്യുന്ന കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ വിള പരിക്രമമനുസരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂവരകിന്, ഹെക്ടറിന് 120 ടൺ കാലിവളം വരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. ഇതിന്റെ പ്രയോജനം പരുത്തിക്കും കിട്ടും.

തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയ രാസവളപ്രയോഗപരീക്ഷണങ്ങളിൽ, രണ്ടു ഭാഗമായി നിലക്കടലപ്പിണ്ണാക്കോ അമോണിയം

സംസ്ഥാനം ഇടുമതു് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടാണ് കണ്ടതു്. മേല്പറഞ്ഞ വള്ളങ്ങൾ ഹെക്ടറിന് 45 കി.ഗ്രാം നൈട്രജൻ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം പകുതിഭാഗം നട്ടമ്പോഴും ബാക്കി പൂക്കുന്ന ശേയിലും പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന കമ്പോഡിയപ്പരുത്തിയുടെ വിളവു് ഹെക്ടറിന് 220 കി. ഗ്രാം കപ്പാസ് എന്ന കണക്കിൽ വർധിക്കുന്നു. 125 കി. ഗ്രാം അമോണിയം സംസ്ഥാനം വിത്തിടാനുള്ള തിണ്ടു നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നിലത്തിൽ വിതരുകയും അതേ അളവിൽ ഇടയിളക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ലാഭകരമായ രീതി തന്നെ രാസവളപ്രയോഗത്തിനു ശേഷം തീർച്ചയായും ജലസേചനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടു്.

തണുപ്പുകാലത്തു് കൃഷിചെയ്യുന്ന കമ്പോഡിയപ്പരുത്തിയുടെയും ഉഷ്ണകാലത്തു കൃഷി ചെയ്യുന്ന കമ്പോഡിയപ്പരുത്തിയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത നിർണ്ണയിക്കുന്നതു് തുലാവർഷപ്പകർച്ച, വേനൽക്കാലമഴ, ചെടിവളരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നരീക്ഷത്തിലെ താപനില എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ്. ശീതകാലപ്പരുത്തിക്കു് തുലാവർഷം കിട്ടുന്നതു കൊണ്ടു് ഉഷ്ണകാലപ്പരുത്തിക്കു് വേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തോതിൽ ജലസേചനം ചെയ്യാൽ മതി. മൂന്നാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ജലസേചനം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണു് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പൂഴിമണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളക്കും, ഉഷ്ണകാലവിളക്കും കൂടെക്കൂടെ ജലസേചനം ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമാണു്. പൂക്കുന്ന സമയത്തും കായ്കൾ പാകമാകുന്ന സമയത്തും ധാരാളം ജലസേചനം ചെയ്യാൽ പണിക്കായ്കൾ നല്ലപോലെ പിടിച്ചുകിട്ടും. കമ്പോഡിയപ്പരുത്തിക്കു് വിതയ്ക്കുന്ന നാൾ തൊട്ടു് വിളവെടുപ്പു വരെ വേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവു്, 28 ഏക്കർ ഇഞ്ചിനും 36 ഏക്കർ ഇഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണെന്നു് മുൻ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു മൂന്നു ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ 3ഏക്കറിഞ്ചു് വെള്ളം നൽകുന്നതാണു് ഏറ്റവും ആദായകരമായിക്കണ്ടതു്. നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയ ഒരു കമ്പോഡിയകൃഷിയിൽനിന്നു് ഹെക്ടറിന് 280 കി. ഗ്രാം മുതൽ 340 കി. ഗ്രാംവരെ ശുദ്ധപഞ്ഞി ലഭിക്കാറുണ്ടു്.

കരുങ്കണ്ണിപ്പരുത്തി. കരുങ്കണ്ണിപ്പരുത്തി പരുത്തിക്കുറി
 മണ്ണിലാണ് പ്രധാനമായി കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രതിവർഷം
 ശരാശരി 75 സെന്റിമീറ്റർ മഴയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്
 കൃഷിചെയ്യുന്നത്. മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൃഷി ചെയ്യുന്ന
 ഒരിനം പരുത്തിയാണ് കരുങ്കണ്ണി. തുലാവർഷക്കാലത്താണ്
 സാധാരണ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ
 അവസാനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന വിത നവമ്പർ മാസം വരെ
 നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു.

കോയമ്പത്ത്‌തൂരിൽ കരുങ്കണ്ണി ഏറിയ പങ്കും ശുദ്ധവിള
 യാരിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങ
 ളിൽ തിന, മല്ലി, തുവര, ഉഴുന്ന് മുതലായവ ഇതുമായി കലർത്തി
 യം കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. കരിമണ്ണിൽ സാധാരണ അനവർത്തിച്ചു
 വരുന്ന വിളപരിക്രമരീതികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു: (i) പരുത്തി-
 ബജറ, പരുത്തി-കാലിത്തീരാച്ചോളം. (ii) പരുത്തി-ചോളം. അഥവാ
 ബജറ-പയറ. ചെറുകിടകൃഷിക്കാർ വർഷംതോറും പരുത്തിക്കു
 ശേഷം വീണ്ടുമുതൽക്കി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പതിവ് ചില സ്ഥല
 ങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്.

കരിമണ്ണിൽ കരുങ്കണ്ണികൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ജൂൺ മാസ
 ത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ മഴയോടുകൂടി നിലമൊരുക്കാനാർംഭി
 ക്കുന്നു. സാധാരണ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉഴവ് നടത്തുന്നു. കളയുടെ ഉ
 പദ്രവം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്നരണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉഴുന്നതാണ്.
 ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണിന് ആവശ്യമായ പരുവം കി
 ട്ടുന്നു. നല്ല പരുവം കിട്ടിയതിനു ശേഷം പരുത്തിക്കു വിതവിത
 തരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്.
 11 കി. ഗ്രാം മുതൽ 22 കി. ഗ്രാം വരെ വിത്തു് ഒരു ഹെക്ടറിൽ
 വിതയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സാധാരണ പരുത്തിക്ക് നേരിട്ട് വളം ചെയ്യാറില്ല. വിള
 പരിക്രമത്തിൽപ്പെടുന്ന മുൻധാന്യവിളയ്ക്ക് നല്ല പോലെ വളം ചേർ
 ക്കുകയേ ഉള്ളൂ. പരുത്തിക്ക് ഈ വളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടഗുണം
 ലഭിക്കുന്നു. കോവിൽപ്പട്ടിയിൽ നടത്തിയ പരിക്ഷണങ്ങളിൽ
 23 കി. ഗ്രാം നൈട്രജൻ അമോണിയം സൾഫേറ്റു രൂപത്തിൽ

അടിവളമായി ചേർക്കുന്നതു കൊണ്ട് മഴയെ ആശ്രയിച്ചു വളരുന്ന കരംകണ്ണിപ്പരുത്തിയുടെ 'കപ്പാസ്' 80 കി.ഗ്രാം കണ്ട് വർധിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ വിളവ് ഇടത്തരം ഫലപുഷ്പിയുള്ള മണ്ണിലാണ് കിട്ടിയത്. നല്ല ഫലപുഷ്പിയുള്ള മണ്ണിലാകട്ടെ, പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഇരട്ടിവിളവ് ലഭിക്കും.

കരംകണ്ണിപ്പരുത്തിയുടെ തൈകളിൽ ചിലപ്പോൾ വിരളനം നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 15 സെ. മീറ്റർ മുതൽ 22 സെ.മീ.വരെ അകലം ചെടികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കയ്യായ ധങ്ങൽ ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇടയിളക്കുന്ന പതിവു ഉണ്ട്.

കോയമ്പത്ത് തുർ, മധുര എന്നീ ജില്ലകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തരിമണൽ കലർന്ന കരിമണ്ണിൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന കരംകണ്ണിപ്പരുത്തിക്ക് ഏതാനും പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കുന്ന സമയത്തു് ജലസേചനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലിതിനു് 1100 കി.ഗ്രാം കപ്പാസ് വരെ വിളവു കിട്ടിയതായി കാണുന്നു.

വിതച്ചു് 5 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പണത്തിക്കായ് പൊട്ടി വിടരാൻ തുടങ്ങും. സാധാരണയായി കരംകണ്ണിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി മുതൽ മേയ് മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. കരംകണ്ണിയിൽ നിന്നു് ഒരു ഹെക്ടറിനു് ശരാശരി 110കി. ഗ്രാം ശുദ്ധപണതി ലഭിക്കുന്നു.

തിന്നവേലിസ്. 'ദേശി' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പരുത്തി 75 സെ. മീ. മഴ ലഭിക്കുന്ന പരുത്തിക്കരിമണ്ണിൽ ആണ് സാധാരണ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതു് മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനമാണ്. തുലാവർഷ വിളയായ ഇതു് സെപ്തംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലത്തു് വിതയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിളവരിക്രമരീതിയും മറ്റും കരംകണ്ണിപ്പരുത്തിയുടേതു പോലെ തന്നെ.

നിലം രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉഴുതു് ആവശ്യമായ പരുവം വരത്തുന്നു. കളകളുടെ ഉപദ്രവം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉഴേണ്ടിവരും.

നല്ല മഴ കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഏതാണ്ടു് 11 കി. ഗ്രാം വിത്തു്

ഒരു ഹെക്ടറിന് എന്ന തോതിൽ വിതയ്ക്കുന്നു. വിതറിവിതയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ട് കയ്യായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടയിളക്കുകയും കൈ കൊണ്ട് കള പഠിക്കുകയുമാണ് പതിവ്.

കരംകണ്ണിപ്പരുത്തിക്കെന്ന പോലെ ഇതിനും നേരിട്ട് വളം ചേരുന്ന പതിവില്ല. വിളപരിക്രമത്തിൽ മുൻഗാമിയായ ധാന്യവിളയ്ക്ക് നല്ല പോലെ വളം, പ്രത്യേകിച്ച്, ജൈവവളം ചേർക്കാറുണ്ട്. വിളവെടുപ്പ് കരംകണ്ണിക്കെന്ന പോലെ തന്നെ.

നാടംപരത്തി. 'നാടം' പരത്തിയും ദേശീ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതു തന്നെ. ഇത് മുഖ്യമായും മോശപ്പെട്ട തരം ചുവന്ന ലാലു മണ്ണിലും ചരൽ കൂടതലുള്ള മണ്ണിലുമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതു ഒരു 'ചിരസ്ഥായിഇനം' ആണ്. മൂന്നു കൊല്ലം മുതൽ അഞ്ചു കൊല്ലം വരെ സാധാരണയായി ഇത് നിലത്തിൽ നിർത്തുന്നു.

നിലം ഒരുക്കാനായി മേയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഏക ദേശം മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉഴുത്ത് ആവശ്യമായ പരുവം വരുത്തുന്നു. 'നാടം' പരത്തി വിതയ്ക്കുന്നത് ജൂൺ - ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ്. ഇത് മിക്കവാറും മറ്റു വിളകളുമായി കലർത്തിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യവർഷത്തിൽ ധാന്യവിളകളുമായി കലർത്തുന്നു. രണ്ടും മൂന്നും വർഷങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പയർവിളകളുമായി കലർത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

'നാടം' പരത്തിക്കിടയിൽ ഉഴുതാണ് ഇടയിളക്കുന്നത്. നല്ല മഴ കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട് കൂടുതൽ പുതിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 'നാടം' പരത്തിക്ക് വളം ചെയ്യുന്നത്, ആട്ടിൻപററങ്ങളെ കിടയിട്ടോ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഉച്ചിഷ്ടവസ്തുക്കൾ ഇട്ടോ ആണ്.

'നാടം' പരത്തിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഒരു നീണ്ട പരിപാടിയാണ്. ചിരസ്ഥായി ആയതു കൊണ്ട് ഓരോ മഴയ്ക്കു ശേഷവും പുതിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും അപ പാകമായാൽ പഠിപ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സീ ഐലൻഡ് പരത്തി. വെസ്റ്റ്ഇൻഡീസ് ദ്വീപുസമൂഹങ്ങളിൽ വ്യവസായികവിളയായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സീ

ഐലൻ്റ് പരുത്തി, ലോകത്തിലെ പരുത്തിത്തരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നാരുനീളമുള്ളതാണ്. 'ബാർബഡൻസ്' സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട 'സ. ഐലൻ്റ് പരുത്തി' കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് പട്ടാമ്പിയിലും ഗലാപുരത്തും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. ഇതിൽത്തന്നെ കൂടുതൽ നാരു നീളമുള്ളതും കൂടുതൽ വിളുപുതന്നതുമായ 'ആരഡ്രൂസ്' എന്ന ഒരു ഇനം ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നാരു നീളം കൂടിയ മേത്തരം പഞ്ഞി ഉപയോഗിക്കുന്ന മില്ലുകളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം ഈജിപ്ത്, സുഡാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മേത്തരം പഞ്ഞിയോട് കൂട നിൽക്കുന്നതാണ് 'ആരഡ്രൂസ്' ഇനത്തിൻ്റെ പഞ്ഞി. നല്ല നീർ വാർച്ചയും സാമാന്യം ഫലപുഷ്ടിയുമുള്ള മണ്ണ് സി ഐലൻ്റ് പരുത്തികൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ നെല്ല്, കപ്പ മുളക്, ഇഞ്ചി മുതലായവ കൃഷിചെയ്യാറുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു തനിവിളയായും തെങ്ങ്, വാഴ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന തോപ്പുകളിൽ ഒരു ഇടവിളയായും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ണിൽ ചരൽ രാശി കൂടിയിരിക്കുന്നു. തീര പ്രദേശത്തോട് അടുക്കത്തോറും മണൽരാശിയും കൂടും. ആകയാൽ മണ്ണിന് നല്ല നീർവാർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും.

കൃഷിചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി നിരപ്പ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കാലേക്കൂടി നിരപ്പാക്കുകയും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏപ്രിൽ-മേയ് മാസങ്ങളിൽ പുതുമഴ കിട്ടുമ്പോൾ നാലഞ്ചു ചാൽ ഉഴന്നു. പിന്നീട് 15 സെ. മീ അകലത്തിൽ 22 സെ. മീ മുതൽ 30 സെ. മീ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള തിണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടുതൽ വളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തിണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 90 സെ. മീ വരെ ആകാം. ഉദ്ദേശം 12 മീറ്റർ അകലത്തിൽ നീർവാർച്ചയ്ക്കായി ചാലുകൾ കീറണം. ഈ പണികൾ സാധാരണ മൺവെട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മഴയെ ആശ്രയിച്ച കൃഷി ചെയ്യുന്ന സീ ഐലൻറ് പരത്തി സാധാരണയായി കാലവർഷാരംഭത്തോടു കൂടി ജൂൺ ആദ്യത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു. മരുന്നപുരട്ടി ശുദ്ധീകരിച്ച ഉദ്ദേശം 30 കി. ഗ്രാം വിത്തു് ഒരു കഴിയിൽ മൂന്നു വിത്തുകൾ വിതം 30 സെ. മീ ഇടവിട്ടു് തിണ്ടുകളുടെ ഒരു വശത്തു് കയ്യാക്കുന്നു. വിത്തു് കയ്യാക്കുന്ന ദോരങ്ങൾക്ക് 2.6 സെ.മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ താഴ്ചപാടില്ല. വെള്ളായണി കാർഷികകോളേജിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മേയ് ആദ്യവാരം വിത്തു് വിതച്ചപ്പോൾ വിളവ് വർദ്ധിച്ചതായും മേയ് യേറിയ കൂടുതൽ 'ക്വാസ്' പഞ്ഞി കിട്ടിയതായും കണ്ടു. വിതയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മഴയുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബീജാങ്കുരണത്തിനു് ആവശ്യമായ ഇൻറർപ്പ് മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേരത്തേ വിതയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടു് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ശക്തിയേറിയ വർഷത്തിന്റെ കെടുതിയിൽ നിന്നു് ഇളം തൈകൾക്കു് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. താമസിപ്പിരിക്കുന്ന വിളയ്ക്കു് കഠിനമായ മഴ നിമിത്തം നാശവും തുടർന്നുള്ള വരൾച്ച കൊണ്ടു് കെടുതിയും വർദ്ധിച്ചതോതിൽ ബോൾപ്പഴുവിന്റെ ശല്യവും നേരിടേണ്ടിവരും. വിത്തുകൾ പാകി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ടു് തൈകൾ മാത്രം നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവ സാവധാനം പഠിച്ചുമാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുമാറ്റിയവ ഇടപോക്കാനോ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടാനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ചെടികൾ ചാണകവെള്ളത്തിൽ മുക്കി നട്ടുനവക്ഷം കൂടുതൽ നന്നായി പിടിച്ചുകിട്ടുമെന്നു് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

നിലമൊരുക്കുമ്പോഴുള്ള ഉഴവോടൊത്തു് ഹെക്ടറിനു് 15 ടൺ കാലിവളം ചേർക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം അവസാന ഉഴവിനു് മുമ്പായി 190 കി.ഗ്രാം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റും 95 കി. ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റും കൂടി അടിസ്ഥാനവളമായി ചേർക്കണം. കേരളത്തിലെ മിക്ക തരം മണ്ണുകളും അജ്ഞാതമായി താകയാൽ ഹെക്ടറിനു് 560 കി. ഗ്രാം കുമ്മായം ചേർക്കുന്നതു്

നല്ലതാണ്. വിരളനത്തിനു ശേഷം ചെടികളിൽ നിന്ന് 7.5 സെ മീ. വിട്ട് ഏകദേശം 133 കി.ഗ്രാം അമോണിയം സൾഫേറ്റ് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് വാരങ്ങളിൽ മണ്ണു കൂട്ടുന്നു. വെള്ളായണിയിൽ നടത്തിയ പാറത്തിൽ നിന്ന് ഹെക്ടറിന് 46 കി.ഗ്രാം നൈട്രജനും 34 കി.ഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ്സും 56 കി.ഗ്രാം പൊട്ടാഷും സി ഐലൻറ് പരുത്തിയുടെ വിളവ് വർധിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാത്രയാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഉണങ്ങിയ ഇലകളും ചുള്ളികളും ഇട്ട് തിണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ചാലുകൾ മുടിയാൽ തിണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മണ്ണൊലിച്ചുപോകുന്നതും കളകൾ വളരുന്നതും തടയാൻ സാധിക്കും. ഇതു കൊണ്ട് മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

ചെടികൾ നന്നായി വളരുന്നതു വരെ യഥാകാലം കള പരിച്ചുമാറുന്നു. സസ്യസംരക്ഷണനടപടികൾ മുറയ്ക്ക നടത്തണം. ഇതിനു വേണ്ടി കീടനാശിനികളും രോഗനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കണം.

നേരത്തെ വിതച്ചാൽ ഒക്ടോബർമാസത്തോടുകൂടി പഞ്ഞി പരിച്ചുതുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ വരെ വിളവെടുപ്പ് തുടരും. നല്ല മുപ്പെത്തിയ കായ്കളിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ പഞ്ഞി പരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, ചുള്ളികൾ, മണ്ണ്, ചെളി മുതലായ മാലിന്യങ്ങൾ കലരാതെയാണ് പഞ്ഞി പരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പട്ടാമ്പിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, വേണ്ട രീതിയിൽ വളങ്ങൾ ചേർത്ത കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഹെക്ടറിന് 1080 കി.ഗ്രാം 'ക്വാസ്' പരുത്തിവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സസ്യസംരക്ഷണം.

പരുത്തിച്ചെടിയെ പല കൃമികീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ബാധിക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ പലതും വിനാശകാരികളാണ്. ഭാരതത്തിൽ പരുത്തിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും

അവയുടെ നിവാരണമാർഗങ്ങളും സാമാന്യമായി താഴെ വിവരിക്കുന്നു;

കീടങ്ങൾ

പാടലബോറപ്പുഴ (പ്ലാറിയെഡ്ര ഗോസിപ്പിയെല്ല). ഭാരതത്തിൽ പരത്തികൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന കീടമായ ഇത് പരത്തിക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിത്തീർക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പഴുപരത്തിയുടെ മുകളും, പൂക്കും, പഞ്ഞിക്കായ്, കരു എന്നിവയിൽ തുളച്ചുകയറി അവയെ നശിപ്പിക്കും. അമേരിക്കൻ പരത്തിക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ നാശം വരുത്തുന്നത്.

പ്രതിവിധികൾ. 1. വിതയ്ക്കുന്നതിന് നല്ല വിത്തു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 2. വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായി വിത്തു മീതെൽ ബ്രോമൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ധൂമനംചെയ്യുക. 3. പരത്തി വിളവെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള സസ്യാവശിഷ്ടം തീവച്ചു നശിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ വിളകളിൽ ഇതിന്റെ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാം.

പുള്ളിബോറപ്പുഴ (ഏറിയോസ് ഫേബിയ, ഏ. ഇൻസുലാന). ഭാരതത്തിൽ പരത്തികൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അപകടകാരിയായ കീടമാണിത്. പരത്തിച്ചെടിയുടെ ഇളം പ്രായത്തിൽ ഇതിന്റെ പഴു തണ്ടു തുരക്കുന്നതു കൊണ്ട് ചെടിയുടെ വളർച്ച നിലച്ചുപോകുന്നു. പൂമൊട്ടും പൂവും കായും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഴു അതിലും തുരന്നുകയറി കനത്ത നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി. 1. പരത്തി വിളവെടുത്തശേഷം സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ തീവച്ചു നശിപ്പിക്കുക. 2. 0.03% എൻഡ്രിനോ 0.10 സെലിനോ അനുയോജ്യമായ ഇടവേളകളിൽ തളിക്കുക.

പരത്തിയില ചുരുട്ടി (സൈലെപ്റ്ററ ഡെറോഗേറ്റ). പരത്തിയുടെ ഇലചുരുട്ടിപ്പഴു വളരെ വിനാശകാരിയായ ഒരു കീടമാണ്. ഇതിന്റെ പഴു പരത്തിയിലയുടെ അടിവശം, തിന്നുകയും ഇല ചുരുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുട്ടിയ ഇലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനോ

ടൊപ്പം ഇവ ഇലയിൽ വലിയ ദാർഢ്യം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഇല മുഴുവനായിത്തന്നെ തിന്നുതീർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇലപൊഴിക്കുന്നതിനും തലോറാ വിളവ് വളരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി. 1. കീടത്തിന്റെ ആക്രമണദശയുടെ ആരംഭത്തിൽ ചുരുട്ടിയ ഇലകൾ പഠിച്ചു നശിപ്പിക്കുക.

2. 0.2% വീര്യമുള്ള ഡി. ഡി. റി. തളിക്കുകയോ 5 ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഡി. ഡി. റി. പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ബി. എച്ച്. സി. പൊടി വിതരണമോ ചെയ്യുക.

പരുത്തി ജാസ്സിയ (എംപോബാസക്സ് ഡിവാസ്സൻസ്). ഏപ്രിൽ ജീവിതദശകളിലും ഈ പ്രാണി ഇലയിലെ നീര് വലിച്ചുകടിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇല ആദ്യം മഞ്ഞയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ചുവപ്പു കലർന്ന തവിട്ടു നിറമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കീടബാധയേറാത്ത ഇലകൾ ചുരുളുകയും കീറുകയും ക്രമേണ പൊഴിഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രാണിയുടെ കടുത്ത ഉപദ്രവമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിളവ് തീരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതാണ്.

പ്രതിവിധി. 0.15% വീര്യമുള്ള ഡി. ഡി. റി. തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 0.1% വീര്യമുള്ള ഡി. ഡി. റി. യും 0.1% വീര്യമുള്ള ബി. എച്ച്. സി. യും ചേർത്ത് മിശ്രിതം തളിക്കുക. 0.03% വീര്യമുള്ള എൻഡ്രിൻ 700 ലിറ്റർ മുതൽ 900 ലിറ്റർ വരെ ഒരു ഹെക്ടറിൽ തളിച്ചാലും മതി.

പരുത്തിച്ചെംചാഴി (ഡിസ്ഡെർക്കസ് സിംഗ്ലാറസ്). ഈ പ്രാണിയുടെ നിംഫുകളും, പ്രാണിയും ചെടിയുടെ ഇലകൾ, പൂക്കൾ, കായ് എന്നീഭാഗങ്ങളിലെ നീര് വലിച്ചുകടിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും വിളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിവിധി. 5% വീര്യമുള്ള ബി. എച്ച്. സി. പൊടി ഹെക്ടറിന് 12 കി. ഗ്രാം മുതൽ 15 കി. ഗ്രാം വരെ വിതരണം. അല്ലെങ്കിൽ 0.25% വീര്യമുള്ള ബി. എച്ച്. സി. യോ ഡി. ഡി. റി. യോ തളിക്കുക.

രോഗങ്ങൾ

വാട്ടം (ഫ്യൂസേറിയം വാസിൻഫെക്ടം). പരത്തിച്ചെടിയിൽ പരക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. പ്രധാനമായി മധ്യഭാഗത്തലിലും ഭക്ഷിണഭാരതത്തിലും ആണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്വഭേശിപ്പരുത്തിയെ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ചെടികൾ ക്രമേണ വാടിനശിക്കുന്നതാണ് രോഗലക്ഷണം.

പ്രതിവിധി. രോഗരോധശക്തിയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യുകയാണ് ഏകപോംവഴി.

കോണിപ്പൊട്ട രോഗം (സാന്തോമാണാസ് മാൽവേസിയാറം). ഈ രോഗം പ്രധാനമായി അമേരിക്കൻപരത്തിയിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ പരത്തിയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗുജറാത്തും, മഹാരാഷ്ട്രം, കർണാടകം, തമിഴ്നാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രോഗലക്ഷണം ഇലയിലും തണ്ടിലും കാണാം. കോണാകൃതിയിലുള്ള നീരു നിറഞ്ഞ പാടുകൾ ഇലയിൽ ഉണ്ടാകും. ക്രമേണ ഇത് തവിട്ടുനിറമാകുകയും അരിക് ചുവക്കുകയും ചെയ്യും. തണ്ടിൽ നീണ്ട കറുത്തവരുകൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി. രോഗത്തിന്റെ പ്രാഥമികസംക്രമണത്തിന്റെ ഉറവിടം വിത്തുതന്നെ ആണ്.

വിത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സൽഫ്യൂറിക്കളം ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചശേഷം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ല പോലെ ഉണക്കുകയും പിന്നീട് ഓർഗാനോ മെർക്കുറിക യൗഗികങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ദിതീയസംക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് യഥാകാലം ചെടിയിൽ ബോർഡോമിശ്രിതമോ മറ്റു താമ്രകമിരനാശിനികളോ തളിക്കണം. ചെടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചൂട്ടുനശിപ്പിക്കുകയും വേണം.

ആന്റാക്നോസ് (ഗ്രോമെല്ലെ ഗോസിപ്പി): ഈ രോഗം പ്രധാനമായി മഹാരാഷ്ട്രം, ഗുജറാത്തും, മധ്യപ്രദേശ്, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

ഇളംതൈകളിലും കായ്കളിലുമാണ് മുഖ്യമായിക്കാണുക. ഈ രോഗം തൈകളുടെ തണ്ടിൽ വലിയ ചുവന്ന പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഉണക്കുന്നു. കായ്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടുകൾ അല്പം കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും. രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും കായ്കൾ പൊഴിയുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിവിധി. 1. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പണിക്കായിൽ നിന്ന് വിത്തു് ശേഖരിക്കുക. 2. വിത്തു് വിതയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കാർഗാനോ മെർക്കുറികയഗ്രികങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക. 3. രോഗം ബാധിച്ച ചെടിയുടെ അവശിഷ്ടം തീവച്ച് നശിപ്പിക്കുക. 4. വിളപരിക്രമം അനുവർത്തിക്കുക.

ഉപയോഗവും സാമ്പത്തികപ്രാധാന്യവും

പഞ്ഞി ശേഖരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ പ്രധാനമായും പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്ത്രം പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണു താനും. പരുത്തി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വാണിജ്യവിളകളിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായി വസ്ത്രനിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരുത്തി കൃഷിചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മറ്റു പല വ്യാവസായികാവശ്യങ്ങൾക്കും പരുത്തി ഉല്പന്നങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ക്ഷാരം ഉപയോഗിച്ച് പരുവപ്പെടുത്തിയ പഞ്ഞി ഒരു അവശോഷകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ഷാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പഞ്ഞിനാരുകൾ ചെറുതാകുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം പാകപ്പെടുത്തിയ പഞ്ഞി വലിച്ചുനീട്ടി പൂർവ്വദൈർഘ്യം നൽകുമ്പോൾ അതിന് പട്ടുപോലുള്ള തിളക്കം കൈവരുന്നു. പഞ്ഞിനാരിന്റെ ഈ ഗുണത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് മെർസറീകരണ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. പഞ്ഞി ഗാഢനൈട്രിക് അമ്ലവുമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ട് 'നൈട്രോ സെല്ലുലോസ്' ആക്കി മാറ്റി ഒരു വിസ്ഫോടകവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രനരം പഞ്ഞിയും 'ലിന്റേഴ്സും' വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്രിമപ്പട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

ശുദ്ധപഞ്ഞി എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പരുത്തിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപന്നം പരുത്തിക്കുരു ആണല്ലോ. പരുത്തിക്കുരുവിന്റെ പുറത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുമാറി “ലിന്റേഴ്സ്” എന്ന പേരിൽ കംബളനിർമാണത്തിന് സൈലോസ്, റയോൺ, ‘സ്റ്റഫിങ്ങ്’ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള “ലിന്റേഴ്സ്” പരുത്തി തുണിത്തരങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിക്കും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. നല്ല ഗുണമേറിയ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും “ലിന്റേഴ്സ്” പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം ലിന്റേഴ്സും “പൾപ്പ്” നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പരുത്തിത്തരിയുടെ ഓട്ട് അഥവാ ഉമി കാലിത്തീരറയാണ്. ചിലപ്പോൾ തീകുത്തിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പരിപ്പ് ആടി എണ്ണ എടുക്കുകയും വളരെ പോഷകാംശമുള്ള പിണ്ണാക്ക് കാലിത്തീര ആയി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരുത്തിയെണ്ണ ശുദ്ധിച്ചെന്ന് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. മേന്മ കുറഞ്ഞ എണ്ണ, സോപ്പ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. “മാർഗറിൻ” (ക്രട്ടിമ വെണ്ണ) നിർമാണത്തിന് ശുദ്ധിച്ചെന്ന് പരുത്തി എണ്ണ നല്ലതാണ്. പലപ്പോഴും പരുത്തിക്കുരു അങ്ങനെ തന്നെ കാലികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്.

ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ

- Ananda Padmanabham, C.D. et al 1968. “A short duration Cotton to suits in the lower Bhavani Project area”, Madras Agrl. Journal, Feb. 1968.
- Annappan, R.S. et al 1968. “Evolution of a superior arboreum cotton strain, Karunganni-7 for the rainfed blacksoil regions of Madras state”. Indian Journal of Agrl. Science Feb. 1968.
- Anonymous 1958, “A note on sea island Cotton-variety Andrews. Indian Cotton growing Review, January 1958. I.C.C.C., Bombay.
- Anonymous 1959. “Cotton needs phosphate too”. Indian Cotton Growing Review, March 1959. I. C. C. C Bombay.

- Anonymous 1963. "Study of Cotton in India." I. C. C., Bombay.
- Anonymous 1968. Agricultural situation in India, Oct. 1968.
- Arakeri, H. R. et al 1962. "Soil Management in India," Asia Publishing House, Bombay.
- Brown, H.B. & Ware J.O., 1958. "Cotton", Mc. Graw Hill Book Co., New York.
- Cardozier, V.R., 1957. "Growing Cotton," Mc. Graw Hill Book Co., New York.
- Dastur, R.H. et al 1960. "Cotton in India"—a monograph Vol. II I.C.C.C., Bombay.
- Dungan, G.H. & Ross, W.A., 1957. "Growing Field Crops," Mc. Graw Hill Book Co., New York.
- Hussain, H.S.J. & Narayana. A., 1966. "A Study on the suitability of two short duration Russian hirsutum varieties for rice fallows in Madras State," Madras Agrl. Journal, March, 1966.
- Kalyanaraman, S.M. & Rangaswami, T.V., 1957. "Recent trials on the Introduction of Cotton in Rice fallows of Madras State," Indian Cotton Growing Review, July, 1957. I.C.C.C., Bombay.
- Mariakulandai, A. & Morachan, Y.B., 1965. "Results of manurial trials on Cotton in Madras State" Madras Agrl. Journal, April 1965
- Mehta, R.R. & Varma, B.K., 1968. "Plant protection," Farm Information Unit, Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.
- Nanjundayya, C. et al 1960 "Cotton in India—" a monograph Vol. III, I. C.C.C., Bombay.
- Santhanam, V., 1966. "Maximisation of Cotton Production in Madras state with special reference to Coimbatore District", Madras Agrl. Journal, May 1966.

- * Sethi, B.L. et al 1960. "Cotton In India " — a monograph, Vol. I. I. C.C.C., Bombay.
- Sethi, B.L. & Dharmarajulu, K., 1957. "Indian Cotton, its past, present and future", Indian Cotton Growing Review. Jauuary, 1957. I. C. C. C., Bombay.
- Sikka, S.M. et al 1961. "Cotton in India"—a monograph, Vol. IV, I. C.C.C., Bombay.
- Subhiah Mudaliar, V.T. 1960. "South Indian Field Crops," Central Art Press, Madras-31
- Sucha Singh, 1967. "Ten years of Agronomic Research on Cotton in Panjab", Indian Journal of Agronomy December, 1967.
- Yegnanarayana Iyer, A. K., 1958. "Field crops of India". The Banglore printing and Publishing Co., Banglore.

കാട്ടുചണം

[ശാസ്ത്രീയനാമം: ക്രോട്ടലേറിയ ജൻസിയ. ഇംഗ്ലീഷ് - സൺ ഹെമ്പ്; കർണാടകം-സനബു: തമിഴ് - സഡമ്പു, സനൽ: തെലുങ്ക് - ജനുവ ഹിന്ദി-സൺ, സാനി, സനായി]

കാട്ടുചണമെന്നും 'വക്ഷ' എന്നുമറിയപ്പെടുന്ന ഈ നാരുവിളകളിൽ 'ഇയ്യ' ബനാർസ് ചണം, ബോംബെ ചണം, ദേവഗുഡി ചണം. തുടങ്ങിവേറെ പേരുകളും ഉണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ നാരുവിളകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാട്ടുചണം. സാധാരണ ചണം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല നാരുവിളയായി കരുതപ്പെടുന്നതു കാട്ടുചണമാണ്. ഇത് പെറിയ തോതിൽ, പച്ചിലവളമായും കാലിത്തീറ്റയായും ചിലയിടങ്ങളിൽ കൃഷിചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്.

സസ്യശാസ്ത്രവശം.

കാട്ടുചണം (ക്രോട്ടലേറിയ ജൻസിയ) ലെഗുമിനോസേ എന്ന കുടുംബത്തിലെ പാപ്പിലിയോണേസി എന്ന ഉപവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 3 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന, നീണ്ട വണ്ണം കറഞ്ഞ ഒരു സസ്യമാണ് കാട്ടുചണം. തണ്ടിന് സാധാരണ അര സെന്റീമീറ്റർ വ്യാസമേ കാണുകയുള്ളൂ. തണ്ടിന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. പുറമേയുള്ള തൊലിയിലാണ് നീണ്ട നാരു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഉൾഭാഗം തടിപോലുള്ളതും പിന്തു് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. വളരെ ആഴത്തിലുള്ള നീണ്ട നാരായവേരും നിരവധി ശാഖവേരുകളും കൂടിയുള്ള ഒരു വേരപടലമാണ് കാട്ടുചണത്തിനുള്ളത്. വേരുകളിൽ നിരവധി ചെറുചുഴകൾ (മുലാർബുടങ്ങൾ) ഉള്ളതായിക്കാണാം. ലെഗുമിനോസേ

വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളിൽ കാണുന്ന ഈ മൂലാർബുങ്ങളിൽ ഉള്ള അണുജീവികൾ (ബാക്ടീരിയ), അന്തരീക്ഷവായുവിലെ മൂല കരൂപത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ലവണരൂപത്തിലുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. ഇലകൾ ചെറുതും വീതി കുറഞ്ഞതും ലാൻസിയോളേറ്റ് ആകൃതിയോടു കൂടിയതുമാണ്. വളരെ കുറിയ ഇലത്തണ്ട് കൊണ്ട് ആണ് ഇലകൾ തണ്ടിനോടു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കാട്ടുചണച്ചെടിയിൽ ശാഖകൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ മുക്കുഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ശിഖാങ്ങൾ പൊട്ടും. ധാരാളം ശാഖകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകതരം കാട്ടുചണവും കാണാറുണ്ട്. സാധാരണ പാപ്പിലോണേഷ്യസ് ചെടികളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളതു പോലെ ഇതിലും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പൂങ്കലകൾ കാണുന്നതിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി ഉണ്ടാകുന്നു. പൂക്കളിൽ സ്വപരാഗണം വഴി കായ്കൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. വിത്തു് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു് മുഖ്യമായും പ്രാണികൾ വഴിയുള്ള പരപരാഗണം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കായ്കൾ ചെറുതും കഴൽരൂപത്തിലുള്ളതും ആയിരിക്കും. കായ്കൾക്ക് ഏകദേശം 5 സെ.മീ. നീളവും 0.7 സെ.മീ. വ്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ വിത്തു് കാഴ്ചയിൽ കിടന്നു് ചലിക്കുകയും ഒരുതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണത്രേ ഇത്തരം ചെടികൾക്ക് കാസ്റ്റാനെറു് എന്ന പേരുണ്ടായതു്.

പല ജാതി കാട്ടുചണങ്ങൾ ഇന്ന് കൃഷിചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇവയെ വളർച്ചക്കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, ശാഖകളുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവം, ലഭ്യമാകുന്ന നാരിന്റെ അളവും ഗുണവും തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിത്തു് വിതച്ചു് വിളവു് പാകമാകുന്നതിനു്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂപ്പുള്ളവയ്ക്കു് 80 ദിവസവും ഇടത്തരം മൂപ്പുള്ളവയ്ക്കു് 100-110 ദിവസവും കൂടിയ മൂപ്പുള്ളവയ്ക്കു് 120 ദിവസവും സാധാരണവേണ്ടി വരും.

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തേക്കും പററിയ മേത്തരം ഉന്നം കാട്ടു ചണവും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനം ഉന്നം

പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ

യു.പി കാൺപൂർ 12 അധികോല്പാദനശേഷിയുള്ളത്.—നാരിന് ഗുണം കൂടുതൽ—വാട്ടരോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധശക്തിയുള്ളത്.

മധ്യപ്രദേശ് എം.18 കുറഞ്ഞ വിളകാലം, അത്യുല്പാദനശേഷി, വരച്ചയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ശക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ളത്.

,, എം.35 എം. 18 എന്ന ഇനത്തെപ്പോലെ തന്നെ. തണ്ടുതുരപ്പന്റെ ശല്യം ഇതിൽ കുറവായിരിക്കും.

,, എസ്.19 തണ്ടുതുരപ്പന്റെ ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിന് പ്രതിരോധശക്തിയുള്ളത്.

ബീഹാർ ബി.ഇ.19

മഹാരാഷ്ട്ര ഡി. IX വാട്ടരോഗത്തെ നേരിടാൻ പ്രതിരോധശക്തിയുള്ളത്.

തമിഴ്നാട് കാൺപൂർ 12

വിതരണം, വിസ്തൃതി, ഉൽപാദനം

ഭാരതത്തിന്റെ ഏതാണ്ടെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ തോതിൽ കാട്ടുചണം കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തരപ്രദേശ്, ബീഹാർ, തമിഴ്നാട്, മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടകം, മഹാരാഷ്ട്രം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വിപുലമായ തോതിൽ ഇത് കൃഷിചെയ്യുവരുന്നത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും എത്രത്തോളം സ്ഥലത്തു കാട്ടുചണം കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൃഷിപദ്ധതി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഓരോ വർഷവും ഭാരതമൊട്ടാകെ ശരാശരി രണ്ടു ലക്ഷത്തിനാലുതിനായിരം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തു ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 88,000 ഹെക്ടർ

തമിഴ്നാട്ടിലും 25,000 ഹെക്ടർ ആസ്ത്രയിലും ബാക്കി മാറ്റ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽനിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ഉത്തരപ്രദേശത്തു നിന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.

കാലാവസ്ഥയും മണ്ണും

ഉഷ്ണമേഖലയിലും സമശീതോഷ്ണമേഖലയിലുമാണ് കാട്ടചനം അധികമായി കൃഷിചെയ്യുവതുന്നത്. അധികം കൂടുതലോ തീരെ കുറവോ അല്ലാതെ ഇടത്തരം അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കൃഷിക്ക് പറ്റിയത്. 50 സെ. മീ മുതൽ 75 സെ. മീ. വരെ മഴ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃഷിക്ക് ഉത്തമം. ഈ മഴ, വിളവകാലത്തു് കാലാകാലങ്ങളിലായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ വിളവിനു് ജലസേചനം നിശ്ചിതതോതിൽ, അതായതു് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഇതിനു് ഒട്ടും തന്നെ പറ്റിയതല്ല.

കാട്ടചനം സമതലങ്ങളിലും പീഠഭൂമികളിലും സമൃദ്ധിയായി കൃഷിചെയ്യാം. ചുവന്ന മണ്ണിലും അലൂവിയൽലോമിലും ചെളി കൂടുതലുള്ള കറുത്ത പശിമരാശിമണ്ണിലും ഇതു് നന്നായി വളരുന്നു. പക്ഷേ, ഏതുതരം മണ്ണായാലും നല്ല നീർവാർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നാരിനുവേണ്ടി കാട്ടചനം വളരെ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു് ഉത്തരപ്രദേശത്തു്, 'ലൈറ്റ് അലൂവിയം' എന്ന തരം മണ്ണിലാണ് ഇതു് വളർത്തുന്നത്.

വിത്തും വിതയും

വിത്തു് നേരിട്ടു് നിലത്തിൽ വിതച്ചാണ് കാട്ടചനം കൃഷിചെയ്യുന്നത്. നാറെടക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൃഷിചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഹെക്ടറിനു് ശരാശരി 60 കി. ഗ്രാം മുതൽ 80 കി. ഗ്രാം വരെ വിത്തു് വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക

പുറുപാടുകളിൽ ഈ അളവ് 30 മുതൽ 140 വരെ കി. ഗ്രാം ആയി മാറാറുണ്ട്. പച്ചിലവളമായി കാട്ടുപണം വളർത്തുമ്പോൾ, നാരെടുക്കുന്നതിന് വളർത്തുമ്പോഴുപയോഗിക്കുന്നതിൽ അല്പം കൂടുതലായ തോതിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ധാരാളം ചെടികൾ ഉണ്ടാകുകയും അവ ഉഴുത്ത് മണ്ണിൽ ചേർക്കുക എളുപ്പമുള്ളതാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാകപ്പെടുത്തിയ നിലത്തിൽ വിത്തു വിതച്ചു ഒരു പ്രാ, വശ്യം ഉഴുത്ത് അവയെ മണ്ണിൽ മൂടുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ, മൂന്നോ നാലോ വരികളിൽ ഒരേ സമയത്തു വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന 'വിതയന്ത്ര'ങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വരിയിലും 30 സെ. മീറ്റർ അകലത്തിൽ വിത്തിട്ടുന്ന സമ്പ്രദായവും നിലവിലുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, വിതയന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നെടുകയും കുറുകയും വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന പതിവും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം ചെടികൾ ഒരേ അകലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായകമായിത്തീരുന്നു.

കൃഷിപ്പണികൾ

നാരു എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ജലസേചനം നടത്തിയാണ് കാട്ടുപണം കൃഷിചെയ്യുന്നത്. മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കൃഷിചെയ്യാമെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

കാട്ടുപണം കൃഷിചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായി മൺസൂൺ കാലത്താണ്. മൺസൂൺ കാലത്തിനു മുമ്പും ദുർല്ലഭമായി ഇതു കൃഷിചെയ്യാറുണ്ട്. മൺസൂൺ കാലത്തെ ആദ്യമഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുവോ മഴയില്ലാത്തപക്ഷം ഒരു ജലസേചനം നടത്തിയ ശേഷമോ നിലം നന്നായി രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉഴുതുമറിക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു നിരപ്പാക്കിയശേഷം കാട്ടുപണത്തിന്റെ വിത്തു ഒരു ഹെക്ടറിന് 60-80 കിലോഗ്രാം എന്ന അളവിൽ വിതയ്ക്കുന്നു. വിതച്ചശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി നിലം ഉഴുത്ത് വിത്തു മണ്ണിൽ മൂടുന്നു. അനുകൂലപരിതസ്ഥിതികളിൽ വിത്തുകൾ വേഗത്തിൽ

മുള്ളുകയും നാലാം ദിവസം മണ്ണിന് മുകളിൽ മുളകാണാനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെടി ശൈശവപ്രായത്തിൽ, മണ്ണിലുള്ള ജലാംശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരുന്നു. മഴയില്ലാത്തപക്ഷം രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നിലത്തിൽ വെള്ളം കൗറി ജലസേചനം നടത്തണം. ഇപ്രകാരമുള്ള ജലസേചനം കാട്ടചണത്തിന് അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽക്കൂടി, നല്ല നീളവും തുക്കുള്ളതലമുള്ള വിളവ് ലഭിക്കാൻ സഹായകമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം വളർത്തുന്ന ചെടികൾ 2½-3 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരും.

വിതച്ചു കഴിഞ്ഞു, പ്രതേകമായി കൃഷിപ്പണികളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാട്ടചണം നല്ലപോലെ തിങ്ങി വേഗത്തിൽ വളരുന്നതുകൊണ്ട് കളകൾ വളർന്ന് ഉപദ്രവകരമായിത്തീരാനിടയില്ല. പച്ചിലവളത്തിനായി കൃഷിയുന്ന കാട്ടചണം വേണ്ടത്ര തിങ്ങി വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവയുടെ അഗ്രം മുറിച്ചുകളയുകയോ കുന്നുകാലികളെക്കൊണ്ട് കറേറ്റേ തീറ്റിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വേണ്ടത്ര ശാഖകൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും.

വളങ്ങൾ വളപ്രയോഗങ്ങൾ

സാധാരണ കാട്ടചണകൃഷിക്ക് വളങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന പതിവില്ല. എന്നാൽ സൂപ്പർഫോസ്ഫേറ്റ്, ട്രൈഫെക്ടറിന് 30 കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിൽ ചേർക്കുന്നത് ആദായകരമായിരിക്കും. ചെടികൾ ശരിയായി വളരുന്നതിനും വിളവു വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പച്ചിലവളമായി കാട്ടചണം കൃഷിചെയ്യുമ്പോൾ, സൂപ്പർഫോസ്ഫേറ്റ് ചേർക്കുന്നത് അവയുടെ വേരുകളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും കൂടുതൽ മൂലാർബുദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും അങ്ങനെ കൂടുതൽ അന്നരീക്ഷ നൈട്രജനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിക്കുന്നു. കാട്ടചണം പച്ചിലവളമായി കൃഷിചെയ്തിട്ട് തുടർന്ന് നെല്ല് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ, സൂപ്പർഫോസ്ഫേറ്റ് നെല്പിന് നേരിട്ടു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം, മുൻവിളയായ കാട്ടചണത്തിന് നൽകി അവ നിലത്തിൽ ഉഴുത്ത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം.

വിളവെടുപ്പും സംസ്കരണവും

കാട്ടചണം നല്ലതു പോലെ വിളഞ്ഞു വിത്തു ലഭിക്കുന്നതിന്, വിതച്ച കഴിഞ്ഞു നാലു-നാലര മാസക്കാലം വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ നാരു എടുക്കുന്നതിന് മൂന്നര നാലു മാസത്തെ വളർച്ച മതിയാകും. പച്ചിലവളമായി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വിളവുകാലം കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ കാട്ടചണച്ചെടികൾ പച്ചിലവളത്തിനു വേണ്ടി മണ്ണിൽ ഉഴുതുചേർക്കാം. ഈ സമയത്തു അവ പൂവിടാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കും.

നാരു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, കാട്ടചണച്ചെടികൾ പൂവിടൽ കഴിഞ്ഞു കായ്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തു വിളവെടുക്കുന്നു. പഠിച്ചെടുക്കുകയോ മണൽപ്പുരപ്പിൽ വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുകയോ ആണ് പതിവ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കായ്കൾ നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞശേഷം മാത്രമേ ചെടികൾ പിഴുതെടുക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ പൂവിടൽ കഴിഞ്ഞു കായ്കൾ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തു വിളവെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതു്. നിറം, ബലം, മുട്ടത്വം എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ള നാരു ലഭിക്കുവാൻ ഇതു് സഹായിക്കുന്നു.

പിഴുതെടുത്ത ചെടികൾ നിലത്തിൽ കിടന്നുതന്നെ ഏതാനും ദിവസം ഉണങ്ങാനനുവദിച്ചശേഷമോ ഉണങ്ങാതെ തന്നെയോ ചണം അഴുക്കാനുള്ള കളങ്ങളിലേക്കും ടാങ്കുകളിലേക്കും മറ്റും മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചെടുത്ത ചെടികൾ കെട്ടുകുളാക്കി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടുകയാണ് പതിവ്. വെള്ളത്തിൽ അവ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കെട്ടുകളുടെ മുകളിൽ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ വയ്ക്കുകയോ അടിയിൽ കുറ്റികൾ നാട്ടി അവയോടു ബലമായി ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചെടികൾ അഴുകി പാകമാകുന്നതിന് ഒരാഴ്ചയോളം വേണ്ടിവരും. അതിനുശേഷം കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നു എടുത്തു നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുറം ചട്ടു വേരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു മുകളിലോട്ടു നീളത്തിൽ വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. നന്നായി അഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ

പ്രവൃത്തി നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേർപെടുത്തിയെടുത്ത പുറംചട്ടയിൽനിന്ന് നാരുക്കൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും പുറമേയും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സസ്യഭാഗങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യണം. ഇതിനുവേണ്ടി അവ അലക്കുന്നതു പോലെ കല്ലിന്മേൽ അടിക്കുകയും വെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു മൂലം അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും നീളമുള്ള പാളിയായി നാരുക്കൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നാരുക്കൾ രണ്ടോമൂന്നോ ദിവസം വീണ്ടും ഉണക്കി പിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നു. കച്ചവടത്തിനും കയറ്റുമതിക്കുമായി നാരുക്കൾ 181 കി. ഗ്രാം. തുക്കമുള്ള കെട്ടുകളാക്കുന്നു. ഈ കെട്ടുകൾക്ക് ബെയിലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ചെടികൾ അഴുക്കാനും കഴുകാനുമുപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധി, വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത നാരുക്കളിലെ മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കാട്ടചണനാരിന്റെ നിറം. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ അഴുകിയതും കഴുകിയതും മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്തതുമായ നാരുക്കൾ തുവെള്ള നിറത്തോടുകൂടിയവയായിരിക്കും. കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിലഴുക്കുക. കഴുകൽ തൃപ്തികരമല്ലാതിരിക്കുക, മലിനവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ നാരിന്റെ നിറം മങ്ങുകയും തവിട്ടു നിറമുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചെടികൾ അഴുക്കി കഴുകി നാരു് ഏടക്കുന്നതിനു പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലാണ് നാരുക്കൾ പാകപ്പെടുത്തി ഏടക്കുന്നത്. ഇതിന് ഡ്രൈപ്രോസസ്സ് (ശുഷ്കപ്രക്രിയ) എന്നു പറയുന്നു. ആദ്യമായി കരിമ്പ് ആട്ടുന്നതു പോലെ പിഴുതെടുത്ത കാട്ടചണം റോളറുകൾക്കിടയിൽ കൂടി കടത്തി ചതച്ചെടുക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ചതച്ചെടുത്തവ ചീകൽയന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചീകി, രടിയുടെ അംശവും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയും നാരുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാർഗം വിപുലമായി എങ്ങും പ്രചാരത്തിലില്ല.

ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ശരാശരി 500-900 കിലോഗ്രാം കാട്ടുചണനാരു ലഭിക്കും. എന്നാൽ നല്ല വിളവാണെങ്കിൽ 1400 കിലോഗ്രാം വരെ നാൽ ലഭിക്കുന്നതും അപൂർവ്വമാണ്. ഉണങ്ങിയ തണ്ടിൽ നാരിന്റെ അളവ് എട്ടു ശതമാനമായിരിക്കും.

സസ്യസംരക്ഷണം

മറ്റു വിളകളെപ്പോലെ തന്നെ കാട്ടുചണവും നിരവധി ക്ഷുദ്രപ്രാണികളുടെയും കമിരാരോഗങ്ങളുടെയും ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാണ്. ഈ കാരണത്താൽ വർഷം തോറും കനത്ത നഷ്ടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.


ക്ഷുദ്രപ്രാണികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാട്ടുചണ നിശാശലഭം (യൂടെത്സ്യ പർവ്വല) ആണ്. ഇതിന്റെ പൂക്കൾ കാട്ടുചണത്തിന്റെ ഇല കാർന്നതിന്നു വളരുകയും അങ്ങനെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളർന്ന ചെടിയുടെ കായ്കളും ഈ പൂഴ് തിന്നുന്നു. ഇവയെക്കൂടാതെ ആർജ്ജിന ക്രിബ്രേറിയ, ആർജ്ജിന സിറിഞ്ചാ എന്നീ നിശാശലഭങ്ങളും ഇലയും കായ്കയും തിന്ന് ചെടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രാണികളെ കൈവല ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കുകയോ വിഷം തളിക്കുകയോ ചെയ്ത് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. കാട്ടുചണച്ചെടിയുടെ മുകൾഭാഗത്തെ തണ്ടുകൾ തുറന്ന് തിന്ന് നാശം ചെയ്യുന്ന ഒരു തണ്ടുതുരപ്പൻ പൂഴ്വം (ലാസ്‌പിറേസിയ (സുഡോനെക്‌ടിസ്)) വർഷംതോറും വലിയ തോതിൽ ഉപദ്രവം ചെയ്യാറുണ്ട്.


കാട്ടുചണത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ വാട്ടരോഗവും തുരുമ്പുരോഗവും ആണ്. വളർച്ചയുടെ എത്ര ഭാഗത്തിലും ചെടി അപ്പാടെ വാടി ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് വാട്ടരോഗലക്ഷണം. തുരുമ്പുരോഗം ചെടിയുടെ ഇല, തണ്ട്, കായ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് വളർച്ച മന്ദീഭവിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു രോഗങ്ങൾക്കും ശരിയായ പ്രതിവിധി അവയെ നേരിടുന്നതിന് ശക്തിയുള്ള ഇനങ്ങൾ വളർത്തുക എന്നതാണ്.

ഉപയോഗവും സാമ്പത്തികപ്രാധാന്യവും

കാട്ടുചണനാൽ പല തരത്തിലുള്ള കയറുകൾ, പരക്കൻതുണി, ധാന്യസഞ്ചികൾ, ടെൻറ് തുണി, മീൻപിടിത്തവല എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ നാൽ സാധാരണ ചണത്തിനുപകരമായും കുറഞ്ഞതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാട്ടുചണനാൽ, സാധാരണചണനാരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബലമുള്ളതും ഈടുനിൽക്കുന്നതുമാണ്. കാട്ടുചണനാൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കയർ വളരെ ബലമുള്ളതും ജലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് ശക്തി കൂടിയതുമാണ്. ഇത്തരം നാലുകൾ 'ചാർപോയ് കൾ' ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പല തരത്തിലുള്ള ചരടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഈ ചണനാൽ കാമുഫ്ളാഷ് വലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. റയോൺ, കൃത്രിമപ്പട്ട് എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബലമുള്ള റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ നിർമ്മാണത്തിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് 1932-34 കാലത്ത് ശരാശരി ഒരാണ്ടിൽ പതിനയ്യായിരം ടൺ നാൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. 1935-38 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് മുപ്പത്തിഏഴായിരം ടണ്ണായി ഉയർന്നു. 1939-40-ൽ ശരാശരി നാല്പതിനായിരം ടണ്ണായി ഇത് വർദ്ധിച്ചു. ഇന്നാകട്ടെ സാധാരണ ചണത്തോടൊപ്പം വർദ്ധിച്ച തോതിൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുക വഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വിദേശനാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒരു പ്രധാന നാരുവിളയാണ് കാട്ടുചണം.





കേരളത്തിലെ നാരുവിളകൾ

കേരള സംസ്ഥാന ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയും
കേരള ഗ്രന്ഥശാലാസംഘവും

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൂടി നടപ്പിലാക്കി
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷി പുസ്തക
കോർണർ പരിപാടിയിലുംപ്പെടുത്തിയാണി
പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന
നാരുവിളകളുടെ കൃഷി രീതിയെയും
ഉപയോഗത്തെയും പറ്റിയെല്ലാം, സാമാന്യ വായന
ക്കാരുന് മനസ്സിലാകും വിധത്തിൽ
ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പേജ് 97

വില്പന ക. 3



കേരളത്തിലെ
നാരവിളകൾ



കേരള ഹെർബറിയം